






Est. B-76  
Tab. 49  
N.<sup>o</sup> 2

24





GOOGIE PAPER CO.



**F L O R A  
C O C H I N C H I N E N S I S.**

TEORIA  
COCHINCHINENSIS

# FLORA COCHINCHINENSIS:

SISTENS

PLANTAS IN REGNO COCHINCHINA NASCENTES.

QUIBUS ACCEDUNT ALIÆ

OBSERVATÆ

IN

SINENSI IMPERIO,

AFRICA ORIENTALI,

INDIÆQUE LOCIS VARIIS.

OMNES DISPOSITÆ SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE LINNÆANUM.

LABORE, AC STUDIO

JOANNIS DE LOUREIRO

Regiae Scientiarum Academiæ Ulyssiponensis Socii: olim in Cochinchinâ Catholicæ Fidei Praeconis: ibique rebus Mathematicis, ac Physicis in Aulâ Praefecti.

Jussu Acad. R. Scient. in lucem edita.

---

*Xylaloen, Myrrham, Piper ardens, Sacchara profert:  
Pluraque, si repetas, officiosa dabit.*

---

TOMUS I.



UNIVERSIDADE DE COIMBRA  
JARDIM BOTANICO

ULYSSIPONE  
TYPIS, ET EXPENSIS ACADEMICIS.

ANNO M.DCCXC.

Permissu Regii Concilii pro Examine, & Censurâ Librorum.

N-5-

A C O D E H  
C O C I T I O N I S M A N I F E S T A

L E V A N T A S I N R E S E N T I A C O N G R E G A T I O N E  
G U I T U R S A C O N C O L D A  
O P E R A C O N C O L D A

In opere , sicubi a sententiâ Veterum recesserim , intelligatur  
hoc factum animo proficiendi in melius , non innovandi . . . Decre-  
tum mihi fuisset aliorum inventis , quantum in me fuerit , ad-  
dere , cum tamen non minus optaverim etiam inventa mea ab aliis  
in posterum superari . Bac. de Verul. de Dignit. , & Augm. Scient.  
l. 9. prope finem.

Intelligendum est eorum omnium , quæ inveniuntur , aliqua esse ,  
quæ jam ab aliis aliquâ ex parte comprehensa . . . longius progre-  
diuntur , magnumque incrementum capiunt . Alia autem a prima ori-  
gine inventa non ita multum a principio progrediuntur : sed tamen  
multo plus utilitatis habent illa initia , quam reliqua omnis , quæ  
ex his proficiscitur accessio . Arist. de Repreh. Sophist. l. 2. c. 8.

A R T I G O  
EXTRAHIDO DAS ACTAS

D A

ACADEMIA REAL DAS SCIENCIAS,  
da Sessaõ de 9 de Agosto de 1788.

**D**etermina a Academia que a Flora da Cochinchina, que o seu Socio Joao de Loureiro, lhe tinha apresentado, se imprima á custa da Academia, e debaixo do seu privilegio.

JOZÉ CORRÉA DA SERRA

Secretario da Academia.

A R T I C O  
EXTRAHIDO DAS TECAS  
ACADEMIA REAL DAS SCIENCIAS  
do Passeio de 6 de Agosto de 1833.

**E**steve que o Brasil é um país que a Terra do Brasil é  
um dos países mais ricos do mundo, que temos  
que cultivar os inícios de cultura que aí se encontra,  
que é a terra de ouro e prata.

JOSE CORREIA DA SILVA  
Secretário da Academia

## REGÆ SCIENTIARUM ACADEMIÆ

ULYSSIPONENSIS

CLARISSIMIS SOCIIS.

**V**ESTRIS auspiciis, Socii Clarissimi, tandem aliquando in lucem prodit Flora Cochinchinensis, quæ variis inter casus ultra vicennium eluctata non nisi senior potuit e tenebris emergere. Faciem Indicis plantis illustrandis Authores varii prætulerant, in primis Batavi, quibus ante duo sæcula lumen haud modicum præstiterat noster Garcias ab Horto insigni opere Botanico de Aromaticis, in diversas linguas properè translato, sæpiusque typis edito. Hujus præmium optimè noverat doctissimus Carolus Clusius, ejusdem interpres Latinus, dum præsaga quadam mente asserere ausus est fore, ut ejus lectione excitata præclara ingenia Authoris exemplum sequerentur.

Ast, nescio quonam fato, illud evénit, ut Maiores nostri, quibus nec occasio, nec vires deerant, domestico exemplari minus attenti sese illi negligerent conformes reddere, & Botanicam scientiam vix a limine salutarent. Unde longâ temporis injuriâ factum est, ut Vegetabilis regni pretiosis emolumentis quodammodo privaremur, quibus aliæ interdum Nationes divites evasere. Attamen non semper eadem rebus facies inest; ipsaque temporis conditio, si Superi faveant, ex deteriori in sanitam, felicemque sæpe convertitur.

Faverunt utique; erecta siquidem superâ scientiarum Regali Academiâ Ulyssiponensi, per Vos, Clarissimi Socii, mature provisum est, ut in quatuor Orbis partibus, in

In quas Lusitanum imperium latè extenditur, tam rem Herbariam, quam cætera Naturæ arcana idonei viri per-scrutentur: perscrutata, repertaque debitum in ordinem redigantur: redactisque, & publico usui oblatis, omnibus, quotquot sunt ubicunque gentium cultiores populi, vestris laboribus, ac studiis prospiciatis.

Talibus, tantisque initii pergrandia incrementa omniari cujuscunque erit: præsertim cum incæpto operi promovendo nos omnes Patrocinio suo corroboret, imo & munificentia compellat Augustissima, Fidelissimaque Regina nostra MARIA I. Quippe quæ haud ignara liberalium Artium culturam domi, bellique validum afferre humanis rebus subsidium, Academiæ stabiliendæ consuluit, subditos sibi populos perenni sapientiâ beatura.

Eadem vota prosequitur, factis olim superaturus, Serenissimus Brasiliæ Princeps JOANNES, Augustissimâ Matre præeunte: quæ & *vinci gaudet ab illo*, dummodo Lusitanæ propaginis fælicitas in ævum maneat, augeatur, redundet.

Accedit, ingensque robur literariis studiis adaugendis profecto addit Illustrissimus alter Joannes Alafoniæ Dux, ejusdem Brigantinæ, id est Regiæ Stirpis Germen Inelitum. Enim vero, cum longe, diuque politiores orbis tractus idem ipse peragraverit, celebriores Academias inviserit, literarios progressus observaverit, nova inventa collegerit, leges, ac statuta annotaverit, quidquid inde bonæ frugis apud exteris invénit, in Patriam operosus retulit, & in Patrios usus curavit adoptari. Hinc Natale suum fortunato duxit Academia nostra, tanto Parente dignum; quem proinde non Academiæ tantum, sed Patriæ Patrem (nomen apud Romanos maximum) æquo jure appellaremus, nisi Magni Viri Modestia repugnaret.

Ita-

Itaque maecti animo estote, Socii Clarissimi, ut opus Academicum perficiatis, quod tam solidis columnis suffultum conspicitis. Seduli promovete, usque dum numeris omnibus absolutum deveniat. Materiam Vobis adstruentibus abunde suppeditabunt non Europa solummodo, sed Asia ipsa, sed Africa quoque, & America, Vobis eo pluris habendam, quod plerumque in proprio, et si remotissimo solo inventam, atque collectam.

Opis meæ non erit lapides, metalla, & his pretiosiora tantæ moli erigendæ conferre: iners tamen, & prorsus inutilis socius non ero. Ex meo qualicunque penu Vobis offero Floram istam Cochinchinensem. In ejus penetralibus invenietis ligna ad construendum apta, colores ad ornandum pulchros, annonam, ac pharmaca copiosa, & necessaria, ut laborantium vires reparentur, operi consummando impensa, & in commune bonum destinatæ.

Vestrum erit munera exilitatem non deditari. Meum Vobis omnibus morem gerere, & quidem animo perlubenti; honoris enim permagni mihi est, quod dicar, & agnoscar

Dabam Ulyssipone  
pridie Kalendas Octobris an. 1788.

Vester, quamvis minimus, Socius  
Joannes de Loureiro.

CAN-



CANDIDO, AC REI HERBARIAE  
STUDIOSO LECTORI.

**R**E G N U M Cochinchinæ, quod ante duo sæcula Tunkini pars fuerat, incipit circa decimum octavum gradum latitudinis Bo-real is: indeque, occupatis regno Champavâ, & parte Orientali Cambodiæ, latè ad Austrum extenditur per gradus plusquam novem usque in sinum Siamensem.

Triginta sex annis, quibus in eo commoratus sum, sat temporis habui ad perscrutanda Naturæ arcana regionis peculiaria: quantumvis non satis otii, vel cuiuslibet adjumenti, cum sola diligentia, & industria mihi subsidio fuerint. Illuc primo transmeaveram eum in finem, ut Evangelicus Præco communem omnium Creatorem, & Salvatorem Jesum Christum illis gentibus annuntiarem. Ast, cum ethnica superstitione nimium obfisteret, & regni leges vetarent, ne homo Europæus ibi pedem figeret, opus mihi profecto fuit, ut manendi facultatem obtinerem, omnibus Prudentiæ viribus, Constantiæ, & Charitatis contendere.

Prudentiæ quidem, ne nimio zelo correptus viderer Principis leges palam despicere; insimulque, ut earum Scientiarum usu, quæ illi magis placere poterant, firmiorem ipsius gratiam demererer: Constantiæ, ut adversa quælibet, quæ etiam in genitali solo haud raro obveniunt, in alieno fortiter sufferrem: Charitatis, ut *omnibus omnia factus*, privato commodo, lucroye posthabito, alienis necessitatibus subvenirem; idque præcipuè ope artis Medicæ, quâ, juxta Dominicum præceptum *curate infirmos, qui in illâ sunt*, opportuniora pharmaca omnibus, tam fidelibus, quam infidelibus depositibus sollicitè, & gratis quidem distribuebam. Itaque, Deo favente, & populari aurâ lenius afflante, non difficulter evénit, ut per Regem mihi liceret ibi morari: quin etiam in ejus aulâ rebus Mathematicis, & Physicis Præfectum me constituit. Verum non eo ipso Evangelicæ doctrinæ promulgandæ libertatem fecit: dissimulabat tamen dummodo res cautè, & occultè ageretur.

Rebus ita dispositis, affluentum multitudine pene obruebar, quorum multi Catholicæ Religionis mysteriis, ac præceptis instrui postulabant, plerique non nisi corporis medicamenta exposcebat. Ea tamen diversis morbis curandis necessaria nec ex Europâ habere poteram, nec, si habuisssem, satis forem ad solvendum. Quapropter cogitare ex hinc cœpi, quanam ratione materiam Medicam, Cochinchinæ indigenam, & ibi non magno parabilem Europææ pretiosiori substituerem? Hocque initium, & causa fuit conatus mei in Scientiâ Botanicâ.

Defectu Magistri , & Authorum , qui manuducerent , tardus procedebam . Nec ex Dioscoride , ejusque commentatore Lagunâ , Rajo , & Tournefortio , quorum opera Botanica successive adeptus fueram , satis mihi affulgebat lucis , ut Indicas plantas luculenter discernerem : quarum multæ , licet ejusdem Generis , & speciei sint , attamen persæpe apparent facie ab Europæs quodammodo diverfâ .

Tandem , labente tempore , opera Cel. Linnæi , Genera Plantarum , & Systema Naturæ , Philosophiamque Botanicam obtinui , ex Cantone Sinarum mihi dono missa ab Humanissimo Viro Thoma Ridell , navis Anglicæ Ductore , cuius amicitæ multum deboe . His instructus doctrinâ , & terminis Linnæanis uti cœpi : statimque cognovi , quantum hoc sistema aliis præcellat , quantumque facilitatis tyronibus subministret , qui aliis adminiculis destituuntur .

Desiderantur in Cochinchinâ horti Botanici , Principumque viridaria , prout habentur in Europâ , ubi has cum illis plantis comparare , ac differentias quascumque internoscere facile possumus . Plantæ Cochinchinenses pleræque agrestes sunt , ex altissimis montibus , & vastis sylvis non sine magno labore , & periculo sparsim petendæ . Quid igitur systemate Sexuali Linnæano facilius , ut earum cognitionem in promptu habeamus ? Floris nunquam antea visi , numeratis staminibus , habemus Classem : numeratis Pistillis , Ordinem : in plurimæ etiam non observatis situ , & proportione , quibus oculi frequenter decipiuntur . Cognitis Classibus , & Ordinibus , quæ ampliora , & primaria sunt fundamenta Botanicæ , Genera quoque citius distinguuntur propriis notis . At differentias specificas quis melius Linnæo determinavit ? Tournefortius , qui cæteroquin alias Botaricos antecellit , plurimas species proponit , quæ vix varietates dici possent , nimis fusus florum coloribus , quibus nil mutabilius , & fallacius .

Non dissimulabo occurrere adhuc in Systemate Linnæano plantas anomalas , aberrantesque notis repugnantibus Charakteri generali non solum Speciei , ac Generis , sed etiam Ordinis , & Classis : quæque mihi non parum molestiae attulerunt . Hæ autem , vel repetitis observationibus reducendæ , si corrigi possint , vel pro monstris habendæ , tolerandæque : sicut animal quodlibet , si nascatur aliquâ sui corporis parte auctus vel deficiens , ut monstrum miramur , sed non ideo cogimus a proprio Genere exulare . Quodnam vero Systema Botanicum habemus , in quo similes aberrationes non obsint ?

*Verum ubi plura nitent in corpore , non ego paucis  
Offendar maculis , quas vel injuria fudit ,  
Aut oblita parum cavit Natura.*

Igitur Celeb. Linnæi Systema amplectens materiam amplam , & facile parabilem acquisivi , mihi pro usu Medico necessariam . Plantarum ,

tarum, quarum virtutes cognoveram, vel ex libris Europæis, vel ex Sinicis, & indigenis, characteres, proprietates, & habitum sedulo descriebam: quas vero praxi Medicæ inutiles judicabam, prorsus rejiciebam. Verumtamen, cum harum numerus quotidie augeretur, in mentem vénit otiosum non fore, si has pariter colligerem, & describerem, Linnæano Catalogo addendas, ac futuro usui fortasse utilles, quamvis præsenti inutiles videbantur. Exinde omnes indiscriminatim cæpi congerere, & in adversaria reponere. Quarum sexaginta circiter specimina, totidemque descriptiones memini per me missa fuisse Cantonem Sinarum, indeque in Angliam, & Sueciam anno 1774: de quibus meminerunt Clar. Bergius, (Mat. Med. pag. 5.) & Clar. Linnæus Filius. (suppl. pl. pag. 331.) Anno autem 1779, cum jam, relictâ Cochinchinâ, Cantone Sinarum residerem, nequid optata pateret via, quâ in Europam reverterer, Londinum misi ducenta triginta alia specimina plantarum, cum propriis earum descriptionibus, quæ mihi defectu plenioris notitiae Authorum, quos non habebam, tunc novæ videbantur, quamvis aliquæ novæ non essent.

Ex illis, pluribusque aliis apud me servatis, & iterato correctis hæc Flora componitur: nec tamen existimo eam esse completam; multas enim ex remotioribus sylvis petendas, quantumvis in Cochinchinâ spontanè nascentes, nec admodum raras, consequi non potui, quartam circiter partem integræ Floræ completuras.

Interea Cantone apud Sinas triennium remanens Sinenses plantas ibi observavi non paucas, quas mihi deferebat mercede conductus Sinensis rusticus, (Europæis enim non permittitur extra vicum suburbii vagari) rei herbariæ non prorsus ignarus: quiique solebat plantas undequaque exquisitas pharmacopolis vendendas colligere. Idem mihi dicebat earum nomina vernaculâ linguâ Cantonensi: quibus tamen non multum fidendum puto; siquidem, cum urgeretur dicere, suspicari possumus, quod aliquando, vero nomine non occurrente, arbitrarium quodlibet substituisse; qui Sinensium mos est, ne ignorantiam suam prodant. Nomina vero plantarum, quæ usui Medico, aut oeconomico magis inserviunt, ea correctiora sunt, utpote ex libris Sinicis ut plurimum excepta, & lingua universali Sinensi, quæ Literatorum dicitur, expressa.

In reditu a Sinis in Lusitaniam appellere coactus fui ad insulam Mozambicum in orâ Orientali Africæ, circa 15 gradum latitudinis Australis: ubi per tres menses commoratus studia Botanica prosequi cordi habui, colligens, & describens varias plantas rariores ex proximâ continente Africanâ. Alias pauciores comparaveram in diversis Indiae locis, quæ peragravi: nempe in Cambodiâ, Champavâ, Benghalâ, Malabariâ, Samatrâ, & alibi: quarum aliquas in hac Floræ propriis Classibus, & locis inserui.

Erit fortasse, qui reprobet me plantas aliarum regionum Flo-

ræ Cochinchinensi immiscuisse, cum Authores Floristæ loqui tantummodo debeant de illis, quæ sunt Floræ suæ concives. In hanc notam, qualisunque ea sit, non ignarus incurri, sed maiori commodo legentium consulens. Si illas in appendices, ut moris est, separasse, rigidiori methodo conformior fierem, sed tunc a scopo Naturalis Scientiæ deflecterem, quæ exigit ut proxima locentur, quæ Naturâ proximiora sunt, posthabitâ differentiâ natalium; proxima enim facilius conferuntur, collata melius dignoscuntur.

Ne vero earum patria, aut origo confundatur, propriis signis distinguentur. Cochinchinenses literâ α: Sinenses β: Africanæ γ: ex aliis Indiæ locis δ. Ita ut, quamvis advenæ, & Floræ hospitio exceptæ, ab hujus domesticis protinus discernantur. Voces, quæ dictas notas sequuntur, sunt nomina propria ejusdem plantæ, expressa lingua illius nationis, quæ tali notâ insignitur.

Quamvis methodum, & systema Celeb. Linnæi amplectar, quia meliorem non novi, non ita me coarctabo, ut ea, quæ aliter observavi, præteream, ac dissimulem. Quam libertatem notus Celeb. Viri candor, si adhuc viveret, non improbarer; licet enim multa, quæ scripsit, ipse propriis oculis observaverit, plura tamen ex locis remotioribus ab aliis Botanophilis accepit.

In indice characterum Genericorum cuilibet Classi præfixo mutavi interdum notam aliquam, quæ in variis speciebus characteri illius Generis adversatur: & adhuc alias excludendas puto, quando progressu temporis, quæ nunc dubia apparent, confirmantur. At incorpore Operis omnes characteres Botanicos ab ipso Linnæo adoptatos, tam Genericos, quam Specificos intactos omnino servavi: subjiciens tamen, quæ aliter me vidisse recordor.

Recentioribus quibusdam visum est, Clarissimis Hallero, Ludwigo, Forstero, Thunbergio præeuntibus, Systematis Linnæani Clases Gynandriam, Monoeciam, Dioeciam, Polygamiam vel noxas esse, vel superfluas. Ego circa Polygamiam non prorsus dissentio, ipsum met Linnæo Filio comprobante. Ait circa alias tres Classes aliter judico. In Gynandria de Generibus Polyandris Calla, Aro, &c. nihil certi decerni posse Linnæus ipsem agnoverat, ob Stamina, & Germina in illis confusa, ac numero incerta. Ex aliis Ordinibus ejusdem Clases, cuius Genera sexdecim in hac Florâ expono, Helioceras priores duæ species potius Monodelphæ dicerentur, quam Gynandras; cum earum stamina inferius coalescant in tubum, & a Pistillo videantur prorsus libera: binas alias species verè Gynandras observavi, utpoter munitas Antheris sessilibus Germini insidentibus.

In aliis Generibus vel stamina inhærent Germini, vel Stylo, sive manifestè Gynandra sunt: vel non ita clare, cum, aut Stylum, aut Stigma non habeant satis expressum, sed horum loco punctum aliquod, seu fossulam longiusculam a basi Staminis ad Pistillum ducentem,

tem, per quæ haud ineptè Gynandriæ adscribuntur. Hujus Classis sex Genera inveni Stamine unico donata, quæ si ex Classe Gynandriæ excludamus, transferri deberent ad Monandriam: ebitat autem, ne fiat, quod nulla planta horum sex Generum Corollam, Nectarium, Stamen, & Pistillum portet Monandris naturâ conformia: habituque gaudent Orchideo potius, quam Scitamineo.

Eadem ratio prohibet Classes Monoeciam, & Dioeciam repudiari, quarum plantæ, quamvis multæ sint ordinis Monandri, non tamen habitu, aut flore bene convenient cum classiariis Monandris. Præterea causa rejecendi has duas Classes supponitur esse inconstantiam florum, qui in illis nunc inveniuntur Monoici, nunc Dioici, sœpe etiam Hermaphroditi: & qui Hermaphroditi nascuntur in America, sœpè Dioici, vel Polygami occurant in insulis maris Australis, Clar. Forstero testante. Ego observationibus Clar. Virorum non præsumo contradicere. Tantum assero frequentem inconstantiam florum illarum Classem mihi obviam non fuisse: sed raram quidem, prout Celeb. Linnæus jam ante obseruaverat, quamque propriis locis annotare non prætermittam.

Itaque, servatis in hac Florâ Clasibus, & Ordinibus Celebri Coryphæi nostri Linnæi, cuilibet Geneti, & Speciei præponam definitionem, si adsit, ab eodem præscriptam, vel adoptatam. Si vero desideretur, nostram substituimus, ita ut nullum Genus, aut Speciem proferamus absque definitione præviâ. Subsequenter habitus plantæ, simulque notæ qualibet per me observatæ, quibus eadem planta conuenit, aut dissidet a definitione Linnæanâ, vel a Synonimis Authorum, ut his cum illis proxime collatis, veritas facilius eruat, & illucescat. Similes notas desideravi frequenter videre in multis operibus Botanicis, nec tamen inveni, vel quia non fuerant observatæ, vel ut superfluæ reliquæ. Sed illis carens quis recte judicare poterit de plantis exoticis, aut longinqui soli, an aptè, vel ineptè collocatae fuerint, aut collocandæ sint in tali Genere, vel Specie? Quomodo Scientiæ perfectio obtinebitur? Quam perinde expectaverat Gesnerus sapienter ad Fuchsium scribens. *Quod si suas quisque observationes protulerit, spes est aliquando fore, ut ex omnibus opus unum absolutum perficiatur.*

Genera, & Species hujus Floræ signori notata non omnia nova esse præsumo. Tantummodo indicate volui eas plantas vel in operibus Celeb. Linnæi non inveniri, vel ita a meis observatæ discrepantes, ut pro diversis, aut novis haberi possint. Circa novas Species, aut Genera constitienda non omnibus idem est judicium. Itaque hæc nostra in dato loco maneant, donec Doctorum Vitorum consenserit, cui non repugno, in meliorem transferantur.

Descriptionibus, & Synonymis Authorum paginas implere, & lectorem gravare non estranigus. Qui plura velit, facile collecta inveniet

yeniet in Systemate plantarum Linnæano per Clar. Reichardum recen-  
ter edito, & alibi. Nos ad singulas species duos plerumque laudabili-  
mus, ex his præcipue, qui plantas Indianas in ipsa Indiâ examina-  
runt, vel saltem, si habeantur, qui, acceptis inde herbariis siccis,  
de illâ plantâ curiosius egerunt. Nec per id fateri velim mea cum  
illis penitus convenire. Inter illos in primis excellit industrius, &  
indefessus Rumphius, cum quo nostra frequentius coherent, tum ob  
minorem distantiam locorum, tum ob acutius hujus Authoris ex-  
amen. Hortum Malabaricum Clar. Rheedii, quem mihi perutilem fu-  
turum sperabam, quamvis diligenter quæsitum non potui obtinere;  
ideoque raro in testem vocavi ab aliis laudatum. Pro plantis Celeb. Lin-  
næo nondum cognitis, nec ab alio clare descriptis, sed a me nuper  
observatis non prætermittam quemlibet Authorem citare, quem judi-  
cem de illâ egisse, quamvis obscurè, & incompletè.

Solum natale cujuscumque speciei ut plurimum subjici; siquidem ex illius qualitate sæpe istius proprietates inferuntur. Quas syl-  
vestres dico, satis intelligitur esse indigenas. De cultis paucæ sunt de  
Sinis translatæ in Cochinchinam: paucissimæ ex aliis locis. Tempus  
florendi non apposui, quia in multis incertum est in terris Äquato-  
ri proximis, ubi arbores longo tempore florent, aliquæ toto anno;  
& admodum rara est, quæ certo tempore foliis omnibus spolietur.  
Utile judicavi arborum, fruticum, & herbarum magnitudinem ordi-  
nariam indicare, non tamen immutabilem, cum aliquando plus cres-  
cat herba humilis in optima terrâ, & climate, quam arbor procerat  
in pessimis.

Uſus œconomicos non debui præterire, cum hic sit finis pri-  
marius Botanicæ, & ex regno Vegetabili pleraque commoda homi-  
nibus proveniant. Eos breviter indicavi, quos ex propriâ, vel inco-  
larum experientiâ melius stabilitos comperi. Virtutes Medicas non te-  
mere extuli, sed praxi diuturnâ probatas, sæpe etiam in libris Sini-  
cis comprobatas. Multæ quidem cum Medicinâ Europæâ conveniunt:  
aliæ, quamvis exoticæ, non ideo despiciendæ, sed amplius proban-  
dæ. Sapor, & odor plantæ ad hanc cognitionem ducunt, ideo inter-  
dum notantur. Florum colores nec ad cognitionem Medicam, nec  
ad Botanicam multum præstare existimo: non tamen fuerunt omitten-  
di; nam primo oculi intuitu ab illis ducimur in ulteriore cognitionem,  
hominesque indocti ex illis quomodocumque dignoscunt diver-  
sas species, quamvis sæpè fallaciter: omnes autem allicimur, & re-  
creamur picturâ illâ tam variâ, quam naturali.

Botanophilis vulgo non placent opera Botanica, quæ tabulis,  
& figuris plantarum elegantioribus non adornantur. Ego in hac arte  
non valeo: nec in Cochinchinâ, & in aliis peregrinationibus meis  
inveni peritum aliquem, qui adjuvaret. Plantas rariores, quas colle-  
gi, & exsiccatas servavi, partim in Angliam misi, partim familiali-  
ter.

ter tradidi Botanicæ studiosis videndas , nec amplius recēpi : ac , etiam si recepissem , non hīc facilè invenirentur artifices , qui eas debitā formā , & elegantiā exprimerent. Illis autem deficientibus , liceat mihi effari cum Celeb. Linnæo ( Gen. pl. pag. X. ) *Verbis tentabimus omnes exprimere notas æque clare , si non clarissim , ac alii splendissimis suis iconibus.* Nam prout Cl. Scopolius benè advertit ( Introd. Histor. Natur. pag. 6. ) *Bona figura tunc utilis , cum data descriptio manca , aut genuinus individui character nondum fuerit detectus.*

Tandem Candidum Lectorem rogamus , ut benignè ferat , & corrigat quoscumque lapsus , quos proculdubio inveniet in hoc opere. Nec dubitamus multa esse , quæ nos præterierint ; homines enim sumus , & occupati officiis , subcisisisque temporibus ista curavimus : libenter fatemur cum Plinio Seniore. In præfactione Hist. Naturalis.

De accentibus , & signis grammaticalibus linguæ Cochinchinensis , & Sinensis propriis pauca dicere oportet : sine quibus quælibet earum voces , quæ omnes monosyllabæ sunt , nequeunt omnino intelligi , quando literis Europæis exprimuntur ; habent enim suas peculiares , & a nostro alphabeto prorsus diversas.

Accentu accuto ( . ) vox attolitur : gravi ( . ) deprimitur : circumflexo ( „ ) ore constricto , & semiclauso pronuntiatur. Signo ( - ) sonus prolongatur : ( ~ ) abbreviatur : interrogativo ( ? ) quasi interrogando profertur : puncto cuilibet vocali supposito ( ¸ ) asperitate quadam gutturali , & tremulâ prolongatur. Aspiratione ( . ) vox aspera expirando promittur. Litera b transversè secta ( b ) indicat sonum medium inter b commune , & v consonans. Litera d simili sectione notata ( d ) indicat sonum medium inter d , & r. Vocales o , & u transversè sectæ ( u ) pronuntiari debent labiis ad latera diductis , in medio conniventibus. Ex ipsis signis aliqua sunt communia linguae Cochinchinensi , & Sinensi : plura peculiarem usum habent in illâ : alia tantummodo in istâ. Omnia ; verò cum molesta sint typographo , sœpe ab illo omittuntur.

certainty. Posterior probability, however, does not give us any information about the true value of the parameter, but it gives us information about the distribution of the parameter. This is why posterior probability distributions are called "probabilistic distributions".

The first step in Bayesian statistics is to define a prior distribution for the parameters. This prior distribution is based on previous knowledge or experience. It is often a normal distribution, which is centered around zero and has a standard deviation of one.

The second step is to calculate the posterior distribution. This is done by multiplying the prior distribution with the likelihood function. The likelihood function is a function that describes the probability of observing the data given the parameters. It is often a normal distribution, which is centered around zero and has a standard deviation of one.

The third step is to calculate the posterior distribution. This is done by multiplying the prior distribution with the likelihood function. The likelihood function is a function that describes the probability of observing the data given the parameters. It is often a normal distribution, which is centered around zero and has a standard deviation of one.

## AUTHORES IN HAC FLORA LAUDATI.

- A* Cost. Arom. Christophori A Costa Historia Aromatum, Clusio interprete, 1605. in f.
- Aet. Helv.* Acta Helvetica, Physico-Mathematica, &c. Basileæ, 1751, & seq. in 4.
- Aet. London.* Philosophical transactions of the Royal society of London. London, 1665, & seq. in 4.
- Aet. Paris.* Histoire de l' Academie Royale des Sciences, &c. a Paris. 1702, & seq. in 4.
- Alp. Exot.* Prosperi Alpini de plantis exoticis libri II. Venetiis 1627. in 4.
- Alp. Ægyp.* Prosperi Alpini de plantis Ægypti. Leidæ 1735. in 4.
- Am. Ruth.* Joannis Ammani Stirpium rariorum in imperio Ruthenico sponte provenientium. Petropoli, 1739. in 4.
- Aublet Guian.* Histoire des plantes de la Guiane Françoise par M. Fusée Aublet. Tom. IV. a Paris, 1775. in 4.
- Bauh. hist.* Historia plantarum universalis Joh. Bauhini, & Henr. Cherleri. Tomi III. Ebroduni 1650. in f.
- Bauh. Pin.* Casp. Bauhini Pinax theatri Botanici. Basileæ, 1671. in 4.
- Bauh. Prodr.* Casp. Bauhini Prodromus theatri Bot. Basileæ, 1671. in 4.
- Bauh. Theat.* Casp. Bauhini Theatrum Botanicum. Basileæ 1658. in f.
- Bellon. Obs.* Petri Bellonii rerum in Græcia, Asia, Ægypto, &c. Observationes, Clusio interprete. Raphelengii, 1605. in f.
- Berg. Mat. Med.* Petri Jonæ Bergii Materia Medica. Stockholmiae, 1782. tomii II. in 8.
- Boerh. Lugdb.* Herm. Boerhaavii Index alter plantarum, quæ in horto Acad. Lugduno-Batavæ aluntur. Lugd. Bat. 1720. tomii II. in 4.
- Bont. Fav.* Jacobi Bontii Historia Naturalis, & Medica Indiæ Orientalis. Amstelædami, 1658. in f.
- Brow. Jam.* The civil, and natural history of Jamaica by Patr. Boown. London, 1756. in f.
- Burm. Zeyl.* Joannis Burmanni Thezaurus Zeylanicus. Amstelædami, 1737. in 4.
- Burm. Ind.* Nic. Laurentii Burmanni Flora Indica. Lugd. Batav., 1768. 4.
- Buxb. Cent.* Joh. Christophori Buxbaumii plantarum minus cognitarum Centuriæ V. Petropoli, 1728. in 4.
- Camer. Hort.* Joachimi Camerarii Hortus Medicus, & Philosophicus. Francfurti, 1588. in 4.
- Catesby Carol.* The natural history of Carolina, &c. by Mark Catesby. London, 1731. in f.

- Clus. Cur. Poster.* Car. Clusii Curæ posteriores. Raphel. 1611. in f.  
*Clus. Exot.* Car. Clusii Exoticorum libri X. Raphelengii, 1605. in f.  
*Clus. hist.* Carolus Clusius rariorum plantarum historia. Antuerpiæ, 1601. f.  
*Com. Hort.* Horti Medici Amstelædamensis rariorum plantarum descrip-  
tio, & icones, Auth. Jo. Commelino. Amstel. 1697-1701. in f.  
*Dalech. Hist.* Jacobi Dalechampii Historia generalis plantarum. Tomi  
II, Lugduni, 1586. f.  
*Dalib. Paris.* Floræ Parisiensis prodromus per Dalibard. Par. 1714. in 12.  
*DiEt. of Arts.* A new, and complete Dictionary of Arts, and Sciences  
by a Society of Gentlemen. Vol. IV. London, 1763. in 8.  
*Dill. Elth.* Joh. Jacobi Dillenii hortus Elthamensis. Vol. II. Londini,  
1732. f.  
*Dill. Musc.* J. J. Dillenii historia Muscorum. Oxonii 1741. 4.  
*Diosc. Bot.* Pedacii Dioscoridis Anazarbei de Materia Medica. Basileæ  
1674. f.  
*Dodart. Mem.* Memoires pour servir a la histoire des plantes, par M.  
Dodart. Par. 1676. f.  
*Du Halde Chin.* Description de l'empire de la Chine, & de la Tartarie  
par le P. J. B. du Halde. Tom. IV. in f.  
*Feuillée It.* Journel des observations faites sur les cotes Orientales de l'  
Amerique par le R. P. Louis Feuillée. Tom. III. a Paris, 1714-1725,  
in 4.  
*Flor. Dan.* Icones plantarum sponte nascentium in regnis Daniæ, &  
Norvegiæ. Hafniæ, 1761. f.  
*Fl. Lapp.* Caroli Linnæi Flora Lapponica. Amstelædami 1737. in 8.  
*Forsk. Arab.* Flora Ægyptiaco-Arabica per Petrum Forskælium. Hav-  
niæ, 1775. in 4.  
*Forst. Gen.* Characteres generum plantarum, quas in itinere ad insulas  
maris Australis collegerunt Joh. Reinholdus Forster, & Ge. Froster.  
Londini, 1776. f.  
*Garc. Arøm.* Hist. simplicium, & Aromatum conscripta a D. Garcia ab  
Horto, Latino sermone contracta a Car. Clusio. Quinta editio Ra-  
phelengii 1605. f.  
*Gmel. Sibir.* Jo. Ge. Gmelin Flora Sibirica. Tomi IV. Petropoli 1747-  
1769. in 4.  
*Grisl. Virid.* Gabrielis Grislei Viridarium Lusitanicum. Veronæ, 1748.  
*Gron. Virg.* Joh. Frederici Gronovii Flora Virginica. Lugduni Batavo-  
rum, 1743. in 8.  
*Hall. Hist.* Alberti Haller historia Stirpium indigenarum Helvetiæ.  
Tomi III. Bernæ, 1768. f.  
*Herm. Par. Bat.* Pauli Hermanni Paradisus Batavus. Lugduni Batavo-  
rum. 1688. 4.  
*Herm. Lugdb.* Pauli Hermanni Catalogus horti academicæ Lugduno-Ba-  
tavi, 1687. 8. Hern.

- Hern. Mex.* Francisci Hernandes Historia Naturalis Mexicana. Romæ, 1651. f.
- Hill. Brit. herb.* The British herbal by John Hill. London, 1757. in f.
- Huds. Engl.* Gulielmi Hudsoni Flora Anglicæ. Tomi II. Londini, 1778. 8.
- Jacq. Austr.* Nic. Jos. Jacquin Flora Austriaca. Viennæ, 1773. in f.
- Kämpf. Aman.* Engelberti Kämpferi Amoenitates exoticæ. Lemgoviae, 1712. in 4.
- Kämpf. hist. Jap.* Histoire Naturele, Civile, & Ecclesiastique de l'empire du Japon par Engelbert Kämpfer. Tom. II. à la Haye, 1729. in f.
- Kalm. It.* Petri Kalmii Iter Americanum. Holmiæ, 1753. vol. III. 8.
- Lin. Gen.* Caroli a Linné Genera plantarum. Editio sexta Holmiæ, 1764. 8.
- Lin. Sy. nat.* Car. a Linné Systema Naturæ. Editio 13. Vol. IV. Vindobonæ, 1767. 8.
- Lin. Mant.* Car. a Linné Mantissa plantarum. Vindobonæ. Et Mantissa altera Holmiæ, 1771. 8.
- Lin. Ph. Bot.* Car. a Linné Philosophia Botanica. Vindob., 1770. in 8.
- Lin. Sp. pl.* Car. a Linné species plantarum. Holmiæ, 1763. in 8.
- Lin. Sy. Vegetab.* Car. a Linné Systema Vegetabilium. Gottingæ, 1774. in 8.
- Lin. H. Cliff.* Car. a Linné Hortus Cliffortianus. Amstel., 1737. in f.
- Lin. M. Cliff.* Car. a Linné Musa Cliffortiana. Lugd. Batav. 1736. in 4.
- Lin. Mat. Med.* Caroli Linnæi Materia Medica. Lipsiæ, 1772. in 8.
- Lin. Sy. pl.* Car. a Linné Systema plantarum, curante D. Joanne Reichenbach. Vol. IV. Francfurti, 1779. in 8.
- Lin. supp. pl.* Caroli Linnæi Filii supplementum plantarum Systematis Vegetabilium editionis decimæ tertiaræ. Brunsvigiæ, 1781. in 8.
- Lob. Adv.* Stirpium adversaria nova, Auctoriibus Petro Pena, & Matthia de Lobel. Londini, 1571. f.
- Magn. Monsp.* Petri Magnol Hortus Regius Monspeliensis. Monspeliæ, 1686. 8.
- Marcgr. Bras.* Ge. Marcgravii Historia naturalis Brasiliæ. Lugd. Batav. 1648. f.
- Marsd. Samatr.* History of Sumatra by M. Marsden. London. in 4.
- Martyn. Dec.* Jo. Martyn Historiæ plantarum rariorū decades V. Londini, 1728. f.
- Matth. Diosc.* Petri Andreæ Matthioli commentarii in sex libros Pedacii Dioscoridis. Basileæ, 1674. f.
- Mentz. Pug. rar.* Christiani Mentzelii Pinax Polyglotus, & pugillus rariorū plantarum. Berolini, 1682. in f.
- Mich. Gen.* Micheli nova Genera plantarum. Florentiæ, 1729. in 4.
- Mill. Dict.* Philippi Miller Dictionarium hortulanorum. Londuni, 1760. in f.
- Moris.*

- Moris. Hist.* Roberti Morisoni Historia plantarum universalis Oxoniensis. Oxonii, 1680. Vol. II. in f.
- Neck. Musc.* Iosep. de Neckar Historia Muscorum. Manhemii, 1771. in 8.
- Osb. It.* Petri Osbeck Iter Indiae Orientalis. Holmiæ, 1757. in 8.
- Petiv. Gaz.* Jacobi Petiver Gazophylacium naturæ. Londini, 1702. in f.
- Pis. Bras.* Gulielmi Pisonis de Indiae utriusque re naturali, & Medicina. Amstelædami, 1658. in f.
- Pis. Mantiss.* Gul. Pisonis Mantissa Aromatum. Simul cum præcedente. in f.
- Plin. Hist. Nat. C.* Plinii Secundi Historiæ mundi libri 37. Lugduni, 1587. in f.
- Pluk. Phyt.* Leonhardi Plukenetii Phytographia. Londini, 1691. in 4.
- Pluk. Alm.* Ejusdem Almagestum Botanicum. Londini, 1696. in 4.
- Pluk. Amalt.* Ejusdem Amaltheum Botanicum. Londini, 1705. in 4.
- Pluk. Mant.* Ejusdem Mantissa Almag. Botanici. Londini, 1700. in 4.
- Plum. Am.* Caroli Plumierii Plantæ Americanæ. Parisiis, 1693. in f.
- Plum. Fil.* Car. Plumierii tractatus Filicum Americanarum. Parisiis, 1705. in f.
- Pomet. Drog.* Histoire generale des Drogues par le Sieur Pomet. Tom. II. a Paris, 1735. in 4.
- Raj. Hist.* Joannis Raji Historia plantarum. Tom. III. Londini, 1686. in f.
- Rheed. Malab.* Hortus Indicus Malabaricus adornatus per Henr. van Rheed. Tomi XII. Amstelædami, 1678-1703. in f.
- Rumph. Amb.* Ge. Everhardi Rumphii Herbarium Amboinense libri XII, & Auctuarium. Amstelædami, 1750-1755. in f.
- Scheuchz. Gram.* J. Scheuchzeri Agrostographia. Tiguri, 1719. in 4.
- Scop. Introd.* Joan. Antonii Scopoli Introductio ad historiam naturalem. Pragæ, 1777. in 8.
- Sloan. Jam.* A natural history of Jamaica by Hans Sloane. Vol. II. London, 1707, 1725. in f.
- Thunb. Jap.* Petri Thunberg Flor. Japonica. Lipsiæ, 1784. in 8.
- Tournef. Instit.* Josephi Pitton de Tournefort Institutiones rei herbariæ, & Corollarium Instit. Lugduni, 1719. Tomi III. in 4.
- Vaill. Par.* Sebastiani Vaillantii Botanicum Parisiense. Parisiis, 1747. in f.
- Zanon. Hist.* Jacobi Zanonii rariorū stirpium historia. Bononiæ, 1742. in f.

# F L O R A C O C H I N C H I N E N S I S

---

## C L A S S I S I. M O N A N D R I A M O N O G Y N I A.

\* *Flores superi : fructu loculari.*

1. **A**MOMUM. *Cor. 3 - partita : nectario petaliformi.*
2. CURCUMA. *Cor. 4 - partita : nectario 3. lobo.*
3. CANNA. *Cor. 6 - partita : nectario revoluto.*
- + 4. DONAX. *Cor. 6 - partita : laciniis tribus erectis , tribus reflexis.*
5. KÆMPFERIA. *Cor. 6 - partita : laciniis omnibus horizonta- libus.*
- + 6. PHYLLODES. *Cor. 7 - fida : nectario oblongo , cananiculato.*

\*\* *Flores inferi : fructu loculari.*

- + 7. SALOMONIA. *Cor. 3 - fida , in tubum Curvata. Silicula.*
- + 8. GARCIANA. *Cor. 4 - petata. Caps. 3. locularis.*

\*\*\* *Flores monospermi.*

9. BOERHAAVIA. *Cor. 1 - petata , Campanulata.*
10. HIPPURIS. *Cor. 0 . Cal. 0 .*

## MONOGYNIA.

## GENUS I. AMOMUM.

CHARACTER GENERICUS. Cor. 4 - fida : laciniâ primâ patentâ.  
Lin. Syst. pl. G. 2.

Sp. 1. AMOMUM ZINGIBER. Lingua Cochinchinensi & Cây gừng :  
sinh Kuong. Lingua Sinensi & Sêm Kiam.

Differentia specifica. Am. scapo nudo : spicâ ovatâ. Lin. sp. 1.

Habitus, & notæ in loco natali observatae. Radix serpens, bulbis palmatis, compressis, carnosis, in senectute fibrosis : radiculis tenuibus, brevibus. Culmus annuus, 2 - pedalis, simplicissimus, solidus, erectus. Folia linear-lanceolata, semipedalia, glabra, alterna : petiolis brevibus, amplexicaulibus, sub-normaliter refractis. Scapus remotus, 8 pollices altus, crassus, teres, rectus, squamofus, saepius nudifolius : spicâ ovato-oblongâ, erectâ, compositâ squamis magnis, ovatis, sub-acuminatis, coloratis, flores semiclaudentibus. Calix spatha duplex, parva. Corolla infundibuliformis, viridi-lutea : tubo longo, tenui : limbo 3 - partito, laciniis Conicis, sub-equalibus. Nectarium fusco-rubrum, ovatum, integerimum, petaliforme, basi utrinque alatum, corollâ sub-brevius, infra laciniarum fissuram anteriorem adnatum. Filamentum filiforme, corollæ insidens, ipsâ brevius. Anthera ovata magna, in longitudinem fissa, amplectens stylum filiformem, ipsâ longiorem : stigmate cylindraceo, apice ciliato. Capsula infera, 3 - gono-rotunda, glabra, 3 - locularis, polysperma : semenibus multis, oblongis.

Habitat in Cochinclina, & Chinâ, ubique cultum.

Zingiber fæmina. Pis. Mant. pag. 190. fig. ibi. Gingembre. Pom. Drog. 1.2. pag. 68. fig. 42. Zingiber maius. Rumph. Amb. 1.8. c. 14. t. 66. f. 1.

Virtus : radicis. Calefaciens, Pellens, Stomachica, Eccoprotica. Succus expressus, recens prodest in frebribus intermittentibus ex crassitate humorum. Decotto, aut pulvere corrigitur aquæ insalubres : sicut etiam Purgantia, & quidem aptius ; quam cinnamomo : finguultus saepè cohibentur.

Ufus. Culinarius, in Indiâ frequentissimus, gratus, & saluber.

Sp. 2. AMOMUM ZERUMBET. & Ngai xanh : Ngai mat tibi.

Differ. spec. Am. scapo nudo : spicâ oblongâ, obtusâ. Lin. sp. 2.

Hab ; & notæ. Radix serpens bulbis teretibus, tortuosis, crassis, ramosis, horizontalibus, carnosis, pallidis : odore tenui, sub-aromatico : sapore amaricante, nec ardente, ut Zingiberis. Culmus 4 - pedalis

dalis, perennis, simplicissimus, teres, solidus, rectus. *Folia* lanceolata, magna, glabra, petiolata, amplexicaulia, obliquè ascendentia. *Scapus* 1-pedalis, remotus, crassus, squamosus, ruber. *Spica* magna, sub-ovalis: squamis rotundatis, astrictis, monofloris, rubris. *Calyx* spatha simplex, acuta. *Corolla* infundibuliformis, pallida: tubo longo: limbo 3-partito, laciniâ summâ acutâ, inferioribus sub-ovatis: *nektario* concolore, petaliformi, obtusissimo, 2-fido, fauci corollæ adnato. *Filamentum* planum, subulatum, inflexum, laciniæ posteriori corollæ inhærens, ipsi subæqualis. *Anthera* oblonga, medio filamenti adnata. *Germen* 3-gonum, inferum. *Stylus* filiformis, filamento æqualis, crenæ antheræ inclusus. *Stigma* concavum, ciliatum. *Capsula* obtusè 3-gona, 3-locularis, 3-valvis: *Seminibus* multis, ovatis.

Habitat incultum, cultuunque in Cochinchinâ.

Lampujum. Rumph. Amb. l. 8. c. 10. t. 64. f. 1. Zingiber Latifolium; Syvestre. Burm. Zeyl. p. 234.

Uſus. In Medicinâ externus. Calefacit, Resolvit. Prodest in contusionibus, & artuum doloribus, præcipiè crurum, & pedum, si ex radice recenti, & contusa fiat cataplasma, vel fatus ex eâdem cum spiritu vini destillata. Garcias (Arom. l. 1. c. 43.) scribit radicem Zerumbet saccharo conditam meliorem esse Zingibere: fortasse in Malabariâ meliorem habet saporem: in Cochinchinâ non est edulis.

Sp. 3. AMOMUM CARDAMOMUM. α Bach dâu kh'âu. β Pě téu keu.

Differ. spec. Am. *scapo* simplicissimo, brevissimo: *bracteis* alternis, laxis. Lin. sp. 3.

Hab; & note. *Radix* horizontalis, repens, sub-lignosa, nodosa, aromatica: radiculis ramosis, magnis. *Culmus* pereunis, binos cum dimidio pedes altis, simplicissimus, teres, erectus. *Folia* lanceolata, subundulata, glabra, striata, amplexicaulia. *Scapus* simplex, brevissimus: *spicâ* brevi, bracteis lanceolatis, laxis. *Corolla* infundibuliformis, 3-partita, sub-acuta, albo-lutea: *calyce* concolore. *Flor* inter bracteas exertus. *Capsula* 3-gono-rotunda, 3-locularis, 3-valvis, polysperma: *seminibus* multis, angulatis: cortice lœvi, albicante. Odor, & sapor totius plantæ aromaticus, acutus, gratus.

Habitat agreste in regno Cambodiâ, Cochinchinæ tributario.

Cardamomum Minus. Rumph. Amb. l. 8. c. 12. t. 65. f. 1. Icon bona. Bont. Jav. l. 6. c. 37. fig. pag. 126: quæ non æquè propria, ac præcedens.

Virtus: semen. Calefaciens, Stomachica, Carminativa.

Uſus etiam frequens in arte Coquinaria.

† Sp. 4. AMOMUM VILLOSUM.  $\alpha$  Sa nhon  $\beta$  Sō Xā m'i.  $\gamma$  ~~100q~~  $\delta$  ~~100s~~  
Differt. spec. Am. *scapo* brevi, reclinato : *bracteis* linearibus : *fructu*  
*villoso*.

Hab ; & notæ. *Radix* horizontalis, sublignosa, repens : radiculis lon-  
gissimis, crassis, odoratis. *Culmus* perennis, simplicissimus, debi-  
lis, erectus, teres, 6-pedalis. *Folia* lanceolata, enervia, glabra,  
petiolata, amplexicaulia, reflexa. *Scapus* 4-pollicaris, tenuis,  
reclinatus. *Spica* subovata, bracteis linearibus, imbricatis. *Corolla*  
pallida, infundibuliformis, 3-partita : nectario petaliformi, bre-  
vi, obtuso. *Pericarpium* inferum, sub-globosum, semipollucare, ruf-  
fum, 3-loculare, evalve, exterius obseßum villis multis, crassis.  
*Semina* multa, angulata, fusca, constricta membranulis interjacen-  
tibus. Stamen, & pistillam solitaria. Odor totius plantæ aromati-  
cus, lenis, sub-acutus. Sapor recentis fructus sub-dulcis, gratus.

Habitat agreste in montibus Cochinchinæ.

Globba Crispa. Rumph. Amb. I. 11. c. 30. tab. 61.

Virtus : semen. Sub-Calefaciens, Stomachica. Roborans, Uterina,  
Alexiteria. Hæc semina, quæ in provinciis Cochinchinæ Qui nhon,  
& Phu-yen absque culturâ nascuntur, avidè exportantur a Sinensi-  
bus mercatoribus, in quorum Medicinâ magni sunt usus.

† Sp. 5. AMOMUM MEDIUM.  $\beta$  Tsão quo.  $\alpha$  Thao qua.

Differ. spec. Amom. *spicâ* caulinâ, ramosâ : *fructu* oblongo, striato,  
evalvi.

Hab ; & notæ. *Culmus* perennis, rectus, simplex, 8-pedalis, cra-  
sus, teres. *Folia* magna, oblonga, sub-acuta, glabra, petiolis am-  
plexicaulibus. *Flos* spicâ caulinâ, longâ, terminali, ramosâ. Recen-  
tem florem non vidi; ideoque de corollæ laciniis, & nectario incer-  
tus maneo. *Pericarpium* inferum, oblongum, obtusum, subte-  
res, striatum, crassum, coriaceum, evalve, exsuccum, 3-locula-  
re, polyspermum. *Semina* multa, angulata, membranulis distincta,  
fusca, odorata, ardentina.

Habitat in provinciâ Yū nân imperii Sinensis, ad occasum provin-  
ciæ Cantonensis. Suspicor eandem esse plantam, quam Bontius (Jav.  
I. 6. c. 37. pag. 127.) describit, delineatque sub nomine Cardamo-  
ni Maioris. Forma fructus valde convenit cum Cardamomo Me-  
dio, apud Matth. in Diosc. I. 1. c. 5, pag. 28.

Virtus : semen. Calefaciens, Incidens, Deobstruens, Antacida. Pro-  
dest in febribus quartanis diuturnis.

Utuntur etiam indigenæ his seminibus ad condendos cibos : simulque  
acuendam vim cujuscumque odoris.

† Sp. 6. AMOMUM GLOBOSUM.  $\alpha$  Mé tlé.  $\beta$  Tsão keu.

Differ.

Differ. spec. Am. *spicā* caulinā , ramosā : *fructu* globoſo , lævi.  
 Hab ; & notæ. *Radix* tuberculosa , repens , brevis. *Culmus* perennis , simplicissimus , teres , erectus , 4 - pedalis. *Folia* lanceolata , magna , glabra , enervia , petiolata , amplexicaulia , erecta. *Flos spicā* caulinā ovato-oblongā , erectā : ramis obliquis : *spathis* par-tialibus , sub - 4 - floris. *Perianthium* tubulosum , 3 - 4 - denta-tum. *Corolla* supera , albo-rubra , infundebuliformis , 3 - partita : laciniis oblongo-ovatis , sub-æ qualibus. *Nectarium* longitudine fel-cuplum , undulatum , apice rotundatum , emarginatum , petalifor-me , corollæ insitens. *Filamentum* planiusculum , longum. *Anthe-ra* oblongo-ovata , crenā verticali amplectens *stylum* filiformem , ipsā longiorem. *Stigma* concavum , ciliatum. *Pericarpium* globosum , glabrum , album , evalve , 3 - loculare , polyspermum : cortice tenui , fragili : *seminibus* multis , angulatis , fuscis , odoratis , sub-ardenti-bus.

Habitat in montibus Cochinchinæ , & Chinæ.

Virtus : seminum , & radicis. Leniter Calefaciens , Stomachica , An-tacida. Ventris dolores , vomitum , & diarrhæam petuitosam cohi-bet. Uſus illius frequens apud Sinenses , & Cochinchinenses Me-dicos.

<sup>†</sup> Sp. 7. AMOMUM HIRSUTUM. α Mé tié bà.

Differ. spec. Am. *spicā* caulinā , simplici , reclinatā : *fructu* sub-ro-tundo , hirsuto.

Hab ; & notæ. *Radix* horizontalis , ramosa , repens. *Culmus* peren-nis , simplicissimus , erectus , teres , hirsutus , 6 - pedalis *Folia* lan-ceolata , magna , erecta , petiolis amplexicaulibus. *Flos spicā* cau-linā , lineari , reclinatā , simplici : pedunculis , & *spathis* 2 - floris. *Perianthium* tubulosum , 4 - fidum , inferum : laciniis rotundatis , æqualibus. *Corolla* supera , infundebuliformis , 3 - partita , laciniis obtusis , sub-æ qualibus. *Nectarium* petaliforme , latissimum , obtu-sum , incurvum , 4 - fidum , laniciis binis lateralibus brevioribus , rotundatis. *Stamen* unicum. *Fruetus* subrotundo-trigonus , hirsutissi-mus , evalvis , 3 - locularis , polyspermus : *seminibus* multis , an-gulatis. *Corolla* albo , rubro , & flavo variegata. Odor , & fapor sub-fatuus. Virtus nondum probata.

Habitat in fylvis Cochinchinæ.

Sp. 8. AMOMUM GALANGA. α Cây riềng : Cao Luong Kuong. β Cão Leam Kiäm.

Differ. spec. Am. *spicā* caulinā , erectā : *spathis* sub-trifloris : *capsu-la* 3 - gono-ovata , glabrâ.

Hab ; & notæ. *Radix* bulbosa , horizontalis , repens ; ramis teretibus , crassis ,

crassis , tortnisis , nodosis . *Culmus* perennis , simplicissimus , erectus , glaber , 6 - pedalis . *Folia* ovato-lanceolata , enervia , glabra , erecta , magna , petiolis amplexicaulibus . *Flos* spicā oblongā , erecta : *pedunculis* , & *spathis* partialibus sub - 3 - floris . *Perianthium* inferum , tubulosum , obtusè 3 - fidum . *Corolla* supera , albolutea , 3 - partita , laciñis oblongo-ovatis , concavis , patentibus , subæqualibus . *Nectarium* petaliforme , subrotundum , emarginatum , laciñis corollæ subæquale . *Filamentum* 1 , lineare , crassum , in longitudinem sulcatum , corollâ longius . *Anthera* oblonga , 2 - fida , amplectens stylum longiorem , crenæ ipsius ; & filamenti inclusum : *stigma* crassiūsculum , emarginatum . *Capsula* 3 - gona , 3 - locularis , 3 - valvis : *seminibus* multis subrotundis . Odor totius plantæ aromaticus : sapor ardens .

Habitat tam culta , quam agrestis in Cochinchinâ , & Chinâ . Galanga Maior . Lancquas . Rumph . Amb . I . 8 c . 9 . tab . 63 . ubi satis propriè delineatur , & describitur .

Virtus : Radicis , & seminum . Calefaciens , Incidens , Stomachica , Sternutatoria . Prodest in Colicâ petuitosâ , Diarrhæâ , Vomitum , Sanguitu .

Ufus : œconomicus recentis radicis ad condiegos pisces , salgama , & acetaria . Præterea ad parandum , & acuendum spiritum vini , quem ex oryzâ , vel saccharo fermentato extrahunt . Crassè contusam , & æquali oryzæ massæ commixtam in bolos efformant , quos in camino suspendunt , ut longo tempore fuliginem imbibant . Bolis istis contritis quantitatem , quam volunt oryzæ coctæ subigunt , ac per noctem sinunt quiescere . Sequenti die fermentatam inventiunt , & alembico magno , sed humili includunt , indeque ad ignem destillat spiritus non inferior spiritu vinoſo palmæ Cocos , & fortasse salubrior .

Observ . Miror Celeb . Linnæum hanc plantam adscripsisse G . Marantæ , cuius characterem essentiale agnoscit *corollam ringentem* , 5 - fidam : *laciñis* 2 *alternis patentibus* . Galanga nostra ( quæ eadem Rumphii ) nec est ringens , nec 5 - fida , nec habet duas laciñias alternas patentes , sed omnes , quæ tres sunt , magnitudine , & formâ fere æquales . Non ignoro Rumphium dixisse florem Galangæ 4 - petalum : sed attente legenti patebit quartum , quod vocat *petalum erectum instar vixilli* , nectarium esse petaliforme , non corollæ laciñiam , quod ex situ interiore , & inspectione figuræ confirmatur : quamvis idem Nectarium ex nostrâ observatione non ita ad basim attenuetur , prout videtur in figurâ Rumphianâ . Itaque indubius affero plantam istam speciem esse Amomi , non Marantæ . Eandem cum aliis a me antea in Europam missam examinavit Clar . Bergius ( Mat . Med . pag . 5 . ) eamque Amomi speciem agno-

## MONANDRIA MONAGYNIÆ.

7

agnovit. Nec obstat, quod a Doct. Viro vocetnr Amomum Zedoaria Officinarum; siquidem, si pharmacoplas interrogemus, nunc pro Zedoariâ, nunc pro Galangâ eandemmet radicem nobis obtrudent; cum nondum certò constet, quæ vera Zedoaria, aut Galanga antiquorum sit.

## + Sp. 9. AMOMUM ARBOREUM. ♂ . . .

Differ. spec. Am. *Caule arboreo : fructu Calycino.*

Hab; & notæ. *Arbor* 10 - pedalis : *ramis* multis, tortuosis, patentibus. *Folia* ovato-oblonga, acuminata, integerrima, parva, inferius tomentosa, omnia ad unum latus versa, petiolis vaginatis, ad apicem subtus carinatâ : *spicâ* ovata terminali, undique floriferâ. *Perianthium* 1 - phyllum : tubo magno, ovato-trigono : limbo 3 - partito, laciniis acutis, erectis. *Corolla* supera, infundibuliformis, 3 - partita : laciniis lanceolatis, subæqualibus, patentibus. *Nectarium* petaliforme, lato-ovatum, corollæ sub-æquale, ipsius tubo interius adnatum. *Filamentum* 1, lanceolatum, coloratum, tubo corollæ, & nectario simul connexum. *Anthera* linearis, medio filamenti in longitudinem coalita. *Germen calycinum*, 3 - gonum. *Stylus* filiformis, crenæ antheræ inclusus, illâ longior. *Stigma* verticaliter planum, apice truncatum. *Pericarpium* ovato-trigonum, ex tubo calycis in maturitate in 3 valvas ex angulis dehiscente, 3 - loculare, polyspermum. *Seminibus* multis, longiusculis, angulatis. Sapor, & odor vix ullus. Virtus incognita. Arboris lignum levissimum, nec foco aptum.

Habitat in insulâ Samatrâ, versus plagam orientalem in sylvâ parum a litore distante.

Obsery. Cum in diversis Amomi Speciebus, Calyx, Corolla, Nectarium, Stamen, fructusque sœpe inter se different: numerus autem laciniarum corollæ semper ternus, & Nectarium semper formâ petali, quamvis situ a laciniis diversum, obseruentur: in ipsis, non in illis, constituendus videtur character essentialis Generis Amomi. Unde sequitur Globbam Sylvestrem (Rumph. Amb. I. II. c. 33. t. 62.) Amomi speciem esse, quam Linnaeus Junior vocavit Renalmiam. Suppl. pl. pag. 7, & pag. 79.

## GENUS II. CURCUMA.

Charact. Gener. *Stamina* 4 sterilia: quinto fertili. Lin. sy. pl. G. 6.

Observ. Celeb. Linnaeus (syst. Nat. pag. 50, & syst. Veget. pag. 49.) quasi datæ descriptioni diffideret, nos monuit, characteres Amomi, Alpiniae, Curcumæ, Thaliæ ab autoptis ex plantis vivis accuratius descri-

describendos, quod nos diligenter exequi curavimus circa Amomum, & Curcumam: Thalam vero, & Alpiniam non vidimus.

† Descriptio Naturalis Curcumæ Vulgaris in solo natali.

Cal. Perianthium superum, 2-fidum: laciniis oblongo-ovatis, erectis, spicæ squamis occultis.

Cor. Monopetala, infundibuliformis: tubo tenui, perianthio æquali, superius dilatato: limbo 4-partito, laciniis longitudine sub-æquatis: binis lateralibus obtusis, undulato-plicatis: summâ acutâ, incurvâ: infimâ latiore, 2-fidâ, laciniis rotundatis.

Nectarium magnum, incurvum, 3-lobum, medio emarginato, basi laciniæ corollinæ exteriori ad natum.

Stam. Filamentum 1, lato-planum, breve, apice rotundatum, laciniæ summæ corollæ infisteus. Anthera exotica, sub-cubica, 2-fida: appendice subulatâ utrinque exertâ.

Pist. Germen subrotundum. Stylus capillaris, stamini æqualis, crenæ antheræ inclusus. Stigma Concavum.

Peric. Capsula subrotunda, laevis, 3-valvis, 3-locularis, polysperma. Sem. Rotunda, pauca.

Observ. Labium illud ovatum, (apud Linnæum) staminave 4 sterilia nullibi invēni.

Char. Gener. ex propriâ observatione. Cor. 4-partita. Nectarium 3-lobum. Filamentum planum.

Sp. 1. CURCUMA LONGA. α Ngé: Kuong hùynh. β Kiām hoām.

Differ. spec. Curc. foliis lanceolatis: nervis lateralibus numerofissimis. Lin. sp. 2.

Hab. Radix perennis, serpens, carnofa, palmata, ramis teretibus, circulis parallelis, radicantibus articulata: cortice tenui pallido: pulpa croceâ, sapore subamaricante, odore unguentario. Caulis nullus. Folia lato-lanceolata, magna, integerrima, glabra, annua, pallido-viridia, lineis obliquis, tenuibus, densis sulcata: petiolis longis, erectis, basi dilatatis, se mutuo sustinentibus, & amplectentibus. Scapus externus, 3-pollicaris, tenuis, suberectus, sub-nudus, foliorum fasciculo approximatus. Spica crassa, sub-ovata, 3 pollices longa: squamis membranaceis, sub-acutis, albicanibus, semipatentibus, infra medium lateraliter coalitis. Flos sessilis, albus,nectario luteo, singulis spicæ squamis solitariè inclusus.

Habitat ubique culta, incultaque in Cochinchinâ, & Chinâ.

Curcuma Domestica. Rumph. Amb. l. 8. c. 16. tab. 64. Terra Merita.

Pomet. Drog. l. 2. p. 72. fig. 47. Curc. rad. longâ. Burm. Zeyl. p. 83.

Virt.

MONANDRIA MONOGYNIA.

19

Virt. Resolvens, Emmenagoga, Diaphoretica. Valet in Ictero, Cachexia, contusionibus, vulneribus, scabie, imo etiam in Leprâ, pellendo per transpirationem, si sumatur cum sulphure: vel cum terebinthinâ per urinam. Exterius pruritum, & affectus cutaneos corrigit.

Usus œconomicus ad condiendos cibos loco Croci, frequentissimus in Indiâ. Circumâ tinguntur telæ, pelles, ligna, ossa, & metalla.

Sp. 2. CURCUMA ROTUNDA. α Ngai Mi. β Pum ngô méu.

Differ. spec. Cerc. *foliis lanceolato-ovatis: nervis lateralibus rarissimis.* Lin. sp. 1.

Hab; & notæ. *Radix* perennis, bulbus ovatus, magnus, ovo anserino saepe æqualis: exterius pelliculâ tenui, rufescente, annulis parallelis radicantibus cinctus: interius solidus, carnosus, flavo-ruber, gustu amaricante, odore subaromatico. Serpit sub terrâ radix per parvos bulbos, ejusdem formæ ovatae, ad latera bulbi materni accrescentes. *Caulis* nullus. *Folia* annua, 3 pedes alta, erecta, lato-lanceolata, subobtusa, glabra, læte viridia, lineis obliquis paucis sulcata: petiolis brevibus, ad basim dilatatis, interiores amplectentibus, crassum caulem mentientibus. *Florem* recentem non vidi, quamvis per aliquot annos plantam studiosè coluerem; naturâ enim agrestis est.

Habitat frequens montes Cochinchinæ, & Chinæ.

Manja-Kua. Rheed. Malab. 11. pag. 19. tab. 10. Curcuma radice rotundâ. Burm. Zeyl. pag. 84. Zerumbet Tommon Beazar (Rumph. Amb. 1. 8. c. 17. t. 68.) suspicor hanc speciem Curcumæ designare. Descriptio quodaimmodo convenit: sed figura nec propriæ descriptioni, nec nostræ benè aptari potest.

Virtus. Fere eadem, quæ præcedentis: sed fortior, ac internè sumpta minus tuta. Externè heroicum pharmacum expertus sum in dolore, & tumore ventris ex suppressione lochiorum, vel mensium. Ex bulbis recentibus Curcumæ Rotundæ, & Crini Zeylanici, foliisque Artemisiæ contusis, addito parum acetii, fit cataplasma, quod calidum topicè applicatur. Radix ista non est esculenta. Ad tingendum adhibetur, colore quidem pulchro, sed inconstante.

† Sp. 3. CURCUMA, PALLIDA α Ngé hoang. β San Kiám hoám.

Differ. spec. Cerc. *bulbis nodosis: scapo longo, bracteato.*

Hab; & notæ. *Planta* annua, acaulis, erecta, 3-pedalis. *Radix* perennis, horizontalis, serpens, oblonga, teres, tortuoso-nodosa, intus, & foris pallida, carnosa, odore, & sapore tenui. *Folia* lanceolata, magna, fulcis obliquis, tenuibus, plurimis: petiolis basi dilatatis, interiores ambientibus. *Scapus* externus, 8 polli-

ces longus, bracteis brevibus vestitus. *Spicæ* oblonga, squamis ova-to-lanceolatis, laxis, reflexis, rubescensibus, 1-floris. *Corolla* albo-lutea, 4-partita: *nectario* 3-lobo. *Stamen* 1, fertile, sterilia nulla. *Capsula* infera 3-locularis, 3-valvis, polysperma.

Habitat agrestis in Cochinchinâ, & Cantone Sinarum.

*Curcuma Agrestis*. Rumph. Amb. I. 8. pag. 164.

*Uſus internus*, quantum ſcio, nullus. *Radix* contusa, & extermè applicata medetur artuum doloribus, & contusionibus.

*Observ.* Rumphius (Amb. I. 8. cap. 17.) varias Tommon species exponit, quas ad genus *Curcumam* pertinere ſentio: fed ex defectu ſufficientis examinis certò decidere non audeo. *Curcuma Longa Linnaei* aptius vocaretur cum Rumphio *Curcuma Domestica*, quatenus imprimis coli ſoleat: vel *Curcuma Vulgaris*, quia uſu in Indiâ frequentiſſimo ab omnibus cognoscitur.

### GENUS III. CANN A.

*Char. Gener.* *Cor.* 6-partita, erēcta: *labio* 2-partito, revoluto. *Stylus* lanceolatus, corollæ adnatus. *Cal.* 3-phyllus. Lin. sy pl. G. I.

*Sp. I. CANNA INDICA.* α Ngai hoang. β San Kiām.

*Differ. Spec.* Can. *foliis* ovatis, utrinque acuminatis, nervosis. Lin. sp. I.

*Hab*; & notæ. *Caulis* simplicissimus, erēctus, 3-pedalis, minūm digitum crassus. *Radix* bulbosa, sub-palmata, repens, perennis pallida. *Folia* lato-lanceolata, magna, glabra, obliquè fulcata: petiolis amplexicaulibus. *Flos* terminalis, nitidè coccineus, *spicæ* erēcta, pauci floræ. *Calix* superus, foliola 3, lanceolata, persistentia. *Corolla* erēcta, 6-partita, inæqualis: *nectario* centrali, 2-partito, revoluto. *Stylus* lanceolatus, corollæ adnatus. *Anthera* 1, linearis, lateri *nectarii* in longitudinem adhærens. *Capsula*, ſcabra, 3-gono-ovata, 3-locularis, 3-valvis: ſeminibus paucis, globofis, nigris, nitidis.

Habitat in collibus, & agris incultis Cochinchinæ, ac Chinæ.

*Cannacorus*. Rumph. Amb. I. 8. c. 22. t. 71. f. 2. *Cannacorus* flore coccineo, ſplendente. Fournef. Inst. pag. 367. tab. 192. Ubi *flos*, & fructus naturali magnitudine optimè exprimuntur.

~~an, casinaria officinalis de liberi monstrosorum emerito~~  
+ GENUS IV. DONAX.

## Descriptio Naturalis.

Cal. Foliola 2, spathacea, lanceolata, inæqualia, convoluta, infera, geminum florem sustinentia.

Periantum proprium superum, 3 - phyllum : foliolis subulatis, incurvis, deciduis.

Cor. Monopetala, irregularis, 6 - partita : laciniis 3 exterioribus lanceolatis reflexis, subæqualibus : 3 interioribus obtusis, erectis, inæqualibus : omnibus ad basim attenuatis, in tubum coalitis.

Stam. Filam. 1, petaliforme, corollæ adnatum, ipsâ brevius. Anthera oblonga, lateralis.

Pist. Germen subrotundum. Sylus planus, turbinatus, corollâ brevior : laciniâ quâdam, parvâ, obtusâ, incisâ ad basim vaginatus. Stigma Concavum, inæquale.

Peric. Fructus globosus, glaber, exsuccus, evalvis, 3 - locularis ; 1 - spermus.

Sem. subrotunda, scabra : raro ad maturitatem pervenientia, præter unum, binis aliis suffocatis.

Nom. ( $\Delta\sigma\pi\alpha\xi$  arundo) a formâ plantæ arundini similis.

Char. Gener. Cor. 6 - partita : laciniis 3 exterioribus, lanceolatis, reflexis : 3 interioribus obtusis, erectis. Fructus 3 - locul., 1 - spermus.

Sp. I. DONAX ARUNDASTRUM.  $\alpha$  Cay lung.

Differ. spec. Don. foliis ovatis : paniculis sparsis.

Hab. Caulis fruticosus, teres, solidus, æqualissimus, nitidus, inferiorius enodis, ad apicem divisus in ramos patentes, 8 pedes altius. Radix serpens, horizontalis, tuberosa, lignosa, arundiformis. Folia lato-ovata, sub-acuminata, integerrima, glabra, alterna, lineis denis obliquè striata : petiolis teretibus, tenuibus, longiusculis. Fls albus, subterminalis : paniculis magnis, sparsis nutantibus.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Arundastrum Tonchat. Rumph. Amb. I. 6. cap. 10. tab. 7.

Observ. Hanc plantam variis Auctores Marantæ adjudicaverunt, ut putto, flore non viso, quia Maranta ab eâ longè differt, juxta characterem Linnæarum nobis propositum. Sy. pl. t. 1. pag. 4. Non autem ita longè distare videtur juxta integrum descriptionem genericam, (Lin. Gen. gl. edit. 6. pag. 3. Genere 5.) quam postea ipse Linnæus

corrigens degenerantem reddidit ab Arundastro Rumphiano, nostroque.

## GENUS V. KÆMPFERIA.

Char. Gener. *Cor.* 6 - partita : *lacinis* 3 maioribus patulis, unicâ 2 - partitâ. *Stigma* 2 - lamellatum. Lin. sy. pl. G. 7.

Sp. 1. KÆMPFERIA GALANGA. α Thien lien : Tam nai β Sân lây.

Differ. spec. Kæmp. *foliis* ovatis, sessilibus. Lin. sp. 1.

Hab; & notæ. *Planta* acaulis, annua, succosa tota. *Radix* bulbosa, palmata, serpens, lobis ovatis, lævibus : radiculis subulatis, crassis, simplicibus. *Folia* lato-ovata, in orbem postrata, integrerima, glabra, fulcis multis longitudinalibus exarata, obscurō-viridia : petiolis subterraneis, brevibus, membranaceis, interiores amplectentibus. *Flos* radicalis, solitarius, sessilis, succosus, albifimus, maculâ violacea magnâ in medio notatus. *Calix* inferus, spathæ multæ, subulatæ, imbricatae : perianthium nullum. *Corolla* monopetala, hippocrateriformis : tubo longo, gracili, curvato. *Limbus* expansus, horizontalis, 6 - partitus : *laciñis* 3 lanceolato-linearibus, subincurvis, æqualibus, longioribus : binis alternis ovatis : infimâ latiore, obtusissimâ, breviter 4 - fidâ. *Nectarium* tubulosum, 2 - fidum, utrinque reflexum, apice rotundatum, tubum corollæ superans. *Filamentum* nullum. *Anthera* oblonga, lateralis, nectario affixa. *Germen* subrotundum, inferum, minimum, abortiens. *Stylus* capillaris longitudine tubi. *Stigma* obtusum. Odor totius plantæ aromaticus, gratus, diu perseverans. Sapor sub-acutus. Color radicis intus albus, foris purpurascens.

Habitat in hortis Cochinchinæ, & Chinæ.

Linnæus (Hort. Cliff. tab. 3.) Kæmpferiam eleganter delineat, sed juniorem ; maturior enim folia habet fere rotunda, nec acuminata : tuncque radix palmata fit, lobis ovatis circum accrescentibus. Ibi infima corollæ lacinia apparet 2 - fida, quæ in nostrâ videtur 4 - dentata. Icon Rumphiana (Amb. l. 8. tab. 69. f. 2.) minus propria haberi potest. At Aro-orchis Burmmani (Zeyl. tab. 13. f. 1.) nullatenus Kæmpferiae convenit, ac potius Orchideis, quam Monandris adscribenda videtur.

Virtus. Stomachica, Cephalica, Diaphoretica, Alexiteria.

## + GENUS VI. PHYLLODES.

## Descriptio Naturalis.

Cal. Inferus, spathæ multæ, acutæ, imbricatæ, polyfloræ.

Perianthium proprium 3 - phylum: foliolis subulatis, erectis, æqualibus.

Cor. Tubulosa: limbo 7 - fido, laciniis 3 exterioribus acutis, subæqualibus, reflexis: 4 interioribus obtusis, erectis, inæqualibus.

Nectarium longum, canaliculatum, erectum.

Stam. Filamentum 1, subulatum breve, lateri nectarii ad basim coailitum. Anthéra oblonga, irregularis: sphærulas nudis oculis conspicuas pro polline emittens.

Pist. Germen trigono-ovatum, inferum. Stylus crassus, brevis, stamine sub-longior. Stigma concavum, versus antheram inclinatum.

Peric. Capsula obtusè 3 - gona, monosperma.

Sem. 1, ovatum, lave.

Nom. Phyllodes, sive progenies folii dicitur; quia ex folii dehiscente petiolo flos enascitur.

Char. Gener. Cor. inæqualis, 7 - fida: nectario longo, canaliculato, erecto.

+ Spec. 1. PHYLLODES PLACENTARIA. α Lá deaong. β Toung iep.

Differr. spec. Phyl. acaulis: petiolis longissimis, stantibus: cymis florum e petiolo fisso prodeuntibus.

Hab. Planta perennis, acanlis, 5 - pedalis: cuius pedes 4 occupant petioli rectissimi, teretes, æqualissimi, nitidi, invicem distantes.

Folia pedalia, ovato-oblonga, apice acuta, integerrima, plana, obliquè sulcata, glabra, coriacea. Flos albus, aggregatus in Cy-  
mam hemisphæricam, magnam, sessilem, infra medium petioli de-  
hiscens erumpentem: involucro 2 - phyllo, spathas partiales, po-  
lyfloras colligente. Radix tuberculofo-fibrosa, horisontalis, serpens.  
Germen plerumque abortit.

Habitat loca Umbrosa Cochinchinæ, & Chinæ.

Uſus æconomicus: ad involvenda cibaria, maximè placetas, simul cum ipsis foliis in caldaris elixandas, unde gratiorem saporem, & colorem acquirunt. Eadem folia tenera, necdum explicata immer-  
gunt spiritui vinoſo oryzæ, vel sacchari triplici aquâ diluto, ut  
fiat acetum.

Obſerv. Quantumuis raro accidat, ut flores ex petiolis filiorum erum-  
pant, hoc tamen obſervatur in Menyanthe Indicæ, Turneria Ul-  
mi-

mifoliâ, & Pontederiâ Vaginali, Hastatâque: quarum nulla convenit cum Phyllode charâctere Classico, aut Generico, nec etiam habitu, si notam illam petioli floriferi excipias. Involucrum Daun Bonkus (Rumph. Amb. l. 11. c. 12. t. 53.) magis ad nostram accedit foliis, flore, usque apud indigenas: sed quot habeat stamina ignoramus, nec descriptio Rumphiana completa est, ut possimus certò judicare.

## † GENUS VII. SALOMONIA.

## Descriptio Naturalit.

**Cal.** Perianthium inferum, compressum, 5-fidum: laciniis subulatis brevibus, subæqualibus, subpatentibus.

**Cor.** Monopetala, formata ex lamellâ oblongâ in tubum cylindricum, fistum longitudinaliter connivente: limbo 3-fido, brevi, laciniis rotundatis, erectis: mediâ longiore, cucullatâ.

**Stam.** Filamentum 1, filiforme, breve, medio laciniæ longioris infistens, igit subæquale. Anthera ovata, incumbens, cucullo tecta.

**Pist.** Germen subrotundum, compressum, superum. Stylus inflexus, in medio ventricosus, stamine brevior. Stigma crassiusculum.

**Peric.** Silicula compressa, 2-loba, scabra, 2-locularis, 1-sperma.

**Sem.** sub-ovata, compressa.

**Nom.** Salomonia a Primo Universalis Botanico Salomone, Rege Hebreorum.

**Char. Gener.** *Cal.* 5-fidus. *Cor.* infera, 3-fida. *Caps.* 2-locularis, 1-sperma.

† Sp. I. SALOMONIA CANTONIENSIS. *g* Siau lam teng.

Differ. spec. *Sal.* *foliis* cordatis, 3-nerviis: *spicis* terminalibus.

Hab. *Caulis* herbaceus, annuus, 6-pollicaris, erectus, fulcatus, multiplex. *Folia* cordata, acuminata, integerrima, glabra, sparsa: petiolis brevibus. *Flos* violaceus, *spicis* simplicibus, erectis, terminalibus.

Habitat inulta Cantone Sinarum.

## † GENUS VIII. GARCIANA.

## Descriptio Naturalis.

**Cal.** Perianthium nullum.

**Cor.** Petala 4, infera: quorum 2 opposita subrotunda, acuminata; ferra-

ferrata, plicata: 2 alia alterna lanceolata: omnia erecta, pilosa, longitudine subæqualia.

Stam. Filamentum 1, planum, lato-subulatum, basi curvatum, utrinque alatum, apice reflexum. Anthera terminalis, magna, in cochleam ex utrâque parte spiraliter voluta.

Pist. Germen compresso-ovatum, pilosum. Stylus filiformis, crassus, filamento æqualis. Stigma convexum, papillosum.

Peric. Capsula ovata, compressa, pilosissima, 3-locularis, 3-valvis, polysperma.

Sem. Plurima, longiuscula, scabra.

Nom. Garcianam dixi in memoriam Primarii Aromatum Scriptoris Garciae ab Horto. Scio Linnæum (Cliffort. pag. 184.) jam antea dicasse Garciae simul, & Garcino arborēm Garciniam: quæ tamen istius nomen potius, quam illius repræsentat. Igitur ut unicuique suus honos, nomenque maneat, non æquivocum, sed integrum, Garciniam totam Garcino, Garcianam integrum Garciae servamus.

Char. Gener. Cal. o. Cor. infera, 4-petala. Caps. 3-locularis, polysperma.

† Sp. 1. GARCIANA COCHINCHINENSIS. α Cây Bôn bôn. β Ti'en lûm.

Differ. spec. Garc. foliis equitantibus: spicâ terminali.

Hab. *Caulis* herbaccus, 2-pedalis, simplicissimus, teres, lanuginosus, erectus. *Folia* subulata, equitantia, crassa, foris striata, intus spongiosa. *Flos* coloris aurei, bracteâ acuminatâ, hirsutâ, brevi suffultus: *pedunculis* solitariis, in *spicam* longam, erectam, terminalem dispositis assurgens.

Habitat loca humida Cochinchinæ. Unde anno 1774 per me in Europam missa. Postea eandem examinavi Cantone Sinarum, invénique Cochinchinensi convenientem.

#### GENUS IX. BOERHAAVIA.

Char. Gener. Cal. o. Cor. 1. petala, campanulata, plicata. Sem. 1, nudum, inferum. Lin. sy. pl. G. 9.

Sp. 1. BOERHAAVIA DIFFUSA. β Houng si sin.

Differ. spec. Boer. *Caule* lævi diffuso: *foliis* ovatis. Lin. sp. 2.

Hab; & notæ. *Caulis* herbaceus, perennis, tenuis, diffusus, procumbens, flexuosus, teres, lævis, rubescens, ramosus. *Folia* oblongo-ovata, sub-acuta, repanda, glabra, opposita, rubescientia.

*Flos* axillaris, paniculâ diffusa: *pedunculo* communi longo, tenui:

par-

partialibus subdivisis, rnbriis, brevioribus. *Cal.* o. *Corolla* supera, rubra, 5-fida, plicato-clausa. *Stamen* 1. *Semen* 1, nudum, ovatum, 5-sulcatum, asperum.

Habitat agros Cantonienes in Chinâ.

Hujus varietatem ibidem observavi, cuius flos pallidus, caulis, & folia non rubescunt: cætera conformia.

<sup>†</sup> Sp. 2. BOERHAAVIA AFRICANA. γ . . .

Differ. spec. Boer. *Caule* diffuso, hirsuto: *foliis* cordato-rotundis: *racemis* dichotomis, terminalibus.

Hab; & notæ. *Caulis* herbaceus, diffusus, teres, pilosus, 2-pedalis, ramosus. *Folia* cordata, subrotunda, obtusa, repanda, glabra, crassa, opposita. *Flos* purpureus, racemis magnis, dichotomis, terminalibus. *Calix* 3-phyllus, inferus, deciduus. *Corolla* supera, campanula, nec plicata: limbo brevi, patente, 5-fido: laciniis emarginatis, in mediâ emarginaturâ acuminatis. *Stamen* 1. *Semen* 1, nudum, inferum, sulcatum.

Habitat Mozambicci in Africâ Orientali.

GENUS X. HIPPURIS.

Char. Gener. *Cal.* o *Petala*. nulla. *Stigma* simplex. *Sem.* 1. Lin. sy. pl. G. II.

<sup>†</sup> Sp. 1. HIPPURIS INDICA. α Cây năn.

Differ. spec. Hip. *scapo* nude: *radice* tuberosâ.

Hab; & notæ. Planta palustris, *acaulis*: *radice* fibrosâ, repente: tuberibus multis, subrotundis, sparsis, parvis, nigris, pilosis, edulis. *Folia* subulata, longa, erecta, congesta. *Scapus* 4-pedalis, nudus, rectissimus, simplicissimus, teres, striatus: intrinsecus tubulosus, interceptus membranis transversus, plurimis. *Spica* terminalis, coarctata, longa, erecta, reticulato-squamosa, crassitie culmum vix superans. *Calyx*, & *corolla* nulli. *Stamen* 1 longum. *Stylus* stamini æqualis: *stigmatibus* binis, oblongis. *Semen* 1, orbiculatum, nudum, squamâ spicæ fotum.

Habitat loca aquosa Cochinchinæ.

Cyperus Dulcis. Rumph. Amb. I. 10. c. 3. t. 3. f. 1.

CLAS-

CLASSIS II.  
DIANDRIA.  
MONOGYNIA.

\* *Flores inferi, monopetali, regulares.*

1. PHILLYREA. *Cor. 4 - fida. Bacca 1. sperma.*
2. LIGUSTRUM. *Cor. 4 - fida. Bacca 4. sperma.*
3. ERANTHEMUM. *Cor. 5 - fida : tubo filiformi. Capsula.*
4. JASMINUM. *Cor. 5 - fida. Bacca dicocca.*
5. NYCTANTHES. *Cor. 8 - fida. Bacca dicocca.*

\*\* *Flores inferi, monopetali, irregulares. Fructus capsularis.*

- + 6. STRIGA. *Cor. hippocrateriformis, 4 - fida : laciniâ summa emarginatâ.*
7. GRATIOLA. *Cor. 4 - fida. Stamina 4: 2 stirilia.*
8. JUSTICIA. *Cor. ringens. Caps. ungue elastico.*
9. DIANTHERA. *Cor. ringens. Antheræ 2 in singulo filamento.*
10. UTRICULARIA. *Cor. ringens, calcarata. Cal. 2 - phyllus.*

\*\*\* *Flores inferi monopetali, irregulares. Fructus gymnospermi.*

11. VERBENA. *Cor. subæqualis. Cal. laciniâ supremâ breviore.*
12. ZIZIPHORA. *Cor. ringens : galeâ reflexâ. Calyx filiformis.*
13. ROSMARINUS. *Cor. ringens : galeâ falcatâ. Stam. curva.*

DIGYNA.

- + 14. OSMANTHUS. *Cor. campanulata. Filamenta plana : Antheris lateralibus*

C

15. AN-

15. ANTHOXANTHUM. *Cal.* gluma 1 - flora, oblonga. *Cor.* gluma aristata.

## TRIGYNIA.

16. PIPER.

*Cor.* o. *Bacca* 1 - sperma.

## MONOGYNIA.

## GENUS I. PHILLYRIA.

Ghar. Gener. Cor. 4-fida. *Bacca* 1-sperma. Lin. sy. pl. G. 19.

† Sp. I. PHILLYREA Indica. & Cây râm.

Differ. spec. Phil. *foliis* ovatis, acutis : *racemis* terminalibus.

Hab., & notæ. Arbor mediocris, ramosissima : ramis oppositis, patentibus, tortuosis. *Folia* ovata, apice acuta, sub-crenata, parva, glabra, obscurō-viridia, opposita, reflexa. *Flos* albus terminalis, racemis brevibus, plurimis. *Cal.* Cyathiformis, 4-dentatus. *Corolla* campanulata, 4-fida. *Stamina* 2, brevia. *Bacca* 1-sperma, parva, rotunda, nigra.

Habitat in Cochinchinā tam culta, quam agrestis.

Virtus : foliorum. Diuretica, Resolvens. Folia contusa cum Urina, vel aceto, externè apposita breviter sanant contusiones, dolorem leniunt, sanguinis grumos dissolvunt.

## GENUS II. LIGUSTRUM.

Char. Gener. Cor. 4-fida. *Bacca* 4-sperma. Lin. sy. pl. G. 18.

† Sp. I. LIGUSTRUM SINENSE. &c.

Differ. spec. Lig. *foliis* lanceolatis : *racemis* oblongis, lateralibus, & terminalibus.

Hab.; & notæ. Arbor parva, 8 pedes alta : *ramis* diffusis, rectis. *Folia* lanceolata, integerrima, tomentosa, petiolata, opposita, obscurō-viridia. *Flos* albus, parvus, racemis oblongis, axillaris, & terminalibus. *Calyx* cyathiformis, albus, 4-dentatus. *Corolla* 1-petala, campanulata, patens : limbo 4-fido, laciniis lanceolatis, crassis. *Bacca* minima, subrotunda, 4-sperma, fusca. *Stamina* 2.

Habitat Agreste prope Cantonem Sinarum.

## GENUS III. ERANTHEMUM.

Char. Gener. Cor. 5-fida : tubo filiformi. *Auriculae* extra tubum. Stigma simplex. *Fructus*.

† Sp. I. ERANTHEMUM SPINOSUM. &c.

Differ. spec. Erant. *foliis* ovatis, oppositis : *stipulis* spinosis : *flore* solitario, lateralī.

Hab; & notæ. *Caulis* subfruticosus, 1 - pedalis, cespitosus, erectus: ramis assurgentibus, brevibus: *stipulis*, & bracteis spinosis. *Folia* ovata, parva, integerima, pilosa, opposita. *Flos* dilutè violaceus, solitarius, lateralis, pedunculatus. *Calyx* 2 - phyllus, foliolis acuminatis, erectis. *Corolla* tubo longo, filiformi, ad basim curvato: limbo 5 - fido, patente. *Filamenta* 2, tubo insidentia, ipsum superantia: antheris oblongis, incumbentibus. *Stylus* brevis: *stigmata* crassiusculo. *Capsula* supera, ovata, 2 - locularis, polysperma. Habitat agreste in suburbis Mozambicci in Africâ.

## GENUS IV. JASMINUM.

Char. Gener. *Cor.* 5 - fida. *Bacca* dieocca. *Sem.* arillata. *Antheræ* intra tubum. Lin. sy. pl. G. 17.

Sp. 1. JASMINUM OFFICINALE. *Si hán hōa.*

Differ. spec. Jas. *foliis* oppositis: *foliolis* distinctis. Lin. sp. I.

Hab; & notæ. *Caulis* fruticosus, scandens, teres, glaber, ramosus. *Folia* opposita, pinnata: *foliolis* lato-lanceolatis, parvis, integerimis, glabris, distinctis. *Flos* pallidus, odorus, parvus, terminalis, pedunculis paucifloris. *Corolla* tubo cylindrico, longo: limbo plano, brevi, laciinis 5, rotundatis. *Antheræ* 2, sub-sessiles in medio tubi. *Stigma* extra tubum, longum, planiusculum, emarginatum. *Bacca* supera, 2 - cocca.

Habitat agreste prope Cantonem Sinarum.

Jasminum Vulgatius, flore albido. Duham. Arb. tom. I. pag. 309. tab. 122. Bauh. Pin. p. 397. n. I.

† Sp. 2. JASMINUM NERVOSUM. *α* Cây Vang.

Differ. spec. Jas. *foliis* ovatis, 3 - nerviis.

Hab; & notæ. *Caulis* fruticosus, longus, scandens, teres, laevis, ramosus. *Folia* impari-pinnata: *foliolis* sesquipollicaribus, ovatis, acuminatis, integerimis, 3 - nerviis, nitidis. *Flos* albissimus, inodorus, terminalis, pedunculis polyfloris. *Corolla* hippocrateriformis, laciinis oblongis, obtusis, numero inconstantibus, saepius 7, saepe etiam 5, 6, vel 8. *Calycis* laciinæ totidem, subulatae, erectæ. *Stamina* 2, tubo inclusa. *Stigma* 2 - fidum. *Pericarpium* bacæ 2, ovatae, monospermæ: femine arillato.

Habitat inter sepes Cochinchinæ.

Virtus. Attenuans, Decibtruens. Imprimis valet exrractum totius plantæ, tam usū externo, quam interno. Sapor amarissimus. Odor nullus.

Observ. Varia sunt Jasmina inodora apud Auctores, quæ cum nostro Co-

Cochinchinensi non cohærent. Affine videtur Nyctanthis Glauca. Lin. Jun. supl. pag. 82. Flos utriusque generis ; habitus Jasmini proprior.

## GENUS V. NYCTANTHES.

Char. Gener. *Cor.* 8 - fida. *Cal.* 8 - fidus. *Pericarpium* dicoccum. Lin. sy. pl. G. 16.

Sp. 1. NYCTANTHES SAMBAC.  $\alpha$  Hoa lāi  $\beta$  Mō li hōa.

Differ. spec. Nyct. *foliis* inferioribus cordatis, obtusis : *superioribus* ovatis, acutis. Lin. sp. 2.

Hab ; & notæ. *Caulis* fruticosus, 4 - pedalis, cespitosus, suberectus, nodosus, scaber, ramosus. *Folia* inferiora cordata, obtusa : superiora ovata, subacuta : omnia integerrima, rugosa, glabra, opposita. *Flos* terminalis, albissimus, nocte odoratissimus, pedunculis sub - 4 - floris, semper luxurians, & sterilis. *Corollæ* limbus infimus obtusus, saepe 8 - fidus, non raro 6, 7, 9, 10 - fidus. *Calycis* laciniae totidem, subulatae, erectae.

Habitat in hortis Cochinchinæ, & Chinæ, vulgaris quidem, & cultu facilis : nec ideo minus in deliciis habita a Magnatibus, quos allicit præstantiâ odoris nulli florum cedente.

*Flos* Manœ. Rumph. Amb. 1. 7. c. 29. tab. 30. Jasminum Limonii folio conjugato. Burm. Zeyl. pag. 128. t. 58.

‡ Sp. 2. NYCTANTHES GRANDIFLORA.  $\alpha$  Hoa lāi ta.  $\beta$  Tā mö li.

Differ. spec. Nyct. *foliis* ternis, oppositisque.

Hab ; & notæ. *Caulis* fruticosus, erectus, 5 - pedalis, crassus, scaber. *Folia* stellata terna, oppositaque, ovata, subcordata, subacuta, rugosa, glabra. *Flos* albus, plenus, terminalis 1 - 2 - natus, Sambac triplo maior, visu speciosior, fragrantia inferior. *Calyx* 10 - fidus, lacinias linearibus, erectis. *Corollæ* infimus ordo laciniarum numero inconstans.

Habitat culta tam in Cochinchinâ, quam in Chinâ : ubi, partim præcisis, partim eleganter flexis ramulis, fit arbuscula pulchra, & pretiosa.

Observ. Cum tam in Nyctanthe, quam in Jasmino numerus laciniarum corollæ, & calycis in plerisque inconstans sit, nec aliis sit character Genericus, per quem differant, congruum magis videtur ex duobus generibus unum fieri.

## † GENUS VI. STRIGA.

## Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 4-fidum : laciniis subulatis, pilosis, æqualibus, erectis, persistentibus.

Cor. Monopetala, infera, hippocrateriformis : tubo longo, tenui, prope limbum recurvo : limbo 4-partito, laciniis 3 inferioribus æqualibus: supremâ maiori, emarginatâ: omnibus rotundatis, brevibus.

Stam. Filamenta 2, brevissima, curvaturæ tubi inhærentia. Antheræ oblongæ, stantes.

Pist. Germen oblongum. Stylus longitudine tubi. Stigma simplex.

Peric. Capsula ovato-oblonga, 1-loocularis, polysperma.

Sem. Plurima, subrotunda, minima.

Nom. Striga ab habitu plantæ strigoso.

Char. Gener. Cor. 4-fida: laciniâ summâ emarginata. Caps. supera, 1-loocularis, polysperma.

## † Sp. I. STRIGA LUTEA. β Thœc chiö kam.

Differ. spec. *Striga foliis lanceolato-linearibus: floribus* solitariis.

Hab. *Caulis* herbaceus, simplicissimus, erectus, 4-falcus, 6-pollicaris. *Folia* lanceolato-linearia, integerrima, sessilia, glabra, sparsa, parva. *Flos* luteus, axillaris, solitarius.

Habitat inulta in suburiis Cantonensibus.

## GENUS VII. GRATIOLA.

Char. Gener. Cor. irregularis, resupinata. Stam. 2 sterilia. Caps. 2-loocularis. Cal. 7-phillus: binis exterioribus patulis. Lin. sp. pl. G. 39.

## Sp. I. GRATIOLA HYSSPOIOIDES? β Pi pā tsāo.

Differ. spec. Grat. *foliis lanceolatis, subserratis, articulo caulino brevioribus*. Lin. sp. 4.

Hab; & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, sesquipedalis, erectus, tenuis, ramosissimus. *Folia* ovato-lanceolata, subserrata, glabra, subsessilia, opposita. *Flos* violaceus, congestus, axillaris: bracteis lanceolatis, ciliatis suffultus. *Cal.* nullus. *Corolla* irregularis, 4-fida, laciniâ inferiori maiore. *Filamenta* 4, quorum 2 sterilia. *Capsula* lato-lanceolata, compressa, 2-loocularis, 2-sperma.

Ha-

Habitat inulta Cantone Sinarum.

Gratiola Indica minor, vera, sive hyssopoides. Pluk. Alm. p. 180.  
t. 193. f. 1.

† Sp. 2. GRATIOLA STRICTA. a. Cây tu hit.

Differ. spec. Grat. *foliis* ovatis : *spicā* longā terminali.

Hab ; & notæ. *Caulis* subfruticosus, simplicissimus, erectus, sesquipedalis. *Folia* ovata, acuminata, subserrata, plana, glabra, opposita. *Flos* albus, rubro punctatus, sessilis : *spicā* longā, simplici, erectā, terminali. *Calyx* nullus præter bracteam triplicem florū suppositam. *Corolla* tubo longo, tenui, angulato : limbo bilabiato, 5 - fido, patente. *Stamina* 2 sterilia ad latus fertilium, his breviora. *Capsula* oblonga, acuminata, in medio sinuata, compressa, 2 - sperma.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

† Sp. 3. GRATIOLA RUGOSA. a. Cây Lâu Bac.

Differ. spec. Grat. *foliis* lanceolatis, rugosis : *spicā* ramosa.

Hab ; & notæ. *Caulis* subfruticosus, simplex, erectus, 3 - pedalis, teres. *Folia* lanceolata, sub-crenata, crassa, rugosa, apice reflexa, glabra, opposita. *Flos* purpurascens, sessilis : *spicis* ramosis longissimis, terminalibus. *Calyx* 5 - phyllus, foliolis linearibus, suffultus bracteis ternis, subulatis, inæqualibus, calyce brevioribus. *Corolla* irregularis, 5 - fida. *Stamina* 4, quorum 2 sterilia breviora. *Capsula* 2 - locularis.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

### G E N U S VIII. JUSTICIA.

Char. Gener. *Cor.* ringens. *Caps.* 2 - locularis, ungue elasto desiliens. Stam. *antherā* singulare. Lin. sy. pl. G. 28.

Sp. 1. JUSTICIA ECBOLIUM. a. Cây dào làong.

Differ. spec. Just. fruticosa, *foliis* lanceolato-ovatis : *spicis* tetragonis : *bracteis* ovatis, ciliatis : *corollarum* galea reflexa. L. sp. 2.

Hab ; & notæ. *Frutex* 5 - pedalis, erectus : *ramis* patentibus. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, glabra, opposita, petiolata. *Spica* terminalis, longa, subtetragona : *bracteis* ovatis, mucronatis, deciduis. *Corolla* albicans : labio superiore reflexo, inferiore 3 - fido. *Caps.* ovata, compressa.

Habitat loca minus culta in Cochinchinâ.

Adhatoda *spicā* longissimā, flore reflexo. Burm. Zeyl. pag. 7. tab. 4. f. 1.

Virtus. Ab indigenis experta in curandâ periosteï inflammatione, quæ in manuum digitis acerbos dolores excitat. Inde nomen vernaculum.

Sp. 2. JUSTICIA PICTA. α Ngaoc diep.

Differ. spec. Just. fruticosa, *foliis lanceolato-ovatis*, *pictis*: *corollis* fauce inflatis. Lin. sp. 5.

Hab; & notæ. *Caulis* arboreus, 8 - pedalis, brachium crassus: *ramis* ascendentibus, albicantibus, lœvibus, fragilibus. *Folia* lato-lanceolata, integerrima, nitida, petiolata, opposita, coloris obscurō-viridis, maculâ longâ, albâ, sinuatâ in medio pulchrè signata: costis lateralibus parallelis, obliquis. *Flos* ruber, *spicis* brevibus, terminalibus: bracteis nullis. *Calyx* 5 - fidus, acutus, brevis, persistens. *Corolla* ringens, limbo oblongo: fauce inflata: labio superiore concavo, integerrimo: inferiore 2 - fido. *Stamina* 2, recta: *Antheris* incumbentibus.

Habitat in hortis Cochinchinæ.

Folium Bracteatum. Rumph. Amb. I. 6. c. 35. tab. 30.

Virtus: foliorum. Emolliens, Resolvens. Usus cataplasmatis præcipuus in inflammatione mamillarum ex lactis coagulatione.

Sp. 3. JUSTICIA FASTUOSA? α . . .

Differ. spec. Just. fruticosa *foliis ellipticis*: *thyrsis* terminalibus. Lin. sp. 8.

Hab; & notæ. *Caulis* fruticosus, erectus, 6 - pedalis: *ramis* longis, debilibus, fulcatis. *Folia* elliptico-lanceolata, subferrata, glabra, opposita, petiolata. *Bracteæ* lanceolatae, deciduae. *Flos* albus, racemis compotitis, oblongis, erectis, terminalibus. *Corolla* galea concava, 2 - fidâ, acuta: labium inferius 3 - fidum. *Filamenta* 2, brevia, fauci inserta: antheris oblongis. *Capitula* oblonga, 4 - fulca, 2 - locularis, polysperma.

Habitat loca agrestia Cochinchinæ.

Gratiolæ affinis Maderaspatana, Digitalis æmula. Pluk. Phyt. tab. 193. fig. 3.

+ Sp. 4. JUSTICIA NIGRICANS. α Truong sinh Cây.

Differ. spec. Just. fruticosa, *foliis lanceolato-linearibus*, obtusis, nigricantibus: *spicis* distichis, terminalibus.

Hab; & notæ. *Frutex* erectus, 6 - pedalis. *Folia* lanceolato-linearia, obtusa, integerrima, crassa, subsessilia, opposita. *Rami*, & *folia* lineis nigris notata. *Flos* albus, rubro virgatus: *spicis* distichis, terminalibus. *Corolla* labium superius lanceolatum, integrum, erectum: inferius 3 - fidum, reflexum. *Bracteæ* setaceæ. *Capitula* 2 - locularis.

Ha-

Habitat loca agrestia Cochinchinæ.

Sp. 5. JUSTICIA CHINENSIS.  $\alpha$  Kim loung bánh.

Differ. spec. Just. herbacea *foliis* ovatis : *floribus* lateralibus : pedunculis 3 - floris : bracteis ovalibus. Lin. sp. 14.

Hab ; & notæ. *Caulis* herbaceus , longus , procumbens , ramosus. *Folia* ovata , sub-acuta , integerrima , glabra , opposita. *Braetæ* ova-les. *Flos* lateralis , dilutè violaceus : pedunculis 3 - floris : involucro setaceo 2 - phyllo. *Corollæ* tubo longo , gracili : limbo ringente : labio superiore subrotundo , inferiore oblongo. *Capsula* 2 - locularis.

*Stamina* 2.

Habitat inulta in hortis , & sepibus Cochinchinæ.

Burm. Ind. pag. 8. tab. 4. f. 1.

Sp. 6. JUSTICIA PURPUREA.  $\beta$  Chi cháp hoa.

Differ. spec. Just. *foliis* ovatis , utrinque mucronatis , integerrimis , glabris : *caule* geniculato : *spicis* secundis. Lin. sp. 21.

Habitus , & notæ. *Caulis* herbaceus , erectus , ramosus , geniculatus , 3 - pedalis. *Folia* ovata , utrinque acuminata , integerrima , oppo-sita , margine ciliata. *Flos* purpureus , spicis secundis axillaribus : *braetæ* lanceolatis , petiolatis. *Corollæ* labium inferius turbinato-oblongum , obtusissimum. *Antheræ* oblongæ. *Filamenta* 2. *Capsula* 2 - locularis.

Recentem observavī Cantone Sinarum , sicut etiam fecerat Osb. it. p. 230. Fol. Tinctorum ( Rumph. Amb. l. 10, tab. 22. f. 1. ) flores habet terminales , solitarios , in eoque a nostrâ differt.

<sup>†</sup> Sp. 7. JUSTICIA TINCTORIA.  $\alpha$  Kim loung nhuom

Differ. specif. Just. *foliis* lanceolatis , subcrenatis , pubescentibus : *floribus* congestis , axillaribus.

Hab ; & notæ. *Caulis* herbaceus , ramosus , procumbens , longus , teres , sulcatus. *Folia* ovato-oblonga , acuminata , subcrenata , pu-bescentia , opposita. *Braetæ* conicæ , obtusiusculæ. *Flos* rosei colo-ris , pedunculis axillaribus , monofloris , polynatis. *Corolla* labio utroque reflexo : superiore ovato , integerrimo : inferiore oblongo , obtuso , 3 - fido. *Stamina* 2. *Capsula* 2 - locularis , elastica.

Uſus. Folia viridi colore saturata , eodem telas pulchre imbuunt.

Habitat inulta in Cochinchina.

### GENUS IX. DIANTHERA.

Char. Gener. *Cor.* ringens. *Caps.* 2 - locularis , ungue elasto-dif-ſiliens. *Stam.* singulum *antheris* binis , alternis. Lin. sy. pl. G. 29.

† Sp. 1. DIANTHERA PANICULATA. & Thuốc lác nho lá.  
Differ. spec. Dianth. *paniculis* axilliaribus : *foliis lanceolatis*, tomentosis.

Hab ; & notæ. *Frutex* 5 - pedalis , caule erecto , ramis brachiatis. *Folia* lanceolata , integerrima , tomentosa , opposita. *Flos* albus , paniculatus , axillaris. *Calyx* 5 - partitus , laciñiis filiformibus. *Corolla* tubo longo , tenui : *labio* superiore filiformi , emarginato : inferiore magno , 3 - fido. *Stigma* acutum. *Antheræ* binæ , una super alteram in singulo filamento. *Capsula* bilocularis.

Habitat syvestris in Cochinchinâ.

### GENUS X. UTRICULARIA.

Charact. Gener. *Cor.* ringens , calcarata. *Cal.* 2 - phyllus , æqualis. *Caps.* unilocularis. Lin. sy. pl. G. 34.

† Sp. 1. UTRICULARIA RECURVA. & . . .

Differ. spec. Utr. *aphylla* : *nectario* recurvo : *spicæ* simplici.  
Hab ; & notæ. *Caulis* 4 - pollicaris , tenuis , simplicissimus , erectus. *Folia* nulla. *Flos* luteus , *spicæ* simplici , oblongâ. *Calyx* biphylloides , compresso-rotundus , magnus. *Corolla* ringens , *nectario* conico , recurvo , petalo subæquali. *Capsula* lenticularis , polysperma , Calyce Cluso fota. *Radix* fibrosa , brevis , folliculis destituta. *Stamina* 2 , brevia.

Habitat in rivo *Hòn mò* , non procul ab urbe regiâ Cochinchinæ.

† Sp. 2. UTRICULARIA AUREA. & Cây raong.

Differ. spec. Utr. *aphylla* : *nectario* compreso-conico : *flore* racemoso.  
Hab ; & notæ. *Caulis* tenuis , longissimus , ramosus , fluctuans. *Folia* nulla. *Radix* plurima , capillaris , viridis , ramosa , utriculata. *Scapus* nudus , teres , erectus , 3 - pollicaris. *Flos* aureus , racemosus : foliolis *calycis* binis , lanceolatis , incurvis. *Corolla* 2 - partita : fauce convexâ , emarginatâ : *nectario* conico , compresso. Habitat in fluiis lentioris cursus in Cochinchinâ.

### GENUS XI. VERBENA.

Charact. Gener. *Cor.* infundibiformis , subæqualis , curva. *Calycis* unicò dente truncato. *Semina* 2 , sive 4 , nuda. *Stamina* 2 , sive 4. Lin. sy. pl. G. 35.

Sp. I. VERBENA OFFICINALIS.  $\alpha$  Cò roi ngùa: Ma tien thao.  $\beta$  Mâ pién tsão.

Differ. spec. Verb. tetrandra, *spicis* filiformibus: *foliis* multifido-laci-niatis. *Caule* solitario. Lin. sp. 15.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, simplex, angulatus, ramosus, 3-pedalis. *Folia* magna, crenato-multifida, opposita, glabra. *Flos* purpurascens, terminalis, *spicis* filiformibus, longissimis. *Calyx* tubulo-angulatus, inæqualiter 5-fidus, dente uno truncato. *Corolla* brevis, tubulosa, limbo 5-fido, laciniis rotundatis, subæqualibus, patentibus. *Stamina* 4, brevissima. *Semina* 4, nuda. *Spica* sub-solitaria in quolibet ramo.

Habitat agrestis, cultaque tam in Cochinchinâ, quam in Chinâ.

Verbena foliis multifido-laci-niatis: *spicis* filiformibus. Hort. Cliffort. p. II.

Virtus. Nervina, Deobstruens. Decoctum prodest in hydrope, cataplasma in tumore scroti.

### GENUS XII. ZIZIPHORA.

Char. Gener. *Cor.* ringens: labio superiore reflexo, integro. *Cal.* filiformis. *Semina* 4, Lin. sy. pl. G. 39.

† Sp. I. ZIZIPHORA SILIQUOSA.  $\alpha$  Cây tút mât.

Differ. spec. Ziz. *foliis* ovatis, rugosis: *spicis* lateralibus: *fructu* siliquofo.

Hab.; & notæ. *Frutex* erectus, lignosus, ramosus, 5-pedalis. *Folia* ovata, acuminata, integerrima, rugosa, glabra, opposita, magna. *Flos* lateralis, racemosus, ruberrimus, calyce concolore. *Calyx* 5-partitus, laciniis filiformibus, erectis. *Corolla* ringens, labio superiore oblongo, incurvo, margine reflexo, integro: inferiore 3-partito, laciniis linearibus, æqualibus. *Filamenta* 2, longitudine fere corollæ: *antheris* stantibus. *Stigma* acuminatum. *Siliqua* linearis, 2-valvis: *seminibus* 4, subrotundis.

Observatio. Omnia in hac plantâ Zizophoræ sunt propria præter siliquam, quæ etiam alteri generi difficulter accommodabitur.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

### GENUS XIII. ROSMARINUS.

Char. Gener. *Cor.* inæqualis, labio superiore bipartito. *Filamenta* longa, curva, simplicia cum dente. Lin. sy. pl. G. 41.

Sp. 1. ROSMARINUS OFFICINALIS.  $\alpha$  Tay duong Choi.  $\beta$  Yong tsao.  
Differ. spec. Rosm. *fruticosus*, *foliis linearibus, oppositis: spicis brevibus, terminalibus.* Lin. sp. I.

Hab; & notæ. *Caulis lignosus, crassus, 2 - pedalis: ramis multis, diffusis, tortuosis. Folia linearia, crassa, sulco longitudinali, glabra, parva, odorata, opposita. Flos albo-cæruleus, spicis simplicibus, brevibus, terminalibus. Calyx 3 - dentatus, lacinia superiore maiore. Corolla ringens, labio superiore oblongo, obtuso, emarginato, lateribus reflexo: labio inferiore longiore, 3 - fido, laciniis latis, mediâ concavâ, emarginatâ. Filamenta 2, simplicia. Semina 4 nuda.*

Observatio. Hæc planta in Chinâ, & Cochinchinâ studiose colitur, sed rara est: crediturque aliundè oriundam industriâ Lusitanorum huc fuisse delatam. Ejus defectum supplet frutex Cedrela, quæ & habitu, & virtute Rosmarino conformis, odore superior est: charactere autem floris longè distat, prout proprio loco videri poterit. Gen. 67. Petandriæ Monogyniæ.

Thunb. Jap. p. 22. Hort. Cliffort. p. 14.

Virt. Cephalica, Tonica, Nervina.

## DIGYNIA.

### $\dagger$ GENUS XV. OSMANTHUS.

#### *Descriptio Naturalit.*

Cal. Perianthium inferum, campanulatum, 4 - fidum, minutum, laciniis subacutis, persistens.

Cor. Monopetala, campanulata, patentissima: tubo brevi: limbo 4 - fido, laciniis oblongo-ovatis, crassis, incurvis.

Stam. Filamenta 2, latiuscula, plana, acuminata, tubo corollæ æqualia, ipsi insistentia. Antheræ 1 - loculares, oblongæ, binæ singulo Filamento lateraliter adhærentes, invicem distantes.

Pist. Germen ovatum, subacutum. Styli 2, crassi, subulati, basi dilatatâ Germen amplectentes. Stigmata simplicia.

Peric. Abortiens.

Nom. (Οσμή odor: αὐθός flos) ex notabili floris odore.

Char. Gener. Cor. 4 - fida, æqualis. Antheræ laterales, binæ in sin-  
gulo filamento, plano.

Sp. I.

† Sp. 1. OSMANTHUS FRAGRANS. α Hoa mout tay. β Mö sī hōa : Guēi hōa.

Differ. spec. Osm. *foliis lanceolatis*, *denticulatis*, *oppositis*: *racemulis* *subfastigiatis*, *axillaribus*.

Hab. *Frutex lignosus*, 7 - *pedalis*, *erectus*: *ramis* *ascendentibus*, *ali-* *quando scandentibus*. *Folia lanceolata*, *denticulata*, *incurva*, *gla-* *bra*, *opposita*, *petiolis brevibus*. *Flos pallidus*, *parvus*, *adoratissi-* *mus*: *racemis brevibus*, *sub-fastigiatis*, *axillaribus*, & *terminali-* *bus*, *padunculis brevibus*.

Habitat in hortis Cochinchinæ: frequentius in Chinâ, puto, quod etiam agrestis.

Observ. In utroque regno Pericarpium diligenter quæsivi, nunquam inveni: existimo semper abortiri. Estne eadem planta, quæ apud Japones dicitur Moklei? Kämpf. Amæn. p. 844. Thunb. Jap. p. 18. t. 2. De Pericarpio, stylo dupli, antheris lateralibus ipsi silent, quæ nostram vetant Oleæ generi commisceri. Memini hanc arbusculam, me Cantone Sinarum remanente, in Angliam translatam fuisse: si ibi floruit, & fructificavit, facillimè res probabitur.

### GENUS XV. ANTROXANTHUM.

Char. Gener. *Cal.* Gluma bivalvis, uniflora. *Cor.* Gluma bivalvis acuminata. Sem. 1. Lin. sy. pl. G. 46.

† Sp. 1. ANTHOXANTHUM PULCHERRIMUM. α Co thia thia.

Differ. spec. Anth. *foliis lanceolatis*, *undulatis*: *paniculâ spicatâ*.

Hab; & notæ. Herba graminea, cespitosa. *Folia radicalia multa*, *lan-* *ceolata*, *undulata*. *glabra*. *Culmi* 1 - *pedales*, *suberecti*, *simplices*, *tenues*, *teretes*, *foliolis subulatis*, *paucis vestiti*. *Panicula* *florum* *sparsa*: *spiculis linearibus*, *floribus plurimis*, *subsessilibus*. *Calyx* *gluma* 3 - *flora*, *bivalvis*: *valvulis concavis*, *acuminatis*, *interiore* *maiore*. *Corolla* *gluma* *bivalvis*: *valvulis oblongis*, *acutis*, *interiore* *longiore*, *apice ciliatâ*. *Filamenta* 2, *tenuissima*, *corollâ bre-* *viora*: *antheris* *ovato-oblongis*. *Styli* 2, *capillares*, *longiores sta-* *minibus*: *stigmatis oblongis*. *Semen* 1. *subrotundum*, *corollâ fo-* *tum*. Planta odoris expers.

Hab. in agris, & hortis Cochinchinæ, incultum.

Observ. Poa Tenella (Lin. sp. 15.) dicitur esse Gramen fumi (Rumph. Amb. l. 10. c. 6. tab. 4. fig. 3.) quæ figura nostram quodammodo re-præsentat, foliis radicalibus jam deciduis. Gluma Calycina multi-flora, propria est Poæ, non Anthoxanthi. Attamen cum in nostrâ plantâ stamina inveniantur constanter duo, eam potius annumeravi-

mus

mus Anthoxantho, non obstantibus calycibus multifloris, qui simili-  
ter tolerantur in Anthoxantho Paniculato Linnei, sp. 3.

## TRIGYNIA.

## GENUS XVI. PIPER.

Caract. Gener. *Caul. o. Cor. o. Bacca r. sperma.* Lin. sy. pl. G. 47.

\* *Baccis separatis.*

Sp. 1. PIPER NIGRUM. α Tio bo: Ho tio. β Hu tsiao.

Differ. spec. Pip. *foliis ovatis, septemnerviis, glabris, petiolis simplicissimis.* Lin. sp. 1.

Hab; & notæ. *Caulis* fruticosus, longissimus, multiplex, ad arbores adrepens, articulis radicantibus. *Folia* ovata, acuminata, integerrima, glabra, basi lateribus æqualibus, subplana, apice, & margine sub-reflexa, 7-nervia, venosa; alterna: *petiolis* simplicissimis. *Flos* lateral, & terminalis: *spicis* simplicibus, longiusculis, oppositi-foliis: *floribus* sessilibus. *Calyx* in hac specie semper 4-phyllo, imbricatus, foliolis crassis, concavis obtusissimis, inæqualibus. *Corolla* nulla. *Filamenta* 2, subulata, plana, calyci æqualia, ejus foliolis occulta. *Antheræ* ovatæ, supra calycem prominentes. *Germen* globosum, superum. *Stigmata* sessilia, fæpius, 4 rarius 3, vel 5, oblonga, reflexa, aspera. *Bacca* globosa, rubro-fusca.

Piso (Mant. p. 180.) Veram, quamvis non elegantem, iconem Piperis Nigri profert sub nomine Piperis Maris: at Piper, quod dicit Fæminam, mihi non occurrit. Verum est, quod Piper Album ex eademmet plantâ proveniat; si enim fructus sinatur diutius in arbore senescere, collectusque, leviter terendo, excorticetur, albus fit: indeque sescupo carius venditur, quia excorticatione ponderis amicit. Tam Albi, quam Nigri in Cochinchinâ magna est copia, quâ naves exteræ quotannis onerantur.

Virtus. Calefaciens, stimulans, stomachica. Ad curandos morbos frigidos ventris, stomachi, cerebri, vesicæ, uteri apta: in tertianis, & quartanis febribus proficia: incolarum Indostan panacæa. Usus: ad condierdos cibos frequens, saluber, & gratus.

† Sp. 1. PIPER SYLVESTRE. α Tio rang.

Differ. spec. Pip. *foliis ovato-lanceolatis, 5-nerviis: spicis rectis, subterminalibus.*

Hab; & notæ. *Caulis* fruticosus, scandens, tenuis, teres, ramosus. *Folia* oblonga, basi rotundata, apice acuta, plana, 5-nervia, venosa,

nosa , alterna , glabra , petiolata. *Bacculae* ovatæ , rubræ , sub-fessiles : *spicis* subterminalibus , linearibus , longis , rectis. *Calyx* , & corolla nulli.

Habitat in sylvis Cochinchinæ , ad nullum usum , quem sciam , aptum.

Suspicio idem esse Piper Caninum. Rumph. Amb. 1. 7. cap. 26. tab. 28. fig. 2. Descriptio , & forma spicæ , ac baccularum satis cohaerent cum nostris : folia autem non ita ; quod in multis tribui potest infastæ oculorum orbitati , quæ accurato Authori non-permitit tabulas ab alio pictas propriis oculis examinare.

† Sp. 3. PIPER PINNATUM. β Xú tsião. α Thuc tieo.

Diff. spec. Pip. *caule* erecto , aculeato : *foliis* ovatis , pinnatis.

Hab ; & notæ. *Caulis* fruticosus , erectus , multiplex , ramosissimus : aculeis multis , brevibus , recurvis. *Folia* pinnata , 3-juga , ovata , acuminata , undulata , integerrima , venosa , nitida , subfessilia. *Fruclæ* raceniis parvis , sub-terminalibus. *Bacculae* globosæ , rubræ , odoræ , parum ardentes.

Observatio. Dubius hanc speciem propono , quia plantam vidi eo tempore , quo non florebat.

Ufus apud Sinenses , ubi nascitur , culinarius : valet etiam in re Medicâ contra lumbaginem , Chlorosim , hydropem , tussim , ventris dolores. Tam folia , quam fructus in usu sunt.

\*\* *Baccis coalitis.*

Sp. 4. PIPER BETLE. α Cay tlau. β Lâu yep.

Differ. spec. Pip. *foliis* ovatis , oblongiculis , acuminatis , 7-nerviis , *petiolis* bidentatis. Lin. sp. 2.

Hab ; & notæ. *Caulis* fruticosus , multiplex , longissimus , nodis radicantibus arboribus adrepens. *Folia* ovata , cordataque , acuminata , basis lateribus inæqualibus , incurva , venosa , nitida , 7-nervia , aromaticæ , subardentia , alterna : *petiolis* simplicibus , raro bidentatis. *Flos* spadyce cylindraceo , tenui , longo , solido , flosculis testo : *pedunculo* solitario , simplici , foliis opposito. *Calyx* , & *corolla* ○. *Stigmata* 4-5 , linearia , fessilia , extra spadycem expansa. *Bacculae* compresso-angulatae , coalitæ , semi-occultatæ , inseparabiles. *Stamina* sæpe quæsita nunquam inveni. Puto quod lateant intra spadycem , quo dissecto , cum aquosus sit , turbatur , evanescit que partium symetria , ut nec microscopio discerni possit.

Burm. ( Zeyl. tab. 83. fig. 2. ) eleganter delineat Betle folia , & spadyses : cuius caules adrepere videntur Rumph. Amb. lib. 9. tab. 116. fig. 2. sub nomine Sirifolii.

**Virtus.** Calefaciens, stomachica, Balsamica, Vulneraria. Folia Betle cum fructulo fructus palmæ Arecæ, & parum calcis continuo gestantur in ore, & masticantur ab incolis utriusque Indiæ Orientalis, tum ad corrigendum pravum anhelitum, tum ad stomachum robandum: a pauperibus etiam ad fallendam famem.

**Sp. 5. PIPER LONGUM.** a Cây lót: Tát phât. g Pipō.

Differ. spec. Pip. *foliis* cordatis petiolatis, sessilibusque. Lin. sp. 6. Hab; & notæ. *Caulis* fruticosus, crassus, ramosissimus, adrepens, nodis radicantibus. *Folia* lato-cordata, basi æquali, rotundata, apice acuminata, 7 - nervia, undulata, alterna, petiolata, sessiliaque, coloris obscuro-viridis. *Flos*, & *fructus* spadice subulato-oblongo, apice obtuso, a fructificatione Bette parum differente, breviore tamen, & crassiore: *pedunculis* oppositifoliis. *Stigmata* sunt, sicut in Bette. *Bacculae* coalitæ, subrotundæ, 1 - spermæ. *Stamina* similiter videre non potui.

Piper Longum Rumph. Amb. I. q. c. I. tab. 116. fig. 1. Ubi fructus, non folia, cum nostris convenient. Pimpilim Pis. Mant. fig., & pag. 183. Quod autem Garcias ab Horto (Arom. I. I. c. 22.) dixerit Piper Nigrum, & Lougum esse plantas omnino diversas, intelligi debet præcipue de fructu: cuius spicæ Nigri, & spadices Longi nullatenus similes videri possunt. Adeoque omitti poterat Pisonis censura: loco supra citato.

**Virtus:** Calefaciens, Stimulans, Deobstruens, Antacida. Piperis Longi fructu, & foliis recentibus utuntur etiam indignæ, ad eondidens pisces. Ejus odor, & sapor similiter ardens, sed Nigro inferior, & multis non placet.

#### Observatio.

Celeb. Lin. sy. pl. part. I. pag. 78. simulque sy. Veget. pag. 68. optimo jure requirit, ut species Piperis in solo natali amplius examinentur, videaturque, an differant a reliquis in partibus fructificationis?

Clar. Forster in itinere ad insulas Oceani Australis hoc examen suscepit, asseritque in multis speciebus invenisse numerum staminum indeterminatum: stigmatum vero numerum, & formam in omnibus fere speciebus differentem. Ego, qui pauca examinavi, differentiam stigmatum similiter variantem notavi, sed a numero terno non longè aberrantem. Stamina quidem bina inveni in speciebus, quæ gaudent fructu discreto: ast in illis, quarum fructificatio est concreta, & in murinam veluti caudam extensa, quarumque maiorem numerum ex Plumicro recensent Linnæus, & Aubletus, etiam oculis microscopio armatis stamina numerare non potui; & an aliquis unquam numeraverit, dubito: sicut etiam an similes plantæ sint veræ species Piperis?

CLAS-

C L A S S I S III.  
T R I A N D R I A.  
M O N O G Y N I A.

\* *Flores superi.*

- |               |  |
|---------------|--|
| 1. MELOTHRIA  | <i>Cor. 5 - fida, rotata. Baccæ 3. locularis.</i>                        |
| † 2. AXIA.    | <i>Cor. 10 - fida, campanulata. Semen 1.</i>                             |
| 3. GLADIOLUS. | <i>Cor. 6 - petaloidea : petalis superioribus tribus convergentibus.</i> |
| 4. IXIA.      | <i>Cor. 6 - petaloidea, patens. Stigmata 3.</i>                          |

\*\* *Flores inferi.*

- |               |   |
|---------------|---|
| † 5. PHANERA. | <i>Cor. 5 - petaloidea. Cal. 4 - phyllus. Legumen.</i>                            |
| 6. COMMELINA. | <i>Cor. 2 - 3 - petaloidea. Cal. 3 - 4 phyllus. Neetaria cruciata, petiolata.</i> |

\*\*\* *Flores graminei : valvulis glumæ calycinæ.*

- |              |   |
|--------------|---|
| 7. SCHOENUS. | <i>Cor. nulla. Cal. paleis fasciculatis. Semen subrotundum.</i> |
| 8. CYPERUS.  | <i>Cor. nulla. Cal. paleis distichis. Semen nudum.</i>          |
| 9. SCIRPUS.  | <i>Cor. nulla. Cal. paleis imbricatis. Semen nudum.</i>         |
| 10. NARDUS.  | <i>Cor. 2 - valvis. Cal. nullus. Sem. tectum.</i>               |

*D I G Y N I A.*

\* *Flores uniflori, vagi.*

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 11. BOBARTIA.   | <i>Cal. multivalvis, imbricatus.</i>                      |
| 12. PANICUM.    | <i>Cal. 3 - valvis : tertiam dorsali minore.</i>          |
| 13. ALOPECURUS. | <i>Cal. 2 - valvis. Cor. 1 - valvis : apice simplici.</i> |
| 14. PHLEUM.     | <i>Cal. 2 - valvis, truncatus, mucronatus, sessilis.</i>  |

34

## T R I A N D R I A.

15. PHALARIS.

*Cal. 2 - valvis : valvis carinatis, æqualibus, corollam includentibus.*

16. MILIUM.

*Cal. 2 - valvis : valvis ventricos, corollâ majoribus, subæqualibus.*

17. AGROSTIS.

*Cal. 2 - valvis : valvis acutis, Cor. brevioribus.*

† 18. STEGOSIA.

*Cal. 2 - valvis. Cor. 3 - valvis, Calyce brevior.*

19. SACCHARUM.

*Cal. lanagine extus vestitus.*\*\* *Flores multiflori, vagi.*

20. AIRA.

*Cal. 2 - florus, 2 - valvis. Flosculi absque rudimento tertii.*

21. POA.

*Cal. 2 - valvis. Cor. ovata : valvis acutiusculis.*

22. ARUNDO.

*Cal. 2 - valvis. Cor. basi lanata, mutica.*\*\*\* *Flores spicati, receptaculo subulato.*

23. TRITICUM.

*Cal. multiflorus.*

24. HORDEUM.

*Involucrum 6 - phyllum, 3 - florum. Flos simplex.*

25. CYNOSURUS.

*Involucrum 1 - phyllum, laterale. Flos compo-*  
*fitus.*

## T R I G Y N I A.

\* *Flores inferi.*

26. LECHEA.

*Cor. 3 - petata. Cal. 3 - phyllus. Caps. 3 - cocca.*

27. ERIOCAULON.

*Cor. 3 - petala. Cal. compositus. Semen 1, coro-*  
*natum corollâ.*

† 28. POLYPARA.

*Cor. 4 - petala, polyflora. Cal. 0. Caps. 3 - lo-*  
*cularis.*

29. MOLLUGO.

*Cor. 0. Cal. 5 - phyllus. Caps. 3 - locularis.*

## MONOGYNIA.

## GENUS I. MELOTHRIA.

Character Genericus. *Cal.* 5 - fidus. *Cor.* campanulata, 1-petala. *Bacca* 3-locularis, polysperma. Lin. sy. pl. G. 55.

† Sp. I. MELOTHRIA INDICA. a Cung Kang deai tlai.

Differentia specifica. *Melot. foliis triangularibus, integris.*

Habitus, & notæ. *Caulis* annuus, angulatus, tenuis, longus, ramosus, scandens cırhis oppositifoliis. *Folia triangularia, integra, denticulata, aspera, parva, alterna, petiolis longis.* *Flos* albus, lateral, subsolitaribus, pedunculatus: *Calyx* 5-dentato, supero: *corolla* campanulatā, 5-partitā. *Bacca* ovato-oblonga, lavis, minima, albo-viridis, 3-locularis, polysperma.

*Cucumis Murinus Viridis.* Rumph. Amb. I. 9. cap. 73. tab. 171. f. 2.

Habitat in Cochinchinā implicata inter sepes.

Observ. Melothria Pendula Linnæi (quæ Americana) procul dubio est diversa species, quæ ab ipso (Cliff. pag. 490.) dicitur habere folia cordata, 5-loba. Ego libentius utramque speciem Cumeri adscribereim; nam flores hermaphroditæ Melothriæ non videntur præbere argumentum sufficiens ad distinguendum genus, maximè cum flores masculi in hac etiam inveniantur, & invenientur fortasse fæminei, si diligentius querantur. Odor pariter, sapor, & color Melothriæ Indicæ cum cucumere sativo convenit. De Antheris coalitis, vel liberis non bene menini.

## † GENUS II. AXIA.

## Descriptio Naturalis.

*Cal.* Perianthium 3-phylum: foliolis acutis, brevibus, inæqualibus, deciduis.

*Cor.* Monopetala, campanulata, æqualis, minima: limbo 10-fido, plano: laciniis rotundatis, brevibus.

*Stam.* Filamenta 3, filiformia, corollæ æqualia. Antheræ didymæ, lobis globosif.

*Pist.* Gemen inferum, ovatum, sulcatum. Stylus filiformis, æqualis staminibus. Stigma crassiusculum.

*Peric.* Nullum.

*Sem.* Unum, ovatum, sulcatum, hirsutum.

*Nom.* (Αξιος dignus) Axiam vocavi, quia ratione virtutis a me

dicis Cochinchinensisibus magni habetur, quasi æmula pretiosi pharmaci Sinensis *Gin-Sēn*.

Sp. 1. AXIA COCHINCHINENSIS.  $\alpha$  Nhōn sām Phū yen.

Differ. specif. Ax. *caule* ramosissimo : *foliis* lanceolatis, tomentosis. Habitus. *Frutex* bipedalis *caule* lignoso, multiplici, ramosissimo, nodoso, rubente, ptocumbente. *Radix* sub-fusiformis. *Folia* ovato-lanceolata, sub-crenata, tomentosa, parva, inæqualia, opposita. *Flos* albo-ruber, minusculus, racemis sub-terminalibus

Virtus. Calefaciens, Roborans. Urinam, sudorem, & menses movet. Prodest in febribus intermittentibus, cruditate ventriculi, pulmonum humoribus viscidis, obstructionibus uteri.

Observatio. Frutex iste quem nullibi invēni, præterquam in Cochinchinâ, accedit ad Boerhaaviam semine nudo, sulcato : recedit corollâ, staminibus, & calyce. Quodammodo etiam affinis est Valerianæ.

### GENUS III. GLADIOLOLUS.

Char. Gen. *Cor.* 6-partita, ringens. *Stam.* adscendentia. Lin. sy. pl. G. 63.

Sp. 1. GLADIOLOLUS UNDULATUS.  $\beta$  . . .

Differ. spec. Glad. *foliis* ensiformibus : *petalis* subæqualibus, lanceolatis, undulatis. Lin. sp. 6.

Hab ; & notæ. *Caulis* herbaceus, sesquipedalis. *Folia* ensiformia, glabra, bifariam expansa. *Spica* disticha, terminalis, floribus alternis. *Corolla* alba, luteo maculata, monopetala, tubulosa, limbo sexpartito : laciniis oblongis, obtusiusculis, quarum quatuor undulato-crispatæ : omnes subæquales, reflexæ. *Neclarium* 4-partitum, laciniatum. *Stamina* 3, ponè nectarium ascendentia. *Capcula* infera, 3-locularis, polysperma.

Linn. Mant. pag. 27.

Habitat Cantone Sinarum, in hortis cultus.

### GENUS IV. IXIA.

Char. Gener. *Cor.* 6-petata, patens, æqualis. *Stigmata* 3, erectiusculo-patula. Lin. sy. pl. G. 62.

Sp. 1. IXIA CHINENSIS.  $\alpha$  Ré quât: Xa cǎn.  $\beta$  Xě cǎn.

Differ. spec. Ix. *foliis* ensiformibus : *paniculâ* dichotoma : *floribus* pendunculatis. Lin. sp. 6.

Hab ; & notæ. *Caulis* perennis, 3-pedalis, inferius anceps, ad apicem

cem teres. *Radix* bulbis testetibus, ramosis, croceis, radiculis longis. *Folia* equitantia, lanceolato-lincaria, striata, glabra. *Flos* magnus, terminalis, aureus, rubro punctatus: paniculâ erectâ, pauciflorâ. *Cal.* communis spathæ acutæ, imbricatæ, proprius nullus. *Corollæ* petala 6, ovato-oblonga, æqualia, patentia. *Filamenta* 3, subulata, versus basim plana, corollâ breviora: *antheris* linearibus, stantibus. *Stylus* turbinato-linearis, æqualis staminibus, profunde 3-fidus: laciniis planis, erectis. *Stigmata* 3, villosa, 3-fida. *Capsula* 3-gona, 3-locularis, 3-valvis, infera, polysperma.

Habitat culta, in cultaque in Cochinchinâ, & Chinâ.

Burm. Ind. p. 16. Balemcanda. Rheed. Malab. 11. p. 73. t. 37.

Observ. Cl. Thunb. (Japon. p. 34.) hanc plantam Moræam esse judicat: mihi magis placeret Ixiam, & Moræam in unum Genus jungi, quia vix differunt.

Virtus. Radicis. Aperiens, resolvens. Sanguinem, & humores crassos solvit, præcipue in tumore faucium.

### GENUS V. PHANERA.

#### Descriptio Naturalis.

*Cal.* Perianthium 4-phylum: foliolis acutis, longis, patentibus, inæqualibus: duobus oppositis planis, lunatis.

*Cor.* Petula 5, ovata, patentia, inæqualia, calyci inserta: unguibus longis, basi appendiculatis, superius utrinque alatis.

*Stam.* Filamenta 3, æqualia, filiformia, deorsum declinata, corollâ longiora. Antheræ nutantes, oblongæ.

*Pist.* Germen superum, oblongum, compressum, pedunculatum: stylus filiformis, brevior staminibus. Stigma obtusum.

*Peric.* Legumen planum, glabrum, polyspermum.

*Sem.* Orbiculata, pauca.

*Nom.* (Φανέρος manifestus) a corolla, & calyce patentissimis.

Char. Gener. *Cor.* 5-petala. *Cal.* 4-phyllo. Legumen.

Sp. 1. PHANERA COCCINEA. a Ré quach.

Differ. spec. Phan. *Caule* scandente: *foliis* cordatis, 2-fidis, 9-nerviis.

Hab., & notæ. *Frutex* magnus: *caule* crasso, compresso, inæquali: *ramis* multis, longissimis, scandentibus, cirrhosis. *Folia* cordata, acuta, 2-fida, 9-nervia, sparsa, petiolata, a tergo nitite rufa.

*Flos* coccineus, pulcher: *pedunculis* longis: *racemis* magnis, terminalibus, pendulis.

Habitat in Sylvis Cochinchinæ, ad verticem magnarum arborum pertingens. Folium linguae Rumph. Amb. I. 7. cap. I. tab. I. Observ. Lin. sy. vegetab. pag. 326, & sy. pl. par. 2. pag. 245. adjudicavit hanc plantam generi Bauhiniae, nomine Bauhiniae scandentis. Sp. I., ratione (puto) corollæ, & leguminis, quæ utrisque communia sunt. Ast in nostrâ stamina constanter sunt terna: prout ante me bene notaverat Rumphius, & calyx 4-phyllus, non 5-fidus, ut in Bauhiniae. Cumque classis Triandria nullam connexiōnem habeat cum Decandriâ, Bauhiniae propriâ, sicut ista observatur habere cum Pentandriâ, vel Dioeciâ, &c. existimo Phaneram Cochinchinensem, quæ ab Amboinensi Rumphinâ non discrepat, diverso generi adscribendam. Vouapa Bifolia (Aublet. Guyan. p. 25. t. 7.) staminibus 3, fructu leguminoso, calyce 4-fido, corollâ expansâ, tinguiculatâ, quamvis 1-petalâ, & foliis 2-natis Phaneræ approximatur, & quidem in eâdem classe: similiter Outéa Guyanensis ejusdem, (pag. 28. t. 9.) staminibus 3, corollâ 5-petala, inæquali, patente, calyce 5-fido, & quantum ex germine concipi potest legumine pedunculato. Præterea Bauhinia Outimouta Aublet. pag. 375. t. 144. (cujus ille florem non vidit) sicut modo habetur habitu, & fructu Phaneræ similior, sic maiori jure congener cœbitur, quando stamina numerentur, quæ spero invenienda Triandra. Scio multos timere ne, genera multiplicando, memoria studentium gravetur: ego autem magis timeo ne nimium coarctando confundantur: ambiguique, imo erronei fiant charactères tam Generum, quam Classem, per quod scientia Botanica evertetur. Est modus in rebus.

## GENUS VI. COMMELINA.

Char. Gener. Cor. 6-petala. *Nectararia* 3, cruciata, filamentis propriis inserta. Lin. sy. pl. G. 68.

\* *Dipetalæ, ob duo petala maiora.*

Sp. I. COMMELINA COMMUNIS. a Rau tlai än.

Differ. sp̄c. Com. corollis inæqualibus: foliis ovato-lanceolatis, acutis: caule repente, glabro. Lin. sp. I.

Hab; & notæ. Caulis 1-pedalis, annuus, repens, glaber, ramosus.

Folia ovato-lanceolata, glabra, petiolis amplexicaulibus. Calyx 4-phyllus. Corolla 2-petala, coloris dilutè cœrulei. *Nectararia*, & filamenta 3. Caps. 3-locularis, polysperma. Ephemerum Dipetalum, Japonicum. Kämpf. amoenit. tab. 889. Usus:

Usus : in Cochinchinâ edulis tam cocta , quam cruda.

Virtus Medica. Refrigerans , Humectans , alvum laxans. Internè juvat in adstrictione alvi , stranguriâ , caloribus internis. Externè ophthalmia medetur , tumores , & dolores lenit.

Sp. 2. COMMELINA AFRICANA γ . . .

Differ. spec. Com. *corollis* inæqualibus : *foliis lanceolatis* , *glabris* : *caule* decumbente. Lin. sp. 2.

Hab ; & notæ. *Caulis* ramosus , procumbens , repens : radice perenni. *Folia* lanceolata , glabra , alterna , petiolata , vaginis ciliatis. *Flos* terminalis , polynatus : *corollis* dipetalis : *nectariis* 3 , *pedunculis* , luteis , non cruciatis , sed apice sinuato-incisis.

Habitat in orâ orientali Africæ. Mil. Dict. n. 3.

Sp. 3. COMMELINA BENGHALENSIS. *α Rau tlaï loung*

Differ. spec. Com. *corollis* inæqualibus : *foliis ovatis* , *obtusis* : *caule* repente. Lin. sp. 3.

Hab ; & notæ. *Caulis* 1 - pedalis , ramosus , teres , semierectus , repens : radice perenni. *Folia* ovata , pilosa , integrerrima : *petiolis* amplexicaulibus. *Corolla* dipetalæ , coloris cyanei. *Calyces* 4 - phylli. *Stamina* , & *nectaria* cruciata terna. *Caps.* 3 - locularis.

Habitat spontanea in Cochinchinâ.

Commelina repens , folio subrotundo , obtuso. Burm. Zeyl. pag. 70.

Pluk. tab. 27. fig. 3.

Sp. 4. COMMELINA CUCULLATA. *α Rau tlaï tlau*.

Differ. spec. Com. *corollis* æqualibus ? *foliis ovatis* : *involueris* cucullatis , turbinatis. Lin. sp. 10.

Hab ; & notæ. *Caulis* herbaceus , sesquipedalis , ruber , procumbens , repens. *Folia* ovata , pilosa , 5 - nervia , undulata : *petiolis* amplexicaulibus. *Calyx* 4 - phyllus. *Cor.* inæqualis , 2 - petala , nitide cærulea. *Stamina* , & *nectaria* terna. *Flos* terminalis , involucris turbinatis , truncatis. Nota. Involuta illa cucullata , quamvis hujus speciei propria , etiam videntur in Arundinellâ minori Rumphii ( Amb. I. 10. pag. 23. ) quam ego existimo esse Commelinam Communem. Vera cucullata proculdubio est dipetala , quamvis Linneus de numero incertus eam annumeraverit tripetalis , ductus testimonio Burm. Ind. pag. 18. tab. 7. f. 3. ubi tria petala describit , & pingit nomine Commelinæ Nervosæ , alioquin cucullatæ conformis.

Habitat inculta in hortis Cochinchinæ.

\*\* *Tripetalæ*, ob 3 petala æqualia.

Sp. 5. COMMELINA TUBEROSA. & Cu eō rai.

Differ. spec. Com. *corollis* æqualibus : *foliis* sessilibus, ovato-lanceo-latis, subciliatis. Lin. sp. 6.

Hab ; & notæ. *Planta* acaulis : *radice* perenni, tuberibus multis, teretibus, obtusis, fuscis, sparsis. *Folia* congesta, lanceolata, ciliata, crassa, incurva, sessilia. *Scapus* tenuis, nudus, erectus 4-pollicaris : *floribus* terminalibus, alternè spicatis. *Cal.* 3 - phyllus *Cor.* 3-petala, coloris nitidè cærulei. *Stamina*, & *nectaria* 3. *Caps.* 3-locularis, polysperma. Est hujus varietas, flore Violaceo.

Frosk. Flora Arab. cent. I, pag. 12., ubi a nostrâ differt caule repente, cum nostra sit acaulis.

Habitat ubique in Cochinchinâ, in locis humidis.

Usus. *Tubera* sunt edulia, & sapida.

† Sp. 6. COMMELINA MEDICA. & Mě mūen tūm. & Cu eō chum : mach

Differ. spec. Com. *floribus* æqualibus : *foliis* sessilibus, subulatis, glabris.

Hab ; & notæ. *Planta* acaulis, repens : tuberibus plurimis, fasciculatis, parvis, albis, utrinque acuminatis. *Folia* radicalia, sessilia, congesta, subulata, glabra, crassa, reflexa. *Scapus* 6 - pollicaris, tenuis, teres, sub-nudus : *spicâ* sèpius simplici, aliquando ramosa, erectâ : *floribus* cyaneis. *Calyx* 3 - phyllus : foliolis lanceolatis, pilosis, erecto-patentibus, persistentibus. *Cor.* petala 3, æqualia, subrotunda, erecta, calyce sub-breviora. *Nectaria* cruciata 4, pedunculata, villosa. *Filamenta* 2, villosa, flexuosa : *autheris* sagittatis, incumbentibus. *Germen* 3 - gono-ovatum, superum. *Stylus* subulatus, æqualis staminibus : *Stigmæ* crassiusculo. *Capsula* trigono-ovata, 3 - valvis, 1 - locularis, polysperma, apice dehiscens : *feminibus* multis, minusculis, rotundis. *Tuberum* sapor sub-dulcis, odor gratus.

Habitat in Chinâ, & Cochinchinâ.

Virtus. *Tuberum*. Refrigerans, Demulcens, Pulmonica, Hepatica. Prodest in tussi, asthmate, pleuritide, stranguriâ, dysuriâ, catharro salfo. Habetur in frequenti usu Medico apud utramque nationem.

Sp. 7. COMMELINA ZANONIA ? & Rau rio.

Differ. spec. Com. *corollis* æqualibus : *pedunculis* incrassatis : *foliis* lanceolatis : *vaginis* margine hirsutis : *bracteis* geminis. Lin. sp. 7.

Hab ;

Hab; & notæ. *Planta* succosa, ramosissima: *caule* annuo; repente. *Folia* lanceolata, radicalia linearia, carinata, glabra: margine, & viginis ciliatis. *Flos* terminalis, cœruleus, pedunculo communi longo: *bracteis* geminis, 1-floris, acutis, in spicam secundam, curvatum lateraliter imbricatis, galli cristam repræsentantibus. *Cal.* 3-phyllo. *Cor.* 3-petala, æqualis. *Stamina* 2, villosa. *Nectaria* cruciata 3. *Capcula* polysperma.

Commelina Cristata Burm. Ind. pag. 18. t. 7. f. 4. Ephemerum Zeylanicum, procumbens, cristatum. Burm. Zeyl. p. 94.

### GENUS VII. SCHOENUS.

Ghar. Gener. *Glumæ* paleaceæ, univalves, congestæ. *Cor.* 0. *Semen* 1, subrotundum inter glumas. Lin. sy. pl. G. 71.

Sp. 1. SCHOENUS COLORATUS.  $\alpha$  Co dœu dœu.

Differ. spec. Sch. *Culmo* triquetro: *capitulo* subrotundo: *involucro* longissimo, plano, variegato: *floribus* imbricatis. Lin. sp. 10.

Hab; & notæ. *Herba* annua, culmo pedali, triquetro, sub-nudo: *foliis* radicalibus subulatis, culmo brevioribus. *Capitulum* ovatum, solitarium, album, sessile: *squamis* imbricatis, 1-floris, 1-spermis: *involucro* 3-phyllo, longissimo, horizontaliter stellato. Habitat ubique in hortis, viis, & agris Cochinchinæ.

Grainen Capitatum Rumph. Amb. I. 10. c. 4. t. 3. f. 2. Burm. Ind. pag. 18. Videtur esse diversum a Kyllingâ, valvis instructâ. Lin. Jun. Suppl. p. 11, & 104.

+ Sp. 2. SCHOENUS RUBER.  $\alpha$  Co' duoi luon.

Differ spec. Sch. *Culmo* tereti, nudo: *capitulo* subrotundo, imbricato: *involucro* 1-phyllo.

Hab; & notæ. *Culmus* 2-pedalis, teres, erectus: *foliis* gramineis; radicalibus. *Capitulum* subrotundum, rubrum, compactum, imbricatum, *squamis* 1-floris: *involucro* 1-phyllo, brevi, lanuginoso.

Habitat spontaneus in Cochinchinâ: sicut etiam præcedens species.

### GENUS VIII. CYPERUS.

Char. Gener. *Glumæ* paleaceæ, distichè imbricatæ. *Corolla* 0. *Semen* 1, nudum. Lin. sy. pl. G. 72.

Sp. 1. CYPERUS ARTICULATUS.  $\alpha$  Co . . .

Differ spec. Cyp. *culmo* tereti, nudo, articulato. Lin. sp. 1.

F

Hab;

Hab; & notæ. *Culmus* 2-pedalis, teres, erectus, foliosus, articulatus. *Folia* lanceolato-linearia. *Spica* composita, disticha: spiculis lateralibus, alternis, patentibus. Habitat in locis humidis Cochinchinæ.

Sloan. Jam. 36. pag. 121. tab. 81.

Sp. 2. CYPERUS MONTI. α Cây lác tlòn.

Differ. spec. *culmo* tereti: *umbellā* supra decomposita: *foliis* carinâ lævibus. Lin. Jun. Suppl. pag. 102.

Hab; & notæ. *Culmus* 3-pedalis, sub-teres, erectus, semifoliosus. *Folia* longissima, inæqualia, glabra, margine aspera. *Umbella* foliosa, supra decomposita: pedunculis nudis: spiculis patulis, lanceolato-linearibus. Habitat in Cochinchinæ.

Monti. Prodr. Gram. t. 1. f. 2.

Sp. 3. CYPERUS ROTUNDUS. α Co cú: Huog phu. β Hiàm phú cù.

Differ. spec. Cyp. *Culmo* triquetro, sub-nudo: *umbellā* decomposita: *spicis* alternis linearibus. Lin. sp. 8.

Hab; & notæ. *Culmus* 1-pedalis, triquetrus, sæpe nudus, aliquando foliolis parvis, sparsis. *Folia* radicalia congesta, subulata, reflexa, glabra, culmo breviora. *Umbella* decomposita, simpliciter foliosa: *spiculis* lanceolato-linearibus: *pedicellis* distichè imbricatis. *Radix* tuberibus ovatis, parvis, multis, sparsis, odoratis, exteriorius fuscis, pilosis, interius rubescens, friabilibus.

Habitat ubique in Cochinchinæ, & Chinæ.

*Cyperus Indicus* Bont. Jav. p. 134. *Gramen Cyperinum Zeylanicum*, radice ruberosa. Burm. Zeyl. pag. 107.

Observ. *Cyperus Rotundus Indicus* vix differt ab *Odorato Americano*, nisi formâ radicis.

Virt. *Tuberum*: Diuretica, Emmenagogue, Vulneraria. Valet in hydrope, affectibus frigidis uteri, & nervorum. Adstrictionem ventris solvit. Ad nigridinem tosta, tritaque, cum vino pota fluorem album cohibent, & ulceræ uteri detergunt.

Sp. 4. CYPERUS ELATUS. α Lác lâm chíeo.

Differ. spec. Cyp. *culmo* triquetro nudo: *umbellā* foliosa, supra decomposita: *spicis* digitalibus imbricatis, spiculis subulatis. Lin. sp. 12.

Hab; & notæ. *Planta* palustris: culmo 5-pedali, acute triquetro, nudo, lævissimo, elato. *Folia* radicalia, subulata, lævia. *Umbella* foliosa, supra decomposita: *spicis* longis, subteretibus, imbricatis, spiculis subulatis.

*Gramen Cyperinum maximum*, Mahakiri dictum. Burm. Zeyl. p. 108. Gra-