

Gramen Cyperoides maius, spicis ex oblongo rotundis, compactis, ferrugineis. Sloan. Jam. pag. 36.  
Ufus. Ex culmis hujus in tænias longas, & strictas sectis, solisque calore convolutis fiunt a Cochinchinensisibus storeæ amplæ, & terfissimæ, quibus ad cubandum utuntur, rejectis aliis stragulis, in calido climate minus commodis.

Sp. 5. CYPERUS COMPRESSUS.  $\alpha$  Co' cù lèp.  
Differ. spec. Cyp. culmo triquetro, nudo: umbellâ universali triphylla: glumis mucronatis, lateribus membranaceis. Lin. sp. 17.  
Hab; & notæ. Culmus triquetrus, nudus, 1 - pedalis. Umbella universalis sub-triphylla, inæqualis: glumis margine membranaceis, acuminatis: spiculis ovato-oblongis, compressis. Stylus longissimus, 2 - fidus.  
Burm. Ind. pag. 21.

Sp. 6. CYPERUS PUMILUS.  $\alpha$  Co' cù chít.  
Differ. spec. Cyp. culmo triquetro nudo: umbellâ diphyllâ composta, spiculis alterno-digitatis, lanceolatis: glumis mucronatis. Lin. sp. 20.  
Hab; & notæ. Culmus minimus, 2 - pollicaris, triquetrus, nudus: foliis radicalibus, minusculis. Umbella 2 - phylla: spiculis subulatis: glumis mucronatis, apice reflexis.  
Pluk. Amag. 179. tab. 191. fig. 8. Burm. Ind. pag. 21.  
Omnes supradictæ, species habitant spontaneæ in Cochinchinâ.

## GENUS IX. SCIRPUS.

Char. Gener. Glumæ paleaceæ, undique imbricatæ. Cor. o. Sem. 1, imberbe. Lin. G. 73.

Sp. 1. SCIRPUS SUPINUS.  $\alpha$  Cây năn tháp.  
Differ. spec. Scir. culmo tereti, nudo: spicis sessilibus in medio culmo glomeratis. Lin. sy. pl. sp. 15.  
Hab; & notæ. Culmus 1½ - pedalis, teres, nudus, striatus, polynatus. Folia subulata, brevia. Flos spicis ovatis, 3 - 4 - natis, lateralibus, per medium culmum erumpantibus. Semen 1, turbinatum compressum, breve, villis asperis, calyce brevioribus cinctum.  
Scirpus supinus, capitulis congregatis. Tournef. Inst. pag. 528.

Sp. 2. SCIRPUS MILIACEUS.  $\alpha$  Co' Rát.  
Differ. spec. Scir. culmo triquetro nudo: umbellâ supra decompositâ: spicis intermediis sessilibus: involucro setaceo. Lin. sp. 25.

Hab; & notæ. *Culmus* 8 - pollicaris, cæspitosus, multiplex, nudus, triquetrus, sæpe 4 - gonus, foliis brevior. *Folia* subulata, trigonocurva, imbricata, sub-equitantia. *Umbella* foliosa, supra decomposita, diffusa: *spiculis* ovatis, undique imbricatis. *Sem.* 1., nudum. *Burm. Ind. pag. 22. tab. 9. fig. 2.*

† Sp. 3. SCIRPUS CAPSULARIS. β *Telm sin tsao.* α *Telm boc:* Dang tám.  
Differ. spec. *Scir. culmo* tereti, nudo: *paniculā* coarctatā, laterali: fructu capsulari.

Hab; & notæ. *Planta* palustris, *culmo* 4 - pedali, tereti, mucronato, nudo, cæspitoso: *foliis* radicalibus, paucis, brevibus, arcte convolutis. *Panicula* sub-coarctata, lateralis. *Flos* glumis paleaceis, undique imbricatis: quæ tamen, nec ineptè, dividi possunt in calycem, & corollam. Scilicet: *Cal.* 4 - phyllus, foliolis brevibus, acutis, æqualibus. *Cor.* 6 - petala, glumis lanceolatis, incurvis, patentibus, calyce longioribus. *Filamenta* 3, setacea, erecta, Corolla subæqualia: *antheris* simplicibus. *Germen* 3 - gonum, oblongum, superuin. *Stylus* sub-nullus. *Stigmata* 3, oblonga, villosa. *Capsula* 3 - loba, 3 - valvis, polysperma: *seminibus* paucis, subrotundis.

Habitat frequenter in Chinâ: invenitur etiam in Cochinchinâ.

Observ. Aquaticum hoc Vegetabile staminibus appropinquat scirpo, fructificatione Junco, habitu utriusque, calyce, & corollâ neutri. Placuit annumerare scirpo, cuius aliæ species in Indiâ accurrunt: at numerosissima Junci familia ab Indis raro agnoscitur.

Virtus. Culmi excorticati decoctum Diureticum est, & Refrigerans: soletque utiliter ministrari in accessu caloris febrilis.

In usu æconomico præbet candelis, & lucernis ellychnium æqualiter porosum, & aptum ad fugendum oleum, lucemque purissimam diffundendam.

*Juncus Indicus* porosus Clusii (Cur. poster. pag. 64.) pro nostro scirpo habendus.

### GENUS X. NARDUS.

Char. Gener. *Calyx* o. *Corolla* 2 - valvis. Lin. sy. pl. G. 75.

Sp. 1. NARDUS INDICA. β Cám sūm hiàm. α Cam tung hương.

Differ. spec. Nar. *spiculæ* setacea, secundâ, subincurvatâ. Lin. Jun. suppl. pl. pag. 105.

Hab; & notæ. *Radix* perennis, repens. *Culmi* (vulgo spicæ) 2 - pollicares, erecti, foliosi, ad apicem attenuati, incurvati, fetis multis, longis, rubro-fuscis circumsepti. *Folia* lanceolata, integriflora,

rima, glabra, alterna, sessilia, erecta, apice sub-reflexa, culmum superantia. Florentem non vidi.

Habitat in montibus Occidentalibus imperii Sinensis.

Observ. Existimo veram esse Nardum Indicam Antiquorum, eandemque officinarum, ob convenientiam formæ, virtutis, saporis, & fragrantis odoris, quam in illâ saepe probavi: quæque illi tribuit Dioscoridis l. 1. cap. 6. Nec longè discrepat Plinius l. 12. cap. 12. Et experientiâ confirmant Garcias Arom. l. 1. c. 33. Matthiolus, & Casp. Rauh. in Diosc. l. 1. c. 6. p. 30 - 32. Bont. Jav. pag. 45. Potmet Dict. des drog. pag. 213. tom. 1. Quamvis icones Nardi Indicæ, quas iste, & Matthiolus exhibent, a nostris observatis differant nimiâ crassistie, & foliis, ut videntur, ad radicem congestis. Miror, quod a Celeb. Lin. Mat. Med. pag. 219. n. 513. pro spicâ Nardi Officinali habeatur Andropogon Nardus: hocque ab eodem æstimetur esse (sy. pl. v. 4. p. 304.) Calatum Odoratum Matthioli, & Arundinem Farctam Rumphii. Cum ille in suis com. in Dioscor. l. 1. c. 17. p. 58. apertè dicat: Calatum Odoratum genere, & formâ Arundinem præ se ferre: cumque antea cap. 6, ejusdem libri spicam Nardi diversam omnino descripsisset. Rumphius (Amb. l. 6. c. 9. tab. 6.) Arundinem Farctam describit 10, vel 12 pedes longam, nec de ejus virtute, aut odore recordatur accuratus Author. Unde satis liquet nec Calatum Odoratum Matthioli, nec Arundinem Farctam Rumphii veram esse Nardum Indicam officinarum: quantumvis verum Andropogon sint, cuius paniculæ potius Saccharum referunt, quam Nardum.

Virtus totius plantæ: Cardiaca, Stomachica, Diuretica: Bontio etiam Deobstruens, & Alexiteria. Idem asserit eâ condiri cibos in Javâ, sicut coniduntur ibi Calamo Aromatico, & Junco Odorato, quos perindè a Nardo diversos cognoscit. In Chinâ, & Cochinchinâ, præter usum Medicum, frequenter miscetur Nardus aliis aromatibus adformandos pastillos, & facculos odoriferos.

## D I G Y N I A.

### G E N U S XI. B O B A R T I A.

Charact. Gener. *Cal.* imbricatus. *Corolla* gluma 2-valvis, supera. Lin. sy. pl. G. 77.

Sp. 1. BOBARTIA INDICA. a Co. gä.

Differ. spec. Bob. *spicis* capitatis: *involucro* folioso. Lin. sp. 1.

Hab; & notæ. Gramen annuum: culmo 6-polliari, tereti, sub-erecto, parum folioso. *Folia* ad radicem cogesta, multa, canalicula-

ta,

ta, patentia. *Capitulum terminale*, grandiusculum, glomeratum, formatum exflosculis, calycibus imbricatis paleis multis, longis, acutis, convolutis, 1-floris: *semine* 1-oblongo.  
Gramen Cyperoides Maderas patanum. Plukn. tab. 300. f. 7. Burm. Ind. pag. 23.

## GENUS XII. PANICUM.

Charact. Gener. *Cor.* 3-valvis: *alvuld* tertiatim minimâ. Lin. sy. pl. G. 82.

Sp. 1. PANICUM POLYSTACHION.  $\alpha$  Co sâu rom.

Differ. spec. Pan. *spicis* teretibus: *involucellis* unifloris fasciculato-setosis: *culmis* erectis superne ramosis. Lin. sp. 1.

Hab; & notæ. *Culmus* annus, 2-pedalis, erectus, tenuis, teres, geniculatus, polynatus, ramosus? non satis memini: icon Rumphiana simplicissimum exhibit. *Folia* subulato-linearia, longa, erecta, radicalia congesta, caulina sparsa, brevia, sub-pilosa. *Spica* cylindrica, erecta, simplex: *involucris* 1-floris, hirtis setis fasciculatis, multis, longis.

Gramen Caricosum, Vulpinum. Rumph. Amb. l. 10. c. 13. p. 18. tab. 7. fig. 2. B.

Sp. 2. PANICUM ITALICUM.  $\alpha$  Cây Khê.  $\beta$  sào mè: Sö.

Differ. spec. Pan. *spicâ* compositâ, *spiculis* glomeratis, setis immixtis: *pedunculis* hirsutis. Lin. sp. 5.

Hab; & notæ. *Culmus* annuus, sesquipedalis, teres, crassiusculus, erectus, simplicissimus. *Folia* caulina, alterna, lanceolato-linearia, plana, striata, reflexa. *Spica* unica, magna, reclinata, composita *spiculis* glomeratis, ovatis, setis densis immixtis, flosculo longioribus. *Semen* flavum, sub-globosum.

Panicum Botton. Rumph. Amb. l. 8. c. 32. tab. 75. f. 2.

Uſus: esculentus.

Sp. 3. PANICUM CRUS CORVI.  $\alpha$  Co dô dót.

Differ. spec. Pan. *spicis* alternis, secundis, *spiculis* subdivisis: *glumis* sub-aristatis, hispidis, rachi trigonâ. Lin. sp. 6.

Hab; & notæ. *Culmus* annus, 2-pedalis, suberectus, multiplex, geniculatus, foliosus. *Folia* graminea, sub-erecta. *Spicæ* plerumque alternæ, aliquando conjugatae: *spiculis* oblongis, distichis, patentibus: *glumis* aristatis, hispidis: *flosculis* omnibus hermaphroditis. *Rachi* saepius 4-gona.

Observ. Hæc herba quasi media inter Crus Corvi, & Crus Galli, ab ambabus adhuc differens est.

Pani-

Panicum Corvi. Thunb. Jap. p. 46.

Sp. 4. PANICUM HIRTELLUM.  $\alpha$  Co Khé.

Differ. spec. Pan. spicâ compositâ : spiculis alternis, adpressis : calycibus geminis : valvulis omnibus aristatis, extimâ longissimâ. Lin. sp. 11.

Hab ; & notæ. Gramen annum, culmo 2 - pedali, suberecto, tereti, lœvi. Folia sabulato-lanceolata, brevia, glabra, undulata : vaginis longis. Spicae rubrofuscæ, breves, terminales, compositæ : spiculis secundis, adpressis, alternis. Valvulae omnes aristatæ : exterior longior.

Burm. Ind. pag. 24. tab. 12. fig. 1. Thunb. Jap. p. 46.

Sp. 5. PANICUM MILIACCUM.  $\alpha$  . . .

Differ. spec. Pan. paniculâ laxâ, flaccidâ : foliorum vaginis hirtis : glumis mucronatis, nervosis. Lin. sp. 23.

Hab ; & notæ. Culmus annuus, 3 - pedalis, erectus, crassus, sub-compreffus, sub-flexuosus, fistulatus, nodosus, ramosus. Folia subulata, maiuscula, pilosa, plana, reflexa : vaginis hirtis, longis. Paniculæ terminales, sparsæ, magnæ. Cal. 3 - valvis, glumis nervosis, acutis, exteriore duplo minore. Corolla 3 - valvis : glumis membranaceis, subacutis, exteriore triplo minore, apice 2 - fidâ. Styli 2, capillares : stigmatibus ovatis, plumosis, coloratis. Semen sub-ovatum, compressiusculum pallidum, nitidum. Datur varietas semine fusco-rubro.

Habitat Pekini, & aliis locis Sinarum.

Hort. Cliff. pag. 27. Burm. Ind. pag. 26.

Uſus cibarius.

Sp. 6. PANICUM LATIFOLIUM.  $\alpha$  . . .

Differ. spec. Pan. paniculâ, racemis lateralibus simplicibus : foliis ovato-lanceolatis, collo pilosis. Linn. sp. 26.

Hab ; & notæ. Culmus annuus, crassus, 5 - pedalis. Folia lanceolata, magna, plicato-sulcata, collo amplexicauli villoso. Flosculi mutici : paniculâ sub-coarctatâ, ramis lateralibus sub-simplicibus : semine pallido.

Omnes istæ species habitat. in Cochinchinâ, præter quintam, quæ Sinenſis est.

## GENUS XIII. ALOPECURUS.

Char. Gener. *Calyx* 2 - valvis. *Corolla* 1 - valvis. Lin. sy. pl. G. 84.

Sp. 1. ALOPECURS HORDEIFORMIS.  $\alpha \dots$

Differ. spec. Alop. *racemo* simplici : *flosculis* aristis circumvallatis.  
Lin. sp. 6.

Hab ; & notæ. *Culmus* annuus , sesquipedalis , simplicissimus , foliosus , sub-erectus , gracilis , teres. *Folia* lanceolata , plana , striata. *Spica* terminalis , oblonga , ramosa , aristata. *Flosculi* pedicellis simplicibus , longiusculis. *Calyx* 2 - valvis , æqualis , 1 - floris. *Corolla* 1 - velvis , calyce longior.

Habitat spontaneus in Cochinchinâ. Pluk. Almag. 177. t. 119. f. 1.

## GENUS XIV. PHLEUM.

Char. Gener. *Cal.* 2 - valvis , sessilis , linearis , truncatus , apice bicuspidato. *Cor.* inclusa. Linn. sy. pl. G. 83.

$\dagger$  Sp. 1. PHLEUM COCHINCHINENSE.  $\alpha$  C<sup>o</sup> choung.

Differ. spec. Phl. *spicâ* secundâ , linearis , glabra.

Hab ; & notæ. *Gramen* 2 $\frac{1}{2}$  - pedale : *culmo* teriti , gracili , sub-erecto. *Folia* subulata , longa. *Spica* secunda , simplex , linearis , longissima , glabra , erecta : *receptaculo* communi ad unum latus articulate excavato , arctè includente singulos flosculos , quin prominent. *Calyx* 2 - valvis , 1 - floris , truncatus , cuspidatus. Habitat spontaneum in Cochinchinâ.

$\ddagger$  Sp. 2. PHLEUM AFRICANUM.  $\gamma$  Muxoeira.

Differ. spec. Phl. *spicâ* cylindrica , flosculis undique coarctatâ : pedunculis 3 - floris , pilosis.

Hab ; & notæ. *Culmus* annus , 2 - pedalis , erectus , crassus , solidus , simplicissimus. *Folia* subulata , striata , alpera , reflexa , pauca. *Spica* cylindrica , caudata , Typhæ latifoliæ similis , erecta , magna : flosculis undeque affixis , coarctatis. *Pedunculi* 3 - flori , pilis longis , flosculos ad basim colligentibus. *Calyx* 2 - valvis , truncatus , valvis 3 - cuspidatis. *Corolla* 2 - valvis , acuta. *Filamenta* 3 , capillaria , glumis duplo longiora : *antheris* bifurcatis. *Semen* 1. turbinatum , apice rotundum. An Phl. Pratense ? Lin. sp. 1.

Habitat in orâ Orientali Africæ , contra Mozambicum.

Usus. Eo utuntur Æthiopes Orientales ad paranda vulgaria liba , & pulmenta , quibus libenter vescuntur.

GE-

## GENUS XV. PHALARIS.

Char. Gener. *Cal.* 2 - valvis , carinatus , longitudine æqualis , corollam includens. Linn. sy. pl. G. 80.

Sp. 1. PHALARIS ZIZANOIDES. & Cō chuoc māt.  
Differ. spec. Phal. *paniculā* simplicissima : *floribus* muricatis ; altero sessili. Lin. sp. 10.

Hab ; & notæ. *Radix* sibrofa , nec nodosa. *Culmus* 2 - pedalis , erectus , teres , foliosus , simplicissimus , crassus , solidus. *Folia* subulata , vaginantia , margine ciliata , aspera. *Spica* terminalis , oblonga , seu velis , *panicula* simplicissima , coarctata : *valvis* calycinis æqualibus , ambabus carinatis , ciliatis : *corollā* bivalvi , breviori. *Flosculi* duo ad *paniculæ* dentes singulos ( si bene memini ) alter pedicellatus , alter sessilis.

Lin. Mantissa. pag. 183. ex Koenigio. Habitat spontanea in Cochinchinâ.

## GENUS XVI. MILIUM.

Char. Gener. *Cal.* 2 - valvis , uniflorus : *valvulis* subæqualibus. *Cor.* brevissima. *Stigmata* penicilliformia. Lin. sy. pl. Gen. 85.

Sp. 1. MILIUM EFFUSUM. & Cāy cō gāo.

Differ. spec. Mil. *floribus* paniculatis , dispersis , muticis. Lin. sp. 5.  
Hab ; & notæ. *Culmus* 1½ - pedalis , erectus , crassiusculus , glaber , fistulatus , articulatus , geniculis rubris. *Folia* lanceolato-subulata , plana , reflexa. *Panicula* magna , terminalis , diffusa : *flosculis* dispersis , muticis. *Corolla* 2 - valvis , clausa , nitida , valvis æqualibus , calyce brevioribus. Nascitur incultum inter segetes oryzæ montanæ in Cochinchinâ.

Lin. Cliff. pag. 27. Milium Indicum , *paniculā* sparsa , erecta. Tournef. pag. 515.

## GENUS VII. AGROSTIS.

Char. Gener. *Cal.* 2 - valvis , uniflorus , corollâ paulo minor. *Stigmata* longitudinater hispida. Lin. sy. pl. G. 86.

Sp. 1. AGROSTIS INDICA ? & Cō lung.  
Differ. spec. Agr. *paniculā* contractâ muticâ : *racemis* lateralibus erectis , alternis. Lin. sp. 20.

Hab; & notæ. *Culmus* 5-pedalis, simplicissimus, teres, foliosus, solidus, flaccidus, procumbens, articulis radicantibus. *Folia* subulata, pauca. *Panicula terminalis*, coarctata, cylindrica mutiea: *ramulis* alternis, brevibus, erectis. *Calycis valva altera* brevior: ambo acutæ, corollâ breviores. Stigmata hispida.

Burm. Ind. pag. 27. Pluken. Alm. p. 175. t. 191. f. 5.

Observ. Flore convenit omnino cum Agr. Indicâ: culmo accedit ad Stoloniferam Lin. sp. 12. Si placeat, Cochinchinensis vocetur nova species.

Sp. 2. AGROSTIS RADIATA.  $\alpha$  Co pháo lusi.

Differ. spec. Agr. *spicis* sub-quinis, radiatis, basi villosis: valvulis petaloideis, aristatis. Lin. sp. 22.

Hab; & notæ. *Culmus* 6-pedalis, simplicissimus, erectus, teres, solidus, levissimus. *Folia* striata, magna. *Spiculæ terminales*, 4-5, horizontaliter radiatæ, basi pilosæ: *calycibus*, & *corollis* etiam pilosæ, nec aristatis. Habitat spontanea in Cochinchinâ.

Sloan. Jam. 33. hist. 1. p. 111. t. 68. f. 3.

Sp. 3. AGROSTIS CAPILLARIS.  $\alpha$  Co deë.

Differ. spec. Agr. *paniculâ* capillari patente: *calycibus* subulatis, æquilibus, hispidiusculis, coloratis: *flosculis* muticis. Lin. sp. 13.

Hab; & notæ. *Culmus* 4-pedalis, simplex, erectus. *Folia* subulata, longa, triquetro-curva. *Panicula terminalis*, spicata: *spiculis* longis, tenuissimis, *flosculis* 2-natis, *calycibus* 1-floris, *valvis* inæqualibus, fusco-violaceis, hispidis, acutis, muticis.

Scheuch. Gram. 129. Gmel. tub. p. 18. Habitat in Cochinchinâ.

Sp. 4. AROSTIS MINIMA?  $\alpha$  . . .

Differ. sp. Agr. *paniculâ* muticâ, filiformi. Lin. sp. 17.

Hab; & notæ. *Caulis* tenuis, repens: *ramis*, assurgentibus, 4-pollicaribus. *Folia* lanceolata, fasciculata. *Panicula* coarctata, filiformis: *flosculis* solitariis, alternis, muticis. *Calyx* corolla brevior, uterque *valvis* inæqualibus.

Nardus *paniculâ* spicatâ. Dalib. fl. Paris. 155. Habitat in Cochinchinâ.

$\ddagger$  Sp. 5. AGROSTIS ODORATA.  $\alpha$  Cây hoa co.

Differ. spec. Agr. *spicis* secundis, congestis, muticis.

Hab; & notæ. *Culmus* 6-pollicaris, tenuis, erectus, foliosus. *Folia* subulata, brevia, glabra, amplexicaulia. *Flos* *spicis* secundis, adpressis, fasciculatis, terminalibus: *valvis* *calycis* muticis, acutis, 1-floris: *corollinis* *glumis* subæqualibus, *calyce* longioribus.

Ufus.

Uſus. Aſtimatur a Cochinchinensibus, etiam magnatibus, ob præſtantiam, & tenacitatem odoris, quo pretiosas veftes imbuunt. Integro gramine, quod exſiccatum ſuavius ſpirat, cervicalia ſolent farcire.

Habitat prope litora in Cochinchinā.

† Sp. 6. AGROSTIS PLICATA. ♂ Sam ſoūc tsao.

Differ. ſpec. Agr. *foliis plicatis*: *Spica* linearis, muticā.

Hab; & notæ. *Culmus* fesquipedalis, anceps, erectus, foliosus. *Folia* lanceolata, magna, in longitudinem plicato-falcata. *Spica* linearis, adpreſſa, diſticha: *valvis* omnibus acutis, calycinis ſub-brevioribus, nullā arifatā. Calyx 1-florus.

Habitat in suburbīis urbis Cantonienſis Sinarum.

### + GENUS XVIII. STEGOSIA.

#### *Descriptio Naturalis.*

Cal. Gluma 1-flora, 2-valvis: interiore ſubrotundā, concavā, carinatā.

Cor. Gluma 3-valvis, calyce brevior: interiore latiore, breviore.

Stam. Filamenta 3, calice breviora. Antheræ oblongæ.

Pift. Germen ovatum. Styl. 2, basi diſtantes, filamentis æquales. Stigmata longiuscula.

Peric. nullum. Corolla fovens ſemen.

Sem. 1, ſubrotundum, ſubacuminatum.

Nom. ( $\Sigma \tau\epsilon\gamma\sigma$  tectum) ab uſu plantæ apud indigenas ad tegendas domos.

Char. Gener. *Cal.* bivalvis, 1-florus *Cor.* 3-valvis, calyce brevior.

Sp. 1. STEGOSIA COCHINCHINENSIS. ♂ Co tranh.

Differ. ſp. St. *spicis* lateralibus, simplicibus.

Habitus. *Culmus* 5-pedalis, rectus, teres, ſolidus, articulatus: *ramis* paucis, obliquis. *Folia* lanceolato-subulata, carinata, aspera.

*Flos* spicis ſubulatis, simplicibus, ſolitariis, axillaribus: *floſculis* ſingulis ſemi-clauſis intra ſpicæ dentes excavatos. *Culmus* perennis? Nullibi eam vidi præterquam in Cochinchinā, nec apud Autheores invēni.

## GENUS XIX. SACCHARUM.

Caract. Gener. *Cal.* lanugo longa extra calycem. *Cor.* 2 - valvis. Lin. sy. pl. G. 79.

Sp. 1. SACCHRUM SPONTANEUM.  $\alpha$  Cây lách.

Differ. spec. Sac. *floribus* paniculatis : *foliis* convolutis. Lin. sp. 1.  
Hab ; & notæ. *Culmus* perennis, 9 - pedalis, erectus, tenuis, simplex, fistulatus, nodis distantibus. *Folia* subulata, longa, stricta, levia : an lateribus convoluta ? *Panicula* maxima, terminalis, diffusa, spicata : *spicis* capillaribus longissimis : *pilis* calycinis durusculis, rectis, corollæ valvis subæqualibus. *Radix* repit, & latissime multiplicatur, maximè prope flumina.

Kerpa. Rheed. Malab. 12. p. 85. tab. 46.

Habitat circa paludes, & loca humida Cochinchinæ frequenter.

Sp. 2. SACCHARUM OFFICINARUM.  $\alpha$  Miá. Cam giá.  $\beta$  Cán ché.

Differ. specif. Sac. *floribus* paniculatis : *foliis* planis. Lin. sp. 2.

Hab ; & notæ. *Culmus* 10 - pedalis, simplex, teres, solidus, succosus, crassus, articulatus, perennis. *Folia* lanceolato-linearia, plana, aspera, striata, acuminata, amplexicaulia, 4 - pedes longa, 3 pollices lata. *Flos* terminalis, *paniculâ* magnâ, diffusâ, spicatâ : *spiculis* longis, simplicibus : lanugine, seu potius pilis longissimis, flexuosis, tenuissimis, loco calycis (qui nullus est in hac specie) protensis. Hujus inveniuntur 3 varietates in Cochinchinâ, quæ præcipue culmo differunt, non flore.

1. Saccharum Album.  $\alpha$  Miá lau : *culmo* longo, albo, mediocriter crasso, dulcissimo, nodis distantioribus.

2. Saccharum Rubrum.  $\alpha$  Miá mung : *culmo* brivi, crassiore, rubro, succosissimo, nodis approximatis.

3. Saccharum Elephantinum.  $\alpha$  Miá boi : *culmo* crassissimo, rubro, longo, minus dulci, nodis approximatis.

Arundo Saccharifera. Rumph. Amb. I. 8. cap. 26. tab. 74. f. 1. Piso Brasil. pag. 108, 109.

Habitat, & colitur abundantissime in omnibus provinciis regni Cochinchinensis : simul in aliquibus imperii Sinensis, sed minori copiâ.

Uſus. Esculentus, dulcissimus, gratissimus, innocuus. Ex saccharo fermentato destillatur spiritus vini : gustu tamen, & odore inferior illo, qui solet fieri ex oryzâ. Ut autem paretur saccharum optimum (quale est Coehinchinense) sumunt indigenæ culmos annuos primæ varietatis Miá lau ; ex illis machinâ a bubalis tractâ sucum

cum exprimunt, coquunt, depurgant, inspissant, exsiccant. Hoc, ut albescat, reponitur in vasis terreis, conicis, amplis, superque sternitur tenuis lamina luti humescentis: cuius humor paulatim descendens, & sacchaeum penetrans, ex illo trahit particulas impuriores, & coloratas, quas in formâ mellis secum defert per foramen parvum vasis conici deorsum versum, & apertum. Saccharum vero crystallinum, sive Canthum, quod ex Cochinchinâ quot annis a multis navibus exportatur, fit ex ipso saccharo albo in aquâ ad ignem soluto, & in syrupo crassiore cocto. Tunc in loco frigido servatur per noctem, superstratis aliquod virgis tenuibus ex arundine Indicâ sectis, quibus nocturno frigore condensatns liquor ille faccharinus adhæret, & in pulchras Crystallos accrescit.

Virtus: in Medecinâ Saponacea, Edulcorans, Pectoralis, Antiseptica. In Indiâ parcus datur infirmis, quam in Europâ.

† Sp. 3. SACCHARUM JACULATORIUM.  $\alpha$  Cây lau.

Differ. spec. Sac. culmo fistulato, simplici: foliis longissimis, carinatis: panicula spicata, oblonga.

Hab; & notæ. Culmus 10-pedalis, perennis, rectus, teres, fistulatus, simplicissimus, nodis distantibus. Folia subulata, longissima, glabra, carinâ dorsali magnâ. Panicula terminalis, oblonga, spicata: spicis longis: pilis calycinis rectis, tenuissimis, corollâ pruilo longioribus. Cor. 2-valvis, æqualis, mutica.

Habitat agreste in Cochinchinâ.

An Vuba, Arundo sagittaria? Marcg. Brasil. pag. 4.

Uſus. In Cochinchinâ pro jaculis missilibus.

Sp. 4. SACCHARUM SPICATUM.  $\alpha$  Tranh cò.  $\beta$  Mão kẽn.

Differ. spec. floribus spicatis: foliis undulatis. Lin. sp. 4.

Hab; & notæ. Culmus 5-pedalis, teres, tenuis, erectus, simplex, foliosus, fistulatus, nodosus, cespitosus: radice perenni, repente, articulatâ, subdivisâ. Folia radicalia congesta, subulato-linearia, aspera, culmo fere æqualia. Flôs spicâ terminali, solitariâ, simplici, longâ, erectâ, pilosissimâ: pilis calycinis longis, rectis, flosculos superantibus.

Habitat loca montana in Cochinchinâ.

Burm. Indiæ pag. 23. t. 9. f. 3. Gramen Caricosum Lanan Rumph.

Amb. I. 10. c. 13. p. 17. tab. 7. f. 2. A. Bromus Tectorum. Pluk. tab. 299. f. 2. Quæ tamen figura spicis congestis differt a nostris spicâ solitariâ.

Uſus frequentissimus ad tegendas rusticorum domos: in quem finem nullum gramen est præstantius, cum plures in annos duret, quin putrefaciat.

Virtus. Radicis, & spicæ. Diuretica, sub-adstringens, sanguinis fluxus cohibens.

Observatio. Nostra planta est procul dubio eadem Rumphii, ac Burmanni, locis supra citatis: cumque non viderimus folia undulata, quæ exhibent Rheodus (Malab. 12. t. 62.) & Plukuetius (Almag. 177. t. 119. f. 1.) puto hanc varietatem diversitati soli tribuendam, quandiu non constet de aliis notis, quæ species dividere suadeant.

## GENUS XX. AIRA.

Char. Gener. *Cal.* 2. valvis, 2 - florus. *Flosculi* absque interjecto rudimento. Lin. sy. pl. G. 87.

Sp. 1. AIRA ARUNDINACEA.  $\alpha$  Cây Sậy.

Differ. spec. *Aira paniculæ* oblongâ, secundâ, muticâ, imbricatâ: *foliis* planis. Lin. sp. 1.

Hab; & notæ. *Culmus* 8 - pedalis, perennis, sub-teres, fistulatus, articulatus, arundinis similis: radiculis multis, minusculis, in paludibus, & ripis fluminum repentibus. *Folia* subulata, plana, magna, inæqualia cinerea, glabra, semiamplexicaulia. *Panicula* oblonga, secunda, patens: *flosculis* muticis, absque rudimento tertii: *Calycibus* bifloris, saepe 3 - valvibus.

*Canna Palustris*, Cano cano. Rumph. Amb. I. 6. c. 8. tab. 5.

Habitat loca cœnosa Cochinchinæ.

## GENUS XXI. POA.

Char. Gener. *Cal.* 2 - valvis, multiflorus. *Spicula* ovata: *valvulis* margine scariosis. Lin. sy. pl. G. 89.

Pp. 1. POA CHINENSIS.  $\alpha$  Cỏ đuôi phượng.

Differ. spec. *Poa*, *poniculæ* ramis simplicissimus: *floribus* sessilibus: *seminibus* imbricatis: *culmo* erecto. Lin. sp. 14.

Hab; & notæ. *Culmus* annuus, 2 - pedalis, gracilis, teres, sub-erectus, foliosus. *Folia* lanceolata, glabra, amplexicaulia. *Panicula* terminalis, oblonga: ramis simplicissimis, patentibus: *glumis* calycinis 2 - valvibus, muticis, 6 - floris: *flosculis* imbricatis.

Burm. Ind. pag. 27. t. 11. f. 3. Osbeck. H. Ind. Or.

Habitat in agris Cochinchinæ.

## GENUS XXII. ARUNDO.

Char. Gener. *Cal. 2 - valvis. Flosculi congesti, lanâ cincti. Lin. sy.*  
pl. G. 99.

\* *Floribus triandris.*

Sp. 1. ARUNDO DONAX.  $\alpha$  Cây cuoi.

Differ. spec. Ar. *calycibus 5 - floris : paniculâ diffusâ : culmo fruticoso.* Lin. sp. 2.

Hab; & notæ. *Culmus* perennis, 10 - pedalis, simplicissimus, teres, fistulatus, nodis distantibus. *Folia magna, plana, aspera, cinerea, amplexicaulia. Panicula terminalis diffusa : floribus 3 - andris, digynis : Calycibus 3 - floris. Semina oblonga pappo piloso, longo basi cincta.* Habitat loca huwiida in Cochinchinâ.

Matthiol. in Diosc. l. 1. c. 97. f. 1. Forskæl Arab. cent. 1. n. 85.

Sp. 2. ARUNDO EPIGEGOS.  $\alpha$  Cây trai.

Differ. spec. Ar. *Calycibus unifloris : paniculâ erectâ : foliis subtus glabris.* Lin. sp. 4.

Hab; & notæ. *Culmus* perennis, 8 - pedalis, inermis, simplicissimus, fistulatus, nodis distantibus, planiusculis. *Folia, sub-erecta, plana, inferius glabra. Panicula erecta, oblonga, subcoarctata : floribus triandris, digynis, muticis : calycibus unifloris : semine oblongo : papposo.* Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Forskæl. Arab. cent. 1. n. 82.

$\dagger$  Sp. 3. ARUNDO PISCATORIA.  $\alpha$  Cây trúc.

Differ. spec. Ar. *calycibus 1 - floris, spicâ terminali : culmo ramoso : foliis minusculis.*

Hab; & notæ. *Culmus* perennis, 8 - pedalis, inermis, ramosus, subulatus, sub-solidus, nodis approximatis. *Folia lanceolato-linearia, obscuro-viridia, glabra, petiolata, omnium arundinum minima, alterna. Flos spicatus, terminalis : calycibus 1 - floris : staminibus ternis : stylo gemino.* Habitat agrestis, cultaque in Cochinchinâ.

Usus. Culmus ad virgas piscatorias aptissimus; nam cum sit tenax, & apice attenuatus, facile indicat quemlibet motum piscis mordentis hamum. Inde nomen specificum.

$\ddagger$  Sp. 4. ARUNDO DIOICA.  $\alpha$  Cây bac mai.

Differ. spec. Ar. *calycibus 1 - floris : spicis fasciculatis, compositis : spiculis linearibus.*

Hab;

Hab; & notæ. *Culmus* perennis, 8-pedalis, inermis, simplicissimus? nodis distantibus. *Folia* lanceolato-linearia. *Spicæ* terminales, fasciculatæ, compositæ spiculis linearibus, longis: *calicibus* monofloris: *flosculis* dioicis, fœmineis Digynis: masculos non inveni. Habitat in sylvis Cochinchinæ.

\*\* *Floribus hexandris.*

Sp. 5. ARUNDO BAMBU. & Tle vuñ. & Yë chö.

Differ. spec. Ar. *calicibus* multifloris: *spicis* ternis, sessiliis. Lin. sy. pl. sp. 1.

Hab; & notæ. *Culmus* lignosus, inanis, teres, rectus, 40, & amplius pedes longus, simplex, nitidus: *inter-nodis* longitudine, & circumferentiâ pedalibus: *vaginis* crassis, pilosis, asperis, convolutis, deciduis: *ramis* alternis, tenuibus, solidis, spinosis, reclinatis, a basi usque ad verticem nascentibus, qui in summitate permittuntur crescere, inferioribus sœpe amputatis: unde fallitur Rumphius asserens in apice tantum ramos pretendere. *Folia* parva, integerrima, lanceolata, basi subrotunda, striata, aspera, petiolis alternis, teretibus. Internodia tubulata culmi sœpe inveniuntur plena humore aquoso, limpido, qui tamen in India extra Gangem non condensatur in Tabaxir, sicut accidit, quamvis raro, in Malabarîa.

*Flos*: paniculâ diffusâ, spicatâ: *spiculis* oblongis, imbricatis. *Calix* 2-valvis, 1-florus, valvis acutis, convolutis. *Corolla* 2-valvis membranacea, minima, pilis cincta. *Filamenta* 6, brevissima: *antheræ* totidem, oblongæ. *Stigmata* 3, subfessilia, longa, villosa. *Semen* 1, oblongum.

Habitat ubique culta in Cochinchinâ, & Chinâ, Tunkino, & Cambodiâ: eaque passim vallantur horti, & pagi.

Arundo Indica, arborea, maxima, Tabaxir fundens. Burm. Zeyl. pag. 35.

Tabaxir Mambu arbor. Rheed. Malab. l. 1. p. 25. t. 16.

Arundarbor vasaria, Bulu Java. Rumph. Amb. l. 6. c. 4. sine figurâ. Virtus. In arte Medicâ materiam præbent ejus folia, cortex, gemmæ, & radix. Folia refrigerant, emolliunt, resolvunt. Eorum decoctum prodest in febribus, melancholiâ, tussi, dolore gutturis. Cortex tenuis rasus refrigerat, agglutinat, blandè astringit: prodest in caloribus internis, hæmorrhagiâ, fluxu mensium immodico, vomitu, nauſeâ. Radix, & gemmæ resolvunt, attenuant, diuresim, ac diaphoresim promovent, sanguinem purificant: convenient in obstructionibus, difficultate urinæ, doloribus vagis, ac venereis. Ex radicis Bambu recentis, foliorum Tabaci, ac piperis Betele partibus

bus æqualibus per multos dies in oleo maceratis fit unguentum magnæ virtutis ad tumores duros, & scirrhosos resolvendos.

Ufus Arundinis Indicæ præcipuè hujus speciei Bambu est utilissimus, & frequentissimus in notâ Indiâ. Ex ejus culmis fiunt integræ domus pauperum, columnæ, trabes, parietes, tabulata, tecta, adjectis tantummodo straminibus. Fiunt etiam lîntres, pontes, navium mali, cistæ, pocula, caldaria, innumeraque alia utensilia tam domestica, quam ruralia.

Observatio. Cum istius Arundinis, quamvis in Asiâ vulgatissimæ, nullam apud Authores accuratam descriptionem invenerim, fortasse, quia ab illis cum aliis speciebus confunditur, mirum non est a celeb. Linnaeo nobis relictam fuisse definitionem hujus speciei valde impropriam. Ego juxta propria observata in vivis plantis, & loco natâlî habita libenter sequentem substituerem.

† Arundo *floribus hexandris*: *paniculâ diffusa*, spiculis imbricatis: *ramis* culmi spinosis: *calycibus 1-floris*.

† Sp. 6. ARUNDO AGRESTIS. & Tle ri.

Differ. spec. Ar. *floribus hexandris*: *paniculâ spicatâ*, spiculis congestis: *ramis* culmi inferioribus spinosissimis: *calycibus 1-floris*.

Hab; & notæ. *Culmus* lignosus, durissimus, subteres, tortuosus, 30 pedes altus, brachium crassus, nodis prominentibus, internodiis brevibus, intus parum vacuis, sæpe integrè solidis: *ramis* alternis, multis, inferioribus densioribus, arcuatis, subdivisis, intricatis: spinis plurimis, crassis, sparsis, curvis. *Folia* liniari-lanceolata, parva, glabra, striata, sparsa, petiolis longiusculis, tenuibus. *Flos* paniculâ erectâ, terminali, in spiculas congestas, breves desinente. *Cal.* uniflorus. *Corolla* minima, lanata. *Antheræ 6*, longissimæ, sub-sessiles. *Stigmata 2*, stylo unico imposita. *Semen* oblongum.

Habitat agrestis in montibus, locisque desertis, & aridis per totam Cochinchinam: puto, quod etiam in Chinâ.

Arundarbor spinosa. Rumph. Amb. I. 6. c. 6. tab. 3.

Ufus. Hæc Arundo est durissima, & in longum tempus permanet incorrupta, ideoque ad opera rustica magis utilis. Præstat præcipuè ad circumvallandas arces, quæ ejus duritie, & spinarum densitate fiunt hostibus imperviæ, vel saltem molestissimæ.

† Sp. 7. ARUNDO MITIS. & Cay mó ho.

Differ. spec. Ar. *floribus hexantris*: *paniculâ erectâ coarctatâ*, spicis longis, imbricatis: *culmo æqualissimo*, inermi: *calycibus 1-floris*.

Hab; & notæ. *Culmus* lignosus, teres, æqualissimus, 40 circiter pe-

des longus, crus crassus, simplex, inanis, articulatus, nodis distantioribus, vix prominentibus: ramis inermibus, polynatis. *Folia* maiuscula, lanceolata, striata, amplexicaulia. *Panicula* coarctata, erecta, simplex, spiculis longis, imbricatis. *Calyx* uniflorus, bivalvis. *Corolla* brevissima, lanata. *Stamina* 6. *Stilus* 1: *stigmatibus* 3, longis, villosis.

Habitat culta, non frequens, in agris, & sèpibus Cochinchinæ: eaque in tenuissimas tænias sectâ uti eleganter solent ad texendos pilos, cistas, & diversa, ac pulchra vascula.

Arundarbor fera, Bulu swangi. Rumph. Amb. l. 6. cap. 7. t. 4. Cujus icon nostræ magis convenit, quam descriptio.

† Sp. 8. ARUNDO MULTIPLEX.  $\alpha$  Cay hòp.

Differ. spec. Ar. *floribus* hexandris: *spicis* interruptis, spiculis verticillatis: *culmo* diviso: *calycibus* 1-floris

Hab; & notæ. *Culmus* perennis, 12-pedalis, pollicem, crassus, teres, multiplex, inermis, fistulatus, internodiis longissimis. *Folia* lanceolato-linearia, 6 pollices longa, plana, glabra, amplexicaulia, coloris fusco-viridis. *Flos* terminalis, spicis paucis, pedicellatis, erectis, longis, interruptis, compositis: *spiculis* subulatis, sessilibus, imbricatis, circa pedicellum communem verticillatis. *Filamenta* 6, capillaria, longa: *antheris* oblongis. *Stigmata* 3, sessilia, longa, plumosa, reflexa. *Cal.* 1-florus. *Semen* oblongum.

Habitat loca culta in provinciis Borialibus Cochinchinæ, ex eaque plantantur sepes ad divisionem hortorum.

Arundarbor tenuis, Leleba dicta. Rumph. Amb. l. 6. c. 1. tab. 1.

Observatio. Sunt adhuc plures species Arundinis in Cochinchinâ, quarum flores non examinavi; ideoque libenter prætermittam. Trium breviter recordabor, quas indefessus Rumphius in insulis Amboinensis, & Molucanis etiam vidit, & descripsit.

1. Arundo Maxima.  $\alpha$  Tle lang nga. Ista est omnium arundinum maxima longitudine, & crassitudine; spinisque densissimis horrida. Fortasse erit varietas Ar. Bambu, cui multum assimilatur. Habitat præcipue inulta ingentes tractus fluminis Lavii a magno portu Bassac usque ad metropolim Cambodiæ. Rhumph. Amb. l. 6. pag. 12. Arundarbor Maxima.

2. Arundo Fax.  $\alpha$  Tle núa. Culmus mediocris 18 pedes longus,  $1\frac{1}{2}$  pollicem crassus, rectissimus, omnium inanissimus, internodiis longis. Ex illis oleo, & stupâ fartis formantur faces viatoriæ; indeque nomen. Rumph. Amb. l. 6. cap. 2. sine figurâ. Arundarbor cratum.

3. Arundo Tabacaria.  $\alpha$  Oúng thaóng. Culmus tenuis, rectissimus, æqualissimus, sub-solidus, asper, ramosus, internodiis longissimis, duris-

durissimis, tenacissimis, scabris. Ex illis lævigatis fiunt fistulæ tabacariæ pulchræ, & idoneæ, ab indigenis usitatæ. A Rumphio (Amboinæ l. 6. c. 3.) vocatur Arundarbor spiculorum, diciturque flores producere in spicis verticillatis, sicut Leleba, quæ nobis Arundo Multiplex, sp. 8. An hujus varietas?

## GENUS XXIII. TRITICUM. ♂ M̄e. ♂ Luā m̄.

## GENUS XXIV. HORDEUM. ♂ M̄eu. ♂ Mach nha.

Tam Tritici, quam Hordei variæ species, & vulgares quidem nascentur in Chinâ, quarum flores non examinavi. Indiginæ libertius vescuntur oryzâ, quæ in aliquibus provinciis cariori pretio venditur quam triticum. In Cochinchinâ coli non solent. Ego utrumque ibi seminavi, pervenéruntque ad maturitatem, sed absque notabili proventu.

## GENUS XXV. CYNOSURUS.

Char. Gener. Cal. 2 - valvis, multiflorus. Receptaculum proprium unilaterale, foliaceum. Lin. sy. pl. G. 93.

Sp. 1. CYNOSURUS ÆGYPTIUS. ♂ Co chi tlâng.

Differ. spec. Cyn. *spicis* digitatis, quaternis, obtusis, patentissimis, mucronatis: *calycibus* mucronatis: *caule* repente: *foliis* oppositis Lin. sp. 7.

Hab; & notæ. *Culmus* tenuis, longus, repens, pallidus, geniculatus, glaber, tenacissimus: *ramis* multis, brevibus, erectis. *Folia* subulata, opposita. *Flos* terminalis, *spicis* 4-5, patentibus, acutis, unilateribus. *Calycis* valvæ acuminatæ, carinatæ, inæquales. Burm. Ind. pag. 28. Gramen Cruciatum. Bont. Jav. p. 148. Gram. Vaccinum. Rumph. Amb. l. 10. cap. 5. tab. 4. f. 1.

Sp. 2. CYNOSURUS INDICUS. ♂ Co chi tiâ.

Differ. spec. Cyn. *spicis* digitatis linearibus: *culmo* compresso declinato, basi nodoso: *foliis* alternis. Lin. sp. 8.

Hab; & notæ. Culmus tenuis, subcompressus, suberectus, geniculatus, rubescens, aliquando repens, foliosus. Folia multa, parvâ, stricta, alterna. Spicæ terminales, congestæ, lineares, patentes. *Calycis* valvæ acutæ: interior longior, ciliata, lanuginosa.

Gramen Vaccinum foemina. Rumph. Amb. l. 10. cap. 5. tab. 4. f. 2.

Gramen Dactyloides. Burm. Zeyl. pag. 106. tab. 47. f. 1.

## TRIGYNIA.

## GENUS XXVI. LECHEA.

Char. Gener. *Cal.* 3 - phyllus. *Petala* 3, linearia. *Caps.* 3 - locularis, 3 - valvis : valvulis totidem interioribus. *Semen* 1. Lin. sy. pl. G. 116.

† Sp. 1. LECHEA CHINENSIS.  $\alpha$  Chát yú tsão.

Differ. spec. Lec. *foliis* ovato-lanceolatis : *spathis* trifloris, terminalibus. Hab ; & notæ. *Caulis* annuus, multiplex, repens, brevis. *Folia* ovato-lanceolata, lineata, glabra : *petiolis* vaginantibus. *Flos* terminalis, cæruleus : *spatha* magnâ, obtusâ, 3 - florâ : *perianthio* 3 - phyllo, brevi, patente. *Corolla* petala 3, unguiculata : *filamentis* 3, filiformibus. *Styli* 3, æquales staminibus : *stigmatibus* simplicibus. *Capsula* supera, 3 - loba, 3 - valvis, 3 - locularis. 1 - sperma. Planta primâ facie Commelinæ, & Tradescantiæ affinis : sed nec filamenta habet villosa, sicut ista, nec nectaria cruciata, sicut illa.

Habitat prope Cantonem Sinarum.

## GENUS XXVII. ERICCAULON.

Char. Gener. *Calyx* communis, capitulum imbricatum. *Petala* 3, æqualia. *Stamina* supra germen. Lin. sy. pl. G. 106.

† Sp. 1. ERIOCaulon QUADRANGULARE.  $\alpha$  Cò dùi còung.  $\beta$  Koué san tsão.

Differ. spec. Er. *culmo* quadrangulari : *foliis* ensiformibus : *capitulo* globoſo, basi truncato.

Hab ; & notæ. *Herba* annua, *culmo* 4 - gono, 8 - pollicari, nudo, erecto. *Folia* ensiformia, brevia, glabra, pauca. *Capitulum* albicans, subglobosum, basi planiusculum, squamis subrotundis, basi attenuatis, 1 - floris, clausis. *Corolla* pétala 2, sub-concava, apice obtusa, dentata. *Pistilla* 3. *Semina* 3, ovata.

Habitat in hortis, & agris Cochinchinæ ubique obvia. In Chinâ similem habitu vidi, sed florem non examinavi.

Sp. 2. ERIOCaulon SETACEUM.  $\alpha$  Cò chat.

Differ. spec. Er. *culmo* sexangulari : *foliis* setaceis. Lin. sp. 4.

Hab ; & notæ. *Herba* annua, pusilla, cespitosa, in orbem reflexa : *culmo* 6 - angulari, tenuissimo, 4 - pollicari, sub-nudo. *Folia* setacea, brevia, pauca, in senectute evanescentia. *Capitulum* terminale, parvum, oblongum, subacutum. *Semina* sub-triquetra.

Habi-

Habitat loca humida Cochinchinæ. Gramen Polytricum Rumph. Amb. I. 10. cap. 12. tab. 7. f. 1. Tsieru pullu. Rheed. Malab. I. 12. pag. 129. tab. 63. Gramen junceum, foliis capillaceis, capitulis minimis rotundis. Burm. Zeyl. p. 109.

## + GENUS XXVIII. POLYPARA.

## Descriptio Naturalis.

Cal. nullus.

Cor. Rotata, petala 4, oblonga, obtusa, circundantia basim receptaculi communis, oblongi, fustinentis multos flosculos. Corolla partialis nulla.

Stam. Filamenta 3, filiformia, erecta, receptaculo partiali insidetia. Antheræ ovatæ, 2 - loculares, stantes.

Pist. Germen 3 - gonum. Stylus nullus. Stigmata 3, oblonga, reflexa.

Peric. Capsula 3 - gona, 3 - locularis, 3 - valvis, polysperma, apice dehiscentia.

Sem. Multa, ovata, minuscula.

Nom. Polypara dicitur a corollâ multos flosculos producente.

Char. Gener. Cor. 4 - petala, polyflora. Cal. o. Caps. 3 - locularis; polysperma.

## † Sp. I. POLYPARA COCHINCHINENSIS. a Rau giáp cá.

Differ. spec. Pol. foliis cordatis, 5 - nerviis: pedunculis lateralibus solitariis.

Hab. Herba hortensis, annua: radice repente. Caulis 6 - pollicaris, erectus, fulcatus. Folia cordata, acuminata, 5 - nervia, magna, integerrima, glabra, alterna, graveolentia, petiolis longis. Flos lateralis, solitarius, pedunculo longo, erecto: corollâ communi albidissimâ, expansâ.

Virtus: totius plantæ. Attenuans, Resolvens, Emmenagoga. Menses obstructos referat: fluorem album compescit: fætum mortuum expellit: ecchymoses, seu fugillationes resolvit.

Habitat hortos Cochinchinenes, inter olera in acetariis edulis: nec alibi a me visa.

Observ. Clar. Thunbergius in Clasie Polyandriâ Polyginiâ Floræ Japonicæ, pag. 12, & pag. 234. tab. 26. plantam describit, & delineat nomine Houttuyniam, quam nostram esse Polyparam non dubito. In hac vero, quam in Cochinchinâ diu colui, semper observavi stamina non confusè mista pistillis, sed terna quælibet ad tria latera germinis 3 - goni singulatim affixa: germina itidem distincta: tribus stigmatibus sessilibus supposita. Foliola illa 4 ad basim rece-

receptaculi communis expansa Petala dici debent, cum sint valde tenuia, & candidissima, quæ proprietates calycibus minus competunt. Folia 5 - nervia habet Polypara, non Houttuynia, cæteroquin habitu valde similes.

## GENUS XXIX. MOLLUGO.

Char. Gener. *Cal.* 5 - phyllus. *Cor.* o. *Capf.* 3 - locularis, 3 - valvis.  
Lin. sy. pl. G. 113.

† Sp. 1. MOLLUGO TRIPHYLLA. β Ha khim sū.

Differ. spec. Mol. *foliis* ternis, lanceolatis: *floribus* dichotomis.  
Hab; & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, diffusus, 4-*gonus*, semi-pedalis: ramis 3 - natis. *Folia* stellato-terna, lanceolata, glabra, integerrima, sessilia. *Flos* apetalus, lateralis, & terminalis, pedunculis longis, dichotomis, apice racemosis. *Stigmata* tria, sessilia, subovata, inæqualia. *Capsula* ovata, 3 - loba, 3 - locularis, 3 - valvis: seminibus multis, reniformibus.

Habitat Cantone Sinarum spontanea.

# CLASSIS IV.

## TETRANDRIA.

### MONOGYNIA.

\* *Flores monopetali, monospermi.*

P

+ 1. HYLA.

*Cal. com. Proprius 2 - phyllus. Cor. irregularis : filamentis tubo insertis. Sem. superum.*

2. CEPHALANTHUS. *Cal. com. o. Receptaculum aggregans flores regulares in globum.*

3. SCABIOSA.

*Cal. com. Receptaculum elevatum, subpaleaceum. Sem. coronatum, involutum, inferum.*

\*\* *Flores monopetali, monocarpi, inferi.*

+ 4. CYLINDRIA.

*Cor. cylindracea Cal. 4 - fidus. Bacca 1 - sperma.*

+ 5. PORPHYRA.

*Cor. campanulata. Cal. truncatus. Bacca 3 - sperma.*

6. CALICARPA.

*Cor. tubulosa. Cal. 4 - fidus. Bacca 4 - sperma.*

7. SCOPARIA.

*Cor. rotata. Cal. 4 - partitus. Capsula 1 - locularis.*

8. PLANTAGO.

*Cor. refracta. Cal. 4 - partibus. Caps. 2 - locularis, circumscissa.*

9. BUDDLEIA.

*Cor. campanulata. Cal. 4 - fidus. Caps. 2 - locularis, 2 - sulca.*

10. PENÆA.

*Cor. campanulata. Cal. 2 - phyllus. Caps. 4 - locularis, 4 - valvis.*

\*\*\* *Flores monopetali : monocarpi, superi.*

11. PAVETTA.

*Cor. tubo longo. Calyx 1 - phyllus. Bacca 1 - sperma.*

+ 12. POLYOSUS.

*Cor. tubo brevi. Cal. 4 - dentatus. Bacca 2 - sperma.*

## TETRANDRIA.

13. IXORA.

*Cor.* tubo longo. *Cal.* 4-partitus. *Bacca* 2-locularis. Sem. 1-2.

14. PETESIA.

*Cor.* tubulosa. *Cal.* 4-dentatus. *Bacca* 2-locularis, polysperma.

15. HEDYOTIS.

*Cor.* tubulosa. *Cal.* 4-partitus. *Caps.* didyma, polysperma, apice dehiscens.

16. OLDENLANDIA.

*Cor.* tubulosa. *Cal.* 4-partitus. *Caps.* polysperma, dehiscens inter dentes.\*\*\*\*\* *Flores monopetali, dicocci, superi : stellatae.*

17. GALIUM.

*Cor.* plana. *Fructus* sub-globosi.

18. SPERMACOCE.

*Cor.* tubulosa. *Fructus* coronatus. *Semina* 2-dentata.

19. CRUCIANELLA.

*Cor.* tubulosa, aristata. *Fructus* nudus. *Semina* linearia.\*\*\*\*\* *Flores tetrapetali, inferi.*

20. FAGARA.

*Petala* staminibus breviora. *Cal.* 4-fidus. *Caps.* 4-valvis, 1-sperma.

† 21. LASIA.

*Petala* carnosa. *Cal.* communis spatha. *Bacca* 1-sperma.

† 22. LEPTA.

*Petala* triangulare. *Cal.* 4-partitus. *Bacca* 4-locularis, 1-sperma.

23. PTELEA.

*Petala* coriacea. *Cal.* 4-partitus. *Drupa* compressa, exsucca.

† 24. HELICIA..

*Petala* revoluta. *Cal.* 4-fidus. *Drupa* ovata, 1-fulca.\*\*\*\*\* *Flores tetrapetali superi.*

25. CISSUS.

*Cal.* cingens german. *Bacca* 1-sperma.

† 26. ALLASIA.

*Germen* inter calycem, & corollam. *Bacca* 1-locularis : seminibus nidulantibus.

† 27. COLUMELLA.

*Cal.* sub-truncatis. *Bacca* 2-locularis.

28. TRAPA. *Cal. 4-partitus. Nux armata spinis conicis, oppositis.*
29. SANTALUM. *Cor. 4-petala, calyci innata. Bacca 1-sperma.*
- \*\*\*\*\* Flores incompleti.
30. SALVADORA. *Cal. 4-fidus, inferus. Bacca 1-sperma. Semen arillatum.*
- <sup>+</sup> 31. LAGENULA. *Cal. 4-phylloides, inferus. Bacca 2-locularis.*
- <sup>+</sup> 32. CREODUS. *Cal. 3-lobus, superus. Bacca 1-sperma.*
33. ELAEAGNUS. *Cal. campanulatus, superus, deciduus. Dru-  
pa.*
- <sup>+</sup> 34. OCTARILLIUM. *Cor. Hippocrateriformis, supera. Cal. 0. Bac-  
ca 1-sperma: arillo 8-gono.*
35. DORSTENIA. *Cal. Receptaculum commune, carnosum.*

## TETRAGYNA.

36. ILEX. *Cor. 1-petala, Cal. 4-dentatus. Bacca 4-  
sperma.*
- <sup>+</sup> 37. TETRADIUM. *Cor. 4-petala. Cal. 4-phylloides, inferus. Ca-  
psulae 4, 1-spermæ: semine arillato.*

## GENUS V CAPPARIDACEA

## MONOGYNIA.

## + GENUS I. PHYLA.

## Descriptio Naturalis.

*Cal. communis polyphyllus*, ovatus, imbricatus: foliolis spathulatis, acuminatis, coarctatis, continens multos flosculos.

*Perianthium proprium 2 - phyllum*: foliolis lanceolatis, concavis, erectis.

*Cor. Monopetala*, tubulosa, irregularis: limbo brevi, patente, 4-fido: lacinias subæqualibus, supremâ emarginatâ.

*Stam. Filamenta 4*, brevia, bino ordine infra os tubi. *Antheræ 2 - lobæ*, subrotundæ.

*Pist. Germen superum*, subrotundum. *Stylus brevis*. *Stigma crassiusculum*.

*Peric. o.*

*Sem. Solitaria*, nuda: Receptaculo communi filiformi, nudo undique affixa.

*Nom. (Φυλα' tribus) Phylam dixi florem multiplicem ex communi calyce prodeuntem.*

*Obser. Cogitavi Phylam Proteis annextere: destiti præcipue impulsu Linnæi, qui essentiam Proteæ statuit in antheris linearibus infra apices corollæ infertis, cum nostræ subrotundæ insideant infra os tubi. Prothea Repens Lin. sp. II. in paucis cum nostrâ convenit, in multis differt.*

*Charact. Gener. Cal. com. imbricatus: proprius 2 - phyllus, inferus.*

*Cor. 4 - fida, irregularis: antheris subrotundis infra os tubi. Sem. I.*

*Sp. I. PHYLA CHINENSIS. & Lién suēn.*

*Differ. spec. Phyl. caule repente: foliis oppositis, semiferratis: pedunculis lateralibus, solitariis.*

*Hab. Caulis herbaceus, annuus, repens: ramis assurgentibus. Folia lanceolato-ovata, acuminata, glabra, opposita, ad basim integerima, superius ferrata. Flos albo-violaceus, lateralis, pedunculo solitario, longo, monofloro.*

## GENUS II. CEPHALANTHUS.

*Charact. Gen. Cal. communis o: proprius superus, infundibuliformis.*

*Recept. globosum, nudum. Sem. I, lanuginosum. Lin. sy. pl. G. 119.*

*Sp. I.*

Sp. 1. CEPHALANTHUS OCCIDENTALIS?  $\beta$  sòy yòng mài.  
 Differ. spec. Ceph. *foliis* oppositis, ternisque. Lin. sp. 1. *ludib.*  
 Hab; & notæ. *Arbor magna*, *ramis* patentibus. *Folia* opposita, ter-  
 naque, ovata, acuminata, integerrima, incurva, reflexa, glabra,  
 costis multis, obliquis. *Fos*, albus, terminalis, pedunculis divi-  
 sis: *flosculis* aggregatis: *receptaculo* communis globoso, villis mul-  
 tis clavatis distincto: calycibus 4-fidis: *corollis* superis, infundi-  
 buliformis, 4-fidis. *Bacca* partialis calycina, minima, 1-sper-  
 mifera: composita rotunda, mediocris, rubra, edulis, moro simili-  
 lis. Si cum Ceph. Americano (mihi non obvio) non conveniat, vo-  
 cetur Ceph. Orientalis.

+ Sp. 2. CEPHALANTHUS ANGUSTIFOLIUS.  $\alpha$  Rì ri cát.  
 Differ. spec. Ceph. *foliis* lanceolato-linearibus, oppositis.  
 Hab; & notæ. *Arbor* mediocris, *ramis* ascendentibus. *Folia* lanceo-  
 lato-linearia, integerrima, opposita. *Flos* pallidus: capitulis termi-  
 nalibus, parvis: *receptaculo* communis oblongo, villoso, *flosculos*  
 in globum colligente: *calyce* communis nullo: proprio infundibu-  
 liformi, 4-fido, laciniis subulatis, pilosis, glandulis coloratis,  
 nitidis, pedunculatis consito. *Corollæ* infundibuliformes, limbo  
 brevi, 4-fido, acuto. *Stamina* 4, brevissima, ad incisuras corol-  
 lae. *Bacculae* subrotundæ, coronatæ, flaccidæ, 2-locularis, 1-  
 spermæ, inferæ. *Bacca* composita parva.

+ Sp. 3. CEPHALANTHUS PROCUMBENS.  $\alpha$  Deei trép.  
 Differ. spec. Ceph. *caule* procumbente: *foliis* ovato-lanceolatis, al-  
 ternis.  
 Hab; & notæ. *Frutex* crassus, procumbens: *ramis* multis, funicu-  
 laribus, longis. *Folia* ovato-lanceolata, magna, integerrima, to-  
 mentosa, alterna, petiolata. *Flos* violaceus, dioicus, racemis ter-  
 minalibus, longis, interruptis. *Masculum* non vidi. *Fæmineus* *re-*  
*ceptaculo* globose, nudo: *calyce* tam communi, quam proprio nul-  
 lo. *Corollæ* infundibuliformes, 5-fidæ, inferæ, plurimæ, pedun-  
 culis propriis, longis, in globum prominentes. *Semen* 1, ovatum,  
 compressum, nudum. *Stylus* capillaris, *corollæ* æqualis: *stigmate*  
 simplici.

+ Sp. 4. CEPHALANTHUS MONTANUS.  $\beta$  Sân yòng mài.  
 Differ. spec. Ceph. *foliis* ovatis, crenatis, alternis.  
 Hab; & notæ. *Arbor magna*: *cortice* cannabino: *ramis* patentibus.  
*Folia* ovata, acuminata, crenata, alterna, petiolata, facie aspe-  
 ra, tergo tomentosa. *Flos* dioicus, coloris viridis: pedunculis foli-  
 ariis

tariis axillaribus : *capitulis* subrotundis , *receptaculo* globoso , nudo. Masculum non vidi. *Fæminei* corolla nulla. *Calyx* proprius infundibuliformis , sub-clausus , 4 - fidus , superus. *Semen* 1 , compressum , coronatum alâ sub-papposâ , fortasse ex tubo calycis laciniato.

† Sp. 5. CEPHALANTHUS STELLATUS. & Rī ri boung gão.

Differ. spec. Ceph. *foliis* stellatis , lanceolato-linearibus.

Hab ; & notæ. *Arbor* mediocris , *ramis* ascendentibus. *Folia* stellata terna , lanceolato-linearia , integerrima , glabra. *Flosculi* albi , terminales , in globum aggregati : *receptaculo* ovato , parvo , flosculos colligente : *calyce* communi nullo. *Perianthium* inferum , 4 - fidum , laciniis subulatis. *Corolla* supera , 4 - fida , limbo reflexo : *antheris* 4 , sub-fsessilibus : *stylo* longo. *Semen* 1 , nudum.

Observ. Omnes istas species examinavi recentes in solo natali : primam , & quartam in Chinâ : secundam , tertiam , & quintam in Cochinchinâ. Cumque tam inter se , quam a Charactere Generico Linnæano differre invenissem , characterem illum ampliavi in supra scripto repertorio Generum , ut omnibus possit congruere. Inde suplicor , quod variae plantæ Herbarii Amboinensis Rumphii ( quorum flores non obtinui ) ad Cephalanthum pertineant. Scilicet Nefatus l. 4 c. 20. t. 25. Funis uncatus l. 7. c. 33. t. 34. Et aliae.

GENUS III. SCABIOSA.

Charact. Gener. *Cal.* communis polyphyllus : proprius duplex , superus. *Receptaculum* paleaceum , sive nudum. Lin. sy. pl. G. 121.

† Sp. 1. SCABIOSA COCHINCHINENSIS. & Co' kwoi meo: & Ti tan tsao.

Differ. spec. Scab. *corollulis* 5 - fidis : *foliis* lanceolatis indivisis , undulatis : *caule* subnudo : *pappo* piloso.

Hab ; & notæ. *Caulis* herbaceus , subnudus , erectus , simplicissimus , 10 - pollicaris. *Folia* radicalia , multa , in orbem expansa , lanceolata , integerrima , undulata , utrinque pilosa. *Flos* aggregatus , purpureus , terminalis : *calyce* communi 3 - phyllo , foliaceo : proprio dupli , utroque 4 - phyllo. *Corollulae* 5 - fidæ , subæquales , calice communi breviores : *receptaculo* paleaceo , elevato , non subulato. *Semen* 1 , coronatum pilis 5 , longiusculis.

Habitat inculta in Cochinchinâ : etiam in Chinâ.

Observ. Ratione 5 pilorum femini insidentium , simulque corollæ 5 - fidæ , purpureæ dubitavi , an esset Scabiosa Atropurpurea. Lin. sp. 18. Sed habitu a nostrâ differt : sicut etiam Scab. Javana Bonpii , Jav. pag. 158.

Virt. Mundificans , Beccchica. Prodest in scabie , tussi , & aliis pulmonum affectibus. Utimur decocto totius herbae.

GE-

## + GENUS IV. CYLINDRIA.

## Descriptio Naturalis.

Cal. Inferus, tubulosus, brevis, persistens, 4-fidus: laciniis acutis, coloratis, patentibus.  
 Cor. Tubulosa, 4-fida: laciniis linearibus, acutis, carnosis, in tumulum cylindraceum conjunctim protensis, apice cucullatis.  
 Stam. Filamenta subnulla. Antherae 4, 2-loculares, subrotundae, compressae, cucullis laciniarum inclusae.  
 Pist. Germen ovatum. Stylus brevissimus. Stigma 4-fidum.  
 Peric. Bacca parva, subrotunda, exsucca, 1-sperma.  
 Sem. 1, globosum, lanuginosum.  
 Nom. Cylindria dicitur ob corollae lacinias tumulum teretem continuantes.

Charact. Genericus. *Cal. 4-fidus inferus. Cor. tubiformis 4-fida. Bacca 1-sperma.*

Sp. 1. CYLINDRIA RUBRA. a Cay Longe.  
 Differ. spec. Cylindr. foliis lanceolatis oppositis: *pedunculis polyfloris*, subterminalibus.  
 Hab. Arbor mediocris: *ramis* ascendentibus. *Folia* lanceolata, subferrata, glabra, opposita. *Flos* ruber, parvus, multus, *pedunculis* subterminalibus, polyfloris. *Bacca* nigra.  
 Habitat in sylvis Cochinchinæ.  
 Blimbimgum Sylvestre. Rumph. Amb. I. 6. c. 79. tab. 73.

## + GENUS V. PORPHYRA.

## Descriptio Naturalis.

Cal. Truncatus, inferus, persistens.  
 Cor. Monopetala, campanulata: tubo calycem superante: limbo 4-partito, laciniis rotundatis.  
 Stam. Filamenta 4, corollâ duplo longiora, ipsius basi insidentia. Antherae ovatae, stantes.  
 Pist. Germen subrotundum. Stylus filiformis, æqualis staminibus. Stigma subrotundum, retusum.  
 Peric. Bacca globosa, 1-locularis, 3-sperma.  
 Sem. Externus convexa, interius angula.  
 Nom. (Porphyra purpura) a colore floris.

Charact. Gener. *Cal.* truncatus, inferus. *Cor.* campanulata, 4-partita. *Bacca* 3-sperma.

Sp. 1. PORPHYRA DICHOTOMA. & Tsù hōa uôn.

Differ. spec. Porph. *foliis* lanceolatis : *racemis* dichotomis.

Hab. *Frutex* erectus, 3-pedalis : *ramis* multis, rectis, débilibus. *Folia* lanceolata, serrata, punctata, subsessilia, opposita. *Flos* purpureus, *racemis* dichotomis, axillaribus. *Bacca* globosa, violacea, carnosa, plurima, minima.

Habitat in collibus provinciæ CANTONIENSIS SINATUM.

### GENUS VI. CALLICARPA.

Charact. Gener. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-fida. *Bacca* 4-sperma. Lin. G. 141. sy. pl.

Sp. 1. CALLICARPA AMERICANA. & Cây nang nang.

Differ. spec. Call. *foliis* ferratis, subitus tomentosis. Lin. sp. 1.

Hab; & notæ. *Frutex* 3-pedalis, *caule* multiplici, suberecto, albicans. *Folia* ovata, acuminata, denticulata, opposita, mollia, rugosa, magna, subitus tomentosa. *Flos* purpurascens, minimus, cymis axillaribus, brevibus : *calyce* brevi, 4-fido : *baccâ* rotundâ, nigrâ plurimâ, minimâ, 4-spermâ. Habitat ad sepes in Cochinchinâ.

Anonymus baccifera, verticillata, folio molli, & incano. Plukn. Almag. 33. t. 136. f. 3.

† Sp. 2. CALLICARPA UMBELLATA. & Cây ma ca.

Differ. spec. Call. *foliis* turbinato-ovatis, glabris, alternis : umbellis sessilibus.

Hab; & notæ. *Arbor* mediocris : *ramis* ascendentibus. *Folia* turbinato ovata, integerrima, glabra, alterna, margine reflexa. *Flos* alto-viridis parvus, umbellis sessilibus, 5-floris, sub-terminalibus. *Cal.* obtuse 4-fidus. *Cor.* campanulata, tubo brevi. *Stamina*, & *stigma* sessilia. *Bacca* carnosa sabrotunda, parva, 4-sperma.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

† Sp. 3. CALLICARPA TRILOBA. Ca. sú thay. & Rát chia ba.

Differ. spec. Call. *caule* scandente : *foliis* 3-lobis : *pedunculis* dichotomis.

Hab; & notæ. *Frutex* scandens, longis, ramosus : cirrhis bifidis. *Folia* cordata, 3-loba, serrata, glabra, petiolis longis. *Flos* pallidus, axillaris, pedunculis dichotomis. *Cal.* 4-dentatus. *Bacca* subrotunda, 4-sperma. *Corolla* 4-fida. *Stamina* 4.

Habitat in Chinâ, & Cochinchinâ spontanea.

## GENUS VII. SCOPARIA.

Charact. Gener. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 4-partita, rotata. *Caps.* 1-locularis, 2-valvis, polysperma. Lin. sy. pl. G. 149.

Sp. I. SCOPARIA DULCIS.  $\alpha$  Cam thao dát.

Differ. spec. Scop. *foliis* ternis: *floribus* pedunculatis. Lin. sp. I.  
Hab; & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, erectus, 3-pedalis: *ramis* 3-natis, rectis, ascendentibus. *Folia*stellata terna, lanceolata, serrata, sessilia, glabra. *Flos* albus, solitarius, axillaris, pedunculis longis. *Cal.* 4-phyllus, persistens, inferus, foliolis oblongis, curvis, pilosis. *Cor.* rotata, 4-partita: fauce pilosissimâ: lacinias oblongis, calycom superantibus. *Filamenta* 4, erecta, corollæ æqualia: *antheris* incumbentibus. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, æqualis staminibus. *Stigma* simplex. *Caps.* ovata, 1-locularis, 4-valvis, polysperma, apice dehiscens: *seminibus* plurimi, subrotundis, minimis.

Habitat agreebris in Cochinchinâ, nec alibi vidi.

Tupeçava. Pil. Bras. p. 246. Icon ibi non satis bona. Scoparia Ternata. Forsk. Arab. (Centur. 2. n. 7.) descriptione magis convenit.

## GENUS VIII. PLANTAGO.

Charact. Gener. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-fida: limbo reflexo. *Stom.* longissima. *Caps.* 2-locularis, circumsissa. Lin. sy. pl. G. 148.

Sp. I. PLANTAGO MAIOR.  $\alpha$  Ma dé: Xa tien.  $\beta$  Ché tsien tsão.

Differ. spec. Plant. *foliis* ovatis, glabris: *scapo* tereti: *spicâ* flocculis imbricatis. Lin. sp. I.

Hab; & notæ. *Planta* acaulis, annua. *Folia* semipedalia, ovata, sub-acuta, subdentata, 5-nervia, glabra, petiolata. *Scapus* nudus, teres, tenuis: *spicis* longissimis, teretibus, multis, singulis in quolibet scapo, simplicissimis: *flocculis* albis, densis, sub-imbricatis. *Cor.* 4-fida, brevis: *staminibus* 4, longissimis. *Caps.* ovata, sub-acuta, horizontaliter dehiscens, 2-locularis, 4-sperma: *seminibus* globosis.

Habitat ad vias, & in hortis, in Cochinchinâ, & Chinâ passim ob-via.

Sjaden. Kœmpf. Jap. p. 912. Plantago latifolia Hill. Brit. herb. p. 152.

tab. 22. f. 7. Thunb. Jap. p. 61.

Virt. Refrigerans, Subastrigens, Abstergens, Vulneraria, Diuretica, Optal-

Ophtalmica. Decocto seminum leviter contusorum maximè utuntur indigenæ ad diuresim promovendam. Succo foliorum expresso, melle apum condito medentur tenebro, & fluxui sanguinco.

## GENUS IX. BUDDLEIA.

Charact. Gener. *Cal.* 4 - fidus. *Cor.* 4 - fida. *Stamina* ex incisuris. *Cap.* 2 - sulca, 2 - locularis, polysperma. Lin. sy. pl. G. 146.

† Sp. 1. BUDDLEIA ASIATICA.  $\alpha$  Sau dai chuat.

Differ. spec. Budd. *foliis* lanceolato-linearibus, rugosis, glabris: *spicis* plenis.

Hab; & notæ. *Caulis* subfruticosus, 3 - pedalis: ramis ascendentibus. *Folia* lanceolato-linearia, rugosa, subferrata, glabra, opposita. *Flos* albus, spicis terminalibus, longis, nec interruptis. *Cal.* inferus, 4 - partitus, persistens: laciniis subulatis, erectis. *Cor.* campanulata, 4 - fida, laciniis rotundatis. *Filamenta* 4, brevissima infra os tubi: *antheris* oblongis, stantibus. *Gernien* oblongum. *Stylus* æqualis staminibus. *Stigma* longiusculum, bifidum. *Capsula* oblonga, 2 - locularis, 2 - valvis, polysperma: *seminibus* longiusculis.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

† Sp. 2. BUDDLEIA TERNATA.  $\alpha$  Cay Lao linh.

Differ. spec. Budl. *foliis* ternatis, acumiuatis: pedunculis monofloris.

Hab; & notæ. *Caulis* subfruticosus, 2 - pedalis, erectus, teres, ramosus. *Folia* ternata, lanceolata, acuminata, ferrata. *Flos* albus, pedunculis axillaribus, solitariis: *calyce* 4 - fido, connivente, persistente: *corollæ* laciniis ovatis. *Stigmate* obtuso, 2 - fido: *æctario* piloso. *Caps.* ovata, 2 - locularis: *seminibus* numerosis.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

## GENUS X. PENÆA.

Char. Gener. *Cal.* 2 - phyllus. *Cor.* campanulata. *Stylus* 4 - angularis.

*Caps.* tetragona, 4 - locularis, 8 - sperma. Lin. sy. pl. G. 144.

† Sp. 1. PENÆA NITIDA.  $\alpha$  Cay Son.

Differ. spec. Pen. *foliis* oblongis, congestis, nitidis: racemis terminalibus.

Hab; & notæ. *Caulis* fruticosus, 4 - pedalis, erectus, ramosus. *Folia* ovato-oblonga, integrerima, nitida, congesta, plana, margine reflexa. *Flos* albus, racemis laxis, terminalibus: *calyce* 2 - phyllo, erecto, rubro, nitido, oblongo. *Cor.* campanulata, 4 - fida: laciniis

niis filiformibus. Germen superum, ovatum : style lateri, non apicci, insidente. Capsula ovata, polysperma: maturam non vidi, ideo de numero loculorum incertus mansi. Habitat agrestis in Cochinchinâ.

† Sp. 2. PENÆA SCANDENS.  $\alpha$  Deei dinh dang.

Differ. spec. Pen. caule scandente : foliis cordatis : pedunculis 2 - floris.

Hab ; & notæ. Caulis fruticosus, ramosus, scandens. Folia lato-cor data, acuminata, integerrima. Flos axillaris, pedunculis longis, 2 - floris. Corolla lutea, campanulata, plicata, infera, 4 - fida. Capsula 4 - locularis, polysperma. Calyx magnus, 5 - fidus persis tens.

Observ. Omnes Penææ species a Linnæo descriptæ solo Africano gaudent. Nostræ Asiaticæ, & Cochinchinæ indiginæ sunt, nec in totum conformes Characteri Generico Linnæano. Habitu vero affinis videtur P. Nitida P. Myrtoidi Lin. Junioris sup. pl. p. 122., & P. Scandens P. Marginatæ Lin. Senioris sp. 3.

### GENUS XI. PAVETTA.

Charact. Gener. Cor. 1 - petala, infundibuliformis, supera. Stigma curvum. Bacca 2 - sperma. Lin. sy. pl. G. 138.

† Sp. 1. PAVETTA ARENOSA.  $\beta$  Tá sā.

Differ. spec. Pav. ramis brachiatis : foliis tuberculosis, oppositis. Hab ; & notæ. Frutex inermis, erectus, 4 - pedalis : ramis multis brachiatis, reclinatis. Folia lanceolata, integerrima, nitida, opposita, tuberculis multis utrinque prominentibus, quasi arenæ granulis constata. Inde nomen sinicum Planta arenosa. Flos albus, terminalis, fastigiatus : calyx baccato, 5 - dentato. Corolla Hippocrateiformis, tubo longo, limbo 5 - fido. Filamenta subnulla. Anthereæ 4, lineares ad os tubi exertæ. Bacca parva, ovata, 1 - sperma, infera. Semen 1, ovato-oblongum. De stigmate non recordor.

Habitat in provinciâ Cantonensi Sinarum.

† Sp. 2. PAVETTA PARASITICA.  $\alpha$  Chanh cõi tlòn lá.

Differ. spec. Pav. caule parasitico : foliis verticillatis : glomerulis axilaribus.

Hab ; & notæ. Caulis perennis, lignosus, 1 - pedalis, ramosissimus, parasiticus. Folia ovata, tomentosa, integerrima, verticillata. Flos fusco-luteus, parvus, villosus, axillaris, glomeratus. Cal. oblongus, 4 - gonus, truncatus, villosus : suffultus squamulâ oblonga,

reflexâ. *Cor.* hippocrateriformis , tubo longo : limpo parvo , 4 - fido , laciniis oblongis , inflexis. *Filamenta* 4 , ori tubi adnata , limbo breviora : *antheris* stantibus. *Germen* calycinum oblongum. *Stylus* filiformis , corollæ æqualis : *stigmate* crassiusculo. *Bacca* parva , ovato-oblonga , 1 - sperma : *semine* ovato. Nascitur frequens , & inhæret arboribus in hortis Cochinchinæ.

*Observ.* Pavettam Indicam non novi. Linnæus in designandis Generum Characteribus modo illam dicit 1 - spermam , modo 2 - spermam. Uterque Burmanus de numero seminum tacet. Rumph. Amb. 1. 6. p. 147. loquens de Flammâ sylvarum peregrinâ ( quæ ab aliis pro Pavettâ Indicâ habetur ) dicit ejus fructum esse ex rotundo planum , ac si bini essent adunati , sicut antea dixerat de flammâ sylvarum Ixorâ Coccineâ : adeoque rectè intelligendum utriusque baccam esse 2 - spermam , sive 2 - locularem , & utramque plantam esse Ixoram. Igitur ad tollendam confusionem existimo baccam 1 - spermam privatim tribuendam Pavettæ : 2 - locularem Ixoræ : 1 - locularem , 2 - spermam proximo Generi nunc exponendo.

+ GENUS XII. POLYZOZUS.

*Descriptio Naturalis.*

*Cal.* Tubulosus , 4 - dentatus , brevis.

*Cor.* Monopetala : tubo brevi : limbo quadrifido , reflexo.

*Stam.* Filamenta 4 , reflexa , corollâ breviora , ori tubi inhærenria. Antheræ oblongæ , stantes.

*Pist.* Germen subrotundum. Stylus filiformis , corollâ longior. Stigma magnum , cylindraceum , apice acuto , emarginato.

*Peric.* Bacca calycina , subrotunda , carnosa , 1 - locularis , 2 - sperma. Sem. Subrotunda.

*Nom.* ( Πολύοζος multum : ὅρνις ramus ) Arbor ramosissima.

*Observ.* Rouhamon Guianensis. ( Aublet. Guian. p. 93. t. 36. ) ab hac descriptione vix differt.

*Charact.* Genericus. *Cal.* 4 - dentatus , baccatus. *Cor.* tubus brevis , limbus 4 - fidus. *Bacca* carnosa , 1 - locularis , 2 - sperma.

+ Sp. 1. POLYZOZUS BIPPINATA. a Cây Trâm ná.

Differ. specifica. Pol. *foliis* bippinatis : *racemis* lateralibus.

Hab. *Arbor* magna , ramosissima : ramis patentibus. *Folia* bippinata ; ovata , acuminata , integerimma , parva , nitida , multijuga. *Flos* viridi-luteus , parvus , multus : *racemis* brevibus , axillaribus : *flosculis*.

*lis* multis neutris intermixtis, calyce, & corollâ hermaphrodito similibus. *Bacca* fusca, medioëris, non edulis.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Uſus. Lignum hujus arboris album, & grave est, nec pulchrum: sed magnæ durationis in sustinendis pontibus, quia humiditati, & vermibus valde resistit.

+ Sp. 2. POLYOSUS LANCEOLATA. ♂ Am san cung.

Differ. spec. Pol. *foliis* lanceolatis: *racemis* terminalibus.

Hab; & notæ. *Arbuscula* inermis, 4-pedalis: *ramis* diffusis. *Folia* lanceolata, integerrima, glabra, opposita, petiolata. *Flos* rubefcens, racemis compositis, terminalibus: *calyce* 4-dentato, baccato: *corollâ* infundibuliformi, limbo 4-fido, patente, æquali tubo. *Fau<sup>x</sup>* tubi staminifera, lanugine multâ obſtructa. Stigma emarginatum. *Bacca* subrotunda, minima, 1-locularis, 2-sperma.

Habitat Cantone Sinarum, spontanea.

Obſerv. Pavetta Caffra (Lin. Jun. suppl. p. 121.) huic Generi magis conformis est quam Pavettæ.

### GENUS XIII. IXORA.

Charact. Gener. *Cor.* 1-petala, infundibuliformis, longa, supera. *Stamina* supra faucem. *Bacca* 4-sperma. Lin. sy. pl. G. 137.

Sp. 1. IXORIA COCCINEA. ♂ Boung tlang do<sup>2</sup>.

Differ. spec. Ix. *foliis* ovatis, semiamplexicaullbus: *floribus* fasciculatis. Lin. sp. 1.

Hab; & notæ. *Caulis* fruticosus, multiplex, erectus, 3-pedalis. *Folia* ovata, integerrima, opposita, glabra, sessilia, nec amplexicaulia. *Flos* coccineus, fasciculato-cymosus, fastigiatus, terminalis. *Corolla* hippocrateriformis potius, quam infundibuliformis: tubo tenui longissimo: limbo parvo, æqualiter 4-fido. *Cal.* minimus, 4-fidus, corollæ concolor. *Stylus* tubo longior: *stigmate* oblongo, 2-fido. *Filamenta* brevissima ad os tubi: *antheris* oblongis. *Bacca* parva, sub-sphaeroidea, emarginata, coronata, 2-locularis, 1-sperma. *Semina* exterius rotundata, interius plana.

Habitat in fruticetis Cochinchinæ.

Jasminum flore tetrapetalo. Ixora Linnæi. Burm. Zeyl. p. 125. t. 57.

Flamma sylvarum. Rumph. Amb. l. 6. cap. 52. pag. 105, 107. Cujus descriptio a nostrâ non longè aberrat. Icon tab. 47. satis cohaeret: non ita tab. 46, quæ nec cum ejusdem Authoris descriptione, nec cum nostrâ convenit.

Sp. 2. IXORA ALBA.  $\alpha$  Boung tláng tláng.

Differ. spec. Ixor. *foliis* ovato-lanceolatis *floribus* fasciculatis. Lin.  
sp. 2.

Hab; & notæ. *Caulis* fruticosus, ramosus, erectus, 3-4-pedalis.  
*Folia* ovato-oblonga, acuta, integerima, glabra, opposita, sub-  
sessilia. *Flos* albus fasciculato-cymosus, terminalis. *Bacca* 2-locu-  
laris, 1-sperma, infera. *Cal.*, *Cor.*, *stam.*, & *pistillum*, ut 1 spe-  
ciei. An hujus varietas?

Habitat similiter in locis planis, sed rarer.

Jasminum Indicum Schetti album. Pluk. alm. p. 196 t. 109. f. 2.

+ Sp. 3. IXORA MONTANA.  $\alpha$  Boung tláng nái.

Differ. spec. Ix. *foliis* turbinato-oblongis, basi cordatis : *flore* fasti-  
giato.

Hab; & notæ. *Caulis* fruticosus, erectus, ramosus, 4-pedalis. *Fo-*  
*lia* oblonga, ad apicem latiora, obtusa, basi cordata, integeri-  
ma, glabra, opposita, sub-sessilia. *Flos* coccineus, fastigiatus, ter-  
minalis. *Flos*, & *fructus* ejusdem formæ, quæ præcedentium : ea-  
rumque fortasse varietas.

Habitat in locis montanis in Cochinchinâ.

+ Sp. 4. IXORA NOVEMNERVIA.  $\alpha$  Buóm rùng tláng.

Differ. spec. Ix. *foliis* nervosis, asperis : *caule* scandente : *cymis* ter-  
minalibus.

Hab; & notæ. *Frutex* magnus, scandens, ramosus, inermis. *Folia*  
ovato-lanceolata, integerima, aspera, 9-nervia, subsessilia, op-  
posita. *Flos* albus, terminalis, cymis hemisphæricis. *Corollæ* tubus  
gracilis, longissimus : limbus 4-fidus. *Stamina* supra faucem. *Sti-*  
*gma* ovatum, 2-fidum. *Bacca* infera, 2-locularis, 1-sperma.

Habitat in desertis locis Cochinchinæ.

+ Sp. 5. IXORA VIOLACEA.  $\alpha$  Buóm rùng tiá.

Differ. spec. Ix. *foliis* nervosis, pilosis : *floribus* axillaribus.

Hab; & notæ. *Frutex* magnus scandens, ramosus, inermis. *Folia* lan-  
ceolata, 9-nervia, integerima, pilosa, subsessilia, opposita. *Flos*  
violaceus, cymis axillaribus : *corolla*, & *calyce* 4-fidis. *Bacca* in-  
fera, 2-locularis, 1-sperma : *seminibus* ovatis asperis.

Habitat loca inculta, ubi arborum agrestium ramis innititur in Cochinchinâ.

## GENUS XIV. PETESIA.

Charact. Gener. Cor. 1 - petala, infundibuliformis. Stigma 2 - fidum.  
*Bacca* polysperma. Lin. sy. pl. G. 139.

† Sp. 1. PETESIA SIMPLICISSIMA. a Cay bó bó.

Differ. spec. Pet. *foliis* lanceolato-linearibus : racemis sub-terminalibus.  
 Hab ; & notæ. *Caulis* herbaceus, simplicissimus, 1 - pedalis, 4 - gonus, erectus. *Folia* lanceolato-linearia, integerrima, glabra : duo opposita maiora, plura minora (ni velis dicere stipulas) simul fasciculata. *Flos* albus, subterminalis : *racemis* erectis, subdivisis. *Bacca* infera, parva, 2 - locularis, polysperma : vestita *calyce* sub-campanulato, acutè 5 - fido. *Stigma* oblongum, 2 - fidum villosum, reflexum.

† Sp. 2. PETESIA TRIFIDA. a Cay Hang the.

Differ. spec. Pet. *foliis* 3 - cuspidatis : *corymbis* terminalibus.  
 Hab ; & notæ. *Caulis* subfruticosus, 4 - gonus, cespitosus, 1 - pedalis, erectus. *Folia* lanceolata, tricuspidata, sessilia, integerrima, opposita. *Flos* albus : *corymbis* terminalibus : *corollis* infundibuliformibus, 4 - fidis. *Fruitus* inferus, polyspermus. *Bacca* ? maturam non vidi.

Habitat utraque species in Cochinchinâ : illa in agris, hæc in montibus *Son coung*.

## GENUS XV. HEDYOTIS.

Char. Gener. Cor. 1 - petala, infundibuliformis. Caps. 2 - locularis ; polysperma, infera. Lin. sy. pl. G. 124.

Sp. 1. HEDYOTIS HERBACEA. a Co luoi rân.

Differ. spec. Hed. *foliis* linear-lanceolatis : *caule* herbaceo, dichotomo : *pedunculis* geminis. Lin. sp. 3.

Hab ; & notæ. *Caulis* 8 - pollicaris, herbaceus, tenuis, dichotomus, procumbens. *Folia* linear-lanceolata, sessilia, glabra, integerrima, opposita. *Flos* albus axillaris, geminus, sœpe solitarius : *corolla* sub-campanulata, 4 - fidâ. *Stamina* 4, brevia. *Stigma* oblongum, 2 - fidum. *Capsula* didyma, coronata 4 calycis apicibus, 2 - locularis, polysperma. Habitat spontanea in Cochinchinâ.

Burm. Indiæ. pag. 33.

## GENUS XVI. OLDENLANDIA.

Charact. Gener. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-partitus, superus. *Capsula* 2-locularis, polysperma. Lin. sy. pl. G. 162.

Sp. 1. OLDENLANDIA REPENS. *Há Kim tsão.*

Differ. spec. Old. *capsulis* subfessilibus, hispidis: *foliis* lanceolatis. Lin. sp. 2.

Hab; & notæ. *Caulis* 10-pollicaris, cespitosus, herbaceus, ramosus, procumbens, geniculatus, repens. *Folia* linear-lanceolata, integerrima, glabra, opposita, sessilia. *Flos* albus, axillaris, solitarius: pedunculo brevissimo. *Corolla* campanulata, 4-fida. *Caps.* calycina, 2-locularis, polysperma, irregulariter dehiscens.

Habitat propè Cantonem Sinarum.

Crusta ollæ minima. Rumph. Amb. l. 9. c. 72. pag. 461. tab. 170. fig. 4. Burm. (Ind. p. 38. t. 15. f. 2.) folia repræsentat latiora, & totundata, quæ nobis visa sunt stricta, & acuta.

Sp. 2. OLDENLANDIA PANICULATA. *Co* naqc.

Differ. spec. Old. *pedunculis* paniculatis, terminalibus: *foliis* ovali-lanceolatis. Lin. sp. 7.

Hab; & notæ. *Caulis* herbaceus, multiplex, diffusus, sub-erectus, 6-pollicaris. *Folia* lanceolata, subfessilia, opposita, integerrima, glabra, sub-carnosa. *Flos* purpurascens: *paniculis* terminalibus, erectis: *pedunculo* communi longo. *Capsula* calycina, didyma, turbinato rotunda, 2-locularis, polyspermâ, calycis dentibus 4, acutis coronata.

Burm. Ind. p. 38. tab. 15. f. 1. Mollugo Zeylanica Sylvestris (Burm. Zeyl. p. 161. t. 71. f. 2.) quamvis flore similis nostræ appareat, foliis stellatis nullatenus convenit, dubitoque Oldenlandiam esse.

† Sp. 3. OLDENLANDIA ZANGUEBARÆ. γ . . .

Differ. spec. Old. *pedunculis* paucifloris: corollis hippocrateriformibus: *foliis* linearibus.

Hab; & notæ. *Caulis* 8-pollicaris, herbaceus, multiplex. *Folia* linearia, integerrima, glabra, sessilia, opposita. *Flos* purpureus, pedunculis erectis, paucifloris, terminalibus. *Corolla* hippocrateriformis, 4-partita. *Stigmate* lanceolato: *capsula* calycinâ, didyma, 2-loculari, polyspermâ. *Stamina* 4, brevia.

Habitat in orâ Zanguebariâ Africæ Orientalis.

Observ. Oldenlandiam 4-petalam nunquam vidi. Nec semper eam Linnæus agnoscit. Parvæ aliæ differentiæ, quæ occurunt, fortasse sufficientes non sunt, ut a Genere Hedyotë separetur.

## G E N U S XVII. G A L I U M .

Charact. Gener. *Cor.* 1 - petala plana. *Semina* 2 , subrotunda. Lin. sy. pl. G. 132.

Sp. 1. GALIUM TUBEROSUM.  $\alpha$  Hùynh tinh.  $\beta$  Hoàm Cím.  
Differ. spec. Gal. *foliis lanceolatis*, *quinariis*: *pedunculis congestis*, *axillaribus*.

Hab ; & notæ. *Caulis* herbaceus , sesquipedalis , rufus , procumbens , simplex : *radice* tubere oblongo , parvo , informi , albo , farinulento , eduli. *Folia* 4-5 - stellata , lanceolata , integerrima , glabra , glauca. *Flos* albus , 4 - fidus : *pedunculis* longiuliculis , 1 - floris , congestis , axillaribus. *Fructus* subrotundus , asper , 2 - spermus. Florem recentem non vidi.

Habitat cultum in agris Cochinchinæ , & Chinæ.

Uſus. Tubera eduntur cocta , vel integra , vel in farinam redacta. Cre-  
dunturque virtute Pulmonica gaudere , spiritus animales fovere , &  
phyſi laborantibus subvenire.

## G E N U S XVIII. S P E R M A C O C E .

Charact. Gener. *Cor.* 1 - petala , infundibuliformis. *Semina* 2 , biden-  
tata. Lin. sy. pl. G. 126.

$\dagger$  Sp. 1. SPERMACOCE FLEXUOSA.  $\alpha$  Dæi ruot gá.

Differ. spec. Sperm. *caule* flexuoso : *geniculis* fetosis : *foliis* ovato-  
lanceolatis , crassis.

Hab ; & notæ. *Caulis* fruticosus , subteres , longus , procumbens , fle-  
xibus multis implicatus , geniculis fetosis. *Folia* ovato-lanceolata ,  
integerrima , crassa , obligue striata , opposita. *Flos* albus , axillaris ,  
verticillis globosis : *calyx* 4-fido , supero , persistente : *corolla* 4-  
partitæ , laciniis oblongis , revolutis. *Capsula* 2 - locularis , 1 - sper-  
ma : *seminibus* 2 - cornibus.

Habitat in fruticetis , & ſepibus Cochinchinæ.

## G E N U S XIX. C R U C I A N E L L A .

Charact. Gener. *Cor.* 1 - petala , infundibulif. : tubo filiformi : limbo  
unguiculato. *Cal.* 2 - phyllus. *Semina* 2 , linearia. Lin. sy. pl. G. 133.

Sp. 1. CRUCIANELLA ANGUSTIFOLIA ?  $\beta$  Uei lin sien.  $\alpha$  Uy li-  
nh tien.

Differ.

Differ. spec. Cruc. foliis senis linearibus : floribus spicatis. Lin. sp. 1.  
 Hab ; & notæ. *Caulis* herbaceus , erectus , simplex , teres , testique-  
 dalis. *Folia* stellata 6 - 8 , liniari-lanceolata , integrerrima , glabra.  
*Flos* albus spicis oblongis , erectis , congestis , terminalibus.  
 Habitat in Chinâ. Florem non vidi , nisi pictum in Herbario sinico.  
 Rubia Angustifolia , spicata. C. Bauh. pin. 334. Rubeola angustiore fo-  
 lio. Tournef. Inst. p. 130. t. 50.  
 Virt. radicis apud indigenas habetur Calefaciens , Deobstruens , Ab-  
 stergens.

## G E N U S XX. F A G A R A .

Charact. Gener. *Cal.* 4 - fidus. *Cor.* 4 - petala. *Caps.* 2 - valvis , 1 -  
 sperma. Lin. sy. pl. G. 157.

Sp. 1. FAGARA PIPERITA.  $\alpha$  Cây Song : Hùynh lục.  $\beta$  Hòam liu.  
 Differ. spec. Fag. foliis crenatis. Lin. sp. 2.  
 Hab ; & notæ. *Frutex* magnus , erectus : *ramis* longis , sub-scanden-  
 tibus , aculeis multis , curvis , sparsis : *radice* lignosa , intus palli-  
 dâ , cortice suberofo , flavo , gustu acri , sub-aromatico. *Folia* ova-  
 ta , acuminata , crenata , nitida , odorifera , dorso spinosa , impari-  
 pinata , bi , trijuga. *Flos* terminalis , albus , rubro mixtus , racemo-  
 fus , pedunculis longis : *calyce* 4 - fido : *corolla* 4 - partitâ , obtu-  
 fâ , inferâ : *staminibus* 4 , corollæ subæqualibus. *Pericarpium* ca-  
 psula corticosa , subrotunda , 4 - loba , 4 - locularis , 1 - sperma : lo-  
 culis apice dehiscentibus : *seminibus* pedunculatis , exertis , com-  
 presso-rotundis , nigris , nitidis , solitariis.

Habitat in sepibus , & fruticetis Cochinchinæ.

Piper Japonicum Seo , & Sansjo. Kämpf. Amæn. p. 892. t. 893.

Thunb. (Japon. p. 64.) foliola memorat circiter 6 - juga cum impa-  
 ri. Kämpferus 4 , sive 5 - juga : petala vero 8 , lacinias calycis (ni  
 fallor) connumerans.

Usus : foliorum ad conditios cibos odore , & sapore grato , salu-  
 brique.

Virtus : radicis in Medicinâ. Calefaciens , Diaphoretica , Emmanago-  
 ga. Prodest in febribus ephemeris , & intermittentibus. Menses ,  
 lumbaginem , & dolores rheumaticos solvit : frequenti usu compro-  
 batia.

## † GENUS XXL LASIA.

## Descriptio Naturalis.

Col. Communis spatha subulata, contorta, colorata, longissima: proprius nullus. Receptaculum commune (spadix, si velis) totum florculis tectum, spathâ brevius.

Cor. Petala 4, carnosa, obtusa, concava, partes generationis constringentia.

Stam. Filamenta 4, plana, brevia, petalis conniventibus occulta. Antheræ binæ in quolibet filamento, rotundatæ, concavæ supra limbum corollæ prominentes.

Pist. Germen subrotundum, superum. Sylus nullus. Stigma subtruncatum.

Peric. Bacca parva, subrotunda, inæqualis, 1 - sperma.

Sem. Subrotundum.

Nom. (*Δεστος horridus*) Planta tota aculeis horrida.

Charact. Gener. *Receptaculum commune. Petala 4, carnosa, infera.*  
*Antheræ 2 in quolibet filamento. Bacca 1 - sperma.*

Sp. 1. LASIA ACULEATA. a Cu chaðc gai.

Differ. spec. Lasi. acaulis: *foliis pinnatifidis, aculeatis.*

Habitus. *Planta 6 - pedalis, acaulis. Folia magna, pinnatifida, petiolis teretibus, longis, erectis. Scapus nudus, foliis subæqualis, simplicissimus. Folia, petoli, scapus aculeis plurimis, curvis, brevibus, sparsis consita.* Habitat loca plana, & humida Cochinchinæ.

Observ. Affinitatem inter Lasiam, & Pothum Linnæi non ignoro. Sed cum Celeb. Vir plantas Ariformes ad Gynandriam amandaverit, quasi anomalas, quibus certus staminum numerus assignari nequeat (Gen. pl. 6 edit. pag. 459.) ego, qui in Lasiâ 4 stamina constanter observavi, eam propriæ classi Tetrandriæ indubius adscribo: & alias similes plantas propriis classibus inferendas existimo, quando certus locus illis assignari possit, quæ modo in Ginandriâ improprium occupant.

## † GENUS XXII. LEPTA.

## Descriptio Naturalis.

Cal. 4-partitus, patens, minimus: foliolis ovatis.  
 Cor. Petala 4, subtriangularia, sulcata, inflexa, calyce duplo longiora.  
 Stam. Filamenta 4, subulata, inflexa, ad angulos basis petalorum receptaculo inserta. Antheræ ovatæ, 2-locularis.  
 Pist. Germen superum, subrotundum, 4-falcatum. Stylus subnnullus. Stigma obtusum.  
 Peric. Bacca 4-loba: lobis ovatis, 1-spermis, versus centrum leviter coailitis, 1-spermis.  
 Sem. Subrotunda.

Nom. (*Δεπτός* minutus) a notabili minutie florum.

Charact. Gener. *Cal.* 4-partitus, inferus. *Cor.* petala 4, triangularia. *Bacca* 4-loba, 4-locularis, 1-sperma.

Sp. 1. LEPTA TRIPHYLLA. ✱ Cây Mát.

Differ. spec. Lep. *foliis ternatis: racemis* axillaribus.

Hab. *Arbor* 10 pedes alta, ramosissima. *Folia* 3-nata, lanceolata, integerrima, undulata, glabra. *Flos* albus minimus: *racemis* compotis, parvis, axillaribus. Habitat in sylvis Cochinchinæ.

## GENUS XXIII. PTELEA.

Charact. Gener. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-partitus, inferus. *Fructus* membrana subrotunda, centro monospermus. Lin. sy. pl. G. 159.

† Sp. 1. PTELEA OVATA. ✱ Cây hót man.

Differ. spec. Pt. *foliis ovatis, simplicibus: racemis* sparsis.

Hab; & notæ. *Arbuscula*, 4-pedalis, ramosissima. *Folia* ovata, utrinque obtusa, integerrima, glabra, alterna, parva. *Flos* albus, minusculus: *racemis* brevibus, sparsis. *Cal.* 4-partitus, inferus, minimus. *Corolla petala* 4, oblonga, patentia, coriacea. *Stamina* 4, subulata, brevia. *Pistillum* in flore recenti quæsivi, & non inveni: unde judicavi plantam esse Dioicam, cuius foeminam non vidi: sed quantum ex masculo decernere fas est, ad Pteleam pertinet. Tempus decebit.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

+ GE.

## + GENUS XXIV. HELICIA.

## Descriptio Naturalis.

Cal. Quadrifidus, minimus : laciniis, acutis, erectis.

Cor. Petala 4, linearia, spiraliter revoluta : ante maturascentiam florae in tubum gracilem leviter coalita.

Stam. Filamenta 4, filiformia, supra medium petalis insistentia. Antherae totidem lineares, apicem corollae aequantes.

Pist. Germen ovatum, superum. Stylus filiformis, aequalis staminibus. Stigma oblongum, teres.

Peric. Drupa ovata, parva : sulco longitudinali : nucleo simplici, ovato.

Nom. (Ἑλίξ spira) a petalis spiraliter revolutis.

Charact. Gener. Cal. 4-fidus inferus. Cor. petala 4, linearia, revoluta. Drupa ovata, 1-sulca.

Sp. 1. HELICIA COCHINCHINENSIS. α Cây Cỏm vàng.

Differ. spec. Hel. foliis ovatis, acuminatis : spicis subterminalibus.

Hab. Arbor mediocris : ramis expansis. Folia ovata, acuminata, aliqua ferrata, integerrima alia, omnia glabra, alterna. Flos luteus, racemis simplicibus, oblongis, subterminalibus.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

## GENUS XXV. CISSUS.

Charact. Gener. Bacca 1-spermu, cincta calyce, corollaque quadripartita. Lin. sy. pl. G. 153.

Sp. 1. CISSUS TRIFOLIATA. α Cây rát.

Differ. spec. Cif. foliis ternatis subrotundis, hirsutis, subdentatis : ramis membranaceo-angulatis. Lin. sp. 6.

Hab. & notæ. Caulis fruticosus, longissimus, ramosissimus, cirrhis scandens. Folia ternata, obtusa, inaequaliter dentata, aspera, basi obliquè truncata. Flos albus, axillaris, 4-partitus : racemis dichotomis. Bacca ovata, alba, 1-sperma, calyce cincta. Stamina 4. Funis Crepitans quartus. Rumph. Amb. I. 9. cap. 64. pag. 447.

Sp. 2. CISSUS VITIGINEA ? α Cây dau Xuong.

Differ. spec. Cif. foliis cordatis, subquinque-lobis, tomentosis. Lin. sp. 1.

Hab; & notæ. *Caulis* subfruticosus, teres, scandens cirrhis folio oppositis. *Folia* 3 loba, magna, denticulata, glabra, alterna, petiolata. *Flos* luteo-viridis, *racemis* cymosis axillaribus. *Cal.* sub-truncatus, brevis, persistens. *Cor.* petala 4, oblonga, carnosa erecta. *Filamenta* 4, subulata, corollâ breviora: *antheris* ovatis, 4-lobis. *Stylus* crassus, brevis: *stigmate* simplici. *Peric.* bacca subrotunda, 1-sperma.

Vitis Maderoapatanæ, folio subrotundo, & angulofo. Petiv. Mus. n. 696. Burm. Ind. pag. 35. Arbuscula baccifera vitagineo folio. Pluk. t. 337. f. 2.

Sp. 3 CISSUS QUADRANGULARIS. α Deei xanh vuong. γ . . .  
Differ. spec. Cif. *foliis* dentatis, carnosis: *caule* terragono, tumidiusculo. Lin. sp. 4.

Hab; & notæ. *Caulis* quadrangularis, perennis, longus, ramosus, glaber, viridis, articulatus, scandens, crassus, succosus. *Folia* cordata, obtusa, subdentata, crassiuscula, glabra, alterna, cirrhis simplicibus opposita. *Flos* albus, 4-partitus: *pedunculis* teretibus, polyfloris, sub-terminalibus. *Bacculæ* globoſæ, rubræ, polyspermæ. Habitat, & scandit arbores sylvestres in Indiâ. Vidi etiam prope Mzambicum in Africâ.

Funis Quadrangularis. Rumph. Amb. 7. cap. 45. pag. 83. tab. 44. fig. 2.  
Sælantus Quadragonos. Forsk. Arab. p. 33. n. II.

† Sp. 4. CISSUS UMBELLATA. β Yòng cõ loi.

Differ. spec. Cif. *foliis* ovatis, integerimis: *floribus* umbellatis.  
Hab; & notæ. *Caulis* fruticosus, volubilis, longus, ramosus. *Folia* ovata, integerrima, opposita, glabra. *Flos* albus: *umbellis* compotitis, terminalibus: *corollâ* campanulata, 4-fida, intus lanata: *calyce* truncato, cingente bacculam subrotundam, 1-spermam. Stamina 4.

Habitat Cantone Sinarum spontanea.

### † GENUS XXVI. ALIAS I A.

#### *Descriptio Naturalis.*

Cal. 1-phillus, inferus: tubo brevi: limbo 5-fido, laciinis subacutis, pilosis.

Cor. Supera, petala 4, subrotunda, pilosissima, concava, parva.

Stam. Filamenta 4, subulata, crassa, calyci subæqualia. Antheræ 2-lobæ, inversæ: lobis 2-locularibus.

Pist. Germen subrotundum, inter calycem, & corollam. Stylus sub

- latus, æqualis staminibus. Stigma acutum.

Peric. Bacca carnosæ, magna, oblonga, obtusa, glabra, pendula,  
2 - locularis, seminibus nidulantibus.

Sem. Compresio-ovata, tumida, plurima.

Nom. (*A'λλας lucanica*) a formâ, & colore fructus, crasso farci-  
mini similis.

Charact. Gener. *Bacca* seminibus nidulantibus. Germen inter *Cal.* 5 -  
fidum, & *corollam* 4 - petalam.

† Sp. 1. ALLASIA PAYOS. γ Muringuiringue.

Differ. spec. All. *foliis* 5 - phyllis : *pedunculis* polyfloris.

Hab. *Arbor* magna, ramis *patentibus*, inermibus. *Folia* digitata,  
5 - nata, ovalia, integerrima, pilosa : *petiolis* oppositis. *Flos* palli-  
dus, subterminalis, *pedunculis* polyfloris. *Bacca* rubro-fusca.

Habitat in orâ Africæ Orientali.

Jeracatia Brasiliana (Pilonis Bras. pag. 160.) quodammodo similis fo-  
liis, & fructu videtur.

Virtus. Cataplasma foliorum dorso infra renes impositum fæliciter par-  
tum promovet.

### + GENUS XXVII. COLUMELLA.

#### *Descriptio Naturalis.*

*Cal.* 1 - phyllus, subtruncatus, erectus, persistens.

*Cor.* Petala 4, longiuscula, acuta, incurva, erecta. Nectarium 4 -  
fulcum, erectum.

*Stam.* Filamenta 4, subulata, inflexa, corollâ breviora, calycis mar-  
gini insistentia, fulcis lateralibus nectarii adpressa. Anthereæ 2 - lo-  
culares, subrotundæ.

Pist. Germen calycinum, subrotundum. Stylus crassus, brevis. Stigma  
simplex.

Peric. Bacca subrotunda, 2 - locularis, 2 - sperma.

Sem. Hinc rotunda, inde angulata.

Nom. Ab antiquo de re rusticâ scriptor Gaditano.

Observ. A Ciilo, cui assimilatur, differt præcipue baccâ 2 - loculari,  
petalis acutis, staminibus margini calycis, nec nectario insistentibus.

Charact. Gener. *Bacca* calycina, 2 - locularis, 2 - sperma. *Stamina*  
*Cal.* margini insistentia. *Petala* 4, acuta.

Sp. 1.

Sp. 1. COLUMELLA PEDATA.  $\alpha$  Cây rát lourng.

Differ. spec. Col. *foliis* pedatis : *racemis* planis, dichotomis.

Hab. *Frutex* scandens, caule longo, tereti, cirrhofo, ramoso. *Folia* petiolato-pedata, ovata, crenata, tomentosa. *Flos* albus, recemis lateralibus, planis, dichotomis.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

### G E N U S XXVIII. T R A P A.

Charact. Gener. *Cor.* 4-petala. *Cal.* 4-partitus. *Nux* spinis 4, oppositis cincta, quæ calycis folia fuere. Lin. sy. pl. G. 165.

$\dagger$  Sp. 1. TRAPA COCHINCHINENSIS.  $\alpha$  Cây Aú.

Differ. spec. Tr. *nucibus* 2-cornibus : *foliis* rhombeo-oblongis, apice incisis.

Hab; & notæ. *Caulis* longus, teres, ramosus, fluctuans : *radiculis* longis, fasciculatis. *Folia* rhombeo-oblonga, basi integerrima, apice incisa, fusco-rubra, subtus tomentosa : *petiolis* longis, in medio tumescientibus, tumoribus ovato-oblongis. *Flos* lateralis, albus solitarius, pedunculis longis : *corollis* 4-petalis. *Cal.* 4-partitus, foliolis oblongis, inæqualibus, germen cingentibus. *Pericarpium* nux turbinata, sulcata, 2-pollicaris, nigra : cornibus duobus oppositis, recurvis, crassis, obtusis : nucleo simplici, subovato, sapore castaneæ simili.

Habitat, & fluctuat in paludibus Cochinchinæ.

Sp. 2. TRAPA CHINENSIS.  $\beta$  Kí xi : Leng cõ  $\alpha$  Linh thát.

Differ. spec. Tr. *nucibus* 2-cornibus : *foliis* quadratis sub-integerrimis.

Hab; & notæ. *Caulis* teres, rubescens, in aquis fluctuans : *ramis* paucis, *radiculis* longis, multis: *Folia* sub-quadrata, aliqua integerrima, subcrenata alia : *petiolis* longis, tumescientibus, sparsis. *Flos* solitarius, lateralis, albus. *Nux* rubro-fusca : cornibus binis, recurvis, longis, oppositis, subacutis. Fortasse est Varietas Trapæ Cochinchinensis, sed ab Europæa specie differens.

Habitat fluctuans prope Cantonem Sinarum.

Linn. Jun. suppl. plant. p. 128. *Trapa Bicornis.*

### G E N U S XXIX. S A N T A L U M.

Charact. Gener. *Cor.* 4-petala : petalis calyci innatis, præter glandulas quatuor. *Cal.* 4-dentatus. *Bacca* infera, 1-sperma. Lin. sy. pl. G. 169.

Sp. 1.

Sp. 1. SANTALUM ALBUM. & Cây hùynh dàn : Bach dàn & Tân yám.  
Differ. spec. Sant. *foliis imparipinnatis*, ovato-lanceolatis.

Hab ; & notæ. *Arbor magna* : *ramis subpatentibus* : *cortice tenui*,  
*cinereo*, *glabro* : *ligno pallidè luteo*, *æqualissimo*, *gravi*, *duro*,  
*odorifero*. *Folia impari-pinnata*, *sub-6 juga* : *foliolis ovato-lanceo-*  
*latis*, *integerrimis*, *glabris*, *petiolatis*. *Bacca ovata*, *1-sperma*,  
*parva*, *fusca*. *Flores* non observavi : vidi autem *sæpe* viventes ar-  
bores in *Đoàng nai*, provinciâ Australiori Cochinchinæ, sitâ ad 10  
gradus latitudinis Borealis, quæ eadem fere est latitudo insulæ Ti-  
moræ, unde maxima copia Santali a Lusitanis mercatoribus expor-  
tatur. *Santalum Malabaricum*, quod emi solet im portu Calecut,  
ubi antea fuerat Regis Samorini metropolis, est Timorensi minus,  
vix femur crassum, sed odore, & virtute excellit, ideoque cariori  
pretio venditur Sinensibus, & aliis mercatoribus. *Santalum Cochinchinense*, sicut crassitie est omnium maximum, ita odore debilius,  
nec sufficiens æqualiter aptum. *Santali Albi*, & *Citrini* eadem est  
origo, nequid varietate differt utriusque arbor.

Garcias ab Horto, Aromatum l. 1. cap. 17. benè scripsit de Santalo.  
Bona est etiam descriptio, & figura Rumph. Amb. l. 2, c. 16. tab.  
II. Sed flores nec pingit, nec describit.

Virtus in Medicina : ligni, maximè Citrini. Resolvens, Diaphoretica,  
Cardiaca. Interius sumptum sanguinem purificat, tollit anxietates  
febriles : exterius tumores resolvit, scabiem purgat.

Uſus œconomicus : præter gratissimum odorem, quem vestibus, &  
aliis rebus tenaciter conciliat, fieri solent ex maioribus arboribus  
elegantes sarcophagi, quibus magnatum corpora sepeliuntur, in lon-  
gissimos annos incorrupti permanſuri.

### GENUS XXX. SALVATORA.

Charact. Gener. *Cal. 4-fidus*. *Cor. o.* *Bacca 1-sperma*. *Semen aril-*  
*lo vestitum*. Lin. sy. pl. G. 175.

† Sp. 1. SALVADORA CAPITULATA. & Cây dúoi.

Differ. spec. Salv. *foliis ovatis*, *acuminatis* : *capitulis axillaribus*.  
Hab ; & notæ. *Arbor mediocris*, *ramosissima*. *Folia ovata*, *acumina-*  
*ta*, *inæqualiter serrata*, *asperrima*, *alterna*, *sub-petiolata*. *Flos axil-*  
*laris* : *capitulis sub-8 floris*, *pedunculo communi longo*, *partialibus*  
*brevisimis* : *calyce 4, 5-partito*, *infero*, *persistente* : *Cor. nullâ*.  
*Stamina 4*, *subulata*, *reflexa*, *calyce duplo longiora*. *Stigma 2-*  
*fidum*, *in aliquibus duplex*. *Bacca lutea*, *subrotunda*, *parva*, *apice*  
*didyma*, *1-locularis*, *1-sperma* : *femine arillato*.

Sp. 2.

Sp. 2. SALVADORA BIFLORA.  $\alpha$ . Cây dúoi.

Differ. spec. Salv. *foliis* lanceolato-ovatis : *floribus* geminis.  
Hab ; & notæ. *Arbor* 10 - pedalis : *ramis* multis , tortuosis , patentibus. *Folia* lanceolato-ovata , subserrata , aspera , alterna. *Flos* axilris , 2 - natus , pedunculis longis : *calyce* 4 - partito : *corollā* nullā : *stylo* 2 - fido , stigmatibus simplicibus. *Bacca* lutea , 2 - loba , 1 - sperma , edulis : *semine* subrotundo , non arillato.

Habitat utraque species ad sepes , & in sylvis Cochinchinæ : nec satis una ad alia dignoscitur , nisi floreant.

+ GENUS XXXI. LAGENULA.

*Descriptio Naturalis.*

Cal. Parianthium quadriphyllum , inferum , persistens : foliolis ovato-oblongis , reflexis.

Cor. nulla. Nectarium 4 - lobum , carnosum , erecto-convivens.

Stam. Filamenta 4 , subulata , calyci æqualia. Antheræ ovatæ , in-cumbentes.

Pist. Germen nectario occultum. Stylus crassus , brevior staminibus. Stigma simplex.

Peric. Bacca parva , lagenæformis , collo constricto , bilocularis , bis-perma.

Sem. Hinc convexa , inde angulata.

Nom. a formâ baccæ lagenariâ.

Charact. Gener. Cal. 4 - phyllus , inferus. Cor. o. Bacca 2 - locularis , 2 - sperma.

† Sp. 1. LAGENULA PEDATA.  $\alpha$ . Cây rát nhô lá.

Differ. spec. Lag. *foliis* quinato-pedatis : racemis subdivisis.

Hab. Frutex mediocris , inermis : caule scandente , cirrhofo , ramoso. Folia pedata : foliolis 5 - natis , ovatis , crenatis , tomentosis.

*Flos* albo-viridis , sub-terminalis : racemis patulis , subdivisis.

Habitat in montibus Cochinchinæ.

+ GENUS XXXII. CREODUS.

*Descriptio Naturalis.*

Amentum filiforme : squamis acutis , parvis , flores sustinentibus.

Cal. Perianthium monophyllum , 3 - lobum , carnosum , fessile , amentum lateraliter semiamplexens : lobis acutis , gibbis medio maiore.

Cor.

COR. Nulla.

Stam. Filamenta nulla. Antheræ 4, oblongæ, 2-loculāres: duæ superiores minores, lobo calycis medio lateraliter adhærentes: duæ aliæ inferiores, singulæ singulis lobis minoribus ad latus appositæ.

Pist. Germen ovatum, inferum. Stylus nullus. Stigma obtusum.

Peric. Bacca ovata, 1-sperma, minima.

Sem. Unicum, subrotundum.

Nom. (Κρεωδης carnosus) a flore carnofo, tumido.

Charact. Gener. Cal. 3-partitus, supetus. Cor. o. Stamina lateralia. Bacca 1-sperma.

† Sp. 1. CREODUS ODORIFER. & Hoa sōi.

Differ. Spec. Cre. foliis lanceolatis, oppositis: amentis congestis, subterminalibus.

Hab. Frutex 6-pedalis, lignosus, erectus: ramis longis, debilibus, sub-scendentibus, inermibus. Folia lanceolata, ferrata, glabra, opposita, petiolata. Flos luteus, parvus, suaveolens: spicis linearibus, longis, reflexis, congestis, subterminalibus.

Habitat in hortis Cochinchinæ, culta ob gratum floris odorem.

Observ. Dubitavi, essetne Bunius Sativa? Rumph. Amb. I. 5. cap. 49. tab. 131. Sed illa, prout a Linnæo dicitur stilago, & classe, & genere diversa omnino planta est: quamvis similiter notetur calyx 3-lobo, corollâ nullâ.

### GENUS XXXIII. ELÆAGNUS.

Charact. Gener. Cor. nulla. Cal. 4-fidus, campanulatus, superus.

Drupa infra calycem. Lin. sy. pl. G. 168.

Sp. 1. ELÆAGNUS LATIFOLIA. β Ρα poi tsū.

Differ. Spec. El. foliis ovatis. Lin. sp. 4.

Hab; & notæ. Caulis fruticosus, erectus, 3-pedalis, inermis, ramosus. Folia ovata, integerima, tomentosa, alterna. Flos lateralis, albus: pedunculis 1-floris, polynatis. Cal. 4-fidus superus.

Cor. o. Drupa parva, ovata, 1-sperma.

Habitat in Chinâ spontanea, prope Cantonem.

Eleagnus foliis rotundis, maculatis. Burm. Zeyl. p. 92. t. 39. f. 2.

## † GENUS XXXIV. OCTARILLUM.

## Descriptio Naturalis.

Cal. Nullus.

Cor. Monopetala, hippocrateriformis, supera : tubo 4-gono, brevi : limbo 4-partito, lacinias acutis, carnosis.

Stam. Filamenta 4, brevissima, ori tubi insistentia. Antheræ oblongæ, 2-loculares, incumbentes.

Pist. Germen oblongum. Stylus turbinatus, longior staminibus. Stigma crassiusculum.

Peric. Bacca oblongo-ovata, aquosa, 1-sperma.

Sem. 1. oblongum, arillatum membranâ tenaci, octogonâ.

Nom. Octarillum ab arillo feminis octogono.

Charact. Gener. Cor. hippocrateriformis, 4-fida, supera. Cal. o. Stamen baccæ arillo octogono.

## † Sp. 1. OCTARILLUM FRUTICOSUM. α Cây nhút.

Differ. spec. Oct. foliis lanceolatis, alterius : pedunculis axillaribus, solitariis.

Hab. Frutex lignosus, magnus, erectus : ramis scandentibus, inermibus. Folia lanceolata, glabra, integerrima, alterna. Flores albus, pedunculis 1-floris, solitariis, axillaribus. Bacca rubra.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

## GENUS XXXV. DORSTENIA.

Charact. Gener. Receptaculum commune 1-phylum, carnosum, in quo semina solitaria nidulantur. Lin. sy. pl. G. 166.

## Sp. 1. DOSRTENIA CHINENSIS. β Pě chi α Bạch chi?

Differ. spec. Dorst. Pedunculis caulinis : petiolis 3-5-phyllis.

Hab ; & notæ. Radix fusiformis, 3 pollices longa, intus, & foris albicans. Caulis perennis, suberectus, teres, simplex albidans. Folia 3-5-nata, lanceolata, integerrima, glabra, petiolo communi longo. Receptaculum florum laterale, carnosum, subovale : flosculis multis ad apicem exertos : calyce infundibuliformi, 3-dentato. Florem recentem non obtinui : vidi pictum in herbario Sinensi, & hâc plantâ frequenter usus sum in Medicinâ.

Habitat in provinciis Borialibus imperii Sinensis.

Virtus. Radicis Aromaticæ. Cephalica, Antifebrilis, Alexiteria. Fluxum menstruum promovet, album cohibet, pruritum sedat.

TE-

## TETRAGYNIA.

## GENUS XXXVI. ILEX.

Charact. Gener. *Cal.* 4 - dentatus. *Cor.* rotata. *Stylus* o. *Bacca* 4 - sperma. Lin. sy. pl. G. 184.

Sp. i. ILEX AQUIFOLIUM. a  $\hat{\textcircled{O}}$  rô cây.

Differ. spec. II. *foliis* ovatis, acutis, spinosis. Lin. sp. i.

Hab; & notæ. *Arbor* mediocris, cortice glabro, ramis patentibus, inermibus. *Folia* oblongo-ovata, acuta, sinuato-plicata, margine undique spinosa, glabra, alterna, petiolata, colore fusco-viridi, ubique homogeneo. *Flos* pallidus, pedunculis axillaribus, paucifloris. *Cor.* 4 - fida. *Bacca* subrotunda, nigra, 4 - sperma.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

*Ilex* aculeata baccifera. C. Bauh. Pin. p. 425. n. 5. *Aquifolium* Matth.

Diosc. l. 1. cap. 104. fig. ibi. Koo-kots. Kämpf Japon. p. 781.

Virtus. Emolliens, resolvens externè applicita.

## + GENUS XXXVII. TETRADIUM.

## Descriptio Naturalis.

*Cal.* Perianthium 4 - phylum, patens, inferum, minimum, persistens: foliolis acutis.

*Cor.* Petala 4, ovata, incurva, sub-erecta, calyce longiora.

*Stam.* Filamenta 4, crassa, subulata, pilosa, corollæ æqualia. Antheræ ovatæ, 2 - loculares, stantes.

*Pist.* Germen subrotundum, 4 - lobum. Stylus nullus. Stigmata 4, subulata, erecta.

*Peric.* Capsulæ 4, subrotundæ, 1 - spermæ, apice dehiscentes.

*Sem.* subrotunda, nitida, arillata.

Nom. (*Tετραδίων* quaternio) a quadruplici fructu, *Cal.*, *Cor.*, & fidam.

Charact. Gener. *Cal.* 4 - phyllus, inferus. *Petala* 4. *Capsulae* 4, 1 - spermæ: *semine* arillato.

Sp. i. TETRADIUM TRICHOTOMUM. " Cây dâu deau.

Differ. spec. Tetr. *foliis* pinnatis: *racemis* trichotomis.

M ii

Hab;

302 TERTANDRIA. TETRAGYNIA.

Hab; & notæ. *Arbor* mediocris, ramis ascendentibus. *Folia* impari-pinnata, lanceolata, glabra, integerrima. *Flos* albicans, racemis vastis, trichotomis, sub-terminalibus.

Habitat in montibus Cochinchinæ.

GENUS

MUMOMUM

Planta arborea, ramosa, foliis pinnatis.

Fructus sphaerici, pericarpio leviter rugosum, pulchrum, subnitidum.

Semina nigra, leviter rugosum, pulchra, subnitida, leviter rugosa.

Pericarpium pulchrum, subnitidum, leviter rugosum.

Fructus sphaericus, pulcherrimus, leviter rugosus, pulcherrimus.

Pericarpium pulchrum, subnitidum, leviter rugosum.

Nom. (Tetradia) (ar. dilatatum) à antiquo nōn regi, Citt. Citt. & genit.

Citt. Citt. Citt. & bivalvis, interius levius, exalat.

TETRADIA MUMOMUM. CLAS.

CLAS.

M II

CLASSIS V.  
PENTANDRIA.  
MONOGYNIA.

\* *Flores monopetalii, inferi, gymnospermi.*

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. MIRABILIS.    | <i>Cor. infundibuliformis. Nucula infera corollam.</i>                        |
| + 2. CYATHULA.   | <i>Cor. cyathiformis. Semen 1, oblongum.</i>                                  |
| 3. ECHIUM.       | <i>Cor. fauce nudâ, irregularis, campanulata. Semina 4.</i>                   |
| 4. HELIOTROPIUM. | <i>Cor. face nudâ, hippocrateriformis: lobis dente interjectis. Sem. 4.</i>   |
| 5. ANCHUSA.      | <i>Cor. fauce fornicatâ, infundibuliformis: tubo basi prismatico. Sem. 4.</i> |

\*\* *Flores monopetalii, inferi, angiospermi.*

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 6. PRIMULA.     | <i>Caps. 1 - locularis. Cor. infundibulif. fauce pervia. Stigma globosum.</i>       |
| 7. HOTTONIA.    | <i>Caps. 1 - locularis. Cor. tubus infra stamina. Stigma globosum.</i>              |
| 8. MENYANTHES.  | <i>Caps. 1 - locularis. Cor. villosa. Stigma 2 - fidum.</i>                         |
| 9. CONVOLVULUS. | <i>Caps. 2 - locularis, 2 - sperma. Cor. campanulata. Stigma 2 - fidum.</i>         |
| 10. DATURA.     | <i>Caps. 2 - locularis, 4 - valvis. Cor. infundibulif. Stigma 2 - fidum.</i>        |
| 11. NICOTIANA.  | <i>Caps. 2 - locularis, 2 - valvis. Cor. infundibuliformis. Stigma emarginatum.</i> |
| 12. IPOMEA.     | <i>Caps. 3 - locularis. Cor. infundibuliformis. Stigma capitatum.</i>               |

13. AZA-

13. AZALEA. *Caps. 5 - locularis. Cor. campanulata; stigma obtusum.*
- † 14. CAMPYLOUS. *Caps. 5 - locularis. Cor. bilabiata. Stigma 5 - lobum.*
15. CEROPEGIA. *Folliculi 2. Cor. limbo connivente. Sem. papposa.*
16. NERIUM. *Folliculi 2. Cor. fauce coronata. Semina papposa.*
17. PLUMIERIA. *Folliculi 2, refracti. Cor. infundibuliformis. Sem. alata.*
18. TABERNÆMONTANA. *Folliculi 2, pulposi. Cor. hippocraterif. Sem. simplicia.*
19. VINCA. *Folliculi 2, erecti. Cor. hippocraterif. Sem. simplicia.*
- † 20. THELA. *Bacca 1 - sperma. Cor. hippocraterif. Stigma 5 - partitum.*
- † 21. ATHRUPHYLLUM. *Bacca 1 - sperma. Cor. campanulata. Stigma simplex.*
- † 22. PYRGUS. *Bacca 1 - sperma. Cor. rotata. Stigma simplex.*
- † 23. ROTULA. *Bacca 4 - sperma. Cor. rotata. Stigma emarginatum.*
24. TOURNEFORTIA. *Bacca 4 - sperma, apice pertusa. Sem. 2 - locularia.*
25. SIDEROXYLON. *Bacca 5 - sperma. Cor. 10 - fida : laciniis interioribus conniventibus.*
- † 26. ONCINUS. *Bacca polysperma. Cor. infundibulif. uncinata. Stigma simplex.*
- † 27. DARTUS. *Bacca polysperma. Cor. campanulata, tubo globofo. Stigma simplex.*
28. CARISSA. *Bacca polysperma. Cor. hypocraterif. Stigma emarginatum.*
29. STRYCHNOS. *Bacca polysperma, pulposa : *seminibus* orbiculatis. Stigma capitatum.*

30. IGNATIANA. *Bacca polysperma exsucca : semiuibus trigono-ovatis. Stigma 2-partitum.*
- † 31. RAPINIA. *Bacca 2-locularis. Cor. Cyathiformis. Calyx 8-partitus.*
32. CAPSICUM. *Bacca 2-locularis, exsucca. Antheræ conniventes.*
33. SOLANUM. *Bacca 2-locularis. Antheræ 2-perforatae.*
34. PHYSALIS. *Bacca 2-locularis : calyce inflato. Antheræ approximatae.*
35. LYCIUM. *Bacca 2-locularis. Stamina villis fuscem claudentia.*
- † 36. ARGYREIA. *Bacca 4-locularis, 1-sperma. Cor. plicata. Cal. coloratus.*
- † 37. CERIUM. *Bacca cellulis plurimis, 1-spermis. Cor. campanulata.*
38. CERBERA. *Drupa 1-sperma. Cor. infundibuliformis. Stigma obtusum.*
39. TECTONIA. *Drupa intra calycem inflatum. Stigma dentatum.*
- † 40. DISSOLENA. *Drupa, nuce scabri. Cor. tubus biforis. Stigma ovatum.*
41. VARRONIA. *Drupa, nuce 4-loculari. Stigma quadruplex.*
- \*\*\* *Flores monopetalii, superi.*
42. PHYTEUMA. *Caps. 2-3-locularis, perforata. Cor. 5-partita. Stigma 2-3-fidum.*
43. CAMPANULA. *Caps. 2-5-locularis, perforata. Cor. campanulata. Stigma 3-fidum.*
44. MORINDA. *Bacca 1-sperma aggregata. Cor. infundibulif. Stigma 2-fidum.*
45. NAUCLEA. *Bacca 1-sperma, aggregata. Cor. 5-fida. Stigma obovatum.*

- † 46. DASUS. *Bacca* 1 - sperma. *Cor.* campanulata.  
*Stigma* 5 - fidum.
- † 47. HELIXANTHERA. *Bacca* 1 - sperma. *Cor.* infundibulif., reflexa. *Antheræ* spirales.
- † 48. AIDIA. *Bacca* 1 - sperma. *Cor.* hipocraterif., fauce lanosâ. *Antheræ* lineares.
- † 49. ANTHONURA. *Bacca* 2 - sperma. *Cor.* rotata. *Antherae* caudatæ.
50. COFFEA. *Bacca* 2 - sperma : feminibus arillatis. *Cor.* hippocraterif. *Stigma* 2 - partitum.
- † 51. DYSODA. *Bacca* polysperma. *Cor.* laciniis 3 - fidiis. *Stigma* 2 - fidum.
- † 52. STIGMANTHUS. *Bacca* polysperma. *Cor.* infundibulif. *Stigma* maximum.
53. GARDENIA. *Bacca* 2 - locularis, polysperma. *Cor.* infundibuliformis. *Cal.* laciniis enciformibus, verticalibus.
54. GENIPA. *Bacca* 2 - locularis, subrotunda. *Cor.* rotata. *Stigma* clavatum.
55. LONICERA. *Bacca* 2 - locularis, subrotunda. *Cor.* inæqualis. *Stigma* capitatum.
- † 56. OXICEROS. *Bacca* 2 - locularis, polysperma. *Cor.* hippocraterif. *Antheræ* lineares.
57. MUSSÆNDÆ. *Bacca* 4 - locularis, oblonga. *Cor.* infundibulif. *Stigma* 2 - partitum.
- \*\*\*\* *Flores polypetali, inferi.*
- † 58. TRIPHASIA. *Bacca* 1 - sperma. *Petala* 3. *Cal.* 3 - dentatus.
- † 59. BOTRIA. *Bacca* 1 - sperma. *Petala* 5, acuta. *Cal.* 5 - crenatus. *Filamenta* plana, petalis inserta.
- † 60. PENTALOBA. *Bacca* 5 - sperma, 5 - loba. *Petala* 5, campanulata. *Stylus* pilosus.

61. VITIS. *Bacca* 5 - sperma. *Petala* sæpe emarginato-connata. *Stylus* nullus.
- † 62. CALISPERMUM. *Bacca* 1 - locularis : feminibus niduantiibus. *Petala* 5, ovata. *Stamina* petalis inserta.
63. EVONYMUS. *Bacca* capsularis, lobata. *Cal.* patens. *Semina* baccato-arillata. *Petala* 5, oblonga.
- † 64. TRALLIANA. *Bacca* 2 - locularis, 2 - sperma. *Petala* 5, reflexa. *Nectarium* 10 - crenatum.
65. RHAMNUS. *Drupa* locularis. *Calyx* corollinus : squamis 5, convergentibus.
66. MANGIFERA. *Drupa* carnosa. *Cor.* petalis 5, lanceolatis. *Nucleus* fibrosus.
67. CEDRELA. *Capsula* 3, 5 - locularis, lignosa. *Cor.* receptaculo unita. *Semina* alata.
68. DIOSMA. *Capsula* 5 - plex. *Nectarium* germen coronans. *Sem.* arillata.
- \*\*\*\*\* *Flores pentapetalii, superi.*
69. PLECTRONIA. *Bacca* 2 - sperma. *Cal.* unguibus clavatis. *Antheræ* geminatæ, inclusæ.
- \*\*\*\*\* *Flores incompleti, inferi.*
70. ILLECEBRUM. *Caps.* 1 - sperma, 5 - valvis. *Cal.* simplex, rufus.
71. CELOSIA. *Caps.* 3 - sperma. *Cal.* exterior triphyllus, coloratus.
- † 72. POLIA. *Caps.* 1 - locularis, polysperma, 3 - valvis. *Cal.* 10 - phyllus.

## DIGYNIA.

\* *Flores monopetalii, inferi.*

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 73. STAPELIA.   | <i>Folliculi 2. Nectarium stellatum.</i>                                 |
| 74. CYNANCHUM.  | <i>Folliculi 2. Nectarium cylindricum.</i>                               |
| 75. PERIPLOCA.  | <i>Folliculi 2. Nectaria 5, filiformia.</i>                              |
| 76. APOCYNUM.   | <i>Folliculi 2. Cor. campanulata : nectariis glandulosis 5, fetis 5.</i> |
| 77. PERGULARIA. | <i>Folliculi 2. Cor. hippocraterif. : nectariis 5, sagittatis.</i>       |
| 78. ASCLEPIAS.  | <i>Folliculi 2. Cor. reflexa : nect. 5, auriformibus, unguiculatis.</i>  |
| † 79. GRAMMICA. | <i>Bacca 4 - sperma. Cor. campanulata : tubo globoſo.</i>                |
| 80. GENTIANA.   | <i>Caps. 1 - locularis, 2 - valvis. Cor. tubulosa, indeterminata.</i>    |
| 81. HYDROLEA.   | <i>Caps. 2 - locularis, 2 - valvis. Cor. rotata.</i>                     |

\*\* *Flores pentapetalii, inferi.*

- |               |   |
|---------------|---|
| † 82. AGLAIA. | <i>Bacca 1 - sperma. Cor. globoſo-clausa.</i> |
|---------------|---|

\*\*\* *Flores incompleti.*

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 83. SALSOSA.      | <i>Semen 1, cochleatum, teclum. Cal. 5 - phyllus.</i>                                  |
| 84. CHENOPODIUM.  | <i>Semen 1, orbiculare. Cal. 5 - phyllus : foliolis concavis.</i>                      |
| 85. BETA.         | <i>Semen 1, reniforme. Cal. 5 - phyllus, basi semen fovea.</i>                         |
| 86. GOMPHRENA.    | <i>Caps. 1 - sperma, circumscissa. Cal. 2 - phyllus, compressus, coloratus.</i>        |
| † 87. TRISANTHUS. | <i>Caps. 2 - locularis. Cal. com. 2 - phyllus, 3 - florus : proprius 5 - dentatus.</i> |

88. BO-

88. BOSEA.

*Bacca 1 - sperma. Cal. 5 - phyllus.*\*\*\*\* *Flores penlapetali, superi, dispermi: Umbellatæ.*A. *Involucro universali, partialique.*

89. HYDROCOTYLE.

*Flores subumbellati, fertiles. Semina compressa.*

90. CAUCALIS.

*Flores radiati, abortivi. Involucrum simplex. Sem. muricata.*

91. DAUCUS.

*Flores radiati, abortivi. Involucrum pinatum. Semina hispida.*

92. ATHAMANTA.

*Flores flosculosi, fertiles. Petala cordata. Semina convexa, striata.*

93. SIUM.

*Flores floscul. fertiles. Petala cordata. Semina subovata, striata.*

94. BUBON.

*Flores floscul. fertiles. Petala planiuscula. Involucrum 5 - phylum.*

95. LIGUSTICUM.

*Flores floscul. fertiles. Petala involuta. Involucra membranacea.*B. *Involucris partialibus: universali nullo.*

96. CORIANDRUM.

*Flores radiati, abortivi. Fructus subglobosi.*C. *Involucro nullo: nec universali, nec partialibus.*

97. ANETHUM.

*Flores flosculosi, fertiles. Sem. marginata, striata.*

## T R I G Y N I A.

\* *Flores superi.*

98. SAMBUCUS.

*Cor. 5 - fida. Bacca 3 - sperma;*

## \*\* Flores inferi.

99. SAROTHRA. *Cor. 5 - petala. Caps. 1 - locul., colo-  
rata. Cal. 1 - phyllus.*
100. TAMARIX. *Cor. 5 - petala. Caps. 1 - locul. Semi-  
na papposa.*
101. RHUS. *Cor. 5 - petala. Bacca 1 - sperma.*
102. BASELLA. *Cor. 6 - fida. Bacca 1 - sperma, 4 - loba.*
- ‡ 103. TRICEROS. *Cor. 6 - petala. Bacca 3 - locul., 3 -  
cornis.*
104. PHARNACEUM. *Cor. nulla. Caps. 3 - locularis. Cal. 5 -  
phyllus.*

## PENTAGYNIA.

105. CRASSULA. *Cor. 5 - partita, infera. Caps. 5, po-  
lyspermæ.*
106. DROSERA. *Cor. 5 - petala, infera. Caps. 1 - locula-  
ris, apice dehiscens.*
107. ARALIA. *Cor. 5 - petala, supera. Bacca 5 - sper-  
ma.*

## MONOGYNIA.

## GENUS I. MIRABILIS.

Character Genericus. *Cor.* infundib., supera. *Cal.* inferus. *Nectarium* globosum, germen includens. Lin. sy. pl. G. 259.

Sp. 1. MIRABILIS JALAPA.  $\alpha$  Hoa phán.  $\beta$  Jén chí hōa.

Differ. spec. Mir. *floribus* congestis, terminalibus, erectis. Lin. sp. 2.  
Hab; & notæ. *Herba* perennis, 3-pedalis, multiplex: *ramis* longis, geniculatis, rubris, diffusis, nunc sparsis, nunc dichotomis. *Folia* cordata, acuta, integerrima, glabra, opposita, petiolata. *Flos* congestus, terminalis, erectus, rubro-purpureus, nitidus, inodorus. *Cal.* 5-phyllus, inflatus, brevis, acutus. *Corolla* tubo longo, superius ampliato: limbo patente, plicato, leviter 5-fido. *Filamenta* 5, filiformia, corollam superanthia: *antheris* subrorundis. *Stylus* æqualis staminibus: *stigmata* globoſo, punctato. *Fruclus* nucula 5-gono-rotunda, rugosa, media inter calycem, & corollam: nucleo simplici, rotundo, albo, farinulento.

Habitat in Cechinchinâ, & Chinâ: vidi etiam in Africâ.

Rumph. Amb. l. 8. c. 51. tab. 89. Jalapa officinarum, fructu rugoso.

Tournef. Inst. p. 130. tab. 50. Pif. Brasil. c. 44. fig. pag. 208.

Virt. radicis. Hydragoga, Purgans. Valet imprimis ad aquam evacuandam in hydrope anasarcâ.

Observ. Hæc radix non est apta ad Medecinam, nisi per aliquot annos in vivâ plantâ senescat: tuncque sit subrotunda, rugosa, exteriorius sub-nigra, intus fusco-pallida, circulis concentricis, nigricantibus distincta. Non dubito, quod convolvulus a Linnaeo dictus Jalapa, imo aliæ convolvuli species simul habeant virtutem Purgantem: sed antiquiorum auctoritate, simulque experientia propriâ ductus assero Mirabilem Jalapam vulgarem esse Jalapam officinarum. Alias Mirabilis species non observavi: puto autem eas aliquam virtutem purgantem similiter possidere, quamvis fortasse debiliorem.

## † GENUS II. CYATHULA.

## Descriptio Naturalis.

*Cal.* Perianthium 8-phyllum, inferum, bino ordine: inferiore 3-phylo: superiore 5-phylo: foliolis omnibus tubulatis, erectis.

*Cor.* Petalum 1, integrum, cyathiforme, pellucidum, calyce superiore brevius.

Stam.

Stam. Filamenta 5, filiformia, tenuissima, corollâ longiora. Anthæ bilocularis, longiusculæ, incumbentes.

Pist. Germen turbinatum. Stylus brevior staminibus. Stigma crassiusculum, polyfidum.

Peric. Nullum, præter calycem conicè clausum, fovventem semen.

Sem. 1, oblongum, teres, æquale.

Nom. Cyathula a corollâ cyathiformi.

Charact. Gener. *Cal.* 8-phyllus, inferus. *Cor.* cyathiformis. *Semen* 1, oblongum.

† Sp. 1. CYATULA GENICULATA.  $\alpha$  Cò xuâc: Nguu tát.  $\beta$  Niêu s. Differ. spec. Cyat. caule geniculato, diffuso: *spicis* longis, terminalibus.

Hab. *Caulis* herbaceus, perennis, 3-pedalis, suberectus, geniculatus, striatus: *ramis* brachiatis, patentibus: *radice* subdivisa, longâ, sœpe repente. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, tomentosa, opposita: petiolis rubris. *Flos* albo-violaceus: *spicis* longis, filiformibus, terminalibus. *Calyx* foliolis omnibus duriusculis, uniformibus, nec coloratis.

Habitat in Cochinchinâ. In Sinis inveniuntur duæ plantæ, quæ eodem nomine dignoscuntur. Has ego non vidi, nisi pictas in Herbario Sinensi: adeoque dubius mansi, an ad idem genus pertineant. Una illarum similem habitum portat, videturque tam genere, quam specie cum Cochinchinensi convenire, quam recentem sœpe examinavi.

Virt. radicis. Refolvens, Attenuans, Deobstruens, Diuretica, Emmenagoga. Convenit præcipue in lumbagine, doloribus rheumaticis, paralysi, artuum debilitate, obstructionibus hepatis, vel uteri.

Obser. Aurem caninam vocavit Rumph. Amb. I. 10. c. 19. t. 11. Linnaeus Achyranthem postratam dixit: cum quo convenire licebit, si corolla violacea, pellucida mihi visa Nectarium vocetur.

### GENUS III. ECHIUM.

Char. Gener. *Cor.* irregularis: *fauce* nudâ. Lin. sy. pl. G. 203.

Sp. 1. ECHIUM VULGARE.  $\alpha$  Cây lo buòn.  $\beta$  . . .

Differ. spec. Ech. caule tuberculato-hispido: *foliis* caulinis lanceolatis, hispidis: *floribus* spicatis, lateralibus. Lin. sp. 7.

Hab; & notæ. *Caulis* 2-pedalis, erectus, teres, crassus hispidus: *ramis* paucis. *Folia* lanceolata, integerrima, hirsuta, albicantia, alterna. *Flos* purpurascens, *spicis* patentibus lateralibus.

Bauh. Pin. p. 254. Hill. Brit. herb. p. 388. tab. 55.

## GENUS IV. HELIOTROPIUM.

Char. Gener. *Cor.* hippocrateriformis, 5-fida, interjectis dentibus: fauce nudâ Lin. sy. pl. G. 191.

Sp. 1. HELIOTROPIUM INDICUM.  $\alpha$  Cây bòi boi.

Differ. spec. *Hel. foliis* cordato-ovatis, acutis, scabriusculis: *spicis* solitariis: *fructibus* 2-fidis. Lin. sp. 2.

Hab; & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 1-pedalis, crassiusculus; multiplex, pilosus. *Folia* sub-cordata, ovata, acuta, sub-serrata, scabra. *Flos* cærulescens, terminalis: *spicis* secundis, longis, recurvis. *Cor.* hippocrateriformis, 5-fida: non dentibus, sed plicaturis 5 ejusdem corollæ interjectis. *Fructus* 2-fidus. *Semina* 4, nuda.

Heliotropium Americanum cæruleum. Pluk. Phyt. tab. 245. f. 4. Heliotropium Indicum, Hormini foliis latioribus. Burm. Zeyl. pag. 120. Virt. Folia istius herbæ contusa maximè conducunt ad maiores anthraces vel, quando incipiunt, resolvendos, vel postea suppurandos.

$\dagger$  Sp. 2. HELIOTROPIUM TETRANDRUM.  $\alpha$  Cây cò cò.

Differ. spec. *Hel. foliis* ovato-lanceolatis, glabris, oppositis: *spicis* congestis, terminalibus.

Hab; & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 1-pedalis, suberectus, multiplex, diffusus, albicans, obtusè 4-gonus, geniculis purpureis. *Folia* ovato-lanceolata, crenata, opposita, glabra. *Flos* rubescens, *spicis* longis, densis, terminalibus, congestis. *Corolla* subcampanulata, 5-fida, laciniis obtusis. *Stamina* 4, corollæ subæqualia. *Stigma* 2-fidum. *Semina* 4, nuda: *calyce* parvo, 5-fido fota.

Habitat inter herbas luxuriantes in hortis Cochinchinæ tam ista, quam prima species.

## GENUS V. ANCHUSA.

Char. Gener. *Cor.* infundibulif. fauce clausâ fornicibus. *Semina* basi insculpta. Lin. sy. pl. G. 194.

Sp. 1. ANCHUSA OFFICINALIS.  $\beta$  Tsù tsào.  $\alpha$  Tù thao.

Differ. spec. *Anch. foliis* lanceolatis: *spicis* imbricatis, secundis. Lin. sp. 1.

Hab; & notæ. *Caulis* herbaceus, perennis, sesquipedalis, teres, erectus, ramosus: *radice* indivisa, longâ, rubrâ. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, aspera, alterna. *Flos* albo-ruber, multus, *spicis* ter-

terminalibus : *corolla* infundibuliformi , brevi , æqualiter 5 - fidâ : faucis fornices distinctè non vidi in siccâ plantâ , nec recentem obtinui.

Habitat in variis locis imperii Sinensis.

Hort. Cliff. pag. 46. Buglossum sylvestre maius. Bauh. Pin. p. 256. n. i.  
Virt. radicis. Diaphoretica , Resolvens : in Medicinâ Sinensi magni usus ad suaviter promovendam eruptionem variolarum , & scabiem depurgandam.

### GENUS VI. PRIMULA.

Char. Gener. *Involucrum* umbellulæ. Cor. tubus cylindricus : ore patulo. Lin. sy. pl. G. 210.

† Sp. 1. PRIMULA MUTABILIS. & Sau cau hōa.

Differ. spec. Pr. *caule* suffruticoso , multiplici : *foliis* ovatis , serratis : *floribus* nudis.

Hab ; & notæ. *Caulis* subfruticosus , 8 - pollicaris , crassus , multiplex : *ramis* reclinatis. *Folia* ovata , subacuminata , ferrata , carnosa , glabra , opposita , petiolis brevibus. *Flos* , cymis magnis , terminalibus , colore mutabilis , primò viridi-luteus , postea albus , in maturitate ruber , in senectute cœruleus. *Cal.* nullus , præter squamu- lam parvam , oblongam ab basim cujusque floris. *Corolla* hippocra- teriformis , tubo cylindrico , longo , solido , impervio : limbo pla- no , 5 - fido , laciniis obcordatis. *Nectarium* squamis 5 , incurvis , partes generationis ante maturitatem floris cludentibus. *Filamenta* 10 , filiformia , limbo breviora , vertici cylindri insistentia : *anthe- ris* subrotundis. *Germen* subrotundum , superum , mediâ sui parte summitati cylindri , quasi receptaculo coalitum. *Stigmata* 3 , ob- longa , sessilia. *Pericarpium* abortit : quod ex dissecto germine , & per microscopium viso appetet polyspermum : an vero 1 , vel 3 - loculare , distingui non potuit. *Involucrum* umbellulæ , sive commu- ne nullum.

Habitat , & ob pulchritudinem collitur. Cantone Sinarum.

Observ. Facies hujus plantæ , præcipue floris omnimodo ad Primu- lam spectat. Stamina , & pistillum ad Decandriam Trigyniam ab- legarent , si ibi posset constanter permanere , nam frequenter in hoc flore stamina numerantur 8 , laciniæ corollæ , & squamæ nectarii 4 : tubus vero ( quod magis mirum ) seu columella illa tubi-formis semper invenitur impervia , quæ ratione situs , coloris , & formæ nul- latenus dici potest pedunculus : an Receptaculum ?

PENTANDRIA MONOGYNIAS 305

† Sp. 2. PRIMULA SINENSIS.  $\beta$  Yù tsuan hōa.  $\alpha$  Ngaoe tràm hoa.  
Differ. spec. Pr. *foliis* ovatis, integerrimis, petiolatis: *involucris* 2-  
phyllis, polyfloris.

Hab; & notæ. *Herba annua*, 6-pollicaris: *radice* crassâ, subdivisâ.  
*Folia* radicalia, cordato-ovata, acuminata, integerrima, glabra:  
petiolis longis, erectis. *Scapi* teretes, nudi, erecti, sub-triflori,  
*foliis* longiores: *involucro* 2-phyllô, floribus subæquali. *Corolla*  
alba, hippocrateriformis: limbo plano 5-6 fido, laciniis acutis,  
integris.

Habitat in imperio Sinensi.

GENUS VII. HOTTONIA.

Char. Gener. *Cor.* hippocrateriformis. *Stamina* tubo corollæ imposta;  
*Caps.* 1-locularis. Lin. sy. pl. G. 216.

† Sp. 1. HOTTONIA LITORALIS.  $\alpha$  Cay bô bô bien.  
Differ. spec. Hot. *foliis* ovato-oblongis, oppositis, integerrimis: *flo-*  
*re* solitario.

Hab; & notæ. *Caulis* sub-simplicissimus, 8-pollicaris, erectus. *Fo-*  
*lia* ovato-oblonga, integerrima, glabra, opposita. *Flos* purpureus,  
axillaris, solitarius pedunculatus. *Cal.* tubulosus, leviter 5-fidus:  
laciniis erectis. *Cor.* hippocrateriformis, 5-fida. *Antheræ* 5, ob-  
longæ, contortæ. *Stigma* turbinato-rotundum. *Capsula* longiuscula,  
1-locularis, 2-valvis: *seminibus* plurimis rotundis, nigris, mi-  
nimis.

Habitat in litore arenoso portus Eo, prope Huæam metropolim Co-  
chinchinæ.

Observ. Hottonia flore solitario ex alis proveniente, (Burm. Zeyl.  
p. 121. tab. 55. f. 1.) quamvis flore approximetur, foliis tamen a  
nostrâ longè recedit: cum illius sint verticillata, polyfida, nostræ  
vero opposita, integerrima.

GENUS VIII. MENYANTHES.

Char. Gener. *Cor.* hirsuta. *Stigma* bifidum. *Caps.* 1-locularis. Lin.  
sy. pl. G. 215.

† Sp. 1. MENYANTHES HYDROPHYLLUM.  $\alpha$  Cây raong tòn lá.  
Differ. spec. Men. *foliis* cordatis, integerrimis: *floribus* axillaribus,  
congestis, nectariferis.

Hab; & notæ. *Planta* palustris: *caule* filiformi, repente. *Folia* cor-  
data, integerrima, glabra, petiolata, sparsa, pauca. *Flos* albus,  
axil-

axillaris , congestus , pedunculis longis. Corolla campanulato-patens , hirsuta : limbo 5 - fido , crenato : *nectariis* 5 , rainosis , discoloribus , basi laciniarum adhærentibus. *Stigma* 2 - fidum. *Capsula* ova- ta , 1 - locularis , polysperma , calyce persistente cincta.

**Observ.** Hæc planta media est inter *Hydrophyllum* , & *Menyanthem* : & ista quidem duo genera parum inter se differunt.

Habitat spontanea loca aquosa Cochinchinæ.

### GENUS IX. CONVOLVULUS.

**Char.** Gener. *Cor.* campanulata , plicata. *Stigm.* 2. *Caps.* 2 - locula- ris : loculis 2 - spermis. Lin. sy. pl. 231.

**Sp. 1. CONVOLVULUS ARVENSIS.**  $\alpha$  Bim bim dát.

Differ. spec. Conv. *foliis* sagittatis , utrinque acutis : *pedunculis* sub- unifloris. Lin. sp. 1.

Hab ; & notæ. *Caulis* volubilis , tenuis , perennis. *Folia* sagittata , utrinque acuta , glabra , alterna , petiolata. *Flos* pallidus , basi intus rubrâ : *pedunculis* longis , solitariis , plerumque 1 - floris. *Cor.* campanulata , brevis , plicata. *Semina* fusca , angulata.

Habitat inter sepes Cochinchinæ.

Helxine Cissampelos. Matth. in Dioscor. I. 4. c. 35. p. 715. C. Baub. ibi pag. 716.

Virtus tam foliorum , quam seminum leniter Purgans.

**Sp. 2. CONVOLVULUS SCAMMONIA.**  $\alpha$  Khoai cà hoa vàng.

Differ. spec. Conv. *foliis* sagittatis , posticè truncatis : *pedunculis* teretibus , sub-trifloris. Lin. sp. 3.

Hab ; & notæ. *Caulis* subfruticosus , volubilis , ramosus , 10 - pedalis , tenuis , pilosus. *Folia* sagittata , oblonga , basi subtruncata. *Flos* lu- teus , plicatus , indivisus , sub-quadriflorus : *pedunculis* teretibus , lon- gis : stipulis lanceolatis oppositis.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Scammonium. Bont. Jav. I. 6. c. 57. p. 154. Scammonia syriaca. Baub. Pin. p. 294. n. 1.

Virt. Syriaca violenter Purg. Nostræ vires non expertus sum : cum so- lus caulis funicularis ( recens tamen ) cum foliis , floribus , & fru- ctu ad me pervenerit absque radice , in quâ hujus plantæ virtus.

**Sp. 1. CONVOLVULUS MEDIUM.**  $\alpha$  . . .

Differ. spec. Conv. *foliis* linearibus , hastato-acuminatis , auriculis den- tatis : *pedunculis* 1 - floris : *calycibus* sagittatis : *caule* volubili. Lin. sp. 6;

Hab :

Hab; & notæ. *Caulis* linearis, tenuis, volubilis. *Folia* subulato-linearia, sub-hastata, glabra. *Flos* pallidus, pedunculis longis, sub-2-floris. Habitat inter sepes in Cochinchinâ.

Tala-neli. Rheed. 11. pag. 113. t. 55. Conv. Medium. Burm. Ind. p. 43.

Sp. 4. CONVOLVULUS PANDURATUS.  $\alpha$  Bim bim vàng.

Differ. spec. Conv. *foliis* cordatis, integris, panduriformibus: *calycibus* lœvibus. Lin. sp. 7.

Hab; & notæ. *Caulis* volubilis, perennis. *Folia* cordata, acuminata; in formam panduræ in medio sinuata, integerrima. *Flos* nitidè luteus: *pedunculis* longis, sub-bifloris: *calycibus*, & *fructibus* lœvibus. *Folia* multa in eadem plantâ sœpe obseruantur absque illo sinu. Habitat inter sepes Cochinchinæ.

Conv. Megalorhizus, flore ampio, lacteo. Dill. Elth. 101. tab. 85. f. 99.

Sp. 5. CONVOLVULUS OBSCURUS?  $\alpha$  Bim bim ràng.  $\beta$  Cà phan xý.

Differ. spec. Conv. *foliis* cordatis, indivisis: *caule* subpubescente: *pedunculis* incrassatis, 1-floris: *calycibus* lœvibus. Lin. sp. 12.

Hab; & notæ. *Caulis* volubilis, annuus, pubescens. *Folia* cordata, acuta, integerrima, utrinque pubescentia. *Pedunculi* polyflori: *calycibus* lœvibus: *corollis* campanulatis, oblongis: *seminibus* hirsutis. *Flos* pallidus, basi interiore fusco-rubrâ.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ, in locis sylvestribus.

Conv. flore minore, lacteo, fundo atro-rubente. Dill. Elth. 98. tab. 83. f. 95. Burm. Zeyl. pag. 74.

Sp. 6. CONVOLVULUS BATATAS.  $\alpha$  Khoai lang.  $\beta$  Hoàn xý.

Differ. spec. Conv. *foliis* cordatis, hastatis, 5-nerviis: *caule* repente, hispido, tuberifero. Lin. sp. 14.

Hab; & notæ. *Caulis* perennis, teres, hispidus, postratus, repens: *tuberibus* sparsis, oblongis, acuminatis, exterius purpureis, pallidissimis. *Folia* cordata, angulata, 5-nervia, alterna: *petiolis* longis. *Flos* purpureus, lateralis, magnus: *pedunculis* erectis, sub-trifloris. Tam in Cochinchinâ, quam in Chinâ quotannis floret, quamvis Osbeckius (It. ad Ind. edit. Engl. pag. 311.) afferat non florere, sicut etiam multa alia minus diligenter observata apud finas.

Habitat in omnibus fere locis utriusque Indiæ, extra, & intra Gangem. Batatas. Rumph. Amb. 1. 9. c. 17. tab. 130. Kappa Keleng. Rheed. Malab. 7. p. 95. t. 50.

Uſus. Tubera esculenta sunt, nutrientia, sapida, dulcia. *Folia* etiam tenera, & juniores furculi leviter cocti in mensis usurpantur.

108 PENTANDRIA. MONOGYNIA.

Sp. 7. CONVOLVULUS MAMMOSUS. & Khoai tù.

Differ. spec. Conv. *foliis* cordatis, acuminatis, repandis: *caule* volubili: *tuberibus* aggregatis.

Hab; & notæ. *Caulis* tenuis, volubilis, annuus. *Folia* cordata, repanda, acuminata, glabra: *costis* obliquis. *Flos* albus, lateralis, campanulatus, plicatus: *pedunculis* 2-3-floris. *Tubera* pallidè fusca, pilosa, ovato-oblonga, saepe acuminata, intus alba, edulia, substantiæ tenacioris, nec ita dulcis ut Batatæ, & tamen apud indigenas magis aestimantur, & carius venduntur.

Batatta Mammosa. Rumph. Amb. I. 9. c. 18. tab. 131.

Habitat frequenter cultus in agris Cochinchinæ.

Sp. 8. CONVOLVULUS MALABARICUS. & Bím bím dòung tièn.

Differ. spec. Conv. *foliis* cordatis, glabris: *caule* perenni, villoso. Lin. sp. 18.

Hab; & notæ. *Caulis* perennis, volubilis, teres, tenuis, villosus.

*Folia* cordata, acuminata, integerrima, glabra. *Flos* albus, basi fusco-purpureus: *pedunculis* 1-floris: *corollæ* campanulatae tubo longo. Habitat agrestis in Cochinchinâ.

Burm. Ind. pag. 44. Kattu Kelengu. Rheed. Malab. II. pag. 105. t. 51.

Sp. 9. CONVOLVULUS CANARIENSIS. & Bím-bím tláng.

Differ. spec. Con. *foliis* cordatis, pubescentibus: *caule* perenni, villoso: *pedunculis* multifloris. Lin. sp. 19.

Hab; & notæ. *Caulis* volubilis, perennis villosus. *Folia* cordata, acuta, integerrima, pubescentia. *Flos* albus, axillaris: *pedunculis* brevibus, polyfloris, capitulatis. *Corolla* sub-globosa, campanulata, connivens. Habitat inter sepes Cochinchinæ.

Pluk. Almag. p. 114. tab. 325. f. 1. Convolv. Canariensis, foliis longioribus, mollibus, incanis.

Sp. 10. CONVOLVULUS TOMENTOSUS. & Bím bím loung. β Khiēn nieu.

Differ. spec. Conv. *foliis* 3-lobis, tomentosis: *caule* lanuginoso. Lin. sp. 26.

Hab; & notæ. *Caulis* volubilis, perennis, fuscus, lanatus. *Folia* 3-loba, tomentosa. *Flos* axillaris, solitarius: *calycibus* 5-phyllis, acutis, fusco-rubris: *corollis* campanulatis, pallidis. *Capsula* sphæroidea, acuminata, 2-locularis, 2-sperma: *seminibus* nigris.

Habitat incultus in Cochinchinâ, & Chinâ.

Pluk. Almag. p. 115. tab. 167. f. 4. Conv. Jamaicensis, trilobus.

Virt. Semina in pilulis sumpta efficaciter, & tutò purgant humores crassos, præcipue phlegma: unde levamen afferunt in hydropo, lum-

PENTANDRIA. MONOGYNIA. 109

Iumbagine, cholorosi, obstructionibus. Diurēsim simul promovent, & menses: prægnantibus nocent.

Sp. 11. CONVOLVULUS REPTANS.  $\alpha$  Rau muóng.  $\beta$  . . .  
Differ. spec. Conv. foliis hastato-lanceolatis, auriculis rotundis: caule repente: pedunculis unifloris. Lin. sp. 48.

Hab; & notæ. *Caulis* herbaceus, perennis, longus, teres, glaber, tubulatus, ramosissimus: *radicibus* fasciculatis, folio oppositis, nunc in terrâ padulosâ repentibus, nunc a terrâ prorsus liberis in aquâ fluctuantibus. *Folia* cordato-sagittata, acuta, glabra: auriculis inferius obliquè truncatis, superius denticulata. *Flos* dilutè purpureus, pedunculis 2-floris. *Corolla* campanulata, integra, plicata, limbo-patente, tubo longiusculo. *Caps.* sub-rotunda, glabra, 2-locularis, 2-sperma.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ, passim obvius in locis aquosis.  
Olus Vagum. Rumph. Amb. l. 9. cap. 51. tab. 155. sig. 1. Ubi optima icon. Forsk. Arab. cent. 2. p. 44. sub nomine Ipomoeæ aquaticæ, foliis cordato-acutis.

Usus. Olus est vulgarissimum, & salubre, nec palato ingratum.

† Sp. 12. CONVOLVULUS BUFALINUS.  $\alpha$  Bim bim tlau.  
Differ. spec. Conv. caule fruticoso, scandente: foliis cordato-sagittatis, glabris: pedunculis multifloris: antheris Cochleatis.  
Hab; & notæ. *Caulis* magnus, fruticosus, ramosus, scandens, glaber. *Folia* cordato-sagittata, glabra, alterna, petiolata. *Flos* luteus, magnus, pedunculis polyfloris. *Corolla* campanulata: antheris 5, filiformibus, spiraliter contortis. *Caps.* 2-locularis, 2-sperma.  
Habitat in sylvis Cochinchinæ: nec alibi vidi.

Sp. 13. CONVOLVULUS PES CAPRÆ.  $\alpha$  Cay muong bien.  
Differ. spec. Conv. foliis bilobis: pedunculis unifloris. Lin. sp. 51.  
Hab; & notæ. *Caulis* subfruticosus, procumbens, repens, subvillosum, ruber, longus. *Folia* utrinque obtusa, saepe bilobo-pandurata, emarginata, crassa, tomentosa. *Flos* purpurascens, axillaris, polynatus.  
Habitat ad maris litora arenosa in Cochinchinâ, Chinâ, & in orâ Africæ Orientali.  
Convolvulus Marinus. Rumph. Amb. l. 9. c. 58. tab. 159. Convolvulus Maritimus, folio crasso, cordiformi. Herm. Lugdb. 174. tab. 175. Burm. Zeyl. p. 72. Ind. pag. 48.

† Sp. 14. CONVOLVULUS AGGREGATUS.  $\alpha$  Bim bim lá dua.  
Differ. spec. Conv. foliis palmatis, 7-lobis, pilosis: floribus aggregatis.  
Hab;

## 110 PENTANDRIA. MONOGYNIA.

Hab; & notæ. *Caulis* volubilis, perennis, teres, pilosissimus, ramefus. *Folia* palmata, lobis 7, ovatis, subacutis, integerrimis, pilosis. *Flos* albus, magnus, aggregatus, axillaris: *pedunculo* communi longo, solitario, proprio nullo. *Cal.* communis 12 - phyllo, campanulatus, foliolis ovato-oblongis, inæqualibus, pilosis: continens flosculos sessiles 10 circiter. *Perianthium* 5 - phillum: foliolis lanceolatis, pilosis, erectis. *Cor.* Monopetala, tubulosa, 5 - fida: laciniis acutis, pilosis, clausis. *Filamenta* 5, corollâ breviora, tubo inhærentia. *Antheræ* ovatae, stantes, basi 2 - fidæ. Germen subrotundum. *Stylus* filiformis, corollâ longior. *Stigma* capitatum. *Capsula* rotunda, 2 - locularis, 2 - sperma: *seminibus* hinc rotundis, inde angulatis.

Habitat in Cochinchinâ. In nullo alio loco mihi obvium, nec apud Authores descriptum inveni.

## GENUS X. DATURA.

Char. Gener. *Cor.* infundibulif., plicata. *Cal.* tubulosus, angulatus. *Caps.* 4 - valvis. Lin. sy. pl. G. 263.

Sp. 1. DATURA METEL.  $\alpha$  Cà duc.  $\beta$  Não hiên hōa.

Differ. spec. Dat. *pericarpiis* spinosis, nutantibus, globosis: *foliis* cordatis, subintegris, pubescentibus. Lin. sp. 5.

Hab; & notæ. *Caulis* 3 - pedalis, crassus, annuus: *ramis* inordinatis, diffusis. *Folia* sub-ovata, acuminata, incomptè angulata, cordata, sœpe integerrima, sparsa, glabra, aliquando pubescentia. *Flos* terminalis, & lateralis, solitarius, violaceus, vel luteus, in aliis albus, aliquando utroque colore mixtus: *corollâ* infundibuliformi, longâ, plicatâ, sub-integerrimâ. *Fruclus* plerumque rotundus, spinosus, loculis binis, sœpe quatuor, polyspermus, raro in valvas regulares dehiscens. Semina multa, compressa, subreniformia.

Habitat inculta per vias, & hortos in Cochinchinâ, in Chinâ, & in Africâ, ubi a me sœpe examinata.

Datura. Acosta. Arom. c. 53. f. p. 289. Stramonia Indica. Rumph. Amb. l. 8. c. 49. t. 87. f. 1, 2. Datura Stramonium. Thunb. Jap. pag. 91.

Observ. Ex inconstantiâ habitus hujus plantæ videtur diversas species a Linnæo ennumeratas, (Daturâ Arboreâ exceptâ, quam non vidi) pro varietatibus habendas. Cur enim ad mutandam speciem coget fructus parum longior, vel spinosior? folia integriora, vel aliquantulum angulata, quæ in eodem sœpe individuo observatur? Flos simplex, vel plenus?

Virt.

Virt. Soporifera, Inebrians, Antispasmodica. Fumus radicis contusæ per fistulam tabacariam exceptus sedat parumper graves asthmæ paroxismos. Folia contusa, & recentia topicè applicata leniunt do-lores hæmorrhoidum, combustiones, & ulcera corrosiva.

## GENUS XI. NICOTIANA.

Charact. Gener. Cor. infundibulif. : limbo plicato. Stam. inclinata. Caps. 2-locularis, 2-valvis. Lin. sy. pl. G. 265.

Sp. 1. NICOTIANA FRUTICOSA.  $\alpha$  Cây thüóc  $\beta$  Yēn yē. Differ. spec. Nic. *foliis* lanceolatis, subpetiolatis, semi amplexicaulibus: *floribus* acutis: *caule* frutescente. Lin. sp. 2.

Hab; & notæ. Caulis 4-pedalis, subfruticosus, crassus, teres, albicans, pilosus, erectus, ramosus. *Folia* lato-lanceolata integerrima, undulata, rugosa, mollia, succosa, subsessilia, semiamplexicaulia, alterna. *Flos* albo-ruber, recemis erectis, terminalibus: *calyce* 5-fido, erecto, inæquali: *corolla* infundibuliformi, tubo longo: limbo acutè 5-fido, patente. *Capsula* 2-valvis, 2-locularis: *semini-*  
*nibus* rotundis, minutissimis, plurimis.

Habitat ubique culta in Cochinchinâ, & Chinâ: ubi vernaculis vo-cibus nominatur, tanquam indigena: nec ex Americâ translatam fuisse suspicantur.

Burm. Ind. p. 54. Tabacus. Rumph. Amb. I. 8. c. 40. Nicotiana foliis linear-lanceolatis, acuminatis, semiamplexicaulibus, caule frutico-so. Mill. Dict. icon. 184. f. 1.

Virtus. Foliorum. Antispasmodica, Paregorica, Emetica, Purgans, Abstergens, Phthiariaca. Externe tumores duros emollit, ulcera antiqua abstergit, vermes necat, scabiem purgat.

## GENUS XII. IPOMEA.

Charact. Gener. Cor. infundibuliformis. *Stigma* capitato-globosum. Caps. 3-locularis. Lin. sy. pl. G. 232.

Sp. 1. IPOMEA QUAMOCLIT.  $\alpha$  Cây đe long leo.  $\beta$  Kam peng fung. Differ. spec. Ip. *foliis* pinnatifidis, linearibus: *floribus* subsolitariis. Lin. sp. 1.

Hab; & notæ. Caulis annuus, volubilis, tenuis, longus, glaber, ramosissimus. *Folia* pinnatifida, laciniis filiformibus. *Flos* coccineus, axillaris, *pedunculis* solitariis, sub-monofloris. Cor. infundibuliformis, tubo longiusculo, limbo patente, acutè 5-fido. *Stigma* capi-tatum. *Capsula* plerumque 4-locularis: *seminibus* paucis.

Flos

Flos Cardinalis. Rumph. Amb. 9. cap. 52. tab. 155. f. 2. Quamoclit, five Jasminum Americanum. Clus. Poster. f. pag. 5. Tsiuria-cranti Rheed. Malab. 11. p. 123. tab. 60.  
Habitat culta in Cochinchinâ, & in Chinâ.

Sp. 2. IPOMŒA TUBEROSA.  $\alpha$  Khoai Xiem.

Differ. spec. Ip. foliis palmatis : lobis septenis, lanceolatis, acutis, integerrimis : pedunculis 3 - floris. Lin. sp. 8.

Hab ; & notæ. Caulis perennis, longus, teres, procumbens, ramosus : tuberibus oblongis, sparsis. Folia cordato-palmata : lobis 7, lanceolatis, integerrimis : petiolis alternis, longis. Flos purpureus, pedunculis 3 - floris, axillaribus. Capsulam maturam non vidi.

Habitat in Cochinchinâ a Siamo oriunda.

Plukenet Alm. p. 116. tab. 276. f. 6. Convolvulus Americanus mandiocæ multifido folio, heptaphyllo, radice tuberosa.

Uſus. Tubera edulia, ut Batatæ, quibus maximè assimilantur sapore, magnitudine, & formâ.

Sp. 3. IPOMŒA CAMPANULATA.  $\alpha$  Rau möi.

Differ. spec. Ip. foliis cordatis : pedunculis multifloris : perianthio exteriore orbiculari : corollis campanulatis, lobatis. Lin. sp. 11.

Hab ; & notæ. Caulis volubilis, tenuis, ramosus. Folia cordata, acuta, glabra, alterna, integerrima. Flos luteus, pedunculis axillaris, 5-7-floris : corolla campanulata, lobata : calyce 5 - partito, laciniis emarginatis. Capsula saepius 2 - locularis, 2 - sperma. Stigma semper capitato-globosum. Unde apparet hanc plantam inter Convolvulum, & Ipomœam mediare. Stigma ad istam, capsula, & corolla ad illum declinant. Perianthium aliud orbiculare non vidi.

Adamboe. Rheed. Malab. 11. p. 175. tab. 56.

Sp. 4. IPOMŒA HEPATICIFOLIA.  $\alpha$  Blm blm biēc.

Differ. spec. Ip. foliis 3 - lobis : floribus aggregatis. Lin. sp. 19.

Hab ; & notæ. Caulis volubilis, annuus, simplex, tenuis. Folia cordata, 3 - loba, subacuta, pilosa : petiolis longis. Flos cœruleus axillaris : pedunculis monofloris, congestis, non propriè aggregatis. Corollæ tubus longus, crassiusculus, limbus 5 - fidus. Capsula 3 - locularis.

Burm. Ind. pag. 50. tab. 20. f. 2. Convolvulus Indicus, Villoſus, heteræ folio 3 - partito, flore cœruleo. Herm. Lugdb. 182.

Habitat inculta in Cochinchinâ.

## GENUS XIII. AZALEA A.

Char. Gener. Cor. campanulata. Stamina receptaculo inserta. Caps. 5-locularis. Lin. sy. pl. G. 226. 88. C. 1. v. 1. conuictus. Lin. 1. v.

† Sp. 1. AZALEA PUNCTATA. a. Cay made ne. 2. CEROPHAGIA  
Differ. spec. Az. foliis margine scabris : floribus punctatis, congestis.  
Hab ; & notæ. Frutex 5-pedalis, erectus, ramodus. Folia lanceolata, integerrima, glabra, alterna, margine scabra. Flos congestus, a terminalis, albus : corollæ campanulatæ, 5-fidæ, inferæ. Calyx 5-partitus, albicans, punctis rubris conspersus, similiter etiam corolla, antheræ, & germen. Caps. 5-locularis.  
Habitat in sylvis Cochinchinæ.

## GENUS XIV. CAMPYLU S.

## Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium tubulosum, 5-partitum, tuberosum, pilosum inferum : laciniis subulatis, longis, inæqualibus, erectis. Cor. Monopetala, tubulosa, 2-labiata : labio superiore subulato : inferiore ovato : utroque integerrimo. Stam. Filamenta 5, inæqualia, corollæ breviora, basi tubi inserta. Antheræ ovatae, stantes. Pist. Germen subrotundum. Stylus æqualis staminibus. Stigma lobatum. Peric. Capsula subrotunda, 5-locularis, polysperma. Sem. Subrotunda, multa.

Nom. (Κεμπύλος flexuosus) a florum racemo flexuoso.  
Char. Gener. Cor. Bilabiata, infera. Caps. 5-locularis, polysperma.

† Sp. 1. CAMPYLU S SINENSIS. a. Xeng con than.  
Differ. spec. Camp. caule scandente : foliis cordatis : flore racemoso.  
Hab. Caulis fruticosus, crassus, longus, scandens, ramis vix ullis. Folia cordata, acuta, integerrima, utrinque tormentosa, pauca, alterna : petiolis longis, geniculatis. Flos albo-ruber, racemo a terminali, longo, flexuoso, bracteis 3-lobis distincto. Habitat in collibus nemorosis apud Sinas Cantonienses.

## GENUS XV. CEROPEGIA.

Char. Gener. *Folliculi* 2, erecti. *Semina* plumosa. *Corollæ* limbus connivens. Lin. sy. pl. G. 328.

Sp. 1. CEROPEGIA CANDELABRUM.  $\alpha$  Cây Saong Kém.  
 Differ. spec. Cer. *umbellis* pendulis : *floribus* erectis. Lin. sp. 1.  
 Hab ; & notæ. *Caulis* perennis, tenuis, longus, procumbens, ramosus. *Folia* ovato-lanceolata, integerima, glabra, margine reflexa, opposita. *Flos* albus, axillaris : *umbellis* pendulis : *corollis* erectis, monopetalis, tubo globoso, magno : limbo parvo, 5-fido. *Stigma* 1, sessile, 2-fidum. *Folliculi* 2, tenues, teretes : apice attenuato, ad angulum rectum refracto : *Seminibus* longis, plumosis, imbricatis.

Niota-niodem-valli. Rheed. Malab. 9. pag. 27. tab. 16.

Habitat in dumetis Cochinchinæ.

$\ddagger$  Sp. 2. CEROPEGIA OBTUSA.  $\alpha$  Rau Kém.

Differ. spec. Cer. *foliis* obtusis : *caule* volubili.

Hab ; & notæ. *Caulis* perennis, filiformis, subtilis, volubilis, glaber. *Folia* oblonga, obtusa, integerima, plana, pauca, opposita. *Flos* pallidus, speciei præcedentis similis, pedunculis brevioribus. *Fructus* tenuiores, apice similiter refracti, glabri : *feminibus* papposis.

Habitat utraque species in suburbii metropolis Cochinchinæ Huææ, foliis magis differentes, quam floribus.

$\ddagger$  Sp. 3. CEROPEGIA CORDATA.  $\alpha$  Deei di mo.

Differ. spec. Cerop. *foliis* cordatis : *umbellis* pendulis.

Hab ; & notæ. *Caulis* perennis, longus, teres, scandens, ramosus. *Folia* cordata, integerima, glabra, opposita, petiolis longis. *Flos* viridi-luteus, *umbellis* magnis, hemisphæricis, axillaribus : pedunculis longis, pendulis. *Calyx* inferus 5-phyllo, foliolis ovatis acutis, parvis, patentibus. *Corolla* 5-partita, laciniis ovatis, conniventibus. *Nectarium* carnosum, erectum, 5-fidum : glandulis 10, oblongis, pistillum circumstantibus. *Filamenta* nulla. *Antheræ* 5, oblongæ, conniventes. *Germen* longiusculum, 2-fidum. *Stylus* crassus, brevissimus. *Stigma* obtusum, emarginatum. *Pericarpium* matutrum non vidi. Ex formâ Germinis folliculos duos esse conjicio : ex flore umbellato, corollis conniventibus speciem esse Ceropegæ existimo.

Habitat scandens per sepes in Cochinchinâ.

GE-