

## GENUS XVI. NERIUM.

Char. Gener. *Folliculi* 2, erecti. *Semina* plumosa. *Corolla* tubus terminatus coronâ lacerâ. Lin. sy. pl. G. 323.

Sp. 1. NERIUM OLEANDER. a Cây daò le. A... Differ. spec. Ner. *foliis* linear-lanceolatis, ternis. *Corollis* coronatis. Lin. sp. 1.

Hab; & notæ. *Frutex* 8-pedalis, caule tereti, recto, ramis assurgentibus. *Folia* verticillato-terna, liniari-lanceolata, integerrima, crassa, glabra. *Flos* ruber, racemis erectis terminalibus. *Cal.* 5-phyllos, inferus, foliolis subulatis, parvis, erectis. *Cor.* infundibuliformis, 5-partita, limbo obtuso, reflexo. *Filamenta* 5, corollâ breviora, tubo insidentia. *Antheræ* sagittatæ stantes, apice caudatae, laciniâ filiformi, longâ, lanosâ. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, corollæ æqualis. *Stigma* obtusum, inæquale. *Pericarpium* folliculi 2, teretes, longi erecti: *seminibus* plurimis papposis. *Tubus* corollæ terminatur coronâ formatâ ex laciniis concoloribus, brevibus, inæqualibus. Hujus est varietas flore albo, quæ magis regularis, semperque numerat 5 stamina, & 5 corollæ laciniias. Ast in varietate rubrâ, quæ gaudet flore pleno, observantur sœpe 10 stamina, ac 10-15 corollæ laciniæ, quæ inferius coalescunt in tubum. Odor vix ullus.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ, multisque aliis Asiæ locis.

Belluta Avreli. Rheed. Malab. 9. pag. 1. t. 1, 2. Rumph. Amb. Auct. cap. 23. tab. 16. f. 1. Oleander Sinicus.

## Sp. 2. NERIUM DIVARICATUM. a Cây Mộc hoa do?

Differ. spec. Ner. *foliis* lanceolato-ovatis: ramis divaricatis. L. sp. 3.

Habit; & notæ. *Arbor* mediocris: *ramis* patentibus, divaricatis. *Folia* ovata, acuminata, integerrima, undulata, nitida, opposita. *Flos* luteo-ruber, congestus, terminalis. *Corolla* infundibuliformis, tubo brevi: limbo 5-fido reflexo. *Nectarii* corona ad os tubi, laciniis subulatis, brevibus. *Antheræ* 5, subfessiles, sagittatæ, in cœnum mutuo conniventes. *Stylus* cylindricus, crassiusculus, vaginans alium superiorem, tenuem: *stigmate* oyato. *Fructus* folliculi 2, teretes, longi, sub-coaliti, erecti: *seminibus* multis longis, papposis, imbricatis.

Apocynum Zeylanicum, Indicum, frutescens, Netii flore candidissimo. Herm. Parad. Bat. 40. Nerium Indicum folio subrotundo undulato, crasso, flore dilutè rubente. Burm. Zeyl. p. 168.

Sp. 3. NERIUM ANTIDYSENTERICUM. a Cây Mộc hoa tláng.

Differ. spec. Ner. *foliis* ovatis, acuminatis, petiolatis. Lin. sp. 4.

Hab; & notæ. Arbor mediocris: *ramis* btachiatis. *Folia* ovata, acuminata, plâna, integerrima, glabra opposita. *Flos* albo-viridis, racemis brevibus, sub-terminalibus. *Corolla* infundibuliformis. *Nectarii* corona ad os tubi: laciniis oblongis, alternatim 3-fidis, & linearibus. *Fruclus* ut præcedentes species.

Nerium Indicum, siliquis angustis, erectis, longis, geminis. Burm.

Zeyl. p. 167. t. 77. Codaga pala. Rheed. Malab. i. p. 85. t. 47.

Usus. Hæc, & præcedens Nerii species materiam præbent ad tornanda opera lignaria, & formanda scrinia elegantissima. Habent enim lignum albissimum, & æqualissimum, eburis æmulum, si gravitatem excipias. Quod si Ebeni (cujus in Cochinchinâ magna copia) intermixta nigredine discernatur, pulchritudo operis augabitur. De virtute arboris antidysemtericâ testari non audeo experientiâ destitutus. Utraque species habitat tam culta, quam inculta in Cochinchinâ.

† Sp. 4. NERIUM SCANDENS. a Cây bòi bòi.

Differ. spec. Ner. *caule* scandente: *pedunculis* terminalibus, polyfloris: *laciniis* *corollæ* longissimis.

Hab; & notæ. *Frutex* magnus, ramis scandentibus. *Folia* ovato-oblonga, integerrima, sub-acuminata, glabra, opposita. *Flos* magnus, pedunculis terminalibus, polyfloris: *Corollæ* tubo albo, limbo ruberrimo. *Cal.* tubulosus, 5-gonus, brevis, 5-partitus: laciniis acutis, carnosis, erectis. *Cor.* infundibuliformis: tubo inferius cylindrico, brevi, superius urceolato: limbo 5-partito, laciniis subulato-linearibus, longissimis, repandis. *Nectarium* ad os tubi, laciniis multis, acutis, in coronam dispositis. *Filamenta* 5, brevia. *Antheræ* sagittatæ, connientes: apice in caudam filiformem longissimam desinentes. *Germen* superum, 2-lobum. *Stylus* longitudine staminum. *Stigma* alterum alteri impositum: inferius cylindraceum, superius acutum, partitum, erectum. *Peric.* Folliculi 2, horizontales, crassi, obtusi: *seminibus* multis, oblongis, compres- sis, papposis.

Habitat in dumetis Cochinchinæ.

Observatio. Quamvis corollæ laciniæ longissimæ affinem faciant Echiti Caudatæ (Lin. sy. pl. sp. 10. Burm. Ind. p. 68. t. 26.) attamen in nostrâ faux coronata, quæ in Echite nuda, illam certò ad Nerium revocat; contortæ enim pleraque per nectaria constantius dignoscuntur. Nec debent obstare folliculi horizontales, quando cætera convenient.

## GENUS XVII. PLUMERIA.

Char. Gener. *Folliculi* 2, reflexi. *Semina* membranæ propriæ inserta.  
Lin. sy. pl. G. 325.

Sp. 1. PLUMERIA OBTUSA. α Hoa sú tláng. β . . .

Differ. spec. Plum. *foliis lanceolatis*, *petiolatis*, *obtusis*. Lin. sp. 3.  
Hab; & notæ. *Arbor* crassa, mediocrem superans: *cortice* cinereo,  
glabro, lactescente: *ligno* succoso, fragili: *ramis* expansis, craf-  
fis, tortuosis. *Folia* lanceolata, integerrima, magna, plana, gla-  
bra, petiolata, sparsa, costis multis transversis. *Flos* terminalis,  
racemis compositis, patulis, erectis: *corollis* odoratis, contortis,  
albis, exteriū rubro, intus flavo colore discretis. *Cal.* tubulosus,  
brevis, deciduus, leviter 5-fidus, laciniis rotundatis, erectis. *Co-  
rolla* monopetala, infundibuliformis, infera: tubo parvo, curvo:  
limbo, 5-partito, laciniis ovatis, alterā alterius latus tegente. *Fi-  
lamenta* 5, brevissima, supra basim tubi inserta: *antheris* oblongis,  
stantibus. *Germen* subrotundum, 2-partitum. *Stylus* nullus.  
*Stigmata* 2, conica. *Pericarpium* folliculi 2, reflexi, crassi, po-  
lypermī: *seminibus* grandiusculis, squamiformibus, imbricatis. in  
basim membranaceam desinentibus.

Habitat in Cochinchinā, & Chinā, culturā facilis, odore, & colore  
floris grata.

*Flos* convolutus. Rumph. Amb. I. 6. c. 43. tab. 38.

Observ. Licet arbor ita a Linnæo distinguatur nomine, & foliis ob-  
tusis, ego, ubicunque illam vidi in Asiā, semper notavi folia acu-  
ta: similiterque ab oculato Botanices scriptore Rumphio visa antea  
fuerant, & delineata.

## GENUS XVIII. TABERNÆMONTANA.

Char. Gener. *Folliculi* 2, horizontales. *Semina* pulpæ immersa. Lin.  
sy. pl. G. 327.

† Sp. 1. TABERNÆMONTANA BUFALINA. α Cây sòng tláu.

Differ. spec. Tab. *foliis lanceolatis*, oppositis: *pedunculis* 2-na-  
tis, monofloris, pendulis.

Hab; & notæ. *Frutex* 5-pedalis, sub-erectus, ramosus. *Folia* lan-  
ceolata integerrima, nitida, opposita. *Flos* albus, lateralis: *pedun-  
culis* geminis, monofloris, longis, pendulis. *Corolla* hippocra-  
teriformis: tubo cylindraceo, tenui, longo, ad basim ventricoso.  
*Stamina* supra medium tubi insidentia. *Stylus* 1, brevior stamini-  
bus:

bus : *stigmate* ovato , bifido. *Pericarpium* folliculi 2 , divaricati , longiusculi , sub-ventricosi , acuminati , torulosi , glabri : *seminibus* oblongis , angulatis , pulpâ rubrâ involutis. Habitat in dumetis Cochinchinæ.

*Capsicum sylvestre*. Rumph. Amb. l. 6. cap. 73. tab. 67. Ibi autem exhibetur fructus subsequenti speciei *Bovinæ* conformior.

† Sp. 2. TABERMÆMONTANA BOVINA. & Cây súng bò.

Differ. spec. Tab. *foliis* lanceolatis oppositis : *pedunculis* solitariis , polyfloris.

Hab ; & notæ. *Frutex* 4 - pedalis , erectus : *ramis* reclinatis. *Folia* lanceolata , integerima , glabra , opposita. *Flos* albus , hypocrateriformis , 5 - fidus : *pedunculis* axillaribus , sub-erectis , solitariis , sub-quinquefloris. *Folliculi* 2 , horizontales , divaricati , recurvi , breves , ventricosi , acuminati , nec torulosi : *seminibus* subrotundis , angulatis , pulpæ rubræ immixtis.

Habitat in locis planis Cochinchinæ.

Virtus. Emolliens , Laxans. Succus viscosus , lactescens ex utroque fructe manans juvat imprimis ad extrahenda suaviter spicula , aut vepres carni infixa.

### GENUS XIX. VINCA.

Char. Gener. *Folliculi* 2 , erecti. *Semina* nuda. Lin. sy. pl. G. 322.

Sp. 1. VINCA ROSEA. & Hoa hai dâng. & . . .

Differ. spec. Vin. *caule* suffrutescente : *floribus* geminis , sessilibus : *foliis* ovato-oblongis : *petiolis* basi bidendatis. Lin. sp. 4.

Hab ; & notæ. *Planta* 2 - pedalis , perennis , sub-fruticosa : *caule* multiplo , suberecto , tereti , rubro. *Folia* oblongo-ovata , integerima , tomentosa , opposita , graveolentia. *Flos* dilutè purpureus , axillaris , 2 - natus. *Cal.* 5 - partitus , inferus , persistens : laci niis linearibus , erectis. *Cor.* monopetala , hippocrateriformis , tubo longo , gracili , superius ventricoso-ovato : limbo 5 - fido laciniis rotundatis , acuminatis. *Filamenta* 5 , brevissima. *Antheræ* sagittatæ , incumbentes , in tubi ventre inclusæ : polline globulofo , nudis oculis conspicuo. *Germen* oblongum duplex. *Stylus* 1 , filiformis , inter bina germina receptaculo affixus. *Stigma* longitudinaliter 3 - articulatum , 3 - forme. *Peric.* folliculi 2 , erecti , monovalves , longiusculi , recti , subteretes , villosi , polyspermi : *seminibus* bino ordine , oblongo-ovatis , scabris , nudis.

Habitat in Cochinchinâ , & Chinâ , tam agrestis , quam culta.

Burm. Ind. pag. 67. Thunb. Jap. p. 110.

† GE-

## † GENUS XX. THELA.

## Descriptio Naturalis.

**Cal.** Perianthium duplex : exterius 3 - phyllum , foliolis ovato-lanceolatis : interius persistens , tubulosum , coloratum , leviter 5 - fidum , consitum papillis multis , pedunculatis.

**Cor.** Hippocrateriformis , infera : tubo cylindrico , calyce duplo longiore : limbo 5 - fido , laciniis subrotundis , acuminatis , planis.

**Stam.** Filamenta 5 - capillaria , tubo æqualia , receptaculo insidentia . Antheræ oblongæ , stantes.

**Pist.** Germen ovato-oblongum. Stylus filiformis , longior staminibus.

Stigma 5 partitum : laciniis oblongis , reflexis.

**Peric.** Bacca parva , oblonga , pentagona , 1 - locularis , 1 - sperma.

**Sem.** Ovato-oblongum.

**Nom.** (Θηλὴν papilla) a calyce papilloso.

**Char.** Gener. *Cal.* duplex : interior papillosum. *Cor.* hippocrateriformis , infera. *Stam.* receptaculo insidentia. *Bacca* 1 - sperma.

† Sp. 1. THELA COCCINEA. α Xích hoa Xà. β Chè hõa tân.

Differ. spec. Th. caule scandente : *foliis* amplexicaulibus : *calycibus* corollæ concoloribus.

Hab. *Caulis* suffruticosus , longus , scandens , striatus , parum ramosus. *Folia* ovato-lanceolata , integerrima , glabra , alterna , semiamplexicaulia. *Flos* coccineus , calyce interiori concolore : spicis longis , simplicibus , subterminalibus.

† Sp. 2. THELA ALBA. α Bạch hoa Xà. β Pă hõa tân.

Differ. spec. Th. caule scandente : *foliis* petiolatis : *calycibus* discoloribus.

Hab. *Caulis* suffruticosus , scandens , tenuis , longus , subsimplicissimus. *Folia* ovato-lanceolata , integerrima , glabra , undulata ; coloris obscuro-viridis , alterna , petiolata , nec amplexicaulia. *Flos* spicis minus longis , sub-terminalibus : *corollis* albis : *calyce* interiori longo , papilloso , non colorato.

Habitant ambæ species inter sepes arundinis Indicæ , per quas scandunt tam in Cochinchinâ , quam in Chinâ.

## + GENUS XXI. ATHRUPHYLLUM.

## Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium campanulatum, 5-fidum, breve, persistens: laci-  
niis acutis.

Cor. Monopetala, infera, campanulata, patens: limbo 5-partito,  
laciis lanceolatis.

Stam. Filamenta nulla. Antheræ 5, biloculares, ovatæ, in medio  
laciinarum corollæ singulæ singulis affixæ, supinæ jacentes.

Pist. Germen subrotundum, minimum. Stylus brevissimus. Stigma sim-  
plex.

Peric. Bacca globosa, parva, 1-sperma.

Sem. Subrorundum.

Nom. (Αθρόος confertus) ob folia ad apicem ramorum conferta.

Char. Gener. Cor. campanulata, infera. Antheræ laciis corollæ in-  
serta. Bacca 1-sperma.

† Sp. i. ATHRUPHYLLUM LINEARE. a Cay ma ca.

Differ. spec. Atr. foliis linearibus, confertis: umbellis sessilibus.

Hab. Arbor magna: ramis patentibus. Folia turbinato-linearia, in-  
tegerrima, plana, nitida, ad apicem ramolorum conferta. Flos  
albo-ruber, minusculus: umbellis sessilibus, foliis intermis-  
tis. Ha-  
bitat in sylvis montanis Cochinchinæ.

Uſus. Lignum ædificiis aptum.

## + GENUS XXII. PYRGUS.

## Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 5-dentatum, patens, breve, persistens.

Cor. Monopetala, infera, rotata, 5-partita: laciis lanceolatis,  
longis, sub-reflexis.

Stam. Filamenta 5, subulata, corollæ inserta, ipsa breviora, in me-  
dio conniventia, inde refracta. Antheræ subulatæ, magnæ, 2-lo-  
cularæ, stantes, in formam conicam mutuo inclinatæ.

Pist. Germen subrotundum. Stylus subulatus, corollæ subæqualis. Sti-  
gma simplex.

Peric. Bacca globosa, parva, 1-sperma.

Nom.

Nom. (Πυργός turris) ab staminibus in formam turris conicæ mutuò inclinatis.

Char. Gener. *Cor.* rotata, infera. *Filamenta* refracta. *Bacca* 1-sperma.

Sp. 1. PYRGUS RACEMOSA. & Cây Lục chót.

Differ. spec. Pyr. *foliis* ovato-lanceolatis : *racemis* terminalibus.

Hab. *Arbuscula* 5-pedalis : *ramis* patentibus. *Folia* ovato-lanceolata, magna, integerrima, glabra, alterna : *petiolis* brevibus. *Flos* albo-ruber : *racemis* ovato-oblongis, terminalibus.

Habitat in dumetis Cochinchinæ.

Observ. Convenit cum Bladhia (Thunb. Japon. p. 7.) numero partium differt illarum formâ, semineque non arillato.

### + GENUS XXIII. ROTULA.

#### *Descriptio Naturalis.*

Cal. Perianthium Cyathiforme 5-partitum, persistens : laciniis acutis.

Cor. Rotata, infera, 5-partita : laciniis ovatis, planis.

Stam. Filamenta 5, subulata, corollâ breviora, ipsius basi inhærentia. Antheræ sagittatæ.

Pist. Germen subrotundum. Stylus turbinato-linearis, planiusculus, statimibus subæqualis. stigma emarginatum.

Peric. Bacca aquosa subrotunda, parva, 1-loocularis, 4-sperma.

Sem. exterius ovata, intus curva.

Nom. Rotulam vocare suasit corolla parvula, rotata, plana.

Char. Gener. *Cor.* rotata, infera. *Bacca* aquosa, 4-sperma.

† Sp. 1. ROTULA AQUATICA. & R. r. c. t.

Differ. spec. Rot. *foliis* imbricatis : *floribus* congestis terminalibus.

Hab. *Caulis* fruticosus, 4-pedalis, simplex, suberectus, teres, inermis : *radice* simplici, longâ : *ramis* brevissimis, simplicissimis. *Folia* ovato-oblonga, integerrima, minima, sessilia, imbricata. *Flos* dilutè violaceus, congestus, terminalis. *Bacca* rubra, piso æqualis.

Habitat in paludibus, & prope ripas fluminum in Cochinchinâ.

## GENUS XXIV. TOURNEFORTIA.

Char. Gener. *Bacca* 2-locularis, disperma, supera : *apice* duobus poris perforata. Lin. sy. pl. G. 205.

† Sp. 1. TOURNEFORTIA MONTANA. *a* Cây thuóc moi.  
Differ. spec. Tourn. *foliis* ovato-lanceolatis, rugosis : *spicis* sub-simplicibus, recurvis, terminalibus.

Hab ; & notæ. *Caulis* fruticosus, scandens, ramosus, hirsutus. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, rugosa, glabra, incurva, reflexa : *petiolis* brevibus, alternis. *Flos* terminalis, spicis secundis, recurvis, sub-simplicibus : *pedunculis* brevibus, 1-floris. *Corolla* alba : tubo basi urceolato : limbo acutè 5-fido : *antheris*, & *stigmate* sessilibus. *Bacca* inversè pyriformis, 2-locularis, 2-sperma, *apice* imperforata, supera.

Habitat in sylvis montanis, ubi illâ pro pharmacho utuntur incolæ agrestis, qui vocantur Moii, Cochinchinæ tributarii.

## GENUS XXV. SIDEROXYLON.

Char. Gener. *Cor.* 10-fida : laciniis alternis incurvis. *Stigma* simplex. *Bacca* 5-sperma. Lin. sy. pl. G. 283.

† Sp. 1. SIDEROXYLON CANTONIENSE. *b* Sân Côt.  
Differ. spec. Sid. inerme, *foliis* palmatis : *pedunculis* solitariis, axillaribus.

Hab ; & notæ. *Caulis* fruticosus, scandens, multiplex, inermis, teres. *Folia* palmata, glabra, petiolis longis, alternis. *Flos* axillaris, pedunculis solitariis, polyfloris. *Cal.* spatha parva, lanceolata, decidua. *Corolla* 5-fida, laciniis incurvis, singulatim coalitis 5 aliis laciniis interioribus *nectarii* acutè 5-fidi. *Stamina* 5. *Stigma* obtusum. *Bacca* subrotunda, 4-locularis, 1-sperma : *seminibus* oblongis. *Radix* tuber magnum subrotundum, basi acuminatum.

Habitat in suburbis Cantonensiibus Sinarum.

Observ. Hæc species, quamvis anomala, minus tamen devia est a Charactere Linnæano, quam Sideroxylon Decandrum (sp. 6.) quod nostro est affine corollâ, nectario, & baccâ loculari.

## † GENUS XXVI. ONCINUS.

## Descriptio Naturalis.

- Cal. Perianthium tubulosum, breve, 5-crenatum, inferum.  
 Cor. Monopetala, infundibuliformis, carnosa: limbo 5-partito, laciniis obtusis, omnibus ad unum latus uncatis, emarginatis. Nectararium ad os tubi, 5-fidum, erectum.  
 Stam. Filamenta 5, brevia, medio tubo affixa. Antheræ simplices.  
 Pist. Germen rotundum. Stylus corollâ brevior. Stigma acutum.  
 Peric. Bacca globosa, magna, nitida, 1-locularis, polysperma.  
 Sem. Multa, parva, subrotunda, nidulantia.  
 Nom. (*Oxykivos* uncus) a corollæ laciniis uncatis.

Char. Gener. *Cor.* infundibulif., infera: laciniis uncatis. *Bacca* globosa: feminibus nidulantibus.

† Sp. 1. ONCINUS COCHINCHINENSIS. & Cây Deom.

Differ. spec. *Onc.* *foliis* ovato-lanceolatis, oppositis: *corymbis* racemosis.

Hab. *Frutex* inermis, lignosus, scandens, 20 pedes longus. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, glabra, nitida, opposita. *Flos* albus, *corymbis* racemosis, longis, terminalibus. *Bacca* globosa, nitido-rubra, pugno maior: cortice duriusculo, fragili: pulpâ similiiter rubrâ, eduli, dulci, subastrigente.

Observ. A Theóphraستa Americanâ non admodum longè recedit.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

## † GENUS XXVII. DARTUS.

## Descriptio Naturalis.

- Cal. Perianthium 5-fidum, inferum: laciniis ovatis, membranaceis.  
 Cor. Monopetala: tubo sub-globoso, calyce longiore: limbo 5-fido, laciniis ovatis, patentibus.  
 Stam. Filamenta 5, filiformia, medio tubo inserta, ipso breviora. Antheræ incumbentes.  
 Pist. Germen subrotundum, sulcatum. Stylus brevissimus. Stigma 5-lobum.  
 Peric. Bacca parva, rotunda, excoriata, diaphana, 1-locularis, polysperma.

Q ii

Sem.

Sem. Multa, subrotunda, minima, inæqualia

Nom. ( $\Delta\epsilon\rho\tau\delta$  excoriatus) a baccâ excoriatâ.

Char. Gener. *Cor.* campanulata, infera : *tubo* globoſo. *Bacca* exco-riata, polysperma.

# Sp. 1. DARTUS PERLARIUS. Cây Don.

Differ. spec. Dar. *foliis* ovatis, ferratis : *racemis* axillaribus.

Hab. *Arbuscula* 6-pedalis : *ramis* ascendentibus : *ligno* flaccido : *ra-dice* sub-aromaticâ, rubescente. *Folia* oblongo-ovata, acuminata, ferrata, magna, subtus tomentosa, mollia, costis obliquis, petio-lis rufis, alternis. *Flos* albus, *racemis* oblongis, parvis, axilla-ribus.

Habitat agrestis ad fluminum ripas, & loca umbrosa in Cochinchinâ. Perlarius alter. Rumph. Aub. l. 6. cap. 62. p. 122. tab. 57.

Virtus. Radicis : Incidens, Diuretica, appetitum excitans. Dicitur etiam a Rumphio prodeſſe in febribus, & maximè probari in mor-billis.

GENUS XXVIII. CARISSA.

Char. Gener. Contorta. *Bacca* 2, polyspermæ. Lin. sy. pl. G. 31&

Sp. 1. CARISSA CARANDAS. γ . . .

Differ. spec. Car. *foliis* ellipticis, obtusis. Lin. sp. 1.

Hab; & notæ. Arbor parva, 6-pedalis : *ramis* tortuosis, dichoto-mis, expansis : *aculeis* magnis, ramofis, apice dichotomis, rectis, oppositis. *Folia* ovata, apice acuta, integerrima, glabra, oppo-sita, subpetiolata. *Flos* albus, formâ, & magnitudine Jasmino Grandifloro æqualis. *Cal.* 5-partitus, inferus : foliolis subulatis, ere-ctis. *Corolla* hippocrateriformis, tubo longo, recto, æquali : lim-bo 5-partito, laciniis ovatis. *Filamenta* 5, brevissima, medio tu-bo insistentia : *antheris* linearibus. *Germen* ovatum. *Stylus* filiformis, brevis. *Stigma* oblongum, emarginatum, erectum. *Bacca* sim-plex, ovata, glabra, 1-loclaris, polysperma : *seminibus* subor-biculatis, imbricatis. *Flos* terminalis, pedunculis paucifloris. *Bacca* matura nigra, edulis, acri-dulcis.

Carandás. Garcia. Arom. l. 2. cap. 6. Rumph. Amb. Auctuar. cap. 74. tab. 25.

Observ. Planta a me descripta nascitur agrestis in litore Africæ Ori-en-talis. Est etiam indigena variorum Indiæ locorum, quæ adivi, sed eam ibi non obſervavi. Audivi a viatoribus, qui utrobique fue-rant,

rant , Africanam ab Indianâ differre , sed differentiam non potuerunt clare exponere. Suspicer descriptionem Linnaeanam excerptam fuisse ex relationibus non satis accuratis ; ideo non judicavi diversam speciem separare , quamvis nostra differat bacca unicâ , corolla hippocratiformi , nec contorta , stigmate emarginato , aculeis ramosis , nec simpliciter dichotomis , & foliis acutis. Spina spinarum Rumphii impropiè dicitur a Linnaeo Carissa spinarum ; est enim Genus diversum , de quo nos in Dioccia. G. 32.

## G E N U S XXIX. S T R Y C H N O S .

Char. Gener. Cor. 5 - fida. Bacca 1 - locularis , cortice lignoso. Lin. sy. pl. G. 270.

Sp. 1. STRYCHNOS NUX VOMICA. a Cây Cù chi.

Differ. spec. Stryc. foliis ovatis : caule inermi. Lin. sp. 1.

Hab ; & notæ. Frutex magnus , trunco arboreo , crasso , erecto , ramis flexuosis , longis , scandentibus , inermibus. Folia ovata , integerrima , obtusa , 5 - nervia , glabra , opposita , petiolata. Flos pallidus , pedunculis lateralibus , & terminalibus : calyx 5 - fido , brevi , acuto. Corolla tubulosa , magna , sub-infundibuliformis , limbo 5 - fido : Staminibus 5 : stigmate obtuso. Pericarpium bacca magna , globosa , fusco-rubra , pulposa , cortice duro , 1 - locularis , polysperma. Semina orbiculata , depressa , villosa , substantiae cornæ , amarissimæ , exterius coloris cinerei.

Habitat in sylvis provinciæ Bình Khang , olim ad regnum Champa- vam , nunc ad Cochinchinam pertinentis.

Caniram. Reed. Malab. 1. p. 67. tab. 37. Nux Vomica officinarum. Burm. Zeyl. pag. 171.

Virtus : Radicis , & ligni , quod aliqui dicunt verum esse colubrinum , nulla mihi probata. Seminum vis convulfiva , vertiginosa , venenata , & non solum quadrupedibus , sed etiam hominibus lethifera , nisi nimis cautè administretur. Vinum , in quo ea semina semitosta infusa fuerant , dedi equo debilitate crurum laboranti , alioquin robusto , qui statim convulsionibus , & tremore crurum agitatus intra horæ quadrantem mortuus cecidit. Eadem tamen semina perfectè ad nigredinem usta valde utilia sunt , & absque periculo dari possunt ad cohibendum fluorem album.

## G E N U S XXX. I G N A T I A N A .

Char. Gener. Cal. 5 - dentatus. Cor. Longissima. Drupa unilocularis , polysperma. Lin. Jun. sup. pl. G. 137. pag. 20.

Sp. 1.

Sp. 1. IGNATIANA PHILIPPINICA. ♂ Yasug. α Hot dāut giō.  
Differ. spec. Ign. foliis ovatis, acutis: caule scandente: pedunculis  
axillaribus, sub-quadrifloris.

Hab; & notæ. *Frutex* magnus, caule arboreo: *ramis* multis, scandentibus, longissimis, inermibus. *Folia* ovata, acuta, integerrima, plana, glabra, magna, venosa, opposita, petiolata. *Flos* albus, *pedunculis* sub-4-floris, lateralibus. *Corolla* infundibuliformis: tubo longissimo, reclinato: limbo patente, 5-fido, obtuso. *Filamenta* 5, tubo æqualia. *Stylus* æqualis staminibus. *Stigmata* 2-partito. *Bacca* magna, subrotunda, collo attenuata, 1-locularis, exsucca, polysperma: cortice glaberrimo, ligneo, albicante, cucurbitæ lagenariæ maturæ simili: *seminibus* trigono-ovatis, fusco-cinereis, glabris substantiæ corneæ, saporis amarisimi.

Habitat agrestis in insulis Philippinis: inde in Cochinchinam, & aliorum translata.

Lin. Jun. sup. pl. pag. 149. Strichnos Ignatii, foliis ovatis, acutis.  
Berg. Mat. Med. pag. 149.

Virt. Seminum. Tonica, Incidens, Diaphoretica, Emmenagogia, Anthelminthica. Valet in apoplexiâ pituitosâ, in colicâ, & cardialgiâ, in febribus intermittentibus, in suppressione mensium, in morbo animalium, aut infectorum venenatorum. Summuntur internè ad 12 grana, aquâ, vel vino contrita, quod plusquam millies expertus sum, saepius cum fælici eventu, aliquando nullo, nunquam malo. Si incaute nimiâ dosi sumatur, vertiginem affert, & motus convulsivos: qui tamen facile curantur liberali haustu, frigidæ, cui succus limonum potest addi. Non est verum quod Lin. Jun. loco citato refert, scilicet: *eandem vim venenatam actiones vitales animalium suffocandi ac nux Vomica habet, similiter habere, eademque dosi feris lethales esse*. Siquidem in Cochinchinâ saepissimè dedi, & vidi alios dare integrum nucleum, pondere unius drachmæ, aquâ vel vino tritum, bufalis, equis, bobus, suibus absque ullo periculo, aut malo exitu. Verum etiam non est, quod ista semina vermbus, & tempore non corrumpantur; si enim diu asserventur, exesa, & perforata inveniuntur, præsertim in Indiâ, & locis humidis.

Observ. Si fructus Cucurbitæ Lagenariæ non debet dici drupa, etiam Ignatianæ fructus, cuius cortex simillimus, dici non potest.

## † GENUS XXXI. RAPINIA.

## Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 8-partitum, inferum: laciniis subrotundis, concavis: bino ordine, exteriori breviore.

Cor. Monopetala, cyathiformis: tubo brevi, crasso: limbo 5-fido, erecto: laciniis ovatis, calyce longioribus.

Stam. Filamenta 5, Capillaria, brevia, tubo insidentia. Antheræ bilobæ, lobis subrotundis.

Pist. Germen subrotundum. Stylus nullus. Stigma simplex.

Peric. Bacca compresso-rotunda, 2-locularis, polysperma.

Sem. Plurima, oblonga, minuscula.

Nom. Rapinia dicitur ex nomine elegantis hortorum cultoris Renati Rapini.

Char. Gener. Cal. 8-partitus, inferus. Cor. cyathiformis, 5-fida.  
Bacca 2-locularis, polysperma.

† Sp. 1. RAPINIA HERBACEA. α Bòn bòn tlòn Já.

Differ. spec. Rap. foliis ovato-lanceolatis, alternis: spicis subterminalibus.

Hab. Caulis herbaceus, 2-pedalis, simplex, erectus, teres, crassus: cortice rugoso. Folia ovato-lanceolata, integerrima, parva, alterna. Flos albus, sessilis: spicis ovato-conicis, subterminalibus.

Habitat inulta in hortis Cochinchinæ.

## GENUS XXXII. CAPSICUM.

Char. Gener. Cor. rotata. Bacca exsucca. Lin. sy. pl. G. 269.

Sp. 1. CAPSICUM ANNUUM. α Ót tau.

Differ. spec. Caps. caule herbaceo: pedunculis solitariis. Lin. sp. 1.

Hab; & notæ. Caulis herbaceus, annuus, 2-pedalis, erectus, ramosus: ramis brevibus, ascendentibus. Folia ovato-lanceolata, integerrima, glabra, sparsa, obscuro-viridia. Flos albus, lateralis, solitarius: corollâ rotatâ: baccâ magnâ, oblongâ, ruberrimâ, exsuccâ, polyspermâ, saporis ardentis.

Hort. Cliff. p. 59. Piper Indicum, vulgatissimum. Bauh. Pin. p. 102.

Sp. 2. CAPSIUM BACCATUM. α Ót tlòn tlái.

Differ. spec. Cap. caule fruticoso lœvi: pedunculis geminis. Lin. sp. 2.

Hab;

Hab; & notæ. *Caulis suffruticosus* 3-pedalis, lœvis, erectus, ramis longiusculis, sparsis, tenuibus. *Folia lanceolata*, integerrima, glabra, sparsa, parva, petiolata. *Flos albus*, rotatus, axillaris, pedunculis 1-2-floris. *Bacca subrotunda*, ruberrima, magnitudine cerasi vulgaris. *Folia infera opposita*, supera alterna.  
*Capicum minus*, rubrum. Rumph. Amb. I. 8. c. 50. pag. 248. tab. 88. f. 2.

Sp. 3. CAPSICUM FRUTESCENS. α Cây Ớt. β Lat tsiao.

Differ. spec. Cap. caule fruticoso, scabriuscule : *pedunculis* solitariis. Lin. sp. 4.

Hab; & notæ. *Caulis fruticosus*, 3-pedalis, scaber : *ramis* diffusis, sœpe scandentibus. *Folia lanceolata*, integerrima, undulata, parva, glabra, petiolata, alterna, & sparsa. *Flos albus*, parvus, axillaris, rotatus, 5-6-fidus. *Bacca* flavo-rubra, conica, curva, corniformis, pollicem longa, plerumque solitaria.

*Capisci* tertia, seu flava species. Rumph. Amb. I. 8. c. 50. t. 88. f. 3. Lada Chili. Bont. Jav. pag. 131.

Virtus baccarum cujuscunque speciei. Calefaciens, Incidens, stomachica. *Capicum* in condimento salubre, crudum in ore urens, in naribus sternaturorum, in fumo suffocans. Species fruticosa, flava omnium acerrima, simulque omnium vulgarissima in utrâque Indiâ. Virtus seminum capsici experientiâ comprobata a Cl. Bergio (Mat. Med. pag. 147.) laudatur ad evincendam pertinaciam febrium intermittentium : &c, si bene memini, in Indiâ utuntur illo in hunc finem, sicut etiam uti solent Pipere, Zingibere, & Sina-pi, quibus similis virtus.

Habitant omnes istæ species cultæ in Cochinchinâ, & in Chinâ.

### GENUS XXXIII. SOLANUM.

Char. Gener. Cor. rotata. Antheræ subcoalitæ : apice poro gemino dehiscentes. *Bacca* 2-locularis. Lin. sy. pl. G. 268.

\* *Inermia*.

Sp. 1. SOLANUM VERBASCIFOLIUM. α Cây Chiâ bôi.

Differ. spec. Sol. caule inermi, fruticoso : *foliis* ovatis tomentosis : *umbellis* compositis. Lin. sp. 1.

Hab; & notæ. Frutex caule erecto, tereti, inermi, 8-pedali : *ramis* patentibus. *Folia* ovata, acuta, integerrima, cinereo-tomentosa, alterna, petiolata. *Flos albus*, parvus, axillaris, & terminalis : racemis umbellatis. *Baccae* 2-loculares, globosæ, luteæ, dia-metro

metro semipollucari.

*Solanum maximè tomentosum*, spinis carens, Virginianum. Pluk. Alm.  
p. 351. tab. 316. f. 1. Aguara-quiya. Pif. Brasil. p. 224.

Habitat incultum in Cochinchinâ.

† Sp. 2. SOLANUM BIFLORUM. α, β Thien phao.

Differ. spec. Sol. caule inermi, fruticoso: foliis ovatis, villosis: pedunculis geminis.

Hab; & notæ. *Caulis* fruticosus, inermis, 3-pedalis: *ramis* diffusis.

*Folia* ovata, sub-acuta, integerrima, utrinque villosa, alterna. *Flos* albus, lateralis: pedunculis 2-natis, 1-floris, erectis. *Calyx* infidus, laciinis subulatis. *Bacca* parva, subrotunda, rubra.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ.

† Sp. 3. SOLANUM ALBUM. α Cà co.

Differ. spec. Sol. caule inermi, suffruticoso: ramis postratis: foliis oblongis angulatis: pedunculis polyfloris.

Hab; & notæ. *Caulis* suffruticosus, subinermis: *ramis* tortuosis, longis, procumbentibus. *Folia* oblonga, angulata, sparsa, petiolata.

*Flos* albus, lateralis, pedunculis polyfloris. *Bacca* mediocris, globosa, colore viridis, albo maculata. Habitat spontaneum in Cochinchinâ.

Trongum Agreste, Album. Rumph. Amb. I. 8. c. 48. p. 241.

Virtus radicis Odontalgica. *Bacca* edulis.

† Sp. 4. SOLANUM DICHOTOMUM. α Kam ngi van.

Differ. spec. Sol. caule inermi, suffruticoso: foliis cordato-lanceolatis: pedunculis dichotomis.

Hab; & notæ. *Caulis* suffruticosus, inermis, pilosus, diffusus, ramosus. *Folia* cordata, lanceolata, integerrima, tomentosa, alterna, petiolata. *Flos* lateralis, pedunculis dichotomis. *Bacca* parva, globosa, rubra.

Habitat Cantone Sinarum, spontaneum.

Sp. 5. SOLANUM NIGRUM. α Cây lu lu duc.

Differ. spec. Sol. caule inermi, herbaceo: foliis ovatis, dentato-angulatis: racemis distichis, nutantibus. Lin. sp. 17.

Hab; & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, inermis, teres, glaber, erectus, 3-pedalis: *ramis* patentibus. *Folia* ovata, acuta, subcrenata, tomentosa, alterna, petiolata. *Flos* albus, axillaris, umbellis parvis, nutantibus. *Bacca* rotunda, parva, nigra. Habitat incultum in Cochinchinâ.

Burm. Ind. pag. 55. Nelen tsjunda. Rheed. Malab. 10. p. 105. tab. 75.

Virtus. Refrigerans, Anodyna, Repellens. Folia externè applicata valent contra cephalgiā, hæmorrhoides, paronychiam, cancrum, & ulcera corrosiva: sed cautè utenda.

Sp. 6. SOLANUM ÆTHYOPICUM.  $\alpha$  Cà tién.

Differ. spec. Sol. caule inermi, herbaceo: foliis ovatis, repando-angulatis: pedunculis fertilibus unifloris, cernuis. Lin. sp. 18.

Hab; & notæ. Caulis herbaceus, inermis annuus: ramis diffusis. Folia ovato-oblonga, sinuato-repanda. Flos solitarius, violaceus: calyce, & corollâ 6-fidis: staminibus 6. Bacca sphæroidea, 6-lobata, magna, glabra edulis: in multis alba, in aliis purpurea.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ, in hortis cultum.

Pluk. Phyt. t. 226. f. 4. Bauh. Pin. p. 167. Solanum Pomiferum, fructu rotundo, striato, duro.

Sp. 7. SOLANUM MELONGENA.  $\alpha$  Cà ăn.  $\beta$  Kie tsù.

Differ. spec. Sol. caule inermi, herbaceo: foliis ovatis, tomentosis: pedunculis pendulis, incrassatis: calycibus inermibus. Lin. sp. 19.

Hab; & notæ. Caulis inermis, herbaceus, annuus, crassus, tortuosus, 2-pedalis: ramis reclinatis, plerumque inermibus, aliquando aculeatis. Folia ovata, sinuata, tomentosa, magna, pauca, sparsa: petiolis crassis, fusco-purpureis, in aliis folio concoloribus. Flos dilutè violaceus, pedunculis axillaribus, incrassatis, deorsum flexis, 1-floris, saepius solitariis, non raro 2-3-natis. Bacca magna, nitida, 2-locularis, polysperma, edulis. Hujus sunt varietas: 1 fructu oblongo, violaceo: 2 fructu oblongo, albissimo: maiori: 3 fructu globoso, violaceo: 4 fructu globoso albo: 5, fructu globoso albo, & violaceo variegato.

Habitat in Chinâ, & Cochinchinâ: imo in toto fere orbe non nisi frigido.

Trongum Hörtense. Rumph. Amb. l. 6. c. 46. t. 85. Belingola. Piso. Brasil. pag. 210. Fockii fockii. Bont. Jav. pag. 123.

Observ. Solanum Insanum (Linnæi sp. 20.) non est specie diversum a Melongenâ; siquidem aculeos illius, per quos videbatur distingui, ego saepè observavi in istâ, ex eisdem feminibus, & in eodem horto nata: ita ut plantæ ejusdem omnino originis viderentur plerique inermes, aliæ aculeatæ seorsim, vel calyce, vel foliis, vel caule, aut ramis. Idem ante me notaverat accuratissimus Rumphius. Vide pag. 239. libro, & capite supra citatis.

Sp. 8. SOLANUM LYCOPERSICUM.  $\alpha$  Cà tau tláng.

Differ. spec. Sol. caule inermi, herbaceo: foliis pinnatis incisis: ramis simplicibns. Lin. sp. 13.

Hab;

Hab; & notæ. *Caulis* inermis, herbaceus, annuus, pilosus, teres, sesquipedalis: ramis prostratis. *Folia* ovato-lanceolata, pinnato-incisa, tomentosa, parva. *Flos* luteus, racemis simplicibus, sparsis. *Bacca* alba, mediocris, subrotunda, 3-loba, glabra. Habitat in Cochinchinâ.

*Solanum Pomiferum*, fructu rotundo, striato, molli. Bauh. Pin. pag. 167. *Pomum amoris*. Rumph. Amb. I. 9. c. 49. tab. 154. f. 1. Habitat incultum in hortis, & agris Cochinchinæ.

Sp. 9. SOLANUM PERUVIANUM. a Cà tau vàng.

Differ. spec. Sol. *caule* inermi, herbaceo: *foliis* pinnatis, incisis, tomentosis: *racemis* 2-partitis, foliosis: *baccis* subpilosis. Lin. sp. 14.

Hab; & notæ. *Caulis* herbaceus, inermis, diffusus, ramosus. *Folia* pinnata, incisa, tomentosa. *Flos* coloris aurei: *racemis* 2-partitis, foliosis: *antheris* sub-coalitis. *Bacca* crocea, pilosa, parva, subrotunda, compressa, 3-locularis, polysperma, edulis.

Habitat incultum in hortis Cochinchinæ.

*Lycopersicon pimpinellæ* folio. Few. Peruv. 3. p. 37. t. 25.

\*\* *Aculeata*.

Sp. 10. SOLANUM MAMMOSUM. a Cà ung.

Differ. spec. Sol. *caule* aculeato, herbaceo: *foliis* cordatis, angulo-lobatis, utrinque villosis, aculeatis. Lin. sp. 23.

Hab; & notæ. *Caulis* annuus, durus, crassus, 5-pedalis, erectus, aculeatus, tomentosus, ramosus. *Folia* (ex Solanis) maxima, subrotunda, angulato-lobata, saepe cordata, utrinque aculeata, villosocinerea, sparsa. *Flos* albus, pedunculis lateralibus, polyfloris. *Calyx* inermis, 5-fidus, pilosissimus. *Bacca* mediocris, rotunda, lutea, hispida.

*Solanum Indicum*, spinosum, frutescens, maximum, villosum totum, fructibus croceis. Burm. Zeyl. pag. 218. Ind. pag. 56.

Habitat agreste in Cochinchinâ.

Sp. 11. SOLANUM INDICUM. a Cà hoang gai.

Differ. spec. Sol. *caule* aculeato, fruticoso: *foliis* cuneiformibus, angulatis, subvillosis, integerrimis: *aculeis* utrinque rectis. Lin. sp. 26.

Hab; & notæ. *Caulis* fruticosus, aculeatus, 3-pedalis, erectus: *ramis* patentibus. *Folia* ovata, subacuta, pinnato-sinuata, utrinque aculeata. *Flos* dilute violaceus, lateralis, pedunculis polyfloris, erectis: *calycibus* aculeatis. *Bacca* parva crocea, subrotunda.

*Solanum Indicum*, frutescens, spinosum, borraginis flore, fructu croceo, rotundo, minimo. Herm. Mus. Zeyl. pag. 65. Burm. Zeyl. t. 102. p. 220.

Habitat agreste in Cochinchinâ.

† Sp. 12. SOLANUM PROCUMBENS.  $\alpha$  Cà quánh.

Differ. spec. Sol. *Caule aculeato, suffruticoso, procumbente: floribus congestis, terminalibus.*

Hab; & notæ. *Caulis suffruticosus, longus, procumbens, densè aculeatus, ramosus. Folia ovata, 5-loba, utrinque villosa, sparsim aculeata: aculeis brevibus, curvis, acutissimis. Flos congestus, terminalis, albo-violaceus, parvus, pedunculatus: calyce 4-fido, corollâ totatâ 4-partitâ. Bacca minima, rotunda, ruberrima, nitida, polysperma.*

Habitat in Cochinchinâ inter sepes, & in locis agrestibus.

### GENUS XXXIV. PHYSALIS.

Char. Gener. *Cor. rotata. Stamina conniventia. Bacca intra calycem inflatum, 2-locularis.* Lin. sy. pl. G. 267.

Sp. 1. PHYSALIS SOMNIFERA.  $\alpha$  γ . . .

Differ. spec. Phys. *caule fruticoso: ramis rectis: floribus confertis.* Lin. sp. 1.

Hab; & notæ. *Caulis fruticosus, multiplex, erectus: ramis sub-rectis, patentibus. Folia subrotunda, integerrima, glabra, conferta, basi obtusissimâ, inaequali. Flos confertus, lateralis, pedunculis 1-floris. Corolla campanulata, albo-viridis, acutè 5-fida. Bacca rubra, subrotunda, 2-locularis, polysperma, intra calycem inflatum, 5-gonum, magnum.*

Habitat agrestis in orâ Africæ Zanguebar: ubi eam examinavi Botanicè, non Medicè.

*Solanum Somniferum verticillatum.* Bauh. Pin. p. 166. n. 7. Clus. hist. 2. p. 85.

Sp. 2. PHYSALIS ANGULATA.  $\alpha$  Lu lu cai.

Differ. spec. Phys. *ramosissima: ramis angulatis, glabris: foliis ovatis, dentatis.* Lin. sp. 9.

Hab; & notæ. *Caulis annuus, sesquipédalis: ramis multis angulatis, tortuosis, diffusis, glabris. Folia ovata, acuminata, subserrata, rugosa, alterna. Flos albus, axillaris, solitarius. Bacca rotunda, rubra, pendula, vesicâ calycis inclusa.*

*Alkekengi Indicum glabrum, capsici folio.* Dill. Elth. 12. tab. II. f. II.

f. II. Burm. Zeyl. pag. 10. Camarú. Pis. Bras. fig., pag. 223.  
Habitat spontanea in Cochinchinâ.

Sp. 3. PHYSALIS PUBESCENS.  $\alpha$  Lu lu loung.

Differ. spec. Phys. *ramosissima*, *foliis villoso-viscosis* : *floribus pendulis*. Lin. sp. 10.

Hab ; & notæ. *Caulis annuus*, 1-pedalis, teres, fuscus, pubescens, ramosissimus. *Folia* basi rotunda, apice acuta, ferrato-incisa, villosa, alterna, petiolis longis. *Flos* luteo-viridis, axillaris, solitarius : *pedunculus* pendulis, nutantibus : *corollâ campanulatâ*, leviter 5-fida : *calyce* 5-fido, acuto, erecto, baccam includente globosam, luteam, 2-locularem.

Habitat inculta in Cochinchinâ.

Burm. Ind. pag. 55. Alkekengi Virginianum fructu luteo Few. Peruv. 3. pag. 5. t. I.

Sp. 4. PHYSALIS ALKEKENGI.  $\beta$  Soán tsiám.  $\alpha$  Toan tuong.

Differ. spec. Phys. *foliis geminis*, *integris*, *acutis* : *caule* herbaceo, inferne subramoso. Lin. sp. 7.

Hab ; & notæ. *Caulis* herbaceus, sesquipedalis, erectus, teres, glaber, parum ramosus. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, glabra, nunc gemina, nunc sparsa. *Flos* albus, lateralis, solitarius : *pedunculus* pendulis. *Bacca* globosa, rubra, calyce vesiculari fota.

Habitat in Chinâ, & Cochinchinâ.

Halicacabus Indicus, minor. Rumph. Amb. I. 10. cap. 44. tab. 26. f. 1. p. 61. Solanum Vesicarium. Bauh. Pin. p. 166. n. 2.

Virtus. Totius herbae. Refrigerans, Diuretica. Similem virtutem habent præcedentes species Angulata, & Pubescens.

### GENUS XXXV. LYCIUM.

Char. Gener. *Cor. tubulosa*, fauce clausa filamentorum barbâ. *Bacca* 2-locularis, polysperma. Lin. sy. pl. G. 273.

Sp. 1. LYCIUM BARBARUM.  $\beta$  Kéu kí.  $\alpha$  Câu khí.

Differ. spec. Lyc. *foliis lanceolatis* : *calycibus* sub-bifidis. Lin. sp. 2.

Hab ; & notæ. *Frutex* 4-pedalis, cespitosus, erectus, ramis assurgentibus : aculeis rectis, solitariis, sparsis. *Folia* lanceolata, integerrima, glabra, nunc congesta, nunc sparsa. *Flos* purpurascens, solitarius, axillaris, pedunculo longo, reflexo. *Calyx* erectus, 3-fidus : lacinia unâ 2-dentatâ. *Corolla* infundibuliformis, 5-fida : staminibus corollæ æqualibus, ejus faucem barbâ densâ claudentibus. *Bacca* parva, rubra, ovata, 2-locularis, polysperma.

Habi-

Habitat Cantone Sinarum.

Virt. Baccarum in Medicinâ sinensi. Tonica, Analeptica, Cephalica. Utuntur infusione in vino: etiam simplici decocto in aquâ.

Jasminoides Sinense, halimi folio longiore, & angustiore. Duham. Arb. I. p. 306. tab. 121. f. 4. Burm. Ind. pag. 59. Lycium Barbarum.

† Sp. 2. LYCIUM COCHINCHINENSE. a Cây sơn lút.

Differ. spec. Lyc. *foliis* oblongis obtusis: *caule* inermi: *cymis* terminalibus.

Hab; & notæ. *Frutex* 4-pedalis, sub-erectus, ramosus, inermis. *Folia* oblonga, obtusa, integerrima, crassa, glabra, alterna. *Flos* terminalis, albus, cymis pedunculatis. *Calyx* 5-fidus. *Corolla* tubulosa, limbo 5-fido, reflexo. *Stamina* 5, corollæ subæqualia, pilis multis confita, tubum corollæ obstruentibus. *Bacca* subrotunda, 2-locularis.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

### + GENUS XXXVI. ARGYREIA.

#### *Descriptio Naturalis.*

Cal. Perianthium 5-phylum, inferum, coloratum, permanens: foliolis ovatis, concavis, pilosis, post fructificationem expansis, binis exterioribus maioribus.

Cor. Monopetala: tubo brevi, crasso, ambiente nectarium 5-crenatum: limbo 5-partito, laciniis oblongis, plicatis, reflexis.

Stam. Filamenta 5, conniventia, limbo breviora, basi incrassata, pilosa, ori tubi affixa. Antheræ sagittatæ, stantes.

Pist. Germen subrotundum. Stylus filiformis, æqualis staminibus. Stigma Capitatum, emarginatum.

Peric. Bacca subrotunda, exsucca, 4-locularis, 1-sperma.

Sem. Hinc rotunda, inde angulata.

Nom. (Αργυρειος argenteus) a foliis plantæ splendorem argenteum imitantibus.

Char. Gener. Cal. 5-phillus, coloratus. Cor. 5-partita, plicata. Bacca 4-locularis, 1-sperma.

† Sp. 1. ARGYREIA OBTUSIFOLIA. a Lá bac thau.

Differ. spec. Arg. *foliis* ovatis, obtusis: *paniculis* subterminalibus.

Hab. *Caulis* fruticosus, inermis, longus, scandens, acirrus: *ramis* paucis. *Folia* ovata, obtusa, integerrima, alterna, subtus pubescens, albicantia, splendentia, plana, petiolata. *Flos* albus, paniculis laxis, subterminalibus. *Bacca* exsucca, rubra.

Habitat in Cochinchinâ per sepes scandens.  
Virtus. Subastrigens.

† Sp. 2. ARGYREIA ACUTA. ♂ Pă hō thān.

Differ. spec. Arg. *foliis* ovatis, acutis : *corymbis* axillaribus.  
Hab ; & notæ. *Caulis* fruticosus, scandens. *Folia* lanceolato-ovata ;  
integerrima, tomentoso-plendentia, alterna. *Flos* albus : *corymbis*  
lateralibus, pedunculo communi longo : filamentis corollâ breviori-  
bus : *calyce* colorato : *corollæ* laciniis plicatis.

Habitat in Sinis, a præcedenti non admodum differens.

† Sp. 3. ARGYREIA ARBOREA. ♂, ♀ Trāng Xūn hōa.

Differ. spec. Arg. *caule* arboreo : *foliis* rugosis : *racemis* terminali-  
bus.

Hab ; & notæ. *Caulis* arboreus, 8-pedalis : *ramis* patentibus. *Folia*  
ovata, acuta, integerrima, rugosa, glabra, reflexa. *Flos* termina-  
lis, luteus, racemosus : *calyce* 5-fido, inflato, rubro : *corollæ*  
tubo filiformi, longiusculo : limbo 5-partito, laciniis rotundatis,  
plicatis. *Bacca* 4-locularis, 1-sperma, calyce permanente fota.

Habitat in sylvis, & colitur in hortis tam in Cochinchinâ, quam in  
Chinâ.

Virtus. Attenuans, Resolvens, Abstergens. Usus frequentior externus  
in inflammatione, & tumore mamillarum, facto cataplasmate ex  
*foliis*, & radice simul contusis.

Observ. Est hujus variatio flore albo, & baccâ plerumque 2-sperma.  
Habitus primæ, & secundæ speciei admodum similis est Argophylli  
nitidi, præcipue *foliis* tomento sericeo albo splendentibus. Lin. Jun.  
sup. plant. p. 156.

### † G E N U S XXXVII. C E R I U M.

#### Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 5-partitum, inferum, persistens : laciniis subulatis,  
erectis.

Cor. Monopetala, campanulata, calyce vix longior : limbo subere-  
cto, 5-fido : laciniis, & fissuris rotundatis.

Stam. Filamenta 5, subulata, erecta, tubo inhærentia, corollâ lon-  
giora. Antheræ oblongæ, incumbentes.

Pist. Germen subrotundum. Stylus subulatus, æqualis staminibus. Sti-  
ma crassiusculum.

Peric. Bacca parva, globosa, locularis : loculis multis, pentagonis,  
regularibus, 1-spermis, versus peripheriam simplici ordine dispositis.  
Sem.

Sem. Angulata, parva.

Nom. (*Kεριον favus*) a formâ pericarpii cellulis polygonis favum melis repræsentantis.

Char. Gener. *Cal.* 5-partitus, inferus. *Cor.* campanulata. *Bacca* cellulis pentagonis monospermis.

† Sp. 1. CERIUM SPICATUM. α Cây Chát chát.

Differ. spec. *Cer. foliis polynerviis: spicis terminalibus.*

Habitus. *Caulis* herbaceus, annuus, sesquipedalis, simplex, teres, erectus: *radice* repente. *Folia* lato-lanceolata, sub-integerrima, polynervia, glabra, alterna, petiolata. *Flos* albus, pedunculatus: *spicis* longis, simplicibus, erectis, terminalibus: bracteis floralibus filiformibus.

Habitat absque culturâ in hortis Cochinchinæ.

Observ. Convenit cum Brunsfelsiâ Plumieri seminibus tunicæ baccæ appositis: differt cellulis pericarpii, calyce, & tubo corollæ.

### GENUS XXXVIII. CERRERA.

Char. Gener. Contorta. Drupa monosperma. Lin. sy. pl. G. 319.

† Sp. 1. CERBERA SALUTARIS. α Cây Múop sác.

Differ. spec. *Cerb. foliis, & fructibus ovalibus.*

Hab; & notæ. *Arbor* mediocris: succo lactescente: *ramis* expansis. *Folia* oblongo-ovalia, obtusa, integerrima, nitida, costis obliquis, sparsa, ad apicem ramorum conferta, subpetiolata. *Flos* albus, inodorus, racemis parvis, subterminalibus. *Calyx* 5-fidus, laciniis subulatis, longis, erectis. *Corolla* hippocrateriformis, tubo longo, curvo: limbo 5-partito, laciniis oblongis, carnosis, patentibus, nec contortis. *Filamenta* 5, medio tubo insistentia, eidem æqualia: antheris oblongis, stantibus. *Germen* ovatum, minimum. *Stylus* staminibus longior, crassus, curvatus: pressione gibbosâ tubum corollæ semper disrumpens. *Stigma* turbinatum, verticaliter compressum, apice truncatum. *Pericarpium* drupa ovalis, magna, pelliculâ laevi, hinc lutea, inde rubra, fructui Mangiferæ simillima: nuce fibroso-ligneâ: nucleo simplici, nec venenato.

Habitat prope maris litora in Cochinchinâ.

Lactaria Salubris. Rumph. Amb. I. 3. pag. 255. tab. 84. Arbor ista propius ad nostram accedit, quam illa ab eodem Rumphio descripta cap. 38. tab. 81., a Linnæo dicta Cerbera Manghas. Et adhuc longius distat Manghas lactescens, foliis Nerii crassis. Burm. Zeyl.

p. 151. t. 70. In nostrâ quidem obseruavî coronam laciniatam ad os tubi a nectario Nerii non discrepantem. Drupa cerberæ , nascentis ad oras freti Malacencis , ibi a me observata est semiliter ovalis , & nucleo simplici. Florem autem non vidi.

## GENUS XXXIX. TECTONA.

Char. Gener. *Stigma* dentatum. *Drupa* sicca , spongiosa , intra caly-  
cem inflatum. *Nucleus* 3 - locularis. Lin. Jun. sup. pl. G. 1371. p. 20.

Sp. 1. TECTONA THEKA.  $\alpha$  Cay Sao.

Differ. spec. Tect. *foliis* ovatis , oppositis : *racemis* laxis , termina-  
libus.

Hab ; & notæ. *Arbor* altissima : *cortice* glabro : *ramis* ascendentibus. *Folia* maxima , ovata , acuta , integerrima , basi obliqua , costis oppositis , incurvis , crassis , superius glabra , aspera , inferius lanuginosa , opposita , petiolata. *Flos* albus , terminalis : *racemis* magnis , erectis , ordinatè divisis : *corollâ* infundibuliformi , 5 - par-  
titâ. *Pericarpium* drupa parva , subrotunda , 3 - locularis , tecta ca-  
lyce vesiculari-inflato , apice 5 - fido hiante.

Habitat in vastis sylvis provinciæ *Đoùng nai* , ad confinia Cochinchinæ , & Cambodiæ.

Jatus. Rumph. Amb. I. 4. c. 13. tab. 18. Theka. Rheed. Malab. 4. p.  
57. t. 27. Quercus Indica. Bont. Jav. I. 6. c. 16. p. 151. Theka Mar-  
den. Samatr. pag. 129.

Uſus. Lignum hujus arboris est omnium optimum ad ædificandum ;  
præcipue naves. Non tam venustate , quam viribus , & constantiâ  
pollet ; nam contra teredinem , formicas albas , in Indiâ valde no-  
xias , & contra nimium hnmorem perstat incorruptum.

## + GENUS XL. DISSOLENA.

## Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium tubulosum , inferum , 5 - fidum : laciniis subulatis ;  
erectis.

Cor. Infundibuliformis : tubo longo , biformi : inferiori crassiore , 5 -  
gono , staminifero : superiori cylindrico : limbo 5 - fido , patente.

Stam. Filamenta 5 , capillaria , brevia , infra os tubi inferioris insi-  
dentialia. Antheræ ovatæ , erectæ.

Pist. Germen ovatum. Stylus filiformis , brevior staminibus. Stigma  
sub-ovatum , crassum , scabrum.

Peric. Drupa parva , ovata ; nuce compressâ scabré ; nucleo simplici.

S

Nom.

Nom. ( $\Delta\delta$ is bis, Σωλην $\nu$  tubus) ob duplicem corollæ tubum.

Char. Gener. *Drupa* nuce scabré. Cor. tubus 2-formis. *Stigma* ovatum.

$\dagger$  Sp. 1. DISSOLENA VERTICILLATA.  $\beta$  Mat sa.

Differ. spec. Dis. *foliis* oppositis, stellatisque: *racemis* terminalibus.  
Hab. *Arbor* parva, 8-pedalis: *ramis* patentibus. *Folia* lanceolata, integerrima, glabra, inferiora opposita, summa stellata terna, quaternaque. *Flos* albus, *racemis* subdivisis, terminalibus. *Drupula* nigra, glabra.

Habitat in provinciâ Cantonensi Sinarum.

#### GENUS XLI. VARRONIA.

Char. Gener. Cor. 5-fida. *Drupa* nucleo 4-loculari. Lin. sy. pl. G. 279.

$\dagger$  Sp. 1. VARRONIA SINENSIS.  $\beta$  Xān chū Yú.  $\alpha$  Sōn chāu dāu.

Differ. spec. Var. *foliis* ovato-lanceolatis, nitidis: *pedunculis* polyfloris.

Hab; & notæ. *Arbor* mediocris, ramis patentibus. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, nitida, opposita, alternaque, sub-petiolata. *Flos* albus, *pedunculis* polyfloris, lateralibus, & terminalibus. *Cal.* 1-phyllo, subcampanulatus, 5-fidus, brevis. Cor. campanulata, 1-petala, tubo brevi, crasso: limbo 5-partito, laciniis ovatis, patentibus, æqualibus. *Filamenta* 5, subulata, ori tubi inferta, corollæ subæqualia: antheris ovatis, incumbentibus. *Germeu* ovatum. *Stylus* brevis. *Stigma* 4-fidum. *Drupa* parva, ovata, glabra, rubra, acida, edulis: nuculâ 4-loculari.

Habitat in variis locis imperii Sinensis.

Virtus. Druparum pulpa est in frequenti usu apud Sinenses Medicos: a quibus æstimatur sub-astringens, exsiccans, Cephalica, renes, & vesicam robotans.

#### GENUS XLII. PHYTEUMA.

Char. Gener. Cor. rotata, laciniis linearibus, 5-partita. *Stigma* 3-fidum. Caps. 2-3-locularis, infera. Lin. sy. pl. G. 236.

$\dagger$  Sp. 1. PHYTEUMA BIPINNATA.  $\beta$  Tcha leāng tsào.

Differ. spec. Ph. *foliis* bipinnatis, serratis: *racemis* terminalibus. Hab;

Hab; & notæ. *Caulis* subfruticosus, erectus : *ramis* angulatis, sulcatis, patentibus. *Folia* 2-pinnata, lanceolata, ferrata, venosa. *Flos* albus, racemis subdivisis, terminalibus, amplis. *Cal.* brevis. 5-fidus. *Corolla* subcampanulata, 5-fida. *Stigma* 3-fidum. *Pericarpium* inferum, perforatum, evalve, turbinatum, 3-loculare, polyspermum. *Stamina* 5, brevia.

Habitat in suburbis Cantonisibus.

Observ. Corolla non est Phyteumæ propria. Pericarpium potius dicitur Bacca, quam Capsula. Cui autem generi adscribenda, ne nouum constituant?

† Sp. 2. PHYTEUMA COCHINCHINENSIS. α Cay thuoc moi.

Differ. spec. Ph. *foliis* bipinnatis rugosis : *pedunculis* divaricatis.

Hab; & notæ. *Caulis* subfruticosus, suberectus, multiplex, 5-pedalis. *Folia* lanceolata, ferrata, rugosa, 2-pinnata bijuga, cum impari maiori. *Flos* albus, subterminalis, pedunculis polyfloris, divaricatis : *calyce* 5-dentato, minimo : *corolla* rotata, 5-partitâ, laciiniis acutis. *Bacca* infera, subrotunda, pertusa, parva, 1-locularis, polysperma : feminibus plurimis, subrotundis, minutissimis. *Stigma* non annotavi.

Habitat in montibus Cochinchinæ, ubi usu Medico indigenis satis nota.

Observ. Hujus plantæ corolla, calyx, & stamina Phyteumæ convenient: pericarpium minimè. Habitus præcedenti speciei valde proximus.

### GENUS XLIII. CAMPANULA.

Char. Gener. *corolla* campanulata, fundo clauso valvis staminiferis. *Stigma* 3-fidum. *Capsula* infera, poris lateralibus dehiscens. Lin. sy. pl. G. 234.

† Sp. 1. CAMPANULA REPENS. α . . .

Differ. spec. Camp. *caule* subdiviso, repente : *foliis* oblongis, carnosis : *floribus* solitariis.

Hab; & notæ. *Caulis* herbaceus, procumbens, subdivisus, ramosissimus ramusculis repentibus. *Folia* oblongo-ovata, integerrima, parva, carnosa, pilosa, opposita. *Flos* albus, sessilis, axillaris, solitarius : *calycibus* acutis, erectis : *corollis* campanulatis, 5-fidis, parvis. *Capsula* inferæ, 3-gono-rotundæ, pilosæ, 3-loculares, 1-spermæ. *Corollæ* laciniae rotundatæ, acuminatæ. *Stigma* 3-fidum.

Habitat inculta in agris Cochinchinæ.

## GENUS XLIV. MORINDA.

Char. Gener. *Flores aggregati*, monopetali. *Stigma* 2 - fidum. *Dru-*  
*pae*. *aggregatae*. Lin. sy. pl. G. 252.

Sp. 1. MORINDA UMBELLATA.  $\alpha$  Cây Ngé bà.

Differ. spec. Mor. *foliis lanceolato-ovatis*: *pedunculis confertis*. Lin.  
sp. 1.

Hab; & notæ. *Caulis* arboreus, 6 - pedalis, ramis patentibus. *Folia*  
lanceolata, integerrima, hispida, opposita, petiolata. *Flos* albus:  
*pedunculis confertis*, lateralibus: *corollis* superis, tubulosis, 5 - fi-  
dis. *Bacca* composita, subrotunda, parva, lutescens, formata ex  
drupulis carnosis, 1 - locularibus, seminibus osseis. *Stamina* 5.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Bancudus Angustifolia. Rumph. Amb. I. 5. c. 13. tab. 98. Ibi describi-  
tur arbor mediocris, pedunculis solitariis, in quo a nostrâ, & a  
Linnæunâ differt.

Uſus. Decoctum radicis præstat ad tingendas telas colore croceo per-  
manentē: rubro pariter, si lignum Sappan admisceatur.

Sp. 2. MORINDA CITRIFOLIA.  $\alpha$  Cây Nhaú.

Differ. spec. Mor. *Arborea*: *pedunculis solitariis*. Lin. sp. 2.

Hab; & notæ. *Arbor* 8 pedes alta: *coma* latissimâ. *Folia* lanceolato-  
ovata, integerrima, glabra, nitida, opposita, sparsaque. *Flores*  
albi, aggregati, infundibuliformes, 5 - fidi: *staminibus* 5: *stigmate*  
2 - fido. *Bacca* pedunculo solitario, oblongo-ovata, tuberculosa,  
succosa, luteo-viridis, graveolens, edulis, sapore ardente, com-  
posita ex drupulis inter se coalitis, monospermis.

Habitat culta in hortis Cochinchinensisibus.

Bancudus Latifolia. Rumph. Amb. I. 5. c. 14. tab. 99. Arbor Conifera  
Macandou. Bont. Jav. I. 6. p. 97. fig. ibi.

Virtus foliorum, & fructus. Calefaciens, Emolliens, Deobſtruens,  
Emmenagogia. In dysuriâ dolorem mitigat, & materiam morbosam  
per urethram expellit.

Sp. 3. MORINDA ROYOC.  $\alpha$  Cây Ngón.

Differ. spec. Mor. procumbens. Lin. sp. 3. Cliff. p. 73:

Hab; & notæ. *Caulis* fruticosus, procumbens, tenuis, 6 - pedalis:  
ramis brevibus. *Folia* parva, ovata, integerrima, glabra, obscurè  
viridia, opposita. *Flos* albus, aggregatus: *pedunculis confertis*,  
terminalibus: *corollâ* infundibuliformi, 4 - fidâ, *staminibus* 4: *sti-*  
*gmate* 2 - fido. *Drupulae* singulæ 2 - loculares, 1 - spermæ, com-  
ponen-

ponentes baccam parvam, subrotundam, carnosam, ggregatam; odore, & sapore Mor. Citrifoliæ similem.

Habitat inculta in Cochinchinâ.

Aublet. Guian. pag. 200. Periclymenum Americanum, e cuius radice fit atramentum. Pluk. Alm. 287. tab. 212. f. 4.

### GENUS XLV. NAUCLEA.

Char. Gener. *Cor.* infundibuliformis. Semen 1, inferum, 2-locular. Receptaculum commune globosum. Lin. sp. pl. G. 239.

Sp. 1. NAUCLEA ORIENTALIS. a Cây gáo.

Differ. spec. Nauc. *foliis* oppositis. Lin. sp. 1.

Hab; & notæ. *Arbor* magna, trunco recto: ramis patentibus. *Folia* ovata, obtusa, integerrima, magna, glabra, petiolata, opposita, costis crassis, parallelis, curvis. *Flos* terminalis, solitarius, pedunculo longo, compositus ex flosculis plurimis flavis in globum bipolliticarem aggregatis. *Cal.* communis nullus. *Perianthium* proprium carnosum, oblongum, inæqualiter polyfidum. *Corolla* infundibuliformis, plerumque 5-fida: *staminibus* totidem brevibus. *Stylus* longissimus, undique conglobatus in capitulum magnum canescens, aureos flosculos conjunctis viribus occultans. *Stigma* integrum, turbinatum, acuminatum. *Semina* solitaria, infera, oblonga, angulata, scabra, 2-3-locularia, receptaculo ovato insidentia. *Bacca* composita fit ex perianthiis flosculorum carnosis, coalescentibus irregulariter in corpus globosum, lacunosum.

Habitat in sylvis planis, & prope rivos in Cochinchinâ.

Bancalus Latifolia, Arbor noctis. Rumph. Amb. l. 4. c. 47. tab. 54.

Bancalus mas, sive angustifolia Rumph. c. 48. tab. 55. hujus est varietas, cum inter se parum differant.

Uſus. Lignum colore flavum, solidum, & pulchrum ad quælibet opera idoneum est, si intra domum servetur: sed pluviæ, & acri expositum citò corrumpitur.

### + GENUS XLVI. DASUS.

#### *Descriptio Naturalis.*

*Cal.* Perianthium tubulosum, breve, coloratum, leviter 5-fidum: lacinias obtusis.

*Cor.* Monopetala, supera, campanulata, undique pilosissima: limbo 5-fido, calyce duplo longiore.

*Stam.* Filamenta 5, brevia, basi corollæ insistentia. Antheræ biliculares, stantes.

Pist.

Pist. Germen subrotundum, calyce vestitum. Stylus filiformis corollæ æqualis. Stigma 5 - fidum : laciniis oblongis, erectis.  
Pericarpium. Bacca calycina, compresso-rotunda, umbilicata, 1 - sperma.

Sem. Sphæroideum.

Nom. ( $\Delta\alpha\delta\upsilon\delta$  hirsutus) a notabili floris hirsutie.

Char. Gener. *Corolla* campanulata, hirsutissima. *Stigma* 5 - fidum.  
Bacca calycina, 1 - sperma.

† Sp. 1. DASUS VERTICILLATUS.  $\alpha$  Cây Caöng.

Differ. spec. Das. *foliis* lanceolatis : verticillis florum axillaribus.

Hab. *Arbor* mediocris : *ramis* expansis. *Folia* lanceolata, integerrima, undulata, subitus tomentosa. *Flos* albus, sessilis : verticillis axillaribus.

Habitat agristis in Cochinchinâ.

#### † GENUS XLVII. HELIXANTHERA.

##### *Descriptio Naturalis.*

Cal. Perianthium Cylindraceum, truncatum, coloratum, suffultum squamulâ ovatâ, carnosâ, calyci concolore.

Cor. Monopetala, supera : tubo brevi : limbo 5 - partito, reflexo : laciniis oblongis, obtusis. Nectarium pentalaterum, apice 5 - fidum, stylum arcte comprimens.

Stam. Filamenta 5, filiformia, fauci corollæ inhærentia. Antheræ lineares, spiraliter revolutæ.

Pist. Germen oblongum, calyce occultum. Stylus æqualis staminibus. Stigma crassiusculum.

Peric. Bacca calycina, oblongo-ovata, 1 - sperma.

Sem. 1. ovatum.

Nom. ( $\text{Ελιξ}$  spira) ab antheris spiralibus.

Char. Gener. *Cal.* oblongus, truncatus. *Cor.* 5 - partita. *Antheræ* spirales. *Bacca* calycina, 1 - sperma.

† Sp. 1. HELIXANTHERA PARASITICA.  $\alpha$  Chanh coi do.

Differ. spec. Hel. *foliis* lanceolatis : *spicis* axillaribus.

Hab. *Caulis* parasiticus, lignosus, longus, ramosus. *Folia* lanceolata, glabra, integerrima, undulata, apice reflexo. *Flos* coccineus, par-

*parvus*, spicis longis, simplicibus, axillaribus. *Calyx*, & *bacca* ejusdem coloris coccinei.  
Habitat, & adrepit arboribus cultis in hortis Cochinchinæ.

## † GENUS XLVIII. AIDIA.

## Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium tubulosum, 5-dentatum, erectum.  
Cor. Monopetala, supera, hippocrateriformis: tubi fauce lanosa: limbo 5-partito, laciniis lanceolatis.  
Stam. Filamenta nulla. Antheræ 5, lineares, incisuris corollæ insertæ.  
Pist. Germen ovatum. Stylus æqualis staminibus. Stigma ovato-oblongum.  
Peric. Bacca ovata, calycina, parva, umbilicata, 1-sperma.  
Sem. 1-ovatum.  
Nom. (*Aidios* æternus) a longissimâ duratione ligni hujus arboris.

Char. Gener. Cor. hippocrateriformis, fauce lanosa. Antheræ lineares. Bacca calycina, 1-sperma.

## † Sp. 1. AIDIA COCHINCHINENSIS. a Cay Tlai.

Differ. spec. Aid. *foliis* lanceolatis, oppositis: *racemis* laxis, axillaribus.  
Hab. *Arbor* magna: ramis patentibus. *Folia* lanceolata, integerrima, glabra, opposita. *Flos* albus, racemis laxis, brevibus, axillaribus.  
Ufus. *Lignum* istius arboris est album, & grave, ex fibris crassis compositum, nec pulchrum. Valet imprimis ad infimas ædificiorum conagationes, & sublicios pontes struendos; nam sub terrâ, vel aquâ diutissime persistit indemne.

## † GENUS XLIX. ANTHEURIA.

## Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium tubulosum, persistens: limbo brevi, 4-fido, laciniis acutis.  
Cor. Monopetala, supera, rotata, 5-partita: laciniis acutis.  
Stam. Filamenta 5, brevissima, fauci corollæ insidentia. Antheræ sagittatæ, stantes: apice caudato, longo, reflexo.  
Pist. Germen ovatum. Stylus subulatus, corollâ longior. Stigma simplex.

Peric.

Peric. *Bacca calycina*, ovata, corticosa, 10 - fulcata, 1 - locularis; 2 - sperma.

Sem. Hinc plana, inde convexo-ovata, 5 - fulca.

Nom. (O'upæ cauda) propter antheras caudatas.

Char. Gener. *Cor.* rotata. *Antheræ* caudatæ. *Bacca calycina*, 2 - sperma.

† Sp. 1. ANTHONURA RUBRA. a Cay lau.

Differ. spec. Anth. *foliis* ovato-lanceolatis, oppositis: *racemis* paniculatis.

Hab. *Arbuscula* 5 - pedalis: *ramis* diffusis, rubescensibus. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, glabra, nitida, opposita, petiolis brevibus. *Flos* albus, filamentis rubris: *racemis* erectis, magnis, subdivisis, sub-terminalibus. *Bacca* parva, fusco-rubra.

Habitat inculta, passim obvia in Cochinchinâ.

*Caryophyllaster* ruber. Malaicè Tsjenkeutan. Rumph. Amb. I. 5. c. 55. t. 136. *Caryophyllaster* albus (ibi) est hujus varietas.

Virtus. Resolvens, stimulans. In Odontalgia cum oris intumescentia efficaciter operatur, si ex foliorum decocto vapor calidus hiante ore excipiatur, qui magnam pituitæ copiam educit, dolorem, & tumorem amovet, dentes roborat.

### GENUS L. COFFEA.

Char. Gener. *Cor.* hippocrateriformis. *Stamina* supra tubum. *Bacca* inferæ 2 - sperma. *Semina* arillata. Liu. sy. pl. G. 247.

Sp. 1. COFFEA ARABICA. a Cay caphe.

Differ. spec. Cof. *floribus* 5 - fidis: *baccis* 2 - spermis. Lin. sp. 1.

Hab; & notæ. *Arbor* debilis, 8 pedes alta: *ramis* patentibus, oppositis. *Folia lanceolata*, integerrima, nitida, undulata, opposita, petiolis brevibus. *Flos* albus, axillaris, congestus, subfessilis: *calyx* 4-dentato, minimo, deciduo: *corolla* hippocrateriformi, 5-partita, laciniis lanceolatis. *Bacca* ovata, rubra, succosa, dulcis: *seminibus* binis, arillatis.

Habitat in hortis Cochinchinæ, non indigena, sed ex alio loco advecta.

Hort. Cliff. pag. 59. Pluken. Phyt. tab. 272. f. 1.

Virtus. Exficcans, Stomachica, Cephalica. Seminum semiustorum frequentissimus, & in deliciis habetur usus, si decoctum calidum sumatur: valetque ad somnolentiam, & dolores capitum arcendos.

Coffea

Coffea usus, proprietates, & cultura benè describuntur in Encyclop. Econ. tom. 4. pag. 48.

† Sp. 2. COFFEA RACEMOSA. γ . . .

Differ. spec. Cof. *Ramosissima* : foliis scabris : racemis terminalibus. Hab ; & notæ. *Arbuscula* 4 - pedalis , ramosissima : ramis diffusis , teretibus. *Folia* ovato-lanceolata , integerrima , tuberculis plurimis confita , scabra , opposita , petiolis brevibus. *Flos* superus , subterminalis : racemis erectis , brachiatis : pedunculo communi longo , 4 - gono , partialibus brevioribus , teretibus , oppositis , vel stellatis. *Bacca* infera , subrotunda , parva , rubra , aquosa , 1 - locularis , 2 - sperma : seminibus hemisphaericis , arillatis , fulco longitudinali notatis.

Habitat agrestis in insulâ Africanâ Mozambicco.

Observ. Coffea Occidentalis Linæi sp. 2. , & Coffea Paniculata Aubletti ( Guian. pag. 152. tab. 58. ) conveniunt cum nostrâ in paniculâ , quam dicunt , brachiatâ : nostra vero ab illis differt ramis incompositis , foliis scabris , tuberculosis , & baccis rotundis , dispermis. De flore autem iudicium ferre non valeo , quia eo tempore , quo Mozambicci moratus sum mensibus scilicet Julio , Augusto , & Septembri non florebat , sed fructus adhuc recentes servabat.

† Sp. 3. Coffea ZANGUEBARIÆ. γ . . .

Differ. spec. Coff. *corollis* 6 - fidis : fructu angulato-nervoso.

Hab ; & notæ. *Aarbor* parva , erecta , 6 - pedalis : ramis crassis , brevibus , expansis. *Folia* ovato-lanceolata , glabra , opposita. *Flos* albus , axillaris , polynatus , pedunculis brevibus , 1 - floris. *Corolla* hippocrateriformis : limbo 6 - 7 - partito. *Baccae* rubræ , oblongo-ovatae , nervis longitudinalibus angulatae , 2 - spermæ , seminibus arillatis , 1 - sulcatis.

Habitat in sylvis planis oræ Zanguebariae continentis Africanæ : inde que a Lusitanis delata , & in hortis culta prope Mozambicum. Odor , sapor , color baccarum omnino similis in tribus supra scriptis speciebus : seminaque in eundem usum adhibentur.

GENUS LI. DYSODA.

*Descriptio Naturalis.*

Cal. Perianthium 5 - fidum : laciniis subulatis , erectis.

Cot. Monopetala , infundibuliformis , supera : tubo brevi : limbo ampio , reflexo , 5 - partito : laciniis 3 - fidis , acutis.

Stam. Filamenta 5 , brevissima , infra os tubi. Antheræ oblongæ , incombentes.

T

Pest.

Pist. Germen subrotundum, calyce vestitum. Stylus filiformis, corollæ æqualis. Stigma oblongum, villosum, 2-fidum reflexum.  
Peric. Bacca subrotunda, calycina, parva, 1-locularis, polysperma.  
Sem. Plurima, ovata, minima.

Nom. (Δισώδες foetidum) ex ingrato plantæ odore.

Char. Gener. Cor. 5-partita : lacinis 3-fidis. *Bacca* calycina, 1-locularis, polysperma.

Sp. 1. DYSODA FASCICULATA.  $\alpha$  Man thien huong.  $\beta$  Mán tsien yòng.  
Differ. spec. Dys. foliis, & floribus confertis.  
Hab. *Caulis* fruticosus, multiplex, 2-pedalis, rectus : *ramis* ascendentibus. *Folia* oblongo-ovata, integerrima, plana, minuscula, sessilia, conferta. *Flos* albus, congestus, terminalis, & lateralis.  
Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ, odore ingrata, aspectu pulchra; eaque utuntur ad discriminandas hortorum areolas, prout Europæi faciunt buxo, & myrto.

### G E N U S LII. STIGMANTHUS.

#### Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 5-phyllum, tubo brevi : limbo 5-partito, lacinis filiformibus, longis.

Cor. Infundibuliformis, supera : tubo longo : limbo 5-partito, lacinis ovato-oblongis, patentibus.

Stam. Filamenta 5, brevissima, infra scissuras corollæ inserta. Antheræ oblongæ, reflexæ.

Pist. Germen subrotundum. Stylus filiformis, corolla longior. Stigma ovatum, sulcatum, maximum.

Peric. Bacca calycina, compressa, tuberculosa, exsucca, 1-locularis, polysperma.

Sem. Oblonga, angulata, ossea.

Nom. Desumptum a magnitudine exotica stigmatis.

Observ. Affinitatem habet cum Mussændâ : a quâ præcipue differt pericarpio, & stigmate.

Char Gener. Cor. infundibuliformis. Stigma sulcatum, maximum. *Bacca* calycina 1-locularis, polysperma : *seminibus* osseis.

Sp. 1. STIGMANTHUS CYMOSUS.  $\alpha$  Cay bùom ràng.

Differ. spec. Stigm. scandens : foliis lanceolatis : flore cymoso. Hab.

Hab. *Frutex* magnus, ramosus, scandens, acirrhous, inermis. *Folia* lanceolata, integerrima, glabra, opposita. *Flos* albus, Cymis vastis, axillaribus, & terminalibus.

Habitat in sylvis, & montibus Cochinchinæ.

## GENUS LIII. GARDENIA.

Char. Gener. *Bacca* infera, polysperma. *Stylus* elevatus, bilobus. *Calyx* laciniis verticalibus. Lin. sy. pl. G. 320.

† Sp. 1. GARDENIA GRANDIFLORA.  $\alpha$  Cây Deanh nam.

Differ. spec. Gard. *arborea*, *foliis* lanceolatis : *calycis* laciniis reflexo-falcatis : *baccis* oblongis.

Hab ; & notæ. *Arbor* mediocris : *ramis* tortuosis, patentibus. *Folia* lanceolata, integerrima, nitida, opposita, petiolata. *Flos* albus, magnus, folitarius, sparsus, terminalis, & lateralis, gratum odorem exhalans. *Calyx* oblongus, baccatus, 6-fidus : laciniis linearibus, reflexo-falcatis, corpori floris lateraliter verticalibus. *Cor*- hippocrateriformis, tubo cylindraceo, longo : limbo 6-partito, laciniis ovatis, sub-planis. *Filamenta* nulla. *Antheræ* 6, lineares, sinibus laciniarum medio sti affixæ, extremis liberæ. *Germen* oblongum. *Stylus* clavatus, æqualis tubo. *Stigma* ovatum, magnum, solidum, 2-fidum. *Bacca* calycina, oblonga, utrinque subacuta, 6-gona, 1-locularis, polysperma, pulpâ rubrâ plena : *seminibus* plurimis, orbiculatis, nidulantibus : *cortice* tenui, glabro, luteo.

Habitat in Cochinchinâ prope fluvios : indeque in hortos transferatur, ob nitorem foliorum, magnitudinem, candorem, & odorem floris æstimabilis.

Observat. In hâc specie stamina, laciniæ calycis, & corollæ fere semper numerantur sex, raro quinque, vel septem. *Corollam* non inveni contortam, nec *Baccam* 2-locularem. Ideoque haud ineptè transferri posset in classem Hexandriam, simul cum subsequente Gardeniâ Floridâ, quæ illi congener prorsus videtur, qvamvis hæc flore luxuriante gaudens a naturali numero partium sæpius aberret. Usus. *Baccarum* recentium-pulpâ succofa, & ruberrimâ tinguntur eleganter serica.

Virtus Medica. Refrigerans, Emolliens, Ophthalmica. Prodest in febribus, præcipue hecticis, & phthisicis : in dysuriâ, scabie, oculorum rubedine, & inflammatione. Ut solent decocto fructus exsiccati simul cum *seminibus*, & excorticati.

Sp. 2. GARDENIA FLORIDA.  $\beta$  Chý tsù.  $\alpha$  Cây Deanh tàu. Lin. sy. pl. sp. 1.

Differ. spec. Gard. *fruticosa*, *foliis ovatis*, *acuminatis*: *stipe multiplicato*: *calycis laciniis rectis*: *baccis ovatis*.

Hab; & notæ. *Caulis fruticosus*, *multiplex*, *lignosus*, *erectus*, *5-pedalis*, *ramosissimus*. *Folia ovalia*, *acuminata*, *integerimma*, *parva*, *nitida*, *opposita*, *sparsaque*, *petiolis brevibus*. *Flos albus*, *odorifer*, *terminalis*, & *sparsus*, *pedunculis monofloris*: *corollis semper multiplicatis*, *ordinibus binis*, *ternisve*: *laciniis singuli ordnis plerumque 6*, *sæpe etiam 5, 7, 8*: *staminibus*, & *calycis laciniis totidem*, *quot corollæ*. *Bacca ovata*, *utrinque subacuta*, *præcedente specie duplo minor*: *pulpâ similiter rubrâ*, *succosa*. *Monolocularem semper observavi*, *nisi forte pellicula tenuis loculos dividens*, *observantis visum effugit*. *Laciniæ calycis verticales*, *eniformes*, *erectæ*. *Baccarum usus*, & *virtus ut præcedentis*.

Habitat tam in Chinâ, quam in Cochinchinâ.

Catsjopiri. Rumph. Amb. Auct. c. 35. tab. 14. f. 2. Ubi corollam describit tribus ordinibus multiplicatam, singulo ordine 6-petalo, seu 6-partito: proindeque staminibus 6, cum hæc ratione situs semper laciniarum numerum sequantur.

Pluknet. Amalh. pag. 29. *Arbuscula Sinensis*, *Myrti maioris folio, vasculo seminali hexagono*, ad singulos angulos alis foliaceis munito, quæ porreætæ vasculi coronam efformant, *Um ki Sinensis* dicta. Idem Amalh. p. 212. *Um ki*, alias *Umuy*, cuius fructus ad tingendum colorem escarlatinum inservit, florem fert rosa- ceum, album 6-petalum. t. 448. f. 4.

Thunb. Japon. p. 108, 109. *Gadenia Florida*. *Bacca 1-locularis*. *Corolla sæpe plena*, *antheris plerumque 6*, *calyce*, & *limbo corollæ 6-partitis*.

† Sp. 3. GARDENIA VOLUBILIS. β Xang lan than.

Differ. spec. Gard. *caule volubili*: *pedunculis polyfloris*.

Hab; & notæ. *Caulis fruticosus*, *volubilis*, *inermis*, *longus*. *Folia lanceolata*, *acumine longo*, *integerimma*, *glabra*, *opposita*, *perfoliis brevibus*. *Flos pallidus*, *axillaris*, *pedunculis longis*, *subdivisis*. *Calyx baccatus*, *5-fidus*: *laciniis acutis erectis*. *Corolla infundibuliformis*: *tubus in medio incrassatus*, ibi stamina 5 sustinens: *limbus patens*, *5-partitus*, *laciniis longis*; *repandis*. *Stylus supra medium yuginatus ab stigmate crasso, verrucoso, colorato*: *inde egrediens in subulatum desinens*. *Bacca infera*, *parva*, *subrotunda*, *2-locularis*, *polysperma*: *seminibus paucis*, *rotundis*.

Habitat inculta apud Sinas, extra suburbia Cantonensiæ.

## GENUS LIV. GENIPA.

Char. Gener. *Cor.* rotata. *Stigma* clavatum. *Bacca* 2-locularis. *Sem.* nidulantia, cordata. Lin. sy. pl. G. 271.

† Sp. 1. GENIPA BUFFALINA. *& Cay Gang tlau.*

Differ. spec. Gen. *foliis* fasciculatis ovatis, glabris : *floribus* sparsis. Hab ; & notæ. *Arbor* 9-pedalis : *ramis* parentibus : *aculeis* longis, rectis, oppositis. *Folia* ovata, integerrima, glabra, plana, dura, fasciculata : petiolo communis brevi, proprio subnullo. *Flos* albus, sparsus, solitarius : *calyce* baccato, 5-fido, laciniis rotundatis, planis. *Corolla* rotata, limbo plano, 5-fido. *Bacca* subrotunda, exsucra, coronata, diametri pollicaris, fusco-lutea, 2-locularis, polysperma. *Filamenta* vix ulla. *Antheræ* 5, oblongæ ori tubi adnatæ, limbo adjacentes. *Stigma* ovatum, 2-fidum.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

† Sp. 2. GENIPA ESCULENTA. *& Cay Gang com.*

Differ. spec. Gen. *foliis* fasciculatis, ovatis, pilosis : *floribus* congestis. Hab ; & notæ. *Arbor* parva, *caule* rectissimo, simplicissimo, 6-pedali. *Folia* ovata, integerrima, pilosa, parva, fasciculis oppositis. *Aculei* longi, recti, oppositi. *Flos* albo-viridis, lateralis, polygnatus. *Corolla* rotata, 5-fida, laciniis oblongis, acuminatis. *Calyx* baccatus, acutè 5-fidus. *Stigma* oblongum, emarginatum. *Bacca* subrotunda, carnosæ, ceraso æqualis, edulis, coronata, 1-locularis, polysperma. *Antheræ* 5, lineares, sessiles.

Habitat inculta in Cochinchinâ.

† Sp. 3. GENIPA ? FLAVA. *& Uat thau cay.*

Differ. spec. Gen. *foliis* lato-lanceolatis : *flore* solitario, terminali. Hab ; & notæ. *Frutex* erectus, 5-pedalis, ramosissimus : *aculeis* sparsis, paucis, rectis. *Folia* lato-lanceolata, integerrima, glabra opposita. *Flos* luteus, solitarius, terminalis : corollâ rotatâ, 5-fida, crassa, sub-pilosa : *staminibus* 5, brevibus : stigmate subrotundo, magno, angulato, sessili. Pericarpium non vidi.

Habitat Cantone Sinarum.

## GENUS LV. LONICERA.

Char. Gener. *Cor.* 1-petala irregularis. *Bacca* polysperma, 2-locularis, infera. Lin. sy. pl. G. 250.

*Mon*

Sp. 1.

## 150 PENTANDRIA. MONOGYNIA.

Sp. 1. LONICERA PERICLYMENUM.  $\beta$  Gín tūm.  $\alpha$  Kim ngán tāu.  
Differ. spec. Lon. *capitulis* ovatis, imbricatis, terminalibus : *foliis*  
omnibus distinctis. Lin. sp. 4.

Hab ; & notæ. *Caulis* fruticosus, teres, volubilis, ramosus. *Folia*  
ovata, sub-acuta, cordata aliqua, inferius pubescentia, opposita,  
nec perfoliata. *Flos* albo-luteus, subterminalis, capitulis imbricatis,  
inæqualibus. *Corolla* bilabiata, tubo tenui. *Bacca* 2-locularis, in-  
fera, polysperma.

Habitat in multis locis imperii Sinenis, inculta.

Virtus, imprimis florum. Resolvens, Diuretica, Mundificans.

Periclymenum Indicum, flore flavescente. Tournef. Inst. pag. 609.

Periclymenum non perfoliatum Germanicum. Bauh. Pin. p. 302.

Caprifolium Com. Honeysuckle. Hill. Brit. herb. p. 516. t. 73. f. 3.

Sp. 2. LONICERA XYLOSTEUM.  $\alpha$  Deei buóm buóm : Kim ngán hoa.  
Differ. spec. Lon. *pedunculis* 2-floris : *baccis* distinctis : *foliis* in-  
tegerrimis, pubescentibus. Lin. sp. 7.

Hab ; & notæ. *Frutex* inermis, scandens, acirrhos, ramis multis.  
*Folia* ovata, integerrima, pubescentia, parva, opposita. *Flos* al-  
bus, axillaris, pedunculis bifloris. *Corolla* tubo longissimo : limbo  
oblongo, 2-partito, lacinia altera leviter 4-fidâ, alterâ integer-  
rimâ, tenuiori. *Baccæ* distinctæ, subrotundæ, rubræ.

Habitat scandens per sepes, & dumeta in Cochinchinâ.

Chamæcerasus dumetorum, fructu gemino, rubro. Bauh. Pin. p. 451.  
n. 4. Lonicera pedunculis 2-floris, foliis ovatis, obtusis, integris.  
Hort. Cliff. pag. 58.

Virtus, Creditur ab indigenis eadem, quæ præcedentis speciei : mihi  
vero non probata.

## † GENUS LVI. OXICEROS.

## Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 5-dentatum, erectum.

Cor. Hippocrateriformis, supera : tubus calyce duplo longior : lim-  
bus 5-fidus, amplius, laciiniis ovatis, parum reflexis, æqualibus.

Stam. Filamenta subnulla. Antheræ 5, filiformes, 3-loculares, lon-  
gæ, ori tubi insistentes, per limbum expansæ.

Pist. Germen subrotundum, calyce clausum. Stylus æqualis tubo. Sti-  
gma ovato-oblongum, polysulcum.

Peric. Bacca calycina, subrotunda, parva, coronata, 2-locularis,  
polysperma.

Sem. pauca, subrotunda.

Nom.

Nom. (Οξύς acutus : Κέρας cornu) ex aculeis plantæ corniformibus, acutissimis.

Charact. Gener. *Cor.* hippocrateriformis, supera. *Antheræ* filiformes. *Bacca* 2-loocularis, polysperma.

† Sp. 1. OXYCEROS HORRIDA. α Cây Uút o: Cây Mo tló.

Differ. spec. Ox. *ramis* reclinatis : *racemis* trichotomis.

Hab. *Frutex* 8-pedalis, caule lignoso, suberecto : *ramis* longis, reclinatis : ramusculis plurimis, brevibus, cruciatim brachiatis : *aculcis* magnis, oppositis, corniformibus, acutissimis. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, glabra, opposita. *Flos* albus, racemis trichotomis, sub-terminalibus. *Bacca* nigra, inutilis.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

† Sp. 2. OXYCEROS SINENSIS. β Cai tsoi lắc.

Differ. spec. Ox. *foliis* lanceolatis nervosis : *racemis* brevibus, terminalibus.

Hab; & notæ. *Frutex* 5-pedalis, erectus, ramosissimus : *aculeis* multis, brevibus, acutis, obliquis. *Folia* lanceolata, integerrima, nervosa, glbra, opposita. *Flos* albus, terminalis, racemis brevibus. *Corolla* hippocrateriformis, tubo longo : limbo 5-fido, plano. *Filamenta* 5, brevissima ad os tubi : *Antheræ* linearibus. *Stigma* ovatum, 2-fidum. *Bacca* calycina, parva, coronata, subrotunda, 2-loocularis, polysperma.

Habitat agrestis circa Cantonem Sinarum.

### GENUS LVII. MUSSÆNDÆ NDA.

Char. Gener. *Cor.* infundibuliformis. *Stigmata* 2, crassiuscula. *Bacca* oblonga, infera. *Sem.* quadrifariam disposita. Lin. sy. pl. G. 257.

Sp. 1. MUSSÆNDÆ FRONDOSA. α Cây buóm bac.

Differ. spec. Mus. *paniculâ* foliis coloratis. Lin. sp. 1.

Hab; & notæ. *Frutex* lignosus, magnus, scandens, acirrus, inermis : ramis multis longis, sparsis. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, rugosa, pilosa, subsessilia, opposita. *Flos* aureus, cymis magnis, patentibus, terminalibus : *bracteis* magnis, ovatis, nervosis, albissimis, petiolatis, singularum baccarum calycinarum lateri insistentibus. *Cal.* tubulosus, 5-partitus, laciinis subulatis, pilosus, erectis. *Cor.* infundibuliformis, supera : tubo longo : limbo brevi,

5-par-

5 - partito , laciniis acutis , caudatis. *Filamenta* 5 , brevia , medio tubo insidentia : *antheris* filiformibus , erectis. *Stylus* corollæ æqualis. *Stigmata* 2 , lanceolata , erecta. *Bacca* ovato-oblonga , bilocularis , polysperma : *seminibus* multis , subrotundis.

Habitat frequens , per dumeta scandens in Cochinchinâ.

Folium Principissæ. Rumph. Amb. l. 6. cap. 56. t. 51. *Mussænda Zeylanica* , flore rubro. Burm. Zeyl. pag. 165. t. 76.

Observ. Utraque figura , & descriptio Burmanni , & Rumphii in multis convenit cum nostrâ , sed non in omnibus , nec illi etiam inter se prorsus convenient , quod potius varietati , quam specificæ diversitati tribuendum. In planta Cochinchinensi nullum odorem notavi : magnam vero pulchritudinem in candore singulari bractearum floribus aureis immixto ; quodque ipsæmet bracteæ , non pedunculis , sed fructui inhærent , quod alibi non vidi.

Virtus. Florum imprimis. Attenuans , Diuretica. Convenit in Tufsi , Asthmate , Febris periodicis , Tumore ventris. Externè abstergit ulcera fordida , impetigines , scabiem , maculas cutaneas.

**† Sp. 2. MUSSÆNDÆ CHINENSIS.  $\alpha$  Xān x̄e lāu.**

Differ. spec. Mus. foliis fasciculatis : floribus solitariis.

Hab ; & notæ. *Arbuscula* ramis diffusis , inermibus. *Folia* lanceolata , integerrima , glabra , congesta. *Flos* terminalis solitarius : *calyx* baccato , 5 - partito , laciniis lanceolatis. *Bacca* ovata , coronata , pallida , 4 - locularis , polysperma : *seminibus* multis , subreniformibus , osseis. *Corolla* infundibulif. , 5 - fida!

Habitat inulta in suburbis Cantonensibus.

**+ G E N U S LVIII. T R I P H A S I A.**

*Descriptio Naturalis.*

Cal. Perianthum 3 - dentatum , inferum , breve persistens.

Cor. Campanulata , petala 3 , oblonga , inferius in tubum rectum curvata , superius parum reflexa.

Stam. Filamenta 5 , subulata , plana , corollâ breviora , receptaculo inhærentia. Antheræ totidem , ovatae.

Pist. Germen ovato-oblongum. Stylus crassus , longior staminibus. Stigma obtuse trigonum.

Peric. Bacca ovata , 1 - locularis.

Sem. 1 , ovatum.

Nom. ( *Τριφάσιος triplex* ) a formâ ternariâ foliorum , corollæ , & calycis istius plantæ.

Char.

Char. Gener. Cor. petala 3, campanulata. Cal. 3-dentatus. *Bacca* supera, 1-sperma.

Sp. 1. TRIPHASIA AURANTIOLA. & Kim Kuit. § . . .

Differ. spec. Triph. *foliis* ternatis : *floribus* solitariis.

Hab. *Arbuscula* 5-pedalis : *ramis* plurimis, patentibus, tortuosis ; subdivisis. *Folia* ternata, foliolis ovatis, emarginatis, planis, glabris, parvis, odoriferis, coloris fusco-viridis. *Aculei* axillares, recti, acutissimi, foliolis breviores. *Flos* albus, axillaris, solitarius, petalis crassiusculis. *Bacca* rubra, ovata, Coffeæ similis, duplo minor, pelliculâ corticeâ tenui : pulpâ viscosâ, dulci, eduli, inodorâ : semine unico, ovato.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ : coliturque in viridariis magnatum ob odorem, & formæ elegantiam ; nam rami, licet lignosi, facile ductiles quamcunque velis, admittunt, & servant.

Observ. Linn. sy. pl. tom. 3. p. 585, & alibi plantam istam Citro adscribit, vocatque Citrum Trifoliatum. Proculdubio Celeb. Vir florem non vidit, qui a Citro prorsus adhorret. Puto, quod vulgare nomen Aurantiola, simulque aromaticus odor filiorum deceptioni ansam dederit. Eadem indicatur nomine Japonico Karatats banna a Kämpferio (Amæn. p. 801. fig. p. 802.) & novissimè a Thunbergio. Fl. Jap. p. 294. Unde dicendum est Clar. Viros vel florem non examinasse, vel diversas flores plantas eodem prorsus habitu (nec vulgari) gaudere.

### † GENUS LIX. BOTRIA.

#### *Descriptio Naturalis.*

Cal. Perianthium campanulatum, 5-crenatum, breve.

Cor. Petala 5, acuta, carnosæ, erecta, apice inflexa, infera.

Stam. Filamenta 5, plana, erecta, corollâ breviora, basi petalorum insistentia. Antheræ ovatæ, stantes.

Pist. Germen subrotundum. Stylus o. Stigma concavum.

Peric. Bacca rotunda, aquosa, 1-locularis, 1-sperma.

Sem. ovatum, sub-compressum.

Nom. (*Botrus uvæ racemos*) ob fructificationem racemis uvarum similem, habitumque non longè a Vite discrepantem.

Char. Gener. Cor. Petala 5, subinflexa. Cal. 5-crenatus. *Bacca* supera, 1-sperma.

† Sp. 1. BOTRIA AFRICANA. γ Muzarruba.

Differ. spēc. Bot. *foliis lobatis*: *racemis lateralibus*.

Hab. *Frutex mediocris*, *multiplex*, *ramosus*, *scandens*: *radice tereti*, *longā*, *rugosā*, *lutescente*. *Folia cordata*, *3-5-loba*, *obtusa*, *venosa*, *crenata*, *tomentosa*, *sparsa*, *petiolis longis*. *Flos rubefcens*, *parvus*, *sub-clausus*, *racemis subdivisis*, *brevibus*: *pedunculo communi longo*, *cirrho*, *cirrhis 2-partitis*. *Bacca nigra*, *aquosa*, *edulis*, *dulcis*, *uvæ similis*.

Habitat agrestis prope litora oræ Zanguebariæ in Africâ.

Virtus. *Resolvens*, *Diuretica*. *Decoctum radicis* (quod non probavi) dicitur efficax contra pleuritidem, inflammations, & apostemata.

Obsery. Hæc planta appellari solet ab incolis Lusitanis *Parreira brava*, quo nomine etiam dignoscitur alia planta Brasiliana, a Linnaeo dicta *Cissampelos Pareira*: sed flos Africanus a me attentè examinatus ab Americano valde differt; ideoque diverso Generi, & Classi adscribendus.

### † GENUS LX. PENTALOBA.

#### *Descriptio Naturalis.*

Cal. *Perianthium 5-phylum*: *foliolis lanceolatis*, *pilosis*, *erectis*.

Cor. *Campanulato-clausa*, *infera*: *petalis 5*, *lanceolatis*, *apice subreflexis*. *Nectarium 5-dentatum*, *erectum*.

Stam. *Filamenta 5*, *filiformia*, *planiuscula*, *incisuris nectatii insistentia*, *corollæ subæqualia*. *Antheræ ovatæ*, *stantes*.

Pist. *Germen subrotundum*, *5-sulcatum*, *pilosum*. *Stylus brevis*, *crassus*, *pilosus*. *Stigma simplex*.

Peric. *Bacca subrotunda*, *5-loba*, *1-locularis*, *5-sperma*.

Sem. *5*, *ovata*.

Nom. a lobis *5*, quibus bacca figuratur.

Char. Gener. *Cor. campanulata*, *5-petala*. *Cal. 5-phillus*. *Bacca supera*, *5-sperma*.

† Sp. 1. PENTALOBA SESSILIS. α Cây Cuong tau.

Differ. spec. Pent. *foliis lanceolatis*: *floribus congestis*, *sessilibus*.

Hab. *Arbor mediocris*: *ramis ascendentibus*. *Folia lanceolata*, *levi-viter ferrata*, *glabra*, *alterna*. *Flos pallidus*, *sessilis*, *congestus*.

Habitat inculta in montibus Cochinchinæ.

## GENUS LXI. VITIS.

Char. Gener. *Petala* apice cohaerentia, emarcida. *Bacca* 5-sperma, supera. Lin. sy. pl. G. 305.

Sp. 1. VITIS VINIFERA. ♀ Pú táo. ♂ Cây Nho tàu. Bò dao.

Differ. spec. Vit. *foliis* lobatis, sinuatis, nudis. Lin. sp. 1.

Hab; & notæ. *Caulis* Fruticosus, crassus, scandens, ramis longissimis, cirrhosis. *Folia* sinuato-lobata, ferrata, glabra, alterna. *Flos* albus, minusculus, lateralis, racemis magnis.

Habitat in Chinâ: inde delata colitur raro in Cochinchinâ.

Matthiol. in Diosc. l. 5. c. 1. Bauh. Pin. p. 299. n. 1.

Sp. 2. VITIS INDICA. ♂ Nho rừng, nhọn lá.

Differ. spec. Vit. *foliis* cordatis, dentatis, subtus villosis: *cirrhis* racemiferis. Lin. sp. 2.

Hab; & notæ. *Caulis* fruticosus, mediocris, ramosus, scandens: cirrhos racemiferis. *Folia* cordata, ovata, acuta, dentata, subtus pubescentia, alterna, petiolis rubescens. *Flos* albus, viniferæ similis, æqualisque: *racemis* parvis, lateralibus. *Bacca* rotunda, fusco-viridis, parva, aquosa, acida, edulis.

Habitat inulta, scandens per sepes in Cochinchinâ.

Scembra Valli. Rheed. Malab. 7. pag. 11. tab. 6. Burm. Indiæ. pag. 62.

Sp. 3. VITIS LABRUSCA. ♂ Nho rừng, chia lá.

Differ. spec. Vit. *foliis* cordatis, sub-trilobis, dentatis, subtus tomentosis. Lin. sp. 3.

Hab; & notæ. *Caulis* fruticosus, longissimus, tenuis, ramosus, cirrhos scandens. *Folia* subtriloba, integraque, ferrato-dentata, tomentosa, aspera, alterna, petiolis longis. *Flos* minusculus, pallidus, racemis brevibus, lateralibus. *Bacca* rotunda, nigra, acida, edulis.

Habitat in sylvis provinciarum Australium Cochinchinæ, prope Cambodiam.

Labrusca Moluca. Rumph. Amb. l. 9. c. 67. tab. 167. Vitis Labrusca. Pluk. Phyt. tab. 249. f. 1.

Ufus. Ex hujus, & præcedentis speciei baccis fermentatis destillatur spiritus vini sat bonus, nec odore, aut sapore ingratus.

## † GENUS LXII. CALISPERMUM.

## Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 5-fidum, patens, minimum, persistens laciniis acutis.  
 Cor. infera, petala 5, ovata, concava, patentia.  
 Stam. Filamenta 5, petalis inserta, corollæ æqualia. Antheræ subrotundæ.  
 Pist. Germen subrotundum. Stylus filiformis, longior staminibus. Stigma crassiusculum.  
 Peric. Bacca subrotunda, succulenta, 1-locularis, polysperma.  
 Sem. subrotunda, minima, ad perepheriam nidulantia.  
 Nom. (Καλισπέρμοντος ονομασία) a feminibus nidulantibus.

Char. Gener. Cor. petala 5, ovata, infera. *Stamina* petalis inserta.  
*Bacca* 1-locularis : feminibus nidulantibus.

† Sp. 1. CALISPERMUM SCANDENS.  $\alpha$  Bo' gie dee. i.  
 Differ. spec. Cal. *foliis* ovato-lanceolatis, crenatis : *spicis* subterminalibus.  
 Hab. *Frutex* lignosus, scandens, longus, ramosus, inermis. *Folia* ovato-lanceolata, crenata, glabra, alterna. *Flos* albus, racemis multis, oblongis, simplicibus, subterminalibus.  
 Habitat in sylvis Cochinchinæ.

## GENUS LXIII. EVONYMYS.

Char. Gener. Cor. 5-petala. *Capsula* 5-gona, 5-locularis, 5-valvis, colorata. *Semina* calyprata. Lin. sy. pl. G. 291.

† Sp. 1. EVONYMUS CHINENSIS.  $\beta$  Kām qūa.  
 Differ. spec. Evon. *caule* scandente : *foliis* 3-lobis : pedunculis polyfloris.  
 Hab ; & notæ. *Caulis* herbaceus, longus, cirrhis scandens. *Folia* cordata, 3-loba, medio acuto, lateralibus obtusis, denticulata, aspera. *Flos* albus, pedunculis polyfloris, lateralibus : *calyce* 5-fido, patente. *Corolla* petala 5, oblongo-ovata, patentia, calyce longioria. *Stamina* 5. *Bacca* supera, ovata, utrinque subattenuata, 10-gona, 1-locularis, polysperma evalvis : *seminibus* ovatis, compressis, calyptrâ succulâ vestitis.  
 Habitat incultus extra suburbia Cantonensiæ in Chinâ.

Obsery.

Observ. Evonymo non satis convenire agnosco: si aptiorem locum invenias, eò transferas.

## † GENUS LXIV. TRALLIANA.

## Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 5 - phylum, inferum, persistens: foliolis brevibus, rotundatis.

Cor. Petala 5, oblonga, patentia, reflexa, calyce longiora. Nectarium magnum, erectum, 10 - crenatum.

Stam. Filamenta 5, brevia, receptaculo insidentia. Antheræ biloculares, subrotundæ.

Pist. Germen subrotundum. Stylus æqualis staminibus. Stigma?

Peric. Bacca subrotunda, 2 - locularis, 2 - sperma.

Sem. intus angulata, exterius rotundata.

Nom. ab antiquo Physicæ indagatore Alexandro Tralliano.

Char. Gener. *Petala* 5, oblonga, reflexa. *Cal.* 5 - phyllus inferus.

*Bacca* 2 - locularis, 2 - sperma.

## † Sp. I. TRALLIANA SCANDENS. &amp; Cây rác.

Differ. spec. Tral. *foliis* cordatis, crenatis: *flore* dichotomo.

Hab. *Caulis* fruticosus, multiplex, longus, scandens, inermis: *ramis* multis, geniculatis. *Folia* cordata, subrotunda, acuminata, glabra, alterna. *Flos* albo-viridis, racemis dichotomis, lateralibus, pedunculo communi longo.

Habitat, & scandit quascunque arbores obvias in Cochinchina.

## GENUS LXV. RHAMNUS.

Char. Gener. *Cal.* tubulosus: squamis stamina munientibus. *Cor.* nulla. *Bacca.* Lin. sy. pl. G. 284.

## Sp. I. RHAMNUS Jujuba. &amp; Tá tsão. &amp; Dai táo.

Differ. spec. Rh. *aculeis* solitariis, recurvis: *pedunculis* aggregatis: *strobilis* semidigynis: *foliis* retusis, subtus tomentosis. Lin. sp. 21.

Hab; & notæ. *Arbor* mediocris, *ramis* tortuosis, patentibus: *aculeis* recurvis, plerumque solitariis. *Folia* ovata, integriflora, 3 - nervia, subtus tomentosa, alterna. *Flos* pallidus, axillaris, pedunculis aggregatis, brevibus. *Drupa* mediocris, ovata, rubra, dulcis, edulis.

Habitat culta in Chinâ, & Cochinchina.

Virtus. Edulcorans, Refrigerans, Pectoralis.

Malus indica. Acoft. Arom. cap. 51. Rumph. Amb. l. 2. c. 44. tab. 36.

Sp. 2. RHAMNUS ZIZYPHUS.  $\alpha$  Hoüug táo.  $\beta$  Hüm tsao.

Differ. spec. Rh. *aculeis* geminatis, altero recurvo: *floribus* digynis: *foliis* ovato-oblongis. Lin. sp. 23.

Hab; & notæ. *Arbor* mediocris, ramis tortuosis, subpatentibus: *aculeis* plurimis, longis, rectis, sub-solitariis. *Folia* oblongo-ovata, ferrata, 3-nervia, utrinque glabra. *Flos* albo-viridis, axillaris, pedunculis brevibus, plerumque monofloris. *Calyx* corollinus, rotatus, 5-fidus. *Stamina* 5, squamis totidem munita. *Stigmata* 2, sessilia. *Drupa* mediocris, ovato-oblonga, fusco-lutea, carnosâ: nuculâ oblongâ, 2-loculari.

Observ. Pedunculi 1-flori, nec corymbosi, floresque digyni ad Zizyphum pertinent. Folia ferrata Napecæ conformantur. Aculei omnes recti neutri convenient.

Habitat in Cochinchinâ, & Cantone Sinarum, ubi drupæ sapore acridulces prostant in foro venales tempore autumnali.

Rh. Zizyphus. Thunb. Jap. p. 95.

+ Sp. 3. RHAMNUS SOPORIFER.  $\beta$  Soän tsao.  $\alpha$  Toan táo.

Differ. spec. Rh. *aculeis* sparsis: *foliis* lanceolatis, enerviis: *strobilis* solitariis.

Hab; & notæ. *Arbor* parva, caule, & ramis tortuosis: *aculeis* rectis solitariis, sparsis. *Folia* lanceolata, integerrima, parva, enervia, alterna, oppositaque. *Flos* rubescens, axillaris, solitarius. *Drupa* subrotunda, parva, rubra, 1-sperma. Florem recentem non vidi.

Habitat in provinciis Borealibus Sinarum.

Virtus. Hypnotica, Paregorica. Ut solent nucleis excorticatis, & diu coctis. Somnum leniter conciliat, dolores mitigat, fluxum semenis cohibet, viscera roboret.

Observ. Rumphius Amb. l. 2. cap. 45. tab. 37. loquens de Vidára Litorâ, quam Linnæus putat esse Rhamnum Napecam, dicit ejus nucleos caput, & ventrem commovere: at arbuscula nostra, quæ habitu Rumphianæ assimilatur, nucleis suis utrumque sedat, prout Medici Sinenses frequenti usu expertum habent.

+ Sp. 4. RHAMNUS AGRESTIS.  $\alpha$  Cây Na.

Differ. spec. Rh. *aculeis* geminis, rectis: *foliis* oblongis: *floribus* racemosis.

Hab; & notæ. *Arbuscula* agrestis, ramis patentibus: *aculeis* geminis, rectis, brevibus. *Folia* ovato-oblonga, integerrima, alterna, glabra.

glabra. *Flos* pedunculis racemosis : *calyce*, 5-fido : *corollā* nullā. *Stamina* 5, villis multis circumdata. *Stigmata* 3, sessilia. *Drupa* minima, globosa, rubra, edulis : *nuculā* 3-loculari.

Sp. 5. RHAMNUS LINEATUS. α Cây ráo ráo. β Chè lùm.

Differ. spec. Rh. *inermis*, *floribus* hermaphroditis : *foliis* ovatis, linearis, repandis, subitus reticulatis. Lin. sp. 15.

Hab ; & notæ. *Caulis* fruticosus, multiplex, teres, æqualissimus, glaber, nitidus, ramosus, 8-pedalis, procumbens : *aculeis* multis, sparsis, solitariis, rectis, brevibus. *Folia* ovata, sub-crenata, plana, parva, glabra, alterna, striata lineis multis, obliquis, parallelis. *Flos* albus, minusculus, pedunculis polyfloris, sub-terminalibus. *Cal.* 1-phyllus, 5-dentatus, minimus. *Cor.* infera petala 10, lanceolata, æqualia, erecta, interiora 5 amplectentia *stamina*. *Filamenta* 5, subulata, longitudine corollæ : antheris nutantibus. *Germen* ovatum, scabrum. *Stylus* filiformis, æqualis staminibus : *stigmata* crassiusculo, concavo. *Drupa* parva oblongo-ovata, scabra, rubra : *nuculā* oblongā, 2-sulcā, 2-loculari.

Habitat inter dumeta, & arundinum sepes in Cochinchina, & Chinâ. Rhamus Zeylanicus, folio subrotundo, glabro, caulis hirsutis, spinis exiguis. Burm. Zeyl. p. 198. t. 88. Acaciæ forte cognatus frutex. Pluk. Phyth. t. 122. f. 4.

Virt. Radicis in decocto. Deobstruens, Diuretica. Vi heroicâ agit contra hydropem, & obstructions rebelles.

Differentia specifica melius, ni fallor, definiretur hoc modo. Rh. aculeis solitariis, rectis : foliis ovatis, oblique lineatis : pedunculis polyfloris.

Observ. Genus Linnæanum Rhamnus mihi appetet valde confusum, cum in eo conjungantur plantæ inter se valde remotæ. Non absque fundamento Tournefortius eas distinxerat. In quinque speciebus, quas memoravimus, fructificatio semper est drupa, nunquam bacca.

### GENUS LXVI. MANGIFERA.

Char. Gener. *Cor.* 5-petala. *Drupa* reniformis. Lin. sy. pl. G. 298.

Sp. 1. MANGIFERA INDICA. α Cây Xoài. β Cân Xú.

Differ. spec. Mang. *racemis* expansis : *petalis* apice reflexis : *drupā* sub-reniformi, glabrâ.

Hab ; & notæ. *Arbor* magna : *cortice* scabro : *ramis* expansis. *Folia* lanceolata, integerrima, glabra, sparsa, nitide virentia, resinosa-odora, costis oppositis, parallelis, petiolis brevibus. *Flos* terminalis, *racemis* erectis, vastis, expansis. *Calyx* foliolis 5, acutis, pa-

ten-

tentibus. *Corolla* infera , petalis 5 , oblongis , planis , apice reflexis , coloris albi , lineolis flavis ad basim striatis , calyce longioribus. *Nectarium* sphæroideum magnum , carnosum , 5 - lobum , germen comprimens. *Stamina* corollâ breviora : *antheris* 5 , ovatis , nutantibus. *Stylus* brevis : *stigmate* simplici. *Drupa* magna , subreniformis , succoso-carnosa : *cortice* glabro , molliusculo , resinoso , pallido , aut viridi , luteo , vel semi-rubro : *nuce* ovatâ , lignosâ , fibrosâ , compressâ : *nucleo* simplici , carnosio , ovato.

**U**sus. *Bacca* esculenta , salubris , sapidissima : in aliquibus prorsus dulcis , in aliis parum acida.

Habitat in Cochinchinâ , & in omnibus fere locis utriuque Indiæ frigoris vehementis expertibus.

Manga Domestica. Rumph. Amb. I. I. c. 21. tab. 25. Acosta. Arom. cap. 43. Bont. Jav. pag. 95.

Varietates hujus inveniuntur plurimæ , quæ præcipue differunt fructus formâ , magnitudine , colore , & sapore , sicut in Europâ pyra , & mala. Flores omnium , quos observavi , inveni hermaphroditos.

† Sp. 2. MANGIFERA FŒTIDA.  $\alpha$  Xoài hôi.

Differ. spec. *Mang. racemis* elongatis : *petalis* integrè reflexis : *drupa* cordatâ , pubescente.

Hab ; & notæ. *Arbor* magna : cortice sub-scabro : *ramis* ascendentibus. *Folia* lanceolata , integerrima , præcedentis speciei triplo maiora , obscurè viridia , sparsa , petiolis longis. *Flos* ruber , terminalis , *racemis* oblongis : *corollis* a basi reflexis , acutis , 5 - petalis. *Drupa* carnosa , hirsuta , subrotunda , cordata , odore gravis , gustu acida , insalubris : *nuce* subrotunda , fibrosâ.

Habitat inulta in locis planis , agrestibus.

Manga Fœtida Rumph. Amb. I. I. c. 23. tab. 28. Bont. Jav. pag. 25. in annot. prope finem. Icon Rumphiana utriusque Mangiferæ est optima.

**U**sus. Lignum hujus arboris , quamvis non optimum , idoneum tamen est ad tabulata sternenda , & longam acquirit durationem , si ante usum ædificii aquæ lutose diu immergatur.

GENUS LXVII. CEDRELA.

Char. Gener. *Cal.* marcescens. *Cor.* 5 - petala , infundibuliformis : basi ad  $\frac{1}{3}$  receptaculo adnata. *Caps.* lignosa , 5 - locularis , 5 - valvis. *Sem.* deorsum imbricata , alâ membranaceâ. Lin. sy. pl. G. 297.

† Sp. 1. CEDRELA ROSMARINUS.  $\alpha$  Ranh ranh chói. Địa , phu tu?  $\beta$  Tí phú pi.

Differ.

Differ. spec. Ced. *caule fruticoso*: *foliis linearibus*: *pedunculis monofloris*, *axillaribus*.

Hab; & notæ. *Frutex lignosus*, *erectus*, *4-pedalis*, *multiplex*: *ramis plurimis*, *rectis*, *ascendentibus*. *Folia filiformia*, *subteretia*, *parva*, *glabra*, *duriſcula*, *simplicia*, *erecta*, *opposita*, *Rosmarini similia*, *triplo tenuiora*, *magis odorata*. *Flos albus*, *pedunculis brevibus*, *1-floris*, *axillaribus*, *solitariis*, *congestisque*. *Calyx monophyllus*, *sub-campanulatus*, *brevis*, *5-dentatus*, *tubo permanente*, *dentibus caducis*. *Corolla petala 5*, *obtusa*, *patentia*, *inferius receptaculo adnata*, *superius marcescentia*, *decidua*. *Filamenta 5*, *capillaria*, *corollæ subæqualia*: *antheris ovatis*. *Stylus filiformis*, *æqualis staminibus*: *stigmate crassiusculo*. *Capsula compresso-rotunda*, *3-locularis*, *3-valvis*, *polysperma*, *apice dehiscens*. *Seminæ multa*, *compresso-rotunda*, *nec alata*.

Habitat frequenter in locis arenosis, ad Boream sitis in Cochinchinâ. Vidi etiam sponte nascentem in insulis circa Macaum in Chinâ. Descriptam apud Authores non inveni. Visum fuit generi associare Cedrelæ Americanæ, cum quâ partim cohæret, partim differt.

Virtus, præsertim foliorum, & florum: Cephalica, Nervina, Deobstruens, Diuretica. Valet contra catarrhum, & dolores rheumaticos. Per destillationem elicitur spiritus nec virtute, nec odore inferior aquâ Reginæ Hungariæ, vel spiritu Lavendulæ. Qui florem non considerant, pro Rosmarino habent. Oleum essentiale elicui odore, & virtute præstans, tenue, flavens, parcum.

### GENUS LXVIII. DIOSMIA.

Char. Gener. *Cor. 5-petala*. *Nectararia 5 supra germen*. *Caps. 3, five 5*, coalitæ. *Semina calyprata*. Lin. sy. pl. G. 292.

<sup>†</sup> Sp. 1. DIOSMIA ASIATICA. . . .

Differ. spec. Dio. *foliis lanceolatis*, *alternis*: *racemis subterminalibus*. Hab; & notæ. *Arbor parva*, *6-pedalis*, *expansa*, *ramosissima*. *Folia lanceolata*, *integerrima*, *glabra*, *alterna*. *Flos flavus*, *racemis compositis*, *subterminalibus*. *Cal. 5-phyllus*, *inferus*, *foliolis ova-to-oblongis*, *patentibus*. *Cor. petala 5*, *oblonga*, *obtusa*, *calyce longiora*: *nectario coronæ-formi*, *crasso*, *germen 5-lobum cingente*, *nec imposito*. *Antheræ 5*, *sessiles*, *lineares*, *ad latera nectarrii*, *apice conniventes*. *Stylus æqualis staminibus*: *stigmate simpli-ci*. *Pericarpium capsulæ 5*, *sub-reniformes*: *seminibus solitariis*, *nec calypratis*. *Capsulae pedunculis propriis instructæ*.

Habitat in monte *Hòn chén* ex adverso urbis *Hùææ* Cochinchinæ metropolis.

## GENUS LXIX. PLECTRONIA.

Char. Gener. *Petala* 5, calycis fauci inserta. *Bacca* 2-sperma, infera. Lin. sy. pl. G. 300.

+ Sp. 1. PLECTRONIA CHINENSIS.  $\alpha$  Pā lac hōa.

Differ. spec. Plect. aculeata : *foliis* 3-natis : *floribus* umbellatis.

Hab ; & notæ. *Arbuscula* 5-pedalis, ramosissima : *aculeis* 3-natis, recurvis, brevibus. *Folia* lato-lanceolata, subcrenata, glabra, ternata, petiolo communi longo. *Flos* albus, terminalis, *umbellis* densis, hemisphæricis : *pedunculo* communi longo, partialibus brevibus. *Corolla* petala 4, acuta, sessilia, patentia, insistentia ori calycis turbinati, subtruncati. *Antheræ* 5, biloculares, subsessiles. *Stigma* sessile, 2-sidum. *Bacca* calycina, 2-sperma : *seminibus* oblongis.

Habitat agrestis in provinciâ Cantonensi finarum.

## GENUS LXX. ILLECEBRUM.

Char. Gener. *Cal.* 5-phyllus, cartilagineus. *Cor.* o. *Stigma* simplex. *Caps.* 5-valvis, 1-sperma. Lin. sy. pl. G. 313.

Sp. 1. ILLECEBRUM LANATUM.  $\alpha$  Rau Chiō.

Differ. spec. Il. *caule* subherbaceo, erecto : *floribus* lateralibus : *foliis* alternis. Lin. sp. 3.

Hab ; & notæ. *Caulis* herbaceus, teres, sub-erectus, *ramis* diffusis. *Folia* lanceolato-ovata, integerrima, tomentosa, subsessilia, opposita. *Flos* spicis densis, oblongis, sessilibus, axillaribus : *calyce* 5-phylo, compresso, rubro : *corollâ* nullâ. *Capsula* compressa, 5-valvis : *semine* solitario, compresso-rotundo, adunco.

Habitat incultum in agris, & hortis Cochinchinæ.

*Amaranthus Indicus*, *Verticillatus*, albus, foliis lanuginè incanus. Pluk. Alm. 27. t. 75. f. 8. *Chenopodium incanum* racemosum, folio maiore minori opposito. Burm. Zeyl. p. 60. t. 26. f. 1.

Sp. 2. ILLECEBRUM SESSILE.  $\beta$  Fān Ki Kōc.

Differ. spec. Ill. *caulibus* repentibus, bifariè tomentosis : *foliis* lanceolatis, subsessilibus : *capitulis* oblongis, glabris. Lin. sp. 15.

Hab ; & notæ. *Caulis* herbaceus, diffusus, brevis, subquadragonus, geniculatus, procumbens, saepe repens. *Folia* lanceolata, subserrata, sessilia, glabra, opposita. *Flos* albicans, capitulis sub-rotundis, axillaribus, saepe binatis. *Capsula* 5-valvis, 1-sperma.

Habitat

Habitat in locis humidis prope Cantonem Sinarum.

Olus Squillarum. Rumph. Amb. l. 10. c. 26. t. 15. f. 1. Amaranthus humilis, foliis oppositis. Burm. Zeyl. p. 17. t. 4. f. 2.

GENUS LXXI. CELOSIA.

Char. Gener. *Cal.* 3-phyllus, corollæ 5-petalæ facie. *Stamina* basi nectario plicato conjuncta. *Caps.* horizontaliter dehiscens. Lin. sy. pl. G. 312.

Sp. 1. CELOSIA CASTRENSIS. α Hoa moung gá. β Kí Koán hóa.

Differ. spec. Cel. *foliis* lanceolato-ovatis, lineatis, acuminatissimis. *Stipulis* falcatis: *spicis* cristatis. Lin. sp. 6.

Hab; & notæ. *Caulis* annuus, sesquipedalis, ruber, striatus, crassus: *ramis* simplicibus, assurgentibus. *Folia* lanceolata, integerrima, glabra, sparfa, lineis rubris, obliquis subtus notata, petiolis brevibus. *Flos* cruento-ruber, *spicis* terminalibus cristatis, magnis: axillaribus oblongis, parvis. *Capsula* 1-locularis, polysperma, circumscissa: *seminibus* compresso-rotundis, nigris, nitidis. *Stipulæ* falcatae. *Folia* acumine longo.

Habitat passim culta in Cochinchinâ, & Chinâ.

Amaranthus Vulgaris. Rumph. Amb. l. 8. c. 45. t. 84.

Virtus. Subastrigens. Reprimit fluxus ventris, & fluorem album: utuntur seminibus semitostis.

Sp. 2. CELOSIA ARGENTEA. α Tanh thuong tu. β Tsim siam tsu.

Differ. spec. Cel. *foliis* lanceolatis, *stipulis* subfalcatis: *pedunculis* angulatis: *spicis* scariosis. Lin. sp. 1.

Hab; & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, angulatus: *ramis* rectis, ascendentibus: *stipulis* subfalcatis. *Folia* lanceolata, integerrima, subtus tomentosa, alterna, petiolis brevibus. *Flos* *spicis* oblongo-conicis, albo-rubris, solitariis, terminalibus. *Calyx* 3-phyllus, *foliolis* lanceolatis, membranaceis, erectis, permanentibus. *Corolla* petala 5, lanceolata, erecta, calyce longiora. *Filamenta* 5, subulata, brevia, basi in tubum membranaceum coalita, superius libera. *Antheræ* oblongæ incumbentes. *Germen* rotundum, superum, tubo staminum semiclausum. *Stylus* filiformis, corollæ æqualis. *Stigma* crassiusculum, planum. *Capsula* globosa circumscissa, 1-locularis, polysperma. *Semina* pauca, lenticularia, nigra, nitida.

Habitat in hortis, & agris Cochinchinæ, & Chinæ inculta.

Thunb. Jap. p. 106. Burm. Ind. p. 64.

Virt. Seminum. Resolvens, Ophthalmica.

Sp. 3. CELOSIA MARGARITACEA. *a* Ha khô thao. *b* Há kháy tsão.  
Differ. spec. Cel. *foliis* ovatis, *stipulis* falcatis : *pedunculis* angula-  
tis : *spicis* scariofis. Lin. sp. 2.

Hab ; & notæ. *Herba* annua , *caule* cespitoso , 2-pedali , erecto ;  
*stipulis* subfalcatis. *Folia* oblongo-ovata , sub-repanda , opposita ,  
petiolis brevibus. *Flos* spicis oblongis , subteretibus , densis , fulvis ,  
erectis , solitariis , terminalibus. *Calyx* 3-phyllus. *Corolla* 5-peta-  
la , infera. *Stamina* 5. *Capsula* horizontaliter dehiscens : *seminibus*  
paucis.

Habitat in agris Cochinchinæ , & Chinæ inculta.

Beluta adeca. Rheed. Malab. 10. p. 75. tab. 38. Amaranthus simplici  
paniculâ. Bauh. Pin. p. 121. n. 4.

Virt. Attenuans , Resolvens. Prodest in inflammationibus , ulceribus ,  
scabie.

### † GENUS LXXII. POLIA.

#### *Descriptio Naturalis.*

Cal. Perianthium 10-phyllum , inferum : *foliolis* lanceolatis , mem-  
branaceis , erectis , persistentibus : interioribus minoribus.

Cor. o.

Stam. Filamenta 5 , capillaria , calyce breviora , receptaculo insiden-  
tia. Antheræ ovatæ , 2-loculares , stantes.

Pist. Germen subrotundum. Stylus filiformis brevior staminibus. Sti-  
gma crassiusculum.

Peric. Capsula trigono-rotunda , 3-valvis , 1-locularis , polysperma.  
Sem. Ovata , pedicellata , pauca.

Nom. (Πολιά canities) ab aspectu plantæ incano.

Char. Gener. Cal. 10-phyllus. Cor. o. Capsula supera , 3-valvis ,  
1-locularis , polysperma.

#### † Sp. 1. POLIA ARENARIA. *a* Sai hò nam.

Differ. spec. Pol. postrata : *foliis* stellatis : *pedunculis* dichotomis.

Hab. Frutex lignosus , 10-pollicaris : *caule* circumquaque diffuso ,  
multiplici , flexuoso , sub-ancipiti , ramosissimo : *radice* longa ,  
verticali , divisa. *Folia* oblonga , integerrima , tomentosa , minuscu-  
la , stellata , sessilia. *Flos* plurimus , albicans (sicut tota planta) *ra-  
cemeis* dichotomis , terminalibus.

Habitat prope litora in Cochinchinâ.

Virtus.

Virtus. Refrigerans, Attenuans. Prodest in febribus lentis, erraticis, catarrhalibus, tussi antiquâ, sudoribus nocturnis. Usus radicis.

Observ. Glaux Maritima Linnæi cum Poliâ affinitatem habet: differt præcipue calyce 1-phyllo, 5-partito, & Capsula 5-valvi.

## DIGYNIA.

### GENUS LXXIII. STAPELIA.

Char. Gener. *Nectarium* dupli stellulâ tegente genitalia. Lin. sy. pl.

G. 334.

† Sp. 1. STAPELIA CHINENSIS.  $\beta$  Yong sau khau.

Differ. spec. Stap. *foliis* lanceolatis, congestis: *corollis* rotatis.

Hab; & notæ. *Caulis* fruticosus, simplicissimus, longus procumbens: denticulis nullis. *Folia* lanceolata, integerrima, carnosâ, glabra, polynata. *Flos* albus, carnosus, axillaris, *umbellis* magnis, simplicibus. *Cal.* 5-partitus, rotatus, ruber, *corollæ* appressus, pedunculo concolore. *Corolla* rotata, margine 5-sinuata, leviter reflexa. *Nectarium* stellis binis, 5-radiatis. *Antheræ* 5, oblongæ, sessiles, conniventes. *Stigmata* 2, simplicia, sessilia. *Folliculi* 2, subulato-conici: seminibus papposis.

Habitat prope Cantonem Sinarum.

Observ. Dubito an hæc planta, quam in loco natali examinavi recentem, sit eadem quam Lin. Jun. (suppl. pag. 170.) vocat Asclepiam Carnosam, quæque ex Chinâ ad ipsum delata fuerat sicca, & mutilata. Habitus quidem utriusque potius convenit Srapeliis, quam Asclepiis.

† Sp. 2. STAPELIA COCHINCHINENSIS.  $\alpha$  Deei ludi tlau.

Differ. spec. Stap. repens: *foliis* ovatis, oppositis: *corollis* infundibuliformibus.

Hab; & notæ. *Caulis* fruticosus, longus, teres, repens, subsimplicissimus. *Folia* ovata, carnosâ, integerrima, glabra, opposita. *Flos* albus, *umbellis* magnis, simplicibus, pedunculo communi longo, crasso. *Cal.* 5-fidus, inferus, persistens, laciniis acutis. *Corolla* 1-petala, infundibuliformis: tubo gracili, longo: limbo 5-partito, laciniis acutis, conniventibus, tegentibus genitalia. *Nectarium* stella unica, carnosâ, plana, radiis 5, acutis, magnis, expansis. *Filamenta* nulla. *Antheræ* 5, oblongæ, procumbentes inter crenas nectarii. *Germen* ovatum; 2-fidum. *Stigmata* 2, longiuscula, sessilia. *Pericarpium* folliculi 2, teretes, subulati: *seminibus* triplici serie stratis, longis, teretibus coronatis pappo longissimo.

Habitat

Habitat in montibus Cochinchinæ.

GENUS LXXIV. CYNANCHUM.

Char. Gener. *Nectarium cylindricum*, 5-dentatum. Lin. sy. pl. G. 331.

† Sp. 1. CYNANCHUM ODORATISSIMUM.  $\alpha$  Hoa li.  $\beta$  . . .  
Differ. spec. Cyn. caule volubili, infernè suberoſo fillo: foliis cordatis, acuminatis, rugosis: cymis reflexis.

Hab; & notæ. *Planta* perennis, caule multipli, volubili, longissimo, infernè suberoſo-fillo, ſuperius tereti, nitido, æqualiſſimo. *Folia* cordata, acuminata, undulata, rugosa, glabra, oppofita, petiolis longis. *Flos* luteus, odoratiffimus: cymis magnis, hemiphæricis, axillaribus, reclinatis. *Cal.* 5-phyllus, inferus, foliolis ovato-lanceolatis, undulatis, suberectis, perſiſtentibus. *Corolla* 1-petala, hippocrateriformis, tubo crasso, brevi, ad baſim inflato: limbo amplo, 5-partito, laciniis oblongis, subreflexis. *Nectarium cylindricum*, crasium, erectum, 5-fidum, laciniis conniventibus. *Filamenta* 5, membranacea, nectario externè adhærentia, glandulis 10 ad baſim diſtincta. *Antheræ* biloculares, compressæ, acutæ, ſtigmati incubantes. *Germen* ovatum, 2-fidum. *Stigma* ſeffile, ovatum, emarginatum, unicum. *Pericarpium* ſemper abortit. Ex germine diſecto, & microſcopio obſervato apparent ſemina plurima oblongiuſcula: unde conjectari licet folliculos eſſe duos, feminibus pappoſis fœtos.

Habitat, & colitur in viridariis Cochinchinæ. Et quamvis admodum vulgare, fragrantia non cedit Nyctanthi Sambac, nec minus illo decorantur nobiles foeminae. Colitur etiam Cantone Sinarum.

*Flos* Siamicus, ſive *flos* Tunkini. Rumph. Amb. Auct. c. 75. tab. 26. fig. 1.

† Sp. 2. CYNANCHUM INODORUM.  $\beta$  Ti yong than.

Differ. spec. Cyn. caule volubili, infernè suberoſo fillo: foliis ovatis, acuminatis: pedunculis subdivisis.

Hab; & notæ. *Planta* perennis: caule volubili, infernè suberoſo, fillo, longo, ramoso. *Folia* ovata, acuminata, glabra, oppofita. *Flos* luteus, parvus, plurimus, inodorus: pedunculis subdivisis, brevibus, axillaribus: calyce 5-fido, brevi. *Corolla* laciniis 5, linearibus, contortis, tubo longioribus, patentibus, potius hippocrateriformis, quam rotata. *Nectarium cylindraceum*, 5-fidum. *Folliculi* 2, oblongi, acuminati, tomentosi, ad invicem curvati: feminibus plurimis oblongis, pappoſis, imbricatis. *Stigma* 1, ſeffile, ovato-oblongum, magnum.

Habitat

## GENUS LXXV. PERIPLOCA.

Char. Gener. *Nectarium* ambiens genitalia, *filamenta* 5 exferens. Lin. sy. pl. G. 330.

† Sp. 1. PERIPOCA COCHINCHINENSIS. a Cây bùp bùp.  
Differ. spec. Per. *caule* arboreo : *foliis* carnosis : *racemis* terminalibus.

Hab ; & notæ. *Arbor* mediocris, ligno flaccido : *ramis* patentibus. *Folia* cordata, oblonga, acuta, integerrima, magna, carnosa, glabra, oppositæ. *Flos* albo-cæruleus, racemis brevibus, terminalibus. *Calyx* 5 - phyllus, foliolis lanceolatis, expansis. *Corolla* rotata, 5 - partita : *nectario* ambiente genitalia collumellis 5, siliiformibus, erectis, basi curvatis. *Pericarpium* folliculi 2, oblongi : *Seminibus* plurimis, subrotundis.

Habitat ad portum Turanum, indigenis dictum *Hàn* in Cochinchinâ, ad Austrum metropolis Huææ. Vidi etiam, sed minori formâ, in Benghalâ.

## GENUS LXXVI. APOCYNUM.

Char. Gener. *Corolla* campanulata. *Filamenta* 5 cum staminibus alterna. Lin. sy. pl. G. 332.

Sp. 1. APOCYNUM RETICULATUM. a Deei xanh.

Differ. spec. Ap. *caule* volubili, perenni : *foliis* ovatis, venosis. Lin. sp. 5.

Hab ; & notæ. *Caulis* fruticosus, volubilis, tenuis, teres, pilosus. *Folia* ovata, subacuminata, integerrima, venosa, glabra, nitida, margine reflexa petiolis oppositis. *Flos* luteus, *umbellis* axillaribus, parvis : *calyx* 5 - fido : *corolla* campanulatâ, 5 - partitâ. *Stamina* 5, filamentis sterilibus alternis carentia. *Germen* oblongum, polyspermum : maturum non vidi.

Habitat in dumetis Cochinchinæ.

Olus crudum minus. Rumph. Amb. I. 7. c. 41. t. 40. f. 2.

† Sp. 2. APOCYNUM JUVENTAS. a Hà thu ô nam.

Differ. spec. Ap. *caule* fruticoso, volubili : *foliis* ovatis, pilosis : *racemis* dichotomis.

Hab ; & notæ. *Caulis* fruticosus, volobilis, tenuis, pilosus, ruber, lactescens : *radice* magnâ, carnosa, tereti, indivisa. *Folia* ovata, integerrima, pilosa, opposita. *Flos* luteo-viridis, minutus : *racemis*

*mis* dichotomis, axillaribus. *Calyx* 5-partitus laciniis oblongis, pilosis, patentibus. *Corolla* campanulata, 5-partita, laciniis lanceolatis, calyce triplo longioribus. *Nectarium* lobis 5, conniventibus: filamentis 5, sterilibus, erectis. *Antheræ* 5, sessilis, squamiformes, ad basim nectarii adhaerentes. *Germen* longiusculum, 2-lobum. *Stigma* sessile, concavum, 2-fidum. *Folliculi* 2: *seminibus* papposis.

Habitat in locis agrestibus Cochinchinæ, sœpius procumbens.

Virtus. Creditur a Medicis indigenis plantæ hujus radicem ita spiritus animales recreare, ut longo ejus usu homines senescentes ad juventutem redeant. Idem sentiunt Sinenses de plantâ *Ho xeu u*, quam eandem esse existimant: sed mihi obvia non fuit, ut examine Botanico probaretur: radix autem, quâ usus sum, formam habet a Cochinchinensi diversam.

† Sp. 3. APOCYNUM ALTERNIFLORUM.  $\beta$  Fù muôn thàn.

Differ. spec. Ap. caule fruticoso, scandente: foliis ovatis, acuminatis, glabris: axillis alternis umbellifleris.

Hab; & notæ. *Caulis* fruticosus, longus, ramosus, scandens. *Folia* ovata, acuminata, integerrima, plana, glabra, opposita, petiolata. *Flos* pallidus, inodorus, umbellatus, axillis alternis floriferis. *Cal.* 5-phyllo, foliolis lanceolatis, erectis. *Cor.* campanulata, 5-fida, calyce longior. *Nectarium* lobis decem, oblongis, erectis, tubo corollæ insistentibus, stamina stigmati apprimentibus. *Folliculi* 2, polyspermi.

Habitat in insulis prope Cantonem Sinarum. Estne Apocynum?

† Sp. 4. APOCYNUM AFRICANUM.  $\gamma$  . . .

Differ. spec. Ap. caule fruticoso, suberecto: foliis ovato-oblongis: pedunculis subtrifloris.

Hab; & notæ. *Frutex* suberectus, 8-pedalis, ramis scandentibus. *Folia* ovato-olonga, obtusa, integerrima, crassa, glabra, parva, opposita. *Flos* pallidus, pedunculis subtrifloris, lateralibus. *Cal.* semi-quinquefidus, laciniis acutis, erectis. *Corolla* campanulata, 5-partita, laciniis lanceolatis, contortis, reflexis. *Nectarium* corpusculis 5, subulatis, appressis, glandulis 5 coloratis alternis. *Stamina* 5. *Stylus* unicus, subulatus, æqualis staminibus: *stigmate* acuto, 2-fido, erecto. *Peric.* Folliculi 2, conici, *seminibus* papposis.

Habitat in planicie arenosâ oræ Zanguebariæ in Africâ.

## GENUS LXXVII. PERGULARIA.

Char. Gener. *Nectarium* ambiens genitalia cuspidibus 5, sagittatis.  
 Cor. hippocrateriformis. Lin. sy. pl. G. 329.

† Sp. 1. PERGULARIA DIVARICATA.  $\beta$  Hú muôn.

Differ. spec. Perg. caule cespitoso: foliis undulatis: floribus terminalibus, divaricatis.

Hab; & notæ. *Frutex* caule cespitoso, sub-erecto, ramulis multis brevibus. *Folia* lato-lanceolata, integerrima, undulata, incurva, glabra, opposita. *Flos* luteus, rubro conspersus, terminalis, pedunculis 2-floris, divaricatis. *Cal.* 5-phyllus, foliolis subulatis, erectis. *Corolla* sub-hippocrateriformis, tubo crasso: limbo 5-partito, laciniis subulatis exotice longissimis. *Nectarium* sagittis 5, erectis, ad os tubi corollæ insistentibus. *Filamenta* 5, tubo æqualia: antheris sagittatis, acumine longo stigma amplectentibus. *Germen* ovatum, 2-lobum. *Stylus* filiformis, æqualis staminibus: stigma acuto, erecto, 2-fido. *Pericarpium* folliculi 2, oblongi, polyspermi: *seminibus* longiusculis, nudis.

Habitat inculta apud Sinas.

Observ. Echites Caudata (Burm. Ind. tab. 26.) quodammodo nostræ assimilatur: sed istius nectarium sagittatum ab Echite prorsus alienum.

† Sp. 2. PERGULARIA SINENSIS.  $\beta$  Fi si thán.

Differ. spec. Perg. caule suffruticoso, volubili: foliis ovato-oblongis: pedunculis polyfloris.

Hab; & notæ. *Caulis* suffruticosus, teres, tenuis, volubilis. *Folia* ovato-oblonga, obtusa, integerrima, glabra, opposita. *Flos* terminalis, & lateralis, pedunculis polyfloris, sparsis. *Corolla* lutea, 5-partita, laciniis linearibus, longis, contortis. *Nectarium* sagittis, 5, erectis, stipitatis. *Germina* 2, ovalia. *Stylus* filiformis: stigma unico, conico, 5-sulcato. *Peric.* folliculi 2, oblongi, seminibus multis, ovatis, nudis.

Habitat apud Sinas inculta.

Observ. In omnibus Pergulariæ, & apocyni speciebus, quas vidi, semper inveni flores Monogynos. Idem videtur fentire de Pergulariâ Japonicâ Thunbergius. Fl. Jap. pag. 112.

## GENUS LXXVIII. ASCLEPIAS.

Char. Gener. *Nectararia* 5, ovata, concava, corniculum exerentia.  
Lin. sy. pl. G. 333.

Sp. 1. ASCLEPIAS CURASSAVIA.  $\alpha$  Yong cō lky.

Differ. spec. Asc. *foliis lanceolatis*, *petiolatis*, *glabris*, *nitidis*: *caule* simplici: *umbellis* erectis, solitariis, lateralibus. Lin. sp. 9.

Hab; & notæ. *Caulis* sub-simplex, volubilis. *Folia* lanceolata, glabra, nitida, petiolata, opposita. *Flos* pallidus, lateralis: *umbellis* solitariis, erectis. *Folliculi* 2, ventricoso-conci: *seminibus* ovatis, compressis, curvis, papposis.

Habitat prope Cantonem Sinarum.

+ Sp. 2. ASCLEPIAS FUSCA.  $\alpha$  Cây fo dua.

Differ. sp. Asc. *caule* repente: *foliis cordato-lanceolatis*: *umbellis* axillaribus, geminis.

Hab; & notæ. *Caulis* herbaceus, volubilis, tenuis, multiplex, inferius radicans, superius ramosissimus. *Folia* cordata, lanceolata, basi barbata, opposita, petiolata, parva. *Flos* fusco-purpureus, *umbellis* 2-natis, axillaribus. *Corolla* minima, *nectariis* 5, auriculatis, absque corniculis. *Fructus* folliculi 2, parvi, subulati, ex-trorsum ventricosi, introrsum plani: *seminibus* ovatis, curvis, papposis.

Habitat in antiquis muris, & ruderibus Cochinchinæ.

## † GENUS LXXIX. GRAMMICA.

## Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium inferum, urceolatum, 5-fidum: laciniis acutis, coloratis, carnosis.

Cor. campanulata, membranacea, 1-petala: tubo globoso, calyci æquali: limbo brevi, 5-fido, laciniis rotundatis, patentibus.

Stam. Filamenta 5, subulata, corollæ æqualia, tubo insistentia. Antherae ovatae, incubentes.

Pist. Germen subrotundum. Styli 2, æquales staminibus. Stigmate compresso-rotundo.

Peric. Bacca membranacea, subrotunda, 4-loba, 1-locularis, 4-sperma.

Sem. Subrotunda.

Nom.

Nom. ( $\gamma\rho\alpha\mu\kappa\delta\sigma$  linearis) a formâ plantæ linearis.

Char. Gener. *Corolla* campanulata, infera : tubo globoſo. *Bacca* 1-locularis, 4-speima.

† Sp. 1. GRAMMICA APHYLLA. ✕ Tɔ haong tlāng.

Differ. spec. Gr. *caule* volubili : *foliis nullis* : *floribus congestis*.

Hab. *Caulis* linearis, tenuissimus, albissimus, intricato-volubilis; multiplex : *ramis* ejusdem formæ, herbis obviis se implicantibus. *Folia* nulla. *Radix* conspicua nulla. *Flos* albus, congestus, pulcher, lateralis. *Bacca* alba, grano piperis æqualis.

Habitat inculta in hortis Cochinchinæ, & inter plantas humiles voluntatur, duratione brevi paucorum mensium, tempore verno. Initium aliquod radicale, quo a terrâ alimentum acciperet, diligenter quæſivi, sed non invēni.

Observ. Habitu affinis est, quanquam minus luxurians, *Tillandsiæ Usneoidi* Lin. sp. 9., & *Licheni Usneæ* Lin. sp. 93. Rumph. Amb. l. 1C. t. 40. f. 2. nomine Musci Capillaris.

### GENUS LXXX. GENTIANA.

Char. Gener. *Corolla* 1-petala. *Capsula* 2-valvis, 1-locularis : receptaculis 2, longitudinalibus. Lin. sy. pl. G. 352.

† Sp. 1. GENTIANA SCANDENS. ✕ Rau m. & Ki si thān.

Differ. spec. Gent. *caule* fruticoso scandente : *corollis* campanulatis, 5-fidis : *paniculis* elongatis, pendulis.

Hab ; & notæ. *Caulis* fruticosus, magnus, lignosus, teres : *ramis* multis, longissimis, scandentibus, inermibus, acirrhis. *Folia* ovato-lanceolata, integerima, glabra, cineracea, opposita. *Flos* lateralis, paniculis longis, demissis : *calyce* 5-dentato, parvo, persistente. *Corolla* 1-petala, campanulata, tubo ampio, externè cinerei coloris, punctis albis distincto, internè pilis densis, purpureis obstrueto : limbo patulo, albo, obtusè 5-fido, brevi, laciniis plerumque laciniato-plicatis. *Stamina* 5. *Styli* 2, longitudine tubi : *stigmatibus* simplicibus. *Capsula* sub-rotunda, 1-locularis, 2-valvis : *seminibus* plurimis.

Habitat, & scaadit per arbores, & sepes in Cochinchinâ, & Chinâ. In Sinensi folia sœpe videntur cordata levi emarginaturâ ad basim.

Odor utriusque est ingratus, & foetidus.

Virtus foliorum, & radicis. Tonica, stomachica. Nauseam, & vomitum efficaciter tollit : cibi appetentiam excitat, digestionem adjuvat.

vat. Sapor est amarissimus. Odorem foetidum, quem habet recens; exsiccata amittit.

Sp. 2. GENTIANA AQUATICA.  $\beta$  Xi Kām Xiong.

Differ. spec. Gent. *corollis* 5-fidis, infundibuliformibus, terminalibus, sessilibus: *foliis* margine membranaceis. Lin. sp. 16.

Hab; & notæ. *Caulis* annuus, cespitosus, erectus, 3-pollicaris: *ramis* nullis. *Folia* lanceolata, integerrima, glabra, sessilia, opposita. *Flos* cyaneus, terminalis, solitarius: *calyce* acutè 5-fido, erecto. *Corolla* infundibuliformis, patens, 10-fida: laciniis 5 majoribus expansis, 5 aliis minoribus, alternis, plicatis. *Stigmata* 2, sessilia, longiuscula, revoluta. *Caps.* ovata, compressa, 1-locularis, polysperma, 2-valvis, apice dehiscens.

Habitat in locis humidis prope Cantonem Sinarum.

Thunb. Japon. p. 115. Gentiana humilis, aquatica, verna. Aman. Ruth. pag. 4. tab. I. f. I.

GENUS LXXXI. HYDROLEA.

Char. Gener. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* rotata. *Filamenta* basi cordata. *Caps.* 2-locularis, 2-valvis. Lin. sy. pl. G. 347.

† Sp. 1. HYDROLEA INERMIS.  $\beta$  Xiong fung.

Differ. spec. Hyd. *caule* inermi: *floribus* solitariis, lateralibus.

Hab; & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 1-pedalis, erectus, inermis, subsimplicissimus. *Folia* lanceolato-linearia, integerrima, glabra, sessilia, sparsa. *Flos* cæruleus, pedunculis 1-floris, solitariis, lateralibus. *Calyx* inferus, 5-partitus, laciniis acutis. *Corolla* 1-petala, campanulata, tubo brevi: limbo 5-partito, patente, laciniis ovatis, calyci subæqualibus. *Filamenta* 5, subulata, tubo corollæ insidentia, limbo breviora: *Germen* ovatum. *Styli* 2, erecti, staminibus breviores: *stigmatibus* obtusis. *Capsula* ovata, 2-locularis, 2-valvis, polysperma: seminibus plurimis, subrotundis, minimis, circumdantibus columellas 2, ovatas, fundo capsulæ adhærentes, superius liberas. *Antheræ* ovatae, incumbentes. De filamentis basi cordatis nihil annotavi, nec memini.

Habitat Cantone, in locis humidis.

Observ. Linnæus (Gen. pl. ed. sextæ.) Corollam hujus Generis describit Rotato-campanulatam, qualis est nostra, nec propriè rotatam. Columellæ illæ dueæ, quæ receptacula semenum sunt, ad Gentianam pertinere videntur.

## † GENUS LXXXII. AGLAIA.

## Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 1 - phylum, 5 - crenatum, inferum, minimum, persistens.

Cor. Petala 5, ovata, concava, carnosa, sub-clausa, in globum con-

niventia. Nectarium tubulosum, 5 - plicatum, petalis paulo brevius.

Stam. Filamenta nulla. Antheræ 5, ovatæ, curvaturis nectarii inclusæ.

Pist. Germen ovatum. Stylus nullus. Stigmata 2, oblonga, erecta.

Peric. Bacca ovata, glabra, aquosa, 1 - sperma.

Sem. 1 - ovatum, sub-compressum, 4 - sulcum.

Nom. (Αγλαια splendor) ex plantæ nitore, odore, & venustate.

Char. Gener. Cal. 5 - dentatus, inferus. Cor. petala 5 in globum con-

niventia. Bacca 1 - sperma.

† Sp. 1. AGLAIA ODORATA. α Cây ngâu. β . . .

Differ. Spec. Agl. foliis 5 - phyllis : floribus racemosis.

Hab. Arbor. 8 - pedalis : ligno flavescere, duro : cortice tenui, fusco : ramis patentibus : comâ densissimâ. Folia pinnata, 3-5 - nata, foliolis ovalibus, basi attenuatis, integrerrimis, glabris, nitidis, petiolis brevibus. Flos luteus, minutissimus, globosus, odoratus : racemis oblongis, axillaribus. Bacca parva, rubra.

Habitat in Cochinchinâ, & in Chinâ tam agrestis, quam culta in hortis magnatum, habitu speciosissima, & odore grata.

Camunium Sinense, seu Tsjiulang. Rumph. Amb. I. 7. pag. 28. t. 18. f. 1. Idem Auct. cap. 43.

Observ. Suspicio ejusdem generis esse Bumaldam Trifoliolum Thunb. Jap. p. 8., & p. 114. Cujus pericarpium maturum Cl. vir fatetur non vidisse.

## GENUS LXXXIII. SALSOLA.

Char. Gener. Cal. 5 - phyllus. Cor. o. Capsula 1 - sperma. Semen Co-

chleatum. Lin. sy. pl. G. 339.

† Sp. 1. SAL SOLA DIDYMA. γ . . .

Differ. Spec. Sals. caule herbaceo, decumbente : foliis oblongis iner-

mibus : Capsulis 2 - lobis, 2 - spermis.

Hab ; & notæ. Caulis herbaceus, 2 - pedalis, procumbens, diffusus,

asper.

asper. *Folia* oblonga, obtusa, integerrima, crassa, glabra, iner-  
mia, opposita. *Flos* apetalus, axillaris, glomeratus, subsessilis :  
*calyce* 5-partito, laciniis emarginatis, apice cucullatis. *Stigmata*  
2, sessilia, oblonga, erecta. *Capsula* 2-loba, 2-locularis, i-  
sperma : *seminibus* cochleatis, asperis, nigris.  
Habitat inulta in insulâ Mozambicco, in Africâ.

## GENUS LXXXIV. CHENOPODIUM.

Char. Gener. *Cal.* 5-phyllus, 5-gonus. *Cor.* o. *Semen* 1, lenticula-  
re, superum. Lin. sy. pl. G. 337.

Sp. 1. CHENOPodium HYDRIDUM.  $\alpha$  Cây mân ri.

Differ. spec. Chen. *foliis* cordatis, angulato-acuminatis, *racemis* ra-  
mosis, nudis. Lin. sp. 8.

Hab; & notæ. *Caulis* herbaceus, simplex, erectus, 3-pedalis, ru-  
bescens. *Folia* su-hastata, sinuato-dentata, cineracea, suprema lan-  
ceolata, alterna, petiolata. *Flos* apetalus, racemis longis : herma-  
phroditus, & foemineus in eodem racemo : *calycibus* 5-phyllis.  
*Semen* 1, lenticulare.

Habitat incultum in agris Cochinchinæ.

Gmel. Sibir. 3. pag. 76.

## GENUS LXXXV. BETA.

Char. Gener. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* o. *Semen* reniforme, intra substan-  
tiam baseos calycis. Lin. sy. pl. G. 338.

Sp. 1. BETA VULGARIS.  $\beta$  Pă hung.

Differ. spec. Bet. *floribus* congestis.

Hab; & notæ. *Caulis* herbaceus, crassus, erectus, albus, 3-peda-  
lis. *Folia* sub cordata magna, integerrima, obtusa, glabra, palli-  
da. *Flos* albus, congestus, apetalus. *Semen* reniformi. *Radix* cra-  
sa, albicans, nec edulis.

Habitat Cantone Sinarum, venditurque in foro cum aliis oleribus.

Thunb. Jap. p. 113. Beta pallidè Virens maior. Bauh. Pin. p. 118.

## GENUS LXXXVI. GOMPHRÆNA.

Char. Gener. *Cal.* coloratus : exterior 3-phyllus : foliolis 2 conni-  
ventibus, carinatis. *Petala* 5, rudia, villosa. *Nectarium* cylindri-  
cum, 5-dentatum. *Caps.* 1-sperma. *Stylus* semibifidus. Lin. sy.  
pl. G. 343.

Sp. 1.

Sp. I. GOMPHRÆNA GLOBOSA.  $\alpha$  Hoa nua ngai.  $\beta$  . . .  
 Differ. spec. Gomp. *caule* erecto : *foliis* ovato-lanceolatis : *capitulis*  
*solitariis* : *pedunculis* diphyllis. Lin. sp. I.

Hab ; & notæ. *Caulis* annuus , 2 - pedatis , ramosus : *geniculis* pur-  
 pusascentibus. *Folia* ovata , utrinque acuta , integerrima , hispida ,  
*fessilia* , opposita. *Flos* lætè purpureus , *capitulis* globoſis , solitariis ,  
*terminalibus* : *calyce* communi nullo , præter foliola 2 , subrotun-  
 da , acuminata , expansa , capitulo ſuppoſita. *Perianthium* imbrica-  
 tum , 7-8-phyllum , coloratum , foliolis acutis , rudibus , erectis.  
*Cor.* nulla , niſi foliola 5 calycis ſuperiora corollam dicas. *Rece-  
 ptaculum* commune oblongum , ſetofum. *Semen* 1 - ovatum , sub-  
 compressum , nigrum , nitidum : *capsula* circumſcifſa. *Stylus* 2 - fi-  
 dus. *Filamenta* 5 , brevia.

Habitat paſſim culta in Cochinchinâ , & Chinâ.

*Flos* Globosus Rump. l. 8. c. 72. t. 100. f. 2. Tourn. Inst. p. 654. tab.  
 429. Amaranthoides Lychnidis folio , flore-purpureo.

Est varietas in Cochinchinâ flore albo , *capitulis* ovatis : in quibus  
 floſculi omnes ſunt fertiles , cum in Purpureâ plures inveniantur  
 steriles. In reliquis convenient.

### + GENUS LXXXVII. TRISANTHUS.

#### Descriptio Naturalis.

Cal. Communis 2 - phyllus , foliolis lanceolatis , persistens , continens  
 3 floſculos. Perianthium proprium , 1 - phyllum , verticaliter lenti-  
 forme , coloratum , denticulis 5 , minimis apici subtruncato impo-  
 fitis.

Cor. nulla.

Stam. Filamenta 5 , subulata , breviflora , Calycis margini inſiſtentia.  
 Antheræ subrotundæ , 2 - loculares.

Pift. Germen orbiculatum. Styllus nullus. Stigmata 2 - oblonga , re-  
 flexa.

Peric. Calycinum , lenticulare , truncatum , factum ex ipſo calyce ,  
 denticulis decidentibus , 2 - loculare , 1 - ſpermum , 2 - fulcum , 2 -  
 partibile.

Sem. Reniformia.

Nom. ( *Tρίς* ter , *ἄνθος* flos ) ob tres flores eodem calyce copulatos.

Char. Gener. Cal. com. 2 - phyllus , 3 - florū : *proprius* 5 - dentatus ,  
 ſuperus. Cor. o. Fructus 2 - locularis , 1 - ſpermus.

Sp. I.

† Sp. 1. TRISANTHUS COCHINCHINENSIS.  $\alpha$  Rau má.

Differ. spec. Trif. caule repente : *foliis* subrotundis , semipartitis : *floribus* congestis.

Hab. *Caulis* filiformis , tenuis , subsimplicissimus , longus , teres , re-pens , distantiis subæqualibus ordinatim radicans. *Folia* subrotunda , semipartita , dentato-crenata , concava , rugosa , glabra : petiolis radicalibus , confertis , longis , erectis , paucis. *Perianthium* floris purpureum , cartilagineum , glabrum , sessile , calyce communi , 3-floro suffultum : pedunculis communibus longiusculis , radicalibus , congestis , paucis , nec umbellatis.

Habitat frequenter ad sepes in Cochinchinâ , non cultus , quamvis esculentus. Si bene memini , etiam in Chinâ , & in aliis Indiae locis.

Pes equinus. Rumph. Amb. I. 9. c. 69. t. 169. f. 1.

Virtus totius plantæ. Vulneraria , Mundificans , Diuretica , Nephritica. Coguovi Eunuchum , qui partes generationis radicitus abscederat , appositâque hâc herbâ cum pauxillâ calce contusâ facile convaluerat.

Observ. Quamvis Praeceptor noster Linnæus cum aliis Clarissimis Viris hanc plantam Hydrocotyli adjunxerint , existimo illos recentem non vidisse ; nam , ut hæc legenti patebit , in paucis conveniunt , in multis differunt : vel forte viderunt aliam a Cochinchinensi , quam probavi , diversam.

### GENUS LXXXVIII. BOSEA.

Char. Gener. *Cal.* 5-phylus. *Cor.* o. *Bacca* 1-sperma. Lin. sy. pl. G. 344.

† Sp. 1. BOSEA CANNABINA.  $\alpha$  Cây Rach.

Differ. spec. Bos. arborea : *foliis* lanceolatis , ferratis , glabris : *racemis* 2-natis.

Hab ; & notæ. *Aabor* mediocris : *ramis* ascendentibus. *Folia* lanceolata , basi obtusa , ferrata , glabra , parva , integerrima , alterna. *Flos* albus , racemis compositis , brevibus , axillaribus , 2-natis. *Calyx* 5-phylus , foliolis lanceolatis , curvis , conniventibus. *Corolla* nulla. *Filamenta* 5 , subulata , calyci æqualia. *Antheræ* subrotundæ , curvaturis Calycis defensa. *Germen* superum , longiusculum. *Stylus* nullus. *Stigma* obtusum , integrum. *Bacca* minima , subrotunda , subcompressa , 1-sperma : *semine* rotundo.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Uſus. Ex cortice extrahuntur fila tenacia , quibus vulgares storeæ texuntur.

## UMBELLATÆ.

## GENUS LXXXIX. HYDROCOTYLE.

Char. Gener. *Umbella simplex* : involucro 4 - phyllo. *Petala integræ*  
*Semina semiorbiculato-compressa*. Lin. sy. pl. G. 355.

Sp. 1. HYDROCOTYLE UMBELLATA.  $\alpha$  Rau má mo.

Differ. spec. Hyd. *foliis* peltatis : *umbellis* multifloris. Lin. sp. 2.

Hab ; & notæ. *Caulis annuus*, tenuissimus, filiformis, albus, raimo-  
 fissimus, intricatus, repens. *Folia cordata*, peltata, subrotunda,  
 crenato-lobata, glabra : *petiolis* brevibus, solitariis, reclinatis, al-  
 bis. *Flos minimus*, rubescens : *umbellis* multifloris, subrotundis,  
 simplicibus : *pedunculis* *umbellæ longiusculis* : *involucris* 3-4-phyl-  
 lis : *corollis pentapetalis* : *flosculis omnibus fertilibus*.

Habitat in Cochinchinâ, frequens in locis humidis, hyberno tempore.

Hydrocotyle Marsh pennywort. Hill. Brit. herb. p. 419. t. 59. f. 16.

Acarigoba. Pif. Bras. l. 4. p. 260. fig. ibi. Notandum vero est icones  
 utriusque Authoris nec inter se, nec cum nostrâ satis conformes.  
 Hujus flores proprii sunt Umbellatæ, non Vulgaris : Folia vero sub-  
 lobata, crenata ad Hydr. Americanam pertinent.

## GENUS XC. CAUCALIS.

Char. Gener. *Cor. radiatæ* : disci masculæ. *Petala inflexo-emarginata*.  
*Fruætus* setis hispidis. *Involucra integra*. Lin. sy. pl. G. 362.

Sp. 1. CAUCALIS ORIENTALIS.  $\beta \dots \alpha$  Cây hôte gai.

Differ. spec. Cauc. *umbellis* patentibus : *foliolis* partialibus suprade-  
 compositis, laciniatis, lacinulæ linearibus. Lin. sp. 5.

Hab ; & notæ. *Caulis* herbaceus, teres, rectus, striatus, ramosus,  
 3-pedalis. *Folia* pinnato-incisa, laciniata, glabra. *Flos* *umbellis*  
 compositis, patentibus : *radiis* universalium longis, inæqualibus,  
 partialium brevissimis : *involucris* utriusque integris, subulatis, radio  
 brevioribus. Flores flosculosi subnudi. *Fruætus* ovato-olongus, echi-  
 nato-hispidus, 2-spermus, cortice persistente, intus striatus.

Habitat inculta Cantone, & alibi.

Caucalis Cafcalitra. Bellon. it. l. 3. c. 49. fig. ibi. Caucalis Orientalis  
 altissima. Tournef. Corol. p. 23.

## GENUS XCII. DAUCUS.

Char. Gener. *Cor.* sub-radiatæ. *Flosculi* disci abortivi. *Fructus* pilis hispidus. Lin. sy. pl. G. 364.

Sp. 1. DAUCUS CAROTA. β Hú lù pā. α Hò la bac.

Differ. spec. Dauc. *seminibus* hispidis: *petiolis* subtus nervosis. Lin. sp. 1.

Hab; & notæ. *Caulis* sesquipedalis, annuus, crassus, hispidus, albicans: *radice* fusiformi, carnosâ, croceâ, esculentâ. *Folia* minutim pinnatifida: *petiolis* nervosis, amplexicaulibus, reclinatis. *Flos* albus: *umbellis* partialibus, plurimis, convexis: *involucris* omnibus laciniato-linearibus. *Semina* parva, hispida.

Habitat Cantone Sinarum: indeque in Cochinchinam translata.

Thunb. Jap. pag. 117. Pastinaca tenuifolia, sativa, radice luteâ. Bauh.

Pin. p. 151. n. 5.

Virt. herbæ, & radicis. Aperiens, Diluens, Diuretica. Semina carminativa.

## GENUS XCII. ATHAMANTA.

Char. Gener. *Fructus* ovato-oblongus, striatus. *Petala* inflexa, emarginata. Lin. sy. pl. G. 369.

Sp. 1. ATHAMANTA CHINENSIS. α Xà sàng. β Xé chōan.

Differ. spec. Ath. *seminibus* membranaceo-striatis: foliis supra-decompositis, lævibus, multifidis. Lin. sp. 9.

Hab; & notæ. *Caulis* annuus, 2-pedalis, lævis, teres, erectus, albus, ramosus. *Folia* pinnato-multifida, glabra, viridi-pallida, odora. *Flos* albus, *umbellis* compositis, convexis, densis, æqualibus, plurimis: *involucellis* partialibus linearibus, integris. *Flosculi* omnes fertiles, *corollis* emarginatis, sub-inflexis. *Semina* minuscula, ovata, 5-crenata, subcoriacea, aromatica. glabra.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ culta, spontaneaque.

Virtus: seminum. Resolvens, Diuretica, Einmenagoga, Deobstruens. Valde proficua in morbis uteri. Externè valet contra cutis pruritum, & pustulas, maximè si adjungatur curcumâ.

## GENUS XCIII. SIMUM.

Char. Gener. *Fructus* subovatus, striatus. *Involucrum* polyphyllum. *Petala* cordata. Lin. sy. pl. G. 378.

Sp. 1.

Sp. 1. SIUM SISARUM. & Xuēi kin. & Rau kan <sup>kan</sup> nuōc.  
 Differ. spec. Sium : *foliis* pinnatis, floralibus 3 - natis. Lin. sp. 4.  
 Hab ; & notæ. *Caulis* annuus, 3 - pedalis, sub-erectus, teres, striatus albus, subsimplex. *Folia* pinnata, ramea 3 - nata, ferrato-incisa, glabra. *Flos* albus, *umbellis* compositis : *involucellis* universalibus, & partialibus polyphyllis, integris. *Semina* ovata, striata. Habitat loca aquosa in Chinā, & Cochinchinā, ubi colitur. Usus : Culinaris. Caules tenaces : folia, & fructus subodori. Hort. Cliff. p. 98. Sisarum Germanorum. Bauh. p. 155. n. 1.

Sp. 2. SIUM GRÆCUM. & Rau kan hoang.  
 Differ. spec. Sium : *foliis* omnibus bipinnatis. Lin. sp. 8.  
 Hab ; & notæ. *Caulis* annuus, 1 - pedalis : *ramis* procumbentibus, aliquando repentibus. *Folia* pinnata, pinnatifida, glabra. *Flos* albus, *umbellis* compositis, parvis : *involucro* universalis nullo : partialibus 1 - phyllis, reflexis. *Petala* cordata, sub-inflexa. *Semina* ovata, striata, glabra. Habitat ubique in cultum in hortis Cochinchinæ : puto, quod etiam in Chinā, quamvis non viderim. Sium foliis duplicato-pinnatis. Lin. Cliff. p. 98. n. 4. Ligusticum Græcum folio Apii. Tourn. Corol. p. 23. Virtus : præcipue seminum. Diureticā, carminativa. Folia edulia. Observ. Defectu involucri universalis ad Chærophyllum accedit. Sapor, odor, semina Sii sunt propria. Puto, quod Sium Decumbens (Flor. Jap. p. 118.) eadem sit planta.

## GENUS XCIV. BUBON.

Char. Gener. *Fructus* ovatus, striatus, villosus. Lin. sy. pl. G. 380.

Sp. 1. BUBON MACEDONICUM. & Hoa Khóm.  
 Differ. spec. Bub. *foliis* rhombeo-ovatis, crenatis : *umbellis* numerosissimis. Lin. sp. 1.  
 Hab ; & notæ. *Caulis* annuus, erectus, rectus, 2 - pedalis : *ramis* multis ascendentibus. *Folia* caulina rombeo-ovata, incisa : ramea oblonga, minuscula, irregularia. *Umbellæ* plurimæ subplanæ : *involucro* universalis, partialique. *Corolla* petalis lanceolato-ovatis, sub-inflexis. *Fructus* oblongo-ovatus, striatus, villosus, tenuis, fuscus, odoratissimus. Habitat cultum, nec raro in hortis metropolis Huæe Cochinchinæ. Apium Macedonicum Bauh. Pin. p. 154. n. 12. Levisticum Indicum. Rumph. Amb. l. 8. c. 60. t. 93. f. 3. Ubi icon non optima. Usus ad Z ii im-

imbuendas odore vestes : qui odor vehemens quidem , sed aliquantulum nauseosus Europaeis.

Virtus Medica : totius plantæ , præcipue seminum. Diuretica , Emmenagogia , Carminativa.

### GENUS XCV. LIGUSTICUM.

Char. Gener. *Fructus* oblongus , 5 - sulcatus utrinque. Cor. æquales : petalis involutis , integris. Lin. sy. pl. G. 376.

Sp. 1. LIGUSTICUM SCOTICUM.  $\alpha$  Rau kan nhâ.

Differ. sp. Lig. foliis bitemnatis. Lin. sp. 2.

Hab ; & notæ. *Caulis* erectus , teres , crassiusculus , striatus , sub-fuscus , 2 - pedalis. *Folia* bitemnata , decomposita alia , acute incisa , pauca , coloris obscuro-viridis , nitidi. *Flos* albus , umbellis compositis , planis , magnis : *involucris* linearibus universali , & partiali : *Fructus* oblongus , utrinque 5 - sulcatus , calyce 5 - fido , permanente cinctus. *Corollæ* æquales , petalis integris. Planta esculenta , odore , & sapore Sii Græci.

Habitat cultum in Cochinchinâ.

Seseli maritimum scoticum. Herm. Parad. t. 227. Levisticum foliis bitemnatis. Hill. Brit. herb. p. 410. t. 58. f. 15.

### GENUS XCVI. CORIANDRUM.

Char. Gener. Cor. radiata : *Petala* inflexo-emarginata. *Involucrum* universale 1 - phyllum. Partialia dimidiata. *Fructus* sphæricus. Lin. sy. pl. G. 386.

Sp. 1. CORIANDRUM SATIVUM.  $\beta$  Xe hâ yû.  $\alpha$  Rau ngô tau.

Differ. spec. Cor. fructibus globosis.

Hab ; & notæ. *Caulis* annuus , erectus , teres , crassiusculus , rubescens , sesquipedalis , ramis assurgentibus. *Folia* multifida , laciinis linearibus. *Flos* albus , sub-rubescens : *umbellis* compositis , paucifloris : *involucro* universali sæpius nullo : partialibus 1 - phyllis , lanceolatis , integris. *Fructus* globosus , simplex , odorus.

Habitat , & colitur in Chinâ , raro in Cochinchinâ.

*Coriandrum maius*. Bauh. Pin. pag. 158. n. 1.

Virtus : semen. Hypnotica , Carminativa. Usus herbæ Culinaris ; frequens.

Sp. 2. CORIANDRUM TESTICULATUM.  $\alpha$  Rau ngô : Hö noi.

Differ. spec. Cor. fructibus didymis. Lin. sp. 2.

Hab ;

Hab; & notæ. *Caulis* annuus, sub-erectus, teres, pallidus 10 - pollicaris: ramis multis diffusis, debilibus. *Folia* polyfida, lacinias linearibus, tenuibus, glabris. *Flos* albus umbellis compositis, parvis, concavis: *involucris*, tam universali, quam partialibus, polyfidis, subulatis. *Fructus* didymus, fusco-viridis, odore, & sapore præstantior Coriandro Sativo.

Habitat, & colitur abundanter per totam Cochinchinam.

Uſus idem, qui præcedentis.

*Coriandrum* minus *Testiculatum*. Bauh. Pin. pag. 158. n. 2. Pluk. tab. 169. f. 2.

### GENUS XCVII. ANETHUM.

Char. Gener. *Fructus* subovatus, compressus, striatus. *Petala* involuta, integra. Lin. sy. pl. G. 394.

Sp. 1. ANETHUM FœNICULUM. β Hòei hiàm. α Tieo hoi.

Differ. spec. An. *fructibus* ovatis. Lin. sp. 3.

Hab; & notæ. *Caulis* annuus, 3 - pedalis, erectus, teres, albicans, ramosus. *Folia* glabra, alterna, petiolata, cineracea, odora, dulcia, bipinnata, pinnatifida, lacinias filiformibus, longis. *Flos* luteus, umbellis compositis, magnis, sub-planis: *involucro* nullo. *Corollæ* omnes fertiles, petalis ovatis, apice involutis. *Semina* compresso-ovata, striata, marginata.

Habitat abundanter in Chinâ: colitur etiam in Cochinchinâ.

Virtus: totius herbae. Diuretica, Resolvens, Stomachica, Cephalica. Semina carminativa, lactifera. Uſus etiam culinaris, dulcis, odoratus, gratus.

*Fœniculum* Vulgare. Hill. Brit. herb. p. 413. t. 59. f. 5. *Anethum Fœnic.*

Thunb. Jap. p. 120.

### TRIGYNA.

#### GENUS XCVIII. SAMBUCUS.

Char. Gener. *Cal.* 5 - partitus. *Cor.* 5 - fida. *Bacca* 3 - sperma. Lin. sy. pl. G. 402.

Sp. 1. SAMBUCUS NIGRA. β Ü chū yú. α Ngò châu dâu.

Differ. spec. Samb. *Cynis* 5 - partitis: *caule* arboreo. Lin. sp. 3.

Hab; & notæ. *Caulis* arboreus, 8 - pedalis: *ramis* patentibus. *Folia* lato-lanceolata, pinnata, 2 - juga, integrerima, glabra, ad apicem rubescens. *Flos* sub-terminalis, *cynis* 5 - partitis, & 3 - partitis: pedun-

pedunculis longis, sub-aequalibus. *Fructus* bacca rotunda, minuta, rubro-fusca, 3-sperma, infera.

Habitat in montanis Sinensibus.

Thunb. Japon. p. 126. Sambucus fructu in umbellâ nigro. Bauh. Pin. 456. n. 1.

Virt. Baccarum. Attenuans, Diuretica, Diaphoretica. Medici Europæi Refrigerantem: Sinenses contra valde calefacientem esse sentiunt: utuntur præcipue in frigiditate extremorum, & doloribus, aut debilitate inde ortis.

### GENUS XCIX. SAROTHRA.

Char. Gener. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Caps.* 1-locularis, 3-valvis, colorata. Lin. sy. pl. G. 414.

Sp. 1. SAROTHRA GENTIANOIDES. α Cây cu gá. Lin. sp. 1.

Differ. spec. Sar. *foliis* subulatis: *floribus* spicatis.

Hab; & notæ. *Caulis* herbaceus, 2-pollicaris, erectus, simplicifimus. *Folia* subulata, sessilia, minuta: *villus* capitatis superius consistit: juniora involuta, seniora reflexa. *Calyx* ruber, 5-partitus, inferus. *Cor.* 5-petala, membranacea, tenuissima, calyce longior, patula. *Filamenta* 5, capillaria: *antheris* subrotundis. *Styli* 3, corollæ æquales, profundè 3-fidi: *stigmatibus* simplicibus. *Capsula* rubra, 3-locularis, 3-valvis, polysperma. *Flos* axillaris, spicis simplicibus, erectis.

Habitat in locis arenosis Cochinchinæ, prope Metropolim.

Centaurium minus, spicatum, angustissimo folio. Pluk. Mant. 43. tab. 324. f. 4.

### GENUS C. TAMARIX.

Char. Gener. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Caps.* 1-locularis, 3-valvis. *Semina* papposa. Lin. sy. pl. G. 405.

† Sp. 1. TAMARIX CHINENSIS. β Cuôn nhám lâu.

Differ. spec. Tam. *foliolis* alternis: *spicis* terminalibus: *petalis* erectis.

Hab; & notæ. *Arbor* mediocris: *ramis* patentibus: *ramulis* tenuissimis, longis, nutantibus. *Folia* minutissima, acuta, imbricata. *Flos* rubescens, terminalis, paniculâ vastâ, compositâ spiculis linearibus, longis, tenuibus. *Cal.* brevis, 5-partitus. *Corolla* petala 5, linearia, erecta. *Capsula* triquetra, colorata, 3-valvis, 1-locularis, polysperma. *Semina* matura non vidi, adeoque judicare non potui

potui an sint papposa? *Stamina* habet quinque.  
 Habitat in provinciâ Cantonensi Sinarum.  
 Observ. Cohæret cum Tam. Gallicâ Staminibus Pentandris: sed differt foliolis alternis, ramulis nutantibus, petalis erectis, terminibus. Magis convenire videtur cum Tam. Orientali (Tournef. Corol. p. 45., & Forsk. Arab. p. 206.) quamvis nec cum istâ in totum conveniat.

## GENUS CI. RHUS.

Char. Gener. *Cal.* 5 - partitus. *Petala* 5. *Bacca*. 1 - sperma. Lin. sy. pl. G. 399.

Sp. 1. RHUS JAVANICUM.  $\beta$  Xiong tsât.  
 Differ. spec. Rh. *foliis* pinnatis, ovatis, acuminatis, ferratis, subtus tomentosis. Lin. sp. 3.  
 Hab; & notæ. Arbor magna: *ramis* patentibus. *Folia* imparipinnata, 5 - juga, aliquando decurrentia: *foliolis* ovatis, acuminatis, obtuse ferratis, subtus tomentosis, coloris obscuro-viridis. *Flos* albus, terminalis, racemis laxis, magnis, erectis. *Corolla* petala 5, striata, campanulata, calye longiora: *antheris* 5, sessilibus, minimis. *Styli* 3, breves. *Bacca* subrotunda, parva, 1 - sperma.

Habitat in sylvis Cantoniensibus Sinarum.

Osbeck. Itin. Chin. Thunb. Jap. p. 121.

Usus. Ex baccis contusis, & aquâ coctis extrahunt Sinenses oleum; quo pro vernice utuntur, pulchro quidem, sed nitore minus consistente.

## GENUS CII. BASELLA.

Char. Gener. *Cal.* 0. *Cor.* 7 - fida: laciniis binis oppositis latioribus; tandem baccata. Semen 1. Lin. sy. pl. G. 413.

$\dagger$  Sp. 1. BASELLA NIGRA.  $\alpha$  Cây Boung.  $\tau\sigma i$ .  $\beta$  Lö quèi.  
 Differ. spec. Bas. *foliis* rotundo-ovatis: *spicis* lateralibus.  
 Hab; & notæ. *Caulis* perennis, volubilis, tenuis, teres, succulentus, ramosus. *Folia* lato-ovata, crassa, glabra, integrifima, alterna, petiolata. *Flos* albo-violaceus, lateralis: *spicis* simplicibus, longis, paucifloris, solitariis. *Calyx* squamæ 3, subrotundæ, acuminatæ, minimæ. *Corolla* 1 - petala: tubo brevi, ventricoso: limbo 6 - fido, laciniis ovatis, concavis, inflexis, subclausis. *Filamenta* 5, subulata, corollâ breviora, tubo insidentia: *antheris* subrotundis. *Germen* superum, subrotundum, 4 - lobum. *Styli* 3, breviores stami-

staminibus : *stigmatibus* oblongis. *Pericarpium* bacca subrotunda, aquosa, nigerrima, parva, 4-loba, apice 4-fida, laciniis obtusis, concavis. *Semen* 1, subrotundum.

Habitat iu Cochinchinâ, & Chinâ, agrestis, cultaque, per sepes, & crates hortorum implicata.

Gandola Alba. Rumph. Amb. l. 9. c. 50. t. 154. f. 2.

Observ. Planta Rumphiana foliis acutis, floribus campaniformibus, 5-fidis, albis, & baccâ irregulariter angulosâ aliquantum a nostrâ differt: spicæ autem laterales in utrâque consentiunt; cum Linnæanæ species Alba, & Rubra pedunculis gaudent simplicibus. An vero corolla ipsa in baccam formetur? non notavi. Videtur potius, quod non; siquidem matura bacca servat eandem formam quadrilobam, quam habebat germen, & a quâ dissidebat corolla tubo simpliciter ventricoso, nec lobato: limbo 6-fido.

Virtus: foliorum, Lubricans, Eccoprotica. Usus esculentus.

### † GENUS CIII. TRICEROS.

#### *Descriptio Naturalis.*

Cal. Perianthium 5-phylum, inferum, persistens: foliolis acutis, patentibus.

Cor. Petala 5, oblonga, patentia, calyce longiora.

Stam. Filamenta 5, capillaria, corollæ subæqualia. Antheræ 2-loculares, ovatæ.

Pist. Germen subrotundum, inæquale. Styli 3, breves, basi invicem distantes. Stigmata simplicia.

Peric. Bacca coriacea, inferius rotunda, apice 3-cornis, 3-locularis, 2-sperma.

Sem. Subrotunda, acuminata.

Nom. (*Kéρας* cornu, *τρίς* ter) a baccâ tricorni.

Char. Gener. *Cal.* 5-phillus. *Cor.* petala 5, oblonga. *Bacca* supera, 3-locularis, 2-sperma.

† Sp. 1. TRICEROS COCHINCHINENSIS. a Cây áu rùng.

Differ. spec. Tric. foliis ovatis, quinatis: racemis terminalibus.

Hab. Arbor mediocris: ramis patentibus. *Folia* impari-bipinnata, 2-juga: foliolis ovatis, acuminatis, ferratis, duris. *Flos* albus, racemis laxis, subterminalibus. *Bacca* parva, inutilis.

Habitat inulta in montibus Cochinchinæ.

## GENUS CIV. PHARNACEUM.

Char. Gener. *Cal.* 5 - phyllus. *Cor.* o. *Capsula* 3 - locularis, polysperma. Lin. sy. pl. G. 410.

Sp. 1. PHARNACEUM MOLLUGO. & Co däng.

Differ. spec. *Ph. pedunculis* unifloris lateralibus : *floribus* longitudine foliorum : *caule* depresso. Lin. sp. 2.

Hab ; & notæ. *Caulis* annuus, cespitosus, procumbens, teres, geniculatus, ramosus, dichotomus. *Folia* lanceolata, integerrima, glabra, inæqualia, crassa, verticillata, 4, 5. *Flos* albicans minimus, pedunculis solitariis, tenuibus, axillaribus, monofloris. *Petala* 5, linearia, bifida. *Stamina* 5. *Styli* 3. *Capsula* 3 - locularis, polysperma. *Semina* minutissima.

Habitat incultum in hortis Cochinchinæ.

Alfine erecta pentaphylla, flore albo. Burm. Zeyl. pag. 13. t. 7.

Virt. totius herbæ. Refrigerans, Abstengens.

Sp. 2. PHARNACEUM INCANUM ? & Co mè.

Differ. spec. *Ph. pedunculis* communibus longissimis : *foliis* linearibus. Lin. sp. 4.

Hab ; & notæ. *Caulis* herbaceus, erectus, 8 - pollicaris. *Folia* linearia, opposita, glabra, integerrima. De stipulis, non memini. *Flos* albicans, paniculatus, pedunculo communi longissimo. *Capsula* 3 - locularis, polysperma.

Habitat in hortis, & agris Cochinchinæ.

Hortus Cliff. pag. 492.

## PENTAGYNYIA.

## GENUS CV. CRASSULA.

Char. Gener. *Cal.* 5 - phyllus. *Petala* 5. *Squamæ* 5, nectariferæ ad basim germinis. *Capsulæ* 5. Lin. sy. pl. G. 423.

Sp. 1. CRASSULA PINNATA. & Cây bap.benh.

Differ. spec. *Cras. foliis* pinnatis : *caule* arboreo. Lin. Jun. sup. p. 191.

Hab ; & notæ. *Radix* lignosa, magna, verticalis, sœpe indivisa.

*Caulis* fruticosus, crassus, erectus, 6 - pedalis, ramis assurgentibus, rectis. *Folia* impari-pinnata, multijuga : *petiolis* longis, tenuibus, erectis, connato-vaginantibus, rubrofuscis : *foliolis* oblongis, obtusis, integerrimis, crassis, sessilibus, subtus tomentosis, superius nitidis. *Flos* rubro-fuscus, parvus : racemis compositis, ere-

Aa

ctis;

ctis, subterminalibus : *calyce* 5-partito, minimo. *Corolla* petala 5, iufera, oblonga, carnosa. *Filamenta* 5, subulata, pilosa, rubra : *antheris* subrotundis. *Nectarium* squamis 10, oblongis, luteis. *Stigmata* 5, sessilia. *Pericarpium* capsulae 5, parvæ, 2-spermæ, introrsum dehiscentes.

Habitat agrestis in locis arenosis Cochinchinæ. Foliola ibi non sunt cordata, nec petiolata, nisi petiolo communi, prout de Chinensi (quam non vidi) Linnæus asserit. suppl. pl. p. 191.

Virtus : radicis. Aperiens, Attenuans, Deobstruens Emmenagogæ. Prodest in Ictero, Hydrope, Cachexia, febribus diuturnis. Foliorum decoctum scabiem abstergit. Eadem folia ad tingendas telas colore nigro usurpantur. Planta tota amarissima.

### GENUS CVI. DROSERA.

Char. Gener. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5. *Capsula* 1-locularis, apice 5-valvis. *Semina* plurima. Lin. sy. pl. G. 421.

Sp. 1. DROSERA ROTUNDIFOLIA.  $\alpha$  Co tlôn gà.

Differ. spec. Dr. *scapis* radicatis : *foliis* orbiculatis. Lin. sp. 1.

Hab ; & notæ. Caulis nullus. *Folia* turbinato-orbiculata, villosa, rubra, multa, sub-petiolata, in orbem strata. *Scapus* nudus, 6-pollicaris, teres, rectus, indivisus : *spicæ* subsimplici terminali, paucifloræ : *calyce* 5-fido, infero : *corollæ* 5-petalæ, albæ, patente. *Capsula* 1-locularis, 5-valvis, polysperma.

Habitat in locis humidis Cochinchinæ.

Ros solis, foliis circa radicem in orbem dispositis. Burm. Zeyl. pag. 207. tab. 94. f. 2. Ros solis folio rotundo. Bauh. Pin. p. 357. n. 1.

† Sp. 2. DROSERA UMBELLATA.  $\beta$  Ku tsim tsao.  $\alpha$  Koúc tinh thảo.

Differ. spec. Dr. *scapis* radicatis : *foliis* ovatis : *strobis* umbellatis.

Hab ; & notæ. Caulis nullus. *Folia* ovalia, petiolis longis circunstrata. *Scapi* varii, nudi, 5-pollicares, terminati umbellulæ sub-5 floræ : *corollis*, 5-petalis. Florem recentem, & pericarpium non vidi ; ideoque de genere incertus maneo, quamvis habitus ad Drosferam pertinere videatur.

Habitat in Chinâ.

### GENUS CVII. ARALIA.

Char. Gener. *Involucrum* umbellulæ. *Cal.* 5-dentatus, superus. *Cor.* 5-petala. *Bacca* 5-sperma. Lin. sy. pl. G. 417.

Sp. 1.