

TRIGYNIA.

- † 27. BEMBIX. *Cor. 5 - petala. Cal. 3 - partitus, inferus.
Bacca ovata: 3 - locularis?*
- † 28. AUBLETIA. *Cor. 0. Cal. 5 - partitus, inferus. Bacca lentiformis, 3 - locularis, 1 - sperma.*

TETRAGYNIA.

- † 29. THYSANUS. *Cor. 5 - petala, infera. Drupæ 4 gibbosæ:
alæ polyfidæ.*

PENTAGYNIA.

30. CERASTIUM. *Caps. 1 - locularis. Petala 2 - fida. Cal. 5 - phyllus.*
31. OXALIS. *Caps. 1 - locularis, angulata. Cor. basi subcohærens.*
- † 32. HEDONA. *Caps. 1 - locularis angulata: seminibus reniformibus. Cal. 1 - phyllus, ventricosus.*
33. COTYLEDON. *Capsulæ 5 ad nectaria. Cor. 1 - petala.*
34. SEDUM. *Capsulæ 5 ad nectaria. Cor. 5 - petala.*
35. AVERRHOA. *Pomum 5 - loculare. Cal. 5 - phyllus.*

MONOGYNIA.

GENUS I. ANAGYRIS.

Char. Gener. *Vexillum*, alèque carinâ breviores in corollâ papilonacea. *Legumen*. Lin. sy. pl. G. 552.

Sp. 1. ANAGYRIS FÆTIDA. ♀ Pā pāi. Lin. sp. I.

Differ. spec. An. *foliis pinnatis*, *foliolis lanceolato-ovatis*: *racemis laxis*, *terminalibus*: *leguminibus teretibus*.

Hab., & notæ. *Frutex arboreus*, 8-pedalis: *Vigno* duro, fœtido: *ramis* demissis. *Folia* impari-pinnata, multijuga: *foliolis* lanceolato-ovatis, integerrimis, glabris, similiter olenibus. *Flos* albus paniculis terminalibus. *Cal.* cyathiformis, 5-fidus, laciinis rotundatis, brevis. *Corollæ vexillum* alis æquale: carina longior: petala omnia unguiculata. *Stamina* 10, distincta, ascendentia. *Legumen* sub-teres, polyspermum.

Habitat inculta prope Cantonem Sinarum.

Bauh. Pin. pag. 391. n. 1. Milléri, & Royeni Synonima a Linnæo citata, cum flores habeant laterales, a nostrâ discrepant. An diversa species judicanda?

† Sp. 2. ANAGYRIS INODORA. ♂ Cay Hay.

Differ. spec. An. *foliis pinnatis*: *florum calycibus inflatis*, coloratis. *Leguminibus* compressis, rectis: *racemis* terminalibus, oblongis.

Hab., & notæ. *Frutex erectus*, arbori mediocri æqualis: *ramis* demissis, saepe scandentibus. *Folia* impari-pinnata: *foliolis* oblongis, acuminatis, glabris, inodoris. *Flos* albus, racemis oblongis, terminalibus. *Calyx* 5-dentatus, inflato-flaccidus, coloratus, brevis. *Corollæ* carina longior vexillo, & alis. *Filamenta* 10, distincta. *Legumen* rectum, compressum, polyspermum.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

GENUS II. POINCIANA.

Char. Gener. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5: summo maiore. *Stam.* longa, omnia fecunda. *Legumen*. Lin. sy. pl. G. 558.

Sp. 1. POINCIANA BIJUGA. ♀ . . .

Differ. spec. Poinc. *aculeis* solitariis: *foliolis* emarginatis. Lin. sp. I.

Hab., & notæ. *Caulis fruticosus*, 6-pedalis, suberectus: *ramis* paucis, diffusis: *aculeis* solitariis, aliquando binis, ternisve. *Folia* abru-

abruptè, & inordinatè pinnata, multijuga : *foliolis* ovatis, integrerrimis, glabris, sæpe emarginatis. *Flos* colore aureo, rubroque variatus, *racemis* simplicibus, terminalibus : *calyce* 5 - phyllo, inæquali : *corollâ* 5 - petalâ, summo maiore : *staminibus* 10, longis : *legumine* sublignoso, acuminato, compresso, polyspermo : *seminibus* offeis, subrotundis.

Habitat agrestis in orâ Africæ Orientali.

Crista pavonis. Rumph. l. 6. c. 24. tab. 20.

Sp. 2. POINCIANA PULCHERRIMA. α Hoa phung. & . . .

Differ. spec. Poinc. aculeis geminis. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Frutex* arboreus, 10 pedes altus : *ramis* longis, diffusis, debilibus : *aculeis* brevibus, plerumque geminis. *Folia* 2 - pinnata, multijuga, ovato-oblonga, obtusa, glabra. *Flos* aureus, coccineo maculatus, pedunculis longis, *racemis* simplicibus, terminalibus. *Calyx* luteus, patens, 5 - phyllus : *foliolis* 4 ovato-oblongis, planis, æqualibus, quinto longiore, incurvo, inflexo. *Corolla* petala 5, patentia, unguiculata, turbinata, margine crispato-dentata : summo maiore. *Stamina* longissima, inæqualia, receptaculo narcto insidentia : *antheris* ovatis nutantibus. *Stylus* longior staminibus : *stigmate* crassuscule. *Legumen* compressum, sub-rhombeum, rostratum, lignosum : *seminibus* 6 circiter, compressis, subrotundis, offeis.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ, multisque Indiæ locis.

Frutex pavoninus, sive Crista pavonis. Breyen. Cent. 61. t. 22. Crista pavonis flore elegantissimo, variegato. Burm. Zeyl. pag. 79. Poinciana flore pulcherrimo. Tourn. Inst. pag. 619. tab. 391.

Observ. Non videtur hæc a præcedenti specie satis distincta ; cum in utrâque similis flos, & folia multijuga : quod autem hæc sint, vel non emarginata, aculeique solitarii, vel gemini, non satis constanter procedit, prout etiam apud Rumphium videri potest.

Sp. 3. POINCIANA ELATA. α Cây Lục.

Differ. spec. Poinc. *Caule* inermi. Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, inermis, *ramis* patentibus. *Folia* impari-bipinnata : *folialis* oppositis, ovato-oblongis, multijugis, glabris. *Flos* dilutè ruber, *racemis* subdivisis, terminalibus. *Cal.* 5 - fidus, patens. *Corolla* petala 5, unguiculata, conniventia, supremum maius, reliqua quatuor subæqualia. *Stamina* 10, subulata, longa, ascendentia, distincta, inæqualia : *antheris* omnibus fertilibus, nutantibus. *Stylus* subæqualis staminibus : *stigmate* 2 - fido. *Legumen* oblongum, acuminatum, compressum : *seminibus* subrotundis.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Forsk. Arab. pag. 86. Poinciana foliis duplicato-pinnatis, foliolis oppositis, oblongis, caule inermi. Hort. Cliff. pag. 158.

GENUS III. CÆSALPINIA.

Char. Gener. *Cal.* 5 - fidus : laciniâ infimâ maiore. *Petala* 5 : infimo pulchriore. *Legumen*. Lin. sy. pl. G. 559.

Sp. 1. CÆSALPINIA SAPPAN. α Cây Vang : Tô mòc & Sū fám mö.
Differ. spec. Cæf. *Caule* aculeato : *foliolis* oblongis, inæquilateralibus, emarginatis. Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. *Arbor* procera, mediocriter crassa : *aculeis* brevibus, sparsis, plurimis : ligni medullâ rubrâ, gravi, durissimâ : *ramis* longis, ascendentibus. *Folia* impari-bipinnata, 12-juga : *foliolis* minusculis, oblongo-ovatis, emarginatis, glabris, sessilibus, basi obliquè truncatis. *Flos* flavus, suavè olens : *racemis* laxis, terminalibus. *Cal.* 5 - partitus, laciniâ inferiori maiori. *Corolla* petala 5, inæqualia, patentia, concava, subrotunda, unguiculata : infimo lineis rubris radiato : *stamina* 10, filiformia, corollâ longiora. *Legumen* rhombeum, oblongo-turbinatum, compressum, lignosum, fuscum, glabrum : *rostro* subulato, longo, recurvo. *Semina* 3, turbinato-oblonga, cornea.

Habitat in altis montibus Cochinchinæ : indeque a mercatoribus Sinenibus abundè exportatur.

Lignum Sappan. Rhumpb. Amb. l. 6. cap. 25. tab. 21. Tsiam pangam. Rheed. Málab. part. 6. p. 3. t. 2. Acacia maior, tinctoria, Zeylanica. Burm. Zeyl. pag. 3.

Uſus ligni : ad tingendum colore rubro, aut purpureo, pulchro quidem, sed inconstante.

Virtus Medica. Attenuans, Resolvens, Emmenagoga. Decoctum ligni probatur efficax ad dissolvendum sanguinem coagulatum ex contusionibus, vel causâ internâ. Item ad promovenda lochia, & menes, & leniendum dolorem inde ortum : in quem finem Medicis indigenis frequenter usuvenit.

GENUS IV. TOLUIFERA.

Char. Gener. *Cal.* 5 - dentatus, campanulatus. *Petala* 5 : infimo maximo, obcordato. *Stylus* nullus. Lin. sy. pl. G. 566.

\ddagger Sp. 1. TOLUIFERA COCHINCHINENSIS. α Cây Cam rau.
Differ. spec. Tol. *foliis* ovatis, integerrimis : *pedunculis* polyfloris, lateralibus, & terminalibus.

Hab. ;

Hab., & notæ. *Arbuscula* 5-pedalis : *caule* erecto, ramosissimo, inermi. *Folia* ovata, obtusa, acuta aliqua, integerrima, obscure viridia, nitida, alterna, subpetiolata, 3 pollices longa, citrum orentia. *Flos* albus, pedunculis polyfloris, axillaribus, & terminibus. *Calyx* 5-dentatus, campanulatus, brevis. *Corolla* petala 5, oblonga, conniventia, subæqualia, infimo maiore, nec obcordato. *Bacca* rotunda, albo-rubra, glabra, succosa, parva, 1-sperma, sub-diaphana, pulpâ resinoso-tenaci, sapore, & odore gratis. *Semina* rotunda: non raro inveniuntur 2 unico loculo, & tunc quidem hemisphærica. *Stamina* 10, brevia. *Stigma* lenticulare, sessile, persistens. In totâ plantâ inventitur vis aromatica, suavis, dulcis. Estne verum Balsamum Tolutanum, seu Carthaginæ? Videatur Pomet. Dict. des Drog. tom. 2. l. 1. pag. 59. f. 25: & si qui alii hujus plantæ characteres clarius expressere.

Habitat inculta in locis planis Cochinchinæ.

Virtus. Calefaciens, Resolvens, Stomachica. Utuntur indigenæ radice, & baccis, non balsamo, quod non solent extrahere.

GENUS V. CASSIA.

Char. Gener. *Cal.* 5-phyllo. *Petala* 5. *Antheræ* supernæ 3 steriles: infimæ 3 rostratæ. *Legumen*. Lin. sy. pl. G. 557.

Sp. 1. CASSIA TORA. α Dâu muồng.

Differ. spec. Cas. *foliis* trijugis, obovatis: exterioribus maioribus: glandulâ subulatâ inter inferiora. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus 2-pedalis, erectus, ramosissimus, *ramis* diffusis. *Folia* abruptè pinnata, 3-juga: *foliolis* obovatis, sessilibus, utrinque lanuginosis, exterioribus maioribus. *Flos* aureus, axillaris, binatus: *calyce* 5-phyllo, inæquali, patente: *corolla* 5-petalâ, unguiculatâ, expansâ, inæquali, summo emarginato. *Filamenta* 10, inæqualia: *antheris* apice perforatis, tribus sterilibus, tribus rostratis. *Stigma* sessile, emarginatum. *Legumen* sub-tetragonum, sub-rectum, longum: *seminibus* sub-teretibus, oblique truncatis.

Habitat inculta ubique in Cochinchinâ.

Thumb. Jap. pag. 179. Senna Orientalis hexaphylla, Tala Zeylonensis. Herm. Lugdb. pag. 557.

Sp. 2. CASSIA OBTUSIFOLIA. α Dâu ma. β Tsào kit lâm.

Differ. spec. Cas. *foliis* trijugis, ovatis, obtusifolis. Lin. sp. 8.

Hab., & notæ: *Caulis* herbaceus, 3-pedalis, multiplex, semipostratus, fulcatus, durus, foetidus, ramosus. *Folia* abruptè pinnata, tri-

trijuga : foliolis ovalibus , acumine brevi. *Flos* luteus , axillaris , pendunculis paucifloris. *Legumen* rectum , obtusum , teres , longum : *seminibus* multis orbiculatis , longitudini leguminis verticalibus. *Stamina* plerumque numerantur 9 , inæqualia.

Habitat prope vias in Cochinchinâ , & Chinâ .

Burm. Ind. pag. 95. Gallinaria rotundifolia. Rumph. Amb. I. 8. c. 68. tab. 97. f. 2.

Sp. 3. CASSIA FISTULA. α Tlái Xiem.

Differ. spec. Cas. foliis 5-jugis , ovatis , acuminatis , glabris : petiolis eglandulatis. Lin. sp. 12.

Hab. , & notæ. Arbor supra mediocrem : ramis patentissimis. Folia abruptè pinnata , 4 - 6 - juga : foliolis ovatis , acuminatis , glabris , maiusculis , petiolatis , inordinate pinnatis. *Flos* nitidè flavus : racenis longis , reclinatis , lateralibus , pedunculis propriis longis , pendulis. Cal. 5 - phyllus , sub-æqualis. Cor. petala 5 , inæqualia : staminibus 10 , quorum 3 multo longiora. *Fructus* legumen 1 - pedale , teres , digitum crassum , fuscum , rectum , obtusum : intus cellulis transversis , pulpâ dulci , nigricante plenis.

Habitat in Cochinchinâ ad Austrum , prope Cambodiam.

Rumph. Amb. I. 2. c. 30. tab. 21. Cassia solutiva. Garc. Arom. I. 1. cap. 29.

Virtus. Purgans , Demulcens. In Cochinchinâ , & in plerisque Asiæ locis vix ullius est usus ; cum habeant alia medicamenta flegmoga- ga magis efficacia , & minus nauseosa.

Sp. 4. CASSIA SOPHERA. β Xý tñ tñu: Kiue' mim tsù. α Thảo kүyet minh.

Differ. spec. Cas. foliis decem-jugis , lanceolatis : glandulâ baseos oblongâ. Lin. sp. 23.

Hab. , & notæ. Caulis suffruticosus , 3 - pedalis , erectus , teres , ramosus. Folia abruptè pinnata , sub-decem-juga : pinnis lanceolatis , glabris , sub-fessilibus. *Flos* flavus , racemo erecto terminali. *Stamina* , & *petala* inæqualia : ista sub-unguiculata. *Legumen* rectum , tenue , longum : *seminibus* sub-teretibus.

Habitat in Sinarum locis Australibus. Vidi etiam in Africâ foliis , & floribus similem , sed caule fusco-rubro , subretrotragono differentem.

Gallinaria acutifolia. Rhumph. Amb. I. 8. c. 68. tab. 97. f. 1. Senna vi- gintifolia , siliquis teretibus. Burm. Zeyl. p. 213. t. 98.

Sp. 5. CASSIA PROCUMBENS. α Cây me dat. β . . .

Differ. spec. Cas. foliis multijugis , eglandulatis : caule procumbente. Lin. sp. 31.

Hab ,

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, sesquipedalis, multiplex, diffusus: undique in terram pronus, flexuosus. *Folia* impari-pinnata, pluri-mi-juga: *foliolis* ovato-oblongis, pilosis, imbricatis, minimis. *Flos* luteus, axillaris, solitarius. *Legumen* oblongum, rectum, compres-sum.

Habitat in Cochinchinâ per agros, & colles dispersa. Observata a me fuit in Chinâ pariter, & in Africâ, ubique constans, & sui similis. Thunb. Japon. pag. 179. Burm. Ind. pag. 98.

G E N U S VI. GUILANDINA.

Char. Gener. *Cal.* 1 - phyllus, hippocrateriformis. *Petala* calycis col-lo inserta, sub-aequalia. *Legumen*. Lin. sy. pl. G. 560.

Sp. 1. GUILANDINA BONDUCELLA. β Nām siē lac.

Differ. spec. *Guil.* aculeata, pinnis oblongo-ovatis: *foliolis* aculeis geminis. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, teres, rectus, crus crassus: *ramis* longè scandentibus, vel procumbentibus: aculeis multis reflexis, sparsis. *Folia* 2 - pinnata, 10 - juga, sine impari: *foliolis* oblongo-ovatis, acuminatis, glabris, integerrimis, aculeis binis ad basim. *Flos* luteus, herinaphroditus, monogynus, *racemo* oblongo, terminali. *Legumen* 3 - pollicare, latum, compressum, echinatum: *seminibus* 6 - 7, oblongo-ovatis, cinereis, nitidis, durissimis. *Sta-mina* 10, libera.

Habitat in sylvis, prope Cantonem Sinarum.

Globuli maiores. Rhumph. Amb. l. 7. c. 50. tab. 49. f. 1.

Acacia, qui lobus echinatus Clusii, oculus Cati Lusitanis. Burm. Zeyl. pag. 4.

Virtus: foliorum. Deobstruens, Emmenagoga: sapore amaro. Radix adstringens, valet contra Dysenteriam. Nuclei sunt Emetici: horum oleum externè valet contra Convulsiones, & Paralysim.

† Sp. 2. GUILANDINA GEMINA. ✕ Cay Maōc med.

Differ. spec. *Guil.* aculeata, *foliis* pinnatis: *calyce* 5 - phyllo: *fru-etu* gemino.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, magnus, suberectus: *ramis* mul-tis scandentibus: *aculeis* multis, recurvis, sparsis. *Folia* simpliciter pinnata, sine impari: *pinnis* ovatis, obtusis, integerrimis, glabris, aculeo solitario ad basim. *Flos* flavus, racemis compo-sitis, laxis, terminalibus. *Calyx* inferus, 5 - phyllus: *foliolis* oblon-gis, obtusis, lanatis, campanulato-patentibus, deciduis, sub-aqua-libus. *Corolla* petala 5, *calyce* vix longiora, ejusdem formæ cum

illo, illique inserta. *Nectarium* glandulis 4, ovatis. *Filamenta* 10, subulata, pilosa, æqualia, corolla breviora, calyci insidentia: *antheris* saggittatis, stantibus. *Germina* 2, longiuscula. *Styli* totidem, crassi, staminibus longiores. *Stigmata* obtusa. *Pericarpium* Legumina 2, sub-ovata, compressa, echinata, monolocularia, polysperma: seminibus 2-3, subrotundis, nitidis, cinereis, durissimis: nucleo amygdalaceo, oleoso, subrotundo.

Habitat in sylvis planis Cochinchinæ, Guilandinæ Bonduc similior, quam Bonducellæ.

Virtus eadem, quæ præcedentis.

† GENUS VII. BARYXYLUM.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium inferum, 5-phylum: foliolis ovato-oblongis, reflexis, æqualibus, deciduis.

Cor. Petala 5, subrotunda, plicato-rugosa, patentia, subæqualia, calyce sub-longiora: unguibus brevibus, carnosis, pilosis, receptaculo insertis.

Stam. Filamentea 10, subulata, inæqualia, corollâ breviora, receptaculo insidentia. Antheræ oblongæ, 4-loculares, nutantes.

Pist. Germen oblongum, compressum. Stylus filiformis, staminibus longior. Stigma horizontaliter oblongum, concavum.

Peric. Legumen crassum, obtusum, subteres, subcurvum, glabrum, polyspermum.

Sem. Sub-rotundo-angulata, 8 circiter.

Nom. (Βαρύς gravis: ξύλον lignum) Hujus arboris lignum gravissimum, durissimum a multis ferreum dicitur.

Char. Gener. *Cal.* 5-phillus, reflexus. *Cor.* 5-petala, subæqualis; plicato-crispa. *Legumen* polyspermum.

Sp. 1. BARYXYLUM RUFUM. a Cây Lim vàng. b Tiế li mü.

Differ. spec. Bar. *foliis* pinnatis, pauci-jugis: *racemis* terminalibus. Hab. *Arbor magna*: *ramis* ascendentibus inermibus: *ligno* gravi, durissimo, fusco-rufo. *Folia* pinnata pauci-juga: *foliolis* parvis, oblongis, obtusis, integerrimis, glabris. *Flos* luteus, racemis laxis, terminalibus.

Habitat in altis montibus Cochinchinæ ad Borçam sitis.

Ufus. Hoc lignum rectum, & firmum optimum est ad pontium publicas, vel columnas ingentia pondera laturas.

Metros

Metrosideros Amboinensis? Rumph. Amb. I. 4. c. 7. tab. 10.

+ GENUS VIII. ALOEXYLU M.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 4 - phyllum : foliolis acutis , pilosis , deciduis , īrē
fimo falcato , incurvo , sub-duplo longiore.

Cor. Petala 5 , inæqualia , calyce longiora.

Stam. Filamenta 10. Antheræ?

Pist. Germen longiusculum , curvum , compressum. Stylus filiformis.
Stigma?

Peric. Legumen lignosum , lāeve , falcatum , ī - spermum.

Sem. 1 , oblongum , curvum , arillatum.

Nom. Αλοεξύλον (Aloexylon) idem est ac lignum Aloe , quod ab
aliis Agallochum nominatur.

Char. Gener. Cal. foliola 4 , acuta : infimum duplo longius. Cor. Pe-
tala 5 , inæqualia. Legumen curvum : semine 1 , arillato.

+ Sp. I. ALOEXYLU M AGALLOCHUM. a Cây Dέo báu. s Chin hiám:
Nǎu hiám.

Differ. spec. Aloe. foliis lanceolatis , alternis : pedunculis polyfloris ;
terminalibus.

Hab. Arbor magna : trunco , & ramis erectis , altissimis : cortice can-
nabino , fuscō , glabro , nec crasso. Folia lanceolata , 8 polypes
longa , integerrima , plana , glabra , subcoriacea , alterna , petiolata.
Flos terminalis , pedunculis polyfloris.

Habitat in altissimis montibus Cochinchinæ prope magnum flumen
Lavum , quod inter hoc regnum , & Laosios interfluit.

Observ. Quamvis hæc arbor a me sedulò quæsita fuerit , semel tan-
tum florentem rānum obtinui , recentem quidem , sed ob distantiam
itineris floribus contusis , & laceris : ita ut nec petalorum formam ,
nec antheras , & stigma satis distinctè observare datum fuerit. Li-
gnum arboris est album , & inodorum. Aroma illud fit ex morbo ,
quo , obstructis nutritionis , & exhalationis viis , oleosæ particulæ
stagnant , & in rezinam crassescunt in interiori arboris trunco , &
ramis : quo fit , ut color , odor , & aliæ ligni qualitates mutentur ,
ac tandem , incremente malo , arbor pereat : ex quâ truncatâ , &
fissâ pretiosa illa frusta aromatica extrahuntur. Nulla pars arboris
lactescens , aut venenata est. Omnes veri Aloes ligni species ex hâc
arbore procedunt ; etiam pretiosissima , quæ dici solet Calambac ,

quæque in solis montibus Champávæ, ad Cochinchinam pertinen-
bus, circa decimum tertium gradum latitudinis Borealis sitis inveni-
tur. Inferiores species (seu potius varietates) non ita rarae sunt,
& ex diversis locis habentur, aliquando in segmentis triginta li-
bras, aut amplius ponderantibus. Dantur alia ligna odorata, quæ
ab imperitis vocantur Agallochum, & Aloe lignum: sunt autem
valde diversa, & in diversis plantis gignuntur.

Agallochum. Rumph. Amb. l. 2. c. 11. t. 10. Garc. Arom. l. 1. c. 16.
Berg. Mat. Med. pag. 961. Inter multos Authores, qui de Agallo-
cho scripserunt, tres isti plura veritati consona dixerunt, non om-
nia; siquidem ex relatu aliorum, quorum fortasse nullus verum
Aleoxyzum flore, & fructu gravidum viderat. Figura Rumphiana
circa folia non longè aberrat: sed fructus prorsus discrepantes, &
flores nullos repræsentat.

Usus. Ligni hujus suffimenta inter omnia maximè aestimantur apud
nationes Orientales. Ex arboris cortice fit vulgaris charta, in quâ
Cochinchinenses scribunt, sicut in Japoniâ fit ex cortice Mori.

Virtus Medica. Excitans, Corroborans, Cephalica, Cardiaca. Suffitius
valet contra Vertiginem, & Paralysim. Pulvis cohibet vomitum, &
fluxus ventris, præcipue Lientericos, quod non propriè astringen-
do, sed corroborando agit.

GENUS IX. CYNOMETRA.

Char. Gener. *Cal. 4* - phyllus. *Antheræ* apice 2 - fidæ. *Legum.* carno-
sum, lunatum, 1 - spermum. Lin. sy. pl. G. 562.

Sp. 1. **CYNOMETRA PINNATA.** a Cây Rang.

Différ. spec. *Cyn. foliis* impari-pinnatis: *racemis* terminalibus.

Hab., & notæ. *Arbor magna, ramis* ascendentibus. *Folia* impari-pin-
nata: *foliolis* lanceolatis, integerrimis, glabris, oppositis. *Flos*
racemis terminalibus: *calyce* 5 - partito, sub-æquali: *corolla* 5 - pe-
talâ: *staminibus* 10. *Legumen* lunatum, luteum, carnosissimum,
1 - spermum, acuminatum, tuberculis nullis: *semine* oblongo-ova-
to, rubro.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

GENUS X. MELIA.

Char. Gener. *Cal. 5* - dentatus. *Petala* 5. *Nectarium* cylindraceum,
ore *Antheras* gerens, *Drupa* nucleo 5 - loculari. Lin. sy. pl. G.
576

Sp. 1.

Sp. 1. MELIA AZEDARACH. α Cây Sâu dâu : Xuyen luyen. β Xún lién.
Differ. spec. Mel. foliis bipinnatis. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. Arbor mediocris : ramis patentibus. Folia impari-
bipinnata, multijuga : foliolis parvis, ovatis, acuminatis, crena-
tis, glabris. Flos parvus, albo, rubro, & cœruleo versicolor : pa-
niculis magnis, sparsis, sub-terminalibus. Calyx 5-dentatus. Pe-
tala 5, oblonga, patentia : nectario cylindrico, petalis longiore,
ore 10-dentato. Stamina 10, minima, apici nectarii inserta. Dru-
pa subrotunda, supera, flava, parva : nuculâ obtuse 5-gonâ,
5-loculari. Tota planta amarissima.

Habitat inculta, cultaque in Cochinchinâ.

Thunb. Jap. pag. 180. Azedaracha sempervirens, & florens. Tourn.
Inst. pag. 616 tab. 387. Azedarach. Burm. Zeyl. pag. 40.

Virtus. Incidens, Deobstruens, Anthelminthica. Internè cautè utenda;
quia nimiâ dosi vertiginem, & convulsiones affert. Sinenses Medi-
ci druparum carne corticosâ imprimis utuntur ad necando vermes,
cujus suspectam vim ut mitiorem reddant, in vino diu coctam, &
exsiccatam, iterum in aquâ coquunt, decoctumque infirmis minif-
trant absque noxæ periculo. Externè tam folia, quam radix valent
contra scabiem, pruritum ferinum, & lepram. Eadem folia minu-
tim incisa, & super antiqua ulcera crebro imposita, irritis omni-
bus aliis remediis, sœpe sanârunt.

GENUS XI. RUTA.

Char. Gener. Cal. 5-partitus. Petala concava. Receptaculum punctis
melliferis decem cinctum. Caps. lobata. Lin. sy. pl. G. 565.

Sp. 1. RUTA CHALEPENSIS. α Kuu li huong. β São tsão.

Differ. spec. Rut. foliis supra decompositis : petalis ciliatis. Lin. sp. 2.
Hab., & notæ. Caulis suffruticosus, 3-pedalis, erectus, teres, al-
bicans, ramosissimus. Folia supra decomposita, oblongo-ovata, mi-
nuscula, cinerea, glabra, gravè olientia. Flos luteus, paniculâ ter-
minali : calyce 4-partito, laciniis acutis, patentibus. Corolla pe-
tala 4, ovata, concava, ciliata. Nectarium poris 10. Stamina 8.
Capsula 4-loba, scabra, 4-locularis, polysperma.

Habitat culta in hortis Cochinchinæ, & Chinæ.

Ruta Chaleensis, angusti-folia, petalis villis scatentibus. Moris. hist.
2. pag. 508. tab. 35. f. 8. Tourn. Inst. pag. 257. tab. 133.

Virtus. Resolvens, Pellens, Sudorifica, Alexiteria, Emmenagogia.
Prodest in Hysteria, Epilepsia, Contagio, Suppressione mensium.

GENUS XII. TRIBULUS.

Char. Gener. *Cal.* 5 - partitus. *Petala* 5, patentia. *Stylus* 0. *Caps.* 5, gibbae, spinosae, polyspermæ. Lin. sy. pl. G. 580.

Sp. 1. TRIBULUS TERRESTRIS. & Gai ma Vuong: Bach tat la. A Gié li tsù.

Differ. spec. Trib. *foliolis* sex-jugatis, sub-equalibus: *seminibus* quadri-cornibus. Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 2 - pedalis, teres, procumbens, multiplex, undequaque diffusus, rubescens. *Folia* pinnata, 5 - 6 - juga: *foliolis* ovatis, integerriinis, pilosis, cinereis, parvis, subequalibus. *Flos* flavus, axillaris, solitarius, pedunculo longo. *Calyx* 5 - partitus. *Corolla* 5 - petala, expansa. *Stamina* 10. *Stigma* sessile, 5 - partitum, laciniis oblongis, deorsum appressis. *Capsulae* 5, ossæ, 4 - cornes, polyspermæ.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ ad maris litora. Vidi etiam in orâ Coromandeliâ, prope Pondechery.

Tribulus Terrestris Indiae Orientalis, foliis viciæ sub-rotundis, & villosis. Tourn. Inst. pag. 266. t. 141. **Tribulus Terrestris**. Matth. in Diosc. l. 4. c. 14. fig. ibi. **Tribulus Terrestris**, Zeylanicus. Burm. Zeyl. pag. 226. t. 106. f. 1.

Observ. Quamvis in istâ plantâ foliola sint lanuginosa, nec semper sex-juga, judicavi tamen associandam esse potius Terrestri, quam Lanuginoso Tribulo, quia fructum ejus semper quadricornem inveni.

Virtus: seminum. Astringens. Prodest in Hæmorrhagiâ narium, Dysenteriâ, & aliis sanguinis profluviis. Gargarisma valet in flacciditate gengivarum, ulceribus, & inflammationibus oris, & gutturis.

GENUS XIII. CHALCAS.

Char. Gener. *Cal.* 5 - partitus. *Cor.* campanulata, petalis unguiculatis. *Stigma* capitato-verrucosum. Lin. sy. pl. G. 569.

Sp. 1. CHALCAS PANICULATA. & Cây Nguyệt quí. A Caō li yòng. Lin. sp. 1.

Differ. spec. Ch. *foliis* ovatis, acutis: *baccis* bispermis.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, *trunco* erecto, diametro 10 - pollicari: *cortice* albicante, tenui: *ramis* multis, patentibus. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, undulata, glabra, nitida, alternatim pinnata, sub-septem-juga cum impari. *Flos* albus, odorifer, panicu-

niculis terminalibus, parvis, plurimis. *Cal.* inferus, acutè 5-fidus; brevis, erectus, persistens. *Petala* 5, sub-campanulata, ovato-oblonga, unguiculata, patentissima, reflexa. *Filamenta* 10, subulata, planiuscula, quorum 5 alterna breviora: *antheris* sub-rotundis. *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, æqualis staminibus longioribus. *Stigma* obtusum, emarginatum. *Bacca* oblongo-conica, succosa, rubra, 1-loocularis, 2-sperma. *Semina* sub-rotunda, lanuginosa.

Habitat agrestis in Cochinchinâ, & Chinâ: colitur etiam frequenter ob florum fragrantiam, gratam quidem, & intensam, sed non gratissimam. Arbor foliolis parvis, & denfissimis aspectum, & umbram præbet amœnam. In Cochinchinâ semper est arbor, nunquam frutex, sicut in Amboinâ, & Javâ.

Burm. Ind. pag. 104. Camunium. Rumph. Amb. I. 7. c. 15. t. 17.

† Sp. 2. CHALCAS JAPONENSIS. *a* Nguyet qui taù.

Differ. spec. Ch. *foliis* ovatis, obtusis: *baccis* monospermis.

Hab., & notæ. Arbor parva, 8-pedalis, *ramis* patentibus. *Folia* oblongo-ovalia, obtusa, integerrima, plana, impari-pinnata, 6-8-juga. *Flos* albus, odoratus, pedunculis polyfloris, terminalibus: *corolla* 5-petala, campanulata: *staminibus* 10, alternis longioribus. *Bacca* rubra, ovata, apice acuta, 1-sperma.

Colitur in Cochinchinâ, &c.

Camunium Japonicum. Rumph. Amb. I. 7. pag. 29. t. 18. f. 2.

GENUS XIV. LIMONIA.

Char. Gener. *Cal.* 5-partitus. *Petala* 5. *Bacca* 3-loocularis. *Semina* solitaria. Lin. sy. pl. G. 582.

Sp. 1. LIMONIA MONOPHYLLA. *a* Cây Cam dâng. *b* São peng. *c*

Differ. spec. Lim. *foliis* simplicibus: *spinis* solitariis. Lin. sp. I.

Hab., & notæ. *Arbuscula* 4-pedalis: *ramis* tortuosis, diffusis: *aculeis* axillaribus, longis, rectis, solitariis. *Folia* ovata, emarginata, sub-crenata, glabra, sub-seffilia, alterna, odora. *Flos* albus, seffilis, congestus. *axillaris*. *Bacca* nigra, dulcis, aquosa, edulis, parva. *Calyx* inferus, 5-fidus, erectus, persistens. *Corolla* petala 5, ovato-oblonga, carnosa, concava, æqualia, sub-patentia, calyce longiora. *Filamenta* 10, brevia, in medio dilatata: horum 5 alterna breviora. *Antheræ* omnes sub-rotundæ. *Germen* sub-rotundum. *Stylus* crassus, brevior staminibus. *Stigma* ovatum, emarginatum. *Bacca* sub-rotunda, 2-loocularis, 1-sperma: *seminibus* hinc planis, inde convexo-ovatis.

Habitat

Habitat in dumetis Cochinchinæ, & Chinæ. A Sinensibus solet etiam
vocari *Xæc may lac*, lingua Cantonensi.

Limones pumili, Zeylanici, sylvestres. Burm. Zeyl. pag. 143. tab. 65.
fig. 1.

Virtus: radicis. Calefaciens, Resolvens, Excitans. Vinum ex ejus in-
fusione prodest in convulsionibus dolorosis, præcipue crurum.

† GENUS XV. QUINARIA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 5 - phylum, breve, sub-erectum, inferum: foliolis
acutis.

Cor. Petala 5, lanceolata, æqualia, incurva, reflexa.

Stam. Filamenta 10, subulata, erecta: quorum 5 corollæ subæqua-
lia, quinque alia alterna breviora: omnia receptaculo insidentia.
Antheræ ovatae, compressæ.

Pist. Germen 5 - gonum, pilosum. Stylus filiformis, crassus, brevior
staminibus. Stigma crassiusculum.

Peric. Bacca sub-rotunda, 5 - locularis, 1 - sperma.

Sem. ovato-oblonga, compressa.

Nom. A numero quinario partium Calycis, Corollæ, Germinis, &
loculorum Baccæ.

Char. Gener. *Cal.* 5 - phyllus, inferus. *Cor.* petala 5, lanceolata, re-
flexa. *Bacca* 5 - locularis, 1 - sperma.

† Sp. 1. QUINARIA LANSIUM. *Van pi chū.*

Differ. spec. Quin. foliis ovato-lanceolatis, pinnatis: racemis vastis
terminalibus.

Hab. Arbor mediocris, ramis patentibus. Folia ovato-lanceolata, un-
dulata, sub-dentata, glabra, alternatim pinnata, multi-juga, cum
impari maiori. Flos albus, sub-terminalis, racemis compositis, ma-
gnis, laxis. Bacca sub-ovata, semipollicaris, edulis, pulpâ albâ,
aci-dulci: cortice flavo, tenui, glabro, lactescente.

Colitur Cantone Sinarum, ubi fructus prostant in foro venales.

Lansium sylvestre. Rumph. Amb. I. I. c. 46. tab. 55. Fructus Lance.
Bont. Jav. I. 6. c. 23. fig. ibi. pag. 109.

† GENUS XVI. AULACIA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 5 - dentatum, inferum, erectum, breve.

Cor. Petala 5, oblonga, erecta, crassa, exterius punctata, interius 4 - fulcata.

Stam. Filamenta 10, subulata, quorum 5 alterna longiora corollæ æqualia. Antheræ ovatæ, 2 - loculares, stantes.

Pist. Germen oblongum, pilosum. Stylus filiformis, crassus, brevior staminibus. Stigma convexum, integrum.

Peric. Bacca ovata, parva, 5 - locularis, 2 - sperma.

Sem. sub-ovata.

Nom. (Αὐλαξ fulcus) Aulacia dicitur a fulcis, quibus petala exarantur.

Char. Gener. Cal. 5 - dentatus, inferus. Cor. petala 5, fulcata, erecta. Bacca 5 - locularis, 2 - sperma.

† Sp. 1. AULACIA FALCATA. α Cây Cham tâu tháng.

Differ. spec. Aul. foliis lanceolato-falcatis, alternis : racemis terminalibus.

Hab. Arbor 8 - pedalis : ramis ascendentibus. Folia lanceolato-falcata, sub-crenata, glabra, alterna, petiolata. Flos albo-viridis, terminalis : racemis sub-divisis, laxis.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Virtus : foliorum. Emmenagogue. Bacca non edulis.

GENUS XVII. MELASTOMA.

Char. Gener. Cal. 5 - fidus, campanulatus. Petala 5, calyci inserta.

Bacca 5 - locularis, calyce obvoluta. Lin. sy. pl. G. 589.

† Sp. 1. MELASTOMA SEPTEMNERVIA. α Cây Mua.

Differ. spec. Mel. foliis septemnerviis, integerrimis, lanceolato-ovatis, hispidis.

Hab., & notæ. Caulis fruticosus, 6 - pedalis, erectus, teres, hispidus, ramis patentibus. Folia lanceolato-ovata integerrima, 7 - nervia, utrinque pilosa, scabra, opposita, petiolata. Flos magnus, rubro-purpureus pedunculis polyfloris, erectis, terminalibus. Cal. 5 - fidus. Corolla petala 5, rotundata, expansa. Stamina 10, fuscæ,

ca, refracta, caudâ longâ demissâ. *Bacca* calycina, ovata, hispida, exsucca, 5-locularis, polysperma: *seminibus* plurimis, ova-tis, minimis: pulpâ nullâ.

Habitat in Cochinchinâ, ubique obvia per colles, & agros minus cultos.

Observ. Fragarius Niger (Rumph. Amb. l. 6. c. 78. t. 72.) qui a Linnaeo Melastoma Malabathrica dicitur, vix a nostrâ differt præterquam nervorum numero. Est etiam nostræ valde affinis Melastoma Grandiflora Aubleti (Guian. pag. 414. tab. 160.) quæ septem-nervia est, discrepat vero foliorum basi cordatâ; ac staminibus inaequilibus.

Virtus. Astringens. Folia, Baccae, & Radix apud indigenas in usu sunt ad cohibendos fluxus ventris, & uteri.

† Sp. 2. MELASTOMA DODECANDRA. β Pè giě hòng. α Cây mua tháp.
Differ. spec. Mel. *foliis* 5-nerviis, integerrimis, glabris: floribus dodecandris.

Hab., & notæ. *Frutex* pusillus, 10 pollices altus, erectus, laevis. *Folia* ovata, integerrima, glabra, 5-nervia, opposita. *Flos* coloris rosei, pedunculis paucifloris, terminalibus. *Stamina* 12, quorum 6 refracta, caudata: 6 alia interiora erecta, mutica, omnia fertilia. *Bacca* sub-rotunda, laciinis calycis coronata, 5-locularis, polysperma.

Habitat inculta in Cochinchinâ, & Cantone Sinarum.

Observ. A Mel. Lævigata, & Discolore (Lin. sp. 9, & 10.) magis differt staminibus, quam foliis.

GENUS XVIII. QUISQUALIS.

Char. Gener. *Cal.* 5-fidus, filiformis. *Petala* 5. *Drupa* 5-angulatis. Lin. ïy. pl. G. 587.

Sp. 1. QUISQUALIS INDICA. α Cây Thùn: Sú cuồn tú. β Xí kiūn tú.
Differ. spec. Quisq. scandens: *foliis* ovatis, oppositis: *corymbis* terminalibus.

Hab. & notæ. *Frutex* magnus, inermis: *caule* crasso, sub-erecto: *ramis* scandentibus. *Folia* ovata, apice acuta, integerrima, glabra, opposita, petiolata. *Flos* albo-ruber: *corymbis* terminalibus, *bracteis* parvis, folii-formibus, floribus intermixtis. *Calycis* tubus filiformis, longissimus: *limbus* brevis, patulus, 5-dentatus. *Petala* 5, oblongo-ovata, plana, æqualia, patentia, margini calycis inserta. *Filamenta* 10, brevia, bino ordine intra tubum calycis insidentia: *antheris* oblongis, incumbentibus. *Germen* oblongum;

5-gonum. *Stylus* filiformis, sublongior staminibus. *Stigma* concavum, integrum. *Drupa* oblonga, utrinque attenuata, acutè 5-gona, pollicem longa: nuce oblongâ, crispâ, 1-loculari. Habitat prope sepes, & ripas fluminum in Cochinchinâ, & Cantone Sinarum.

Rumph. Amb. l. 7. c. 38. tab. 38. Burm. Ind. pag. 104. tab. 28. f. 2. & tab. 35. f. 2.

Observ. Hæc planta semper est ejusdem speciei, quamvis habitu aliquantulum differat secundum diversa loca, & tempora: quod diligenter observavit acuratissimus Rumphius loco supra citato.

Virtus. Astringens, Roborans, Anthelmintica, Nephritica. Nuclei præcipue commendantur, quotidiano usu probati contra Vermes, & Rachitem puerorum: unde illis vernaculum nomen Fructus Vermium.

† GENUS XIX. CUBOSPERMUM.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium superum, hippocrateriforme, 5-fidum: laciinis lanceolatis, perfistens.

Cor. Petala 6, ovata, obtusa, emarginata, patentia.

Stam. Filamenta 10, subulata, quorum 5 alterna breviora: omnia erecta, corollâ breviora.

Pist. Germen cylindraceum, inferum. *Stylus* filiformis, longior staminibus. *Stigma* sub-rotundum, 5-crenatum.

Peric. Capsula cylindrica, 5-valvis, 5-locularis, polysperma.

Seim. Multa, sub-cubica.

Nom. Cubospermum propter semina cubica.

Char. Gener. Cal. 5-fidus, superus. Cor. petala 6, emarginata Caps. 5-locularis, polysperma.

† Sp. 1. CUBOSPERMUM PALUSTRE. a Raujua.

Differ. spec. Cub. *Caule* repente: *foliis* oblongis: *pedunculis* solitariis.

Hab. *Herba* palustris: *caule* longo, tereti, crasso, repente. *Folia* ovato-oblonga, integerrima, glabra, alterna. *Flos* albus, basi luteus: *pedunculis* solitariis, longis, teretibus, 1-floris.

Habitat in locis aquosis Cochinchinæ.

† GENUS XX. ACOSTA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium sub-rotundum, 5-dentatum, coloratum, villosum.

Cor. Monopetala, calyce triplo longior: tubo urceolato, 5-gono, magno: limbo brevissimo, 5-fido, patente.

Stam. Filamenta 10, calyci aequalia, pilosa, crassa, receptaculo insidentia. Antheræ oblongæ, incumbentes: apicibus bifidis, subtilibus, longis

Pist. Germen sub-rotundum, calyce clausum. Stylus filiformis, corollæ aequalis. Stigma crassiusculum.

Peric. Bacca calycinæ, parva, globosa, coronata, 5-locularis, polysperma.

Sem. Plurima, sub-rotunda, minima.

Nom. Acostam vocavi in memoriam Doct. Christophori a Costâ, Indiæ Aromatum scriptoris.

Observ. Convenit cum Andromedâ numero partium: cum Ericâ antheris bifidis: baccâ calycinâ ab utrâque discrepat.

Char. Gener. *Cal.* superus, 5-dentatus. *Cor.* urceolata, 5-fida. *Bacca* 5-locularis, polysperma.

Sp. 1. ACOSTA SPICATA. a Cay Men.

Differ. spec. *Ac.* foliis ovato-lanceolatis, oppositis: *spicis* terminalibus.

Hab. *Arbuscula* 5-pedalis: *ramis* ascendentibus. *Folia* ovato-lanceolata, leviter, & aequaliter ferrata, crassa, plana, glabra, opposita. *Flos* albus spicis filiformibus, erectis, terminalibus.

Habitat in sylvis planis Cochinchinæ.

† GENUS XXI. ENKANTHUS.

Descriptio Naturalis.

Cal. Communis, 6-phyllo: foliolis sub-rotundis, concavis, acuminate, coloratis.

Cor. Communis, petala 8, oblonga, plana, patentia: continens 5 flosculos pedunculatos, pedunculis longis, reflexis.

Perianth. Proprium 5-phylum, corolatum, parvum, persistens: foliolis acutis.

Cor. Propria 1-petala, campanulata: tubo ampio: limbo brevi, 5-fido, laciniis rotundatis.

Stam. Filamenta 10, subulata, basi tumida, pilosa, fundo corollæ insistentia, hujus limbo breviora.

Pist. Germen 5-gonum, superum. Stylus crassus, æqualis staminibus. Stigma simplex, coloratum, nitidum.

Peric. Bacca ovato-oblonga, 5-gona, 5-locularis, polysperma.

Sem. Oblonga, parva.

Nom. (Εὐκοσ πρægnans : ἀνθός flos) Enkianthum vocavi plantam; cuius flores aliis floribus gravidi sunt.

Char. Gener. Cal. communis: *proprios* 5-phyllo, inferus. Corolla campanulata 5-fida. Fructus 5-locularis, polyspermus.

† Sp. 1. ENKIANTHUS QUINQUEFLORA. 3 Tsiau tsung hoa.

Differ. spec. Enk. *Calycibus* 5-floris: *caule*, arboreo.

Hab. Arbor mediocris: *cortice* lœvi: *ramis* patentibus. *Folia* oblonga, acuminata, integerrima, glabra, congesta. *Flos* solitarius, pulchrè ruber, fimbriâ albâ ad apicem terminatus, flosculos quinque intus continens.

Colitur Cantone Sinarum.

† Sp. 2. ENKIANTHUS BIFLORA. 3 San lièo hoa.

Differ. spec. Enk. *Calycibus* bifloris: *caule* fruticoso.

Hab., & notæ. *Frutex* lignosus, erectus, 3-pedalis: *ramis* expansis. *Folia* lanceolato-ovata, integerrima, pilosa, parva, congesta, petiolis brevibus. *Flos* coccineus, terminalis, congestus, sessilis.

Calyx communis 5-phyllo, coloratus: filiolis-ovatis, concavis, deciduis. *Cor. com.* o. *Flosculi* duo e communi calyce prodeentes.

Perianthium proprium parvum, 5-partitum: laciniis lanceolatis, pilosis, patentibus. *Corolla* 1-petala, campanulata, patens: *tubo* 5-sulco-plicato: *limbo* 5-partito: laciniis ovatis, magnis. *Filamenta* 10, filiformia, erecta, inæqualia, corollâ sub-breviora, receptaculo insidentia. *Antheræ* ovatae, incumbentes. *Germen* superum, ovatum, pilosissimum. *Stylus* filiformis, corollâ longior. *Stigma* crassiusculum, 5-fidum, hians. *Bacca*? (maturam non vidi) ovata, 5-locularis, polysperma: *seminibus* plurimis, sub-rotundis minimis.

Habitat Cantone Sinarum.

Observ. Plantæ hujus generis sunt mirabiles, præciguè primæ speciei, cuius flores calycibus, & corollis tam propriis, quam communibus simul gaudent; quod alibi me vidisse non recordor. Hujus rami floribus multis conspicui, necdum in folia expansi, solent a magnatibus Sinensis domi servari in multos dies in vasis procelaneis aquâ plenis, spectabiles visu, odore nullo. † GE-

† GENUS XXII. CYRTA.

Descriptio Naturalis.

- Cal. Perianthium cyathiforme, 5-dentatum, inferum, persistens.
 Cor. Monopetala, campanulata: tubo brevi, calyci æquali: limbo 5-partito, magno, patente: laciniis lanceolatis.
 Stam. Filamenta 10, brevia, basi dilatata, corollæ fundo inserta. Antheræ oblongæ, reflexo-curvæ, a tergo per totam longitudinem filamentis coalitæ.
 Pist. Germen subrotundum, acuminatum. Stylus subulatus, staminibus, & corollâ longior. Stigma simplex.
 Peric. Drupa oblonga, curva, utrinque attenuata, tomentosa, 1-sperma.
 Sem. Nucula oblonga, sulcata, apice attenuata.
 Nom. (*Kυρτος curvus*) a Drupâ curvâ.

Char. Gener. *Cal.* 5-dentatus, inferus. *Cor.* campanulata, 5-partita. *Drupa* curva, nuce sulcatâ.

† Sp. 1. CYRTA AGRESTIS. α Cây Cau cau.

Differ. spec. Cyrt. *foliis* ovatis, alternis: *pedunculis* polyfloris, sub-terminalibus.

Hab. *Arbor* parva, 8 pedes alta: *ramis* patentibus. *Folia* ovata, acuminata, subserrata, glabra, alterna. *Flos* albus, subterminalis, *pedunculis* polyfloris.

Habitat in dumetis Cochinchinæ.

† GENUS XXIII. ANOMIA.

Descriptio Naturalis.

Cal. o.

Cor. Monopetala, irregularis, profundè 10-partita: laciniis longitudine sub-æqualibus, oblongis, sub-turbinatis, partim obtusis, partim acutis, superioribus ascendentibus.

Stam. Filamenta 10, subulata, quorum 5 alterna breviora, corollæ basi insistentia, corollâ breviora. Antheræ sub-rotundæ.

Pist. Germen lineare, superum. Stylus longior staminibus. Stigma simplex.

Peric. Siliqua longa, recta, pulposa, unilocularis, polyvalvis, polysperma. Sem.

Sem. Sub-rotunda, a valvis libera.

Nom. (Ανόμος ex-lex, irregularis) a corollâ, & siliquâ irregularibus.

Char. Gener. Cal. o. Cor. 10 - partita, irregularis. *Siliqua longa*, recta.

† Sp. 1. ANOMA MORINGA. ♂ Moringa.

Differ. spec. An. foliis alternis, bipinnatis: siliquis polygonis: seminibus triquetro-alatis.

Hab., & notæ. Arbor mediocris, ramis patentibus. Folia alterna, 2 - pinnata cum impari, sub-trijuga: foliolis ovatis, glabris, petiolatis, integerrimis, minusculis, inferioribus saepe ternatis. Flos albus, paniculis sparsis, sub-terminalibus, erectis: staminibus 10, omnibus fertilibus: antheris sub-rotundis. Siliqua longa, recta, subulata, sub-octogona, 3 - valvis: seminibus sub-rotundis, alis tribus membranaceis expansis, a futuris valvarum independentibus, recto, & simplici ordine dispositis. Cor. generis propria. Cal. o.

Habitat in multis Indiae locis: in Benghalâ a me observata.

Moringa. Acosta. Arom. apud Clus. Exot. pag. 278. c. 35. Moringa Zeylanica foliorum pinnis pinnatis, flore maiore, fructu angulofo. Burm. Zeyl. pag. 162. tab. 75.

† Sp. 2. ANOMA MORUNGA. α Ba dāu deai.

Differ. spec. An. foliis oppositis, bipinnatis: siliquis trigonis: seminibus triquetro-alatis.

Hab., & notæ. Arbor mediocris, ramis patentibus. Folia opposita, impari-bipinnata: foliolis ovatis, integerrimis, glabris, minimis, oppositis, petiolatis. Flos pallidus, paniculis sub-terminalibus. Stamina 10, quorum 5 alterna sterilia: 5 alia longiora, antheris ovatis incumbentibus. Siliqua ultra pedem longa, trigona, 3 - valvis, aliquando 4 - gona, 4 - valvis, 1 - locularis: seminibus triquetro-alatis, uno ordine dispositis. Corolla generis propria. Calyx nullus.

Habitat agrestis in Cochinchinâ: vidi etiam Mozambici in Africâ.

Morunga: Kellor. Rumph. Amb. I. 1. c. 73. tab. 74. 75.

Ufus. In Cochinchinâ nullus. Indigenæ Amboinenses comedunt folia, Africani flores, Malabarici teneras siliquas elixas.

In Medicinâ utriusque speciei radix, cortexque dicuntur externè curare morsus venenatos, artus ædemate, vel paralyfi affectos: internè vero cholera morbum, & scorbutum: quarum virtutum ipsomet periculum non feci: nec etiam cum aliis judico Lignum esse Nephriticum, nisi forte de Americanâ loquazatur, quam non

non vidi. Asiaticam habere vim Diureticam, & Emmenagogam Censeo.

Sp. 3. ANOMA COCHINCHINENSIS. *α Ba dāu nhō lā.*

Differ. spec. An. *foliis oppositis, bipinnatis: siliquis sub-compressis, bivalvibus: seminibus nudis.*

Hab., & notæ. *Arbor 10-pedalis, ramis ascendentibus. Folia opposita, impari-bipinnata: foliola sub-ovata, integerrima, tomentosa, minima. Flos albus paniculis sub-terminalibus, sparsis. Stamina 5 alterna sterilia: 5 alia anteris ovatis, magnis: omnia ascendentia. Siliqua oblonga, crassa, sub-compressa, utriusque attenuata, 1-loocularis, bivalvis: seminibus plurimis, sub-rotundis, alâ nudis, inordinatis. Corolla generis propria. Calyx nullus.*

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Observ. Omnes flores hujus generis a me in diversis admodum locis observatos inveni hermaphroditos, omnesque fæcundos: quamvis in solâ primâ specie stamina omnia cujusque floris fæcunda sint, in aliis speciebus dimidia pars tantum, quinque numero. De his plantis adeo confusè loquuntur Authores, ut Linnæus incertus proprii Characteris genericis, putaverit speciem esse Guilandinæ, a quâ penitus abhorrent. Monuit itaque, ut attentè flores examinent, qui vivos obtineant. Hoc diligenter præstigi.

+ GENUS XXIV. OPHISPERMUM.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium campanulatum, 6-partitum: laciniis oblongo-ovatis, sub-erectis, æqualibus.

Nectarium lobi 10, ovati, tomentosi, ad basim laciniarum calycis in orbem positi.

Cor. o: nisi parvos lobos Nectarii Corollam dicas.

Stam. Filamenta 10, brevissima, inter lobos nectarii assurgentia, receptaculo insistentia. Antheræ oblongæ, parvæ, stantes.

Pist. Germen superum, compresso-ovatum. Stylus longior staminibus. Stigma 2-fidum.

Peric. Capsula lato-lanceolata, compressa, corticosa, 2-loocularis, 1-sperma, apice dehiscens.

Sem. Solitaria, ovata, acuminata: alâ longâ, subtereti, sinuosa, lateraliter adjunctâ.

Nom. (*Ophis anguis.*) ab alâ sinuosa, anguiformi, seminis lateri adrepente.

Char.

Char. Gener. *Cal.* 6-partitus, inferus. *Cor.* 0. *Caps.* 2-locularis, 1-sperma: *seminibus* alatis.

† Sp. 1. OPHISPERMUM SINENSE. β Pă mău yong.
Differ. spec. Oph. *foliis* lanceolatis: *floribus* solitariis.
Hab. *Arbor magna*, *ramis* patentibus. *Folia* lanceolata, integerima, undulata, nitida, alterna. *Flos* terminalis, solitarius: *Calyce*, & *staminibus* cum *capsulâ* persistentibus.

D I G Y N I A.

GENUS XV. SAXIFRAGA.

Char. Gener. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Caps.* 2-rostris, 1-locularis, polysperma. Lin. sy. pl. G. 608.

† Sp. 1. SAXIFRAGA Chinensis. β Hö ngi tsao.
Differ. spec. Sax. *foliis* radicalibus, cordato-rotundis, interruptè crenatis: *paniculâ* floribus irregularibus.
Hab., & notæ. *Planta* herbacea, acaulis. *Folia* aggregata, cordata, sub-rotunda, carnosa, interruptè crenata, pilosa, subtus rubescens: *petiolis* longis. *Scapus* nudus, 6-pollicaris: *paniculâ* diffusa. *Corolla* alba, rotata, 5-petala, quorum 2 exteriora duplo maiora. *Capsula* birostris, bilocularis, polysperma. *Styli* 2, flore breviores.
Habitat in agris, Cantone Sinarum.
Obs. Non obstantibus capsulis 2-locularibus, cætera omnia ad Saxifragam revocant; & quamvis farmentosa non sit, ad eam proximè accedit, quæ Sax. farmentosa dicitur. Lin. Jun. sup. sy. pag. 240. Thunb. Jap. pag. 182.

GENUS XXVI. DIANTHUS.

Char. Gener. *Cal.* cylindricus, 1-phyllo, basi squamis 4. *Petala* 5, unguiculata. *Caps.* cylindrica, 1-locularis. Lin. sy. pl. G. 614.

Sp. 1. DIANTHUS CARYOPHYLLUS. α Houng nhung hōa. β . . .
Differ. spec. Di. *floribus* solitariis: *squamis* calycinis sub-ovatis, brevissimis: *corollis* crenatis. Lin. sp. 7.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 1-pedalis, sub-erectus. *Folia* subulata, crassa, semi-amplexicaulia, inferiora imbricata, superiora opposita. *Flos* plenus, solitarius, ruber, albusve, vix odorus:

Nn

ca-

calyce cylindrico, 5 - dentato, basi squamis 4, conicis, brevissimis. *Petala multa*, crenata, luxuriantia, unguiculata. *Stam.* 10.

Styli 2, reflexi. *Capsula* teres, polysperma, 1 - locularis. Colitur in Chinâ, unde in Cochinchinam creditur delatum.

Tunica ramis uni- & bifloris, petalis levibus, stipulis calycinis brevissimis. Hall. Helv. n. 896. Dianth. Caryophyllus. Tunb. Jap. pag.

184.

Sp. 2. DIANTHUS CHINENSIS. a Cam trioc hoa. 6.

Differ. spec. Di. floribus solitariis: *squamis* calycinis subulatis, patulis, tubum æquantibus: *corollis* crenatis. Lin. sp. 11.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, sub-erectus, tenuis. *Folia* subulata, parva, glabra, opposita. *Flos* solitarius, simplex, 5 - petalus: petalis coccineis, margine crenato, albo: *squamis* calycinis subulatis, tubum æquantibus: aspectu pulcher, odore nullo.

Habitat in viridariis Sinensis, & Cochinchinensis.

Burm. Ind. pag. 105.

TRIGYNIA.

GENUS XXXVII. BEMBIX.

Cal. Perianthium inferum, 3 + partitum ad lacinias ovatis, concavis, erectis.

Cor. Petala 5, ovata, concava, calyce paulo longiora. Stam. Filamenta 10, filiformia, quorum 5 alterna longiora, petalorum basi insistentia, ipsis breviora. Antheræ biloculares, stantes.

Pist. Germen ovatum. Styli 3, oblongo-turbanati, bifurcati, erecti. Stigmata verticaliter compressa, emarginata.

Peric. Bacca ovata, parva, trilocularis?

Sem. Non. observata.

Nom. (Βεμβιξ turbo) ab stylis, & foliis turbinatis.

Char. Gener. Cal. 3 - partitus, inferus. Cor. 5 - petala. Bacca ovata; 3 - locularis.

† Sp. 1. BEMBIX TECTORIA. a Lai trung cuon.

Differ. spec. Bemb. foliis cuneiformibus: caule scandente.

Hab. Caulis fruticosus, lignosus, durissimus, scandens, acirrus, inermis, ramosus. Folia cuneiformia, integerrima, glabra, plana, dura,

dura, magna, opposita, petiolata. *Flos* pallidus, racemis parvis, sub-terminalibus.
Habitat in sylvis Cochinchinæ.
Usus. Ad tegendas cymbas, domos, & similia, quæ aeris mutatio-
nes patiuntur exposita; namque istis foliis defensa longissimo tem-
pore servantur indemnia.

† GENUS XXVIII. AUBLETIA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium inferum, campanulatum: tubo brevi, crassissimo: limbo 5-partito, laciniis triangularibus, æquilateris, patentibus, æqualibus, persistentibus.

Cor. Nulla.

Stam. Filamenta 10, reflexa, basi fissurarum calycis per paria insi-
dentia: horum 5 brevissima, 5 alia triplo longiora. *Antheræ* bre-
viorum oblongæ, magnæ: longiorum parvæ, ovatae.

Pist. Germen compressum. Stylus sub-nullus. Stigmata 3, ovata, re-
flexa.

Peric. Bacca orbiculata, subtus convexa, superius plana, 3-locularis, 1-sperma.

Sem. Sub-lenticularia.

Nom. In memoriam Clarissimi Aubleti, qui plantis suis Guianensibus
Botanicam largè ditavit.

Char. Gener. *Cal.* 5-partitus, inferus. *Cor.* o. *Bacca* lentiformis,
3-locularis, 1-sperma.

† Sp. i. AUBLETIA RAMOSISSIMA. An pât pouc.

Differ. spec. *Aub. foliis* ovatis, 3-nerviis, crenatis: *floribus* axilla-
ribus.

Hab. *Arbor* mediocris, ramosissima, *ramis* tortuosis: *aculeis* sparsis;
rectis, brevibus. *Folia* ovata, 3-nervia, minutè crenata, glabra,
alterna, petiolata. *Flos* pedunculis polyfloris axillaribus.

Habitat Cantone Sinarum inulta.

TETRAGYNIA.

GENUS XXIX. THYSANUS.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium inferum, 5 - phylum, coloratum, persistens : foliolis lanceolatis, concavis, pilosis, patentibus.

Cor. Petala 5, campanulata, patentia, oblonga, calyci æqualia.

Stam. Filam. 10, brevia, reflexa. Antheræ sub-rotundæ, 2 - loculares, stantes.

Pist. Germen tetragonum. Styli 4, filiformes, angulis 4 germinis a latere inserti. Stigmata totidem, leviter bifida.

Peric. Drupæ 4, oblongæ, gibbosæ, apice recurvæ : cortice lanuginoso a latere dehiscente.

Sem. Nuclei solitarii, oblongo-ovati, leves, inferius involuti tunica carnosâ, fimbriatâ, rubrâ, apice nudi.

Nom. (*Θυσανός* fimbria) ab involucro feminis fimbriato.

Char. Gener. Cor. 5 - petala. Drupæ 4, gibbosæ : nucleo arillato.

† Sp. 1. THYSANUS PALALA. α Deei Khe.

Differ. spec. Thys. foliis pinnatis : pedunculis polyfloris, axillaribus.

Hab. Frutex lignosus, magnus, sub-erectus, ramosus, inermis. Folia pinnatifolia, 10 - juga : foliolis oblongis, integerrimis, glabris. Flos lateralis, pedunculis polyfloris. Corolla alba. Nuclei alii rubrâ. Calyx similiter ruber.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Palala secunda ? Rhumph. Amb. I. 2. c. 9. pag. 26. tab. 6.

Observ. Affinitatem habet cum Simabâ. Aubl. Guian. pag. 400. tab.

153.

PENTAGYNIA.

GENUS XXX. CERASTIUM.

Char. Gener. Cal. 5 - fidus. Petala bifida. Caps. 1 - locularis, apice dehiscens. Lin. sy. pl. G. 637.

Sp. 1. CERASTIUM REPENS. α . . . A kîm tsao.

Differ. spec. Cer. foliis lanceolatis : pedunculis ramosis : capsulis sub-rotundis. Lin. sp. 9.

Hab. *

Hab., & notæ. *Caulis* 1-pedalis, herbaceus, perennis, tenuis, multiplex, ramosus, procumbens, sœpe repens. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, undulata, tomentosa, sessilia, opposita. *Flos* albus, axillaris, & terminalis, pedunculis sub-1-floris. *Calyx* 5-phyllo. *Petala* 5, profundè bipartita, laciniis lanceolatis. *Capsula* subrotunda, acuminata, 1-locularis, polysperma, apice dehiscens. Habitat in pratis, & hortis Cochinchinæ: etiam Cantone Sinarum. *Cerastium* perenne, procumbens. Hort. Cliff. pag. 174. *Lychnis* incana, repens. Bauh. Pin. pag. 206. n. 6.

GENUS XXXI. OXALIS.

Char. Gener. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* unguibus connexa. *Capsula* 5-gona, angulis dehiscens. Lin. sy. pl. G. 634.

Sp. 1. OXALIS SENSITIVA. β Chän tsú. α Chua me lá me.

Differ. spec. Ox. *scapo* umbellifero: *foliis* pinnatis. Lin. sp. 8.

Hab., & notæ. *Herba* annua, *caule* 6-pollicari, erecto, tereti, simplicissimo. *Folia* ad apicem congesta, undequaque reflexa, pinnata, sine impari, sub-12-juga: *foliolis* oblongo-ovatis, plerumque oppositis, integerrimis, glabris, subsessilibus. *Flos* luteus, terminalis, umbellatus: pedunculo communi longo: *calyce* 5-phyllō: *corollā* 5-partitā, erectā. *Capsula* 5-gono-ovata, 5-locularis, 5-valvis, polysperma, angulis dehiscens. Planta visu pulcherrima, tactum refugiens, & quasi sentiens retrò se colligens.

Habitat Cantone Sinarum, & in Cochinchinâ per hortos, & prata.

Herba sentiens. Rumph. Amb. I. 8. c. 79. t. 104. Bont. Jav. I. 6. cap. 32. f. pag. 120. *Oxis* Indica, Tamarindi foliis, floribus umbellatis. Burm. Zeyl. pag. 178.

Sp. 2. OXALIS CORNICULATA. α Chua me ba chia. β Tsö tsän tsao.

Differ. spec. Ox. *pedunculis* umbelliferis: *caule* ramoso, diffuso. Lin. sp. 13.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, multiplex, ramosus, teres, tenuis, diffusus, sœpe repens, 1-pedalis, & ultra. *Folia* ternata, sparsa, petiolis longis: *foliolis* obcordatis, sessilibus, glabris, acidis. *Flos* luteus, pedunculis polyfloris (nec umbellatis) lateralibus. *Petala* emarginata, basi connexa. *Capsula* 5-gona, longa, hirsuta, polysperma.

Habitat sparsa per vias, & hortos in Cochinchinâ, & Chinâ.

Thunb. Jap. pag. 187.

Oxis lutea, Indica. Rumph. Amb. I. 8. c. 64. pag. 277. *Oxis* flore luteo, vulgaris, minor, Zeylanica. Burm. Zeyl. pag. 179.

Vir-

Virtus: totius herbæ. Refrigerans, Antiscorbutica.

+ GENUS XXXII. HEDONA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium monophyllum, tubo 10-gono, sub-ventricoso: limbo 5-fido, laciniis acutis, erectis: basi suffultum squamis 4, subulatis, inæqualibus.

Cor. Petala 5, unguibus longis, a basi ad medium receptaculo elongato coalitis: limbo plano, magno, rotundato, crenato. Nectarium ad os tubi, lobis 10, ad planum limbi reflexis.

Stam. 10, filiformia, receptaculo insitentia, supra os tubi calycis reclinata. Antheræ oblongæ, nutantes.

Pist. Germen superum, oblongum, 5-gonum, sub-turbinatum. Styli 5, erecti, æquales staminibus. Stigmata simplicia.

Peric. Capsula 5-gona, oblonga, 1-locularis, polysperma.

Sem. Multa, sub-reniformia.

Nom. (Hedonæ jucunditas) a jucunditate, & elegantiâ floris.

Char. Gener. *Cal.* 1-phyllus, ventricosus. *Corollæ* nectarium 10-lolum. *Capsula* 1-locularis, angulata, polysperma.

+ Sp. 1. HEDONA SINENSIS. *a* Yü mi.

Differ. spec. Hed. *foliis* ovatis oppositis: *flore* axillari, solitario.

Hab. *Caulis* annuus, 1-pedalis, simplicissimus, erectus, teres. *Folia* ovata, sub-acuminata, integerrima, sessilia, glabra, opposita. *Flos* axillaris, solitarius, subsessilis, coccineus.

Colitur ob venustatem Cantone Sinarum.

Observ. Affinitatem habet cum Diantho: a quo differt non solum ordine, sed calyce angulato, sub-ventricoso, nectario 10-lobo, unguis corollæ receptaculo in longitudinem coalitis, capsula 5-gonâ.

GENUS XXXIII. COTYLEDON.

Char. Gener. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 1-petala. *Squamæ* nectariferæ 5, ad basim germinis. *Capsulæ* 5. Lin. fy. pl. G. 628.

Sp. 1. COTYLEDON LACINIATA. *a* Truong sinh rach lá.

Differ. spec. Cot. *foliis* laciniatis: *floribus* quadrididis. Lin. sp. 6.

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, teres, crassus, sub-erectus, 2-pedalis, ramosus, succulens: *radice* repente. *Folia* carnosa, glabra, infe-

inferiora laciniata, magna, summa lanceolato-linearia, integra, parva, omnia opposita. *Flos* luteus, corymbis racemosis, magnis, terminalibus: *bracteis* lanceolatis, parvis, sessilibus, floribus mixtis. *Limbus corollæ*, & *calycis* 4-fidus: illius tubus 4-gonus. *Stamina* 8. *Capsulae* 4, polyspermæ introrsum dehiscentes. *Squamæ* 4, ad basim germinum.

Habitat tam culta, quam inculta in Cochinchinâ, ubi quotannis floret numero partium semper constans.

Cotyledon Afra, folio crasso, lato, laciniato, flosculo aureo. Boerh. Lugdb. I. pag. & tab. 288. Planta anatis. Rumph. Amb. I. 8. cap. 63. tab. 95.

Virtus. Refrigerans.

Sp. 2. COTYLEDON SERRATA. & Truong sinh lòn lá.

Differ. spec. Cot. *foliis* ovalibus, crenatis: *caule* spicato. Lin. sp. 4:

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, erectus, teres, 3-pedalis. *Folia*

ovata, ferrata, magna, carnofa, concava, opposita, petiolata.

Flos flavus corymbo terminali, bracteis nudo. In hâc etiam specie

deest quinta pars calycis, corollæ, staminum, & capsularum.

Habitat in hortis Cochinchinæ.

Cotyledon Cretica, folio oblongo fimbriato. Dill. Elth. pag. 113. tab.

95. fig. 112.

GENUS XXXIV. SEDUM.

Char. Gener. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-petala. *Squamæ* nectariferæ 5, ad basim germinis. *Caps.* 5. Lin. sy. pl. G. 629.

Sp. 1. SEDUM STELLATUM. & Chêu li.

Differ. spec. Sed. *foliis* planiusculis, angulatis: *floribus* lateralibus, sessilibus, solitariis. Lin. sp. 6.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, teres, repens: *ramulis* erectis, 5 pollices longis. *Folia* stellato-terna, lanceolato-linearia, integerima, planiuscula, subteretia, parva, passeris linguae similia, unde vernaculum nomen Sinicum. *Flos* luteus, pedunculis monostoris, solitariis, lateralibus: *corolla*, & *calyx* 5-phylis, subæqualibus, foliolis lanceolatis, incurvis. *Capsulae* 5, acutæ, polyspermæ. *Squamæ* 5, nectariferæ.

Habitat Cantone Sinarum.

Hort. Cliff. pag. 176. Cotyledon Stellata. Bauh. Pin. pag. 285. n. 6.

Sp. 2. SEDUM ANACAMPSEROS. & Truong sinh lòn lá. & Pă touc săn.

Differ.

Differ. spec. Sed. *foliis* cuneiformibus, integerrimis: *caulibus* decumbentibus: *floribus* corymbosis. Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, teres, repens: *ramulis* sub-erectis, 4 pollices longis. *Folia* sub-cuneiformia, apice rotundata, emarginata, crassa, sparsa, oppositaque. *Flos* luteus corymbo terminali: *corollis* 5-petalis: *capsulis* 5.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ. Hic florentem observavi non illuc, quamvis non raro occurrat.

Sedum caule procumbente, foliis ovatis, integerrimis. Hall. Helv. n. 956. *Telephium* repens, folio diciduo. Bauh. Pin. pag. 287. n. 5.

Virtus. Refrigerans, Antiscorbutica. In Cochinchinâ folia non decidunt.

GENUS XXXV. AVERRHOA.

Char. Gener. *Cal.* 5-phyllus. *Petala* 5, supernè patentia. *Pomum* 5-gonum, 5-loculare. Lin. sy. pl. G. 626.

Sp. 1. AVERRHOA CARAMBOLA. α Cây Khe. β Yam tao.

Differ. spec. Av. *axillis* *foliorum* fructificantibus: *pomis* oblongis, acutangulis. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Arbor* supra mediocrem: *ramis* expansis, comâ densissimâ. *Folia* impari-pinnata, 4-juga, superiora maiora: *foliola* ovata, acuminata, integerrima, glabra, petiolata, opposita. *Flos* lateralis, sparsus, racemis brevibus, saepius e ramis minoribus, aliquando a maioribus, aut a trunco pullulantibus. *Calyx* inferus, 5-partitus, erectus, ruber. *Corolla* campanulata, petala 5, oblongo-ovata, minuscula, colore albo, & purpureo variata. *Stamina* semper 5, corollâ breviora, angulis germinis 5-goni defensa, receptaculo insidentia. *Styli* 5, subulati: *stigmatibus* obtusis. *Pomum* ovo gallinaceo æquale, acutè 5-gonum, 5-loculare, polyspermum: cortice flavo, tenui, glabro: pulpâ hyalinâ, aquosâ, in multis dulci, in aliis acidâ, odore vix ullo. *Semina* pauca, minuscula, oblonga, angulato-planiuscula, fusca.

Habitat ubique culta per totam Cochinchinam, & in provinciis Australibus imperii Sinensis: vidi etiam in Malabariâ, & in aliis Indiæ locis.

Prunum Stellatum. Rumph. Amb. I. 1. c. 30. tab. 35. Fructus Carambolas dicti. Bont. Jav. I. 6. c. 11. pag. 102. fig. ibi.

Observ. Flos istius arboris per me saepe observatus in diversis locis nunquam inventus fuit Decander; adeoque ad Pentandriam reduci debere non dubito. Ansam errori dedit Burmanus (Zeyl. pag. 148.) addens synonymis variorum Authorum, quod hujus plantæ flores sint

DECANDRIA. PENTAGYNYA.

289

sint 5-fidi, calyx 5-folius, stamina 10, & pistilla 3: quæ omnia, & singula nostræ observationi repugnant.

Uſus. Lignum arboris ad fabricandum ineptum est. Fructus dulces ſunt, eſculenti, & ſapidi, etiam crudi: acidi vero, aut immaturi cum aliis edulis elixantur, queis gratam aciditatem, & falubritatem communicant. Conditi vel ſaccharo, vei ſale, pipere, & ace-to in longum tempus conservantur. In re Medicâ Refrigerant, & ſub-adstringunt, ardorem febrilem, ſitum, & inapetentiam cibi allevant.

Sp. 2. AVERRHOA BILIMBI. ♂ Blimbing.

Differ. spec. Av. *Caudice nudo, fructificante: pomis oblongis, obtusangulis. Lin. sp. 1.*

Hab., & notæ. *Arbor fructicosa, 8-pedalis: ramis paucis, reclinatis. Folia impari-pinnata, 10-juga, & ultra: foliolis parvis, ovato-lanceolatis, integerrimis, glabris, petiolis brevibus, ſparſis. Flor rubro-purpureus, racemis oblongis, parvis, trunco adhærentibus. Cal. 5-fidus. Corolla 5-petala, patens. De staminibus non omnino certus sum, an fint 5, ſicut clarè vidi in præcedente ſpecie. Fructus pomum oblongum, digitum crassum, obtuse 5-gonum, 5-loculare, polyspermum, exterius glabrum, viride, interius aquosum, acidiflum.*

Habitat Gœæ, & in multis locis Indiæ intra, & extra Gangem.

Blimbingum teres. Rumph. I. 1. c. 31. tab. 36. Bont. Jav. I. 6. c. 42. pag. 133. fig. ibi.

Virtus, & uſus idem fere, qui præcedentis Carambolæ.

Obſerv. Species a Linnæo dicta Averrhoa Acida est Cicca, ubi vi-deri potest. Lin. Jun. (Sup. pag. 416.) hoc benè notavit.

290
CLASSIS XI.
DODECANTRIA.

MONOGYNIA.

1. ASARUM. *Cor. o. Cal. 3-fidus, superus. Caps. 6-locularis.*
- † 2. PTEROTUM. *Cor. o. Cal. 5-phyllus, inferus. Concep-
taculum: semine alato.*
3. PORTUCALA. *Cor. 5-petala. Cal. 2-fidus, inferus. Caps.
1-locularis, circumfissa.*
4. WINTERANIA. *Cor. 5-petala. Cal. 3-lobus, inferus. Bacca
3-locul. 2-sperma. Nect. antheriferum.*
- † 5. ADENODUS. *Cor. 5-petala. Cal. 5-phyllus inferus. Dru-
pa 1-sperma. Nectar. glanduliferum.*
- † 6. STIXIS. *Cor. 6-petala. Cal. o. Drupa 1-sperma
superia.*
- † 7. DIATOMA. *Cor. 6-7-petala. Cal. 8-fidus. Bacca 1-sper-
ma, calycina.*
8. RHIZOPHORA. *Cor. polypetala. Cal. polyfidus, inferus. Dru-
pa 1-sperma, solida.*

TRIGYNYA.

9. EUPHORBIA. *Cor. petala peltata. Cal. ventricosus, inferus.
Caps. 3-cocca.*
10. RESEDA. *Cor. petala multifida. Cal. partitus, inferus.
Caps. 3-locularis, hians.*
11. TACCA. *Cor. petala 6, fornicata. Cal. 6-fidus, supe-
rus. Bacca 3-locularis, sicca, angulata.*

TETRAGYNYA.

- † 12. DICHLORA. *Cor. petala 5, carnosæ. Cal. 4-dentatus. Bac-
ca calycina 4-locularis, polysperma.*

PEN,

PENTAGYNIA.

† 13. MILTUS.

*Cor. ♂. Cal. 5 - phyllus, inferus. Capsulae
5, 1 - spermæ.*

POLYGYNIA.

† 14. HECATONIA.

*Cor. petala 5, patentia. Cal. 5 - phyllus, in-
ferus. Semina plurima, nuda.*

MONOGYNYA.

GENUS I. ASARUM.

Char. Gener. *Cal.* 3, five 4-fidus, germini insidens. *Cor.* o. *Caps.* coriacea, coronata. Lin. sy. pl. G. 642.

Sp. i. ASARUM VIRGINICUM. *S*í *s*ín. *a* *T*é *r*án,

Differ. spec. Af. *foliis* cordatis, obtusis, glabris, petiolatis. Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. *Planta* perennis, 5-pollicaris, acaulis. *Folia* cordata, sub-rotunda, sub-acuta, integerrima, glabra: *petiolis* longis, sub-erectis, teretibus, congestis. *Flos* solitarius, apetalus, pedunculis foliis brevioribus. *Calyx* capsularis, 3-4-fidus. *Capsula* oblongo-lobata, 6-locularis, polysperma, *seminibus* ovatis. *Radix* repens, longa, fasciculata, linearis, albo-cinearea: odore aromatico, grato: sapore acri, mordaci.

Habitat incultum in variis Sinarum provinciis.

Thunb. Japon. pag. 190. Asarum Virginianum, pistolochiae foliis sub-rotundis, cyclaminis more maculatis. Pluk. Alm. 53. t. 78. f. 2.

Virtus: radicis. Attenuans, Deobstruens, Emmenagogue, Sialogoga, Cephalica. Utuntur semper Medici indigenæ radicis decocto, quod nunquam vomitum movet, aut nauseam.

GENUS II. PTEROTUM.

Descriptio Naturalis.

Cal. Petianthium 5-phylum: foliolis ovatis, concavis, coriaceis, patentibus, persistentibus.

Cor. Nulla.

Stam. Filamenta 15, subulata, plana, calyce longiora. Antheræ sub-rotundæ, 2-loculares.

Pist. Germen ovatum, superum. Stylus o. Stigma simplex.

Peric. Conceptaculum oblongum, acutum, coriaceum, 1-valve, a latere dehiscentia.

Sem. 1, ovato-oblongum, alatum alâ polyfidâ, basi adnatâ, in longitudinem feminis extensa.

Nom. (Πτερωτός alatus) a semine alâ polyfidâ instructo.

Char:

Char. Gener. *Cal.* 5 - phyllus, inferus. *Cor.* o. *Conceptaculum* oblongum : *semine* i, alato.

† Sp. i. PTEREROTUM PROCUMBENS. α Cây truong deei.
Differ. spec. Pter. *foliis* lanceolatis, alternis : *racemis* axillaribus.
Hab. Frutex magnus, lignosus, procumbens, longus : *ramis* multis, brevibus. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, parva, glabra, alterna. *Flos* racemis parvis, axillaribus.
Habitat in sylvis Cochinchinæ.

GENUS III. PORTULACA.

Char. Gener. *Cor.* 5 - petala. *Cal.* 2 - fidus. *Caps.* 1 - locularis circumcisæ, aut 3 - valvis. Lin. sy. pl. G. 659.

Sp. i. PORTULACA OLERACEA. α Rau Sam. β Mâ chi hién.
Differ. spec. Port. *foliis* cuneiformibus : *floribus* sessilibus. Lin. sp. i:
Hab., & notæ. *Caulis* annuus, teres, aquosus, ruber, lœvis, procumbens : *ramis* diffusis, saepe repentibus. *Folia* sub-cuneiformia, oblonga, obtusa, carnosa, glabra, sessilia, conferta, integerrima. *Flos* luteus, sessilis, sparsus : *corollis* 5 - petalis, patentibus, apice sub-truncatis, emarginatis. *Stamina* 10. *Capsula* 1 - locularis, horizontaliter dehiscentia : *seminibus* multis, rotundis, nigris, minimis.

Habitat passim vias, & agros in Cochinchinâ, & Chinâ.

Burm. Ind. pag. 110. Thunb. Jap. pag. 192. Portulaca angustifolia, five sylvestris. Bauh. Pin. pag. 288. n. 2.

Virtus : præcipue seminum in decocto. Refrigerans, Emolliens, Diuretica, Antiscorbutica. Sinenses imprimis utuntur ad attenuandum sanguinem, ac diuresim promovendam. Hujus oleris frequenti usu ante partum solet præcaveri ejus difficultas.

GENUS IV. WINTERANIA.

Char. Gener. *Cal.* 3 - lobus. *Petala* 5. *Antheræ* 16, adnatæ Nectario urceolato. *Bacca* 3 - locularis. *Sem.* 2. Lin. sy. pl. G. 653.

Sp. i. WINTERANIA CANELLA. γ

Differ. spec. Wint. *foliis* lanceolato-ovatis, integerrimis, sparsis : *floribus* pedunculatis, terminalibus.

Hab., & notæ. *Arbor.* magna, *ramis* ascendentibus : *cortice* exteriore scabro, rufo : interiore glabro, aromatico, ardente. *Folia* ovata, utrinque attenuata, sub-obtusa, integerrima, glabra, encruxia

via. *Flos* albus, pedunculis paucifloris, simplicibusq;e aggregatis, terminalibus. *Bacca* supera, sub-rotunda, semipollicaris, corticosa, 6-locularis, monosperma: *seminibus* ovato-angulatis. Plantam fructicantem observavi, non florentem.

Habitat in altis montibus insulæ Madgascariæ, S. Laurentii dictæ. Lin. Jun. suppl. plant. pag. 247. Winteranus Cortex. Clus. Exot. l. 4. c. 1. Ex insula S. Laurentii fructus magnitudine avellanæ, vel paulo maior, *Caryophyllos* redolens. Garc. Arom. l. 1. c. 21.

Virtus. Calefaciens, stomachica. Usus œconomicus ad condierdos cibos, sapore, & odore gratissimo, medio inter *Caryophyllum*, & *Laurum*. Folia recentia gratiora sunt baccis, & cortice. Drymis Frosteri eisdem qualitatibus prædita dicitur, nec modo florendi a nostrâ differt: hæc tamen pistillo unico, illa multis gaudet. Vide Lin. Jun. Suppl. plant. pag. 269.

† G E N U S V. A D E N O D U S.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 5-phyllum, inferum: foliolis lanceolatis, reflexis, deciduis.

Cor. Petala 5, ovata, sub-erecta, calyci æqualia, a medio ad apicem polyfida, laciniis filiformibus.

Nectarium glandulis 5, magnis, 2-lobis, procumbentibus, persistentibus.

Stam. Filamenta 15, brevia, patentia, receptaculo insidentia. Anthæ oblongæ, quadragonæ, stantes: apice hiante, reflexo.

Pist. Germen longiusculum. Stylus subulatus, æqualis staminibus. Stigma acutum.

Peric. Drupa ovato-oblonga, parva, glabra, 1-sperma.
Sem. Nucula oblonga, rugosa.

Nom. (*Αδενόδος* glandulosus) a glandulis in flore, & fructu persistentibus.

Char. Gener. *Calyx* 5-phyllus, inferus. *Cor.* petala 5, fimbriata: glandulis 2-lobis, permanentibus. *Drupa* 1-sperma.

† Sp. 1. ADENODUS SYVESTRIS. a Cây Cỏm thàng.

Differ. spec. Ad. *foliis* ovato-lanceolatis, ferratis: *spicis* sub-terminalibus.

Hab. *Arbor* mediocris: *ramis* patentibus. *Folia* ovato-lanceolata, serrata, glabra, alterna. *Flos* albo, rubroque variatus, *spicis* subterminalibus.

Habitat

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

† GENUS VI. STIXIS.

Descriptio Naturalis.

Cal. Nullus.

Cor. Campanulata, petala 6, oblonga, carnosa, revoluta.

Stam. Filamenta 16, corollæ subæqualia, receptaculo insidentia, exteriora breviora. Antheræ oblongæ, stantes.

Pist. Germen superum, ovatum, pilosum, pedicellatum. Stylus brevis, crassus. Stigmata 3, rotunda.

Peric. Drupa ovata, carnosa, mediocris, 1-sperma: cortice punctato.

Sem. Nucleus oblongo-ovatus, solidus.

Nom. ($\Sigma \tau \iota \xi \varsigma$ punctio) a punctis, quibus drupa distinguitur.

Char. Gener. Cal. o. Cor. petala 6, revoluta. Drupa punctata, fura pera, 1-sperma.

† Sp. I. STIXIS SCANDENS. a Cây Cám.

Differ. spec. Stix. foliis oblongis, integerrimis, venosis: racemis simplicibus, axillaribus.

Hab. Frutex magnus, scandens, acirrhous, inermis, ramosus, longissimus. Folia oblonga, acuminata, integerrima, venosa, dura, alterna. Flos purpureo, & viridi variatus: racemis simplicibus, longis, axillaribus.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Atunus. (Rumph. Amb. l. I. c. 56. tab. 66.) ejusdem generis videtur esse.

† GENUS VII. DIATOMA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium baccatum, campanulatum, patens, semi-8-fidum, laciniis acutis.

Cor. Petala 6-7, sub-rotunda, incisa, patentia, calyce longiora: unguibus filiformibus elevata.

Nectarium annulare, carnosum, polycrenatum.

Stam. Filamenta 16, subulata, corollæ subæqualia, receptaculo inserita. Antheræ sub-rotundæ.

Pist. Germen sub-rotundum, calyce clausum. Stylus filiformis, crassus,

sus, æqualis staminibus. Stigma 4-5-fidum : laciniis ovatis, sulcatis, horizontaliter patentibus.

Peric. Bacca rotunda, parva, coronata, 1-sperma.
Sem. Sub-rotundum.

Nom. (Δ latopin. incisura) a petalis corollæ incisis.

Char. Gener. *Cal.* baccatus, 8-fidus. *Cor.* 6-7-petala incisa. *Bacca* rotunda, 1-sperma.

† Sp. 1. DIATOMA BRACHIATA. a Cây ma.

Differ. spec. Diat. *ramis* brachiatis : *foliis* ovatis, oppositis : *racemis* brevibus, subterminalibus.

Hab. *Arbor magna* : *ramis* brachiatis, expansis. *Folia* ovata, integerrima, glabra, opposita. *Flos* parvus, croceus, *racemis* sub-divisis, brevibus, sub-terminalibus.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

GENUS VIII. RHIZOPHORA.

Char. Gener. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* 4-partita. *Sem.* 1, longissimum, basi carnosum. Lin. sy. pl. G. 646.

Sp. 1. RHIZOPHORA CASEOLARIS. a Cây Bán tòn thài.

Differ. spec. Rhiz. *foliis* ovatis, obtusis : *strobilis*, solitariis : *fructibus* orbiculatis, depresso-mucronatis. Lin. sp. 7.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, *trunko* brevi, tortuoso : *ramis* longis, diffusis. *Folia* ovata, integerrima, glabra, subsessilia, opposita. *Flos* ruber, solitarius, sparsus. *Cal.* inferus, persistens, in florescentiâ campanulatus, in maturentiâ rotatus, 6-partitus, laciniis conicis, crassis, planis. *Corolla* petala 6, linearia, calyci insidentia, citò decidua, calyci subæqualia. *Filamenta* 100 circiter, subulata, calyci affixa, ipso longiora. *Antheræ* reniformes, 3-loculares, nutantes. *Germen* sub-rotundum, planiusculum. *Stylus* longior staminibus. *Stigma* lenticulare, emarginatum. *Drupa* sphæroidea, mucronata, sesquipolicaris, glabra, 1-sperma. *Nucleus* ejusdem formæ, solidus, durus, in multas laminas crassas verticaliter separabilis.

Habitat propè ripas fluminum in Cochinchinâ. Eadem in litore Africæ Orientalis visa est staturâ inferior, foliis nonnullis emarginatis, flore, & fructu conveniens.

Burm. Ind. pag. 108. *Mangium Caseolare*. Rumph. Amb. I. 4. c. 62. tab. 74.

Sp. 2.

† Sp. 2. RHIZOPHORA SEXANGULA. & Cây Bán deai tlái.

Differ. spec. Rhiz. *foliis* ovato-lanceolatis, oppositis : *fructibus* sexangulatis : *petalis* 10 : *staminibus* 20.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, *ramis* tortuosis, patentibus. *Folia* ovato-lanceolata, integerima, plana, glabra, opposita. *Flos* ruber, sub-terminalis, solitarius : *calyce* campanulato, eadem formâ persistente, magno, 10-partito, laciniis, acutis, patentibus. *Corolla* petala 10, oblonga, emarginata, ciliata, calyci subæqualia. *Filamenta* 20, capillaria, calyci insistentia, ipso longiora : anthers oblongis, stantibus. *Germen* oblongum, superum. *Stylus* subulatus, æqualis staminibus : *stigmate* obtuso. *Drupa* oblonga, prismaticæ, æqualiter hexagona, recta, obtusa : *cortice* coriaceo, glabro : nudeo lignoso, tereti, simplicissimo.

Habitat prope ripas fluminum in Cochinchinâ.

Sp. 3. RHIZOPHORA GYMNORHIZA. & Cây Deà.

Differ. spec. Rhiz. *foliis* ovato-lanceolatis, integerimis : *radicibus* superterraneis. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Arbor* supra mediocrem : *trunko* alto, recto : *certice* crasso, fiso, fusco-rubo : *radicibus* multis, magnis, arcuatis, supra coenum aquâ marinâ perfluum elevatis, patentibus. *Folia* ovato-lanceolata, integerima, glabra, sparsa, saepe ad apicem congesta, petiolata. *Flos* ruber, solitarius, sparsus : *calyce* 10-13-partito, laciniis subulatis, erectis. *Cor.* 10-13-petala, calyci subæqualis, petalis linearibus, citò deciduis. *Stamina* numero duplia, 20-26, petalis, & laciniis calycis correspondentia. *Drupa* longa, sub-teres ; subulata : *nucleo* tereti, recente molliusculo, senescente sub-corneo.

Habitat ingentes tractus litorum ad Austrum Cochinchinæ, & Cambodiæ. Etiam frequenter occurrit in freto Malacenci.

Burm. Ind. pag. 108. Mangium Celsum. Rumph. Amb. 1. 4. c. 58. tab. 68.

Uſus. Cortex istius arboris utilissimus est ad tingendas telas colore rufo, vel castaneo : qui facilè in nigrum mutatur, si alternis vicibus immergantur telæ coeno fusco aquâ diluto, ad soleaque exsiccatae laventur, & iterum decocto corticis imbuantur, donec optatus color habeatur nigerrimus simul, & constans. Nullus Rhizophoræ fructus in Cochinchinâ est edulis. Fructus non minus indurescit, quam Palmæ Arecæ : nec iste meliori jure vocabitur Drupa, quam ille ; cum ambo tam cortice, quam nucleo (si formam excipias) convenient.

Observ. Omnes Rhizophoræ species, quas observavi, 20, aut plura

Pp nu-

numerant stamina, semperque calyci insistentia; adeoque videtur genus Rhizophora ad Icosandriam pertinere.

TRIGYNIA.

GENUS IX. EUPHORBIA.

Char. Gener. *Cor.* 4 - 5 - petala, calyci infidens. *Cal.* 1 - phyllus, ventricosus. *Caps.* 3 - cocca. Lin. sy. pl. G. 665.

Sp. 1. EUPHORBIA ANTIQUORUM. α Cây Xuong raong: Thanh laong. Differ. spec. Euph. *aculeata*, sub-nuda, triangularis, articulata: *ramis* patentibus. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Planta* fruticosa 8 - pedalis, *caule* triangulari, aculeato, articulato, succoso, cinereo-viridi, glabro: *ramis* patentibus: *foliis* nullis. *Flos* luteus, parvus, sessilis, terminalis, solitarius.

Habitat in sepibus Cochinchinæ.

Burm. Ind. pag. 110. Esula Indica. Bont. Jav. I. 6. c. 57. fig. ibi, pag. 153.

† Sp. 2. EUPHORBIA EDULIS. α Xuong raong lá.

Differ. spec. Euph. *aculeata*, foliosa, 5 - angularis: *pedunculis* polyfloris, terminalibus: *floribus* apetalis.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, 6 - pedalis, 5 - angularis, aculeis geminatis: *ramis* ascendentibus. *Folia* multa, sparsa, sub-cuneiformia, apice rotundata, 3 - pollicaria, integrerrima, carnosa, glabra. *Corolla* nulla. *Calyx* 1 - phyllus, carnosus, ventricosus, interiorius ruber, exteriorius viridis. *Stamina* brevia, 40 circiter. *Capsula* 3 - cocca.

Habitat culta in hortis Cochinchinæ, puto, quod etiam agrestis.

Usus. Folia elixa cum aliis oleribus comedunt sæpe indigenæ absque noxâ.

Sp. 3. EUPHORBIA NEREIFOLIA. α Xuong raong rao.

Differ. spec. Euph. *aculeata* seminuda: *angulis* abliquè tuberculatis. Lin. sp. 7.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, aculeatus, 4 - 5 - angularis, *ramis* longis, diffusis, inarticulatis: tuberculis multis per angulos dispositis. *Folia* caulina rara, ad apicem sparsa, oblonga, crassa, præva. *Flos* luteo-viridis, solitarius, sparsus, sub-terminalis.

Habitat sepes Cochinchinæ.

Burm. Ind. pag. 111. Ligularia. Rumph. Amb. I. 6. c. 45. tab. 40.

Virtus:

Virtus. Emetica, Purgans, acris, nec tuta. Usus frequens apud indigenas ad ducendas sepes, spinis horridas.

Sp. 4. EUPHORBIA TIRUCALLI. α Gay San hò Xanh.

Differ. spec. Euph. *inermis* seminuda, fruticosa, filiformis, erecta: *ramis* patulis, determinatè confertis. Lin. sp. 10.

Hab., & notæ. *Frutex* magnus, erectus, arborescens, 10 - pedalis: *ramis* inermibus, patentibus: *ramulis* filiformibus, dichotomis, confertisque. *Folia* rara, minuscula, oblonga, crassa, sparsa. *Flos* luteus, parvus, 5 - petalus: *pedunculis* monofloris, congestis, subterminalibus.

Habitat inter sepes in Cochinchinâ, uti & in Malabariâ.

Tithymalus arborescens, caule aphylllo. Pluk. Phyt. tab. 319. fig. 6.

Officraga lactea. Rumph. Amb. Auct. cap. 80. tab. 29.

Virtus. Caustica. Humor lactescens ex totâ plantâ oculos, si tangat, excæcat.

G E N U S X. R E S E D A.

Char. Gener. *Cal.* 1 - phyllus, partitus. *Petala* laciniata. *Caps.* 1 - locularis, ore dehiscens. Lin. sy. pl. G. 664.

\dagger Sp. 1. RESEDA COCHINCHINENSIS. α Hoa phan.

Differ. spec. Res. *foliis* 5 - nerviis: *floribus* trigynis: *calycibus* 5 - partitis: *pedunculis* subdivisis.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, multiplex, 8 - pollicaris, erectus, tenuis. *Folia* lato-lanceolata, integerrima, 5 - nervia, glabra, sessilia, opposita. *Flos* luteus, terminalis, pedunculis subdivisis. *Calyx* 5 - partitus. *Corolla* rotata, petala 5, subæqualia, rotundata, laciniata. *Stamina* 18 circiter. *Styli* 3. *Caps.* 3 - valvis, 1 - locularis, polysperma, apice dehiscens.

Habitat in agris Cochinchinæ.

\dagger Sp. 2. RESEDA CHINENSIS. β Thin Kí hoàm.

Differ. spec. Res. *foliis* lato-lanceolatis, integris, glabris: *floribus* solitariis, trigynis: *staminibus* Iccsandris: *calycibus* 5 - partitis.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 10 - pollicaris, quadragonius, multiplex, sub-erectus. *Folia* lato-lanceolata, integerrima, glabra sessilia, opposita. *Flos* luteus, pedunculis monofloris solitariis. *Calyx* 5 - partitus. *Corolla* petala 5, inæqualia. *Stamina* 30 circiter. *Styli* tres. *Capsula* 1 - locularis, polysperma, apice dehiscens.

Habitat suburbia Contoniensia in Sinis.

Usus. Hanc, & præcedentem speciem æmulas inveni Luteolæ, ad tingendas telas colore flavo, aut viridi utiles.

Sp. 3. RESEDA ODORATA. & . . .
Differ. spec. Ref. *foliis integris*, *trilobisque*: *calycibus* florem *æquantibus*. Lin. sp. 12.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, *sesquipedalis*: *ramis* longis, debilibus, ascendentibus. *Folia* *integra*, 3-lobaque, lanceolata, glabra, reflexa, alterna. *Flos* albus, spicis oblongis, terminalibus. *Calyx* 6-phyllus, patulus, foliolis linearibus, inæqualibus. *Corolla* petala 4-5, laciniata, inæqualia, inferius minimum. *Stamina* 16 circiter. *Styli* 3. *Capitula* 1-locularis, tricornis, ore dehiscens, *seminibus* ovatis, compressis. *Flos* suaveolens.

Observavī Cantone Sinarum ab Europā Oriundam.

GENUS XL. TACCA.

Char. Gener. *Flos* superus. *Cor.* 6-petala, *fornicata*. *Cal.* 6-phyllus. *Bacca* sicca, angulata, 3-locularis. Lin. Jun. suppl. pl. pag. 37.

Sp. 1. TACCA PINNATIFIDA. ✕ Cay Nua. 3 . . .

Differ. spec. Tac. *caule* *simplicissimo*: *foliis pinnatifidis*: *umbellā terminali*.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 3-pedalis, crassus, erectus, teres, scaber, rubescens, *simplicissimus*. *Folia magna*, expansa, plerumque tria numero, laciniato-pinnata, laciniis acutis, glabris, inæqualibus. *Flos* sub-viridis, pedunculo erecto, terminali, in umbellam floriferam, sub-rotundam diviso. *Calyx* 6-phyllus. *Corolla* 6-petala. *Bacca* infera, sub-ovata, 6-gona, 3-locularis: *seminibus* ovatis. *Stamina* plerumque 12, sub-fessilia.

Habitat frequens in Cochinchinā culta in hortis, & agris: etiam in Chinā.

Lin. Jun. sup. pl. pag. 251. *Tacca sativa*. Rumph. Amb. 1. 8. c. 89. tab. 112.

Ufus. Radix hujus plantæ est tuber, pugnum crassum, sub-rotundum, edule. Petioli, & caules diu elixati deponunt acrimoniam, & similiiter cibo apud redduntur.

It qd.

TE

DODECANTRIA TETRAGYNTIA

AT TETRAGYNTIA.

GENUS XII. DICHROA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium monophyllum : tubo sub-globofo : limbo brevi, dentato, patente.

Cor. Petala 5, ovato-lanceolata, crassa, patentia, calyce longiora.

Stam. Filamenta 15, filiformia, inæqualia, omnia corollâ breviora. Antheræ sub-ovatæ, planiusculæ, biloculares, stantes.

Pist. Germen sub-rotundum, calyce clausum. Styli 4, crassi, filamentis subæquales. Stigmata ovata, emarginata.

Peric. Bacca calycina, sub-rotunda, 4-locularis, polysperma.

Sem. Multa, sub-rotunda.

Nom. (Δ 's bis, X' color) a duplii colore, quo flos hinc, inde distinguitur.

Char. Gener. Cal. 4-dentatus. Cor. petala 5 lanceolata. Bacca calycina, 4-locularis, polysperma.

+ Sp. 1. DICHROA FEBRIFUGA. a Cay Thuong son, Châm Chân.

Differ. Spec. Dic. foliis lanceolatis, oppositis: corymbis terminalibus.

Hab., & notæ. Frutex arboreus, caule recto, 9 pedes alto: ramis patentibus. Folia lanceolata, glabra, sub-ferrata, palmari longitudo, sessilia, opposita. Flos terminalis, corymbis racemosis. Corolla exterius alba, intus cærulea, sicut etiam stamina.

Habitat loca montana in Cochinchinâ, & Chinâ.

Virtus: foliorum, & radicis. Febrifuga. Febres tertianas, & quartanas pertinaces, ac diuturnas fæliciter expellit. Solet excitare vomitum, si cruda assumatur: si vero cum vino diu, & lento igne coquatur ad consumptionem liquoris, tunc per sedem tartummodo purgat, & obstructions aperit. Imprimis utuntur indigenæ foliorum decocto, quod adjunctâ Glycyrrhizâ mitius operatur. Senibus, & dehilibus minus tuta.

PEN

PENTAGYNTIA.

AT GENUS XIII. MILTUS.

Descriptio Naturalis.

- Cal. Perianthium inferum, 5 - phylum : foliolis ovatis, concavis, rugosis, coloratis, patentibus, persistentibus.
- Cor. Nulla. Nectarium nullum.
- Stam. Filamenta 12, fundo calycis affixa, ipso breviora. Antheræ ovatae, didymæ, stantes.
- Pist. Germen sub-rotundum, sulcatum. Stylus o. Stigmata 5, linearia, deorsum flexa.
- Peric. Capsulae 5, connatae, ovatae, scabre, 1 - spermæ.
- Sem. Ovata, nitida.
- Nom. (Miltus minium) ex colore ruberrimo totius plantæ.

Char. Gener. Cal. 5 - phyllus, inferus. Cor. o. Caps. 5, monospermæ.

Sp. 1. MILTUS AFRICANA. ♂ . . .

Differ. spec. Milt. caule prostrato : foliis congestis, oblongis : floribus congestis, lateralibus.

Hab. Caulis fruticosus, multiplex, tenuis, prostratus, glaber, inermis, 4 pedes longus. Folia oblonga, integrerima, obtusa, crassa, glabra, minuscula sub-sessilia, opposita, congestaque. Florum pedunculi simplices, congesti, laterales. Caules, flores, folia omnia ruberrima.

Habitat in locis aridis insulæ Mozambicci in Africâ.

Observ. Genus hoc, & Glinus. (Lin. sy. pl. G. 666.) haud multum inter se distant.

POLYGYNIA.

AT GENUS XIV. HECATONIA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium inferum, 5 - phylum : foliolis ovatis, concavis, coloratis, reflexis.

Cor. Petala 5, ovata, striata, plana, patentia, calyci subæqualia. Stam.

DODECANDRIA. POLYGYNIA. 303

Stam. Filamenta 18, filiformia, erecta, inæqualia, corollâ breviora, basim receptaculi elongati circumstantia. Antheræ ovatæ, 2-loculares, stantes.

Pist. Germina lenticularia, 100 circiter, eidem receptaculo in columnam elevato circumposita. Stylus 0. Stigma puncta singula exerta ad apicem singuli germinis.

Pericarp. Nullum.

Sem. Lenticularia, totidem, quot germina, eidem receptaculo cylindraceo affixa.

Nom. (Ἐκατόν centum) quia centena germina ex quolibet flore producuntur, Hecatoniam nominavi.

Char. Gener. Cal. 5 - phyllus, inferus. Petala 5. Sem. plurima, nulla.

† Sp. 1. HECATONIA PALUSTRIS. Chú lién.

Differ. spec. Hec. foliis cuneiformibus, glabris : Germinibus in cylindrum collectis.

Hab. Herba annua : caule 1-pedali, sub-erecto, crasso, tubulato; laevi, ramoso. Folia 3-nata, cuneiformia, incisa, glabra, petiolata. Flos luteus, parvus : pedunculis monofloris, solitariis, sub-terminalibus. Fructus cylindraceus, ex receptaculo seminibus tecto, in longum extenso.

Habitat in locis humidis prope Cantonem Sinarum.

† Sp. 2. HECATONIA PILOSA. Khião tsão.

Differ. spec. Hec. foliis lanceolatis, pilosis : germinibus in globum collectis.

Hab. Caulis annuus, pilosus, erectus, 8-pollicaris, ramosus. Folia 3-nata, lanceolata, pilosa, ferrata, aliqua bifida. Flos luteus, sub-terminalis : pedunculis monofloris, solitariis. Germina, & semina acuminata, in capitulum globosum disposita.

Habitat prope Cantonem Sinarum.

DIGANIA

CLAS-

DODGE CANNONIA. FORT GUNNISON.

CLASSIS XII.

ICOSANDRIA.

M O N O G Y I N I A

- | | |
|------------------|--|
| 1. CACTUS. | <i>Cal.</i> superus, 1 - phyllus. <i>Cor.</i> multifida. <i>Bacca</i> 1 - locularis, polysperma. |
| 2. EUGENIA. | <i>Cal.</i> superus, 4 - partitus. <i>Cor.</i> 4 - petala. <i>Bacca</i> 1 - sperma. |
| † 3. OPA. | <i>Cal.</i> superus, 5 - fidus. <i>Cor.</i> 5 - petala. <i>Bacca</i> 1 - sperma. |
| 4. PSIDIUM. | <i>Cal.</i> superus, 5 - fidus. <i>Cor.</i> 5 - petala. <i>Bacca</i> 1 - locularis, polysperma. |
| 5. MYRTUS. | <i>Cal.</i> superus, sub-5 - fidus. <i>Cor.</i> sub-5 - petala. <i>Bacca</i> 2 - 3 - locularis. |
| 6. PUNICA. | <i>Cal.</i> superus, 5 - fidus. <i>Cor.</i> 5 - petala. <i>Pomum</i> 10 - loculare, polyspermum. |
| † 7. DRUPATRIS. | <i>Cal.</i> superus, 5 - fidus. <i>Cor.</i> 4 - petala. <i>Drupe</i> : nuce 3 - loculari. |
| † 8. DECADIA. | <i>Cal.</i> inferus, 3 - phyllus. <i>Cor.</i> 10 - petala. <i>Drupa</i> : nuce 3 - loculari. |
| 9. AMYGDALUS. | <i>Cal.</i> inferus, 5 - fidus. <i>Cor.</i> 5 - petala. <i>Drupe</i> : nuce foraminosa. |
| 10. PRUNUS. | <i>Cal.</i> inferus, 5 - fidus. <i>Cor.</i> 5 - petala. <i>Drupe</i> : nuce integrâ. |
| † 11. PHOBEROS. | <i>Cal.</i> inferus, 10 - fidus. <i>Cor.</i> 0. <i>Bacca</i> 4 - sperma. |
| † 12. DODECADIA. | <i>Cal.</i> inferus, 12 - fidus. <i>Cor.</i> 12 - fida. <i>Bacca</i> - locularis, polysperma. |

D I G Y N I A.

13. CRATÆGUS. *Cal.* superus, 5 - fidus. *Cor.* 5 - petala. *Bac-*
ca 2 - sperma.

PEN-

A I P E N T A G Y N I A.

14. MESPILUS. *Cal.* superus, 5 - fidus. *Cor.* 5 - petala. *Bacca* 5 - sperma.

15. PYRUS. *Cal.* superus, 5 - fidus. *Cor.* 5 - petala. *Po-*
mum 5 - loculare, polyspermum.

16. SPIRÆA. *Cal.* inferus, 5 - fidus. *Cor.* 5 - petala. *Cas-*
psulae plures, congestæ.

P O L Y G Y N I A.

17. ROSA. *Cal.* 5 - fidus. *Cor.* 5 - petala. *Bacca* ca-
lycina, polysperma.

18. RUBUS. *Cal.* 5 - fidus, inferus. *Cor.* 5 - petala. *Bac-*
ca composita.

19. FRAGARIA. *Cal.* 10 - fidus, inferus. *Cor.* 5 - petala. *Re-*
ceptaculum seminum baccatum.

20. POTENTILLA. *Cal.* 10 - fidus, inferus. *Cor.* 5 - petala. *Se-*
mina plurima, mutica.

MONOGYNYA.

GENUS I. CACTUS.

Char. Gener. *Cal.* 1 - phyllus, superus, imbricatus. *Cor.* multiplex.
Bacca 1 - locularis, polysperma. Lin. sy. pl. G. 668.

Sp. 1. CACTUS FICUS INDICA. α Cay Luoi roäng.
Differ. spec. Cac. articulato-prolifer: *articulis* ovato-oblongis: *spinis* setaceis. Lin. sp. 19.

Hab., & notæ. *Frutex* erectus, 6 - pedalis: *caule*, *ramis*, *foliis* nullis, præter articulos folii-formes, aliis similibus impositos, in altum elevatos. *Articuli* 6 - pollicares, oblongo-ovati, compressi, carnosí, semipollicem crassi, glabri, consti *spinis* duriusculis, confertis. *Flos* flavo-ruber, terminalis, solitarius, sessilis, multus, supremo margini articuli insidens. *Calyx* 1 - phyllus, oblongus, teres, truncatus, carnosus, scaber. *Corolla* petala multa, turbinata, brevia, inæqualia. *Filamenta* numerosa, brevia, calyci inserta. *Bacca* calycina, 2 - polycaris, polysperma.

Habitat in Cochinchinâ. Vidi etiam in Benghalâ, & in aliis Indiæ locis.

Thunb. Japon. pag. 198. *Ficus* Indica. Matth. in Diosc. l. 1. c. 145. pag. 235. fig. 3.

GENUS II. EUGENIA.

Char. Gener. *Cal.* 4 - partitus, superus. *Petala* 4. *Drupa* 1 - sperma, quadrangularis. Lin. sy. pl. G. 671.

Sp. 1. EUGENIA MALACCENSIS. α Dad huong taù. β
Differ. spec. Eug. *foliis* integerrimis: *pedunculis* ramosis Lateralibus. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, *ramis* patentibus. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, obscurè viridia, nitida, opposita, petiolis brevibus. *Flos* pallidus, *pedunculis* polyfloris, lateralibus: *calyce* 4 - partito: *corolla* 4 - petalâ: *staminibus* Icosandris. *Bacca* subrotunda, fæpius obtusè 4 - gona, aliquando ovata, sesquipollucris, 1 - sperma, carnosâ, penitus dulcis, rosæ odorem spirans, parum succosa: pelliculâ tenui, nitidâ, flavescente: *semine* plurimque unico, magno, sub-rotundo, molliusculo, nutante, non osco, aut corneo.

Habitat

Habitat culta Malaccæ, Macai Sinarum, & in multis Indiæ locis.
Jambosa Rosacea. Rumph. Amb. I. I. c. 32. pag. 123. tab. 37.
Jambos Malaccensis, fructu aureo, rosam spirante. Burm. Zeyl. pag.

124.

Uſus. Fructus gustui, odoratui, & viſui placens, nec minus ſaluber.

Sp. 2. EUGENIA JAMBOS. a Cay Dað. Annam.

Differ. spec. Eug. foliis integerrimis: pedunculis ramosis, terminalibus. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. Arbor mediocris, ramis patentibus. Folia lanceolata, integerrima, obſcurè viridia, glabra, oppoſita, petiolis brevibus. Flos viridi-luteus, pedunculis ramosis, terminalibus: calyce ſupero, 4-fido, laciñiis obtufis, concavis: petalis 4, concavis, ſub-rotundis: ſtaminibus Icosandris, longis, rubris. Bacca pyriformis, 2-pollicaris, hinc alba, inde rubra, carnoſo-fuccoſa, acriduleſis, inodóra: ſemine 1, magno, molliusculo, ſub-rotundo, nutante.

Habitat in Cochinchinâ, & in multis Indiæ locis.

Prunus Malabarica, fructu umbilicato, pyriformi, Jambos dicta. Ray. hist. part. 2. pag. 1478. Jambosa sylvestris alb. Rumph. Amb. I. I. c. 35. tab. 39. Sed fructus melius exprimitur tab. 38. f. 4.

Uſus. Bacca ſapore acido minus placet, quam præcedentis ſpeciei.

Sp. 3. EUGENIA ACUTANGULA. a Cay Tam lang.

Differ. spec. Eug. foliis crenatis: pedunculis terminalibus: pomis ob-longis, acutangulis. Lin. sp. 6.

Hab., & notæ. Arbor magna, ramis patentibus. Folia lanceolata magna, ſub-crenata, glabra, ſparsa, petiolis longis. Flos rubescens, parvus, ſeffilis, terminalis: racemis ſimplicibus, longiſſimis, pendulis, ſæpe bipedalibus. Calyx campanulatus, ſuperus, 4-fidus, laciñiis ſub-rotundis, perſiſtentibus. Petala 4, parva, ſub-rotunda, concava, conniventia. Filamenta numeroſa, filiformia, longiſſima calyci inhærentia: antheris ſub-rotundis. Germen turbinato-rotundum. Stylus ſubulatus, longior ſtaminibus. Stigma ſimplex. Bacca oblonga, 3-pollicaris, utrinque ſub-acuta, 4-gona angulis acutis, exfucca, corticosa, ſub-rugosa, flavo-fuſca, 1-sperma: ſemine magno, ovato, farinuſculo, glabro.

Habitat in ſylvis Cochinchinæ.

Burm. Ind. pag. 114. Butonica Terrestris, rubra. Rumph. Amb. I. 5. c. 30. tab. 115. Ubi notandum nec fructum, nee flores ſatiſ cohærere cum noſtriſ observatiſ.

Uſus. Semina amariſſima, ſi in lixivio calcis, vel cinerum macerentur, amaritiem deponunt: ſieque eſculentia redduntur, indigenis non ingrata, & valde nutrientia.

† Sp. 4. EUGENIA NERVOSA. & Cây Sđi.

Differ. spec. Eug. *foliis* integerrimis : *floribus* congestis, terminalibus : *Baccis* globosis, nervosis.

Hab., & notæ. *Arbor* magna, ramis patentibus. *Folia* lanceolata, integerrima, glabra. *Flos* albus, pedunculis 1 - floris, congestis, terminalibus. *Cal.* superus, 4 - partitus, magnus : laciniis, obtusis, concavis. *Petala* 4, sub-rotunda, concava, parva, citò decidua. *Filamenta* linearia, plusquam 100, calyci inserta, petalis triplo longiora, in capitulum globosum latè expansa : *antheris* parvis, nutantibus. *Stylus* subulatus, longior staminibus : *stigmate* acuto. *Bacca* globosa, 1 - pollicaris, nervosa, glabra, corticosa fusco-rubra, 1 - sperma : *semine* globo, in multa frusta angulata, subæqualia facilè separabili.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

† Sp. 5. EUGENIA CORTICOSA. & Cây Tlâm bđi.

Differ. spec. Eug. *foliis* ovatis, acuminatis : *racemis* corymbosis : *filamentis* brevissimis.

Hab., & notæ. *Arbor* magna : *ramis* patentibus : *cortice* crasso, fiso, sub-aromatico. *Folia* ovata, acuminata, integerrima, glabra, sub-opposita. *Flos* albo-ruber, parvus, multus, sub-terminalis, *racemis* corymbosis. *Calyx* superus, cyathiformis, sub-truncatus. *Corolla* petala 4, parva, sub-rotunda, clausa. *Filamenta* 20, subulata, corollâ breviora, *calyci* propè marginem insidentia : *antheris* sub-rotundis, minimis. *Bacca* minuta, 3 - linearis, sub-turbinata, glabra, nigricans, 1 - sperma : *semine* sub-rotundo, molliusculo. Ergo non Drupa, sicut nec præcedentes.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Virtus : corticis. Incidens, Deobstruens, Diaphoretica. Sapor sub-ardens, amarescens.

† G E N U S III. O P A.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium tubulosum, campanulatum, superum : limbo brevi, 5 - fido, laciniis rotundatis.

Cor. Petala 5, sub-rotunda, concava, conniventia, ori tubi calycini inserta, limbo parum longiora, citò decidua.

Stam. Filamenta plurima, capillaria, interiori vertici tubi calycis insistentia corollâ duplo longiora. Antheræ ovatae, 2 - loculares, nuntantes.

Pist. Germen sub-rotundum. Stylus subulatus æqualis staminibus. Stigma acutum.

Peric. Bacca sub-rotunda, calycina, truncato-pertusa, 1 - sperma.

Sem. Sub-rotundum.

Nom. (Ὀπή foramen) a foramine baccæ pertusæ.

Char. Gener. *Cal.* superus, 5 - fidus. *Cor.* 5 - petala. *Bacca* pertusa, 1 - sperma.

† Sp. 1. OPA ODORATA. a Cây Nô.

Differ. spec. Op. *ramis* brachiatis : *foliis* lanceolatis, oppositis : *corymbis* terminalibus.

Hab. *Arbuscula* 5 - pedalis : *ramis* brachiatis, patentibus. *Folia* lanceolata, integerrima, nitida, odorata, opposita. *Flos* albus, corymbis racemosis, terminalibus.

Habitat in dumetis Cochinchinæ.

† Sp. 2. OPA METROSIDEROS. a Cây Boung Vâng.

Differ. spec. Op. *foliis* ovatis, ferrata, sparsa : *racemis* sub-terminalibus.

Hab., & notæ. *Arbor* magna, *ramis* patentibus. *Folia* ovata, acuta, inæqualiter ferrata, plana, nitida, dura, sparsa, oppositaque. *Flos* albus, racemis oblongis, subterminalibus. *Calyx* baccatus, campanulato-patens, 5 - fidus, laciniis acutis, deciduis. *Petala* 5, ovata, intus pilosa, calyce longiora. *Filamenta* 20, subulata, corollâ parum longiora, calyci insidentia. *Antheræ* cordatæ, nutantes. *Germen* turbinatum. *Stylus* bipartitus, pilosus, staminibus æqualis. *Stigmata* simplicia. *Bacca* parva, calycina, sub-rotunda, umbellata, exfusca, 1 - sperma : *semine* sub-rotundo.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Metrosideros vera? Rhumph. Amb. l. 4. c. 6. tab. 7.

Usus. Lignum istius arboris est grave, durissimum, constans, fusco-rubrum, optimum ad ædificandum.

GENUS IV. PSIDIUM.

Char. Gener. *Cal.* 5 - fidus, superus. *Petala* 5. *Bacca* 1 - locularis, polysperma. Lin. sy. pl. G. 670.

Sp. 1. PSIDIUM PYRIFERUM. a Cây Ôi.

Differ. spec. Psid. *foliis* lineatis, obtusiusculis, unifloris. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocre, *trunko*, & *ramis* tortuosis, sub-affur-

assurgentibus : *cortice* tenui, lœvi, albido. *Folia* ovata, prorsus obtusa, integerrima, costis multis transversalibus, parallelis, glabra, sub-rugosa, opposita, petiolis brevibus. *Flos* albus, axillaris, solitarius, *pedunculis* crassis, brevissimis. *Cal.* baccatus, 5-fidus. *Corolla* petala 5, ovata, patentia. *Stamina* plurima, calyci insistentia. *Bacca* 2-pollicaris, plerumque ovata, aliquando sub-rotunda, raro pyriformis: pelicula exteriore lœvi, pallida: intus carnosa, alba, vel rubra: *seminibus* plurimis, nidulantibus.

Habitat in Cochinchinâ, & in Chinâ Australi: culta quidem in maiorem arborem excrescit: sylvatica ubique minor, & incomposita.

Cujavus Domestica. Rumph. Amb. I. 1. c. 41 tab. 47. Guajavos, fructu pallido, dulci. Burm. Zeyl. pag. 112.

Sp. 2. PSIDIUM POMIFERUM. α Ôi rùng nhô. β . . .

Differ. spec. Psid. *foliis* lineatis, acuminatis: *pedunculis* 3-floris. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Frutex* 4-pedalis, tortuosus, erectus, lignosus, ramosissimus. *Folia* lanceolata, integerrima, parva, rugosa, scabra, sessilia, opposita, costis parallelis, obliquis. *Flos* albus, parvus, sparsus, *pedunculis* longiusculis, 1-3-floris. *Calyx*, *corolla*, *stamina* sicut præcedentis. *Bacca* pollicaris, vel minor, sub-globosa, lœvis, pallida, intus alba, vel rubra, 1-locularis, polysperma.

Habitat in sylvis Cochinchinæ, & Chinæ.

Cujavus Agrestis Rumph. Amb. I. 1. c. 42. t. 48. Pluk. Phyt. tab. 193. fig. 4.

Ufus. Utriusque speciei fructus edules sunt: viles tamen, nec sapore, aut odore admodum grati. Radix, & tenera folia sunt adstringentia, prosumtque ad cohibendos fluxus ventris, & roborandum stomachum.

† Sp. 3. PSIDIUM CANINUM. β Pă hăo.

Differ. spec. Psid. *foliis* sub-serratis, utrinque tomentosis: *pedunculis* polyfloris axillaribus, & terminalibus.

Hab., & notæ. *Arbuscula* 2-pedalis, ramosissima, diffusa. *Folia* ovata, sub-acuta, sub-serrata, venosa, utrinque tomentosa, alterna, petiolis brevibus. *Flos* albus, racemulis oblongis, axillaribus, & terminalibus. *Cal.* 5-fidus, superus. *Cor.* 5-petala. *Stamina* plurima, calyci insidentia. *Bacca* 3-linearis, ovata, coronata, monolocularis, polysperma. Dicitur Canina, eo quod ad illam accedentes canes delectantur, & tripudiant, sicut feles ad Valerianam.

Habitat agreste prope Cantonem Sinarum.

Sp. 4.

† Sp. 4. PSIDIUM NIGRUM. a. Cay Nen.
Differ. spec. Psid. *foliis* leviter serratis, glabris: *pedunculis* terminatis, ramosis.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, *ramis* tortuosis, patentibus. *Folia* ovato-lanceolata, leviter serrata, utrinque, glabra, sparsa, nervis, aut costis nullis, obscure viridia, nitida. *Flos* albus, pedunculis polyfloris, terminalibus. *Bacca* nigra, minima, rotunda, coronata, 1-locularis, polysperma. *Calyx*, *corolla*, *stamina* generis propria. Semina nidulantia.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

† Sp. 5. PSIDIUM RUBRUM. a. Cay Tram.
Differ. spec. Psid. *foliis* oblongis, integerimis: *floribus* sessilibus; congestis, axillaribus.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, *ramis* patentibus. *Folia* oblonga; obtusa, integerima, glabra, opposita, petialis brevibus. *Flos* albus, multus, sessilis, congestus, axillaris. *Calyx* tubulosus, oblongus, 4-dentatus, superus. *Corolla* petala, 4, parva, inæqualia. *Stamina* plurima, calyci insidentia. *Bacca* calycina, oblonga, rubra, 1-locularis, polysperma, coronata, edulis, acridulcis, parva.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Observ. A Psidio ablegandam non judico; quamvis deficiente 5 parte Calycis, & Corollæ ab illo diffideat.

GENUS V. MYRTUS.

Char. Gener. *Cal.* 5-fidus, superus. *Petala* 5. *Bacca* 2, sive 3-sperma. Lin. sy. pl. G. 672.

† Sp. 1. MYRTUS CANESCENS. a. Cay Simshu.
Differ. spec. Myrt. *floribus* solitariis, sparsis: *foliis* ovatis, 3-nerviis, tomentosis: *petiolis* cauli connatis.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, erectus, 6-pedalis, multiplex, glaber, albidos, lævis: *ramis* patentibus. *Folia* ovata, sub-acuta, integerima, 3-nervia subtus tomentosa, incana, opposita: *petiolis* cauli connatis. *Flos* purpurascens, solitarius, sparsus: *calyx* baccato, magno, 5-fido laciniis rotundatis, patentibus, inæqualibus: *involucro* 2-phyllo, minori substrato. *Petala* 5, sub-rotunda, patentia, calyce longiora. *Stamina* plurima, calyci inserta, corollæ subæqualia. *Bacca* ovata, coronata, tomentosa, purpureonigra, 3-locularis, polysperma: pulpâ succosa, nigrescente, stipitico-dulci, esculepta: *semibus* minusculis, sub-rotundis, multis.

Habi-

Habitat loca inculta ubique in Cochinchinâ.

Arbor foliis rotundis, subtus incanis, trinerviis, flosculis parvis ad foliorum exortum. Herm. Mus. Zeyl. pag. 31. Burm. Zeyl. pag. 29.

† Sp. 2. MYRTUS TRIINERVIA. α Sim ràng lón.

Differ. spec. Myrt. *racemis* longis, sub-terminalibus : *foliis* ovatis, acuminatis, 3 - nerviis, glabris.

Hab., & notæ. Arbor 12 pedes alta : *ramis* patentibus. *Folia* ovata, acuminata, integerrima, 3 - nervia, utrinque glabra, petiolata, opposita. *Flos* albus, sub-terminalis, *racemis* longis. *Calyx* baccatus, 4 - fido. *Corolla* 4 - petala. *Stamina* plurima, calyci insidentia. *Bacca* sub-rotunda, coronata, fusca, glabra, 1 - locularis, polysperma, *seminibus* paucis, inæqualibus, angulatis.

Habitat dumeta Cochinchinæ.

Virtus: corticis, foliorum, fructuum. Exsiccans, Astringens. Convenit in fluxibus immodicis ventris, uteri, &c. Decoctum baccarum cum gummi Lacca valde prodest in ulceribus, & laxitate gengivæ nostrorum. Cortex, & folia sunt etiam vulneraria. Baccæ sunt edules, & silvix semipollicem dianetro æquant.

Sp. 3. MYRTUS ZEYLANICA ? Sim ràng nho.

Differ. spec. Myrt. *pedunculis* multifloris : *foliis* ovatis, sub-petiolatis. Lin. sp. 10.

Hab., & notæ. *Arbuscula* 6 - pedalis *ramis* patentibus. *Folia* ovata, sub-acuminata, sub-ferrata, glabra, alterna, petiolis brevibus. *Flos* albus, *pedunculis* polyfloris, sub-terminalibus : *calyce* baccato, albo, 4 - fido : *corella* 4 - petala. *Stamina* capillaria, 100 circiter, calyci insidentia. *Bacca* candida, parva, sub-rotunda, 1 - locularis, polysperma. *Semina* 8 circiter.

Habitat in dumetis Cochinchinæ.

Myrtus Zeylanica fructu niveo, molli, aromatico, dulci, odore citri. Herm. Mus. Zeyl. pag. 65. Burm. Ind. pag. 115.

Sp. 4. MYRTUS ANDROSÆMOIDES. α Cây maóc hót.

Differ. spec. Myrt. *pedunculis* 3 - fido-multifloris : *foliis* sub-ovalibus, sessilibus. Lin. sp. 11.

Hab., & notæ. *Arbuscula* 5 - pedalis, ramosissima. *Folia* sub-ovalia, sessilia, opposita, glabra, enervia, integerrima. *Flos* terminalis, albo-ruber, *pedunculis* divisus, multifloris. *Calyx* 5 - dentatus, baccatus. *Petala* 5. *Stamina* multa, calyci inhærentia. *Bacca* carnosæ, sub-rotunda, fusco-rubra, parva, polysperma.

Habitat in dumetis Cochinchinæ.

Arbor foliis Ardrosæmi latioribus, plurimas baccas in summitate ramu-

† Sp. 5. MYRTUS CHINENSIS. Tân quát xiong.

Differ. spec. Myrt. *pedunculis multifloris* : *foliis ovato-lanceolatis* ; *serratis*, *pilosis*.

Hab., & notæ. *Frutex* erectus, sesquipedalis : *ramis* paucis, ascendentibus. *Folia* ovato-lanceolata, serraturis brevibus, acutissimis, pilosa, alterna, sub-sessilia. *Flos* albus, sub-terminalis, pedunculis, multi-floris. *Cal.* baccatus, 5-fidus, laciñis acutis, patentibus.

Corolla 5-partita, laciñis ovatis, concavis, in tubum brevissimum basi unitis. *Filamenta* 30 circiter, filiformia, corollæ, æqualia, tubo illius inhærentia: *antheris* sub-rotundis. *Germen* sub-rotundum. *Stylus* filiformis, æqualis staminibus. *Stigma* crassiusculum. *Bacca* sub-rotunda, coronata, 2-loocularis, polysperma: *seminibus* ovatis, paucis.

Habitat inculta prope Cantonem Sinarum.

Observ. Impropias hujus generis existimo plantas, quarum baccae sunt 1-locales; etenim si Myrtus plures loculos non habeat, quo alio charactere satis distinguetur a Psidio? Illas tamen retinui aliorum vota expectans.

GENUS VI. PUNICA.

Char. Gener. *Cal.* 5-fidus, superus. *Petala* 5. *Pomum* multiloculare, polyspermum. Lin. sy. pl. G. 673.

Sp. 1. PUNICA GRANATUM. Cáy thạch lựu. Hán Xě lieu.

Differ. spec. Pun. *foliis lanceolatis*: *caule* arboreo. Lin. sp. I.

Hab., & notæ. *Arbor* infra mediocrem, *trunko* scabro, *crus* crasso: *ramis* longis, debilibus, saepè reclinatis. *Folia* lanceolata, integerima, undulata, pallido-viridia, nitida, glabra, opposita, parva: *petiolis* brevibus. *Flos* pulchrè coccineus, solitarius, pedunculis brevibus, raro bifloris. *Calyx* carnosus, coloratus, 5-fidus, laciñis acutis, erectis. *Corolla* 5-petala, supera, sub-erecta. *Stamina* multa brevia, calyci insidentia. *Stylus* 1, brevis. *Pomum* sub-rotundum, magnum, saepius 9-locale: *acinis* numerosis, rubris, angulatis, aquosis, dulcibus, esculentis, 1-spermis: *cortice* crasso, rubescente, calyce persistente coronatum.

Habitat, & colitur in Chinâ, & Cochinchinâ.

Thunb. Jap. pag. 199. Malum Granatum. Rumph. Amb. I. 2. c. 33. tab. 24. fig. 1.

Virtus: corticis. Adstringens. Pulpa acinorum Refrigerans, Diuretica.

Sp. 2. PUNICA NANA. α Luu Chua thap.

Differ. spec. Pun. *foliis* linearibus : *caule* fruticoso. Lin. sp. 2.

Hab., & note. *Caulis* fruticosus, cespitosus, erectus, 3 pedes altus : *ramis* plurimis ascendentibus : aculeis multis, longis, rectis, solitariis, sparsis. *Folia* lanceolato-linearia, integerrima, minuta, glabra. *Flos* coccineus. *Pomum* 1-pollicare, sub-rotundum, acidum, pallidum, vix in alio a Granato differens præter parvitatem, & saporem.

Habitat culta in hortis Cochinchinæ : nec diligentè culturâ amplius crescit. Ibi etiam invenitur varietas flore albo, & alia flore luxuriante, coccineo, quæ ambæ Granato cedunt magnitudine, Nanam superant.

Punica Americana nana, sive humillima. Tournef. Inst. pag. 636. Aulbl. Guian. pag. 513.

* GENUS VII. DRUPATRIS.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium campanulatum, superum, limbo 5-fido, laciniis acutis.

Cor. Petala 4, sub-rotunda, concava, patentia, calyce sub-longiora.

Stam. Filamenta ultra 20, crassa, corollâ breviora, calyci insidentia. Antheræ 2-lobæ, sub-rotundæ, stantes.

Pist. Germen sub-rotundum. Stylus crassus, staminibus æqualis. Stigma crassissimum.

Peric. Drupa ovalis, lævis, exsucca.

Sem. Nux 3-locularis.

Nom. Drupatris, quasi drupa ternaria, quæ tres nucleos continet.

Char. Gener. Cal. 5-fidus, superus. Cor. 4-petala. Drupa nuce 3-loculari.

* Sp. 1. DRUPATRIS COCHINCHINENSIS. α Cay Deung.

Differ. spec. Drup. *foliis* oblongis, serratis : *spicis* sub-terminalibus.

Hab. Arbor magna, *ramis* ascendentibus, paucis. *Folia* ovato-oblonga, acuminata, ferrata, glabra, magna, alterna. *Flos* albus, parvus, *spicis* oblongis, multis, sub-terminalibus. *Drupa* mediocris, non edulis.

Habitat in altis sylvis Cochinchinæ.

* G E-

† GENUS VIII. DECADIA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 3 - phylum , persistens : foliolis sub-rotundis , pilosiss , carinatis , patentibus , inæqualibus.
 Cor. Petala 10 , sub-ovata , sub-serrata , erecta , calyce longiora , exteriora maiora.
 Stam. Filamenta 30 circiter , petalis subæqualia , illorum basi insuffitentia. Antheræ 2 - lobæ , sub-rotundæ , stantes.
 Pist. Germen sub-rotundum , superum. Stylus filiformis , æqualis statim minibus. Stigma crassiusculum.
 Peric. Drupa ovata , rugosa , parva.
 Sem. Nux ovata , 3 - locularis.
 Nom. Decadiam vocavi ob decadem petalorum , ex quibus constat.

Char. Gener. Cal. 3 - phyllus , inferus. Cor. 10 - petala. Drupa nuce 3 - loculari.

Sp. 1. DECADIA ALUMINOSA. α Cay Deung se.
 Differ. spec. Dec. foliis lanceolatis , ferratis : racemis sub-simplicibus , subterminalibus.
 Hab. Arbor mediocris : cortice lœvi : ramis patentibus. Folia lanceolata , ferrata , alterna , petiolata , glabra , lœtè virentia. Flos albus , minutus , racemis sub-simplicibus , parvis , sub-terminalibus.
 Habitat in sylvis Cochinchinæ.
 Arbor Aluminosa. Rumph. Amb. I. 5. c. 15. tab. 100. Arbor Bobu dicta. Burm. Zeyl. p. 26.
 Uſus. Cortex , & præcipue folia , etiam exſiccata , magni uſus ſunt infeſtoribus indigenis in tingendis telis , quarum colores decocto illorum nitidè exaltantur , & firmantur. Vide citatum Rumph. pag. 160.

GENUS IX. AMYGDALUS.

Char. Gener. Cal. 5 - fidus inferus. Petala 5. Drupa nuce poris perforatæ. Lin. sy. pl. G. 674.

† Sp. 1. AMYGDALUS PERSICA. β Tao ho gin. α Cay daò nhon.
 Differ. spec. Am. ferraturis omnibus acutis : floribus ſeffilibus , folitariis. Lin. sp. 1.
 Hab. , & notæ. Arbor parva , ramis patentibus. Folia lanceolata , alterna , glabra , ferrata , ferraturis brevibus , acutis , æqualibus. Flos Rr ii ſeffilis ,

sessilis, solitarius, campanulatus; coloris rosei diluti: *calyce* 5-fido, infero: *corollâ* 5-petalâ, patente: *staminibus* Icosandris. *Drupa* sub-rotunda, acuminata, fulco longitudinali, carnosa, lanuginosa, pallida, acido-dulcis. In Chinâ Australi, & Cochinchinâ magnitudine vix bipollicari, nec ita sapida, ut in Lusitanâ.

Habitat culta in hortis Sinensibus, unde in Cochinchinam translata. Thunb. Japon. pag. 199. Persica molli carne, & vulgaris. Bauh. Pin. pag. 440. n. 1.

Virtus: nucleorum. Resolvens. Emmenogoga, Eccoprotica.

Sp. 2. AMYGDALUS COMMUNIS. β Hím hò gân. α Hạnh nhơn.

Differ. spec. Am. *foliorum* ferraturis infimis glandulosis: *floribus* sessilibus, geminis. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, *ramis* sub-patentibus. *Folia* ova-ta, acuta, sub-ferrata, glabra, petiolata, sparsa. *Flos* albus, lateralis, sessilis, 2-natus: *calyce* campanulato, 5-fido: *corollâ* 5-petalâ, patente: *staminibus* Icosandris, corollâ brevioribus. *Drupa* ovata, coriacea: nuce foraminofâ, 1-loculari: nucleo oblongo, acuto, eduli, dulci: in aliis amaro.

Habitat, & colitur affatim in Chinâ, tam dulcis, quam amara. In Cochinchinâ puto, quod non sit: mihi certè non occurrit.

Amygdalus sativa. Tournef. Inst. pag. 627. tab. 402. Bauh. Pin. pag. 441. n. 1.

Virt. nucleorum amarorum. Anodyna, Eccoprotica, Diuretica, Emmenogoga. Profunt in Hydrope, Tussi, alvi, & mensium difficultate. Nucleis leviter tostis utuntur Medici indigence in decoctis, etiam in pilulis. Nuclei dulces lenius operantur, & melius sapiunt.

Sp. 3. AMYGDALUS PUMILA. α Đào hoa houng.

Differ. spec. Am. *foliis* venoso-rugosis. Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. *Arbuscula* 5-pedalis, *ramis* patentibus, glabris, fuscо-rubentibus. *Folia* lanceolata, ferrata, venosa, petiolata, alterna. *Flos* rubro-purpureus, maiusculus, lateraris, sub-solitarius. *Calyx* campanulatus, 5-fidus, laciiniis rotundatis, ciliatis. *Corolla* plena, petala 20 circiter, expansa, obtusa. *Fruclus* Persico minor, formâ similis, sapore acidus.

Habitat in Cochinchinâ, non frequens, coliturque ob floris pulchritudinem. Existimo a Sinensibus huc translatam.

Persica Africana, nana, flore incarnato pleno. Tournef. Inst. pag. 625.

Persica Nana, flore carneo, pleno. Pluk. tab. 11. fig. 3.

† Sp. 4. AMYGDALUS COCHINCHINENSIS. α Cây Giang cuóc.

Differ. spec. Am. *foliis* ovatis integerimis: *racemis* parvis sub-terminalibus.

Hab.,

Hab., & notæ. *Arbor magna, ramis patentibus. Folia ovata, acuminata, integerrima, undulata, nitida, alterna. Flos albus, racemis parvis, sub-terminalibus. Calyx inferus, campanulatus, 5-fidus, laciniis ovatis, reflexis. Corolla petala 5, sub-rotunda, concava, patentia, calyce longiora. Filamenta 30 circiter, subulata, calyci inserta, corollæ duplo longiora. Antheræ sub-rotundæ, minimæ. Germen ovatum. Stylus filiformis, æqualis staminibus. Stigma planiusculum, scabrum. Pericarpium drupa semipollicaris, ovato-ventricosa, apice acuta, fusca : nuce reticulato-foraminosa : nucleo simplici, formâ, & odore Amygdali Communis simili.*

Habitat in vastis sylvis Cochinchinæ.

GENUS X. PRUNUS.

Char. Gener. *Cal. 5-fidus, inferus. Petala 5. Drupæ nux futuræ prominulis. Lin. sy. pl. G. 675.*

Sp. I. PRUNUS DOMESTICA. β Múei Xú. α Cây Môi.

Differ. spec. *Prun. pedunculis sub-solitariis : foliis lanceolato-ovatis, convolutis : ramis muticis. Lin. sp. 12.*

Hab., & notæ. *Arbor mediocris, ramis patentibus, inermibus. Folia lanceolato-ovata, sub-ferrata, glabra, sparsa, petiolis brevibus. Flos albus, lateralis, mutitus, pedunculis brevibus, congestis. Calice 5-fido, staminifero : petalis 5, obtusis. Drupa sub-rotunda, nigricans, vel pallida, 1-pollicaris, plerumque acida, 1-sperma. Habitat in plerisque Sinarum provinciis : inde in Cochinchinam delata, ubi raro fructificat.*

Tumb. Jap. pag. 403. *Pruna magna, crassa sub-acida. Bauh. Pin. pag. 443.*

Observ. Ex diversitate loci multas patitur varietates.

\dagger GENUS XI. PHOBEROS.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium inferum 10-fidum, persistens : laciniis ovatis, concavis, 5 alternis duplo maioribus, omnibus patentibus, similibus.

Cor. Nulla.

Stam. Filamenta 100 fere, capillaria, basi calycis insidentia, ipso longiora. Antheræ sub-ovatae, minimæ.

Pist. Germen sub-rotundum. Stylus crassus, æqualis staminibus. Stigma crassiusculum.

Peric. Bacca ovata, carnosa, lœvis, 1-localaris, sub-quadrifisperma. Sem.

Sem. Sub-ovata.

Nom. (*Φοβερός* formidabilis) ob caulem magnis aculeis horridum.

Char. Gener. *Cal.* 10-fidus, inferus. *Cor.* o. *Bacca* 1-locularis, sub-4-sperma.

† Sp. 1. PHOBEROS COCHINCHINENSIS. *α* Cây Gai bom.

Differ. spec. Phob. *caule* toto aculeato: *pedunculis* terminalibus.

Hab. *Frutex* 10-pedalis, lignosus, erectus, totus aculeatus: *aculeis* longis, rectis, subulatis, solitariis, axillaribus. *Folia* ovata, sub-ferrata, plana, dura, glabra, alterna. *Flos* albus, pedunculis polyfloris, terminalibus.

Habitat in Cochinchinâ, ubi, connexis ejus ramis, fiunt sepes, cui-libet animali horribiles, & imperviae.

† Sp. 2. PHOBEROS CHINENSIS. *β* Cō tsū.

Differ. spec. Phob. *ramis* inferioribus aculeatis, sterilibus: superioribus inermibus, floriferis.

Hab., & notæ. *Frutex* erectus, lignosus, 8-pedalis: *ramis* expansis, inferioribus aculeatis, aculeis longis, rectis, sub-solitariis, superioribus inermibus. *Folia* sparsa, oppositaque, ovata, integerima, plana, glabra, petiolata. *Flos* pallidus, pedunculis polyfloris, lateralibus, ramis superioribus inhærens. *Pericarpium* *Bacca* carnofa, parva, ovata, seminibus paucis, unico loculo. *Calyx*, *corolla*, *stamina* ut in primâ specie.

Habitat in Chinâ, ubi ex eâ similiter ordinantur sepes.

Oxycantha Javanica. Rumph. Auct. cap. 44. tab. 19. fig. 3.

† GENUS XII. DODECADIA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium inferum, patulum, 12-fidum: laciinis obtusis, brevissimis.

Cor. Monopetala, campanulata: tubo crasso, brevi: limbo 12-fido: laciinis acutis, pilosis, calycem superantibus.

Stam. Filamenta 30, filiformia, tubo corollæ insistentia, limbo longiora. Antheræ sub-rotundæ.

Pist. Germen ovatum. Stylus subulatus, longior staminibus. Stigma. simplex.

Peric. *Bacca* ovata, parva, polysperma.

Nom.

Nom. (Δωδεκά duodecim : ἀνθός flos) ex duodecim partibus corollæ, & calycis, e quibus flos constat.

Char. Gener. *Cal.* 12 - fidus, inferus. *Cor.* 12 - fida, campanulata.
Bacca.

† Sp. 1. DODECADIA AGRESTIS. α Cây Chon dung.

Differ. spec. Dod. *foliis lanceolatis, integerrimis, alternis: floribus racemosis, axillaribus.*

Hab. *Arbor magna, ramis patentibus. Folia ovato-lanceolata, intergerrima, glabra, alterna. Flos parvus, albicans, racemis simplicibus, axillaribus. Baccam maturam non vidi; ideo certò decernere non potui circa semina, & loculos.*

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

D I G Y N I A .

G E N U S XIII. C R A T Æ G U S .

Char. Gener. *Cal.* 5 - fidus. *Petala* 5. *Bacca* infera, disperma. Lin. G. 678.

Sp. 1. CRATÆGUS INDICA. α Cây Boung Vang tlái.

Differ. spec. Crat. *foliis lanceolatis, ferratis: caule inermi: corymbis squamosis.* Lin. sp. 7.

Hab., & notæ. *Arbor magna, inermis, ramis patentibus. Folia lanceolata, inæqualiter ferrata, glabra, alterna. Flos albus corymbis racemosis, squamosis, terminalibus. Calyx superus, 5 - fidus, in senectute truncatus. Corolla petala 5, sub-rotunda, patentia. Stamina Icosandra. Styli 2. Bacca calycina sub-rotunda, umbilicata, carnosa, 1 - locularis, edulis. Semina 2 - 4, oblonga.*

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Burm. Ind. pag. 117.

Usus. Lignum arboris rubescens, grave, & tenax aptissimum est ad formandos remos, vel quoslibet palos, qui impulsu, vel pondere gravati aliquantulum cedunt, nec franguntur.

† Sp. 2. CRATÆGUS BIBAS. α Pi pá xú. α Ti ba diệp.

Differ. spec. Crat. *Inermis, foliis lanceolatis, ferratis, tomentosis: racemis terminalibus, hispidis.*

Hab., & notæ. *Arbor mediocris, inermis: ramis patentibus. Folia lanceolata, inæqualiter ferrata, tomentosa, sparsa, petiolis brevibus.*

bus. *Flos* albus, *racemis* hispidis, magnis, terminalibus. *Calyx* 5-fidus baccatus. *Corolla* 5-petala, patens. *Stamina* Icosandra. *Styli* 2. *Bacca* mediocris, pyriformis, flava, lanuginosa, acido-dulcis, succosa, edulis, 1-locularis, 2, 3-sperma: cortice tenui, pulpâ albâ.

Habitat abundè culta Macai, & Cantone Sinarum. Ex nomine Sinico Pi-pa corruptè vocantur Bibas ab Europæis.

Arbor sinicè dicta Pi-pa. Pluk. Amalh. pag. 26. tab. 371. fig. 2.

Virtus: foliorum. Refrigerans, Stomachica, Pulmonica. Sitim, & vomitum cohibent: faucium, & oris ulcera sanant.

† Sp. 3. CRATAEGUS RUBRA. β Uly mö.

Differ. spec. Crat. *Inermis* foliis cuneiformi-ovatis, crenatis, glabris, ad apicem ramorum congestis: *racemis* terminalibus, lævibus.

Hab., & notæ. Arbor magna: *ramis* patentibus, inermibus. *Folia* apice ovata, basi attenuata, crenata, glabra, alterna, ad ramorum apicem fasciculata. *Flos* sub-terminalis, *racemis* compositis, brevibus. *Calyx* campanulatus, 5-fidus, pilosus, ruber: laciniis subulatis, longis, expansis, in senectute deciduis. *Corolla* petala 5, ovata, patentia, calycis fauci inferta. *Filamenta* 20, capillaria, inæqualia, calyci insistentia, corollâ breviora: *antheris* sub-rotundis. *Germen* sub-rotundum infra receptaculum. *Styli* 2, filiformes, æquales staminibus. *Stigmata* crassifuscula. *Eccâ calycina*, sub-rotunda, rubra, edulis, 2-locularis, 2-sperma: seminibus sub-ovatis.

Habitat agrestis prope Cantonem Sinarum.

Observ. Crat. Crus galli, & Crat. Tomentosa (Lin. sy. pl. sp. 5, & 6.) cum hâc nostrâ affinitatem habent: sed præter alias differentias ambæ illæ sunt aculeatæ, nostra inermis.

PENTAGYNA.

GENUS XIV. MESPILUS.

Char. Gener. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5. *Bacca* infera, 5-sperma. Lin. sy. pl. G. 681.

Sp. 1. MESPILUS PYRACANTHA. β Tân Kieu tsù: Xân châ. α Son tra: Dang Kieu tu.

Differ. spec. Mesp. *spinosa*: *foliis* lanceolato-ovatis, crenatis: *caly-cibus* fructus obtusis. Lin. sp. 2.

Hab.,

Hab., & notæ. *Arbor* parva, caule *spinoso*, 6-pedali: *ramis* patentibus: *aculeis* brevibus, rectis, sparsis. *Folia* lanceolato-ovata, sub-crenata, glabra, sparsa, petiolata. *Flos* albus, pedunculis longis, 1-floris, polynatis, terminalibus. *Calyx* baccatus, 5-fidus, laciniis acutis. *Corolla* 5-petala. *Stamina* Icosandra. *Styli* 5. *Bacca* rubro-fusca, 1-pollicaris, sub-rotunda, obtusè 5-gona, 1-loccularis, 5-sperma: *seminibus* osseis, sub-reniformibus. *Fructus* interius sub-flavus, carnosus, acridulcis, sapidus, saluber.

Habitat in Chinâ tam agrestis, quam culta.

Mespilus oxyantha. Pluk. Amalth. pag. 216. tab. 453. fig. 3. *Oxyantha* Dioscoridis pyrifolio. Bauh. Pin. pag. 454. n. 9.

Virt.: fructus maturi. Sub-astringens, stomachica. Frequens illorum est usus apud indigenas in Anorexiâ, Dysenteria, & Tenesmo phlegmaticis; & in purgatione lochiorum nimiâ, ac dolorificâ.

GENUS XV. PYRUS.

Char. Gener. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5. *Pomum* inferum, 5-lokulare; polyspermum. Lin. sy. pl. G. 682.

Sp. 1. PYRUS COMMUNIS. β Ly: Tú. α Cây Lê tau.

Differ. spec. Pyr. *foliis* lœvibus, ferratis: *floribus* corymbosis. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, *ramis* patentibus. *Folia* ovata, acuminata, sub-integerrima, glabra, sparsa, petiolata. *Flos* albus, corymbis brevibus terminalibus. *Poma* sub-rotunda, fusco-rufa, vel pallida, carnoſa, dura, acerba.

Habitat frequens in hortis Cantoniensibus: in provinciis Sinensis Borealis succosiora, & sapidiora sunt pyra, non tamen Europæorum æmula. In Cochinchinâ rara est hæc arbor in hortis magnatum, nec ibi unquam vidi fructificantem.

Thunb. Jap. pag. 207. *Pyrus Satiya*. Bauh. Pin. pag. 439. n. 1.

Sp. 2. PYRUS MALUS. § Pim pō. α Cây Bình ba.

Differ. spec. Pyr. *foliis* ferratis: *umbellis* sessilibus. Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, *ramis* expansis. *Folia* lato-lanceolata, sub-integerrima, glabra, sparsa, petiolata. *Flos* albus, umbellis sessilibus, terminalibus. *Poma* sub-globosa, vel sphæroidea, basi, & apice concava, lœvia, nitida, hinc alba, inde lætè rubra, edulia, sub-acida, parum succosa: aspectu jucundiora, quam gustu.

Habitat in locis Borealis imperii Sinensis.

Pyrus foliis ferratis: pomis basi concavis. Hort. Cliff. pag. 198. Ma-
la
Ss

la sylvestria, quæ, & alba, & rubra. Bauh. Pin. pag. 433. n. 7.

Sp. 3. PYRUS CYDONIA. β Mū qūa : Mim Xū. α Mouc qua.

Differ. spec. Pyr. foliis integerrimis : floribus solitariis. Lin. sp. 6.

Hab., & notæ. Arbor mediocris, ramis patentibus : interdum aculeis rectis, sparsis. Folia lato-lanceolata, integerrima, sparsa, subtus tomentosa. Flos rubescens, pedunculis 1-floris, solitariis, sparsis. Pomum ovatum, apice, & basi umbilicatum, semipedale, luteum, lanuginosum, odoratissimum, acerbum, vix succosum, du-

rissimum, 5-loculare : semenibus multis, conglutinatis. Fructus odore gratior, quam in Europâ, sed vix edulis ab duritiem.

Habitat in Chinâ versus Septentrionem : Cantone raro.

Thunb. Japon. pag. 208. Umbats, vulgo Marmeer. Kæmpf. Am. exot. pag. 800.

Virtus : fructuum. Astringens, Roborans. Prodest in fluxu ventris, & vomitu : in debilitate nervorum : manuum, & pedum doloribus : sitim allevat : in hydrope utilis.

GENUS XVI. SPIRÆA.

Char. Gener. Cal. 5-fidus. Petala 5. Capsulae polyspermæ. Lin. sy. pl. G. 686.

† Sp. 1. SPIRÆA CANTONIENSIS. β Tsî choüc hōa.

Differ. spec. Spir. foliis lanceolatis, apice incisis : umbellis pedunculatis, terminalibus.

Hab., & notæ. Caulis fruticosus, 4-pedalis, erectus, multiplex : ramis ascendentibus. Folia lanceolata, ad apicem serrato-incisa, ad basim integerrima, alterna, petiolata. Flos albissimus, umbellis simplicibus, convexis, pedunculatis, terminalibus. Calyx 5-partitus, patens. Corolla petala 5, plana. Stamina 20, capillaria, calyci inserta. Styli 5. Capsulae 5, minimæ, polyspermæ.

Habitat Cantone Sinarum.

Observ. Spiræa Chamaedrifolia, (Lin. sp. 5.) & spiræa Incisa (Thunb. Jap. pag. 213.) non longè a Cantonensi recedunt.

POLYGINIA.

GENUS XVII. ROSA.

Char. Gener. Petala 5. Cal. urceolatus, 5-fidus, carnosus, collo coarctatus. Sem. plurima, hispida, calycis interiori lateri affixa. Lin. sy. pl. G. 687.

Sp. 1.

Sp. 1. ROSA CINNAMOMEA. α Hoa Koe. β Mùi hōa.

Differ. spec. Ros. *germinibus* globosis : *pedunculis* glabris : *caule* aculeis stipularibus : *petiolis* sub-inermibus. Lin. sp. 3.

Hab. , & notæ. *Caulis* fruticosus, cespitosus, 3-pedalis, ramosus, aculeatus : *petiolis* etiam aculeatis. *Flos* ruberrimus, simplex, 5-petalus : *germinibus* globosis : *pedunculis* inermibus : odore vix allo.

Habitat ubique culta in Cochinchinā, & Chinā.

Rosa odore Cinnamomi, simplex. Bauh. Pin. pag. 483. n. 7.

Sp. 2. ROSA SPINOSISSIMA. α Hoa hoàng lợt. β . . .

Differ. spec. Ros. *germinibus* globosis, glabris : *pedunculis* hispidis : *caule*, petiolisque aculeatissimis. Lin. sp. 6.

Hab. , & notæ. *Caulis* fruticosus, 6-pedalis, sub-scandens, aculeatissimus. *Flos* rubescens, inodorus : *corollā* simplici, 5-petalā : *germinibus* sub-globosis, glabris : *petiolis*, & *pedunculis* aculeatis.

Habitat ubique in Cochinchinā. Puto eandem esse Rosam Sinicam. Lin. sp. 9.

Sp. 3. ROSA CENTIFOLIA. α Hoa hoàng tau. β Tá Mùi hōa.

Differ. spec. Ros. *germinibus* ovatis, *pedunculis* que hispidis : *caule* hispido-aculeato : *petiolis* inermibus. Lin. sp. 11.

Hab. , & notæ. *Caulis* 2-pedalis, fruticosus, erectus, hispido-aculeatus. *Petoli* inermes. *Flos* magnus, plenus, dilutè ruber, odoratissimus : *germinibus* ovatis : *pedunculis* hispidis.

Habitat in Chinā : ægrè colitur in Cochinchinā.

Rosa multiplex media. Bauh. Pin. pag. 482. R. Centifolia Batavica. Clus. hist. 1. pag. 114.

Sp. 4. ROSA INDICA. α Hoa hoàng cong gai. β Trâm hōa.

Differ. spec. Ros. *germinibus* ovatis, *pedunculis* que glabris : *caule* sub-inermi : *petiolis* aculeatis. Lin. sp. 15.

Hab. *Caulis* fruticosus, sub-inermis, 8-pedalis, sub-scandens. *Flos* ruber, sub-plenus, inodorus : *germinibus* ovatis, *pedunculis* glabris. *Petoli* aculeati. Sæpe tota planta inermis.

Habitat in Cochinchinā, & Chinā communissima.

Burm. Ind. pag. 117.

Sp. 5. ROSA ALBA. β Kín ỳm. α Kim anh tú: Hoa Hount tiêng.

Differ. spec. Ros. *germinibus* ovatis, glabris : *pedunculis* hispidis : *caule*, *petiolis* que aculeatis. Lin. sp. 17.

Hab. , & notæ. *Caulis* fruticosus, longus, scandens, ramosus : *aculeis* multis, recurvis, sparsis. *Folia* pinnata 1-2-juga, cum impari, foliolis

liolis lato-lanceolatis, ciliatis: *petiolis* aculeatis. *Germina* oblongo-ovata, glabra: *pedunculis* hispidis. *Flos* pallidus, 5-petalus, inodorus: *pedunculis* terminalibus, polyfloris.

Habitat in Chinâ, & Cochinchinâ.

Rosa Alba, vulgaris maior. Bauh. Pin. pag. 482. n. 9.

† S. 6. ROSA NANKINENSIS. α Hoa houng tieo. β Tsiāo Mui hoā.

Differ. spec. Ros. *germinibus* ovatis, glabris: *caule* multiplici, ramosissimo, aculeato, tortuoso, brevissimo: *pedunculis* hispidis.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, lignosus, 6-pollicaris, crassus, multiplex, ramosissimus, totus aculeatus. *Folia* impari-pinnata, 3-juga: *petiolis* aculeatis: *foliolis* ovato-oblongis, acuminatis, ciliato-serratis, planis, sessilibus. *Flos* pallide ruber, parvus, plenus: *petalis* ovato-oblongis, sub-acuminatis, planis: *pedunculis* hispidis. *Germina* ovata, calycina, glabra: *calycis laciniis* 5, partim aculeatis, partim nudis.

Habitat Cantone Sinarum, & alibi, a Nankino oriunda. Affinitatem habet cum Rosâ Pumilâ. Lin. Jun. suppl. pl. pag. 262. Ait in Nankinensi fructus nec magnus, nec pyriformis: caulis vero aculeatus totus.

GENUS XVIII. RUBUS.

Char. Gener. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5. *Bacca* composita acinis monospermis. Lin. sy. pl. G. 688.

Sp. 1. RUBUS MOLUCCANUS. α Cây Ngei tlòn lá.

Differ. spec. Rub. *foliis* simplicibus, cordatis, sub-lobatis: *caule* aculeato, decumbente. Lin. sp. 10.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, procumbens, longus, ramosus: aculeis plurimis, brevibus, sparsis. *Folia* simplicia, cordata, subrotunda, lobata lobis inaequalibus, sub-obtusis, serrata, rugosa, subtus tomentosa: *petiolis* longis, aculeatis, sparsis. *Flos* albus, terminalis, racemis oblongis: *braecheis* laceris. *Calyx* 5-fidus inferus. *Corolla* saepius 6-petala. *Stamina* Icosandra. *Styli* multi. *Bacca* parva, sub-rotunda, rubra, composita bacculis monospermis. Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Thunb. Japon. pag. 219. Rubus Latifolia. Rumph. Amb. I. 7. c. 48. tab. 47. fig. 2.

Sp. 2. RUBUS PARVIFOLIUS. α Cây Ngei hoa tiá. β . . .

Differ. spec. Rub. *foliis* ternatis, subtus tomentosis: *caule* hirto, *petiolis* que aculeis recurvis. Lin. sp. 4.

Hab.,

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, longus, scandens, *ramis* multis: *aculeis* paucis, longiusculis, recurvis. *Folia* ternata, parva, subrotunda, ferrato-incisa, subtus tomentosa, albicantia: *petiolis* aculeatis. *Flos* purpureus, *paniculâ* laxâ, terminali. *Calyx* acute 5-partitus. *Corolla* 5-petala. *Bacca* sub-rotunda, rubra, composita acinis monospermis.

Habitat in sylvis Cochinchinæ, & Chinæ.
Rubus Parvifolia. Rhumph. Amb. l. 7. c. 48. tab. 47. fig. 1.

Sp. 3. RUBUS FRUTICOSUS. α Cây Ngei chia lá.

Differ. spec. Rub. *foliis* quinato-digitatis, ternatisque: *caule*, *petiolis* que aculeatis. Lin. sp. 7.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, longus, procumbens, aculeatus, ramosus. *Folia* quinato-digitata, ferrata, subtus tomentosa, flavescens: *petiolis* aculeatis, sparsis, longis. *Flos* albus, racemis terminalibus, *pedunculis* aculeatis. *Bacca* sub-rotunda, nigra, edulis, dulcis, composita acinis monospermis, minimis.

Habitat sylvas, & sepes Cochinchinæ.

Rubus Vulgaris, fructu nigro. Bauh. Pin. pag. 479. n. 1. Tournef. Inst. pag. 614. tab. 385. Rubus Fruticosus. Forsk. Arab. pag. cxiii.

Virtus. Baccarum. Refrigerans. Radicis Astringens.

GENUS XIX. FRAGARIA.

Char. Gener. *Cal.* 10-fidus. *Petala* 5. *Receptaculum* seminum ovatum, baccatum, deciduum. Lin. sy. pl. G. 689.

Sp. 1. FRAGARIA VESCA. β Fú puen tsù. α Phúc bon tu.

Differ. spec. Frag. *flagellis* reptantibus. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, perennis, divisus, brevis: *flagellis* reptantibus, teretibus, pubescentibus. *Folia* ovata, ferrata, subtus pubescentia, 3-nata: *petiolis* longis, erectis, rubescentibus. *Flos* albus: *pedunculis* monofloris, longis, axillaris. *Calyx* 10-fidus, laciniis subulatis, patentibus, permanentibus. *Corolla* petala 5, patentia. *Stamina* plurima, brevia, calyci inferta. *Bacca* parva, rubra, sub-rotunda, sapida: *seminibus* multis, sparsis, minimis, receptaculum carnosum circumdantibus.

Habitat, & colitur in Chinâ.

Fragaria Vulgaris. Bauh. Pin. pag. 326. n. 1. Hill. Brit. herb. pag. 2. tab. 1. fig. 2. Gmel. Sibir. 3. pag. 180.

Virtus. Refrigerans, Diuretica. Baccarum succus visum acuit, si cum melle oculis instilletut.

G E N U S X X . P O T E N T I L L A .

Char. Gener. *Cal.* 10-fidus. *Petala* 5. *Semina* sub-rotunda, nuda, *receptaculo* parvo, exsucco affixa. Lin. sy. pl. G. 690.

Sp. 1. POTENTILLA FRUTICOSA. ♂ Yam chi chö. & Duong trinh daoc.
Differ. Spec. Pot. *foliis* pinnatis: *caule* fruticoso. Lin. sp. 1.

Hab, & notæ. *Caulis* fruticosus, erectus, rectus, rubescens, 2-pedalis: *radice* simplici, crassâ, obliquâ: *radiculis* crassis, longis. *Folia* impari-pinnata, 3-juga, alterna, petiolata: *foliolis* lanceolatis, integerimis, æqualibus, pubescentibus, subsessilibus. *Flos* aureus, spica oblongâ, simplici, terminali. *Calyx* 10-fidus, lacinias acutis, erectis. *Corolla* petala 5, rotundata, patentia. *Stamina* numerosa, calyci inserta, corollâ sub-longiora. *Semina* multa, acuminata, calyce defensa, receptaculo exsucco affixa.

Habitat in provinciis Borealibus Sinensis.

Pentaphylloides Fruticosa. Amman. Ruthen. pag. 88, 89. tab. 17, 18. fig. 1. Ubi præter alia notandum folia ibi delineari digitata, floresque sub-solitarios: cum in nostrâ flores in spicam paucifloram assurgent, foliaque sint verè pinnata, basi inter se distantes.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

* Flores Tetrapetali.

- | | |
|------------------|--|
| 1. CHELIDONIUM. | <i>Cal.</i> 2 - phyllus, inferus. <i>Siliqua.</i> |
| 2. CAPPARIS. | <i>Cal.</i> 4 - phyllus, inferus. <i>Bacca</i> pedicellata, corticola. |
| 3. ACTÆA. | <i>Cal.</i> 4 - phyllus, inferus. <i>Bacca</i> 1 - locularis. <i>Semina</i> gemino ordine. |
| 4. CAMBOGIA. | <i>Cal.</i> 4 - phyllus, inferus. <i>Bacca</i> 8 - sperma, 8 - angularis. |
| 5. CARYOPHYLLUS. | <i>Cal.</i> superus. <i>Bacca</i> 1 - sperma, coronata. |

** Flores Pentapetali, inferi.

- | | |
|------------------|---|
| 6. VATERIA. | <i>Caps.</i> 3 - valvis : <i>semine</i> 1, arillato. <i>Cal.</i> 5 - fidus. |
| 7. CORCHORUS. | <i>Caps.</i> multivalvis, multilocularis. <i>Cal.</i> 5 - phyllus. |
| † 8. ARSIS. | <i>Bacca</i> 1 - sperma, pedicellata. <i>Cal.</i> 5 - phyllus. <i>Petala</i> campanulata. |
| † 9. FALLOPIA. | <i>Bacca</i> 4 - sperma. <i>Cal.</i> communis 12 - phyllus. <i>Perianthium</i> o. |
| † 10. CRASPEDUM. | <i>Bacca</i> 1 - locularis, polysperma. <i>Cal.</i> 5 - phyllus. <i>Petala</i> fimbriata. |
| † 11. AUGIA. | <i>Drupa</i> compressa. <i>Cal.</i> sub-truncatus. <i>Petala</i> oblonga. |
| 12. ELÆOCARPUS. | <i>Drupa</i> nucleo criso. <i>Cal.</i> 5 - phyllus. <i>Petala</i> lacera. |

*** Flo-

*** Flores Hexapetali, inferi.

13. THEA. *Caps.* 3-locularis, 1-sperma. *Cal.* 3-6-
phyllus. *Petala* 5-9.
14. LAGERSTROEMIA. *Caps.* 6-locularis, polysperma. *Cal.* 6-
fidus. *Petala* crispa.

**** Flores Polyptali, inferi.

15. NYMPHÆA. *Bacca* multilocularis, corticosa. *Cal.* 4-5-
phyllus, deciduus.

***** Flores Apetali, inferi.

16. SEGUIERIA. *Caps.* 1-sperma: semine alato. *Cal.* 5-
phyllus.

- † 17. THILACHIUM. *Bacca* 10-gona, polysperma. *Cal.* folli-
culus, circumscissus.

DIGYNIA.

18. CALLIGONUM. *Cal.* 5-phyllus, inferus. *Cor.* o. *Peri-*
carpium baccatum.

19. PEONIA. *Cal.* 5-phyllus, inferus. *Cor.* 5-petala.
Caps. polysperma: seminibus coloratis.

TETRAGYNYA.

- † 20. ECHTRUS. *Cal.* o. *Cor.* 6-petala. *Caps.* 1-locula-
ris, 4-valvis, polysperma.

POLIGYNYA.

21. CLEMATIS. *Semina* plurima, aristata. *Cal.* o. *Cor.*
4-petala, infera.

22. THALICTHRUM. *Semina* plurima sub-mutica, nuda. *Cal.*
o. *Cor.* 4-5-petala, infera.

23. LIRIODENDRUM. *Semina* plurima lanceolata, imbricata. *Cal.*
3-phyllus, inferus. *Cor.* 6-9-petala.

24. MI-

24. MICHELIA. *Baccæ multæ, 4-spermæ. Cal. varians, inferus. Cor. 8-15-petala.*
25. UVARIA. *Baccæ multæ, 1-loculares, polyspermæ. Cal. 3-phyllus, inferus. Cor. 6-petala.*
26. ANNONA. *Bacca composita bacculis 1-spermis. Cal. 3-phyllus, inferus. Cor. 6-petala.*
- † 27. MELODORUM. *Baccæ multæ, seminibus nidulantibus. Cal. 3-phyllus, inferus. Petala 6, triangularia.*
- † 28. DESMIS. *Baccæ multæ, loculis in longum catenatis. Cal. 3-phyllus, inferus. Petala 6, lanceolata.*
29. ILLICIUM. *Capsule 1-spermæ, in orbem positæ. Cal. 6-phyllus, inferus. Cor. petala 27.*

EPILOGUE.

Præmio coronato 1-loculari, 1-petala. Tunc illa p. 29.

29.1. CALATRAVALENSIS. *Diff. ibidem. Cal. 1-locularis, 1-petala. Petala 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 136*