





Est. B-76
Tab. 4
N.º 10





F L O R A
C O C H I N C H I N E N S I S.

PLORIA
COHINCINENSIS

FLORA COCHINCHINENSIS:

SISTENS

PLANTAS IN REGNO COCHINCHINA NASCENTES.

QUIBUS ACCEDUNT ALIAE

OBSERVATÆ

IN

SINENSI IMPERIO,
AFRICA ORIENTALI,
INDIAEQUE LOCIS VARIIS.

OMNES DISPOSITÆ SECUNDUM

SYSTEMA SEXUALE LINNÆANUM.

LABORE, AC STUDIO

JOANNIS DE LOUREIRO

Regiae Scientiarum Academiæ Ulyssiponensis Socii : olim in Cochinchinâ Catholicæ Fidei Praeconis : ibique rebus Mathematicis ,
ac Physicis in Aulâ Præfecti.

Jussu Acad. R. Scient. in lucem edita.

*Xylaloen, Myrrham, Piper ardens, Sacchara profert:
Pluraque, si repetas, officiosa dabit.*

TOMUS II.



UNIVERSIDADE DE COIMBRA
JARDIM BOTANICO

ULYSSIPONE
TYPIS, ET EXPENSIS ACADEMICIS.

ANNO M.DCCXC.

Permissu Regii Concilii pro Examine, & Censurâ Librorum.

N-5

ELORA
COCHINCHINENSIS

LIVANTIS IN REGNO COCHINCHINAE MUSCENIÆ

GUTTOS ACCEDUNT ALIA

OBESERVATAE

IN

SINENSIS IMPERIO

ALTAICA ORIGINATÆ

INDIAQUE LOCIS ATRIIS

OMNES DISTORTÆ SEQUENDA

SATYRUM SUXALEM TINNAM

FAZORAK AGSTUDIO

JOANNIS DE LONREIRO

REGIS CECILIANÆ ACADÆMIE EXLIBRIS SOCIÆ OMIJ IN COPYRI-

GHII. EDITIONIS LIBRI. PROLOGI. IN THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY

AC PLATEA IN VEN. PEGGI.

July 1697 R. Scioeit in Venetia egiis.

YANNAE. MARYAM. PEGG. ZARIA. A. MOLINI.

TOMUS II



ULYSSEONIS

TIPIÆ ET EXPLANATÆ GODFRIMICÆ

ANNO MDCCLX

Emilia Regia Galliæ Exemplarum a Galleria Vaticana

CLAS SIS XIV.

D I D Y N A M I A.

G Y M N O S P E R M I A.

* *Calycos sub-quinquefidi.*

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. LEONURUS. | <i>Antheræ punctis nitidis adspersæ.</i> |
| 2. MENTHA. | <i>Filamenta distantia, recta. Cor. sub-equalis.</i> |
| 3. TEUCRIUM. | <i>Cor. labium superius divaricatum : staminibus ascendentibus pervium.</i> |
| 4. AJUGA. | <i>Cor. labium superius staminibus brevius.</i> |
| 5. BETONICA. | <i>Cor. labium superius planum, ascendens : tubo cylindrico. Stam. longitudine faucis.</i> |
| 6. BALLOTA. | <i>Cor. labium superius fornicatum. Calyx 10-striatus.</i> |
| 7. LAMIUM. | <i>Cor. labium inferius utrinque dente setaceo.</i> |
| 8. STACHIS. | <i>Cor. labium inferius lateribus reflexum. Stam. deflorata ad latera deflexa.</i> |
| 9. NEPETA. | <i>Cor. labium inferius crenatum. Faux marginè reflexo.</i> |
| † 10. BARBULA. | <i>Cor. labium inferius magnum, fimbriatum.</i> |
| ** <i>Calycos bilabiati.</i> | |
| 11. SCUTELLARIA. | <i>Cal. fructiferus, operculatus.</i> |
| 12. MELISSA. | <i>Cal. angulatus, scariosus : labio superiore ascendentē.</i> |
| † 13. DENTIDIA. | <i>Cal. labium superius 3-fidum denticulatum.</i> |
| 14. OCYBUM. | <i>Cor. resupinata. Filam. bina basis processu-</i> |
| | <i>Zz 15. DRA-</i> |

15. DRACOCEPHALUM. *Cor.* faux inflato-dilatata.
16. TRICHOSTEMA. *Filamenta* longissima.
- † 17. COLEUS. *IX* *Filamenta* in tubum coalita, stylum vaginantia.
18. ORIGANUM. *M* *Strobilus* calyces colligens.
19. CLINOPODIUM. *A* *Involucrum* calyces colligens.

A N G I O S P E R M I A.

* *Calyces bifidi.*

20. ACANTHUS. *Capsula* 2-locularis. *Cor.* 1-labiata, 3-fida. *Antheræ* villosæ.

** *Calyces 4-fidi.*

21. GMELINA. *Drupa* nucleo 2-loculari. *Cor.* bilabiata. *Antheræ* binæ crassiores bipartitæ.
22. LANTANA. *Drupa* nucleo 2-loculari. *Cor.* hippocraterif. *Stigma* uncinatum.
23. BARLERIA. *Capsula* 2-locularis. *Cor.* infundibulif. *Sem.* bina. *Caps.* elastica.

*** *Calyces quinquefidi.*

- † 24. CAMPSIS. *Caps.* 2-locularis. *Cor.* infundibulif. *Stamin.* mutuo inflexa.
25. DIGITALIS. *Caps.* 2-locularis. *Cor.* campanulata, subtus ventricosa. *Stam.* declinata.
26. BIGNONIA. *Caps.* 2-locularis. *Cor.* campanulata. *Sem.* alata.
27. RUELLIA. *Caps.* 2-locularis. *Cor.* campanulata. *Stamin.* per paria approximata.
- † 28. DICEROS. *Caps.* 2-locularis. *Cor.* campanulata: lacinias ob-cordatis. *Antheræ* lobis divaricatis.

29. SÉSAMUM. *Caps.* 2 - locularis. *Cor.* campanulata , inaequalis. *Rudim.* filamenti quinti.
30. CHELONE. *Caps.* 2 - locularis. *Cor.* personata , inflata , clausa. *Rudim.* filamenti quinti.
31. ANTIRRHINUM. *Caps.* 2 - locularis. *Cor.* personata , subitus nectario prominente.
32. COLUMNEA. *Caps.* 2 - locularis. *Cor.* ringens , supra basim gibba. *Antheræ* connexæ.
- † 33. MAZUS. *Caps.* 2 - locularis. *Cor.* ringens : fauce papilloſa. *Antheræ* connexæ. *Cal.* 5-gonus.
34. MANVLEA. *Caps.* 2 - locularis. *Cor.* limbus 5-partius : lacinia inferiorē profundiore , reflexa.
35. MARTYNIA. *Caps.* 4 - locularis , lignosa. *Cor.* ringens ; inflata.
36. CORNUTIA. *Bacca* 1 - sperma. *Cor.* ringens. *Stylus* longissimus.
37. CLERODENDRUM. *Bacca* 1 - sperma. *Cor.* ringens. *Stam.* longissima.
38. VOLKAMERIA. *Bacca* 2 - sperma. *Cor.* laciniis secundis. *Sem.* bilocularia.
39. VITEX. *Bacca* 4 - sperma. *Cor.* ringens : labio superiore 3 - fido.
- † 40. TRIPINNA. *Bacca* polysperma. *Cor.* sub-campanulata , 5-fida : summā maiori. *Cal.* cyathiformis.
- **** *Calyces multifidi.*
- † 41. SEPTAS. *Caps.* 2 - locularis. *Cor.* infundibulif. *Cal.* 7 - partitus , inaequalis.
- **** *Calyces polyphylli.*
- † 42. PICRIA. *Bacca* 2 - locularis. *Cor.* ringens. *Cal.* 4 phyllus.

G YMNO S PERMIA.

GENUS I. LEONURUS.

Char. Gener. *Antheræ* punctis nitidis adpersæ. Lin. sy. pl. G. 780.

Sp. 1. LEONURUS MARRUBIASTRUM. γ . . .

Differ. spec. Leon. *foliis* ovatis, lanceolatisque, ferratis : *calycibus* sessilibus, spinosis. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, sesquipedalis, erectus, simplex, quadrifolius. *Folia* omnia lanceolata, ferrata, tomentosa, opposita. *Flos* croceus, capitulis lateralibus : *calycibus* spinosis, sessilibus. *Corolla* ringens : tubo longo : labio superiore oblongo, integro, villosa, fornicate, stamina obtegente : inferiore breviore, 3-fida, laciinis obtusis. *Antheræ* oblongæ, 2-fidæ, compressæ, exoticæ. In illis microscopio observavi puncta illa nitida, elevata, sub-globosa, sparsa : cognovique nihil aliud esse, quam pollen vesiculare conglobatum, quod sejunctum, aut in particulas minores conformatum similiter nitet in aliis floris partibus, germine, filamentis, & interiori tubo corollæ, in quas deciderat.

Habitat prope litora Africæ Orientalis in Zanguebaria.

Sideritis foliis ovatis, & lanceolatis, inciso-ferratis. Lin. H. Cliff. pag. 313. Leonurus Marrubiastrum. Burm. Ind. pag. 127.

GENUS II. MENTHA.

Char. Gener. *Cor.* sub-equalis, 4-fida : laciñia latiore emarginata.

Stam. erecta, distantia. Lin. sy. pl. G. 771.

Sp. 1. MENTHA CRISPA. α Rau hung.: Rau thom tail. β . . .

Differ. spec. Ment. *spicis* capitatis : *foliis* cordatis, dentatis, undulatis, sessilibus : *staminibus* corollam æquantibus. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Radix* perennis. *Caulis* herbaceus, sub-erectus, 6-pollicaris, 4-gonus, repens, rubescens. *Folia* sub-rotunda, sub-cor data, dentata, crispa, sessilia opposita. *Flos* diluté purpureus : *spicis* brevibus, capitatis. *Stamina* corollam su-æquantia.

Habitat culta in Cochinchinâ, & Chinâ ubique obvia.

Hort. Cliff. pag. 306. Berg. Mat. Med. pag. 343.

Virtus : totius herbæ. Resolvens, Stomachica, Deobstruens, Anthelmintica.

Uſus in Anorexiâ, Colicâ, Hystericâ, Vermibus, obſtructionibus mentericis, maximè infantum. Præterea frequens, & gratus in condimento ciborum ejus uſus.

Sp. 2.

Sp. 2. MENTHA HIRSUTA. α Rau thom nam. β Hiām tsāi.
Differ. spec. Ment. *floribus* capitatis : *foliis* ovatis pubescentibus ;
ferratis : *staminibus* corollā longioribus. Lin. sp. 6.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 1-pedalis, erectus, cespitosus, 4-gonus : radice perenni, repente. *Folia* ovato-lanceolata, ferrata, pilosa, non crispa, opposita. *Flos* albo-violaceus, axillaris, capitulatus : pedunculis propriis brevibus, communi longiore : *involucro* communi 2-phyllo, lanceolato. *Stamina* corollā longiora : *pedunculi* omnes pilosi. Odor, sapor, usus fere iidem, qui præcedentis, sed debiliores.

Habitat in Cochinchinā, & Chinā similiter culta.
Mentha Aquatica hirsuta. Bauh. hist. 3. pag. 224. Hill. Brit. herb. pag. 351. sp. 1. tab. 50. fig. 11.

Sp. 3. MENTHA PULEGIUM. α Cây bắc hà. β Pō hō.
Differ. spec. Ment. *floribus* verticillatis : *foliis* ovatis, obtusis, sub-crenatis : *caulibus* sub-teretibus, repentibus : *staminibus* corollā, longioribus. Lin. sp. 14.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, perennis, sesquipedalis, sub-tetragonus, fuscus, repens. *Folia* ovato-lanceolata, sub-crenata, opposita, petiolata. *Flos* albo-purpureus, verticillis axillaribus. *Calyx* 5-fidus. *Corolla* infundibuliformis, 5-fida, sub-æqualis. *Stamina* Didynamica, erecta, corollā longiora. *Semina* 4, nuda.

Habitat agrestis, cultaque in Chinā, & Cochinchinā.
Pulegium Latifolium. Bauh. Pin. pag. 222. Matth. in Diosc. l. 3. cap. 30. pag. 521. fig. ibi.

Virtus : foliorum. Resolvens, Pectoralis, Cephalica, Diaphoretica, Emmenagoga. Prodest in Astmate, Tussi, Hysteriā, Cephalgiā, Epilepsiā puerorum.

† Sp. 4. MENTHA STELLATA. α Rau ngū hoang.
Differ. spec. Ment. *spicis congestis*, terminalibus : *foliis* stellatis, ferratis.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, erectus, 1-pedalis, 4-sulcus : radice perenni, repente. *Folia* stellata, quaterna, oblonga, obtusa, ferrata, glabra. *Flos* minimus, albo-violaceus : *spicis* oblongis, congestis, terminalibus. *Calyx* 5-fidus, erectus, persistens : laciniis acutis, sub-æqualibus. *Corolla* tubulosa, calyce duplo longior, basi dilatata : limbo patente, 4-fido, laciniis obtusis, brevibus, una emarginata. *Filamenta* 4, quorum duo breviora, erecta, distantia, corollā longiora : pilis longis in medio circumdata. *Antheræ* sub-rotundæ, minimæ. *Germen* 4-fidum, superum. *Stylus* 2-fidus, deflexus.

flexus, æqualis staminibus. *Stigmata* patentia. *Semina* 4, subrotunda, nuda.

Habitat loca humida inculta in Cochinchinâ.

GENUS III. TEUCRIUM

Char. Gener. *Cor. labium superius (nullum) ultra basim 2-partitum, divaricatum ubi stamina.* Lin. sy. pl. G. 764.

Sp. 1. TEUCRIUM POLIUM. β Ti tam tsao. α Đja tam thao.

Differ. spec. Teuc. *capitulis* sub-rotundis: *foliis* oblongis, obtusis, crenatis, tomentosis, sessilibus: *caule* postrato. Lin. sp. 32.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 1-pedalis, sub-erectus, cespitosus, perennis, 4-gonus, purpurascens. *Folia* ovato-oblonga, obtusa, crenato-incisa, tomentosa, opposita, petiolis brevibus. *Flos* dilutè purpureus, *capitulis* sub-rotundis, densis, pilosissimis, terminalibus. *Calyx* 5-fidus. *Corolla* labium superius brevissimum, divaricatum, emarginaturâ amplectens *stamina* ascendentia: labium inferius 3-fidum, laciniis rotundatis, mediâ emarginatâ. *Glandula* ad basim germinis, ut in Lathræ. *Semina* 4 nuda, calyceum, & corollæ tubum in maturitate dilatantia.

Habitat incultum prope Cantonem Sinarum.

Polium candidum tomentosum, flore purpureo. Tourn. Inst. pag. 206. sp. 9.

Sp. 2. TEUCRIUM MASSILIENSE. α Tiá tò dat.

Differ. spec. Teuc. *foliis* ovatis, rugosis, inciso-crenatis: *caulibus* erectis: *racemis* rectis secundis. Lin. sp. 24.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 3-pedalis, erectus, 4-gonus, albicans, glaber. *Folia* ovata, acuta, profundè crenata, rugosa, opposita. *Flos* violaceus, spicis erectis, terminalibus. *Calyx* ovatus, 5-fidus. *Corolla* tubo cylindraceo: labio superiore sub-nullo. *Semina* 4, nuda. Magnam hujus plantæ virtutem prædicant indigenæ, quam propriâ experientiâ nondum probatam inculcare non præsumo.

Habitat incultum in Cochinchinâ.

Teucrium Creticum. Clus. hist. 1. pag. 348. *Chamædris fruticosa.* Meissnæ folio. Tournef. Inst. pag. 205. sp. 8.

Sp. 3. TEUCRIUM UNDULATUM. α Cay dom dom.

Differ. spec. Teuc. *foliis* oblongis, undulatis, sub-crenatis: *corymbo* terminali.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, erectus, teres, 5-pedalis: *ramis* paten-

patentibus. *Folia* ovato-oblonga, obtusa, undulata, sub-crenata, glabra, opposita, petiolata. *Flos* pallidus, corymbo racemoso, terminali. *Corolla* 5-fida: *tubo* brevi: laciinis obtusis, superioribus divaricatis. *Stamina* longissima, ascendentia. *Semina* 4-nuda, calyce persistente fota.

Habitat ad sepes Cochinchinæ.

† Sp. 4. TEUCRIUM THEA. a Cây Chè baong.

Differ. spec. Teuc. *foliis* ovato-lanceolatis: *caule* procumbente: *pedunculis* axillaribus 3-floris.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, 8-pedalis, procumbens, glaber, inermis, teres, ramosus. *Folia* ovato-oblonga, acuta, integerrima, petiolata, glabra, opposita. *Flos* albus, axillaris: pedunculis 3-floris. *Stamina* Didynamica, corollâ longiora. *Stigma* acutum 2-partitum. *Semina* 4, calyce fota.

Habitat in dumetis Cochinchinæ.

Virtus: foliorum. Attenuans, Deobstruens, Diuretica. Theam. vocant indigenæ, addito vernaculo nomine: eaque frequenter utuntur ad digestionem promovendam, maximè quando sentiunt stomachum gravatum nimia ingurgitatione.

GENUS IV. AJUGA.

Char. Gener. *Cor.* labium superius minimum. *Stam.* labio superiore longiora. Lin. sy. pl. G. 763.

Sp. 1. AJUGA ORIENTALIS. a Thich thao.

Differ. spec. Aj. *floribus* resupinatis. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* sesquipedalis, erectus, 4-gonus, perennis, fusco-purpureus. *Folia* ovata, sub-acuta, crenata, subtus tomentosa, opposita. *Flos* purpurascens, terminalis, & axillaris, spicatus. *Calyx* acutè semiquinque fidus, hirsutus, connivens. *Corolla* resupinata, labio superiore vix ullo, laciinis binis minimis, divaricatis, utrinque adhærentibus labio inferiori, 3-fido. *Stam.* Didynamica, brevia. *Semina* nuda.

Habitat inulta in Cochinchinâ.

Bugula Orientalis, villosa, flore inverso, candido, cum oris purpureis. Tournef. Cor. pag. 14. lin. 30. Ajuga Orientalis. Thunb. Jap. pag. 243.

Sp. 2. AJUGA REPTANS. b... .

Differ. spec. Aj. stolonibus reptantibus. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, teres, villosus, repens. *Folia* ova-

ta,

ta, utrinque attenuata, crenata, incisa, crassa, villosa, opposita; radicalia minora. *Flos* albus, spicis terminalibus, verticillatis, interruptis: *braetcis* ovato-lanceolatis, integerimis. *Calyx* 5-fidus, hirsutus, laciniis æqualibus, conniventibus. *Corollæ* labium superius minimum, staminibus brevius. *Semina* 4, calyce persistente servata. *Corollæ* non resupinatae.

Habitat inulta circa Cantonem Sinarum. Nomen Sinicum non potui indagare.

Consolida Media, pratensis, purpurea. Bauh. Pin. pag. 260. n. 2.
Ajuga Decumbens. Thunb. Jap. pag. 243.

G E N U S V. B E T O N I C A.

Char. Gener. *Cal.* aristatus. *Cor.* labium superius adscendens, planiusculum: tubo cylindrico. Lin. sy. pl. G. 776.

Sp. 1. BETONICA OFFICINALIS? α Hoac huong. β Hö hiäm.

Differ. spec. Bet. *spicæ* interrupta. *Corollarum* labii lacinia itermedia emarginata. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, sesquipedalis, sub-erectus, 4-gonus: *radice* repente: *ramis* oppositis, geniculatis. *Folia* oblongo-ovata, aliqua sub-cordata, profundè crenata, utrinque pubescentia, opposita: petiolis longis, gracilibus. Odor sub-aromaticus, gratus, debilis. Sapor fatus. Florentem non vidi, quamvis in proprio horto per multos annos cultam: adeoque de specie certò judicare non possum nisi ex habitu.

Habitat non raro culta in Cochinchinâ, & in Chinâ.

Berg. Mat. Med. pag. 555. Betonica. Hort. Cliffort. pag. 310.

Virtus: foliorum. Calefaciens, Tonica, Stomachica.

G E N U S VI. B A L L O T A.

Char. Gener. *Cal.* hippocrateriformis, 5-dentatus, 10-striatus. *Corollæ* labium superius crenatum concavum. Lin. sy. pl. G. 778.

† Sp. 1. BALLOTA PILOSA. α Rau nhaong.

Differ. spec. Bal. *foliis* ovatis, crenatis, tomentosis: *verticillis* pilosis: *calycibus* 10-dentatis.

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, 4-pedalis, erectus, debilis, 4-gonus, striatus, pilosus, ramosus. *Folia* ovata, acuta, crenata, tomentosa, opposita. *Flos* albus, 2-labiatus, verticillis axillaris, pilosus. *Calyx* tubulosus, recurvus, 10-striatus, limbo 10-dentato, dentibus acutis, reflexis. *Corollæ* labium superius fornicatum, integrum:

tegrum: inferius patens, 3-fidum. *Semina 4*, nuda. Stam. Didynamica.

Observ. A Ballotâ Distichâ imprimis differt calycibus 10-dentatis. Differt etiam foliis ovatis, crenatis, nec cordatis, & serratis ut in Ballota Distichâ videntur.

Habitat inculta in Cochinchinâ.

GENUS VII. LAMIUM.

Char. Gener. *Cor. labium superius integrum, fornicatum: labium inferius 2-lobum. Faux utrinque margine dentata.* Lin. sy. pl. G. 774.

Sp. 1. LAMIUM GARGANICUM. α Cây cút lợn. β Hí kiêm tsào.

Differ. spec. Lam. *foliis cordatis, pubescentibus: corollis fauce inflatâ, tubo recto, dente utrinque gemino.* Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, perennis, erectus, 3-pedalis, 4-gonus, ramosus, albicans. *Folia* cordata, sub-acuta, inæqualiter crenata, pubescentia, opposita petiolata. *Flos* albo-purpureus, spicis verticillatis. *Calyx* 5-fidus. *Corolla* labium superius fornicatum, integrum: inferius 2-lobum. *Tubus* rectus. *Faux* utrinque margine dentatâ. *Stamina* didynamica: antheris sub-rotundis, purpureis. *Stigma* acutum, 2-fidum. *Semina 4*, nuda.

Habitat incultum in Cochinchinâ, & Chinâ: odore ingratum.

Thunb. Fl. Jap. pag. 246.

GENUS VIII. STACHYS.

Char. Gener. *Cor. labium superius fornicatum: lab. inferius lateribus reflexum: intermediâ maiore, emarginatâ. Stamina deflorata versus latera reflexa.* Lin. sy. pl. G. 777.

† Sp. 1. STACHYS ARTEMISIA. α Cây Ich mâu. β Kẽ hoéi: Sung úy.

Differ. spec. Stac. *verticillis multifloris: foliis incisis: caule simplici.*

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, rectus, simplex, 3-pedalis, 4-gonus, sulcatus, albicans. *Folia magna*, radicalia sub-rotunda, crenata: caulina longiora, pinnati-fida, incisa, subtus tomentosa, petiolata, opposita. *Flos* bilabiatus, albo-purpureus, oblongus, verticillis polyfloris, axillaribus. *Calyx angulatus*, 5-fidus, laciniis acutis, binis inferioribus longioribus, pungentibus. *Corolla* labium superius ovatum, integerrimum, fornicatum: inferius 3-fidum, laciniâ mediâ emarginatâ, lateralibus reflexis. *Stamina 4*, quorum duo breviora, ad labium superius deflexa. *Stigma* acutum, 2-fidum.

Aaa

Semi-

366 D I D Y N A M I A. G Y M N O S P E R M I A.

Semina 4, nuda, longiuscula. *Odor* parum gratus. *Sapor* sub-amarus.

Habitat culta, in cultaque in Cochinchinâ, & Chinâ.

Virtus: foliorum, florum, & feminum. Resolvens, Corroborens.

Valet in affectibus Hystericis, & aliis provenientibus ex utero, cuius fluorem cohibet, dolores sedat, sanguinis grumos dissolvit, secundinas expellit. Usus tam internus, quam externus, nec violentus.

Observ. Habitus hujus plantæ nondum florentis est valde similis Artemisiæ Unicaulis: virtus Medica ab Artemisiæ Vulgaris vix differt; ideo aliqui Practici in illis locis pro verâ Artemisiâ habuerunt. Ast flos omnino repugnat, qui veræ Stachyos est.

GENUS IX. NEPETA.

Char. Gener. *Cor.* labium inferius lacinulâ intermediâ crenatâ. *Fauces* margine reflexo. *Stam.* approximata. Lin. sy. pl. G. 768.

Sp. 1. NEPETA HIRSUTA. « Cây mè dat.

Differ. spec. Nep. floribus sessilibus verticillato-spicatis, tomento ob-volutis. Lin. sp. 7.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 1-pedalis, erectus, 4-gonus, pilosus, pallidus. *Folia* lanceolata, serrata, hirsuta, sessilia, opposita. *Flos* albus, sessilis, verticillis axillaribus, pilis multis intermixtis. *Corolla* labium inferius latius, crenatum: *faucis* margine reflexâ. *Stamina* recta, approximata. *Semina* 4.

Habitat spontanea in agris Cochinchinæ.

Hort. Clifft. pag. 311. n. 3.

+ GENUS X. BARBULA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 5-fidum: laciñis acutis, erectis, æqualibus.

Cor. Ringens, tubo calyci æquali: limbo 5-fido, laciñis 4 labii superioris ovatis, erectis, sub-æqualibus: labium inferius magnum, patens, incurvum, terminatum funibrâ longâ, capillari.

Stam. Filamenta 4, erecta, quorum 2 longiora, corollam superantia. Antheræ sub-rotundæ.

Pist. Germen sub-rotundum, 4-sulcum. Stylus 2-fidus, brevior staminibus. Stigmata simplicia.

Peric. Nullum. Calyx connivens.

Sem. 4, sub-rotunda, nuda.

Nom.

Nom. Barbula dixi a fimbriâ barbatâ labii inferioris.

Char. Gener. Cor. Labium inferius magnum, fimbriatum : superius 4-fidum, laciniis ovatis.

† Sp. 1. BARBULA SINENSIS. § Sat song kim.

Differ. spec. Bar. *floribus* verticillatis : *foliis* oblongis, serratis.

Hab. *Frutex* lignosus, 1-pedalis : *ramis* ascendentibus, paucis. *Folia* ovato-oblonga, obtusa, serrata, basi integerrima, lineata, tomentosa, opposita : *petiolis* brevibus. *Flos* albus axillaris, verticillatis fastigiatis. Planta grati odoris.

Habitat Cantone Sinarum inulta.

GENUS XI. SCUTELLARIA.

Char. Gener. Cal. ore integro : post florescentiam clauso, operculato. Lin. sy. gl. G. 792.

Sp. 1. SCUTELLARIA ALTISSIMA. α Cây thiét cát : Tiá tò rùng.

Differ. spec. Scut. *foliis* cordato-oblongis, acuminatis, serratis : *spicis* sub-nudis. Lin. sp. 14.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, erectus, 3-pedalis, 4-gonus, ramosus. *Folia* cordato-oblonga, acuminata, serrata, tomentosa, opposita. *Flos* cæruleus, spicis longis, sub-nudis, terminalibus. *Stamina* 4, Didynamica, longa. *Stigma* acutum. *Calyx* integer, foliolo quodam rotundo, concavo semina nuda operiens.

Habitat agriculis in Cochinchinâ.

Cassida Orientalis altissima, urticæ folio. Tourn. Cor. pag. 11. lin. 15.

Virtus. Emmenagogue, Consolidans. Ustus externus proficiens in ossium fracturis.

Sp. 2. SCUTELLARIA ALBIDA. α Thiét cát tau.

Differ. spec. Scut. *foliis* sub-cordatis, serratis, rugosis, opacis : *spicis* secundis : bracteis ovatis. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, 1-pedalis, 4-gonus, tomentosus, rubescens, sub-erectus, aliquando repens. *Folia* cordata, obtusa, serrata, opposita, petiolata. *Flos* pallidus, spicis brevibus, foliosus, terminalibus.

Habitat spontanea in Cochinchinâ.

Scutellaria Teucrii facie, flore albo. Bauh. hist. 3. pag. 291.

Sp. 3. SCUTELLARIA ALPINA. α Hán săn thao.

Differ. spec. Scut. *foliis* cordatis, inciso-crenatis : *spicis* imbricatis ; rotundato-tetragonis. Lin. sp. 3. Aaa ii Hab.,

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, erectus, sesquipedalis. *Folia* cordata, obtusa, profundè crenata, tomentosa, opposita. *Flos* violaceus, terminalis, spicis oblongis, sub-tetragonis. *Calyx* integer, rotundatus, pilosus. *Corolla* ringens, tubo longo, ad basim tumido, retrorsum flexo. *Semina* 4, squamâ calycinâ tecta.

Habitat in Cochinchinâ, agrestis.

Teucrium Alpinum, inodorum, magno flore. Bauh. Pin. pag. 247. n. 5.

G E N U S XII. M E L I S S A .

Char. Gener. *Cal.* aridus, supra planiusculus: labio superiore sub-fastigatio. *Cor.* labium superius sub-fornicatum, 2-fidum: labium inferius lobo medio cordato. Lin. sy. pl. G. 786.

Sp. 1. MELISSA CRETICA. β Tsū sū. α Tu tō.

Differ. spec. Mel. *racemis* terminalibus: *pedunculis* solitariis, brevissimis. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 2-pedalis, erectus, 4-gonus, ramosus. *Folia* lato-ovata, acuta, obtuse serrata, laevia, opposita, petiolis longis. *Flos* albo-purpureus, racemis spicatis, terminalibus: *pedunculis* florum brevissimis. *Caulis*, *petioli*, *folia*, *calyces*, omnia rubro-fusca, parco viridi maculata, mixto odore Pulegii, & cimicum imbuta.

Habitat culta in Chinâ, & Cochinchinâ.

Thunb-Japon. pag. 247. *Calamintha Clinopodii* Austriaci foliis, odore Pulegii. Pluk. Almg. 75. tab. 163. fig. 4.

Virtus: foliorum, & seminum. Resolvens, Diaphoretica, Cephalica. Prodest in Cephalgiâ, Hypochondriasi, & Maniâ ex humoribus crassis, & frigidis ortis. Foliis recentibus vescuntur indigenæ in acetariis.

† Sp. 2. MELISSA RUGOSA. α Tiá tō nhám lá.

Differ. spec. Mel. *racemis* confertis axillaribus, & terminalibus: *foliis* rugosissimis, sub-rotundis, acuminatis.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, sesquipedalis, 4-gonus, erectus, ramosissimus. *Folia* rugosissima, sub-rotunda, acuminata, ferrata, opposita, petiolata. *Flos* albo-ruber, racemis confertis axillaribus, & terminalibus. Planta tota, corollis exceptis, colore obscurō-viridi prædicta. Odore, & virtute præcedenti similis.

Habitat culta, & spontanea in Cochinchinâ.

GENUS XIII. DENTIDIA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium bilabiatum, 5-fidum, nitidum, pilosum, 5-nervium; erectum: laciniis 3 superioribus obtusis, denticulatis: 2 inferioribus subulatis, longioribus.

Corolla. Ringens, pilosa: labio superiore 4-fido, laciniis sub-aequalibus, rotundatis, erectis: labio inferiore maiore, integerrimo, incurvo, reflexo.

Stam. Filamenta Didynamica, fauci insistentia, omnia corollâ breviora. Antheræ 2-lobæ, stantes, lobis ad basim divericatis.

Pist. Germen 4-fidum. Stylus brevis, æqualis staminibus. Stigma acutum, 2-fidum.

Peric. Nullum. Calyx persistens, semina fovens.

Sem. 4, sub-rotunda.

Nom. Dentidia a calycis laciniis superioribus denticulatis.

Char. Gener. *Cal.* laciniis 3, superioribus denticulatis. *Cor.* labium superius brevius, 4-fidum: inferius integerrimum.

† Sp. I. DENTIDIA NANKINENSIS. β Kiām nān tsū sū.

Differ. spec. Dent. *foliis* reniformibus, fimbriatis: *spicis* prismaticis, axillaribus.

Hab. *Caulis* herbaceus annuus, 1-pedalis, erectus, duriusculus, 4-gonus, rectus, purpureus, glaber: ramis brachiatis. *Folia* reniformia, concava, limbo reflexo, fimbriato, glabra, fusco-purpurea, opposita, petiolis longis. *Flos* albo-ruber, spicis prismaticis, quadragonis, axillaribus. *Planta* aspectu elegans: colore, & odore Melissæ Creticeæ similis: foliis, spicis, calyce, & corollâ differens. Habitat Nankini in Sinis: inde Cantonem delata ob pulchritudinem studiosè colitur.

GENUS XIV. OCYMMUM.

Char. Gener. *Cal.* labio superiore orbiculato: inferiore 4-fido. *Corolla* resupinatæ alterum labium 4-fidum, alterum indivisum. *Filamenta* exteriora basi processum emitentia. Lin. sy. pl. G. 790. †

Sp. I. OCYMMUM GRATISSIMUM. α Rau é lón lá.

Differ. spec. Oc. *caule* suffruticoso: *foliis* lanceolato-ovatis, *rachis* teretibus. Lin. sp. 3.

Hab. ,

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, rectus, 5-pedalis, 4-sulcatus, glaber, albicans, ramosus. *Folia* lanceolato-ovata, sub-serrata, sub-tus punctata, superius lanuginosa, pallida, odoratissima, opposita, petiolata. *Flos* albus, *calycibus* coloratis: *racemis* spicatis, lateribus, & terminalibus: *bracteis* acutis flores pedunculatos distinguenteribus.

Habitat in hortis Cochinchinæ.

Ocymum Zeylanicum, perenne, odoratissimum, latifolium. Burm. Zeyl. pag. 174. tab. 80. fig. 1. *Oc. Gratissimum*. Burm. Ind. pag. 129. Virt. Pellens, Excitans, Stomachica. Ufus culinaris.

Sp. 2. OCYMUM BASILICUM. α Rau É tiá: Rau Que.

Differ. spec. *Oc. foliis* ovatis glabris: *calycibus* ciliatis. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 3-pedalis, erectus, teres, fuscus, tomentosus, ramis rectis, ascendentibus. *Folia* ovata, sub-acuta, ferrata, pubescentia, rubro-fusca, undulata, opposita, petiolata, caryophyllos aromaticos redolentia. *Flos* albus, minutus, *racemis* spicatis, longis, erectis, terminalibus: *calycibus* pilosis, bracteatis, pedunculatis.

Habitat cultum in hortis Cochinchinæ.

Basilicum Indicum, tertium, nigrum. Rumph. Amb. I. 8. e. 55. tab. 92. fig. 1. *Ocimum Crispum* Thunb. Jap. pag. 248. *Ocymum Caryophyllum maius*. Bauh. Pin. pag. 226.

Virtus: foliorum, & spicarum efficacior præcedente. Attenuans, Pellens, Excitans, Cephalica. Valet in Cephalgia petuitosâ, doloribus Rheumaticis, & vagis. Semina efficacissima habentur contra morsus, & venena serpentum, si masticata partim devorentur, par-tim recenti plague imponantur.

Sp. 3. OCYMUM MINIMUM. α Rau é ntho lá.

Differ. spec. *Oc. foliis* ovatis, integerrimis. Lin. sp. 6.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 1-pedalis, teres, glaber: *ramis* multi-s, patentibus. *Folia* ovata, integerrima, parva, glabra, opposita, odorata, lætè virentia. *Flos* albus, spicis simplicibus, terminalibus.

Habitat in hortis Cochinchinæ raro.

Ocymum Minimum. Burm. Ind. pag. 129. Bauh. Pin. pag. 226. n. 10.

† Sp. 4. OCYMUM AFRICANUM. γ

Differ. spec. *Ocym. foliis* lanceolatis, integerrimis, pilosis: *spicis* terminalibus, verticillatis, interruptis.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 1-pedalis, erectus, 4-gonus, pilosus: *ramis* paucis, ascendentibus. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima,

rima, pilosa, opposita, petiolata. *Flos* albus, minutus, resupinatus, *spicis* verticillatis, erectis, longis, terminalibus: verticillis interruptis, hirsutis. Tota planta suave-olet.

Habitat incultum in arenariis Africæ Orientalis, ubi illud virens ad examen revocavi.

Huic approximatur spicâ verticillatâ Ocytum Album. Lin. sp. 4. Ocytum Verticillatum. Lin. Jun. Sup. plant. pag. 276. Ocytum Virgatum Thunb. Jap. pag. 250. & Ocytum Citratum Rumph. Amb. l. 8. c. 57. tab. 93. fig. 1. Omnia tamen ab Africano differunt foliis rotundioribus, & aliis notis. Rumphianum minus distat. Notandum est easdem Ocyti species, etiam in Indiâ, earum natali solo, frequenter variare habitum, & formam.

GENUS XV. DRACOCEPHALUM.

Char. Gener. *Cor. faux inflata: labium superius concavum.* Lin. sy. pl. G. 787.

† Sp. 1. DRACOCEPHALUM COCHINCHINENSE. a Cay co ed. Differ. spec. Drac. *floribus* spicatis: *bracteis* sub-rotundis, acutis.

Foliis ovato-lanceolatis, integerrimis.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 10-pollicaris, erectus, 4-gonus fulcatus, villosus. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, villosa, pauca, opposita. *Flos* violaceus, spicatus, terminalis: *bracteis* sub-rotundis, acutis, multifloris. *Corolla* fauce inflatâ: labio superiore concavo. *Filamenta* Didynamica, pilosa. *Stigma* acutum, 2-fidum, laciniis inæqualibus, mutuò inflexis. *Semina* 4.

Habitat agreste in Cochinchinâ.

GENUS XVI. TRICHOSTEMA.

Char. Gener. *Cor. labium superius falcatum. Stamina longissima.* Lin. sy. pl. G. 791.

† Sp. 1. TRICHOSTEMA SPIRALIS. a Cay rau med. Differ. spec. Tric. *staminibus* longissimis, spiralibus.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 4-pedalis, erectus, 4-gonus: *ramis* brachiatis. *Folia* ovata, acuta, integerrima, tomentosa, opposita. *Flos* albo-violaceus, *spicis* longis, terminalibus. *Calyx* 2-labiatus. *Corolla* ringens, labio superiore falcato. *Stamina* longissima, in helicem convoluta (quorum 2-breviora) intra corollam retenta. *Semina* 4, nuda.

Obsrv. Ad Trich. Brachiatam Linnæi quodammodo accedit: sed nostræ

pro nostræ stamina nullatenus brevia dici possunt, imo nec mediocria.
Habitat inulta in Cochinchinâ.

Benzoini bulli tidi G. E. N. U. S. XVII. C O L E U S.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium bilabiatum : labio superiore 4-fido, laciis linearibus : inferiore lanceolato, integerrimo, incurvo, longiore.

Cor. Ringens, calycem superans : labio superiore ascendentे, brevi obtuso, 4-fido, laciis lateralibus brevioribus : labio inferiore ova-to, concavo, integro, duplò longiore.

Stam. Filamenta 4 (quorum 2 brev:ora) filiformia, sub-inflexa, fau-ci insidentia, corollâ duplò longiora : oanlia ad medium usque coa-lita in tubum, vaginantem stylum. Antheræ ovatae, imcumbentes.

Pist. Germen 4-fidum. Stylus æqualis staminibus. Stigma acutum, 2-fidum.

Peric. Nullum. Calyx foyens semina.

Sém. 4 ovata.

Nom. (Κολεός vagina) a filamentis stylum vaginantibus.

Char. Gener. Filamenta in tubum coalita, stylum vaginantia.

Sp. i. COLEUS AMBOINICUS. & Rau thom loung. Tis tò taupi. Differ. spec. Col. foliis subcordatis, crenatis, carnosis : spicis terminalibus, longissimis.

Hab. Radix perennis, repens. Caulis herbaceus, 3-pedalis, sub ere-ctus, crassus, teres, ad apicem sub-4-gonus, pilosus, pallidus. Folia subcordata, subrotunda, obtusa, crenata, carnosa, pilosa, albicania, mollia, odorata, opposita, petiolis longis. Flos purpu-rascens, terminalis, spicis longis, verticillatis, interruptis.

Habitat in hortis Cochinchinæ, & in variis Indiæ locis, præsertim humidis.

Marrubium Amboinicum Album. Rumph. Amb. I. 8. c. 75. tab. 72.

Marrubium Odoratissimum Betonicæ solio. Burm. Zeyl. pag. 153. tab. 71. fig. 1. Marrubium Zeylanicum, Odoratum, Nepetæ facie, folio Lamii Panonici. Herm. Mus. Zeyl. pag. 30.

Obs. Hæcplanta, ejusque flores sat bene describuntur a Rumphio, lo-ni-co citato : spica vero (non flores singuli) melius repræsentatur a Barmanno.

Virt. Resolvens, Tonica, Cephalicæ. Prodest in Asthmate, antiquâ Tussi, affectionibus Epilepticis, & Convulsivis. Odor totius plan-tæ vehementis, nec ingratus : sapor subardens. Usus etiam edulis.

G E-

sallot

GENUS XVIII. ORIGANUM.

Char. Gener. *Strobilus tetragonus*, spicatus, calyces Colligens. Lin: sy. pl. G. 784.

Sp. 1. ORIGANUM DICTAMNUS. β Quām tūm fām fūm.
Differ. spec. Orig. *Foliis inferioribus tomentosis*: *spicis nutantibus*.

Lin. sp. 2.

Hab; & notæ. *Caulis suffruticosus*, 1-pedalis, durus, rectus: ramis longis debilibus, brachiatis. *Folia* ovata, acuta, serrata, inferiora tomentosa, superiora glabra, punctata, opposita. *Flos* albus, *spicis brevibus*, reclinatis, terminalibus: *bracteis laxis*, subrotundis, acuminatis, magnis. Planta grati odoris.

Habitat incultum prope Cantonem Sinarum. Notandum in provinciis Borealis Sinarum nasci aliam plantam eodem nomine *Fām fūm* vocatam, radice carnosā albā, sub-fusiformi, magni usus in Medicinā, sed prorsus alienam ab Origano.

Dictamnus Creticus. Bauh. Pin. pag. 222. n. 1. Hill. Brit. herb. pag. 381. tab. 54. f. 12.

Virt: totius plantæ. Calefaciens, Deobstruens, Emmenagogia.

Sp. 2. ORIGANUM RETICULATUM. β Quām tūm Kinh kiái.

Differ. spec. Orig. *Spicis aggregatis*, longis, prismaticis, rectis: *bracteis membranaceis*, calyce duplo longioribus. Lin. sp. 4.

Hab; & notæ. *Caulis* 1-pedalis, perennis, erectus, crassus, 4-gonus, tomentosus, rubescens. *Folia* ovata, subacuta, crenata, rugosa, tomentosa, opposita, petiolata. *Flos* albo-violaceus, *spicis prismaticis*, congestis, terminalibus: *bracteis* flore longioribus. *Calyx* 2-labiatus, pilosus: labio altero ovato, integerrimo: altero 2-fido. *Corolla* ringens, calyce longior: labio superiore 2-fido, connivente: inferiore 3-fido, reflexo. *Bracteæ* rubescentes, sicut caulis. *Radix* Crassa in multos caudices ascendentibus superius divisa. Planta odorata.

Habitat incultum prope Cantonem sinarum.

Virtus. Calefaciens, Tonica, Emmenagogia.

Bauh. Pin. pag. 223. n. 5. Berg. Mat. Med. pag. 562.

Sp. 3. ORIGANUM HERACLEOTICUM. α Kinh giài tau. β . . .

Differ. spec. Orig. *Spicis longis*, pedunculatis, aggregatis: *bracteis* longitudine calycum. Lin. sp. 6.

Hab; & notæ. *Caulis simplex*, 2-pedalis, erectus, 4-gonus, fulcatus, ramosus, perennis. *Folia* ovata, acuta, serrata, basi integer. Bbb

rima, glabra, punctata, opposita. *Flos* albo-ruber, spicis linearibus, longis, congestis, plerumque ternis, terminalibus: *bracteis* lanceolatis, calyce brevioribus, aut sub æqualibus, 5-fidis.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ.

Origanum Heracleoticum, Cunila gallinacea Plinii. Bauh. Pin. pag.

223. n. 4.

Sp. 4. ORIGANUM SYRIACUM. α Kinh giài Nâm.

Differ. spec. Orig. *Spicis* longis, ternatis, pedunculatis: *foliis* ovatis, villosis. Lin. sp. 9.

Hab; & notæ. *Caulis*, erectus, 2-pedalis, 4-gonus, durus, ramis diffusis. *Folia* ovata, acuta, tota ferrata, nervis villosis, minuta, opposita. *Flos* rubescens. *Spicis* congestis, sub-ternatis, longis, axillaribus, & terminalibus: fauce villis obstructâ, ut in Thymo.

Habitat agreste in Cochinchinâ.

Virtus: spicarum tam hujus, quam præcedentis speciei. Pellens, sudorifica, Emmenagoga. Prodest in febre Catarrhalis, & in Vertigine: Exterius mundat scabiem. Utriusque odor gratus.

Maiorana syriaca, vel Cretica. Bauh. Pin. pag. 224. n. 3.

Sp. 5. ORIGANUM MAIORANA. α β. . . .

Differ. spec. Orig. *Foliis* ovalibus, obtusis: *spicis* subrotundis, compactis, pubescentibus. Lin. sp. 11.

Hab; & notæ. *Caulis* perennis, multiplex, sub erectus, teres, tenuis. *Folia* ovalia, integerrima, minuta, pubescentia, cinerea, opposita, petiolata. *Flos* albicans, terminalis: *spicis* brevissimis: *bracteis* lato-lanceolatis. Planta odoris gratissimi.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ, rara tamen, forsan aliunde advepta.

Burm. Ind. pag. 128. Maiorana hortensis odorata; perennis. Moris hist. 3. pag. 359.

Virt. Tonica, Resolvens, Stomachica, Errhina.

G E N U S X I X. C L I N O P O D I U M.

Char - Gener. *Involucrum* multifetum, verticillo subiectum. Lin. sy. pl. G. 783.

† Sp. 1. CLINOPODIUM ASIATICUM. α Cay Cō.

Differ. spec. Clin. *Foliis* oblongis, nervosis, rugosis, subtus tomentosis: *spicâ* verticillatâ, terminali.

Hab; & notæ. *Caulis* suffruticosus, duos cum dimidio pedes longus, erectus, 4-gonus, 4-sulcus, simplex, villosus. *Folia* ovato-oblonga,

ga, obtusa, leviter ferrata, rugosa, polynervia, subtus tomentosa; opposita. *Flos* violaceus, *spicā* terminali, oblongā, compositā verticillis interruptis: *involucris* acutis, hirsutis, subjectis. *Calyx* 2-labiatus, integerimus, inaequalis, pilosissimus. *Corolla* labio superiore concavo, æqualiter 3-fido: inferiore refracto, integerimo, longiore.

Habitat incultum in Cochinchinâ.

ANGIOSPERMIA.

GENUS XX. ACANTHUS.

Char. Gener. *Cal.* bifol; bifidus. *Cor.* 1-labiata, deflexa, 3-fida; *Caps.* 2-locularis. Lin. G. 857.

Sp. 1. ACANTHUS ILICIFOLIUS. a Cay Ô rô. b Lao chû läc.

Differ. spec. Ac. *Foliis* repandis, dentato-spinosis: *caule* fruticoso; aculeato. Lin. sp. 4.

Hab; & notæ. *Frutex* 3-pedalis, caule, & ramis suberectis, crassis, teretibus, inermibus: *cortice* albido, viscoso. *Folia* ovato-oblonga, obtusa, magna, dura, sparsa, glabra, sinnato-plicata, angulis omnibus spinosis. *Flos* albus, racemo simplici, erecto, terminali, longo. *Calyx* tubulosus, teres, æqualis: limbo erecto, 4-partito, lacinias acutis, binis exterioribus maioribus. *Corolla* 1-petala, tubo antrorsum truncato: retrorsum extensa in laciniam ovatam, erectam, leviter 3-fidam. *Filamenta* 4, Didynamica, plana, mutuò inflexa, longitudine inter calycem, & corollam. *Antheræ* oblongæ, ciliatae, stantes. *Germen* ovatum, superum. *stylus* æqualis staminibus. *Stigma* simplex. *Capsula* ovata; 2-valvis, 2-locularis, 2-sperma: seminibus oblongis, hinc planis, inde convexis.

Habitat ad ripas fluminum in Cochinchinâ, & Chinâ.

Observ. Praecedens descriptio pertinet ad plantam Cochinchinensem.

Cantone Sinarum idem habitus: at floris calyx ad basim vestitur foliolis duobus concavis, parvis, calyci adpressis: corollæ vero pars truncata terminatur emarginaturâ, hinc., inde rotundatâ, brevi.

Aquifolium Indicum. Rumph. Amb. I. II. c. 48. t. 71. f. 1. Myrancanthus Indicus. Bont. Jav. I. 6. c. 55.

Virtus: radicis. Calefaciens, Attenuans, Diuretica. Bontius asserit multum prodeesse in Paralyysi, Asthmate, Colicâ, & expectoratione falsæ petuitæ: quas virtutes extollere non audeo experientiâ destitutus.

GENUS XXI. GMELINA.

Char. Gener. *Cal.* sub-4-dentatus. *Cor.* 4-fida, Campanulata. *An-*
theræ bipartitæ; 2 simplices. *Drupa* nucleo 2-loculari. Lin. sy.
 pl. G. 821.

Sp. 1. GMELINA ASIATICA? & Cây Gang tu hú. Lin. sp. 1.

Differ. spec. Gmel. *Caule arboreo: aculeis, & foliis oppositis: race-*
mo simplici, terminali.

Hab; & notæ. *Arbor mediocris, 15 pedes alta: ramis expansis:*
aculeis oppositis, longis, rectis. Folia ovata, integerrima, glabra,
opposita, petiolata, parva. Flos luteus, racemo simplici, terminali,
amentiformi: squamis magnis, ovatis, concavis, integerrimis, ru-
bris, flores singulos protegentibus. Perianthium proprium ovatum,
carnosum, 2-fidum, laciniis obtusis. Corolla ringens, tubo tenui,
longiusculo: limbo inflato-rotundo, lateraliter ringente: labio su-
periore fornicato, integro: inferiore 3-fido. Stamina 4, Didyna-
mica, corollâ breviorâ. Drupa mediocris, subovalis, carnosa, lu-
tea, glabra, non edulis: nuce ossâ, oblongâ, inæquali, bilocu-
lari

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Radix Deiparæ spuria, Lowara. Rumph. Amb. I. 2. c. 48. pag. 127.
 tab. 40.

Observ. Quamvis in figurâ Rumphianâ folia sint 3-loba, in nostrâ ve-
 ro integerrima, non judicavi diversam speciem decernere, cum ple-
 raque alia converiant, imprimis corollæ forma personata. Pro hoc
 genere, & specie a Celeb. Lin. citatur Jambosa sylvestris parvi-fo-
 lia, (Rumph. I. pag. 129. tab. 40.) quæ procul-dubio Eugeniæ spe-
 cies est, nullatenus Gmelinæ.

Virtus. Calefaciens, Resolvens. Valent in doloribus articulorum, &
 affectibus nervorum radix internè sumpta, folia externè applicata.

GENUS XXII. LANTANA.

Char. Gen. *Cal.* obsoletè 4-dentatus. *Stigma uncinato-refractum. Dru-*
pa nucleo 2-loculari. Lin. sy. pl. G. 824.

† Sp. 1. LANTANA RACEMOSA. & Cây Tlai.

Differ. spec. Lant. *foliis oppositis, sub-rotundis: caule arboreo iner-*
mi: racemis terminalibus.

Hab., & notæ. *Arbor magna, ramis patentibus inermibus. Folia sub-*
rotunda, acuminata, integerrima, plana, glabra, dura, obscurövi-

ridia, subtus albicantia, opposita, petiolis longis, basi glandulosis. *Flor.* albus, magnus, racemis compositis, nudis, vastis, terminalibus. *Cal.* sub-truncatus, denticulis 4-5, minimis. *Corolla* campanulata, 5-fida, sub-aqualis. *Drupa* carnosa, turbinata, compressa, apice retusa: *nuce* 2-loculari. *Stamina* Didynamica. De stigmate (an uncinatum?) non amplius recordor.

Habitat in sylvis Cochinchinæ: ubi ejus lignum cæditur pro ædeficiis.

GENUS XXIII. BARLERIA.

Char. Gener. *Cal.* 4-partitus. *Stamina* 2 longè minora. *Caps.* 4-angularis, 2-locularis? 2-valvis, elastica, absque unguibus. *Sem.* 2. Lin. sy. pl. G. 848.

† Sp. 1. BARLERIA PROCUMBENS. & Kām quā tsū.

Differ. spec. Barl. inermis: *foliis* lanceolatis, crenatis, hispidis: *capitulis* terminalibus.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, inermis, procumbens, multiplex, tortuosus, hispidus. *Folia* lato-lanceolata, crenata, pilosa, opposita. *Flor.* luteus, *capitulis* terminalibus: *bracteis* acuminatis ciliatis. *Calycis* laciniæ 4, subulatæ, pilosæ. *Stamina* 2 valde minora. *Caps.* oblonga, angulata, 2-locularis, 2-sperma: *seminibus* orbiculatis.

Habitat inculta prope Cantonem Sinarum.

† GENUS XXIV. CAMPASSIA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium oblongum, 5-gonum, semiquinquesfidum: laciniis acuminatis, erectis, sub-aqualibus.

Cor. Infundibuliformis: tubo calyci aequali: limbo magno, patente, 5-fido, laciniis rotundatis, planis, aequalibus.

Stam. Filamenta 4 (quorum 2 breviora) subulata, mutuo incurva, medio tubo insidentia. Antheræ 2-loculares: lobis divaricatis.

Pist. Germen oblongum. Stylus filiformis, longior staminibus. Stigma spathulatum, 2-fidum, hians.

Peric. Capsula longa, 4-gona, 2-valvis, 2-locularis, polysperma.

Sem. Sub-rotunda, multa.

Nom. (Kāmuysi curvatio) ab staminibus mutuo incurvatis.

Char. Gener. *Cal.* 5-gonus, 5-fidus. *Cor.* infundibuliformis, 5-fida.

Sta-

Stamina mutuo inflexa. *Caps.* 2-locularis, polysperma.

Sp. 1. CAMPsis ADREPENS. & Lién siéu.

Differ. spec. Camp. *foliis* 2-pinnatis: *corymbo* racemoso.

Hab. *Caulis* fruticosus, inermis, scandens, radiculis lateralibus arborum truncis adrepens. *Folia* 2-pinata, *foliolis* ovato-lanceolatis, serratis, glabris. *Flos* coccineus, magnus, racemis ordinatè compotitis, terminalibus.

Habitat in sylvis prope Cantonem Sinarum.

GENUS XXV. DIGITALIS.

Char. Gener. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* campanulata, 5-fida, ventricosa. *Caps.* ovata, 2-locularis. Lin. sy. pl. G. 816.

† Sp. 1. DIGITALIS COCHINCHINENSIS. & Cây B? long.

Differ. spec. Dig. *foliis* lanceolatis, asperis: *floribus* solitariis, axillaribus: *calycibus* acutis: *corollis* obtusis, apice emarginatis.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, sesquipedalis, sub-erectus. *Folia* lanceolata, integriflora; aspera, opposita. *Flos* albo-violaceus, sessilis, axillaris, solitarius: *calycibus* 5-fidis, acutis. *Corolla* campanulata, subtus ventricosa, 5-fida, laciniis obtusis, supremâ emarginatâ. *Capsula* ovata, acuta, 2-locularis.

Habitat in agris, & hortis Cochinchinæ inculta.

† Sp. 2. DIGITALIS SINENSIS. & Tù hòa yong.

Differ. spec. Dig. *foliis* ovatis, utrinque pilosis: *floribus* solitariis axillaribus: *calycis* laciniis subulatis: *corollis* obtusis, apice integris.

Hab., & notæ. *Caulis* cespitosus, erectus, 1-pedalis, teres, glaber.

Folia ovata, acuta, serrata, utrinque pilosa, opposita, petiolis brevibus. *Flos* fusco-purpureus, axillaris, solitarius. *Calycis* laciniæ 5, subulatæ erectæ, suprema maior, aliquando 2-fida. *Corolla* campanulata, ventricosa, 4-fida, laciniis obtusis, summâ maiore, integrâ. *Stamina* Didynamica. *Stigma* cochleariforme. *Capsula* ovato-conica, 2-sulca, 2-locularis, polysperma.

GENUS XXVI. BIGNONIA.

Char. Gener. *Cal.* 5-fidus cyathiformis. *Cor.* fauce campanulata, subtus ventricosa, 5-fida. *Siliqua* bilocularis. *Sem.* membranaceo-alata. Lin. G. 817.

Sp. 1.

Sp. 1. BIGNONIA INDICA. a Cây Đồi muông: Cây do do. [†]
 Differ. spec. Bign. *foliis bipinnatis*: *foliolis integerrimis*, *ovatis*,
acuminatis. Lin. sp. 16.
 Hab., & notæ. *Arbor magna*, ramis ascendentibus. *Folia bipinnata*,
foliolis ovatis, *acutis*, *integerrimis*, *glabris*, *oppositis*. *Flos magnus*,
ruber, *racemis erectis*, *terminalibus*. *Calyx* spatha lunata,
crassa, *colorata*, *lanosa*. *Corolla* 1-petala, ringens: tubo magno,
curvo, *ventricoso*: *labio superiore truncato*: *inferiore longiore*, 3-
 partito, *laciniis ovatis*, *undulatis*, *sub-equalibus*. *Filamenta* 4,
subulata, *quorum 2 longiora*, *basi tubi corollæ insistentia*. *Antheræ*
binæ in quotibet filamento, *oblongæ*, *biloculares*, *magnæ*, *pendulæ*.
Germen oblongum, *sub-4-gonum*. *Stylus* subulatus, *longior staminibus*. *Stigma* spathulatum. *Pericarpium* siliqua longissima, *compressa*, *sub-curva*, *lanosa*, *2-valvis*, *4-locularis*, *polysperma*: *dissipimento* *rectangulo*. *Semina plurima compressa*, *biloba*: *lobis orbiculatis*, *invicem coalitis*: *alâ membranacea lateraliter protensa*: *per strata varia* in quolibet loculo disposita, nec imbricata.
 Habitat agrestis in Cochinchinâ, imprimis prope flumina.
 Burm. Ind. pag. 131. Pajanelli. Rheed. Malab. 1. pag. 79. tab. 45.
 Varietas occurrit in Africâ prope Mozambicum, *caule arboreo*, parvo,
foliis similiter bipinnatis, *pedunculis polyfloris*, *terminalibus*:
siliqua glabrâ, *curvâ*, *1-pedali*, *compressâ*: *seminibus oblongis*,
2-lobis, per tres ordines dispositis in quolibet loculo.

† Sp. 2. BIGNONIA PENTANDRA. Cây Ngục ngac.
 Differ. spec. Bign. *foliis bipinnatis*: *staminibus pentandris*: *calyce carnosâ*, *colorato*, *5-dentato*.
 Differ. spec. *Arbor mediocris*, *ramis ascendentibus*. *Folia ovata*, *acuminata*, *integerrima*, *glabra*, *2-pinnata cum impari*. *Flos magnus*, *ruber*, *racemis erectis*, *terminalibus*. *Calyx* tubulosus, *5-gonus*, *obsoletè 5-dentatus*, *carnosus*, *coloratus*, *persistens*. *Corolla* monopetala, ringens, tubo crasso, *æquali*, *brevi*: *labio superiore concavo*, *2-fido*: *laciniis omnibus ovatis*, *crispis*, *sub-equalibus*. *Filamenta* 5 *inæqualia*, *medio tubo insidentia*: *Antheris* 10, *oblongis*, *pendulis*, *æqualibus*, *binis* in quolibet filamento. *Germen oblongum*, *obtuse 4-gonum*. *Stylus* subulatus, *longior staminibus*. *Stigma* spathulatum. *Siliqua* *2-pedalis*, *curva*, *utrinque attenuata*, *2-locularis*, *2-valvis*, *polysperma*. *Semina* *oblonga*, *compressa*, *2-loba*, *alata utrinque membranâ tenui*.
 Habitat prope flumina in Cochinchinâ.

† Sp. 3. BIGNONIA LONGISSIMA. & Cay Quao.
Differ. spec. Bign. foliis alternis : floribus solitariis, longissimis : Calyce nullo.

Hab. & notæ Arbor parva, 9 pedes alta, ramis patentibus. Folia ovato-lanceolata, integerrima, glabra, alterna. Flos albus, magnus, solitarius, terminalis. Cal. nullus. Corolla infundibuliformis, tubo tenui, longissimo : limbo ampio, 5-fido, laciniis ovatis, crispis, sub-equalibus, incisurā supremā breviore. Filamenta 4, quorum 2 breviora, opī tubi inserta. Antheræ oblongæ, 2-loculares, binæ in quolibet filamento, ipsi normales, horizontaliter porrectæ. Stylus filiformis, corollæ sub-equalis. Stigma spathulatum. Siliqua longa, compressa, curvato-unciformis, 2-valvis : dissepimento longitudinali, cruciformi in 4 loculos divisa. Semina plurima compressa, oblonga, 2-loba, in diversa strata ordinata.

Habitat ad ripas fluminum in Cochinchinâ.
Observ. Lignum Equinum (Rumph. Amb. l. 4. c. 40. t. 46) Linnaeo Juniori dictum Bignonia Spathacea (sup. pl. p. 283) satis cum nostrâ convenit longitudine, & formâ corollæ: non autem calyce spathaceo, & foliis pinnatis. Omnes tres species Asiaticæ, quas modo descripsimus (si siliquam cum seminibus excipias) aptari nequeunt Characteri Generico Bignoniæ a Linnaeo explantis Americanis conflato: imo etiam siliqua non semper 2-locularis invenitur in Asiaticis.

G E N U S XXVII. RUELLIA.

Char. Gener. Cal. 5-partitus. Cor. sub-campânulata. Stamina per paria approximata. Caps. dentibus elasticis dissiliens. Lin. sp. pl. G. 847.

Sp. 1. RUELLIA ANTIPODA. & Rau Chon vit.
Differ. spec. Ru. Foliis mucronato-serratis : caule repente : floribus, sub-spicatis, terminalibus, quinis, ternis ve. Lin. sp. 12.
Hab. & notæ. Caulis herbaceus, annuus, 5-pollicaris, teres, repens, ramis diffusis. Folia ovato-lanceolata, serrata, opposita, glabra, sessilia. Flos albo-violaceus, terminalis, pedunculis polyfloris. Calyx 5-fidus, acutus, erectus, permanens. Corolla ringens, 5-fida. Stamina per paria curvaturâ approximata. Capsula subulata, teres, longa, 2-locularis, polysperma, elasticè dissiliens.

Habitat spontanea in pratis, & hortis Cochinchinæ.
Burm. Ind. pag. 134. Crusta ollæ maior. Rumph. Amb. l. 9. c. 72. tab. 170. fig. 2. Notandum Rumphium ibi plantam descriptissime pe-

dun-

dunculis polyfloris, subterminalibus, nostris magis conformem: sed in figurâ eam delineasse flore solitario, axillari, quod potius ad Ruelliam Ciliarem referendum est.

Sp. 2. RUELLIA CILIARIS. α Rau thom dat.

Differ. spec. Ru. *foliis* dentatis, ciliatis: *floribus* oppositis. Lin. sp 7.
Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 8-pollicaris, angulatus,
sulcatus, ramosus, diffusus, repens. *Folia* ovata, dentata, opposi-
ta, subpetiolata. *Flos* albo-violaceus, solitarius, oppositus, axilla-
ris, pedunculis longis. *Calyx* oblongus, angulatus, ciliatus, 5-par-
titus, persistens. *Corolla* ringens, labio superiore breviore, 2-fido:
inferiore 3-fido. *Stamina* Didynamica, approximata: rudimentum
duorum filamentorum sterilium inter stamina longiora assurgentium.

Capsula ovata, 2-locularis, polysperma, apice elasticè dissiliens.
Ruellia Persica? Burm. Ind. pag. 135. tab. 42. fig. 1. Ast ea figura
(quamvis a Linnæo Citata) nullatenus cum Linnæanâ descriptio-
ne, aut cum nostrâ convenit!

Habitat in agris Cochinchinæ spontanea.

† GENUS XXVIII. DICEROS.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 5-partitum: laciñiis subulatis, villosis, erectis, sub-
æqualibus.

Cor. Campanulata, 4-fida: tubo intus piloso: laciñiis limbi cordatis,
unâ maiore.

Stam. Filamenta 4 (quorum 2 longiora) subulata, pilosa, tubo in-
hærentia. Antheræ profundè 2-fidæ, divaricatæ, 2-cornæ.

Pist. Germen subulatum, breve, 4-sulcum. Stylus tubo æqualis. Sti-
gma Cochleariforme, inflexum.

Peric. Capitula, sub-ovata, 2-locularis, 2-valvis.

Sem. Plurima, rotunda, minima.

Nom. ($\Delta'ix\epsilon\rho\sigma$ bicornis) ob antheras bicornes.

Char. Gener. Cal. 5-partitus. Cor. Campanulata, 4-fida: laciñiis ob-
cordatis, unâ maiore. Antheræ divaricatæ. Caps. 2-locularis.

† Sp. 1. D'ICEROS COCHINCHINENSIS. α Rau ngū.

Differ. spec. Dic. *foliis* stellatis, carnosis: *floribus* solitariis, axillari-
bus.

Hab. *Radix* perennis, repens. *Caulis* herbaceus, 1-pedalis, subere-
ctus, teres, villosus. *Folia* stellata terna, ovato-lanceolata, ferra-
ta,

382 D IDY NAMIA A NGIO SPERMIA.

ta, carnosa, glabra. *Flos* albo-violaceus, solitarius, axillaris, pedunculis villosis.

Habitat loca humida in Cochinchinâ.

Uſus. Eſculentus in acetariis.

GENUS XXIX. SESAMUM.

Char. Gener. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* campanulata 5-fida: lobo infimo maiore. *Rudimentum* filamenti quinti. *Stigma* lanceolatum. *Caps.* 4-locularis. Lin. sy. pl. G. 845.

Sp. 1. SESAMUM ORIENTALE. a. Cây Ma. s. Ma. Ch.

Differ. spec. Ses. *foliis* ovato-oblongis. *integris*. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, erectus, 3-pedalis, 4-gonus, 4-falcatus. *Folia* ovato-oblonga, *integra*, dentata, pilosa, venosa, petiolata, opposita. *Flos* albus, axillaris, solitarius, pedunculatus. *Calyx* 5-partitus, erectus. *Corolla* campanulata, inaequilater 5-fida. *Capsula* oblonga, 4-gona, 4-sulca, 4-locularis, polysperma: *seminibus* plurimis, compressis, acutiusculis, luteis, nitidis. *Stamina* Didynamica, fine aliquo rudimento filamenti quinti. *Stigma* 2-fidum reflexum. Ad basim cujuslibet pedunculi floris prodeunt ex utrâque axillâ singulæ bracteæ lineares, breves, cum singulis glandulis luteis, 5-fidis, quæ flosculi cujusdam minimi speciem ferunt.

Habitat affatim cultum in Cochinchinâ, & Chinâ.

Thunb. Japon. pag. 254. Digitalis Orientalis sesamum dicta. Burm. Zeyl. pag. 87. tab. 38. fig. 1

Virtus: præcipue feminum, & olei expressi. Resolvens, Emollient. Prodest in convulsionibus, si folia Absynthii cum illo contundantur, & calidè fricentur artus convulsi. Uſus eſculentus in condensatis cibis.

GENUS XXX. CHELONE.

Char. Gener. *Cal.* 5-partitus. *Rudimentum* filamenti quinti inter supraem staminâ. *Caps.* 2-locularis. Lin. sy. pl. G. 806.

Sp. 1. CHELONE OBLIQUA. a. . . .

Differ. spec. Chel. *foliis* lanceolatis, petiolatis, ferratis, oppositis. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, 3-pedalis, erectus: *ramis* patentibus. *Folia* lanceolata, ferrata, glabra, rugosa, petiolata, opposita. *Flos* rubro-purpureus, subterminalis, 2-3-natus. *Cal.* 5-partitus.

Ca-

Corolla personata, inflata, sub-clausa, 5-fida, laciniis, subæqualibus, emarginatis. *Filamenta* 4, Didynamica. *Rudimentum* quinti non erat. *Capsula* 2-locularis, 2-sperma.

Habitat Agrestis in Cochinchinâ.

Mill. ic. 62. tab. 93.

GENUS XXXI. ANTIRRHINUM.

Char. Gener. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* basis deorsum prominens, nectarifera. *Caps.* 2-locularis. Lin. sy. pl. G. 808.

Sp. 1. ANTIRRHINUM SPURIUM. &

Differ. Spec. Ant. *foliis* ovatis, alternis: *caulibus* procumbentibus. Lin. sp. 4.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 3-pedalis, procumbens, pilosus: *ramis* multis, diffusis. *Folia* ovata, cordata, tomentosa, infima opposita, superiora alterna. *Flos* luteus, solitarius, pedunculis axillaribus. *Corolla* nectario calcarato, incurvo: *labio* superiore 2-fido, inferiore 3-fido: *fauce* clausâ.

Habitat incultum Cantone Sinarum.

Antirrhinum caule procumbente, foliis villosis, ovatis, imis conjugatis, superioribus alternis. Hall. Helv. n. 341.

Sp. ANTIRRHINUM LINARIA. & Søy kue hoā.

Differ. spec. Ant. *foliis* lanceolato-linearibus, confertis: *cavile* erecto: *spicis* terminalibus sessilibus, floribus imbricatis. Lin. sp. 31.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, perennis, duriusculus, erectus, sesquipedalis, simplex, teres: *ramis* erectis, paucis. *Folia* lanceolato-linearia, integerrima, sparsa, confertaque. *Flos* imbricatus, spicis longis, terminalibus, colore dilutè luteo, croceoque variatus. *Calyx* 5-phyllus, acutus: *foliolis* binis inferioribus divaricatis, *corolla* calcar subulatum prementibus. *Corolla* labio superiore 2-fido, inferiore 3-fido: *fauce* turgidâ, clausâ. *Stamina* 4, sub-petaliformia, exotica, tortuosa, quorum 2 breviora. *Capsula* subrotunda, apice 2-loba, bilocularis, polysperma, saepius abortiens.

Habitat Cantone Sinarum, cultum ob speciem floris.

Antirrhinum foliis linearibus, sparsis. Hort. Cliff. pag. 325. Antirrhinum foliis linearibus, adscendentibus, congestis: caule erecto, spicato. Hall. Helv. n. 336.

Sp. 3. ANTIRRHINUM MOLLE. & Rau Chiœ loung.

Differ. Spec. Ant. *corollis* ecaudatis: *foliis* oppositis ovatis, tomentosis: *caulibus* procumbentibus. Lin. sp. 40.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, procumbens, 2-pedalis, 4-falcus, pilosus, ramosus. *Folia* ovata, integerrima, parva, utrinque villosissima, opposita. *Flos* purpureus, sub-terminalis, verticillatus: *labio* corollæ superiore 2-fido, inferiore 3-fido: *rietum* clauso: *caudæ* nullæ. *Capsula* oblonga, 2-locularis, *seminibus* lenticularibus.

Habitat spontaneum in pratis Cochinchinæ.

Antirrhinum Hispanicum villosum, origani folio glutinoso. Tourn. Inst. pag. 168.

† Sp. 4. ANTIRRHINUM PORCINUM. a Rau Chico heo.

Differ. spec. Ant. *floribus* ecandatis, verticillatis: *foliis* lanceolatis, oppositis, glabris: *caulibus* erectis.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, sesquipedalis, annuus, sub-multiplex, diffusus. *Folia* lanceolata, sub-ferrata, glabra, viscosa, sessilia, opposita. *Flos* albo-purpureus, axillaris, verticillatus, multus: *calyce* 5-partito, longiusculo, laciniis subulatis, erectis, pilosis. *Corolla* 5-fida, parum gibba, ecaudata, *rietum* patente, calyce brevior. *Capsula*, 2-locularis, polysperma, apice dehiscens.

Habitat loca humida Cochinchinæ: ubi colligitur pro nutrimento suum, ex quo vernaculum nomen Porcinum.

† Sp. 5. ANTIRRHINUM AQUATICUM. a Rau Chico nioe.

Differ. spec. Ant. *foliis* verticillatis: *floribus* solitariis: *corollis* rotundè inflatis.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 2-pedalis, erectus, teres, glaber. *Folia* lanceolato-linearia, verticillata, sub-quaterna, integerrima, glabra, sessilia. *Flos* purpurascens, axillaris, solitarius. *Calyx* 5-partitus. *Corolla* palato aperto, rotundè inflata, personata, labio superiore 2-fido, inferiore 3-fido. *Capsula* oblonga, 2-locularis, polysperma.

Habitat in paludibus Cochinchinæ.

G E N U S XXXII. C O L U M N E A .

Char. Gener. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* labium superius fornicatum, integrum: supra basim gibba. *Antheræ* connexæ. *Capsula* 2-locularis. Lin. sy. pl. G. 856.

† Sp. 1. COLUMNEA STELLATA. a Hœa Kach.

Differ. spec. Col. *foliis* stellatis: *floribus* solitariis: *caule* repente.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, perennis, repens, teres, gracilis, albicans: *ramis* sub-erectis, 4-pollicaribus, tenerimis. *Folia* ovata, 3 lineas longa, serrata, stellata terna, pallidè virentia, odo-

ri-

rifera, petiolata. *Flos* albus, rubro virgatus, hirsutus, solitarius; axillaris, pedunculatus. *Cal.* 5-paritus, laciinis subulatis, erectis, æqualibus. *Cyrolla* ringens, tubo longiusculo, vix gibbo: labio superiore fornicato, 3-fido: inferiore 2-fido. *Stamina* Didynamica, per paria invicem incurvata: antheris ovatis, connexis, difficulter separabilibus. *Capsula* subulata, 2-locularis, polysperma. Omnia, præter capsulam, pilosa. *Planta* aquatica, quæ, deficiente humore, statim perit: odore, & aspectu amænissima: mundo muliebri conveniens, & usitata.

Habitat in multis locis Cochinchinæ: colitur in vasis fictilibus, & ligneis aquâ plenis, substrato luto.

Virtus. Emollientis, Refrigerans, Humectans.

GENUS XXXIII. MAZUS.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium campanulatum, magnum, 5-gonum, 5-sidum: laciiniis lanceolatis, patentibus, sub-æqualibus, persistentibus.

Cor. Ringens, labio superiore acuminato, sub-fornicato, leviter 2-fido: inferiore longiore, 3-fido, laciinis rotundatis, inflexis: faux exterius bifulcata, interius consita papillis pedunculatis.

Stam. Filamenta 4 (quorum duo longiora) per paria invicem inflexa. Antheræ oblongæ, connexæ.

Pist. Germen sub-rotundum. Stylus filiformis, æqualis staminibus longioribus. Stigma spathulatum, 2-sidum, hians.

Peric. Capsula sub-rotunda, compressa, 2-locularis, 2-valvis, polysperma.

Sem. Multa, ovata, minuscula.

Nom. (*Mazos* papilla) a papillis pedunculatis, quæ faucem obstruant.

Char. Gener. *Cal.* campanulatus. *Cor.* ringens, fauce papillis obstruētā. *Antheræ* connexæ. *Caps.* 2-locularis.

† Sp. 1. MAZUS RUGOSUS. a Rau dâng lóng lá.

Differ. spec. *Maz. foliis* ovatis rugosis: *spica* laxâ, terminali.

Hab. *Caulis* herbaceus, annuus, sub-erectus, semipedalis, ramosus.

Folia ovata, ferrata, rugosa, opposita. *Flos* albo-violaceus, *spica* longâ, laxâ, pedunculis longiusculis.

Habitat in agris Cochinchinæ.

G E N U S · X X X I V · M A N V L E A ·

Char. Gener. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* limbo 5-partito subulato : laciniis superioribus 4 magis connexis. *Caps.* 2-locularis, polysperma. Lin. sy. pl. G. 830.

† Sp. 1. MANVLEA INDIANA. & Non trān Nam.

Differ. Spec. Man. *foliis* ovatis, integerrimis, oppositis : *flore* capitato.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, sesquipedalis, erectus, durus, villosus, simplex, ramis ascendentibus. *Folia* oblongo-ovata, integerrima, ciliata, incana, opposita, sessilia. *Flos* cæruleus, capitulis sub-rotundis, bracteis setosis, flosculis intermixtis. *Calyx* 5-partitus, acutus, villis hispidus, sub-æqualis. *Corolla* limbus 5-partitus, laciniis acutis, 4 superioribus magis connexis. *Stamina* Didynamica, antheris connexis. *Capsula* acuminata, 2-locularis, 2-valvis, polysperma. Planta odorata satureiæ odore.

Habitat prope maris litora arenosa in Cochinchinâ.

G E N U S · X X V · M A R T Y N I A ·

Char. Gener. *Cal.* 5-fidus *Cor.* ringens. *Caps.* lignosa, corticata, rostro hamato, 5-locularis, 2-valvis. Lin. sy. pl. G. 811.

† Sp. 1. MARTYNIA ZANGUEBARIA. v. Biri viri.

Differ. Spec. Mart. *foliis* pinnati-fidis : *flore* axillari solitario : *caule* procumbente.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, teres, procumbens, ramosus, 8-pedalis. *Folia* oblonga, pinnato-incisa, pilosa, opposita, petiolata. *Flos* dilutè purpureus, axillaris, solitarius. *Calyx* 5-phylloides, foliolis lanceolatis, pilosis, expansis, sub-æqualibus, deciduiis. *Corolla* ringens, tubo magno, sub-rotundo-gibbosio : *limbo* brevi, labio superiore 3-fido, obtuso, lacinia media emarginatâ : *labio* inferiore ovato, integro, longiore. *Filamenta* 4, Didynamica, subulata, incurva, omnia limbo breviora, basi corollæ insidentia. *Antheræ* oblongæ, 2-loculares, incumbentes. *Germen* superum, sub-rotundum, pilis densis ex corollæ basi assurgentibus occultum. *Style* filiformis, longior staminibus. *Stigma* lanceolatum, 2-fidum, erectum. *Pericarpium* capsula lignosa, sub-ovata, compressa, utrinque bisulcata, 2-rostris, 4-locularis, 1-sperma, 2-valvis : rostris recurvis : cortice coriaceo, tenui.

Habitat in litoribus Zanguebar Africæ Orientalis.

Ob-

Observ. Convenit cum Martyniā Annuā (Reliq. Houst. pag. 5. tab. 10.) loculis 4, monospermis, & formā drupæ; cur enim capsulam potius dicemus, quam drupam? Labia etiam corollæ convenire possunt, si duas lacinias laterales labio superiori adjudicemus, non inferiori: ut Houstonus fecit: fissura autem suprema in plantâ Africana brevior est, & pro emarginaturâ censer debet: tubus brevior, sub-globosus.

GENUS XXXVI. CORNUTIA.

Char. Gener. *Cal. 5-dentatus. Stamina Corollâ longiora. Stylus longissimus. Bacca 1-sperma.* Lin. sy. pl. G. 825.

† Sp. CORNUTIA QUINATA. *U sī kām.*

Differ. spec. *Corn. foliis 5-natis, lanceolato-ovatis: flore racemoso.*
Hab., & notæ. *Arbor mediocris: ramis patentibus, teretibus. Folia 5-nata, lanceolato-ovata, acuminata, integerrima glabra: petiolo communi longo. Flos luteo-viridis, racemis terminalibus. Calyx le-viter 5-dentatus. Corolla sub-infundibuliformis, ringens: labio superiore 3-fido: inferiore 2-fido, breviore. Stamina Didynamica, corollâ longiora. Stylus longior corollâ, & staminibus, non tamen longissimus. Stigma 2-fidum, reflexum. Bacca subrotunda, gibbofa, Carnosa, 1-sperma.*

Habitat in sylvis prope Cantonem sinarum.

GENUS XXXVII. CLERODENDRUM.

Char. Gener. *Cal. 5-fidus, campanulatus. Cor. tubo filiformi: limbo 5-partito, aequali. Stamina longissima intra lacinias maximè hiantes. Bacca 1-sperma.* Lin. sy pl. G. 852.

Sp. 1. CLERODENDRUM INFORTUNATUM. *Fung mi chū.*

Differ. spec. *Cler. foliis cordatis tomentosis.* Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis fruticosus, erectus, 7-pedalis: ramis 4-gonis, 4-sulcatis. Folia magna, cordata, lato-ovata, acuminata, sub-crenata, pilosa, rugosa, opposita, petiolis longis. Flos terminalis Cymbo racemoso, vasto. Calyx, corolla, stamina, stylus, pedunculi omnia coloris coccinei rutili. Calyx 5-fidus, campanulatus. Corolla tubo longo, tenui: limbo 5-fido, subaequali, rotundato: stamina longissima, per fissuram supremam Corollæ ascendentia: antheris nutantibus, basi emarginatis. Stylus longus: stigmate aecto, bifido. Bacca 1-sperma.*

Habitat Gastone. Sinarum.

Burm.

Burm. Ind. pag. 137. Burm. Zeyl. pag. 66. tab. 29.

G E N U S XXXVII. V O L K A M E R I A .

Char. Gener. *Cal.* 5-fidus, *Cor.* laciniis secundis. *Bacca* 2 sperma.
Sem. 2-locularia. Lin. sy. pl. G. 851.

Sp. 1. VOLKAMERIA INERMIS. & Sān fú mūn. Lin. sp. 2.

Differ. spec. Volk. *rantis* inermibus: *foliis* lanceolatis integerrimis:
floribus sub-ternis, axillaribus.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, erectus, 5-pedalis, teres, inermis, ramosissimus. *Folia* lanceolata, integerrima, glabra, nitida, opposita, petiolata. *Flos* albus, axillaris, pedunculis sub-trifloris. *Calyx* albus, acutè 5-fidus, persistens. *Corollæ* tubus tenuis, longissimus, limbus 5-fidus, laciniis ad latera divaricatis. *Stamina* 4, purpurea, corollâ multo longiora. *Bacca* supera, 4-sulca, seminibus duobus, bilocularibus.

Habitat inculta prope Cantonem Sinarum.

Jasminum Litoreum. Rumph. Amb. l. 7. cap. 47. tab. 46.

† Sp. 2. VOLKAMERIA PUMILA. & Sān tāng lóng.

Differ. sp. Volk. *foliis* lanceolatis, sub-integerrimis, tomentosis: *pedunculis* sub-sexfloris, axillaribus.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, 1-pedalis, erectus, teres, inermis, simplex, ramosus. *Folia* lanceolata, sub-integerrima, tomentosa, magna, opposita, petiolata. *Flos* ruber, pedunculis 5-6-floris, axillaribus. *Calyx* magnus, inflatus, acutè 5-fidus, persistens. *Corolla* 5-fida, longa, sub-æqualis. *Stamina* Didynamica, corollâ longiora. *Bacca* sub-rotunda, 4-sulca, exsucca, 2-locularis, 1-sperma, seminibus 2-locularibus.

Habitat inculta prope Cantonem Sinarum.

† Sp. 3. VOLKAMERIA PETASITES. & Cây Boung roi.

Differ. spec. Volk. *foliis* ovatis, acuminatis, rugosis: *racemis* laxis, terminalibus.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, 5-pedalis, erectus: *ramis* diffusis, brachiatis, ramulis sub-tetragonis, rubentibus. *Folia* ovata, acuminate, sub-serrata, rugosa, glabra: *petiolis* longis, oppositis. *Flos* terminalis, racemis laxis, sub-divisis: *calyce*, & *pedunculis* fusco-rubris. *Calyx* 5-gonus, inflatus, magnus, 5-partitus, laciniis acutis, persistens. *Corolla* viridi-lutea, monopetala: tubo longo, tenui: limbo 5-fido, laciniis ovatis, concavis, sub-æqualibus. *Stamina* 4, Didynamica, tenuia, brevia, fauci *corollæ* inhærentia:

antheris ovatis, magnis, nutantibus. *Germen* sub-rotundum, superum. *Stylus* subulatus, æqualis staminibus. *Stigma* acutum, bifidum. *Bacca* sub-rotunda, 4-sulca, 2-locularis, 1-sperma: *Semine* bilobo, biloculari, duriusculo.

Habitat in dumetis Cochinchinæ.

Petasites Agrestis. Rumph. Amb. I. 6. cap. 54. tab. 49.

Observ. Hanc plantam Linnæus adjunxit Clerodendro Infortunato, procul-dubio fructu non viso. Ego sæpe observavi in vivis fruticibus baccam nullatenus 1-spermam, ut in Clerodendro, sed quasi 4-fidam, bilocularem scilicet, seminibus 1-spermis, bilobis, quæ speciem quatuor seminum repræsentat, prout benè descripsit, & pinxit sagacissimus Rumphius. Quod vero folia ab ipso exponantur cordata, diversitati soli tribuendum judico, cum in aliis etiam plantis non raro accidat similis variatio.

† Sp. 4. VOLKAMERIA ANGULATA. Nu trinh thao: Cây bì.

Differ. spec. Volk. foliis cordatis, angulatis: *corymbo* racemoſo, terminali.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, simplex, erectus, 5-pedalis, inermis, teres: *ramis* reclinatis, sub-tetragonis. *Folia* magna, cordata, 5-angulata, denticulata, glabra, opposita, petiolis longis. *Flos* terminalis, in aliquibus albus, in plurimis coccineus: *racemo* corymboso, vasto, vel, si velis, paniculâ pedunculis ordinatis. *Calyx* 5-fidus, laciniis acutis, patentibus, persistens. *Corolla* 1-petala, tubo longo, tenui: limbo 5-fido, sub-æquali, laciniis brevibus, rotundatis, supremis divaricatis, amplectentibus *Stamina* longa, aſcendentia. *Stylus* æqualis staminibus. *Stigma* acutum, 2-fidum. *Bacca* exſucca, sub-4-gona, apice 4-fida, 2-locularis, 1-sperma: *semibinis* 2-lobis, 2-locularibus, duritie drupaceâ.

Habitat ubique in collibus, & hortis minus cultis in Cochinchinâ.

Observ. Suspicor hanc esse, quæ a Linnæo dicitur Clerodendrum Paniculatum, queque, observato fructu, Clerodendrum dici nequit: nec etiam Volkameria Multiflora Burmanni, (Ind. pag. 137. tab. 45. fig. I.) quæ licet vera Volkameria sit, non est Paniculata, sed Triflora, axillaris. Non satis capio, quid Linnæus velit intelligi per notam corollæ laciniis secundis. Si per has indicantur laciniæ laciniatæ, nullas tales invénimus in nostris speciebus Volkameriæ, nec etiam vidimus in figuris Auctorum, quos habemus.

GENUS XXXIX. VITE X.

Char. Gener. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* limbus 6-fidus. *Bacca* 4-sperma.
Lin. sy. pl. G. 853.

Ddd

Sp. I.

Sp. 1. VITEX TRIFOLIA. α Thuốc ôn: Quan âm bien: Mạn Kinh.
 Differ. spec. Vit. *foliis* ternatis, quinatisque integerimis: *paniculis* dichotomis. Lin. sp. 2.
 Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, ramosus, teres, 8-pedalis, digitum crassus, procumbens, aliquando repens. *Folia* ternata, rarius quinata: foliolis ovatis, integerimis, undulatis, superius obscurō-virentibus, subtus cinereo-incanis, mollibus: *petiolis* communibus longis, oppositis. *Flos* violaceus, terminalis: *racemis* dichotomis. *Calyx* 5-dentatus. *Corolla* ringens: labio superiore 3-fido, inferiore 2-fido, laciinis obtusis. *Bacca* parva, globosa, dura, glabra, nigra, (Piperis similis) 4-sperma.

Habitat frequentissima ad maris litora, per arenam repens in Cochinchinā, sicut etiam in Chinā.

Lagondium Vulgare. Rumph. Amb. I. 6. c. 21. tab. 18. Vitis Trifolia, Indica, Minor. Pluken. Almag. 390. tab. 206. fig. 5. Negundo Fœminā. A Costa. Arom. c. 38. apud Clus. Exot. pag. 280.

Virtus: præcipue fructus. Calefaciens, Discutiens, Nervina, Cephalica, Emmenagogue. Prodest in Paralysi, artuum debilitate, & doloribus. Quod fæliciter probarunt Gracias, Acosta, Rumphius, & Bontius etiam in semet-ipso, præter Medicos Indianos, apud quos in magno est usu tam interno, quam externo. Sapor plantæ amarians. Odor gravis, intensus, sub-aromaticus.

Sp. 2. VITEX NEGUNDO. α Thuốc ôn ràng. β Mạn Kim.
 Differ. spec. Vit. *foliis* quinatis, ternatisque, serratis: *floribus* racemoso-paniculatis. Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. *Caulis* arboreus, tortuosus, brachium crassus, *ramis* expansis. *Folia* lanceolata, quinata, ternataque, plerumque integerima, aliquando ferrata, plana, venosa, fulso-cinerea, petiolis oppositis. *Flos* purpurascens, *racemis* laxis, terminalibus, erectis. *Calyx*, *corolla*, & *fructus* a præcedenti specie non differunt. Similis etiam sapor, & odor: virtus eadem, sed minus efficax.

Habitat in locis mediterraneis sylvestribus Cochinchinæ, & Chinæ.
 Lagondium Litoreum. Rumph. Amb. I. 6. cap. 22. tab. 19. Bemnosi. Rheed. Malab. 2. pag. 15. tab. II. Negundo arbor mas. Bauh. h. I. pag. 189.

\ddagger Sp. 3. VITEX SPICATA. α Cây Ngu trao. β Ú chẽ Kim.
 Differ. spec. Vit. *foliis* quinatis, crenatis: *spicis* linearibus, terminalibus.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, erectus, 8-pedalis, crassus: *radice* sæpe cespitosa. *Folia* 5-nata, raro 3-nata, lanceolata, crenata, aliqua

aliqua integerrima, lètè virentia, tomentosa, rugosa, graveolenta, opposita, petiolis longis. *Flos* albo-violaceus, spicis longis, linearibus, sèpe congestis, terminalibus: *involucellis* partialibus subulatis, polyfloris. *Calyx* minimus, 5-fidus, acutus, persistens. *Corolla* 1-petala, tubo brevi, globoso: limbo patente, 5-fido, laciniis obtusis, 4 superioribus, sub-æqualibus, summâ maiore. *Filamenta* 4, Didynamica, laciniâ inferiori corollæ breviora, superioribus longiora, tubo prope basim insidentia. *Stigma* 2-fidum, reflexum. *Bacca* sub-rotunda, fusca, Pipere minor, 4-sperma.

Habitat inculta, cultaque in Cochinchinâ, & Chinâ.

Virtus. Calefaciens, Resolvens, Nervina, Anodyna. Prodest in Paralysis, Hemiplegia, Tremore, & contractione membrorum, eorum debilitate, doloribus vagis. Usus frequentior foliorum, externus.

Observ. Vitex Pinnata Linnæi (sy. pl. sp. 4) ex Bumanno (Ind. pag. 138. tab. 43. fig. 2.) Malaicè dicta Tsjulang, & vocata Camuumum sinense a Rumphio (Amb. l. 7. c. 15. pag. 28. tab. 18, fig. 1. ex Auctuario) nullatenus ad hoc Genus, aut Glaeser pertinet: sed ad Pentandriam Dignyiam, ubi videri potest, a nobis indica ta nomine Aglaia Odorata.

† GENUS XL. TRIPINNA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium Cyathiforme, 5-crenatum, persistens.

Cor. Monopetala, sub-campanulata, patens: tubo calycem superante: limbo 5-fido: laciniis ovatis, undulatis, villosis, summâ maiore.

Stam. Filamenta 4 (quorum duo longiora) corollæ subæqualia. Antheræ bicornes, incumbentes.

Pist. Germen subrotundum. Stylus æqualis staminibus. Stigma acutum, bifidum.

Peric. Bacca ovata, carnosâ, 1 locularis, polysperma.

Sem. Oblonga, compressa, pauca.

Nom. Tripinnata vocavi a foliis tripinnatis.

Char. Gener. *Cal.* Cyathiformis, 5-crenatus. *Cor.* sub-campanulata, 5-fida: summâ maiore. *Bacca* 1-locularis, polysperma.

† Sp. 1. TRIPINNA TRIPINNATA. & Cay Den.

Differ. spec. Trip. *foliis* 3-pinnatis: *foliolis* ovatis, acuminatis: *racemis* terminalibus.

Hab. Arbor magna, ramis patentibus. *Folia* tripinnata cum impari maiore: *foliolis* ovatis, acuminatis, integerrimis, glabris. *Flos* luteo-ruber: *corymbis* racemosis, terminalibus.

Habitat in sylvis montanis Cochinchinæ.

† G E N U S X L I. S E P T A S.

Descriptio Naturalis.

- Cal. Perianthium septem-partitum : laciniis profundis, erectis, 4 oppositis subulatis, 3 alternis ovatis, acutis, maioribus.
 Cor. Infundibuliformis, tubo brevi : limbo 5-partito, laciniis oblongo-ovatis. subæqualibus.
 Stam. Filamenta 4 (quorum 2 longiora) subulata, erecta, corollâ breviora. Antheræ incumbentes.
 Pist. Germen oblongo-acutum. Stylus sub æqualis staminibus. Stigma obtusum, emarginatum.
 Peric. Capsula oblonga, acuta, 2-locularis, polysperma.
 Sem. Subrotunda, plurima.
 Nom. Septas a septenario numero laciniarum calycis.
 Char: Gener. *Calyx* 7-partitus : laciniis 4 oppositis subulatis : 3 alternis ovatis. Cor. infundib; 5-partita. Caps. 2-locularis.

† Sp. I. SERTAS REPENS. p. Pā tsī hiēn.

- Differ. spec. Sept. Caule repente : foliis oblongo-ovatis : floribus solitariis.
 Hab. Herba humilis, annua, caule ramoso, repente. Folia oblongo-ovata, integerrima, sessilia, opposita. Flos albus, solitarius, axillaris : pedunculis longis.
 Habitat in suburbis Cantonensibus apud Sinas.

† G E N U S X L I I. P I C R I A.

Descriptio Naturalis.

- Cal. Perianthium 4-phylum, deciduum : foliolis 2 ovatis, planis ; corollâ longioribus : binis aliis alternis linearibus, brevioribus.
 Cor. Tubulosa, ringens : tubo in medio constricto : labio superiore spathulato, emarginato : inferiore ampliore, 3-fido, laciniis rotundatis, æqualibus.
 Stam. Filamenta 4, quorum 2 longiora erecta, seorsim vaginata tubulis papilloſis : antheris 1-locularibus, curvis, invicem distantibus. Duo alia breviora inflexa, antheris 2-locularibus, connexis.
 Pist. Germen ovatum. Stylus corollæ æqualis. Stigmata 2, lanceolata ; erecta.
 Peric. Bacca ovata, infera, 2-locularis, polysperma.

Sem,

D I D Y N A M I A A N G I O S P E R M I A .

393

Sem. subrotunda plurima.

Nom. (Πικρία amaritudo) ob insignem plantæ amaritiem.

Char. Gener. *Cal.* 4 - phyllus. *Cor.* ringens. *Bacca* 2 - locularis.

Spec. 1. PICRIA. FEL TERRÆ. a. Cây mât dat. b. . .

Differ. spec. Pic. *foliis* ovatis, ferratis : *floribus* confertis.

Hab. *Caulis* herbaceus, perennis, sesquipedalis, erectus, multiplex,
4-gonus, ramosus. *Folia* ovata, serrata, aspera, glabra, opposita.
Flos albo-ruber, congestus, pedunculatus, axillaris; & terminatus.

Habitat culta in hortis Cochinchinæ, & Chinæ.

Virt: Foliorum. Aperiens, Pellens, sudorifica, Diuretica, Emmenoga-
ga. Usus in Hydrope incipiente, Febribus intermittentibus, mensi-
bus, & lochiis suppressis, doloribus colicis, & iliacis.

1. RAPARICIA	2. RIBOTIA
3. CITRONE	4. CARDAMOMA
5. SINAPE	6. SISYMBRIUM

C L A S S I S X V.

T E T R A D Y N A M I A.

S I C U L O S Æ.

1. LEPIDIUM. *Silicula cordata*: *valvulis acutè carinatis.*

2. THLASPI. *Silicula obcordata*: *valvulis marginato-carinatis.*

S I L I Q U O S Æ.

3. RAPHANUS. *Siliqua articulata*: *cal. connivens.*

4. BRASSICA. *Glandulae 2 intra stamina breviora*: *2 extra stamina longiora*: *cal. connivens.*

5. RICOTIA. *Siliqua unilocularis*: *cal. connivens.*

6. CLEOME. *Siliqua dehiscens*, *unilocul. Cal. hians.*

7. CARDAMINE. *Siliqua dehiscens*: *valvulis revolutis.*

8. SINAPIS. *Siliqua dehiscens*. *Cal. horizontaliter patens.*

9. SISYMBRIUM. *Siliqua dehiscens*: *valvis rectiusculis. Cal. patulus.*

SILICULOSÆ.

GENUS I. LEPIDIUM.

Char. Gener. *Silicula* emarginata, cordata, polysperma: *valvulis carinatis*, dissepimento contrariis. Lin. sy. pl. G. 865.

Sp. I. LEPIDIUM PETRÆUM. β Tim li. α Dinh lich.

Differ. spec. Lep. *foliis* pinnatis, integerimis: *petalis* emarginatis, calyce minoribus. Lin. sp. 6.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 8-pollicaris, teres, rectus. *Folia* latto-lanceolata, integerima, parva, pinnata. *Flos* dilutè luteus, spicis simplicibus, erectis, longis, terminalibus. *Stamina* Tetradyntica. *Silicula* ovata, emarginata, compressa, 2-locularis, polysperma. Sapor grātē amarus, & ardens. Odor lenis.

Habitat agreste in Chinâ.

Nasturtium *foliis* pinnatis, radicalibus ovato-lanceolatis, caulinis linearibus. Hall. Helv. n. 515. Nasturtium Pumilum, Vernum. Bauh. Pin. pag. 105. n. 8.

Virt. Diuretica, Antiscorbutica. Prodest in Hydrope, & Tussi interterâ. Phlegma viscosum dissolvit. Usus primarius semenum.

GENUS II. THLASPI.

Char. Gener. *Siliqua* emarginata, obcordata, polysperma: *valvulis navicularibus*, marginato-carinatis. Liu. sy. pl. G. 866.

Sp. I. THLASPI BURSA PASTORIS. α Hán san tsào.

Differ. spec. Th. *siliculis* obcordatis: *foliis* radicalibus pinnati-fidis. Lin. sp. 10.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, erectus, 1-pedalis, glaber, multiplex: *radice* divisa, albissimâ. *Folia* radicalia pinnati-fida: caulina sagittato-linearia, suprema integerima, media denticulato-repanda: omnia tomentosa: coloris obscurō-viridis. *Flos* albus, racemis erectis. *Silicula* obcordata, sub-trigono-æquilatera, sursum emarginata, *valvis* carinatis, 2-locularis: *seminibus* multis, sub-reniformibus.

Habitat incultum in Chinâ.

Thunb. Jap. pag. 259. Nasturtium siliquis triangularibus. Hasl. Helvet. pag. 514.

Virtus: totius herbeæ in decocto. Refrigerans, Adstringens. Valet contra sputum sanguinis, Dysenteriam, & Mensium fluxum immodicum.

S I L I Q U O S A.

G E N U S III. R A P H A N U S.

Char. Gener. *Cal.* clausus. *Siliqua* torosa, sub-articulata, teres. *Glandulae* melliferæ 2 inter stamina breviora, & pistillum: totidem inter stamna longiora, & calycom. Lin. sy. pl. G. 886.

Sp. 1. RAPHANUS SATIVUS. β Tsái fú Kēn. α La bac: Cai cu.
Differ. spec. Raph. *siliquis* teretibus, torosis, bilocularibus. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Radix* oblongo-turbinata, indivisa, carnoxa, alba, magna. *Caulis* annuus, 2-pedalis, erectus, teres. *Folia* oblongo-ovata, incisa, serrata, magna. *Flos* albo-purpureus, spicis longis, terminalibus: glandulis duabus inter stamna breviora, & pistillum. *Glandulas* vero alias inter stamna longiora, & calycom non invéni in plantâ Cochinchinensi. *Siliqua* longa, teres, acuminata, torosa, lœvis, sub-articulata, sub-2-locularis, *seminibus* multis, sub-rotundis.

Habitat cultus in Cochinchinâ, & in Chinâ.

Thunb. Jap. pag. 263. Burm. Ind. pag. 140.

Virtus: seminum. Pellens, Resolvens, Diuretica, Eccoprotica. Radix esculenta, sapore acris, juvat in Ischuria, Asthmate, Raucedine.

G E N U S IV. B R A S S I C A.

Char. Gener. *Cal.* erectus, connivens. *Sem.* globosa. *Glandula* inter stamna breviora, & pistillum: interque longiora, & calycom. Lin. sy. pl. G. 884.

Sp. 1. BRASSICA OLERACEA. α Cai rò tau.

Differ. spec. Bras. *radice* caulescente, tereti, carnosâ. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, biennis, 2-pedalis, erectus, crassus, teres. *Folia* sub-rotunda, concava, magna, glabra: petiolis canaliculatis, carnosis. *Flos* luteus, terminalis. *Siliqua*, *seminibus* globosis.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ: dubito an indegena? In utroque regno folia sœpe in globum connivent, licet non tam densum, ut in Europâ. Karò floret.

Hortus Cliffort. pag. 338. Brassica alba, vel viridis. Bauh. Pin. pag.

Sp. 2.

Sp. 2. BRASSICA CHINENSIS. α Cai rô Annam. β Chāi lán tsái.
Differ. spec. Bras. *foliis* ovalibus, subintegerrimis, *floralibus* ample-
xicaulibus lanceolatis: *calycibus* ungue, petalorum longioribus. Lin.
sp. 8.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, perennis, ad 5 pedes, & ultra sæ-
pe assurgens: *radice* caulescente, tereti, durissima. *Folia* sub-ova-
lia, subintegerrima, rugosissima parva, sub-plana, *petiolis* longis,
subteretibus. *Flos* albus, terminalis, spicis laxis.

Habitat culta in Cochinchinâ, & Chinâ.

Burm. Ind. pag. 140.

GENUS V. RICOTIA.

Char. Gener. *Siliqua* unilocularis, oblonga, compressa: *valvulis* pla-
nis. Lin. sy. pl. G. 874.

† Sp. 1. RICOTIA CANTONIENSIS. β . . .

Differ. spec. Ric. *foliis* oblongis, pinnato-incisis: *flore* solitario.
Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 10-pollicaris, erectus, multiplex,
fulcatus, glaber. *Folia* oblonga, pinnato-incisa, parva, glabra, ses-
silia. *Flos* luteus; solitarius: *calyce* 4-phyllo, sub-patente: *corol-*
lā 4-petalā, cruciformi, obcordatā, patente. *Stamina* Tetrady-
nica. *Siliqua* oblonga, compressa, tenuis, subfessilis: *axillaris*,
obliqua, 1-locularis, 2-valvis: *seminibus* multis, ovatis.

Habitat inulta Cantone sinarum.

GENUS VI. CLEOME.

Char. Gener. *Glandulæ* nectariferæ 3, ad singulum sinus calycis sin-
gulæ, excepto infimo. *Petala* omnia ascendentia. *Siliqua* unilocu-
laris, bivalvis. Lin. sy. pl. G. 890.

Sp. 1. CLEOME PENTAPHYLLA. α Mân mân tia.

Differ. spec. Cle. *floribus* Gynandris: *foliis* quinatis: *caule* inermi.
Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, inermis, erectus, sim-
plex, 2-pedalis, teres, fusco-ruber: *ramis* diffusis. *Folia* quina-
ta, petiolo communi longo: *foliolis* ovalibus, tomentosis, fessilibus,
supremo maiori. *Flos* albicans, spicâ longâ, erectâ, terminali: *bra-*
cteis 3-phyllis flores distinguenteribus. *Calyx* inferus, 4-phillus,
foliolis oblongis, erectis, deciduis. *Corolla* petala 4, rotundata,
inæqualia, patentia: *unguis* longis, filiformibus, *Filamenta* 6,

Eee

lon-

longa, filiformia, æqualia, patentia, receptaculo filiformi, longo, in medio intumescenti insidentia: *antheris* oblongis, stantibus. *Germen* oblongum, apici ipsius receptaculi elongati inhærens: a basi staminum distans. *Stylus* nullus. *Stigma* lenticulare, retusum. *Pericarpium* siliqua 3-pollicaris, subulato-teres, rugosa, 1-locularis, 2-valvis: *seminibus* plurimis, reniformibus, rugosis, 6 ordinibus stratis: insistens *pedunculo*, sive receptaculo longo, florifero, staminifero, fructifero.

Habitat inculta agros, & hortos Cochinchinæ.

Lagansa Rubra. Rumph. Amb. I. 8. c. 66. t. 96. fig. 2. Sinapistrum Indicum Pentaphyllum, flore carneo, minus, non spinosum. Burm. Zeyl. pag. 216.

Sp. 2. CLEOME ICOSANDRA. *a* Màn mòn tláng.

Differ. spec. Cle. *floribus* Icosi-tetrandis: *foliis* quinatis. Lin. sp. 6. Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 2-pedalis, erectus, teres, inermis, striatus, pilosus: *ramis* ascendentibus. *Folia* quinata, ovato-lanceolata, aspera, petiolo communi longo, proprio nullo. *Flos* luteus, axillaris solitarius. *Omnia*, præter petala, & stamina, confita papillis viscosis. *Calyx* campanulatus, 4-phyllus, foliolis lanceolatis, deciduis. *Corolla* campanulata, patens, petala 4, ovato-oblonga, sub-æquaria, calyce longiora. *Filamenta* 18-22, subulata, brevia, æqualia, receptaculo planiusculo inserta: *antheris* subulatis, recurvis. *Germen* superum, oblongum. *Stylus* crassus, brevis. *Stigma* obtusum. *Pericarpium* siliqua longa teres, subulata, tenuis, obliquè striata, 1-locularis, polysperma: *seminibus* reniformibus.

Habitat inculta in hortis, & agris Cochinchinæ.

Lagansa Alba. Rumph. Amb. I. 8. c. 66. tab. 96. fig. 3. Sinapistrum Zeylanicum Pentaphyllum viscosum, flore flavo. Burm. Zeyl. pag. 215. tab. 99.

Observ. In ambabus his speciebus Cleomes vix Cleomen ipsam agnosc. Stamina nullatenus sunt Tetradyynamica: glandulas ad sinus calycis non notavi: nec petala ascendentia. Siliqua sola coheret.

GENUS VII. CARDAMINE.

Char. Gener. *siliqua* elasticè dissiliens, valvulis revolutis. *Stigma* integrum. *Cal.* subhians. Lin. sy. pl. G. 876.

Sp. 1. CARDAMINE CHELIDONIA. *b* . . .

Differ. spec. Card. *foliis* pinnatis: filiolis quinis, incisis. Lin. sp. 8. Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 8-pollicaris: ramis multis ascen-

-den-

dentibus. *Folia* pinnata, foliolis septenis, lanceolatis, incisis; glabris. *Flos* albus, spicis simplicibus, terminalibus. *Calyx* 4-phyllos, filiolis oblongis, curvis, sub-hiantibus. *Corolla* 4-petala, campanulata, patens. *Siliqua* longiuscula, teres, 2-locularis, valvis revolutis dehiscens: seminibus ovatis. *Stigma* obtusum, integrum, sessile.

Habitat inculta Cantone Sinarum.

Cardamine glabra, Clelidonii folio. Pall. it. 3. pag. 34. Mill. Dict. n. 10.

GENUS VII. SINAPIS.

Char. Gener. *Cal.* patens. *Cer.* unguis recti. *Glandula* inter stamina breviora, & pistillum, interque longiora, & calycem. Lin. sy. pl. G. 885.

Sp. 1. SINAPIS CHINENSIS. β Kíai tsái. α Cái cu: Cái sen: Cái mó. Differ. spec. Sin. *Siliquis* lèvibus, sub-articulatis, patulis: *foliis* lyrato-runcinatis, sub-hirsutus. Lin. sp. 8.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 3-pedalis, crassus, striatus, ramosus. *Folia radicalia* magna, oblongo-ovalia, lyrato-runcinata, rugosa, pilis raris, saepe nullis: *petiolis* sub-teretibus, caniculatis, brevibus, carnosis. *Folia caulina* cordato-conica, amplexicaulia, sub-ferrata, alterna, glabra, auriculis rotundatis. *Flos* terminalis luteus, spicis longis, simplicibus. *Siliqua* patulæ, lèves, toro-surgidæ, 2-loculares: *seminibus* globosis, fuscis.

Habitat latissimè culta in Chinâ, & in Cochinchinâ.

Observ. Duæ hujus varietates inveniuntur in Cochinchinâ dictæ *cai sen*, *cai mó*, quæ folia habent integra nec lyrata, multo sapidiores, & teneriores pro cibo. Hujus quoque varietas est Sinapis Juncea (Linnæi sp. 9.): sicut etiam Sinapis Cernua. Thunb. Japon. pag. 261.

Sinapi Indicum maximum, lactucæ folio. Herm. Par. pag., & tab. 230.

Virtus: semen. Incidens, Stimulans. Valet præcipue in morbis ex impunitâ crassâ oriundis. Extremè pro Sinapismis.

Sp. 2. SINAPIS BRASSICATA. β Pë Kíai. α Cái bách thoái. Differ. spec. Sin. *foliis* ob-ovatis, denticulatis, lèvibus. Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 2-pedalis, glaber, simplex, lèvis, teres, albus. *Folia radicalia* ob-ovata, plana, glabra, obscuro-viridia, nitida denticulata: *petiolis* longis, curvis, albissimis: cau-

lina sub-lanceolata, sessilia, amplexicaulia. *Flos* flavus, *calyce* concolore, erecto : spicis simplicibus, longis, terminalibus. *Siliquæ* sub-teretes, patulæ, pedunculatæ, 2-loculares.

Habitat copiosè culta in Chinâ, & Cochinchinâ.

† Sp. 3. SINAPIS PEKINENSIS. β Pē tsāi. α Cai bén.

Differ. spec. Sin. *foliis* turbinato-ovatis, integris, crispis : *petiolis* sub-planis, latis : *siliquis* glabris, planiusculis.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 2-pedalis, erectus, crassus, teres, glaber. *Folia* radicalia turbinato-ovata, integra, ferrato-runcinata, crispata, glabra, flavescentia, tenerrima : *petiolis* sub-planis, latissimis, albis, sulcatis, semiamplexicaulibus : *caulina* conica, sessilia integerrima. *Spicæ* solitariæ, longissimæ, patentæ. *Calycis* foliola 4, oblonga, obtusa, erecta, lutea. *Corolla* similiter lutea, 4-petala, patens. *Siliquæ* lineares, compressæ, glabræ, 2-loculares : *seminibus* globosis, rufis.

Habitat Pekini culta, ubi omnium optima. In Cochinchinâ altius crescit, inferior qualitate. In Lusitaniâ satam, & plantatam servo, sed quotannis in peius degenerantem.

Obsery. Attendens ad varietates Brassicæ Oleraceæ in Europâ cultas, & facie inter se valde differentes dubitare cœpi, num omnes istæ sinapis plantæ dici etiam debeant varietates, non diversæ species?

Virtus. Fere eadem, quæ præcedentium, sed debilior.

GENUS IX, SISYMBRIUM.

Char. Gener. *Siliqua* dehiscens valvulis rectiusculis. *Cal.* patens. *Cor.* patens. Lin. sy. pl. G. 877.

† Sp. 1. SISYMBRIUM APETALUM. α Cai hoang.

Differ. spec. Sif. *foliis* pinnati-fidis, tomentosis : *floribus* apetalis.

Hab., & notæ. *Radix* sub-fusiformis, alba. *Caulis* annuus, 8-pollicaris, multiplex, fulcatus, lœvis. *Folia* ad basim hastata, superius pinnati-fida, tomentosa, magna, pauca. *Calyx* 4-phyllus, foliolis laxis, sub-patentibus, stamina superantibus. *Petala* nulla. *Siliquæ* longiusculæ, tenues, teretes, declinatæ, 2-loculares : valvulis rectis, dissepimento paulo brevioribus : *seminibus* multis. *Stylus* nulus. *Stigma* obtusum, integrum.

Habitat spontaneum in hortis, & locis humidis Cochinchinæ.

CLASSIS XVI.
MONADELPHIA.

TRIANDRIA.

- † 1. TAMARINDUS. Monogyna. *Legum.* pulposum. *Filam.* in placum coalita.

TETRANDRIA.

- † 2. STEMONA. Monogyna. *Baccæ polysperma.* *Petala 4.* *Anthers* laterales.

PENTANDRIA.

- † 3. ZALA. Monogyna. *Folliculus polyspermus.* *Petalum* lingulatum. *Filam.* fasciculata.

- † 4. MEDUSA. Monogyna. *Caps.* 1-locularis, 3-valvis. *Petala 5.*

5. MELOCHIA. Pentagyna. *Caps.* 5-locularis, 1-sperma.

HEXANDRIA.

- † 6. PIMELA. Monogyna. *Drupa* nuce loculari. *Petala 3.*

DODECANDRIA.

7. PENTAPETES. Monogyna. *Caps.* 5-locularis, polysperma; *Petala 5,* patentia.

POLYANDRIA.

* *Calyce simplici.*

- † 8. METEORUS. Monogyna. *Drupa* 1-sperma. *Cal.* 4-fidus; *Cor.* 4-fida.

9. CAMELLIA. Monogyna. *Drupa* 4-locularis. *Cal.* imbricatus.

MONADELPHIA.

† 10. CORDYLA.

Monogyna. *Bacca* 1-locularis, clavata. *Cal.*
4-fidus. *Cor.* o.

† 11. OPHELUS.

Monogyna. *Bacca* 12-locularis, lignosa. *Cal.*
5-fidus. *Cor.* 5-petala.

12. SIDA.

Monogyna. *Caps.* locularis. *Cal.* angulatus.

13. BOMBAX.

Monogyna. *Caps.* 5-locularis, polysperma.
Sem. lanata.** *Calyce duplice.*

14. GOSSYPIUM.

Monogyna. *Caps.* 3-4-locularis, polysperma.
Sem. lanata. *Cal.* exterior 3-fidus.

15. URENA.

Monogyna. *Arilli.* 5, 1-spermi muricati.
Cal. exterior 5-fidus.

16. HIBISCUS.

Pentagyna. *Cap.* 5-locularis, polysperma.
Cal. exterior polyphyllus.

17. ALCEA.

Polygyna. *Arilli* 1-spermi, plures. *Cal.* ex-
terior 6-fidus.

18. MALVA.

Polygyna. *Arilli* 1-spermi plures. *Cal.* ex-
terior 3-phillus

TRIANDRIA.

GENUS I. TAMARINDUS.

Char. Gener. Monogyna. Cal. 4-partitus. Petala 3. Nectarium fatis 2, brevibus sub filamentis. Legumen pulposum. Lin. sy pl. G. 50. Cl. 3.

Sp. I. TAMARINDUS INDICA. a Cay Me.

Differ. spec. Tam. foliis pinnatis, plurimi-jugis: pedunculis polyfloris, lateralibus.

Hab., & notæ. Arbor magna, cortice scabro, fuscō: ramis patentibus. Folia pinnata, plurijuga, alterna, nunc cum impari, nunc sine. Foliola minuta, ovato-oblonga, integerrima, glabra, sessilia, luce patentia, nocte imbricata. Flos racemulis parvis, lateralibus, pedunculo communi longo, erecto. Calyx campanulatus, pallidus, limbo magno, patente, 4-partito, laciniis lanceolatis, concavis, inæqualibus. Corolla lutea, venis rubris virgata, petala 3, ovato-lanceolata, concava, inæqualia, patentia, calyce longiora. Filamenta 3, filiformia, ascendentia, corollâ longiora; a basi usque ad medium lateraliter coalita in laminam planam, superius libera: fetis binis ad apicem lamellæ, utrinque adhærentibus. Nectarium nullum. Stylus subulatus, in medio dilatatus, longior staminibus, cum illis adscendens. Stigma crassissimum. Pericarpium legumen semipedale, crassum, subcurvum, compressum subtuberosum, 1-loculare: semenibns paucis, circumdati pulpâ fuscâ, succofâ, acidâ, inodorâ.

Habitat culta in hortis Cochinchinæ.

Tamarindus. Rump. Amb. l. 2. c. 32. t. 23. Bont. Jav. l. 6. c. 4. fig. ibi. Garc. Arom. l. 1. c. 28.

Virtus: pulpæ leguminum. Refrigerans, Incidens, Eccoprotica. Prodēst in febribus calidis, & putridis: in Tenesmo: in plerisque morbis biliosis. Medici indigenæ decoctum cortieis propinant pueris variolis confluentibus laborantibus, sœpe fælici exitu.

Usus. In Indiis condimentum est universale, gratissimum, & salubre.

Observ. A classe Triandriâ ad Monadelphiam transtuli hoc Genus non solum propriâ observatione fretus, sed etiam ab ipso Linnæo monitus filamenta habere infernè connata, seu Monadelpha. Gen. pl. edit. 6. p. 23. g. 46. Similiter sy. pl. v. 1. p. 92. Gen. 50. Idem monuit scopolius. Introd. Hist. Nat. pag. 296.

TETRANDRIA.

† GENUS II. STEMONA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Nullus.

Cor. Petala 4, infera, subulata, erecta, incurva, æqualia, magna: binis exterioribus bina alia interiora ex obliquo tegentibus.

Stam. Filamenta 4, petalis similia, lato-subulata, incurva, corollâ paulo breviora: laciniâ verticali, cruciformi supra basim versus centrum invicem connexa, receptaculo insidentia. Antheræ lineares, biloculares, magnæ, a medio singuli filamenti ad apicem usque lateraliter adhærentes.

Pist. Germen compresso-rotundum. Stylus nullus. Stigma hiatus germinis apice emarginati, suppositum laciniæ verticali stamina connectenti.

Peric. Bacca sphæroidea, 1-locularis, polysperma.

Sem. Multa, longiuscula, simplici ordine strata.

Nom. ($\Sigma\tau\eta\mu\omega\gamma$ stamen) ab staminibus notabili formâ connexis.

Char. Gener. Monogyna. Cal. o. Petala 4, erecta. Antheræ laterales. Bacca 1-locularis, polysperma.

† Sp. I. STEMONA TUBEROSA. & Cây Bach bò Př sú tsá.

Differ. spec. Stem. Cauke scandente: foliis septemnerviis: floribus solitariis, axillaribus.

Hab: caulis fruticosus, scandens, longus, tenuis, inermis, acirrus: radice tuberosa, fasciculata, tuberibus longis, teretibus, utrinque attenuatis, alblicantibus, edulis. Folia ovata, acuminata, integerima, glabra, septemnervia, opposita. Flos luteo-ruber, solitarius, axillaris pedunculis longis. Bacca mediocris, mollis, rubra.

Habitat inulta in Cochinchinâ, & Chinâ.

Virtus: radicis. Incidens, Refrigerans, Demulcens. Utilis in morbis pulmonum, phthisi, atiquâ tussi.

Ubium Polypoides. Rumph. Amb. I. 9. c. 16. tab. 129.

PENTANDRIA.

+ GENUS III. ZALA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Nullus.

Cor. Monopetala, lingulata : tubo globoso, parvo : limbo inferius constricto, superius expanso, sub-rotundo, acuminato, integerissimo, margine parum reflexo : nectario 2-phyllo, corollæ adnato, foliolo postico maiore.

Stam. Filamenta 5-8, filiformia, inæqalia, in fasciculum coalita, nectario inclusa, limbo corollæ breviora. Antheræ sub-rotundæ.

Pist. Germen superum, oblongum, apice planiusculum, tubo corollæ inclusum, a nectario, & staminibus separatum. Stylus sub-nullus.

Stigma longiusculum, obtuse hians verius stamina inclinatum.

Peric. Folliculus oblongus, gibbus, apice obtusus, 1-locularis, polyspermus.

Sem. Oblonga, minuscula, pauca.

Nom. (Ζαλη fluctuatio) Planta in aquâ fluctuans.

Char. Gener. Monogyna. **Cal.** o. **Cor.** 1-petala, lingulata. **Stam.** in fasciculum coalita. **Caps.** 1-locularis.

Sp. 1. ZALA ASIATICA. α Bed phù Bình. β Féu pêng.

Differ. spec. Zal. radice fluctuante : foliis turbinatis, obtusis : floribus radicalibus, solitariis.

Hab. Planta annua, sub-acaulis. Folia turbinato-triangularia, 2-pollicaria, 5-nervia, crassa, integerrima, utrinque pilosa, sessilia, conferta : insidentia radicibus capillaribus, fasciculatis, longis, supra aquam repentibus, a terrâ distantibus. Flos albo-viridis, sub-sessilis, parvus, solitarius, radicalis.

Habitat fluctuans in fluminibus lenti cursus in Cochinchinâ, & Chinâ.

Plantago Aquatica. Rumph. Amb. I. 11. c. 53. tab. 74. fig. 2. Bont. Jav.

I. 6. c. 38. pag. 129. Nymphæa minima Maderaspetana. Blukens. Alm. pag. 266. Phyt. tab. 207. fig. 6. Tam hæc, quam Rumphiana icones bonæ sunt : Rumphiana quidem naturali magnitudine.

Observ. Apud Auctores hic citatos nulla floris delineato, aut descriprio. Linnæus (sy. pl. vol 4. pag. 62. g. 1112.) plantam istam adscribit Classi Gynandriæ, vocatque Pistiam stratiotem : attamen ingenuè fatetur flores siccios, quos vidit, non satis ipsi fecisse, li-

temque ad autoptas remittit. Si in Indiā tantum nata esset, mutata classe, nomen a Linnæo impositum servassem: sed, quoniam Pistias Africanas, & Americanas non observavi, has aliis observandas relinquō sub-antiquo nomine. Asiaticam a me rite examinatam diverso charactere, & nomine indicandam censui, ne nota cum ignotis confundantur.

Virtus: totius herbæ. Attenuans, Pellens, Sudorifica, Diuretica, Abstergens. Valet præcipue in scabie, imo etiam in Leprā tam extērne quam interne sumpta.

† GENUS IV. MEDUSA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 5-phylum, inferum, persistens: foliolis ovatis, pilosis, incurvis, patentibus.

Cor. Petala 5, ovato-oblonga, curva, inflexa, denuō ad apicem reflexa, calyce longiora.

Stam. Filamenta 5, filiformia, basi in tubum coalita, corollæ aequalia. Antheræ incumbentes.

Pist. Germen sub-rotundum. Stylus subulatus, pilosus, æqualis staminibus. Stigma simplex.

Peric. Capsula ovata, 3-loba, testa villis multis, longis, flexuosis, pilosis, 1-locularis, 3-valvis, 6-sperma.

Sem. Sub-rotunda.

Nom. a villis *Capsulæ* longis, flexuosis, angues capitis Medusæ representantibus.

Char. Gener. Monogyna. Cal. 5-phillus. Petala 5. Caps. 1-locularis, 3-valvis, 6-sperma.

† Sp. I. MEDUSA ANGUIFERA. a Cay Chōm chōm dāt.

Differ. spec. Med. foliis ovato-oblongis, ferratis: pedunculis paucifloris.

Hab. Arbor mediocris, ramis ascendentibus. Folia ovato-oblonga, acuminata, ferrata, glabra, alterna. Flos ruber, pedunculis paucifloris. Capsula in 3 lobos dehiscit, horizontaliter expansos, testos villis longis, flexuosis, pilosis, multis.

GENUS V. MELOCHIA.

Char. Gener. Pentagyna. Caps. 5-locularis, 1-sperma. Lin. fy. pl. G.
894.

Sp. I. MELOCHIA CORCHORIFOLIA. a Cây bảy giái.

Differ. spec. Mel. *floribus capitatis sessilibus*: *capsulis*, sub-rotundis: *foliis* sub-cordatis, sub-lobatis. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, binos cum dimidio pedes longus, sub-erectus, teres, *ramis* diffusis. *Folia* sub-cordata, sub-angulata, serrata, plicata, glabra, alterna. *Flos* terminalis, capitulis sub-sessilibus: *calyce* dupli, exteriore 3-phyllo, foliolis subulatis: interiore 5-dentato, ventricoso. *Corolla* albo-purpurea, 5-petala. *Stamina* 5, coalita. *Styli* 5. *Capsula* sub-rotundo-pentagona, 5-locularis, 1-1perma.

Habitat in agris Cochinchinæ, inculta.

Virtus. Emolliens, Lubricans, Malvæ æmula.

Melochia Corchori folio. Dill. Elth. pag. 221. tab. 176. fig. 217. Burm.

Zeyl. pag. 156.

HEXANDRIA.

† GENUS VI. PIMELA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium tubulosum, 3-fidum, inferum: laciniis obtusis, brevibus, erectis.

Cor. Petala 3, ovato-oblonga, erecta, conniventia, crassa, calyce longiora. Nectarium lentiforme, carnosum, 6-crenatum.

Stam. Filamenta 6, subulata, basi in tubum coalita, corollâ breviora. Antheræ oblongæ, 2-loculares, stantes.

Pist. Germen sub-rotundum, nectario immersum. Stylus nullus. Stigma acutum, 2-fidum.

Peric. Drupa ovato-oblonga, carnosa.

Sem. Nux oblonga, utrinque acuta, sub-hexagona, angulis alternis obtusioribus, 2-locularis.

Nom. (Πιμελη pinguedo) Genus hoc arborum oleo, & rezinâ piñguissimum.

Char. Gen. Monogyna. Cal. 3-fidus. Petala 3. Drupa 1-3-locularis.

† Sp. I. PIMELA NIGRA. a Cây Bái. g. Ô lâm.

Differ. spec. Pim. *foliis* pinnatis, lævibus: *racemis* simplicibus, lateribus: nuce 2-loculari.

Habitus. Arbor magna, *ramis* sub-patentibus. *Folia* impari-pinnata, sub-5-juga, *petiolis* glabris, ad basim tumidis: *foliolis* oblongis,

Ff ii acutis,

acutis, integerrimis, utrinque lœvibus, nitidis, nigrescentibus. *Flos* albicans, racemis simplicibus, lateralibus. *Drupa* carnosæ, oleosa, exterius glabra, nigro-cærulea, interius rubescens: *nuce* durissimâ, plerumque biloculari: nucleo longiusculo, tereti.

Habitat in sylvis Cochinchinæ, & Chinæ.

Usus. Drupæ muriâ conditæ frequenter apponuntur mensis, non minus sapidæ quam olivæ, sed stomacho graves. Nucleorum in Cochinchinâ nullus usus.

Canarium Nanarium? Rumph. Amb. I. 3. c. 3. tab. 49.

† Sp. 2. PIMELA ALBA. α Cay Ca na. β Pă lâm.

Differ. spec. Pim. *foliis* pinnatis, sub. 6-jugis, scabris: *racemis* confertis, subterminalibus: *nuce* 3-loculari.

Hab., & notæ. Arbor magna, ramis ascendentibus. *Folia* impari-pinnata, sub-6-juga, inferiora minora, *petiolis* teretibus: *foliolis* ovato-lanceolatis, semipedalibus, integerrimis, glabris, scabris, pallidis, petiolatis. *Flos* pallidus, racemis congestis, sub-terminalibus. *Calyx* tubulosus, 3-fidus. *Corolla*, petala 3, erecta, crassa. *Stamina* 6, connexa. *Stylus* filiformis, brevis: *stigmate* rotundo, integro. *Drupa* trigono-ovata, glabra, rugosa, viridi-lutea, austero-acida: *nuce* 3-loculari, sub-hexagonâ, utrinque acuminata: putamine crasso, durissimo.

Habitat in sylvis Cochiachinæ, & Chinæ.

Canarium sinense: Caná. Rumph. Amb. I. 3. c. 2. pag. 154. Arbor excelsa e Chinâ heic introducta: kandan. Thunb. Japon. pag. 368.

Usus. Drupæ hujus arboris muriâ conditæ olivis Europæis similes sunt colore, & quodammodo etiam formâ, & sapore: sunt autem saluberrimæ, ita ut medici non eas denegent ægrotis, experientiâ docti digestionem, & appetentiam cibi promovere. Nuclei projiciuntur.

† Sp. 3. PIMELA OLEOSA. α Cay Deau rái.

Differ. spec. Pim. *foliis* pinnatis, sub-4 jugis: *pedunculis* lateralibus, polyfloris: *nuce* 1-loculari.

Hab. Arbor maxima, trunco altissimo, recto, *ramis* ascendentibus. *Folia* impari-pinnata, sub-4-juga, aliquando plura, *petiolis* glabris, teretibus, nec tumescentibus: *foliolis* oblongis, acuminatis, repandis, glabris, subsessilibus. *Flos* albus, *pedunculis* polyfloris, lateralibus. *Drupa* ovalis, parva: *nuce* 1-loculari, nucleo solitario. Plura dicere non valeo, quia licet arbores sœpe viderim, flores non examinavi.

Habitat frequens in sylvis Cochinchinæ, maximè versus Cambodiæ. Nanarium Oleosum, Minjac. Rumph. Amb. I. 3. c. 6. t. 54.

Usus.

Uſus. Drupæ hujus arboris non ſunt edules. Ex trunco ſupra baſim excavato extrahitur abundanter oleum ſub-flavum, viſcidum, odorum, Copaiferæ Brailiensis ſimile colore, odore, tenacitate, & aliquatenus etiam virtute penetrante, vulnerariā, & refolvente. Operibus ligneis ſuperillitum eleganter nitet, vel purum, vel cum vernice ſinensi mixtum; eoque plus valet, quod cuicunque colori aptari poſſit abſque hujus detrimento, quamvis durațione vernici ſinensi cedat, ac vilius habeatur. Frequentior uſus eft in re navalı. Picem. Indicam, vulgo *Damar*, & ſtupam ex cortice arundinis bambu cum hoc oleo: & pauca calce contundunt, fitque mixtura tenacissima, quā navium rīmas obturant, nullā präcedente coctione; nam hoc oleum, etiam frigidum tenacissimē adhæret, & mixtione calcis condensatum cito indureſcit, & naturam quaſi lapideam induit, & ſervat, ſine ullo nauſeoſo odore, quo pix Europaea navigantes adeo moleſtat. Lignum arboris eft fuſco-rufum, durum, & grave, ex quo fecantur aſſeres, & tabulæ vastissimæ, quaſe ædificandis navi- bus inſerviunt, licet durațione mediocri. Arbor, quaſe prodiuit reſinam *damar*, de quā Rumphius agit, naſcitur etiam copioſe in Cochinchinā, ſed flores ego non vidi, nec veros characteres ex deſcriptione Rumphianā valeo deducere.

Obſerv. Canarium commune Linnæi (Mant. pag. 20. gen. 1281, & sy. pl. vol. 4. pag. 248. gen. 1214.) deductum fuit ex canario vulgari (Rumph. Amb. l. 3. c. 1. tab. 47.): quod, licet fructificatione, & habitu Pimelæ noſtræ ſit ſimile, maximè vero diſſert Claffe, Calyce, & Staminibus Pentandris, nec Monadelphis. Ea arbor puto, quod non naſcatur in Cochinchinā, nec in Chinā.

DODECANDRIA.

GENUS VII. PENTAPETES.

Char. Gener. Monogyna. *Cak.* 5-partitus. *Stam.* 20: horum 5 caſtrata, longa. *Caps.* 5-locularis, polyſperma. Lin. sy. pl. G. 899.

Sp. I. PENTAPETES PHOENICEA. a Hoa ti ngo. β. . . .
 Differ. ſpec. *Pent. foliis haſtato-lanceolatis, ferratis.* Lin. sp. I.
 Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 5-pedalis, erectus, teres, rectus: *ramis* paucis, ascendentibus. *Folia* ad baſim auriculato-haſta- ta: inde ſubulata, ferrata, alterna, petiolis brevibus. *Flos* coccineus axillaris, ſolitarius, meridie expansus, vespere deciduus. *Calyx* infe- rrus, 5-phyllus, patens, perſiftens: foliolis lanceolatis, incurvis, cilia- to-pilofis, apice acuminato, reſtexo. *Corolla* petala 5, obtuſa, ſub- æquilatera, rotato-patentiflora. *Nectarium* tubulosum, 5-gonum, bre-

410 MONADELPHIA. POLYANDRIA.

breve, sustinens foliola 5, lanceolata, erecta, concolora. *Filamenta* 15, brevia, subulata, nectario insistentia, hujus foliolis breviora, cum illo decidua. *Antheræ* sagittato-lineares, stantes. *Germen* ovatum. *Stylus* turbinato-linearis, 5-angulatus, petalis æqualis. *Stigma* simplex. *Capsula* ovata, 5-locularis, 5-valvis, polysperma. *Semina* dupli ordine, versus centrum angulata, exterius convexa.

Habitat culta in hortis Cochinchinæ, & Chinæ.

Flos Impius. Rumph. Amb. I. 8. c. 71. tab. 100. Blattaria Zeylanica, flore amplio, coccineo. Commel. H. Amst. I. pag. 11. tab. 6. Burm. Zeyl. pag. 47.

Observ. Foliola illa 5 nectarii impropriè dicuntur filamenta castrata, cum diversa formâ, magnitudine, & situ gaudeant. Corpus illud tubulosum, 5-gonum, cui stamina insident, tam ex propriâ observatione, quam ex descriptione Rumphianâ potius existimo dicendum nectarium, quam filamenta in orbem coalescentia.

POLYANDRIA.

† GENUS VIII. METEORUS.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 4-fidum, superum : laciniis sub-rotundis, erectis, persistentibus.

Cor. Monopetala, hippocrateriformis : tubo brevi : limbo 4-fido, laciniis ovatis, parum reflexis.

Stamina. Filamenta ultra 30, filiformia, flexuosa, corollâ duplò longiora, omnia inferius coalita in tubum cylindricum, brevem cum illis ex corollâ deciduum. Antheræ sub-rotundæ, minimæ.

Pist. Germen sub-rotundum. Stylus filiformis, æqualis staminibus. Stigma crassiusculum.

Peric. Drupa Octogono-ovata, glabra, coriacea, 1-sperma, coronata. Sem. 1, rotundum, durum, solidum.

Nom. (Μετεώρος pendulus) a flore, & fructu racemis longissimis pendentibus.

Char. Gener. Monogyna. Cal. 4-fidus. Cor. 4-fida. Drupa. 1-sperma, coronata.

† Sp. 1. METEORUS COCCINEUS, a Rau Bung.

Differ. spec. Met. foliis ovato-oblongis, sub-ferratis : racemis simplicibus, longissimis, pendulis.

Hab. Arbor magna, ramis tortuosis, ascendentibus. Folia ovato-oblonga, acuta, subferrata, glabra, sparsa, petiolata. Flos coccineus ter-

mi-

MONADELPHIA POLYANDRIA. 411

minalis : racemis simplicibus, longissimis, pendulis : pedunculis propriis brevissimis. *Drupa* obtusè 8-gona, coriacea, glabra, fulca, lato-ovata, calycina : *semine* magno, sub-rotundo, corneo.

Habitat spontaneus in sylvis planis Cochinchinæ.

Butonica Terrestris ? Rumph. Amb. I. 5. c. 30. tab. 116.

Observ. Butonicam Albam vocat Linnaeus Eugeniam Racemosam. Meteorus noster certè non est Eugenia ; nam corolla 1-petala, tubulosa, & stamina in tubum connexa diversum genus reposcunt, sicut & classem.

Usus. Foliis teneris utuntur frequenter indigenæ in acetariis. Lignum foco, non ædificiis aptum est. Drupæ prorsus inutiles.

GENUS IX. CAMELLIA.

Char. Gener. Monogyna. Cal. imbricatus, polyphyllus : foliolis interioribus maioribus. Lin. sy. plant. G. 914.

† Sp. 1. CAMELLIA DRUPIFERA. a Cay Deau 15.

Differ. Spec. Cam. foliis ovato-oblongis, sub-crenatis : floribus 2-3r natis, terminalibus : drupis 4-locularibus.

Hab., & notæ. Arbor mediocris, ramis patentibus. Folia ovato-oblonga, acuminata, sub-crenata, glabra, dura, parva, alterna, petiolata. Fls albus, terminalis, pedunculis binis, aut ternis, monofloris. Calyx sub-rotundus, imbricatus, foliolis superioribus maioribus. Corolla petala 8, oblonga, emarginata. Stamina plurima, ad basim in tubum connexa. Stylus 4-fidus, æqualis staminibus. Drupa sub-rotunda : nuce fulcata, 4-loculari : nucleis sub-rotundis. Fructus Juglandi æqualis, nec multum dissimilis, non tamen esculentus.

Habitat inculta, cultaque in Cochinchinâ.

Usus. Oleum ex nucleis expessum æstimatur ab indigenis ad capillos ungendos, & varia unguenta Medica, nam gratum spirat odorem, nec facilè rancore corruptitur.

† GENUS X. CORDYLA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium campanulatum, 4-fidum, inferum : foliolis acutis. Cor. Nulla.

Stam. Filamenta 34, subulata, longa, sub-infexa, omnia basi in orbem coalita. Antheræ ovatae, incumbentes.

Pist. Germen ovatum, acuminatum, pedicello longo insistens. Stylus

subulatus, brevis. Stigma simplex.
Peric. Bacca ovata, acuminata, 1-locularis, polysperma, pedicellata.
Sem. Sex, ovata.

Nom. (Κορδύλη clava) a Germine, & Bacca in formam Clavæ pedicello longo impositis.

Char. Gener. Monogyna. Cal. 4-fidus. Cor. o. Bacca 1-locularis, pedicellata.

† Sp. 1. CORDYLA AFRICANA. γ Μυτόνδο.

Differ. spec. Cord. foliis alternatim pinnatis : pedunculis polyfloris, lateralibus.

Hab. Arbor magna, ramis patentibus. Folia alternatim pinnata : foliolis oblongis, emarginatis, glabris, parvis. Flos lateralis, apetalus : pedunculis polyfloris, solitarii : staminibus croceis, longis, pulchris. Bacca sesquipollucaris, esculenta.

Habitat ad oram Africæ Orientalem.

† GENUS XI. OPHELUS.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium campanulatum, 5-fidum, inferum, magnum tubo brevi : laciniis acutis patentibus, apice reflexis.

Cor. Petala 5, ovata, crassa, deorsum reflexa, calyce longiora.

Stam. Filamenta 500 circiter, filiformia, inferne in tubum magnum coalita, superne in capitulum hemisphaericum, valvum reflexa, collâ parum breviora. Antheræ sub-rotundæ, parvæ.

Pist. Germen ovatum. Stylus filiformis, crassus, longior staminibus. Stigma polyfidum, laciniis subulatis, patentibus.

Peric. Bacca oblongo-ovata, maxima, 12-locularis, polysperma : cortice lignoso, æquali, laevi.

Sem. Plurima, angulata.

Nom (Οφέλος utilitas) ab usu æconomico fructus. †

Char. Gener. Monogyna. Cal. 5-fidus. Cor. 5-petala. Bacca 12-locularis : cortice lignoso.

† Sp. 1. OPHELUS SITULARIUS. γ Μυλαμβείρα.

Differ. spec. Oph. foliis sparsis, integerrimis : flore solitario, terminali.

Hab-

Hab. *Arbor magna*, trunco crassissimo, nec alto, apice diviso in multos simul ramos, diffusos, reclinatos. *Folia oblonga*, acuta, integerrima, glabra, petiolata, sparsa, congestaque. *Flos albus*, terminalis, solitarius, patentissimus, diametro corollæ 3-pollicari. *Bacca longitudine 1-pedali*, & amplius: cortice duro, nec admodum crasso, lævi, æqualissimo, fusco.

Habitat agrestis ad litora Africæ Orientalis.

Uſus. Apud indigenas œconomicus, ad hauriendam aquam, ad servandos liquores, semina, legumina, &c. in fructu illo cucurbitino.

Observ. *Lecythis Ollaria Linnæi*, & *Couroupita Guianensis Aubleti* cum hac plantâ Africanâ convenient baccâ maximâ, lignosâ: sed fructu operculato, numero partium, & nectario lingulato multum differunt: nec minus differt *Crescentia*.

GENUS XII. SIDA.

Char. Gener. Monogyna. *Cal.* simplex, angulatus. *Stylus multi-partitus*. *Caps.* plures, 1-permæ. Lin. sy. pl. G. 902.

Sp. 1. SIDA ALNIFOLIA. a Cây Bảy đường tiễn.

Differ. spec. Sid. *foliis orbiculatis*, plicatis, ferratis. Lin. sp. 4.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 3-pedalis, ramis multis diffusis. *Folia* sub-rotunda, ferrata, plana, sulcata, obscurō-viridia, subtus tomentosa. *Flos* axillaris, solitarius, luteus: *calyce* 5-fido, angulato: *petalis* 5, obcordatis: *staminibus* plurimis coalitis. *Capsulae* 10, monospermæ.

Habitat in agris Cochinchinæ.

Malvinda stellata, alnifolia. Burm. Zeyl. pag. 150. Dell. Elth. pag. 215. tab. 172. fig. 211.

Virtus. *Folia* mucilagine abundant: virtutem Malvæ possident.

Sp. 2. SIDA VISCOSA. a Cây Bảy xôi.

Differ. spec. Sid. *foliis cordatis*, crenatis, tomentosis: *floribus* sub-solitariis: *capsulis* septem-locularibus, rotundis, depresso.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, sesquipedalis, erectus, pilosus. *Folia* cordata, crenata, tomentosa, mollia, albicania. *Flos* axillaris, solitarius, luteus. *Capsulae* sub-rotundæ, 10-loculares. Tota planta mucilagine viscosa scatet.

Habitat in agris Cochinchinæ.

Althæa populi folio villoso, leviter ferrato. Sloan. Jam. 98. pag. 222. tab. 139. fig. 4.

Sp. 3. SIDA CORDIFOLIA. α

Differ. spec. Sid. *foliis cordatis*, *subangulatis*, *ferratis*, *villofis*. Lin. sp. 10.

Hab., & notæ. *Caulis annuus*, *2-pedalis*, *erectus*, *hispidus*. *Folia cordata*, *acuta*, *ferrata*, *pilosa*. *Flos luteus*, *polynatus*, *axillaris*: *pedunculis petiolos superantibus*: *calycibus angulatis*, *hirsutis*: *capsulis* 6, *monospermis*.

Habitat in agris Cochinchinæ.

Althæa Maderaspatana, *sub-rotundo folio*, *molli*, & *hirsuto*: *multipilis*, *seminibus ad apicem crinitis*. Pluk. Phyt. tab. 131. fig. 2.

Sp. 4. SIDA INDICA. α Cay koi xay.

Differ. spec. Sid. *foliis cordatis*, *sublobatis*, *stipulis reflexis*: *pedunculis petiolo longioribus*: *capsulis multilocularibus*, *scabris*, *calyx longioribus*. Lin. sp. 19.

Hab., & notæ. *Caulis herbaceus*, *annuus*, *6-pedalis*, *erectus*, *teres*, *glaber*, *ramis obliquis*. *Folia cordata*, *sub-rotunda*, *sæpe sub-lobata*, *acuminata*, *crenata*, *magna*, *utrinque glabra*, *cinereo-glaucia*, *petiolata*, *sparsa*. *Flos luteus*, *axillaris*, *parvus*, *pedunculo 1-flo-ro petiolis longiore*: *calyce simplici*, *glabro*, *capsulis breviore*. *Capsulae sub-rotundæ*, *in orbem crenatæ*, *16-loculares*, *3-spermæ*: *loculis ad apicem acuminatis*, *reflexis*.

Habitat in culta in hortis, & agris Cochinchinæ.

Abutilon Indicum *foliis profundè crenatis*. Burm. Zeyl. pag. 2. Althæa Theophrasti *similis*. Basb. Pin. pag. 316. n. 9. Abutilon læve. Rumph. Amb. I. 6. c. 14. tab. 11.

Virtutem Malvæ censetur habere, nec immeritò.

† Sp. 5. SIDA SCOPARIA. α Cay Bây chôi.

Differ. spec. Sid. *foliis lanceolato-linearibus*, *ferratis*: *floribus foliariis*, *axillaribus*: *capsulis 5-locularibus*.

Hab., & notæ. *Caulis laffruticosus*, *4-pedalis*, *erectus*, *teres*, *inermis*, *ramis multis*, *rectis*, *ascendentibus*, *lentissimis*, *alblicantibus*. *Folia lanceolato-linearia*, *ferrata*, *glabra*, *alterna*, *petiolata*. *Flos axillaris*, *solitarius*, *subsessilis*, *pallidè luteus*, *minutus*. *Stipulae se-taceæ*. *Calyx simplex*, *angulatus*, *5-fidus*. *Petala 5*, *obtusissima*. *Styli 5*. *Capsula 5-locularis*, *glabra*, *loculis acutis*, *apice 2-fidis*, *1-spermis*. *Stamina plerumque 10*, *connexa*.

Habitat loca agrestia in Cochinchinâ.

Silagurium Longifolium. Rumph. Amb. I. 10. c. 32. pag. 45. tab. 18. fig. 2. Sida Acuta. Burm. Ind. pag. 147.

Uſus: œconomicus caſium ad colligandas ſcopas maiores longæ du-
rationis: unde nomen vernaculum ſcoparia.

Virtus: radicis, & foliorum. Emolliens, Reſolvens, Anodyna. Ex-
ternè valet ad quoscumque tumores reſolvendos, vel maturandos,
doloremque leniendum.

GENUS XIII. BOMBAX.

Char. Gener. Monogyna. Cal. 5-fidus. Stam. 5. ſive multa. Caps.
lignoſa, 5-locularis, 5-valvis. Sem. lanata. Recept. 5-gonum.
Lin. ſy. pl. G. 901.

Sp. 1. BOMBAX PENTANDRUM. a Cây Gỗ. Mô miên hõa: Uen xu. Differ. spec. Bomb. floribus pentandris: foliis ſepenatis. Lin. ſp. 1. Hab., & notæ. Arbor magna, trunco recto, aculeis brevibus, ſparſis, paucis: ramis rectis, horizontalibus, ſtellatis: tribus, vel pluribus, ex eodem centro in orbem extenſis, ſuperioribus ordinibus in pyramidem decreſcentibus. Folia digitata, ſepena, petiolis communibus longis, alternis: foliolis lanceolatis, integerrimis, glabris, petiolatis, inæqualibus. Flos pallidus, carnosus, racemis brevibus, terminalibus. Calyx tubulosus, inflatus, 5-fidus, laciniis rotundatis. Corolla petala 5, ovata, concava, pilosa, ſub-patentia. Filamenta 5, connexa, ſubulata, corollæ æqualia. Antheræ magnæ, linea- res, flexuofæ, aliquando 3 diſtinctæ, reniformes in quolibet filamento. Stylus filiformis, æqualis ſtaminibus. Stigma ſub-rotundum, inæqualiter crenatum. Capsula oblonga, 5-pollicaris, obtuse 5-gona, 5-locularis, 5-valvis, baſi dehifcens: cortice crasso, duro, fuſco, rugoso. Semina plurima, ſub-rotunda, involuta ſeorsim lanata tenuiſſima, pallidâ, brevi, multâ.

Habitat agrestis in Cochinchinâ, & Chinâ, copiosius autem in Cambodiâ.

Eriophoros Javana. Rumph. Amb. l. 1. c. 67. tab. 80. Arbor Lanigera, ſive Gossampinus Plinii. Bont. Jav. l. 6. c. 24. fig. ibi.

Uſus. Iſtius arboris fructus tomentum omnium optimum, & idoneum præstat ad farciendas culcitas, pulvinaria, & ſimilia, quæ, licet fre-quenter comprimantur, elasticitate naturali reſiliunt, ne indureſcant.

GENUS XIV. GOSSYPIUM.

Char. Gener. Monogyna. Cal. duplex: exterior 3-fidus. Caps. 4-lo-
cularis. Sem. lanata obvoluta. Lin. ſy. pl. G. 910.

Sp. 1. GOSSYPIUM HERBACEUM. a Cây Boung. & Miên ſú.

Ggg ii

Differ.

- Differ. spec. Goss. *foliis* 5-lobis, subtus eglandulosis: *caule* herbaceo, laevi. Lin. sp. 1.
- Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 3-pedalis, simplex, erectus, teres, sub-tomentosus: *ramis* brevibus, patentibus, trifariam alternis, axillaribus, indivisis. *Folia* sub-rotunda, 5-loba, integerima, eglandulosa, venosa, alterna, petiolis longis, teretibus. *Flos* solitarius, magnus, axillaris, & terminalis. *Calyx* exterior trigonus, tripartitus, laciniis magnis, conicis, aliquando integerrimis saepius dentato-incisis. *Corolla* petala 5, patentia, calyce ampliora, coloris pallidè-lutei, maculâ fusco-rubrâ in fundo notata, obtusissima. *Stamina* multa in cylindrum coalita. *Stylus* æqualis staminibus: *figmatibus* 3-4, obtusis. *Capsula* ovata, acuminata, 3-4-gona, 3-4-locularis, polysperma. *Semina* sub-rotunda, pauca, lanâ tenui, albissimâ involuta, valvis tribus, vel quatuor erumpente.
- Colitur in totâ Cochinchinâ, Chinâ, & plerisque Asiæ locis non nimis frigidis.
- Thunb. Japon. pag. 271. Gossypium Capas. Rumb. Amb. I. 6. c. 15. tab. 12. Quæ figura, & descriptio partim cum nostrâ non cohærent.
- Uſus. Nullius plantæ universalior est utilitas, quam Gossypii. Hæc indumenta præbet quatuor orbis partibus: maximè Asiæ incolis, minus Europæ. Ejus semina, quasi legumina sunt edulia, & salubria.

Sp. 2. GOSSYPIUM ARBOREUM. γ . . .

- Differ. spec. Goss. *foliis* palmatis: *lobis* lanceolatis: *caule* fruticoso. Lin. sp. 2.
- Hab., & notæ. *Caulis* arboreus, 8-pedalis, crus crassus, cortice scabro, fusco: *ramis* diffusis, longis, tortuosis. *Folia* palmata, 3-5-loba, eglandulosa, glabra, sparsa, petiolata, lobis brevibus. *Flos* integrè luteus, terminalis, solitarius. *Calyx* exterior 3-phylloides, foliolis magnis, incisis, erectis: interior 5-crenatus. *Capsula* plerunque 3-gona, 3-valvis, 3-locularis, sub-ovata, acuminata, scabra. *Semina* multa, lanâ albâ obvoluta.
- Habitat in orâ Africæ Orientali.
- Forsk. Ægyp. pag. 125. Gossypum Arborescens. Alp. Exot. 38. tab. 38. Uſus idem, qui præcedentis.

GENUS XV. URENA.

Char. Gener. Monogyna. *Cal.* duplex: exterior 5-fidus. *Caps.* 5-locularis, echinata, monosperma. Lin. sy. pl. G. 909.

Sp. 1. URENA LOBATA. & Gày Bát loung. & Sié tháu fö.

Differ.

Differ. spec. Ur. *foliis* angulatis. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, bipedalis, erectus, teres, pilosus, ramosus. *Folia* sub-rotunda, cordata, 3-lobata, serrata, pilosa, alterna, petiolis longis. *Flos* rubescens, axillaris, pedunculis 1-floris, 2-natis. *Caps.* echinata, 5-locularis, 1-sperma.

Habitat spontanea in Cochinchinâ, & Chinâ. Burm. Ind. pag. 149. Lappago Rumph. Amb. I. 10. c. 43. tab. 25. fig. 2. Ast. in Rumphianâ plantâ folia laciniata: in nostrâ lobata sunt.

Sp. 2. URENA SINUATA. & Cây Bảy lông. ab initio dicitur

Differ. spec. Ur. *foliis* sinuato-palmatis: sinibus obtusis. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, erectus, 3-pedalis: ramis ascendentes. *Folia* sinuato-palmata, sinibus obtusis, serrata, aspera, alterna, petiolata: poro glandulosi unico sub costâ intermediâ. *Flos* coloris rosei, minutus, subsolitarius, axillaris: *calyce* utroque 5-fido: *arillis* 5, monospermis, ovatis, echinatis.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

Malvinda foliis inferioribus multifidis, superioribus incisis, flore solitario. Burm. Zeyl. pag. 150. tab. 69. fig. 2. Alcea floribus roseis, fructu lapaceo, 5-partito. foliis profundè laciniatis. Herm. Mus. Zeyl. pag. 63.

Sp. 3. URENA PROCUMBENS. & Cây Bảy Cát. g. 3. quia effigie

Differ. spec. Ur. *foliis* oblongis, sinuatis, serratis: *caule* procumbente. Lin. sp. 4.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 3-pedalis, procumbens, teres, rubescens, ramosus. *Folia* hastata, inaequaliter, & profundè serrata, aspera, alterna. *Flos* croceus, axillaris, congestus: *calyce* utroque 5-fido: *staminibus* 10: *stylo* unico. *Capsula* rotunda, echinata, 4-locularis, 1-sperma.

Habitat loca arenosa in Cochinchinâ, & Chinâ.

Urena Procumbens, foliis hastato-subcordatis indivisis, serratis, caule procumbente. Burm. Ind. pag. 150.

Sp. 4. URENA POLYFLORA. & Xie thâu sô.

Differ. spec. Ur. *foliis* angulatis: *floribus* congestis: *calycibus* polyfloris.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, erectus, 2-pedalis, ramis patentibus. *Folia* angulata, inaequaliter crenata, utrinque pilosa, alterna, petiolata. *Flos* croceus, axillaris, congestus: *calyce* utroque 5-fido: exteriore polyfloro: interiore laciniis linearibus. *Stylus* unicus: *stamina* Monadelpha. *Capsula* ovata, muricata, 5-locularis, monosperma. Petala 5, obtusa, basi sub-coalita.

Habitat agrestis prope Cantonem Sinarum.

Sp.

† Sp. 5. URENA MONOPETALA. α Cây Bảy chéo.

Differ. spec. Ur. *foliis* ovato-lanceolatis, ferratis: *corollis* monopetalis.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus: 2-pedalis, erectus, ramosus. *Folia* ovato-lanceolata, integra, ferrata, venosa, tomentosa, alterna.

Flos violaceus, axillaris, solitarius. *Calyx* exterior 5-phillus, brevior. *Carolla* 1-petala, tubo calyci æquali: limbo patente, 5-partito, laciniâ superiore maiore, emarginata: *stamina* Monadelpha.

Capsula sub-rotunda, muricata, 5-locularis, 1-sperma.

Habitat inulta in Cochinchinâ.

GENUS XVI. HIBISCUS.

Char. Gener. Monogyna. *Cal* duplex: exterior polyphyllus. *Caps.* 5-locularis, polysperma. Lin. sy. pl. G. 911.

Sp. 1. HIBISCUS POPULNEUS. α Cây Tla.

Differ. spec. Hib. *foliis* cordatis, integrerrimis: caule arboreo, *calyx* cum exteriore truncato. Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. *Caulis* Arboreus, 15-pedalis, ramis longis, expansis. *Folia* basi cordata, inde conica, integrerrima, glabra, sparsa, petiolis longis. *Flos* magnus, pallidus, in senectute ruber, 5-petalus, patens. *Calyx* exterior in Cochinchinâ 3-phillus, in Malabarâ integer, repandus: interior campanulatus, 5-dentatus. *Capsula* sphæroidea, sesqui-pollicaris, 5-locularis, polysperma.

Habitat agrestis in Cochinchinâ. Etiam longâ serie plantatus in urbe Gallorum Pondichery, ubi jucundum umbraculum præbet viatoriibus.

Novella Litorea. Rumph. Amb. l. 3. c. 31. tab. 74.

Sp. 2. HIBISCUS TILIACEUS. α Cây Tla lâm chéo. β . . .

Differ. spec. Hib. *foliis* cordatis, sub-rotundis, indivisis, acuminate, crenatis: *caule* arboreo: *calyx* exteriore decem dentato. Lin. sp. 4.

Hab., & notæ. *Caulis* arboreus, 12 pedalis, tortuosus: *cortice* canabino: *ramis* multis expansis. *Folia* cordata, sub-rotunda, acuminate, sub-crenata, sparsa, petiolis longis, teretibus. *Flos* magnus, sparsus, flavus, rubro-striatus: *calyx* exteriore 10-dentato, interiore 5-fido: *corolla* 5-petalâ, obtusâ, patente. *stamina* multa, Monadelpha. *Stylus* 5-fidus. *Capsula* ovata, rugosa, fusca, 5-locularis, polysperma.

Habitat agrestis in Cochinchinâ, maximè ad ripas fluminum, & maris