

ris litora: similiter in Chinâ.
Alcea Indica Sinarum, flore luteo, malvaceo. Pluken. Amalt. pag. 6.
 tab. 355. fig. 5. Novella Daun. Rumph. Amb. I. 3. c. 28. tab. 73.
Virt. foliorum. Refrigerans, Laxans, Resolvens. Intus sumpta in decocto valent in ardore febrili, Dysuria. Externè in partu diffici, phlegmonibus, Cephalgiâ calidâ.
Ufus. Cortex inservit ad torquendos minores funes, nectenda retia, texendas streas, & quælibet liganda.

Sp. 3. *HIBISCUS ROSA SINENSIS.* α Hoüng Kän. β . . .
 Differ. spec. *Hib. foliis* ovatis, acuminatis, ferratis, glabris: *caule* arboreo. Lin. sp. 6.

Hab., & notæ. *Caulis* arboreus, 9-pedalis: *cortice* scabro, fuscō: *ramis* patentibus. *Folia* ovata, acuminata, ferrata, glabra, nitida, obscuro-viridia, petiolata, alterna. *Flos* nitidè coccineus, magnus, 4-pollicaris, simplex, plenusque, pulcherrimus, inodorus, solitarius, sub-terminalis. *Calyx* exterior 8-phyllo, foliolis linearibus: interior semiquinque-fidus, acutus. *Stamina* plurima, brevia, tubo longo, tenui lateraliter inserta. *Styli* 5, breves. *Capsula* sub-rotunda, 5-locularis, polysperma.

Habitat tam culta, quam spontanea in Cochinchinâ, & Chinâ.
Flos Festalis. Rumph. Amb. I. 6. c. 11. tab. 8. *Ketmia Sinensis*, fructu sub-rotundo, flore pleno. Burm. Zeyl. pag. 133.

Virt. foliorum, & radicis. Emolliens, Resolvens, Anodyna. Profund in Stranguria, & Dysuriâ; dolores nephriticos mitigant, alvum laxant, inflammationem tonsillarum, & oris per gargarisma leniunt.

Ufus. Flores spiritum vini, & similes liquores tingunt colore rubro, additoque parcissimo alumine, colore violaceo gratissimo. Idem flores recentes, si calceis, vel telis nigris affrimentur, nigredinem augent, & nitorem. In Cochinchina sic trivialis est ista planta, ut ex illâ integræ hortorum sepes ducantur. Præter binas varietates flore simplici, & flore pleno coccineis, est tertia varietas flore etiam pleno, magno coloris lateritii: præterea quarta flore albissimo, pleno, rarior quidem & culturâ difficilior, quæ aliquantulum differt a præcedentibus foliis ferrato-incisis, ad *Hibiscum Syriacum* declinantibus.

Sp. 4. *HIBISCUS MUTABILIS.* α Phù duong. β Fū yung.

Differ. spec. *Hib. foliis* cordato-quinqueangularibus, obsoletè ferratis: *caule* arboreo. Lin. sp. 9.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, 9-pedalis, rectus, multiplex, ramosus: *cortice* cinereo, glabro, cannabino. *Folia* cordata, sub-rotunda, 5-angulata, obsoletè-ferrata, utrinque tomentosa, albicantia, sparfa,

sa , petiolis longis. *Flos* magnus , plenus , colore mutabilis ; nunc albus , nunc ruber , plerumque roseus apparet : pedunculis polyfloris , terminalibus. *Calyx* exterior saepius 9-phyllo , foliolis linearibus : interior semiquinque-fidus. *Stamina* Monadelpha. *Capsula* sub-rotunda , 5-locularis , polysperma.

Habitat in hortis Cochinchinæ , & Chinæ.

Thunb. Jap. pag. 272. *Flos* Horarius. Rumph. Amb. l. 6. c. 12. tab. 9. Virt. Fere eadem , quæ præcedentis Rosæ Sinensis ; & Althææ Europææ æmula. In rebus œconomicis nullius usus , præter aspectum pulchrum.

Sp. 5. HIBISCUS SYRIACUS. α Houng kân biée.

Differ. spec. Hib. *foliis* cuneiformi-ovatis , supernè inciso-serratis : *caule* arboreo. Lin. sy. pl. sp. 12.

Hab. , & notæ. *Caulis* fruticosus , erectus , rectus , 9-pedalis , multiplex : *ramis* strictis , ascendentibus. *Folia* parva , sub-cuneiformia , superius inciso-serrata , tomentosa , alterna , petiolis brevibus. *Flos* cæruleo-violaceus , plenus , mediocris , sub-erectus , subsefilis , lateralis , & terminalis. *Calyx* exterior 7-phyllo. *Stamina* Monadelpha. *Fructus* plerumque abortiens.

Habitat in hortis Cochinchinæ : in Chinâ mihi non visus.

Forsk Ægyp. cent. 4. n. 93. pag. 125. Thunb. Jap. pag. 272.

Sp. 6. HIBISCUS SURATTENSIS. α Cây soudng chua.

Differ. spec. Hib. recurvato-aculeatus : *foliis* 5 lobis : *calycibus* exterioribus appendiculatis : *stipulis* semicordatis : *floribus* pedunculatis. Lin. sp. 16.

Hab. , & notæ. *Frutex* 6-pedalis , scandens , multiplex , ramosus : *caule* , *foliis* , petiolis , calyce , pedunculis omnibus aculeatis. *Folia* mixtim 3-loba , palmataque 5-loba , ferrata , sparsa , petiolis longis. *Flos* lateralis , solitarius , mediocris , pedunculo longo : corollâ intus croceâ , foris ruberrimâ. *Calyx* duplex , uterque persistens. Exterior rotatus , appendiculatus , exoticus , 10-phyllo , foliolis ovato-oblongis , pedicellatis : interior 5-fidus , laciniis acutis , conniventibus , dorso , & margine carinatis. *Corolla* petala 5 , campanulata , obtusa , basi leviter cohærentia. *Filamenta* plurima , subulata , inferius coalita in tubum , calyce longiore. *Antheræ* oblongæ , incurvæ. *Germen* conicum , 5-gonum. *Styli* 5 , reflexi , æquales statim in minibus. *Stigmata* convexa. *Capsula* lato-conica , inermis , sericea , 5-valvis , 5-locularis , polysperma , calyce interiore connivente clausa. Semina angulata , scabra.

Habitat inter sepes Cochinchinæ.

Ketmia Indica , spinulosa , profundè laciniata , acetosa sapore. Burm. Zeyl.

Zeyl. pag. 135. Herba crinalium Agrestis. Rumph. Amb. I. 6. c. 19. pag. 40. tab. 16

Uſus. Foliis grātē acidis condiuntur cibi. In cataplasmate juvant ad diſſolvendos tumores duros, & pustulas ex variolis rēſiduas: in quēm finem plantæ radix efficacior habetur.

Sp. 7. HIBISCUS ESCULENTUS. a Cây boung vàng, chia lá. b Hoàng súu quei.

Differ. spec. Hib. foliis quinque partito-pedatis: calycibus interioribus latere rumpentibus. Lin. sp. 19.

Habitus, & notæ. *Caulis* suffruticosus, 6-pedalis, teres, inæqualis; suberectus; ramis herbaceis, diffusis, reclinati, hispidis. *Folia* palmata, crenata, tomentosa, petiolis longis, hispidis, latis. *Flos* lateralis, solitarius, magnus, 5-petalus, luteus, rubro conspersus. *Calyx* exterior 8-phyllus: interior oblongus, spathaceus, apice 4-dentatus, a latere dehiscens. *Capsula* oblonga, acutè 5-gona, 5-locularis, 5-valvis: *seminibus* multis, reniformibus. *Stamina* Monadelpha. *Styli* 5.

Habitat in hortis Cochinchinæ, & Chinæ.

Burm. Ind. pag. 153. Fork. Ægyp. centur. 4. pag. 125. n. 90. Secunda Quigombo ex Africâ traducta. Pis. Bras. I. 4. c. 45. pag. 211. fig. ibi.

Uſus. Fructus nondum maturi, sed cocti esculenti sunt. Planta colitur ob formam, & colorem floris, quamvis inodori.

GENUS XVII. ALCEA.

Char. Gener. *Cal.* duplex: exterior 6-fidus. *Arilli* monospermi, plures. Lin. sy. pl. G. 905.

† Sp. 1. ALCEA AFRICANA.

Differ. Spec. Alc. foliis 3-lobis, crenatis: floribus solitariis, axillariibus: calyce utroque 6-partito.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 4-pedalis, erectus, multiplex, teres, hispidus. *Folia* 3-loba, inæqualiter crenata, aspera, alterna, petiolata. *Flos* coccineus, lateralis, pedunculis solitariis, longis, monofloris: *calycibus* exteriore, & interiore 6-partitis: *staminibus* Monadelphis: *pistillo* pentagyno: *arillis* 5, monospermis, laevibus.

Habitat ad litora Africæ Orientalis.

Observ. Alcea Indica (Burm. Ind. pag. 149.) convenit cum Africanâ foliis 3-lobis, crenatis: differt autem floribus terminalibus, luteis, & calyce interiore 5-fido.

122 MONADELPHIA. POLYANDRIA.

GENUS XVII. MALVA.

Char. Gener. *Cal*. duplex: exterior 3-phyllos. *Ari*lli plurimi, monospermi. Lin. sy. pl. G. 906.

Sp. 1. MALVA TOMENTOSA. Cay Bay thi.

Differ. spec. Malv. *foliis cordatis*, crenatis, tomentosis: *floribus lateralibus congestis*: *caule fruticoso*. Lin. sp. 2. Hab., & notæ. *Caulis fruticosus*, 2-pedalis, erectus, teres, hispidus, parum ramosus. *Folia* ovata, sub-acuta, sub-cordata, crispa, crenata: utrinque tomentosa. *Flos* luteus, minusculus, axillaris, glomeratus. *Calyx* exterior 3-phyllos: interior 5-dentatus. *Petala* 5, ob-cordata, brevia. *Stamina* 5, coalita. *Stylis* multi. *Ari*lli plurimi, monospermi multi.

Habitat inulta in Cochinchinâ.

Althaea Orientalis bidens, sub-rotundis foliis, floribus parvis, luteis.

Pluk. Amalthe. II. tab. 356. fig. 1. Malva foliis cordatis, crenatis, villosis. Hort. Cliff. pag. 347.

Sp. 2. MALVA VERTICILLATA. Tung quei tsu. Doung qui tu.

Differ. spec. Malv. *caule erecto*: *foliis angulatis*: *floribus axillariis*, glomeratis: *calycibus scabris*. Lin. sp. 17.

Hab., & notæ. *Caulis herbaceus*, annuus, 3-pedalis, erectus. *Folia* cordata, 5-7-angulata, sub-crenata, glabra, petiolis longis, alternis.

Flos albo-ruber, parvus, pedunculis 1-floris, axillaribus, glomeratis. *Calyx* exterior 3-phyllos: interior 5-fidus. *Stamina* Monadelpha, multa. *Ari*lli plurimi, monospermi.

Habitat culta Cantone Sinarum. In Cochinchinâ raro.

Berm. Ind. pag. 149. Hort. Cliff. pag. 502.

Virtus: totius plantæ. Emolliens, Laxans.

CLASSIS XVII.**

DIADELPHIA.

OCTANDRIA.

1. POLYGALA. *Cat.* 2 laciniae alaeformes. *Cor.* vexillum cylindricum. *Cap.* obcordata, 2-locularis.

DECANDRIA.

* *Stamina omnia connexa.*

2. ERYTHRINA. *Ala carinaque brevissimæ.*

3. ABRUS. *Filamenta 9 basi infima connexa, latere superiore libera. Sem. ovata.*

4. GENISTA. *Pistillum deprimens carinam. Stigm. involutum.*

5. LUPINUS. *Antheræ alternæ rotundæ, alternæ oblongæ. Legumen coriaceum.*

6. ANTHYLLIS. *Cal. turgidus, includens siliquam.*

7. ARACHIS. *Legum. torulosum, reticulatum. Cor. refupinata, vèxillo ampio.*

8. ASPALATHUSA. *Leg. muticum, ovatum, subdisspermum.*

9. PTEROCARPUS. *Leg. foliacum. Stamina bina trianthéra.*

† 10. DERRIS. *Legum. membranaceum. Petala basi falcata.*

11. CROTOLARIA. *Legum. pedicellatum, turgidum.*

** *Stigma pubescens. Nec priorem notæ.*

12. PHASEOLUS. *Carina, stylusque spirales.*

13. DOLICHOS. *Vexillum basi callis 2, oblongis, alas compressimenteribus.*

14. PISUM. *Stylus supra carinatus, villosusque.*

15. VICIA. *Stylus sub stigmate barbatus.*

*** Legum. sub-monospermum. Nec priorum notæ.

16. PSORALEA. Cal. punc̄tis glandulosis.

17. TRIFOLIUM. Legum. vix calyce longius, 1-2-spermum.
Flores capitati.

18. GLYCYRRHIZA. Cal. bilabiatus: superiore 3-fido.

**** Legumen sub-articulatum.

19. ÆSCHYNOMENE. Legum. articulis monospermis. Cal. bilabiatus.

20. HEDYSARUM. Legum. articulis sub-rotundis, compressis.
Carina obtusissima.

21. CORONILLA. Legum. isthmis interceptum, rectum.

22. ORNITHOPUS. Legum. articulatum, arcuatum.

23. HIPPOCREPIS. Legum. compresso-membranaceum: altera su-
tura emarginaturis ad medium excisa.

24. MEDICAGO. Legum. spirale, membranaceo-compressum.
Pistillum carinam deflectens.

† 25. DIPHACA. Legumina 2, articulata. Stam. Vaginâ du-
plici.

***** Legumen 1-loculare, polyspermum. Nec priorum notæ.

26. CLITORIA. Vexillum amplum, alas obtegens. Cor. re-
supinata.

27. ROBINIA. Vexillum reflexo-patens, sub-rotundum.

† 28. CITTA. Vexillum. turgidum. Legum. exterius cellu-
losum.

29. GLYCINE. Carina vexillum reflectens.

30. INDIGOFERA. Carina utrinque denticulo.

† 31. GRONA. Carina subtus cavernosa, alis utrinque co-
alita.

- † 32. PHYNCHOSIA. *Carina rhomboidea, rostrata. Legum membranaceum.*
- † 33. MARCANTHUS. *Carina, & alae longissimæ. Legum. Crassum, teres.*
- † 34. ERVUM. *Cal. 5-partitus, sub-equalis, longitudine ferre corollæ.*

- † 35. SARCODUM. *Cal. semitruncatus. Legum. carnosum.*
- † 36. CYTISUS. *Legumen pedicellatum. Cal. bilabiatus.*

37. LOTUS. *Legumen teres, farctum seminibus cylindricis.*

Lotus multijugatus, subfusiformis, foliis oppositis. Annua. Flv.

+ 33. HYMCHOSI.

OCTANDRIA.

+ 33. MARCANTHUS.

GENUS I. POLYGALA.

Char. Gener. *Calyx* 5-phyllosum foliolis duobus alæformibus, coloratis. *Legum.* obcordatum, bilocularis. Lin. G. 921.

+ 32. SARCODIUM.

Sp. 1. POLYGALA SIBIRICA. *g.*
Differ. Spec. Pol. *floribus* cristatis: *racemis* nudis: *caulis* herba-

ceis. *Foliis* lanceolatis. Lin. sp. 9.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 6-pollicaris, sub-erectus, ramo-
sus, teres. *Folia* lanceolato-ovata, integerrima, glabra, alterna.
Flos spieis brevibus, laxis, axillaribus. *Calyx* foliolis binis latera-
libus alæformibus, magnis. *Corolla* albicans, ad viridem declinans:
carina cristata, appendice pennicilliformi. *Stamina* 8, coalita. *Ca-
psula* compressa, obcordata, 2-locularis, 1-perma.

Habitat inculta Cantone Sinarum. Eset Chinensis (Lin. sp. 19.) si.
imberbis.

Polygala multicaulis, angustissimis foliis, floribus carneis. Amm. Ruth
pag. 34. n. 44.

+ Sp. 2. POLYGALA GLOMERATA. *g. Tai Kām.*

Differ. Spec. Pol. *floribus* cristatis, congestis: *foliis* ovato-oblongis:
caule fruticoso.

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, lignosus, erectus, 7-pollicaris, pa-
rum ramosus. *Folia* ovato-oblonga, integerrima, glabra, alterna,
Flos albus, sessilis, congestus, lateralis. *Calyx* 5-phyllosum, com-
pressus: foliolis binis lateralibus lato-falcatis, magnis, florem te-
gentibus, tribus aliis lanceolatis, parvis, omnibus persistentibus.
Corolla 3-petala, papilonacea, calyce minor. *Vexillum* nullum.
Alæ 2, turbinatæ, apice rotundatæ, reflexæ. *Carina* simplex, in-
flexa, alis longior, caudâ bifidâ, longâ, penicilliformi, atergo ex-
teriorius adnatâ. *Filamenta* 8. filiformia, ascendentia, carinæ æqua-
lia, vaginæ tumidæ insidentia. *Antheræ* oblongæ stantes. *Germen*
compressum, inversè cordatum. *Stylus* filiformis, æqualis staminibus.
Stigma unciforme. *Capsula* compressa, obcordato-biloba, 2-lo-
cularis, 1-sperma: *seminibus* ovatis, pilosis.

Habitat inculta prope Cantonem sinarum.

DECANDRIA.

GENUS H. ERYTHRINA.

Char. Gener. *Cyl.* bilabiatus $\frac{1}{2}$. *Vexillum* longissimum, lanceolatum.

Lin. sy. pl. G. 926.

Sp. 1. ERYTHRINA CORALLODENDRUM. & Cây Boung: Thích

doung bl. β Tum ye Xu.

Differ. spec. Er. *foliis* ternatis, inermibus: *caule* arboreo, aculeato.

Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. Arbor magna, cortice cinereo, glabro: *aculeis* reticulatis, brevibus, sparsis: *ramis* sub-ascendentibus. *Folia* 3-nata, sparsa. *Foliola* sub-cordata, sub-rotundo-trigona, acuta, integerrima, glabra, glauca: *petiolis* communi, & propriis longis, inermibus. *Flos* coccineus spicis terminalibus, erectis. *Calyx* spatha simplex, subacuta. *Corolla* vexillum longissimum, acutum, protenuum. *Aë*, & *carina* quadruplo breviores. *Stamina* 10, vexillo subæqualia, omnia in unum basi coalita. *Legumen* longum, rectum, teres, torulosum, articulatum, glabrum: *seminibus* oblongo-reniformibus, 8 circiter: capsula membranacea communi vestitis, a capsula exteriori leguminis distincta.

Habitat agrestis, cultaque in Cochinchinâ, & Chinâ Australi.

Gelata Litorea. Rumph. Amb. I. 3. c. 33. t. 76. Arbor fabifera Boatsin-kring-dicta. Bont. Jav. I. 6. c. 44. pag. 135. fig. ibi.

Virtus. Antifebrilis, Mundificans, Antiputridinosa. Decoctum corticis valet contra febres intermittentes, sine evacuatione sensibili. Folia contusa purgant ulcera putrida: prosuntque in Odontalgia loco applicata.

Ufus. Lignum hujus arboris est album, & levissimum, ad ædificia impatum: apertissimum vero, & ab indigenis præ omnibus quæstum ad formandum pulverem pyrium ex ejus carbonibus. Ejus foliis carnes involutæ diu servantur a putredine, tenerioresque, & sapidiores redduntur: siveque aviatoribus, prætermissa coctione, usufuntur.

† Sp. 2. ERYTHRINA FUSCA. & Cây Son dong.

Differ. spec. Er. *foliis* ternatis, inermibus, lanceolatis: *corollarum* vexillis convolutis.

Hab., & notæ. *Caulis* arboreus, 8-pedalis: *cortice* fusco, canabino: *aculeis* plurimis, brevibus, sparsis: *ramis* diffusis. *Folia* ternata, inermia, sparsa, petiolata: *foliolis* lanceolatis, integerrimiis, glabris. *Flos* fusco-ruber, racemo terminali. *Calyx* sub-bilabiatus,

la-

labiis integris, erectis. *Corolla* vexillum longissimum, obtusum; sub-turbinatum, in tubum convolutum, basi refractum. *Stamina* longa, basi connexa. *Legumen* longum, teres, articulatum, pilosum: *feminibus* oblongis. Porus mellifer supra basim calycis.
Habitat in Cochinchinā ad ripas fluminum spontanea.
Gelala Aquatica. Rumph. Amb. l. 3. c. 35 t. 78.

GENUS III. ABRUS.

Char. Gener. *Cal.* obsoletè 4-lobus: superiore lato. *Filamenta* 9, basi infimâ connata, dorso hiantia. *Stigma* obtusum. *sem.* sphærica. Lin. sy. pl. G. 924.

Sp. 1. ABRUS PRECATORIUS. a Cam thao do hot.

Differ. spec. Abr. *foliis* abrupto-pinnatis: *pinnis* numerosis, obtusis. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, volubilis, multiplex, longus, ramosus. *Folia* abruptè pinnata, sparsa, petiolo longo: *foliolis* oppositis, ovatato-oblongis, glabris, sub-12-jugis. *Flos* purpurascens, spicis lateralibus. *Legumen* compressum, breve, glabrum, rostratum: *feminibus* 3-4, ovatis, nitidè coccineis, macula laterali nigerrimâ: durissima, non edulia.

Habitat in dumetis, & sepibus Cochinchinæ.

Abrus frutex, Zaga. Rumph. Amb. l. 7. c. 31. tab. 32. Phæsolus Indicus ruber. Bont. Jav. l. 6. c. 44. pag. 136. fig. ibi. Orobos Indicus Abrus Alpini dictus, fructu coccineo, macula nigrâ notato. Burm. Zeyl. p. 177.

GENUS IV. GENISTA.

Char. Gener. *Cal.* bilabiatus: $\frac{2}{3}$. *Vexillum* oblongum a pistillo, *staminibusque* deorsum reflexum. Lin. sy. pl. G. 930.

† Sp. 1. GENISTA SCANDENS. a Cây Gieng gieng.

Differ. spec. Gen. *spinis* simplicibus: *caule scandente*: *foliis* 2-pinnatis.

Hab., & notæ. Frutex magnus, caule scandente, longissimo, tereti, ramoso: *spinis* multis, simplicibus, brevibus, sparsis, recurvis.

Folia bipinnata: *foliolis* ovatis, integerrimis, oppositis. *Flos* flavus: *calyce* concolore, sub-bilabiato, 5-fido: *racemis* magnis, laxis, terminalibus, pendulis. *Corolla* papilonacea, vexillo oblongo, reflexo. *Stamina* 10, omnia coalita. *Legumen* sub-rotundum, compressum, glabrum: *semine* 1, magno, compressp. Habitat

Habitat in Cochinchinâ prope ripas fluminum, arundinum Indicarum, & majorum arborum ad summitatem usque pertingens. Abundantia, magnitudine, & aureo florum colore jucundum spectaculum præbet transeuntibus.

GENUS V. LUPINUS.

Char. Gener. Cal. bilabiatus. Antheræ 5 oblongæ, 5 sub-rotundæ. Legumen coriaceum. Lin. sy. pl. G. 939

† Spec. 1. LUPINUS COCHINCHINENSIS. α Cây Lục lác. δ...
Differ. spec. Lup. foliis simplicibus, ovalibus: floribus spicatis, terminalibus: calycibus appendiculatis.
Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annutus, sub-teres, rectus, striatus, 2-pedalis: *ramis* ascendentibus. *Folia* simplicia, ovalia, emarginata, glabra, albicantia, alterna. *Flos* luteus, terminalis, spicatus: *calycibus* appendiculatis: labio superiore 2-fido: inferiore 3-dentato. *Stamina* 10, connata: *antheris* 5 oblongis, 5 aliis alternis sub-rotundis. *Legumen* oblongum, turgidum, obtuse 3-gonum, caudatum, glabrum, polyspermum: *seminibus* orbiculatis, uncinatis. Habitat agrestis in Cochinchinâ. Idem a me visus in Benghalâ.

† Sp. 2. LUPINUS AFRICANUS. γ...
Differ. spec. Lup. foliis lanceolatis, 3-natis: caule fruticoso, diffuso: pedunculis polyfloris, terminalibus.
Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, 3-pedalis, ramis diffusis. *Folia* ternata, lanceolata, glabra, petiolis alternis. *Flos* luteus, pedunculis terminalibus, polyfloris. *Calyx* appendiculatus, 5-fidus. *Corolla*, *stamina*, & *Leguumina* generis propria.
Habitat agrestis in orâ Orientali Africæ.

GENUS VI. ANTHYLLIS.

Char. Gener. Cal. ventricosus. Legumen sub-rotundum, tectum, Lin. sy. pl. G. 936.

† Sp. 1. ANTHYLLIS INDICA. α Cây Káoc sát.
Differ. spec. Ant. fruticosa, foliis pinnatis, æqualibus, glabris: racemis oblongis, sub-terminalibus.
Hab., & notæ. *Frutex* magnus, caule erecto, *ramis* scandentibus, inermibus. *Folia* impari-pinnata: *foliolis* ovatis, integerrimis, glabris, sub-æqualibus. *Flos* albus, racemis oblongis, multis, subterminalibus. *Calyx* ventricosus, 5-dentatus, ruber, persistens. *Fila-*
III men-

menta 10, omnia connata. Legumen breve, 2-spermum : seminibus, reniformibus. Habitat in montibus Cochinchinæ.

GENUS VII. ARACHIS.

Char. Gener. Cal. bilabiatus. Cor. supinata. Filamenta connexa. Legum. gibbum, torulosum, venosum, coriaceum. Lin. sy. pl. G. 937.

Sp. 1. ARACHIS ASIATICA. α Cây đậu phộng.

Differ. spec. Ar. foliis pinnatis, pilosis : stipulis bifidis : floribus congestis : folliculis 3-4-spermis.

Hab., & notæ. Caulis herbaceus, annuus, 3-pedalis, multiplex, teres, pilosissimus, rufescens, sub-erectus, ramis diffusis procumbentibus. Folia sparsa, petiolata, abruptè pinnata, 2-juga : foliolis ovatis, pilosis, integerrimis : petiolis brevibus. Stipulae acutæ, bifidæ, oppositæ, semi-amplexicaules. Fls aureus, congestus, axillaris : pedunculis tenuibus, longissimis, 1-floris. Flores masculi multi, commixti hermaphroditis. Calyx bilabiatus : labio superiore ovato, 3-fido : inferiore subulato, integro, incurvo, longiore. Corolla papilionacea, resupinata : vexillo latissimo, obtuso, emarginato, expanso : alis brevioribus, ovatis, conniventibus : carinâ falcatâ, alis breviore. Filamenta 10, omnia in vaginam connata, ad angulum rectum assurgentia : antheris 5 oblongis, 5 aliis alternis sub-rotundis. Germen (hermaphrodit) oblongum. Stylus subulatus, æqualis staminibus : stigmate simplici. Pericarpium supra terram nullum : sub terrâ folliculus, oblongus, obtusus, reticulatus, torulosus, evalvis, 3-4-spermus, e germine floris in maturiscentiâ, reclinato pedunculo, terram perforante enatus. Semina ovata, sæpe obliquè truncata.

Habitat culta abundantissimè in Cochinchinâ, & in Chinâ.

Chamæbalanus Japonica. Rumph. l. 9. c. 54. tab. 156. fig. 2.

Senna tetraphylla, s. absi congener hirsuta, Maderapatenfis, folliculos sub terrâ condens. Pluk. Almag. 341. tab. 60. fig. 2.

Usus. Hæc femina leviter tosta sapida fiunt, & variis tragematisbus misceri solent amygdalas suppletura. Oleo tenui, limpido scatent, lucernis aptissimo, communis usus in Cochinchinâ. Ad frigenda edulia etiam adhibetur, quamvis præstantiâ saporis cedat oleo olivarum.

† Sp. 2. ARACHIS AFRICANA. γ

Differ. spec. Ar. foliis pinnatis, glâbris : stipulis integris : folliculis 2-3-spermis.

Hab.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, teres, longus, procumbens, ramosus. *Folia* abruptè-pinnata, 2-juga: foliolis ovatis, glabris. *Flos* aureus, plerumque geminus, axillaris, pedunculis brevioribus: *floribus* masculis cum hermaphroditis sparsis. *Corollæ* alæ, & carina vexillo triplò minores. *Folliculus* evalvis, torulosus, reticulatus, 2-3-spermus, subterraneus. *Stipulæ* subulatæ, integræ, oppositæ ad basim petiolorum.

Habitat in variis locis Africæ Orientalis. Per me in Lusitaniam delata floruit, & fructificavit, sed ita debilis, ut tertio anno semina non amplius germinarent. Nullibi vidi Pericarpium in valvas aperriri.

Observ. Hæc species a præcedente non admodum differt, nec qualemcumque differentiam a me notatam apud Auctores invenio, fortasse, quia Africaram non viderunt. A Linnaeo indiscriminatim vocantur Arachis Hypogœa.

GENUS VIII. ASPALATHUS.

Char. Gener. *Cal.* 5-fidus: laciniâ superiore maiore. *Legum.* ovatum, muticum, sub-dispermum. Lin. sy. pl. G. 931.

† Sp. 1. ASPALATHUS ARBOREA. α Cay Kaa gá.

Differ. spec. Asp. *foliis* pinnato-quinatis: *racemis* terminalibus.
Hab., & notæ. Arbor mediocris: trunco recto, elato: *ramis* debilis, reclinatis. *Folia* impari-pinnata, 2-juga: *foliolis* ovatis, integrimis, glabris, sessilibus, inferioribus minoribus. *Flos* albus, parvus, racemis compositis, terminalibus: *calyce* 5-fido, patente, laciniâ superiore maiore. *Corolla* vexillo obcordato, latiusculo, evanescidente; alis oblongis, vexillo æqualibus. *Stamina* omnia conata, corollâ breviora. *Stigma* obtusum, sessile. *Legumen* oblongo-ovatum, compressum, muticum, sub-dispermum.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Observ. Differt ab Aspalatho Indicâ, quæ pedunculos habet unifloros, axillares; nec in arborem assurgit.

GENUS IX. PTEROCARPUS.

Char. Gener. *Cal.* 5-dentatus. *Caps.* falcata, foliacea, varicosa. *Sem.* aliquot, solitaria. Lin. sy. pl. G. 925.

† Sp. 1. PTEROCARPUS FLAVUS. β Hoàn pě mō. α Hùynh bá.

Differ. spec. Pter. *foliis* pinnatis, sub-triangularibus: *spicis* lateralibus: *corollis* dentatis.

Hab., & notæ. *Arbor* magna : ramis ascendentibus, inermibus : *cortex* glabro, intus succoso, flavo, amaro. *Folia* impari-pinnata, sub-trijuga : foliolis ovatis, acutis, integerimis. *Flos* flavus, spicis lateralibus, brevibus. *Corolla* papilonacea, vexillo dentato, reflexo. *Legumen* breve, compressum, glabrum : cortice crassö, duro, vix dehiscente, inæquali : *semibus* 2-3, compresso-rotundis.

Habitat in sylvis. Sinensibus.

- Malaparius. Rumph. Amb. l. 5. c. 32. tab. 117.

- Observ. Quamvis hâc plantâ frequenter usus sum in praxi Medicâ, florem non vidi, nisi pictum, & descriptum in herbariis Sinensibus, & Rumphiano, unde existimo Pterocarpi speciem esse.

- Virtus : corticis. Resolvens, Vulneraria. Rumphius scribit prodesse in Paralyysi, quod experientâ nondum probavi.

- Usus. Decocto corticis tinguntur serica colore flavo permanente, nec injucundo.

† GENUS X. DERRIS.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium tubulosum, coloratum, margine 5-crenato, erecto.
Cor. Petala 4, papilonacea, longitudine sub-æqualia : vexillo ovato : alis oblongis : carinâ lunatâ : omnibus basi falcatis, unguibus filiformibus insistentibus.

Stam. Filamenta 10, omnia connata in vaginam, æqualia, brevia. Antheræ didymæ lobis rotundis.

Pilt. Germen oblongum, compressum. Stylus æqualis staminibus. Stigma simplex.

Peric. Legumen oblongum, obtusum, compressissimum, membranaceum, lœve, monospermum.

Sem. Oblongum, planum.

Nom. ($\Delta\epsilon\pi\pi$ is membrana) a legumine membranaceo.

Char. Gener. Cal. 5-crenatus, coloratus. Petala unguibus filiformibus. Legum. oblongum, membranaceum.

† Sp. 1. DERRIS PINNATA. a Cham bia an tian.

Differ. spec. Der. scandens, foliis pinnatis : pedunculis polyfloris, lateralibus.

Hab. Frutex scandens, caule longo, inermi, ramosissimo. Folia alternatim pinnata, multijuga : foliolis ovato-oblongis, basi rhombicis, parvis, glabris, integerimis. Flos albus, pedunculis polyfloris, lateralibus. Legum. 1-spermum. Ha-

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Usus. Radix carnosæ, rubescens supplet defectum fructus Arecæ, quæ simul cum folio aromatico Piperis Betle assiduè masticatur ab indigenis, ut suavem halitum, & rubedinem oris conciliet.

† Sp. 2. DERRIS TRIFOLIATA. *g. Sān leāo tāu.*

Differ. spec. Derr. scandens, *foliis ternatis: racemis longis, axillaribus.*

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, scandens, ramosus, inermis: *radice* longâ, multiplici, carnosâ. *Folia* 3-nata, ovato-lanceolata, integerrima, glabra. *Flos* albus, racemis longis axillaribus: *calyce* concolore, leviter 4-dentato. *Corollæ* petala longitudine æqualia, basi falcata, unguiculata. *Stamina* omnia connexa, æqualia. *Legumen* 2-3-spermum, oblongum, rectum, compressum, membranaceum? maturum non vidi.

Habitat in sylvis provinciæ Cantonensis Sinarum.

GENUS XI. CROTOLARIA.

Char. Gener. *Legumen* turgidum, inflatum, pedicellatum. *Filamenta* connata cum fissurâ dorsali. Lin. sy. pl. G. 934.

† Sp. 1. CROTOLARIA HEPTAPHYLLA. *a*

Differ. spec. Crot. *foliis septemnatis: spicis longis: caule* arboreo.

Hab., & notæ. *Arbor* 10-pedalis, ramis diffusis. *Folia* impari-pinnata, 3-juga: *foliolis* ovato-oblongis, venosis, sub-tomentosis, petiolis brevibus. *Flos* albus, axillaris, & terminalis, spicis simplificibus, longis, solitariis. *Calyx* 5-dentatus, villosus, brevis. *Corollæ* *vexillum* emarginatum, assurgens: *ale* oblongæ, *vexilli* dimidiæ: *carina* inflexa, alis brevior. *Stamina* omnia connata. *Legumen* pedicellatum, turgidum, villosum; inæquale: *seminibus* paucis, sub-rotundis.

Habitat inculta in Cochinchinâ.

† Sp. 2. CROTOLARIA SCANDENS. *a Cây Hay.*

Differ. spec. Crot. *foliis oblongis: pedunculis polyfloris, axillaribus: caule* fruticoso, scandente.

Hab., & notæ. *Frutex* magnus, *rantis* longis, lignosis, scandentibus. *Folia* ovato-oblonga, acuminata, integerrima, glabra, alterna, petiolata. *Flos* albus, axillaris, pedunculis polyfloris: *corollâ* *pileonacea*, petalis sub-æqualibus, patentibus: *calycibus* glabris: *Staminibus* omnibus connexis. *Legumen* turgidum, utrinque acuminatum: *seminibns* paucis.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

GENUS XII. PHASEOLUS.

Char. Gener. *Carina* cum *staminibus*, *styloque* spiraliter tortis. Lin. sy pl. G. 940.

Sp. 1. PHASEOLUS VULGARIS. α Dâu thâng tau.

Differ. spec. Phas. *caule* volubili: *floribus* racemosis, *geminis*, *bracteis* calyce minoribus: *leguminibus* pendulis. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ *Caulis* annuus, volubilis, 8-pedalis, simplicissimus.

Folia 3-nata, acuminata, basi rotundata, aspera, petiolis longis.

Flos albus, axillaris, racemis geminis, vel etiam petiolis simpliciter geminis: *bracteis* calyce maioribus. *Legumen* longum, sub-curvum, sub-compressum, glabrum: *seminibus* multis reniformibus, albis.

Habitat raro in Cochinchinâ, non indigena.

Thunb. Jap. pag. 278. Smilax hortensis, sive Phaseolus maior. Bauh.

Pin. pag. 339. n. 1. OTODA CROTON

Sp. 2. PHASEOLUS LUNATUS. α Dâu dai.

Differ. spec. Phas. *Caule* volubili: *leguminibus* acinaciformibus, *sub-lunatis*, lævibus. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, volubilis, 10, aut ultra pedes longus, ramosus. *Folia* 3-nata, lævia, acuta, inæqualia. *Pedunculi* polyflori. *Flos* luteus, vexillo patente, viridi, calyci concolore. *Carina*, & *stamina* spiraliter contorta. *Legumen* compressum, latum, sub-curvum, acuminatum, glabrum: *seminibus* orbiculato-reniformibus, nitidis, nigris, albo striatis, magnis.

Habitat cultus in Cochinchinâ. Quamvis esculentus, ob pulchritudinem seminum pluris habetur, quam ob saporem.

Burm. Ind. pag. 157.

† Sp. 3. PHASEOLUS TUBEROSUS. α Dâu săn ràng.

Differ. spec. Phas. *Caule* scandente: *vexillo* revoluto: *radice-tuberosa*, fasciculata.

Hab. & notæ. *Caulis* fruticosus, scandens, longus, ramosus: *stipulis* bicornibus, acutis, expansis: *foliis* 3-natis, magnis: *floribus* integrè luteis, racemosis, subterminalibus. *Galyx* 4-fidus, laciniis longitudine æqualibus, summâ obtusa, emarginata. *Corollæ* vexillum revolutum. *Stamina*, & *carina* spiralia. *Legumina* sub-compressa, longa, non edulia. *Radix* tuberosa, fasciculata, magna, esculenta.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

Sp.

Sp. 4. PHASEOLUS TUNKINENSIS. *a. Dāu ke bắc.*
 Differ. spec. Phas. *Caulē* volubili, ramosissimo: *foliolis*, conicis, parvis, crassis: *vexillo* revolutō, calyci concolore.
 Hab., & notæ. *Caulis* annuus, volubilis, brevis, ramosissimus. *Folia* 3-nata, conica, parva, crassa, glabra, plana. *Flos* albus, racemosus, axillaris: vexillo revoluto, calyci viridi concolore. *Carina* cum staminibus spiraliter contorta. *Legumen* sub-lunatum, compressum, lāeve, pendulum, 3-spermum: *seminibus* ovatis, pallidis, rubro variegatis, edulis.
 Habitat cultus in Cochinchinā, ab Tunkino oriundus.

Sp. 5. PHASEOLUS RADIATUS. *a. Dāu Xanh* *Ju* *dai*. *b. Liu tēu.*
 Differ. spec. Phas. *Caulē* erecto, tereti: *floribus* capitatis: *leguminibus* cylindricis horizontalibus. Lin. sp. 11.
 Hab., & notæ. *Caulis* annuus, erectus, 2-pedalis, sub-teres, sulcatus, pilosus, ramosus. *Folia* 3-nata, lato-lanceolata, pilosa, stipulis geminis, acutis, petiolis longis. *Flos* fusco-luteus, capitatus, axillaris, pedunculo communi longo, erecto. *Cat.* 4-fidus, acutus, æqualis, lacinia summa emarginata. *Corollæ* *vexillum* magnum, sub-rotundum, patens, apice plicato, emarginato. *Alæ* breviores, lato-falcatae, lobo conico, inflato, exterius prominente. *Carina* falcata, simul cum staminibus spiraliter contorta, media longitudine inter vexillum, & alas. *Legumen* lineare, teres, rectum, acuminatum, pilosum, fuscum, polyspermum, horizontale: *seminibus* viridi-luteis, ovatis, parvis, omnium phaseolorum saluberrimis, nec palato ingratiss.

Habitat, & colitur abundantter in Cochinchinā, & Chinā.

Phaseolus Minimus. Rumph. Amb. I. 9. c. 30. tab. 139. fig. 2. Phaseolus Zeylanicus, siliquis radiatim digestis. Burm. Zeyl. pag. 192. Virt. Seminum. Resolvens, Diuretica. Prodest in Hydrope, Cephalgia, vīlū debilitate.

Sp. 6. PHASEOLUS MUNGO. *a. Dāu muòng* *än.* *b. Sião tēu.* *c. Tsiám tēu.*
 Differ. spec. Phas. *Caulē* flexuoso, tereti, hirsuto: *leguminibus* capitatis, hirsutis. Lin. sp. 13.
 Hab., & notæ. *Caulis* annuus, sesquipedalis, flexuosus, erectus, teres, hispidus, ramosus. *Folia* 3-nata, sub-forunda, utrinque sub-acuta, pilosa, mollia, flavo-viridia: *stipulis* 2-fidis, acutis, medio adnatis, ciliatis. *Flos* flavus, axillaris, pedunculo communi petiolis sub-æquali, desinente in capitulum 3-4-florum. *Calyx* 5-fidus, suffultus stipulis geminis, incurvis, inflexis, calyce longioribus. *Carina* ab uno latere corniculum tubulosum exerens, quo unam ex aliis

removet: alâ alterâ cum ipsâ carinâ, & staminibus in spiram contortis. *Legumen* teres, tenui, longiusculum, acuminatum, pilosum: *seminibus* multis, sub-ovatis fusco-viridibus, esculentis.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ in agris cultus.

Mungo. Garc. Arom. l. 2, c. 21. Phaseolus hirsutus, flexicaulis, Mungo affinis Maderaspatanus, cable tereti. Pluk. Almag. 290.

GENUS XIII. DOLICHO S.

Char. Gener. *Vexillî* basis callis duobus, parallelis, alas subtus comprimentibus. Lin. Sy. pl. G. 941.

Sp. 1. DOLICHOS SINENSIS. *& Dau* *su* *& Tâu* *cô*; *Téu* *cô*.

Differ. spec. Dol. volubilis, *leguminibus* pendulis, cylindricis, torulosis: *pedunculis* erectis, multifloris. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, longus, teres, tenuis, volubilis, subramosus. *Folia* ternata, lato-lanceolata, glabra: *stipulis* lanceolatis binis, ternis ab basim petioli communis, *Flos* albo-violaceus, *pedunculis* paucifloris, sub-erectis, axillaribus: *vexillo* ascendente, obtusissimo, emarginato, callis binis ad basim exertis. *Stylus* sub-teres, superius pilosus. *Legumen* lineare, longissimum, pedale, sub-teres, torulosum, glabrum, pendulum: *seminibus* oblongo-reniformibus, pallidis, multis.

Habitat cultus ubique in Cochinchinâ, & Chinâ.

Rumph. Amb. l. 9. c. 22. tab. 134. Burm. Ind. pag. 158.

Uſus. Legumina ista sunt salubria, & sapida, maximè recentia. Observ. Existimo Dol. sesquipedalem (Lin. sp. 7.) specie non differre: certè notæ omnes ibi expositæ utrique æqualiter convenient, si docum natalem excipias, quod non est curandum.

Sp. 2. DOLICHOS UNGUICULATUS.

Differ. spec. Dol. volubilis, *leguminibus* capitatis, sub-cylindricis: apice recurvo, concavo. Lin. sp. 4.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, teres, volubilis, glaber, mediocris, parum ramosus. *Folia* ternata, acuta, glabra: *stipulis* medio adnatis, utrinque acutis. *Flos* axillaris, pedunculo longo, crasso, striato, patente, sœpe bipartito: *capitulis* paucifloris. *Corolla* albo, luteo, & violaceo variegata: *vexillo* lato, rotundato, emarginato, ascendentem, callis binis parallelis, curvis, alas deprimentibus. *Alæ*, & *carina* obtusæ, conniventæ, unguiculatæ, sub-æquales. *Stamina*

Diadelpha, ascendenta, vaginâ longâ: *antheris* ovatis, stantibus. *Stylus* teres, superius barbatus: *stigmate* crassiusculo, glabro. *Legumen* longum, sub-teres, subarcuatum, torulosum, pendulum:

apice recurvo, concavo. *Semina* ovata, rubra.

Habitat in Chinâ, unde in Lusitaniam translatus.

Thunb. Japon. pag. 279. Rumph. Amb. l. 9. c. 27. tab. 138. *Cacara Nigra.*

Uſus. *Semina* ſunt edulia: ſed nec ori, nec ſtomaco multum grata.

Sp. 3. DOLICHOS ENSIFORMIS. α 大根 β Tāo téu.

Differ. spec. Dol. *caule* ſub-erecto: *leguminibus* gladiatis, dorſo 3-carinatis: *seminibus* arillatis. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, ſuffruticosus, scandens, longus; ramosus, glaber. *Folia* 3-nata, acuta, rugosa, glabra: *ſtipulis* ſetaceis, minimis. *Flos* violaceus, pedunculis polyfloris, axillaribus. *Calix* tubulosus, bilabiatus: labio ſuperiore 2-fido, inferiore 3-dentato, breviore. *Corollæ vexillum* ſub-rotundum, emarginatum, re-fractum: callis oblongis ad baſim alas prementibus. *Alæ*, & *carina* falcatæ, vexillo æquales. *Filamenta* Diadelpha, ſubulata, æqualia, ascendentia: *antheris* ovatis, nutantibus. *Germen* oblongum. *Stylus* filiformis, glaber, æqualis ſtaminibus. *Stigma* parvum, conca-vum. *Legumen* magnum, compressum, dorſo crassius, 3-nervium, ad apicem reflexum, acuminatum, acinaciforme: *seminibus* 5-6 compreſſo-ovatis, arillatis, magnis.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ: coliturque pro umbraculo contra ſolis calorem: cibo minus aptus. Eſt varietas legumine duplo lon-giore, & planiore, foliis obtufioribus, & aliis parvis differentiis, quæ ad mutandam ſpeciem non ſufficient.

Thunb. Jap. pag. 279. *Lobus* Machæroides. Rumph. Amb. l. 9. c. 23. tab. 135. fig. 1.

Sp. 4. DOLICHOS TETRAGONOLOBUS. α 大圓 β . . .

Differ. spec. Dol. volubilis, *leguminibus* membranaceo-quadrangula-tis. Lin. sp. 6.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, teres, tenuis, scandens, longus, ramosus. *Folia* ternata, lato-lanceolata, glabra, pallidè viridia: *ſtipulis* lanceolatis, minuſculis. *Flos* pallidè cæruleus, pedunculis lateralibus, longis, paucifloris: *vexillo* ſub-rotundo, magno, re-fracto, callis binis parallelis alas breviores depremitibus. *Legu-men* crassum, ſemipedale, a quatuor angulis in longitudinem ex-e-rens 4 membranas tenues, laceras, connatas. *Semina* 8 circiter, ſub-ovata.

Habitat, non frequens, in Cochinchinâ, & Chinâ.

Burm. Ind. pag. 159. *Lobus Quadrangularis*. Rumph. Amb. l. 9. c. 21. tab. 133.

Uſus. Recens legumen ſapidum inveni: ſed caput grayat.

Sp. 5. DOLICHOS PRURIENS. α Dâu ngúia.

Differ. spec. Dol. volubilis, leguminibus racemosis: *valvulis* sub-carinatis, hirtis: *pedunculis* ternis. Lin. sp. 9.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, longissimus, teres, ramosus, volubilis, aliquando repens. *Folia* ternata, ovata, sub-obtusa, mollia, pilosa, lètè virentia. *Flos* fusco-violaceus, pedunculis polyforis, lateralibus, longis, pendulis. *Legumen* 3 pollices longum, compressum, sub-curvum, pilosissimum, polyspermum: *seminibus* 5-6, ovatis, compressis. *Pili* rufi totius plantæ, & præcipue leguminis, si cutem tangant, pruritum excitant intolerabilem.

Habitat ad ripas fluminum in Cochinchinâ, omnibus odiosus.

Phaseolus Zeylanicus, lobis undequaque pilosis, fructu lucido, nigro. Burm. Zeyl. pag. 191. Cacara pruritus. Rumph. Amb. l. 9. cap. 36. tab. 142.

Sp. 6. DOLICHOS ALTISSIMUS. α Dâu bân Phu yen.

Differ. spec. Dol. leguminibus racemosis, hirtis, æqualibus: *seminibus* hilo cinctis: *foliis* utrinque glabris. Lin. sp. 8.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, perennis, ramosus, longissimus, ad arborum summitem scandens. *Folia* ternata, sub-rotundo-rhombea, sub-rugosa, utrinque glabra: *stipulis* subulatis. *Flos* violaceus, racemis longis, lateralibus: *vexillo* sub-rotundo, magno, reflexo: callis parallelis alas comprimentibus. *Legumen* oblongum, planum, scabrum, 3-4-spermum: *seminibus* ovatis, compressis, pallidis, hilo cinctis.

Habitat incultus, cultusque in Cochinchinâ.

Cacara perennis. Rumph. Amb. l. 9. c. 25. tab. 136.

Observ. Si caulem perennem excipias, reliquæ notæ hujus plantæ magis convenient Dolicho Altissimo, quam Lignoso: huic adscribe, si magis placet, vel potius ex duabus speciebus una fiat.

Usus. Semina elixa in frequenti usu sunt apud indigenas, quamvis magis patient, quam delectent.

Sp. 7. DOLICHOS PURPUREUS. α Dâu bân tiá. β Tsù pién téu.

Differ. spec. Dol. volubilis, *caule* glabro: *petiolis* pubescentibus: *corolle* alis patentibus. Lin. sp. 18.

Hab., & notæ. *Caulis* volubilis, perennis, rubro-purpureus, hispidus, ramosus. *Folia* sub-cordata, acuta, brevia, venis purpureis, 3-nata: *petiolis* pilosis: *stipulis* quaternatis, subulatis. *Flos* lètè purpureus, calyce concolore: *spicis* longis, erectis, terminalibus. *Legum.* 3-pollicare, lato-planum, glabrum, purpurascens: *seminibus* compresso-ovatis, hilo cinctis. *Corollæ* alæ patentes.

Habi-

Habitat cultus in Cochinchinâ, & Chinâ.

Burm. Ind. pag. 160.

Uſus. Legumina tenera, & recentia sapida ſunt, & falubria.

Sp. 8. DOLICHOS ALBUS. α Dâu bán tláng. β Pě piēn tēu.

Differ. spec. Dol. Caule volubili, glabro: vexillo latifimo: legumi-ne plano, carnoſo.

Hab., & notæ. Caulis volubilis, perennis, teres, glaber, albicans, ramosus. Folia 3-nata, trigono-rotunda, pubescentia, mollia, pallida: petiolis glabris: ſtigulis binatis, acutis, brevibus. Flos albus, racemis brevibus, sub-terminalibus: vexillo latifimo, reflexo, callis binis alas comprimentibus. Legumen 3-pollicare, lato-planum, carnoſum, glabrum, dorſo tuberculosum, roſtratum: ſeminibus compreſſo-ovatis, hilo cinctis.

Habitat cultus in Cochinchinâ, & Chinâ, tenerior, & ſapidior præcedente, nec formâ valde differens.

Cacara Alba. Rumph. Amb. I. 9. c. 26. tab. 137.

Sp. 9. DOLICHOS BULBOSUS. α Sân rúong.

Differ. spec. Dol. volubilis, foliis glabris, multangulis, dentatis. Lin. sp. 14.

Hab., & notæ. Caulis volubilis, perennis, ſuffruticosus, longus, teres, glaber, ramosus: ſtipulis nullis. Folia ſub-rotundo-angulata, 3-nata, acuminata, glabra, petiolata. Flos terminalis, racemis longis. Calyx Cyathiformis, 4-fidus, laciñia ſuperiore breviore, emarginatâ. Corolla pallidè violacea: vexillo ovato, integerrimo, connivente. Filamenta Diadelpha, æqualia: antheris omnibus ova-to-oblongis incubentibus. Stylus longior staminibus, filiformis, fulcatus, glaber: ſtigmate crassifculo, glabro. Legumen coimprefsum, lineare, iſthmis interceptum, 4 pollices longum, ſub-arcuatum. Radix tuberibus fasciculatis, ſub-rotundis, caudatis, ſuccofis, albis. Sem. sub-quadrata, compressa.

Habitat cultus in Cochinchinâ.

Cacara Bulbosa. Rump. Amb. I. 9. c. 20. t. 132. fig. 2. Phaseolus Nervicensis, foliis multangulis, tuberosâ radice. Pluk. Almag. pag. 292. tab. 52. fig. 4.

Uſus. Tubera tam cruda, quam cocta eſculenta ſunt: non autem ſemina.

Sp. 10. DOLICHOS TRILOBUS. α Sân deai cu: Cat căn. β Kēn cō.

Differ. spec. Dol. volubilis: foliolis lateralibus, extrorſum gibbis: intermedio trilobo. Lin. sp. 15.

Hab., & notæ. Caulis perennis, ſuffruticosus, teres, longissimus, ra-

mosus, volubilis, vel repens quando terram attingit, hirsutus. *Folia* 3-nata, petiolata, stipulis bicornibus: *foliolis* 3-lobatis, acuminate, pubescentibus. *Flos* purpureus, spicis longis, terminalibus, & lateralibus. *Calyx* 4-fidus, laciniis acutis, inferiore longiore. *Corollæ vexillum* lato-ovatum, emarginatum, erectum, patens, maculâ luteâ magnâ in medio notatum. *Alæ* oblongæ, vexillo breviores. *Carina* alis longior. *Filamenta* 10, Diadelphia, ascendentia, æqualia, vaginæ longæ connata: *antheris* omnibus oblongis, incumbentibus. *Germen* lineare, pilosum. *Stylus* ventricosus, æqualis staminibus. *Stigma* sub-rotundum, glabrum, minimum. *Legumen* 4-pollicare, lineare, rectum, compressum, isthmis interceptum: *seminibus* 8 circiter, sub-quadratis, compressis, rufis. *Radix* tuberibus longis.

Habitat cultus in Cochinchinâ, & Chinâ.

Burm. Ind. pag. 160. t. 50. fig. 1. Phaseolus Maderaspatanus, foliis glabris, trilobis. Pluk. Almag. pag. 292. t. 214. fig. 3.

Uſus. Tubera radicis fasciculata, pauca, 2-pedalia, subteretia, fibroſo-carnosa, pallida, edulia ſunt cocta, non cruda, nec etiam legumina.

Virtus: radicis. Refrigerans, Pellens, Diaphoretica, Antifebrilis. Proficit in omnibus febribus calidis, etiam malignis: in tenefmo, & dysenteria: ſitim mitigat, & ebrietatem.

Observ. Dubito an sit eadem planta, de quâ Plukenetius, & Burmannus locuti ſunt: maximè, quia de tuberibus tacuerunt, quæ in noſtrâ ſunt valde notabilia magnitudine, & virtute.

† Sp. 11. DOLICHOS MONTANUS. *a* Sân rûng.

Differ. spec. Dol. *Cauli* fruticoso, scandente: *foliolis* ovato-rhombeis: *filamentis* 5 *antheris* oblongis: 5 aliis alternis, sub-rotundis. Habitus, & notæ. *Caulis* fruticosus, longus, ramosus, scandens: *radice* sub-tuberofâ, fasciculatâ, durâ, macrorrhizâ. *Folia* ternata, foliolis ovato-rhombeis, magnis, tomentosis, integris. *Flos* integrè purpureus, spicis longis, lateralibus. *Calyx* 4-fidus, laciniis acutis inferiore longiore. *Corollæ vexillum* ovatum, emarginatum, conniventis: *alæ* vexillo æquales: *carina* alis brevior. *Stamina* 10, Diadelphia, ſubulata, ascendentia: 5 alterna longiora, *antheris* oblongis: 5 alia breviora, *antheris* sub-rotundis. *Germen* lineare, rectum. *Stylus* ſubulatus, æqualis staminibus. *Stigma* crassiusculum, glabrum. *Legumen* lineare, rectum, compressum, isthmis interceptum: *seminibus* compressis, sub-orbiculatis.

Habitat in ſylvis montanis Cochinchinæ.

Observ. Hæc species duabus proximè antecedentibus affinis est, imprimis radice tuberofâ, leguminibus linearibus isthmis interceptis, sty-

stylis, stigmatibusque non pubescentibus. Si Linnæus binas priores species Dolicho non adjudicasset, aliter de omnibus tribus sentirem: quod indubius decernere non possum, quia nec satis memini, nec in adversariis meis notatum invenio, an in his plantis inveniantur calli illi vexillares, qui Dolichi characterem determinant.

Sp. 12. DOLICHOS BIBLORUS. α Sān cū.

Differ. spec. Dol. *Caule* perenni, lævi: *pedunculis* bifloris: *leguminibus* erectis. Lin. sp. 25.

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, suffruticosus, sesquipedalis, erectus, ramosus, pilosus. *Radix* tuber ovatum, fuscum. *Folia* liniari-lanceolata, integerima, venosa, utrinque pubescentia, sub-fessilia. *Flos* luteus, axillaris, pedunculis 2-floris, erectis: stipulis binis lateralibus, subulatis, longis. *Corolla* vexillum callis duobus oblongis, parallelis ad basim alas prementibus. *Legumen* hirsutum, coriaceum, inflatum, 2-spermum.

Habitat agrestis prope Cantonem Sinarum.

Burm. Ind. pag. 161. *Phaseolus vulgaris*, Lablab effigie, flore parvo, ochroleuco, siliquis falcatis, gemellis. Pluk. Almag. pag. 291. tab. 213. fig. 4.

Sp. 13. DOLICHOS SOIA. α Dāu nanh. β Hoām tēu.

Differ. spec. Dol. *Caule* erecto, flexuoso: *racemis* axillaribus erectis: *leguminibus* pendulis, hispidis, sub-dispermis. Lin. sp. 23.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, sesquipedalis, erectus, teres, pilosus, sub-rectus, simplex, ramis ascendentibus. *Radix* indivisa, radiculis tuberculosis. *Folia* 3-nata, ovata, sub-acuminata, pilosa, petiolis longis. *Flos* violaceus, axillaris, racemis simplicibus, erectis: *leguminibus* hirsutis, pendulis. *Calyx* tubulosus, 5-fidus, laciinis acutis, binis superioribus brevioribus. *Corolla* vexillum sub-ovatum, emarginatum, connivens. *Alæ* oblongæ, vexillo breviores, unguibus longis, filiformibus. *Carina* 2-phylla, lato-falcata, unguiculata, minima. *Filamenta* 10, Diadelpha, quorum 9 brevissima, vaginæ longæ, sub-curvæ connata. *Antberæ* sub-rotundæ. *Germen* oblongum, hirsutum. *Stylus* æqualis staminibus. *Stigma* crassiusculum, glabrum. *Legumen* rectum, sub-compressum, torulosum, hispidum, pendulum: *semilibus* ovatis, lævibus, pallidis, tribus circiter. *Corolla* parvula, vix calycem superans, callis binis oblongis, ex basi vexilli prodeuntibus, alas premit. Est varietas flore albo, & purpureo distincta, pedunculis brevioribus. Est alia semilibus nigris.

Habitat in Cochinchinâ, & in Chinâ frequenter cultus.

Thunb. Japon. pag. 282. *Phaseolus erectus*, Daidsu. Käempf. Amæn. pag. 837. fig. 838. Cadelium. Rumph. l. 9. c. 31. fig. 140. Ubi

notandum hanc plantam herbarii Amboinensis a Linnæo citari pro Phaseolo Maximo, cum tam descriptio, quam figura, & usus ad hanc speciem Dolichi Soia omnino pertineant, post-habito tantummodo colore floris, qui in diversis locis non semper idem.

Usus. Hæc semina elixa, aut leviter tosta tam stomacho, quam palato accepta sunt. Ex illis fit celebris muria Japoniensis, Soia dicta, quâ Chinenses, & Cochinchinenses frequenter utuntur ad conditios cibos, & appetitum excitandum. Fit etiam pulmentum candidum, lactis coagulati simile, Sinensibus dictum Téu bú, vel Táu bú, quo nullus cibus est illis familiarior: & quamvis ex se insipidum, propriis condimentis adhibitis, dat ferculum nec injundum, nec insalubre.

Sp. 14. DOLICHOS CATIANG.

Differ. spec. Dol. Caule erecto: leguminibus geminis, linearibus, erectiusculis. Lin. sp. 24.

Hab., & notæ. Caulis annuus, sesquipedalis, erectus, sub-teres, scaber, ramosus. Folia 3-nata, lato-lanceolata, glabra, petiolo communi longo: stipulis lanceolatis, minutis. Flos sub-terminalis, pedunculo longissimo, 2-3-floro. Corollæ vexillum ovatum, patens, callis binis ad basim alas prementibus. Stamina Diadelpha. Stylus a medio ad apicem superius villosus: stigmate simplici. Legumen lineare, 4-pollices longum, sub-teres, tenue, glabrum, sub-rectum: seminibus oblongo-ovatis, sub-compressis, hilo discolor.

Varietas 1. α Dáu den. β Hé téu. Flore violaceo: semine nigerrimo.

2. α Dáu bac. β Mié téu. Flore luteo: semine pallido.

3. α Dáu deá. β Sião húm téu. Flore purpurascente: semine rufo.

Habitant in agris culti in Cochinchinâ, & Chinâ.

Burm. Ind. pag. 161. Phaseolus minor. Rumph. Amb. I. 9. c. 29. tab. 139. fig. 1.

Usus. Omnes istæ varietates sunt vulgaris cibus in Indiâ. Virtutem Medicam, quam indigenæ illis attribuunt, satis probatam non habeo, nec judico.

Sp. 15. DOLICHOS HASTATUS. γ . . .

Differ. spec. Dol. Caule procumbente: foliis sub-hastatis: pedunculis polyfloris, erectis.

Hab., & notæ. Caulis annuus, procumbens, longus, teres, ramosus. Folia sub-hastata, 3-nervia, glabra, 3-nata. Flos luteus, axillaris, pedunculis polyfloris, longis, striatis, erectis. Corollæ vexillum patens, callis binis alas comprimentibus. Legumen lineare, rectum, sub-teres: seminibus ovatis, pallidis, esculentis.

Habitat cultus in orâ Africæ Orientali.

GENUS XIV. PISUM.

Char. Gener. *Stylus triangularis*, supra carinatus, pubescens. *Caly-*
cis laciniæ superiores 2 breviores. Lin. sy. pl. G. 944.

Sp. 1. PISUM SATIVUM. a Đậu tòn. g
 Differ. spec. Pis. *petiolis* teretibus : *stipulis* infernè rotundatis, cre-

natis : *pedunculis* multifloris. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, ramosus, albicans, gla-

ber, scandens, cirrhis terminalibus. *Folia* abruptè pinnata, sub-bi-

juga : foliolis ovalibus, glabris, petiolis teretibus : *stipulis* cauli-

nis, perfoliatis, magnis, rotundatis, crenatis. *Flos* albus, lateralis

pedunculis paucifloris, longis. *Legumen* bi-pollicare, rectum, sub-

teres, glabrum : *seminibus* globosis, subfusnis, edulibus.

Habitat in Chinâ, & Cochinchinâ, non frequens, nec fortasse indi-

gena.

Thunb. Japon. pag. 283. Hill. Brit. herb. pag. 279. tab. 40. fig. 2.

GENUS XV. VICIA.

Char. Gener. *Stigma latere inferiore transversè barbatum*. Lin. sy. pl.
 G. 947.

Sp. 1. VICIA FABA. g. Sâm têu. a Tam đậu.

Differ. spec. Vic. *caule* erecto : *petiolis* absque cirrhis Lin. sp. 18.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, erectus, 2-pedalis, crassus, angula-

tus, ramosus. *Folia* impari-pinnata, sub-trijuga, foliolis ovato-ob-

longis, tomentosis : cirrhis nullis. *Flos* axillaris, polynatus, albus,

maculâ nigrâ distinctus. *Legumen* crassum, sub-teres, rectum,

acuminatum, tomentosum, polyspermum : *seminibus* ovatis, com-

pressis, magnis, edulibus.

Habitat culta in Chinâ, raro in Cochinchinâ.

Thunb. Japon. pag. 284. Faba vulgaris, fructu minore. Hill. Brit.

herb. pag. 286. tab. 41. fig. 6.

GENUS XVI. PSORALEA.

Char. Gener. *Calyx punctis callosis adspersus*, longitudine *leguminis*

1-spermi. Lin. sy. pl. G. 967.

† Sp. 1. PSORALEA SCUTELLATA. a Cây Nenh hoa tím.

Differ. spec. Psor. *arborea*, *foliis* pinnatis : *calycibus* scutellatis : spi-

cis congestis.

Hab.

Hab., & notæ. *Arbor* magna, ramis longis, reclinatis. *Folia* impari-pinnata, multi-juga: *foliolis* ovatis, acuminatis, integerimis, glabris, costis multis obliquis, parallelis. *Flos* violaceus, spicis congestis, sub-terminalibus. *Calyx* scutellæformis, truncatus, brevis, crassus, excrescentiis albis, glandulosis conspersus. *Corolla* papilonacea, vexillo sub-rotundo, patente: *alis*, & *carinâ* brevioribus. *Stamina* 10, Diadelpha. *Legumen* breve, compressum, acuminatum, 1-2-spermum.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

† Sp. 2. PSORALEA RUBESCENS. α Nenh hoa do.

Differ. spec. *Pfor. arborea*, *foliis* pinnatis: *pedunculis* polyfloris, lateralibus: *calycibus* sub-truncatis, biglandulosis.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, ramis patentibus. *Folia* pinnata, oblongo-ovata. *Flos* lateralis, albo-ruber, pedunculis polyfloris. *Calyx* sub-truncatus, tuberculosus: glandulis binis, viscosis ad basim fuscultus. *Corolla* papilonacea. *Stamina* Diadelpha. *Legumen* compressum, acuminatum, 1-spermum.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

GENUS XVII. TRIFOLIUM.

Char. Gener. *Floræ* sub-capitati. *Legumen* vix calyce longius, non dehiscens, deciduum. Lin. sy. pl. G. 968.

Sp. 1. TRIFOLIUM MEL. INDICA. β Sam pa lim.

Differ. spec. Trif. *leguminibus* racemosis, nudis, monospermis: *caule* erecto. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, sesquipedalis, erectus, teres, ramis diffusis. *Folia* 3-nata, ovata, integerima. *Flos* purpureus, terminalis, racemis brevibus. *Legumen* lanceolato-ovatum, compressum, 1-spermum, nudum.

Habitat in agris Cantonensiibus.

Burm. Ind. pag. 172.

Sp. 2. TRIFOLIUM GLOBOSUM. β Tsin li quong.

Differ. spec. Trif. *capitulis* villosis, globosis: *calycibus* superioribus flosculo destitutis. Lin. sp. 16.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, sesquipedalis, sub-erectus, ramosus.

Folia 3-nata, oblonga. *Flos* pallidus, axillaris, & terminalis: capitulo globo, villis albis plurimis circumdato, *calycibus* superioribus apetalis, nec fertilibus. *Legumina* ovata, 1-sperma.

Habitat in agris prope Cantonem Sinarum.

Tri-

Trifolium Orientale, capitulo lanuginoso. Tournef. Cor. 27.

† Sp. 3. TRIFOLIUM CUSPIDATUM. & Cây chia ba.

Differ. spec. Trif. *pedunculis* sub-capitatis: *leguminibus* 1-spermis
nudis: *foliolis* linearibus, cuspidatis.

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, suffruticosus, 4-pedalis, hirsutus, erectus, ramis ascendentibus. *Folia* 3-nata, linearia, integerrima, cuspide acutâ apici rotundato accrescente. *Flos* albus, lateralis, *pedunculis* paucifloris, sub-capitatis: *calycibus* pilosis: *corollæ vexillo* ovato, maculâ purpureâ distincto. *Legumen* nudum, monospermum.
Habitat agreste in Cochinchinâ.

† Sp. 4. TRIFOLIUM VOLUBILE. γ...

Differ. spec. Trif. *pedunculis* polyfloris, axillaribus: *leguminibus* bispermis, nudis: *caule* volubili.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, tenuis, teres, longus, procumbens, sœpe volubilis. *Folia* 3-nata, sub-rotunda, integerrima, tomentosa. *Flos* luteus, axillaris, *pedunculis* polyfloris. *Legumen* oblongum, acutum, nudum, glabrum, 2-spermum.

Habitat ad litora Africæ Orientalis.

GENUS XVII. GLYCYRRHIZA.

Char. Gener. *Cal.* bilabiatus: $\frac{1}{2}$. *Legumen* ovatum, compressum. Lin.
sy. pl. G. 955.

Sp. 1. GLYCYRRHIZA ECHINATA. & Fu chau can tsao. & Cám thao.

Differ. spec. Glyc. *leguminibus* echinatis: *foliis* stipulatis, *foliolis* impari sessili. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, 5-pedalis, erectus, teres, glaber, inermis, pallidè virens: *ramis* multis patentibus: *radice* longissimâ, tereti, repente, intus luteâ, succosâ, foris fusco-rufâ, sapore dulci. *Folia* impari-pinnata, sub-quadriflora: *foliolis* lanceolato-ovatis, integerrimis, impari sessili: stipulis subulatis. *Flos* purpurascens, axillaris, spicis capitatis, sub-rotundis: *pedunculo* communi longo, erecto. *Calyx* bilabiatus, labio inferiore linearis, indiviso. *Corolla* papilonacea, *vexillo* acuto: *alis*, & *carinâ* brevioribus. *Stamina* Diadelphia. *Legumen* oblongum, compressum, echinato-scabrum: *semibus* reniformibus, fuscis, paucis.

Habitat in provinciis Borealibus imperii Chinensis.

Glycyrrhiza capite echinato. Bauh. Pin. pag. 352. n. 1. Glycyrrhiza
siliquis conglobatis, echinatis. Hill. Brit. herb. pag. 288. tab. 41.
fig. 8.

Sp. 2. GLYCYRRHIZA GLABRA. & Fân châu cân tsào. & Cam thao.
Differ. spec. Glyc. *leguminibus* glabris: *stipulis* nullis: *foliolis* impa-
ri petiolato. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, 4-pedalis, erectus, teres, glaber,
parum ramosus: radice longâ, tereti, luteâ: dulci. *Folia* lanceola-
to-ovata, pinnata, cum impari petiolato: stipulis nullis. *Flos* albo-
purpleus lateralis, spicis oblongis, pedunculo communi longo,
erecto. *Legumen* oblongum, lâve, compressum: seminibus paucis.
Habitat agrestis, cultaque in variis locis imperii Chinensis.
Glyzyrrhiza siliquosa, vel Germanica. Bauh. Pin. pag. 352. n. 1. *Gly-
cyrrhiza vulgaris*, siliquis glabris. Hill. Brit. herb. pag. 287. tab. 41.
fig. 7.

Virtus: radicis utriusque speciei. Edulcorans, Pectoralis. Valet in Tu-
ssi, Asthmate, Rheumatismo, Stranguriâ. Faicum asperitatem, si-
tim, & famem mitigant pastilli ex *Glycyrrhizæ*, & argillæ albæ
(indigenis dictæ Hoât thach) æqualibus partibus confecti, quos dum
itinerantes ore volvunt, contra illa incommoda levamen sentiunt.

GENUS XIX. Æ SCHYNOMENE.

Char. Gener. *Cal.* bilabiatus. *Legumen* articulis truncatis, monosper-
mis. Lin. sy. pl. G. 960.

† Sp. 1. Æ SCHYNOMENE HETEROPHYLLA. & Cây bot mûoi.
Differ. spec. Æsch. *caule* fruticoso: *foliis* inferioribus 3-natis, ovatis:
superioribus pinnatis, sub-rotundis.

Hab., & notæ. *Caulis* arboreus, debilis, 8-pedalis: *ramis* patentibus,
tomentosis. *Folia* inferiora 3-nata, ovata, petiolata: superio-
ra impari-pinnata, foliolis sub-rotundis, sessilibus. *Flos* albus, par-
vus, axillaris, pedunculis polyfloris. *Calyx* 4-dentatus. *Corollæ* pa-
pilonaceæ *carina* ovata, alis longior, vexillo brevior. *Stamina* 10,
omnia in unum coalita. *Legumen* lineare, compressum, pilosum,
articulis multis truncatis, cordatis: feminibus reniformibus.

Habitat inculta in viâ Nhà hò Cochinchinæ Borealis.
Observ. Legumen, & Corolla ad Æschynomene pertinente: non ita
Calyx, & Stamina.

† Sp. 2. Æ SCHYNOMENE LAGENARIA. & Cây dien dien.
Differ. spec. Æsch. *herbacea*, *foliolis* obtusis, plurimi-jugis: *legumi-
nibus* muricatis.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 3-pedalis, erectus, crassus, teres,
spor-

spongiosus : *ramis* plurimis brevissimis, patentibus. *Folia* impari-pinnata, plurimi-juga : *foliolis* ovato-oblongis, obtusis, integrerimis, glabris, minusculis. *Flos* luteus, pedunculis lateralibus, polyfloris. *Calyx* bilabiatus : labio superiore obtuso, emarginato, refracto : inferiore 3-fido, laciniis acutis, sub-equalibus. *Corollæ* papilonaceæ *vexillum* ovatum, integrum, ascendens. *Aleu* oblongæ, vexillo breviores. *Carina* lunata, æqualis vexillo. *Filamenta* Diadelpha, filiformia, adnata vaginæ versus carinam fissæ. *Antheræ* ovatæ incumbentes. *Germen* lineare, compressum, rectum. *Stylus* subulatus, æqualis staminibus. *Stigma* simplex. *Pericarpium* Legumen longum, rectum, strictum, compressum, muricatum, articulatum, articulis truncatis, longiusculis, deciduis. *Semina* compressa, reniformia.

Habitat in paludibus, & locis cœnosijs, aquofisque in Cochinchinâ. Uſus. Caulis spongiosus, & facile cedens, ac elasticè resiliens commode aptatur ad obturandas lagenas, defectu ſuberis, quo regio illa caret.

Observ. Rarò accidit, ut vagina staminum versus carinam fissa inventiatur, cum potius versus vexillum findi soleat. Hoc tamen jam notaverat Linnæus in Bauhipiâ Divaricatâ, & Acuminatâ, licet contrarium ac in Papilonaceis fieri contingat. Gen. pl. ed. 6. pag. 205. n. 511, & sy. pl. vol. 2. pag. 248.

GENUS XX. HEDYSARUM.

Char. Gener. *Cor.* carina transversè obtusa. *Legumen* articulis monofermis. Lin. sy. pl. G. 961.

Sp. 1. HEDYSARUM RENIFORME. B. Ld. in tsao. Differ. spec. Hed. *foliis* simplicibus, reniformibus : *caule* tereti. Lin. sp. 6.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, sesquipedalis, ramosus, teres, tenuis, glaber, procumbens. *Folia* pauca, transversè ovata, sub-reniformia, integrerima, glabra, sparsa, solitaria, suprema ternata, petiolis longis, filiformibus. *Flos* violaceus, spicis terminalibus, paucifloris. *Calyx* 5-fidus, pilosus, connivens. *Corollæ* *vexillum* latum, obtusissimum. *Legumen* tenue, articulis 6, refracto-plicatis, laevibus, 1-spermis.

Habitat suburbia Cantonis Sinarum.

Burm. Ind. pag. 164. tab. 52. fig. 1.

† Sp. 2. HEDYSARUM VESPERTILIONIS. a Cây hò diep.

Differ. spec. Hed. *foliis* simplicibus, lunatis : lobis retrofalcatis : *ra-*
Ll. ii *cemo*

cemo terminali : *leguminibus* retrofractis , in calyce inflato inclusis. Lin. Jun. suppl. pl. pag. 331.

Hab. , & notæ. *Caulis* annuus , 4-pedalis , erectus , rectissimus , sub-simplicissimus , teres , ad apicem quadragonus , fulcatus , subtiliter hispidus , saepe uno , vel duobus ramulis , brevibus , erectis. *Folia* sub-lunata , 4 lineas longa , 2 pollices lata , in formam arcus sagittarii curvata , apice retusa , 3-nervia , reticulato-venosa , glabra , luteo , rubro , & viridi versicolora : *petiolis* longis , rectis , gracilibus , trifariam alternis : *stipulis* binis , acutis , minutis. *Flos* albus , spicâ simplici , longâ , erectâ , terminali. *Calyx* 5-fidus , pilosus : lacinias tribus inferioribus sub-longioribus , omnibus acuminatis , dorso carinatis , persistentibus. *Corollæ* papilionaceæ vexillum lato-cordatum , connivens , calyce paulo longius : *alæ* oblongæ , incurvæ , vexillo breviores : *carina* media longitudine inter alas , & vexillum. *Filamenta* Diadelpha , simplicia , & novem-fida , corollâ breviora : *antheris* simplicibus , sub-rotundis. *Germen* filiforme , flexuosum. *Stylus* subulatus , crassus , brevis : *stigmate* crassiusculo. *Pericarpium* Legumen lineare , glabrum , tenue , articulatum : articulis sub-lenticularibus , filo dorsali connexis , in maturiscentiâ hinc , inde plicatis , intra calycem inflatum , apice conniventem retractis. *Semina* sub-reniformia , compressa , brevia , fusca , laevia. *Folia* ad apicem caulis saepe heterophylla observantur , minuscula , inæquilater , & obtuse trigona , ibique aliquando ternata.

Habitat in Cochinchinâ , a Siamesi regno oriundum. Colitur ob pulchritudinem ; nam , lenni aurâ afflante , commota folia totidem versicolores papilioles volitantes repræsentant. Hæc planta cum aliis jam anno 1774 per me missa fuerat in Sueciam , & Angliam.

Sp. 3. HEDYSARUM GANGETICUM. β Tsung loung thu.

Differ. spec. Hed. *foliis* simplicibus , ovatis , acutis , stipulatis. Lin. sp. 8.

Hab. , & notæ. *Caulis* suffruticosns , 3-pedalis , cespitosus , diffusus , stipulatus , teres , pilosus. *Folia* ovato-lanceolata , simplicia , integririma , utrinque pilosa , alterna. *Flos* spicis terminalibus , longis.

Corollæ vexillum , & *carina* lutea : *alæ* violaceæ. *Legumen* articulatum , arcuatum , ad singulos articulos ex parte convexâ emarginatum.

Habitat agreste in suburbis Cantoniensibus.

Hedysarum monophyllum , latifolium , siliculis plurimis spicâ longâ digestis. Burm. Zeyl. pag. 113. tab. 49. fig. 2. Phaseolus Montanus. Rumph. Amb. I. II. c. 36. tab. 66.

Sp. 4. HEDYSARUM TRIQUETRUM. α Cay Do dot.

Differ. spec. Hed. *foliis* simplicibus , cordato-oblongis : *petiolis* alatis : *ramis* triquetris. Lin. sp. 12.

Hab. ,

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, fruticosus, procumbens, multiplex, 3-pedalis: *ramis* triquetris. *Folia* oblonga, acuta, lateribus reticulineis, sub-parallelis: *petiolis* alatis, alternis. *Flos* purpureus, spicis sub-terminalibus. *Corollæ vexillum* sub-rotundum. *Legumen* compressum, rectum, lineare, articulatum, pilosum.

Habita in Collibus Son coung in Cochinchinâ.

Burm. Ind. pag. 165. tab. 52. fig. 2. *Onobrychis Zeylanica*, monophyllos, caule triangulo, petiolis foliorum alatis. Burm. Zeyl. pag. 176. tab. 81. *Phaseolus Montanus sextus*. Rumph. Amb. I. II. cap. 36. pag. 146.

Observ. In nostrâ plantâ folia non habent margines rotundatos, nec petiolas refractos, sicut in *Zeylanica*: gaudet autem similiter stipulis lanceolatis, & caule ad verticem rubescente.

Sp. 5. HEDYSARUM DIPHYLLUM.

Differ spec. Hed. *foliis* binatis, petiolatis: *bracteis* geminis ovatis, acutis, sessilibus. Lin. sp. 14.

Hab., & notæ. *Radix* sub-fusiformis, magna. *Caulis* herbaceus, teres, tenuis, multiplex, 8-pollicaris, diffusus. *Folia* ovata, apice acuta, binata, glabra, parva: petiolo communi longo: stipulis geminis, acutis. *Flos* luteus, axillaris, solitarius: *calyce* bilabiato, colorato, ciliato. *Legumen* hispidum, rectum: articulis paucis, lentiformibus.

Habitat agreste prope Cantonem Sinarum.

Burm. Ind. pag. 165. *Hedysarum bifolium*, foliolis ovatis, siliulis asperis geminis. Burm. Zeyl. pag. 114. tab. 50. fig. 1.

Sp. 6. HEDYSARUM PULCHELLUM.

A pho sien.
Differ. spec. Hed. *foliis* ternatis: *bracteis* geminis, conjugatis, orbiculatis, lineatis. Lin. sy. pl. sp. 15.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, erectus, 3-pedalis, teres, glaber, *ramis* multis, obliquis. *Folia* lato-lanceolata, integerrima, glabra, ternata, foliolo medio triplo maiore. *Flos* luteus, spicis longis, rectis, terminalibus: *bracteis* orbiculatis, lineatis, conjugatis flores ternos occulentibus. *Legumen* planum, rectum, acuminatum, articulatum, 2-pernum, eisdem bracteis assurgentibus defensum.

Habitat incultum prope Cantonem Sinarum.

Onobrychis Indica 3-phyllos; foliis amplis mucronatis, siliquis parvis in spicam longam ex alis inter bina foliola circinata arctè convenientia reconditis. Pluk. Amalt. pag. 161. tab. 433. fig. 7. *Hedysarum trifoliatum frutescens*, flore, ac fructu inter duo foliola rotunda absconditis. Burm. Zeyl. pag. 116. tab. 52. Figura ista est optima, quamvis aliquantulum discrepet a Sinensi plantâ numero florum, & seminum.

† Sp. 7.

† Sp. 7. HEDYSARUM ELEGANS. β Háp chiong tsão.

Differ. spec. Hed. *foliis ternatis, obtusis, utrinque tomentosis: bracteis conjugatis, ovatis: leguminibus arcuatis.*

Hab., & notæ. *Caulis suffruticosus, erectus, 3-pedalis, ramosus. Folia ternata, ovata, obtusa, utrinque tomentosa, obliquè nervosa. Flos luteus congestus, bracteis geminis, ovatis, conjugatis, linearis, pilosis in spicas subterminales, erectas dispositis. Legumina curva, pilosa, articulata, 3-sperma, erecta.*

Habitat incultum prope Cantonem Sinarum.

Observ. Hæc species primo aspectu non multum differt a præcedente: differt tamen *foliis obtusis, pilosis, bracteis ovatis, formâ curvâ leguminis, & maiori numero florum, & seminum: quod varietati tribui nequit, maximè cum ambas examinaverim eodem tempore, & in eodem solo agresti natus.*

Sp. 8. HEDYSARUM TRIFLORUM. β Sié thòi tsão.

Differ. spec. Hed. *foliis ternatis obcordatis: caulis procumbentibus: pedunculis unifloris, ternis. Lin. sp. 35.*

Hab., & notæ. *Caulis annuus, teres, brevis, cespitosus, procumbens. Folia ternata, obversè cordata, glabra, parva, petiolata.*

Flos albus, pedunculis monofloris, congestis, axillaribus. Legumina arcuata, articulata, polysperma, compressa.

Habitat agreste prope Cantonem Sinarum.

Burm. Ind. pag. 167. *Hedysarum trifoliatum, repens, Acetosellæ folio glabro, caule hirsuto, siliquâ planâ, articulatâ. Burm. Zeyl. pag. 119. tab. 54. fig. 2.*

Sp. 9. HEDYSARIUM LAGOPODIOIDES. β Thii fum tsão.

Differ. spec. Hed. *foliis ternatis: racemis oblongis: legumiibus inflexis: calycibus hirsutis. Lin. sp. 37.*

Hab., & notæ. *Caulis suffruticosus, erectus, 2-pedalis, teres, hispidus: ramis diffusis. Folia 3-5-nata, ovato-lanceolata, glabra, petiolata: Stipulis lanceolatis, minutis. Flos obscuro-purpureus, spicis oblongis, densis, hirsutissimis, terminalibus: bracteis subrotundis, acuminatis, 2-floris, deciduis: pedunculis 1-floris, longis, inflexis, hirsutis. Calyx 5-fidus, laciniis longè acuminatis, conniventibus: pilis multis, longis corollam occultantibus. Legumen lineare, coloratum, articulatum: articulis retracto-plicatis: seminibus compressis, reniformibus, fuscis, laevibus, minusculis.*

Habitat incultum circa Cantonem Sinarum.

Burm. Ind. pag. 168. tab. 53. fig. 2. Quæ tamen figura non fatis convenit cum nostrâ observatione tam numero, quam formâ foliorum.

Sp. 10.

Sp. 10. HEDYSARUM CRINITUM. *Cây Day mảng*
 Differ. spec. Hed. *foliis pinnatis : racemis longis : leguminibus inflexis*: *caule fruticoso*. Lin. sp. 52.
 Hab., & notæ. *Caulis 5-pedalis*, erectus, fruticosus, teres, tomentosus, multiplex: *ramis diffusis*. *Folia impari-pinnata*, sub-trijuga: *foliolis lanceolatis*, 4-pollicaribus, integrerimis, glabris, venosis. *Flos violaceus*, *spicā densa*, tereti, 1-pedali, recta, terminali: *bracteis lanceolatis*, longè acuminatis, ciliatis, 2-floris: *pedunculis longis*, pilosis, inflexis. *Foliorum stipulæ lanceolatæ*, minimæ. *Calyx 5-partitus*, pilosissimus, lacinias subulatis, patentibus. *Corolla papilionacea*: *vexillo sub-rotundo*, integro, connivente, *alio brevioribus*, oblongis: *carinâ lunata*, longitudine mediâ inter vexillum, & alas. *Filamenta Diadelpha*, brevia: *antheris ovatis*, stantibus. *Gerumen lineare*, flexuosum. *Stylus subulatus*, ascendens: *stigmate obtuso*. *Legumen longum*, tenne, articulatum; articulis 7 circiter, subrotundis, filo dorsali connexis, intra calycem refracto-plicatis, pedunculo communi appressis, pedicellis propriis arcuato-inflexis.

Habitat in collibus agrestibus Conchingchinæ. Burm. Ind. pag. 169. tab. 56.
 Observ. Hæc, & præcedens planta, quamvis in multis differant, non multum differunt. Observavi utramque recentem in natali solo: hanc scilicet in Cochinchinâ foliis semper pinnatis, 12-3-jugis, rarissime ternatis: illam vero in Chinâ foliis promiscue ternatis, & quinatis: nec in aliis notis maior, & constantior differentia.

Sp. 11. HEDYSARUM ALPINUM. *Cây nhút*
 Differ. spec. Hed. *foliis pinnatis : leguminibus articulatis*, glabris, pendulis: *caule erecto*. Lin. sp. 40.
 Hab., & notæ. *Caulis suffruticosus*, 4-pedalist, erectus, teres, simplex, ramosus. *Folia impari-pinnata*, multijuga: *foliolis oblongis*, obtusis, stipulatis. *Flos luteus*, racemis parvis, erectis. *Legumen lineare*, rectum, tenui, glabrum, articulatum, longum, pendulum: *seminibus sub-reniformibus*, multis.

Habitat agreste in Cochinchinâ.

Gmel. Sibir. v. 4. pag. 26. n. 35. tab. 10. *Hedysarum saxatile*, siliqua laevi. Amman Ruthen. pag. 116. n. 152. 153.

Sp. 12. HEDYSARUM VIRGINICUM. *Cây muòng*
 Differ. spec. Hed. *foliis pinnatis : caule fruticoso : leguminibus articulatis*, glabris, pedunculatis, erectis. Lin. sp. 46.
 Hab., & notæ. *Caulis fruticosus*, erectus, 3-pedalis: *ramis ascendentibus*. *Folia impari-pinnata*: *foliolis oblongis*, obtusis, parvis, mul-

multis. *Flos* violaceus, spicis terminalibus. *Legumen* tenui, articulatum, glabrum, peduncularum, erectum: *seminibus* sub-rotundis, compressis. *Habitat* in agris Cochinchinæ ad portum Turanum, vulgo *Hàn*. *Gronov.* Virgin. 174.

- † Sp. 13. HEDYSARUM LINEARE. & Cây Ve ve cái.
Differ. sper. Hed. foliis pinnatis, foliolis lanceolato-linearibus: spicis terminalibus: leguminibus rectis, laevibus: caule diffuso.
Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 2-pedalis, diffusus, ramosus. *Folia* impari-pinnata, foliolis lanceolato-linearibus, glabris. *Flos* obscuro-violaceus, parvus, spicis erectis, terminalibus. *Legumen* lineare, rectum, laxe, acuminatum, 6-spermum.
Habitat incultum in Cochinchinâ.
Virtus: radicis. Deobstruens, Emennagoga, Cibi appetentiam excitans.

GENUS XXI. CORONILLA.

- Char. Gener. *Cal.* bilabiatus: dentibus superioribus connatis. *Vexillum* vix alis longius. *Legumen* isthmis interceptum Lin. sy. pl. G. 956.
† Sp. 1. CORONILLA COCHINCHINENSIS. & Dâu Chi.
Differ. spec. Cor. suffruticosa: foliolis sub-15 jugis: pedunculis sub-trifloris: leguminibus erectis, torulosis.
Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 4-pedalis, erectus ramosus. *Folia* pinnata, 15-juga, foliolis oblongis, obtusis, cuspidate tenui. *Flos* luteus, axillaris, pedunculis sub-trifloris. *Calyx* 5-dentatus, brevis, dentibus sub-æqualibus. *Corollæ vexillum* alis sub-longius. *Legumen* erectum, rectum, filiforme, longum, torulosum, istmis interceptum. *Semina* multa, sub-cylindrica.
Habitat agrestis in Cochinchinâ.

GENUS XXII. ORNITHOPUS.

Char. Gener. *Legumen* articulatum, teres, arcuatum. Lin. sy. pl. G. 957.

- † Sp. 1. ORNITHOPUS RUBER. & Cây Ve ve duc.
Differ. spec. Orn. foliis alternis, ovatis, ciliatis: leguminibus compressis, scabris: spicis terminalibus.
Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 2-pedalis: ramis multis, sub-erectis, rubris. *Folia* ovata, alterna, ciliata, petiolata, pauca. *Flos* pallidus, papilonaceus, spicis terminalibus. *Legumen* arcuatum, compref-

compressum, scabrum, articulatum, ex parte convexâ sinuatum, polyspermum: *seminibus* sub-rotundis.

Habitat Agrestis in Cochinchinâ.

Observ. Accedit ad Orn. Compressum: (Lin. sp. 2.) recedit foliis alternis, flore spicato. Cumque ab Hedysaro non abhorreat, eò transferetur, si liber.

GENUS XXIII. HIPPOCREPIS.

Char. Gener. *Legumen* compressum: alterâ futurâ pluries emarginatum; curvum. Lin. sy. pl. G. 958.

† Sp. I. HIPPOCREPIS BARBATA. *a* Cây Xuồng ngực.

Differ. spec. Hip. *leguminibus* rectis: *spicâ* oblongâ, terminali.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 4-pedalis, erectus, teres. *Folia* ovata, integerrima, glabra, ternata, medio maiore. *Flos* purpureus, terminalis, papilonaceus, in spicam oblongam, densam crescens. *Legumen* pedunculatum, erectum, rectum, planum, barbatum, futurâ exteriore pluries, & profundè emarginatâ: *seminibus* quadrato-reniformibus, parvis, compressis.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

GENUS XXIV. MEDICAGO.

Char. Gener. *Legumen* compressum, cochleatum. *Carina* a vexillo deflectens. Lin. sy. pl. G. 971.

Sp. I. MEDICAGO POLYMORPHA. *a* Cỏ áo nho cây.

Differ. spec. Med. *leguminibus* cochleatis: *stipulis* dentatis: *caule* diffuso. Lin. sp. 9.

Hab., & notæ. *Caulis* sub-erectus, diffusus, 2-pedalis. *Folia* obtusa, glabra. *Flos* luteus, pedunculis 1-floris solitariis. *Legumen* in orbem volutum, compresso-planum, sub-articulatum, inerme, glabrum, luteo-fuscum.

Habitat in agris Cochinchinæ.

Thunb. Jap. pag. 291. *Medica Orbiculata*. Bauh. hist. 2. pag. 384.

† GENUS XXV. DIPLACIA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 5-fidum, gibbum, persistens: laciniis acutis, inferiore longiore: *stipulis* binis lanceolatis, curvis suffultum.

Minn

Corol.

Corol. Papilionacea. Vexillum trigono-rotundum, emarginatum, ascendens. Alae ovatae, vexillo breviores. Carina 2-phylla, lunata, vexillo æqualis: unguibus longis filiformibus.

Stam. Filamenta 10, æquale numero insistentia laminis duabus, oblongis planis, erectis, vaginæ locum tenentibus. Antheræ oblongæ, incumbentes.

Pist. Germina 2, oblonga, compressa, recta. Styli singuli subulati, longiores staminibus. Stigmata crassissima.

Peric. Legumina 2, compressa, recta, acuminata, articulata: articulis ovatis, striatis, glabris, inæqualibus.

Sem. Ovata, compressa.

Nom. (Δ is binis: Φακη legumen) a dupli legumine ex singulo flore prodeunte.

Char. Gener. Legumina 2. Vagina staminum duplex.

† Sp. 1. DIPHACA COCHINCHINENSIS. a Kim phung. g...

Differ. spec. Diph. foliis pinnatis: floribus geminis.

Hab. Caulis arboreus, 8-pedalis: cortice inæquali, fusco, inermi: ramis patentibus. Folia impari-pinnata, sub-septemjuga: foliolis ovatis, glabris, parvulis, subsessilibus, oppositis, alternisque. Flos pallidus, pedunculis 2-natis, 1-floris, axillaribus.

Habitat culta in hortis Cochinchinæ, & Chinæ.

Solulus arbor: Roraco. Rumph. Amb. l. 5. cap. 45. tab. 128.

Observ. Hanc plantam Hedyarum Ecastaphyllum vocaverat Linnaeus (Mantissæ 446): speciem Pterocarpi fecerat D. Bergius: Parkinson adscriperat Joannes Burmannus; si quidem, deficiente plenâ descriptione, proprium locum assignare non poterant. Licet Filamenta in duos fasciculos æquales connata jam antea Brownius notavisset.

GENUS XXVI. CLITORIA.

Char. Gener. Cor. supinata: vexillo maximo, patente, alas obumbrante. Lin. sy. pl. G. 943.

Sp. 1. CLITORIA TERNATEA. a Cây Dâu biếc.

Differ. spec. Clit. foliis pinnatis. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. Caulis fruticosus, volubilis, teres, tenuis, longus, ramosus. Folia impari-pinnata, 2-3-juga: foliolis ovatis, sub-pubescentibus. Flos solitarius, lateralis, oppositifolius. Calyx 5-fidus, erectus. Corolla resupinata, cyanea, maculâ luteâ notata: vexillo ampio, expanso, alas, & carinam latè obtegente. Legumen longum, sub-compressum, rectum, acuminatum, polyspermum: seminibus reniformibus.

Habi-

Habitat agrestis, cultaque in Cochinchinâ.

Flos coeruleus. Rumph. Amb. l. 7. cap. 30. tab. 31. Flos Clitorius; flore coeruleo. Burm. Zeyl. pag. 100.

Ufus. Succo hujus floris solent indigenæ tingere liba, aliaque edulis colore cyaneo, pulcherrimo quidem; sed breviter evanescente, ideoque ad imbuendas telas inepto.

GENUS XXVII. ROBINIA.

Char. Gener. Cal. 4-fidus. Legumen gibbum elongatum. Lin. sy. pl. G. 953.

† Sp. 1. ROBINIA MITIS. § Khū sēm. & Kho sām hoa vàng.

Differ. spec. Rob. racemis pedicellis ternis: foliis impari-pinnatis: caule inermi. Lin. sp. 4.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, 3-pedalis, erectus, inermis, ramosus. *Folia* impari-pinnata, ovato-lanceolata, glabra, læte viridia, sub-bijuga. *Flos* luteus, racemis terminalibus, brevibus, pedicellis ternis. *Legumen* oblongum, utrinque attenuatum, glabrum, polyspermum: *seminibus* reniformibus.

Habitat agrestis in Chinâ: raro in Cochinchinâ.

Burm. Ind. pag. 163. Pluken. Phyt. tab. 310. fig. 3.

† Sp. 2. ROBINIA AMARA. & khō sām hoa tiá. § Khū sēm.

Differ. spec. Rob. racemis elongatis, pedicellis ternis: foliis impari-pinnatis, sub-quinque-jugis: caule inermi.

Hab., & notæ. *Planta* fruticosa, 4-pedalis, tota inermis: ramis diffusis, fusco-rubentibus. *Folia* impari-pinnata, sub-quinque-juga: foliolis ovato-oblongis, superius fusco-virentibus, subtus alblicantibus. *Flos* violaceus, racemis erectis, longis, sub-terminalibus: pedicellis ternis. *Calyx* planiusculus, 4-dentatus. *Corollæ* vexillum sub-rotundum, patens: alæ oblongæ, rectæ: carina brevior, obtusa, monophylla. *Legumen* longum, sub-teres, rectum, acuminatum, glabrum: *seminibus* multis oblongo-reniformibus. *Radix* sub-carnosa, multiplex, luteo-fusca, amarissima.

Habitat inulta in Cochinchinâ, & Chinâ.

Virtus: radicis. Attenuans, Roborans, Exsiccans. Prodest in fluxu ventris diurno: stomachi debilitate: obstructionibus mesenteri, & uteri: humores crassos, & nimios compescit. Ejus virtutem non tantum in aliis, sed in me ipso efficaciter expertus. Ufus commodior in pilulis. Ad tollendum saporem, quem habet, nauseosum debet macerari in aceto, & leviter torri.

- † Sp. 3. ROBINIA FLAVA. & Hòam Khin. & Hùynh cám.
 Differ. spec. Rob. *pedunculis* ternis, 3-floris, terminalibus: *foliis* abruptè-pinnatis, sub-octojugis, *caule* inermi.
 Hab., & notæ. *Planta* fruticosa, 1-pedalis, inermis. *Folia* erecta, abruptè-pinnata, sub-octojuga: *foliolis* oblongis, sub-acutis, glabris, pallidè virentibus. *Flos* albus, terminalis, pedunculis ternis, erectis, trifloris. *Radix* simplex, lignosa, crassa, lutea, amara, cariosa. Plantam virentem non vidi.
 Habitat agrestis in provinciis Borealibus imperii Sinensis.
 Virtus: radicis. Pellens, Antifebrilis. Usus præcipuus in decocto.

† GENU S XXVIII. CITT A.

Descriptio Naturalis.

- Cal. Perianthium bilabiatum, gibbosum, coloratum, hispidum: labio superiore integro: inferiore 3-fido, laciniis subulatis, mediâ longiore.
 Cor. Papilonacea. Vexillum sub-rotundum, calyce duplo longius, ad basim gibboso-turgidum, superius patens, ascendens. Alæ oblongæ, acutæ, conniventes, vexillo longiores. Carina falcata, alis æqualis.
 Stam. Filamenta 10 (simplex, & 9-fidum) quorum 5 alterna crassiora, corollæ æqualia. Antheræ 5 oblongæ, 5 aliæ sub-rotundæ.
 Pist. Germen oblongum, pilosum. Stylus filiformis, longior staminibus.
Stigma sub-rotundum.
 Peric. Legumen ovato-oblongum, crassum, compressum, hispidum: cortice exterius diviso in cellulas sub-quadratas, obliquè formatas ex membranis verticalibus, ordinatis.
 Sem. 3, ovata, compressa, arillata, magna.
 Nom. (Κίττα pica) a flore turgido, maculis, albis, & nigris hanc avem repræsentante.

Char. Gener. Cal. & vexillum gibboso-turgida. Legum. exterius cellulosum, hispidum: seminibus arillatis.

- † Sp. 1. CITTA NIGRICANS. & Cây Boung mát.
 Differ. spec. Cit. caule fruticoso volubili: *foliis* ternatis, ovatis: *floribus* sub-umbellatis.
 Hab. Caulis fruticosus, teres, volubilis, digitum crassus, longus, ramosus, inermis. *Folia* 3-nata, ovata, acuminata, integerrima, venosa, glabra, petiolo communi longo, stipulis nullis. *Flos* axillaris,

laris, pedunculis polyfloris, sub-umbellatis : *calyx* fusco, *Corolla* nigra, maculâ albâ notata.

Habitat inter sepes in Cochinchinâ.

Lobus Litoralis. Rumph. Amb. l. 7. c. 6. tab. 6. *Lobus Cartilagineus.*

Cluf. Exot. l. 3. c. 9, & 10. Quamvis Auctores isti cellulas leguminis non exprimant, eandem esse plantam existimo.

GENUS XXIX. GLYCINE.

Char. Gener. *Cal.* bilabiatus. *Corollæ* carina apice vexillum reflectens.

Lin. sy. pl. G. 943.

Sp. I. GLYCINE SUBTERRANEA. γ Jugum.

Differ. spec. *Glyc. foliis ternatis, radicalibus : caulis prostratis, flexuosis : pedunculis bifloris.* Lin. sp. I.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, semipedalis, prostratus, multiplex, teres, flexuosus, radicans. *Folia* ternata, radicalia : *foliolis* lanceolatis, acutis, integerrimis, venosis, glabris : *petiolo* communi longo, erecto, propriis brevibus. *Flos* dilute flavus, radicalis, sparsus : *pedunculo* brevi, erecto, solitario, monofloro. *Corollæ* vexillum ob-ovatum, apice carinæ compellente, reflexum. *Germen* subrotundum, in matrescentiâ terram penetrans, ibique fructificans. *Legumen* sub-reniforme, bivalve, reticulatum, 1-spermum : valvis raro dehiscentibus. *Semen* lato-ovatum, nec compressum, luteum, edule.

Habitat prope Sofalam, & in variis locis Africæ Orientalis : unde semina per me delata in Lusitaniam flores, & fructus produxerunt duobus annis: tertio autem anno nova semina non germinarunt.

Mandibæ fructus ex oris Africæ translatus. Pis. Bras. pag. 256. *Mandibæ* de Angola. Marcgr. Bras. 43. *Arachis Africana*. Burm. Ind. Fl. Capens. pag. 22.

GENUS XXX. INDIGOFERA.

Char. Gener. *Cal.* patens. *Corollæ* carina utrinque calcari subulato, patulo. *Legumen* lineare. Lin. sy. pl. G. 962.

† Sp. I. INDIGOFERA COCCINEA. β Louc hâm tsão.

Differ. spec. Ind. *foliis ternatis, ovato oblongis : pedunculis polyfloris, axillaris : leguminibus teretibus, arcuatis.*

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, multiplex, sub-erectus, ramosus.

Folia ternata, ovato-oblonga, obtusa, pubescentia, parva. *Flos* coccineus, axillaris, pedunculis polyfloris. *Calyx* 5-fidus, marginatus.

ne superiore truncata, hians. *Corollæ* carina calcaribus binis, longis, reflexis. *Legumen* longum, teres, tenuer, arcuatum.

Habitat agrestis circa Cantonem Sinarum.

† Sp. 2. INDIGOFERA ROTUNDIFOLIA. β Ô tam sin.

Differ. spec. Ind. *foliis* ternatis, sub-rotundis, utrinque tomentosis: *racemis* brevibus, axillaribus: caule volubili.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, filiformis, volubilis, pilosus. *Folia* ternata, sub-rotunda, apice sub-acuta, utrinque tomentosa: stipulis subulatis. *Flos* luteus, racemis brevibus, axillaribus. *Corolle* carina calcaribus duobus, longis, subulatis, curvis. *Legumen* oblongum, planum, acuminatum, glabrum, bispermum.

Habitat agrestis circa Cantonem Sinarum.

Observ. Affinitatem habet cum Indigofera Procumbente, ex Cap. B. Spei. Linn. sp. 4.

† Sp. 3. INDIGOFERA BÜFALINA. α Đau tlâu.

Differ. spec. Ind. *foliis* ternatis, ovatis, glabris: *racemis* axillaribus: *leguminibus* crassis, villosis: caule scandente.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, scandens, teres, longus, glaber. *Folia* ternata, ovata, glabra. *Flos* albo-purpureus, racemis axillaribus, & terminalibus: pedunculo communi longo. *Carina* vexillum impellens dentibus binis callosis, supra basim exertis. *Calyx* bilabiatus, 5-fidus, patens. *Legumen* longum, rectum, crassum, villosum, sub-compressum: seminibus ovatis.

Habitat in dumetis Cochinchinæ.

Sp. 4. INDIGOFERA TINCTORIA. α Chàm sholá. β Lan tsão: tá cím.

Differ. spec. Ind. *foliis* pinnatis, obovatis: *racemis* brevibus: caule suffruticoso. Lin. sp. 12.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, erectus, simplex, 3-pedalis, rectus, teres, glaber, ramosus. *Folia* impari-pinnata, sub-septemjuga: foliolis ovatis, integerrimis, glabris, glaucis, brevi-petiolatis. *Flos* axillaris, racemis simplicibus, erectis, brevibus. *Calyx* planiusculus, leviter 5-fidus. *Corolle* vexillum oblongo-ovatum, ascendens, flavum. Alæ, & carina rubræ: hæc ad basim dente utrinque instructa. *Legumen* longum, tenuer, teres, sub-arcuatum, sub-torulosum, glabrum, pendulum: seminibus multis cylindricis.

Habitat spontanea, coliturque vastissime in Cochinchinâ, & Chinâ. Indicum. Rumph. Amb. I. 8. c. 39. tab. 80. Anil. Garc. Arom. I. 2. cap. 26. pag. 239. edit. Lat. Clus. Ubi notandum Garciam non errasse dicendo Indigoferam sive Anil Ocymo similem; siquidem caulis, & foliola ovata, oppositaque in utrâque plantâ aliquo modo con-

convenunt: nec de modo parandi Indicum in pastillos hæc similitudo intelligi debet, neque Garcias afferuit.
 Virtus: foliorum. Resolvens, Abstergens. Ex Indigoferâ istâ cum circumâ fit unguentum aptum ad resolvendas contusiones, & inflammations, abstergenda ulcera, & scabiem.
 Usus. Folia contusa, & in aquâ, paucâ admixtâ calce, macerata, resolvuntur in pigmentum, Indicum dictum, ad tingendum colore cyaneo, viridi, & purpureo usitatissimum in toto orbe.

† GENUS XXXI. GRONA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 4-fidum, persistens: laciniis sub-æqualibus, superiore emarginatâ.

Cor. Papilonacea. Vexillum obcordatum, sub-clausum. Alæ turbinatæ, obtusæ, vexillo breviores. Carina inflexo-concava, alæ utriusque infra medium coalita, subtus divaricata in cavernam hians.

Stam. Filamenta 10 (simplex, & 9-fidum) vaginæ ascendentî insiden-
tia. Antheræ sub-rotundæ, minimæ.

Pist. Germen lineare. Stylus filiformis, æqualis staminibus. Stigma sim-
plex.

Peric. Legumen lineare, rectum, compressum, acuminatum, hirsutum,
polyspermum.

Sem. Reniformia, compressa, minuta.

Nom. ($\Gamma\rho\omegaν$ caverna) ob carinam subtus cavernosam.

Char. Gener. Corolla carina alis utrinque coalita: *subtus in caver-
nam hians. Legumen lineare.*

† Sp. 1. GRONA REPENS. α Dau Lan Aug.

Differ. spec. Gron. *foliis* ovatis, alternis: *spicis* axillaribus: *caule* re-
pente.

Hab. *Caulis* suffruticosus, multiplex, prostratus, repens. *Folia* ova-
ta, integerrima, alterna, petiolata: *stipulis* binis subulatis. *Flos*
purpureus, *spicis* erectis, axillaribus, & terminalibus: *bracteis* acu-
minatis, 2-floris.

Habitat in collibus agrestibus Cochinchinæ.

† GENUS XXXII. RHYNCHOSIA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium bilabiatum : labio superiore lato, emarginato : in inferiore 3-fido, laciniâ media longiore.

Cor. Papilonacea. Vexillum ovatum, ascendens. Alæ oblongæ, vexillo breviores : unguibus filiformibus, appendiculatis. Carina monophylla, rhomboidea, rostro longo, acuto terminata.

Stam. Filamenta 10 (simplex, & 9-fidum) vaginæ longæ, ascendi-
ti insistentia, vexillo æqualia. Antheræ sub-rotundæ.

Pist. Germen oblongum, compressum. Stylus sub-æqualis staminibus.
Stigma simplex.

Peric. Legumen ovatum, compressum, membranaceum, sub-acumina-
tum, 2-spermum.

Sem. sub-ovata, compressa.

Nom. (ΡΥΝΧΩΣ rostrum) a carinâ floris rostratâ.

Char. Gener. *Carina* rhomboidea, rostrata. *Legumen* membranaceum,
2-spermum.

† Sp. 1. RHYNCHOSIA VOLUBILIS. β Chio tāu.

Differ. spec. Rhynch. foliis ternatis, sub-rotundis, tomentosis : pedun-
culis polyfloris, binnatis.

Hab. *Caulis* herbaceus, volubilis, teres. *Folia* ternata, sub-rotunda,
tomentosa. *Flos* luteus, pedunculis 2-natis, polyfloris, axillaribus.
Semina nigra, nitida.

Habitat inulta prope Cantonem Sinarum.

† GENUS XXXIII. MARCHANTHUS.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium 4-fidum, tubulosum, coloratum, tomentosum, per-
sistens : laciniis acutis, binis lateralibus brevioribus.

Cor. Papilonacea, longa, sub-clausa. Vexillum ovatum, emarginata-
tum, connivens, calyce longius. Alæ oblongæ, vexillo triplo lon-
giores, rectæ. Carina alis longior : apice acuto, ascendentæ.

Stam. Filamenta 10 (simplex, & 9-fidum) omnia liniari-turbinata,
acuminata, recta : horum 4 triplo crassiora reliquis. Antheræ cras-
siorum ovatæ, incumbentes : tenuiorum oblongæ, stantes.

Pist. Germen oblongum, teres. Stylus filiformis, totus pilosus, æqua-
lis

lis staminibus. Stigma obtusum, scabriuscum.
Peric. Legumen rectum, sub-teres, crassum, acuminatum, polyspermum.
Sem. Sub-ovata.

Nom. (*Mapnōs* longus) ex notabili floris longitudine.

Char. Gener. *Carina*, & alae longissimæ. Legum. crassum, sub-teres.

† Sp. 1. MARCANTHUS COCHINCHINENSIS. α Dâu mèo.
Differ. spec. Marc. foliis ternatis: *pedunculis* polyfloris axillaribus:
caule volubili.
Hab. *Caulis* herbaceus, longus, teres, volubilis, ramosus. *Folia* ter-
nata, ovato-rhombea, pilosa: *stipulis* filiformibus. *Flos* albus, ca-
lyce concolore: *pedunculis* polyfloris axillaribus. *Legumen* esculen-
tum, quamvis nec sapidum, nec salubre.
Habitat cultus in Cochinchinâ.

G E N U S XXXIV. E R V U M.

Char. Gener. *Cal.* 5-partitus, longitudine corollæ. Lin. sy. pl. G. 948.

Sp. 1. ERVUM HIRSUTUM. α Cây Deái chòn.
Differ. spec. Erv. *pedunculis* multifloris: *seminibus* globosis, binis.
Lin. sp. 3.
Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 2-pedalis, sub-erectus, angulatus,
hirsutus, ramosus. *Folia* ternata, sub-lanceolata, integerrima, ru-
gosa, pilosa. *Flos* purpurascens, axillaris, spicis ovatis, erectis.
Calyx 5-partitus, pilosus. *Corolla* papilonacea, brevissima, vix caly-
ci æqualis. *Legumen* teres, acuminatum, 2-spermum: *seminibus*
globosis.
Habitat incultum, per agros dispersum in Cochinchinâ.
Cicer pedunculis multifloris, *seminibus* globosis. Hort. Cliff. pag. 370.
Vicia segetum cum siliquis plurimis, hirsutis. Baub. Pin. pag. 345. n. 2.

† G E N U S XXXV. S A R C O D U M.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium cyathiforme, breve, coloratum, persistens: parte su-
periore truncatum, inferiore denticulis 3, acutis, erectis.
Cor. Papilonacea. Vexillum ovatum, integrum, ascendens. Alæ oblon-
go-ovatae, breves, planæ. Carina monophylla, falcata, vexillo
æqualis.

Nnn

Stam.

Stam. Filamenta 10 (simplex, & 9-fidum) subulata, vaginæ longæ connata, vexillo breviora. Antheræ ovatæ, incumbentes.

Pist. Germen lineare. Stylus subulatus, æqualis staminibus. Stigma crassifuscum.

Peric. Legumen longum, teres, rectum, æquale, carnosum, glabrum, polyspermum.

Sem. Reniformia.

Nom. ($\Sigma\alphaρχωδης$ cornosus) a Legumine carnosō.

Char. Gener. *Cal.* semitruncatus. *Alæ* planæ, breves. *Legumen* carnosum, teres.

† Sp. 1. SARCODUM SCANDENS. α Cây muồng deei.

Differ. spec. Sarc. *foliis* pinnatis: *spicis* terminalibus: *Caulis* fruticoso, scandente.

Hab. *Caulis* fruticosus, lignosus, scandens, inermis, longus, ramosissimus. *Folia* pinnata, multijuga: *foliolis* ovato-oblongis, acuminatis, integerimis, lanuginosis: *stipulis* linearibus. *Flos* coloris rosei, *spicis* simplicibus, terminalibus: *bracteis* lanceolatis, ciliatis, monofloris.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Observ. Quamvis cum Loto conveniat Legumine farcto, differt tamen calyce semitruncato, 3-dentato, alis planis, nec conniventibus, feminibusque reniformibus, atque vexillo ascendentē.

G E N U S XXXVI. C Y T I S U S.

Char. Gener. *Cal.* 2-labiatus: $\frac{2}{3}$. *Legumen* basi attenuatum. Lin. sy. pl. G. 951.

Sp. 1. CYTISUS CAJAN. α Đậu sảng. β Xân têu kẽn: săn tấu can.

Differ. spec. Cyt. *racemis* axillaribus, erectis: *foliolis* sub-lanceolatis, tomentosis: *intermedio* longius petiolato. Lin. sp. 4.

Hab., & notæ. *Caulis* arborescens, lignosus, 10-pedalis, teres, rectifimus: *ramis* similiter rectis, ascendentibus. *Folia* ternata, lanceolata, integerima, obliquè nervosa, venosa, tomentosa, mollia, albicantia, petiolata, petiolo medio longiore. *Flos* flavus, *pedunculis* longis, erectis, axillaribus, sub-sexfloris. *Calyx* semiquinquefidus, lacinias acutis, sub-æqualibus. *Corolla* papilonacea, petala 4, longitudine sub-æqualia. *Vexillum* sub-rotundum, patens. *Alæ* ovatae, ad basim dente notata. *Carina* lunata. *Filamenta* 10, Diadelpha, subulata, sub-æqualia. *Antheræ* ovatae, stantes. *Germen* li-

nea-

neare. *Stylus* filiformis, æqualis staminibus, basi hirsutus, superius glaber. *Stigma* sub-rotundum. *Legumen* longum, rectum, sub-teres, acuminatum, pubescens, oblique striatum, (non contortum) sub-articulatum, polyspermum: *seminibus* reniformibus, 6 circiter.

Habitat incultus, cultusque ad ordinandas sepes in Cochinchinâ, & in Chinâ.

Observ. In utroque regno hanc plantam observavi omnino conformem: attamen in herbariis Sinensibus invenio duas eodem nomine descriptas, & pictas valde differentes: alteram quidem caule erecto, sed foliis pinnatis, sub-trijugis, aliam vero foliis ternatis, caule scandente, ut videtur, herbaceo.

Cytisus folio molli, incano: siliquis Orobis contortis, & acutis: Burm. Zeyl. pag. 86. tab. 37. *Phaseolus* Balicus. Rumph. Amb. l. 9. cap. 24. tab. 135. fig. 2.

Virtus: radicis. Attenuans, Resolvens, Odontalgica. Prodest in Chlorosi, faucium inflammatione, dentium dolore, fluxu ventris ex crassis humoribus, ani ulceribus, morsu animalium venenatorum.

GENUS XXXVII. LOTUS.

Char. Gener. *Leg.* cylindricum, strictum. *Alæ* sursum longitudinaliter conniventes. *Cal.* tubulosus. Lin. sy. pl. G. 969.

Sp. 1. LOTUS ARABICUS. α Δάιον λεόναντον.

Differ. spec. Lot. *leguminibus* cylindricis aristatis: *caulibus* postratis: *pedunculis* 3-floris: *bracteis* monophyllis. Lin. sp. 9.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, striatus, scandens, acirrus, sèpè postratus. *Folia* ternata, ovata, pilosa, petiolis brevibus: *stipulis* binis lanceolatis. *Flos* luteus pedunculis longis, erectis, polyfloris, axillaribus. *Calix* tubulosus labio superiore obtuso, emarginato. *Corollæ* alæ oblongæ, conniventes. *Stylus* linearis, teritusculus, villosus, cum staminibus ascendens. *Legumen* teres, acuminatum, rectum, pilosum: *seminibus* oblongis, cylindricis.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

Lotus Hirsuta. Forskæl. Arab. Cent. 5. n. 39. pag. 140.

Observ. Notæ Loti Hirsutæ ex Forskæleo potius convenient Loto Arabico Linæi, quam illius *Lotus Rosea* foliis quinatis, sive impari-pinnatis, 2-jugis, prout in Flora Arabicâ exponuntur: Loto verò Arabico folia 3-nata a Linæo tribuuntur, totidemque in Cochinchinensi numeravimus.

C L A S S I S X V I I I .
P O L Y A D E L P H I A .

I C O S A N D R I A .

- 1. CITRUS. *Cal.* 5-fidus, inferus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 20
in tubum fissum connata. *Stylus* 1. *Bacca* locularis, pulpâ vesiculari.
- 2. MELALEUCA. *Cal.* 5-fidus, superus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 40
in 5, 6 phalanges. *Stylus* 1. *Caps.* 3-valvis,
calyce semivestita.

P O L Y A N D R I A .

- † 3. BALSAMARIA. *Cal.* 2-phyllus, inferus. *Cor.* 6-petala. *Stam.*
200 in 5, 6 phalanges. *Stylus* 1. *Drupa* 1-sperma.
- 4. GLABRARIA. *Cal.* 5-fidus, inferus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* phalanges 5 ex senis. *Stylus* 1. *Drupa*.
- 5. HYPERICUM. *Cal.* 5-partitus, inferus. *Cor.* 5-petala. *Styli* 1, 3, 5. *Caps.* locularis.

ICOSANDRIA.

GENUS I. CITRUS.

Char. Gener. *Cal.* 5-fidus. *Petala* 5, oblonga. *Antheræ* 20, filamentis connatis in varia corpora. *Bacca* 9-locularis. Lin. sy. pl. G. 974.

Sp. 1. CITRUS MEDICA. Cây Tanh yen. β . . .

Differ. spec. Cit. *petiolis* linearibus. Lin. sp. I.

Hab., & notæ. *Caulis* arboreus, 8-pedalis, erectus, aculeatus: *ramis* longis, reclinatis. *Folia* ovato-oblonga, alterna, sub-ferrata, glabra, pallido-virentia: *petiolis* linearibus. *Flos* albus, odoratus, mediocris, pedunculis polyfloris, sub-terminalibus. *Bacca* semipedalis, ovata, apice protuberante, sub-9-locularis: pulpâ vesiculari, albâ, saepius acidâ: cortice flavescente, crasso, duriusculo, odorato, inæquali. *Fructus* esculentus tam crudus, quam saccharo conditus.

Habitat culta in Cochinchinâ, & Chinâ.

Malum Citrum. Rhumph. Amb. l. 2. c. 35. tab. 25. Malus Medica.

Bauh. Pin. pag. 435. n. I.

Est hujus Varietas, non rara in Sinis, caule, foliis, & floribus similis: fructu vero oblongo, solido absque loculis, aut pulpâ, supra medium diviso in 5, vel plures lacinias longas, teretes, sub-curvas, manum hominis repræsentante lateraliter conniventem, digitisque parum curvatis. Ex quâ formâ deducitur nomen. vulgare *Phat thū*, id est Citrus digitata, seu Chirocarpus.

Varietas 2. Citrus Limon. α Cây Canh. β Tsim pi xu. *Caulis* arboreus, 8-pedalis, tortuosus, aculeatus: *ramis* multis diffusis. *Folia* ovato-lanceolata, sub-integerrima, alterna: *petiolis* plerumque linearibus. *Flos* albus, maculâ rubescente, *pedunculis* terminalibus, paucifloris: *corollâ* 5-petalâ, oblongâ: *Staminibus* 20, in varia corpora collectis. *Bacca* sesquipollucaris, apice protuberante, sub-globosa, æqualis, nitida, flavo-viridis, odorata, sub-9-locularis, pulpâ multâ, acidissimâ, seminibus paucis, sub-ovatis. Hæc Citri varietas in usu œconomico est omnium optima: vocaturque a Rumphio *Limonellus Nipis*. Amb. l. 2. c. 39. tab. 29. *Limonum* arbores multum variant non solum magnitudine, & formâ fructus, sed etiam foliorum, & petiolorum simplicium, & alatorum: quas notas apud citatum Rhumphium facile observabis.

Sp. 2.

Sp. 2. CITRUS AURANTIUM. α Cây Cam. β Cân xú.

Differ. spec. Cit. *petiolis* alatis : *foliis* acuminatis. Lin. sp. 2.

Hab. , & notæ. *Arbor* mediocris , aculeata , cortice viridi-fusco , ramis patentibus. *Folia* lato-lanceolata , sub-integerrima , glabra , alterna , *petiolis* pterumque alatis. *Flos* albus , 5-petalus , odoratus : *pedunculis* terminalibus , polyfloris. *Stamina* 20 , connata in varia corpora tubum formantia. *Bacca* sub-globosa , apice planiuscula , coloris aurei , nitida , odorata , 3-pollicaris , sub-9-locularis , pulpâ vesiculari , acido-dulci : cortice carnofo , mediocri , pelliculâ exteriore gustis sub-ardentis , amaricantis. Hæc descriptio imprimis convenit Aurantio vulgarissimo in quatuor obis partibus , quod in Europâ dici solet Lusitanum , aut Sinense ; quia a Sinis per Lusitanos traslatum per totam Europam propagatum hodie videmus.

Habitat culta , inultaque in Cochinchinâ , & Chinâ.

Aurantia Mala. Math. in Diosc. l. 1. c. 131. pag. 206. fig. 7.

Aurantium Sinense. Tournef. Inst. pag. 620. n. 15. tab. 393.

Virtus : pulpæ. Refrigerans , Antiscorbutica. Corticis flavi exterioris. Calefaciens , Tonica , Stomachica , Pellens per sudorem , & urinam. Petuitam , & tussim domat. Vomitum , nauseam , & anxieties cohibet. Pharmacum est apud Sinas usitatissimum : cortex scilicet , non medulla fructûs , quæ non permittitur infirmis a Medicis Sinensis bus , quamvis tam facile in Europâ concedatur.

† Sp. 3. CITRUS NOBILIS. α Cam Sanh. β Tsein cān.

Differ. spec. Citr. *inermis* , *ramis* ascendentibus : *petiolis* strictis fructu tuberculofo : sub-compresso.

Hab. , & notæ. *Arbor* mediocris , *ramis* ascendentibus , inermibus. *Folia* lanceolata , integerrima , sparsa , nitida , obscuro-viridia , gravè olentia : *petiolis* linearibus. *Flos* albus , 5-petalus , odoratus , pedunculis polyfloris , terminalibus. *Bacca* compresso-rotunda , sub-9-locularis , intus , & foris rubra : cortice crasso , succoso , dulci , eduli , tuberculofo-inæquali. Sinensi vulgari duplò maior est , diame tro 5 polices æquante. Est Citrorum omnium gratissima.

Habitat abundanter in Cochinchinâ : etiam in Chinâ , quamvis Cantone illam non viderim.

Malus Arantia cortice dulci , eduli. Bauh. Pin. pag. 436. n. 3. Aurantium , quæ malus Aurancia regia , dulcis : cortice suavi , & dulci. Burm. Zeyl. pag. 39. Aurantium verrucosum : Manis besaar. Rumph. Amb. l. 2. c. 43. Tabula vero 35 minus cum nostrâ descriptione cohæret , quam tabula 34 : nec ista , aut Rumphii expositio in totum convenit , fortasse , quia plantam non viderit , cum ipsem fateatur ibi non esse vulgarem.

Sp. 4.

- † Sp. 4. CITRUS MADURENSIS. α Kīm kūit. β Kīn: kūit xú.
 Differ. spec. Citr. *inermis*: ramis diffusis, angulatis: petiolis linearibus: fructu globoſo, lævi.
 Hab., & notæ: *Arbuscula* 3-pedalis: *ramis* patentibus, tortuosis, angulatis, inermibus. *Folia* lato-lanceolata, sub-integerrima, alterna, glabra: *petiolis* linearibus. *Flos* albus, 5-petalus, odorus, minusculus: pedunculis paucifloris. *Bacca* globosa, lævis, luteo-viridis, semipollici vix æqualis, sub-8-locularis: pulpâ vesiculari, amaricante. Saccharo condita edulis est, & grata: non autem cruda. Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ: coliturque ob pulchritudinem. *Limonellus Madurensis*. Rumph. Amb. I. 2. cap. 40. pag. 110. tab. 31.
- † Sp. 5. CITRUS MARGARITA. β Chū tsū. α Chau tu.
 Differ. spec. Citr. *ramis* ascendentibus, aculeatis: *petiolis* linearibus: baccis 5-locularibus, oblongis.
 Hab., & notæ. *Arbuscula* 4-pedalis: *ramis* ascendentibus, aculeatis. *Folia* lanceolata, integerrima, nitida, sparsa: *petiolis* linearibus. *Flos* albus, 5-petalus, odoratus: *pedunculis* paucifloris, sparsis. *Bacca* oblongo-ovata, rubro-lutea, glabra, 8 lineas longa, 5-locularis: cortice tenui: pulpâ vesiculari, dulci, eduli.
 Habitat Cantone Sinarum, nec rara: in Cochinchinâ mihi non visa.
- † Sp. 6. CITRUS FUSCA. α Cay Baong. β Chi Xac. β Chi keu.
 Differ. spec. Citr. *ramosissima*, aculeata: *foliis* lanceolato-ovatis: *petiolis* cordato-alatis: *baccis* globoſis, asperis.
 Hab., & notæ. *Arbor* supra mediocrem: *ramis* plurimis, tortuosis, sub-ascendentibus: aculeis plurimis longis, validis. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, obscuro-viridia, glabra, ingratia odoris: *petiolis* magnis, alatis, cordiformibus. *Flos* albus, sub-odorus: *pedunculis* polyfloris, subterminalibus. *Bacca* globoſa, 2-pollicaris, aspera, fuco-viridis, corticosa, sub-9-locularis: pulpâ vesiculari, pallidâ, acidâ, sub-amarâ, ingratâ.
 Habitat latissimè in Cochinchinâ, rariùs in Chinâ.
 Aurantium Acidum Lemon Itam. Rumph. Amb. I. 2. c. 41. tab. 33.
 Virtus: Corticis integri baccarum. Attenuans, Deobstruens, Eccoprotica.
- Sp. 7. CITRUS DECUMANA. α Cay Buoi. β Yéu Xu.
 Differ. spec. Citr. *petiolis* alatis: *foliis* obtusis, emarginatis. Lin. sp. 3.
 Hab., & notæ. *Arbor* supra mediocrem: *ramis* patentibus, aculeatis. *Folia* ovata, sub-acuta, raro obtusa, rarissimè emarginata, glabra,

Universidade de Göttingen
JABALI - BOTANICO

sparsa : petiolis cordato-alatis , magnis. *Flos* albus , odoratissimus , racemis vastis , erectis , terminalibus. *Corolla* 5-petala , reflexa. *Stamina* 20 circiter , petalis sub-aequalia , in tubum polyfidum coallita. *Bacca* sphæroidea , saepius utrinque retusa , diametro 8-pollicari , aequalis , luteo-viridis , in 12 , & amplius loculos divisa : pulpâ vesiculari rubra , in aliis albâ , nunc dulci , nunc acidâ : cortice crassissimo , albo , fungoso , amaricante , inutili. *Semina* ovata , sub-acuta , 2 , 3 in quolibet loculo. Harum arborum sunt multæ varietates , fortasse species : quarum una præstantior sapore , & odore fructus caulem habet minorem , similiter aculeatum , baccas sub-globosas , 5-pollicares , intus albas , dulcissimas , exterius flavescentes. Dicitur idiomate Sinico *Hiām yūen* , Cochinchinensi vero *Huong ien* : quod interpretatur Globus Odoratus.

Habitat frequenter in Cochinchinâ , & Chinâ.

Aurantium fructu omnium maximo Pumpelius dicto. Burm. Zeyl.

pag. 39. Limo Decumanus , Pompelmoes. Rumph. Amb. I. 2. c. 34.

pag. 96. tab. 24. fig. 2.

Observ. Existimo multas alias dari species Citri in Indiâ , quarum aliquas vidi , sed non satis examinavi. Nec dici potest eas esse tantummodo varietates , prout habentur etiam in Europâ. Namque , ut bene notavit Rumphius , (Amb. I. 2. c. 40.) illæ in Europâ variant per artificiosam culturam , oculacionem , & insitionem , quam artem plerique Indiani , maximè Cochinchinenses , penitus ignorant. Hæ vero nascuntur in sylvis , absque ullâ culturâ , & tamen constanti varietate , adeoque specie differre censendum , nisi tam levis , aut minus constans sit differentia , quæ dissuadeat.

Quæ a Linnæo dicitur Citrus Trifoliata huic generi prorsus repugnat.

Quique Auctores illam a Kämpfero prius expositam Citro adjudicarunt , videntur recentis plantæ corollam , stamina , & baccam non observasse : certè non fatentur , nec accuratè exponunt. Vide supra Clas. 5. G. 58. Triphasia Aurantiola. Ubi notabis characterem Genericum a me ex vivâ plantâ diligenter excerptum planè differre a Citro : notas vero specificas , & habitum omnimodo convenire Trifoliatae.

GENUS II. MELALEUCA.

Char. Gener. *Cal.* 5-partitus , superus. *Cor.* 5-petala. *Filamenta* multa , connata in 5 corpora. *Stylus* 1. *Caps.* semivestita calyce bacato , 3-valvis , 3-locularis. Lin. sy. pl. G. 978.

Sp. MELALEUCA LEUCADENDRA. a Cây Tlâm. Lin. sp. I.

Differ. spec. Mel. *foliis* lineari-lanceolatis , quinque-nerviis , sparsis : *spicâ* longâ apice foliosa. Hab.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, trunco alto, flexuoso: rami ascendentibus, incomptis, paucis: cortice crasso, pallido, lamellato, fissili, tenaci. *Folia* linear-lanceolata, integerrima, 5-nervia, plana, recta, cinerea, odorata, duriuscula, sparsa, petiolata. *Flos* albus, sessilis: *spicis* longis, sub-terminalibus, apice in folia homogenea rursus erumpentibus: bracteis floralibus minutis, ovatis, acutis. *Calyx* tubulosus, 5-fidus: tubo sub-rotundo, coriaceo, rubro-fusco: laciniis rotundatis, deciduis. *Corolla* petala 5, sub-rotunda, concava, calyce longiora. *Filamenta* 40 circiter, in 5-6 fasciculos connata, longa, capillaria, inæqualia, margini tubi calycis insistentia. *Antheræ* minimæ, ovatae, incumbentes. *Germen* inferum, sub-rotundum, 3-lobum, calyce cinctum. *Stylus* filiformis, æqualis staminibus. *Stigma* crassiusculum. *Pericarpium* capsula sub-rotunda, 3-locularis, 3-valvis, apice dehiseens, calyce truncato (laci-niis decidientibus) semivestita. *Semina* multa, oblonga, compre-fo-angulata, minima.

Habitat frequens in sylvis Cochinchinæ. Melaleuca Leucadendron, Latifolia, & Angustifolia. Lin. Jun. sup. pl. syst. veget. pag. 342. Arbor Alba. Rumph. Amb. I. 2. cap. 25 tab. 16. & cap. 26. tab. 17.

Usus. Cortice hujus arboris in laminas flexiles divulso utuntur quotidie indigenæ ad obturandas rimas quarundam navium, quarum tabulæ non clavis, sed funiculis ligantur. Item ad tegendas domos, & quidquid aliud aeri expositum ab ejus mutationibus servare volumus longo tempore indemne.

Virtus: foliorum. Attenuans, Roborans, Stomachica, Diuretica, Emmenagoga. Valet in Obstructione hepatis, Hydrope, debilitate ventriculi, difficultate respirationis, mensum, aut lochiorum suppressione. Hoc decocto utuntur commode Cochinchinenses viatores ad præcavenda mala ex cibis crassioribus venalibus in diversoriis.

POLYANDRIA.

† GENUS III. BALSAMARIA.

Descriptio Naturalis.

- Cal. Perianthium 2-phylum, coloratum, inferum: foliolis rotundis, concavis, deciduis.
- Cor. Petala 6, oblongo-ovata, concaval, patentia, calyce longiora.
- Stam. Filamenta 200 circiter, corollâ breviora, connata in 5-6 fasciculos, receptaculo insidentes. Antheræ oblongæ, stantes.
- Pist. Germen globosum, rubrum, nitidum. Stylus filiformis, longior

Ooo

stami-

staminibus. Stigma convexum, margine inaequali. Peric. Drupa globosa, lignosa, glabra, aequalis: nucleo rotundo, acuminato, solido, carnoso, oleoso.

Nom. Balsamaria, quasi Balsamum Mariæ, nomen est, quo in multis Indiae locis haec arbor vulgo cognoscitur.

Char. Genero *Calobophyllum*, inferus. Cor. 6-petalā. Stam. 200 circiter in 5-6 fasciculis. Stylus 1. Drupa globosa, 1-sperma.

† Sp. 1. BALSAMARIA INOPHYLLUM. Cay Muu.

Differ. spec. Bals. foliis ovatis, sub-emarginatis, lineatis: racemis corymbosis, terminalibus.

Habit. Arbor supra mediocrem, trunco elato, tortuoso: cortice crassissimo, scabro, fusco: ramis incomptis, ascendentibus. Folia ovata, sub-emarginata, integerrima, transverse lineata, plana, dura, nitida, opposita: petiolis brevibus. Flos candidus, pulcherrimus, suaveolens, racemis in formam Corymbi ordinatis, pedunculis longis, albis, sub-terminalibus. Calyx albus, viridi mixtus, unde a corolla dignoscitur, simulque ex foliorum brevitate, & rotunditate. Drupa globosa, 1-pollicaris, laevis, viridi-fusca: cortice exteriori tenui, succosa: interiori crassiore, lignosa: nucleo albo, laxo.

Habitat tam culta, quam agrestis in locis mediterraneis Cochinchinæ. Vidi etiam frequentem in Cambodiâ, & in sylvis Malaiorum juxta fretum Malacense.

Inophyllum flore 8-fido. Burm. Zeyl. pag. 131. Bitangor Maritima. Rumph. Amb. 1. 3. c. 26. tab. 71. Ubi etiam dicitur Cajū Maria.

Observ. Circa florem hujus arboris variant Auctores. Burmannus dixerat 8-fidum. Rumphius loco citato ex 9, vel 10 petalis compositione postea vero libro 4. capite 55. describens arborem dictam Lignum Clavorum dicit eam magnam affinitatem habere cum Bitangora, seu Cajū Maria, illique tribuit, sicut nos isti, calycem 2-phylum, & corollam 6-petalam. Linnæus eam facit speciem Calophylli, cui (Gen. pl. ed. 6. pag. 266.) attribuit corollam 4-petalam, calycem nullum: at in Systemate plantarum, & Vegetabilium Characterem genericum decernit Calophyllo calycem 4-phylum, Corollam 4-petalam. Sed nullus, quem viderim, advertit plantam esse Polyadelpham, sicut nos constanter observavimus in vivis arboribus, simul cum aliis notis supra descriptis. Eadem planta a Linnaeo adscripta fuerat classi Polyandriæ, insuperque alia species ab eo dicta Calophyllum Calaba. Hanc ego non vidi, nec a loco dimovere presumo: illi vero, ore melius probata, novam classem, genus, & nomen debui decernere, ne confundantur.

Ufus. Truncus, rami, & folia scatent humore albo, crasso, tenacissimo:

simo: quod collectum mutat colorem in viridem obscurum, diciaturque Balsamum Mariæ. Valet in curatione vulnerum, quæ non admodum citè consolidat, sed prævalet in præcavenda inflammatiohe, & putredine. Ex Druparum nucleus exprimitur abundans oleum, similiter viride, tenui, & ingratii odoris, lychinis aptum, in re Medicâ balsamo inferius.

G E N U S IV. G L A B R A R I A.

Char. Gener. *Cal. 5-fidus. Petala 5. Nectarium receptaculi setis longitudine Calycis. Stamen 30: sénis semper connexis. Drupa. Lin. sy. pl. G. 975.*

Sp. 1. GLABRARIA TERSA. α Cay Phao 1661. Lin. sp. 1. Differ. spec. Glab. foliis ovato-lanceolatis, alternis: pedunculis poly-

floris, lateralibus. *Hab.*, & notæ. Arbor magna, ramis ascendentibus. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, glabra, superius scabriuscula, subtus cinerea, petiolata, alterna, sparsaque. *Flos* albus, parvus, pedunculis poly-

floris, brevibus, lateralibus. *Florem* non examinavi, quamvis, ar-

borem obviam habuerim.

Habitat in altis sylvis Cochinchinae.

Lignum Leve: Halaur. Rumph. Amb. 1, 4. c. 38. tab. 43.

Ufus. Lignum est levissimum, pallidum, aeris odoris, crassis, & pilosis constans fibris, ab insectis, & putredine immune, dummodo siccum servetur; ideoque ad superiora ædificiorum tigna maximè idoneum.

G E N U S V. H Y P E R I C U M.

Char. Gener. *Cal. 5-partitus. Petala 5. Filamenta multa in 5 phalanges basi connata. Capsula. Lin. sy. pl. G. 981.*

Sp. 1. HYPERICUM OLYMPICUM? α Le ngành tlāng. β Höang xoc.

Differ. spec. Hyp. floribus trigynis: calycibus acutis: staminibus corollâ brevioribus: caule fruticoso. Lin. sp. 9.

Hab., & notæ. Arbor 10-pedalis, ramis patentibus. *Folia* ovato-lanceolata, integerrima, glabra, opposita. *Flos* duteus, pedunculis incanis, sub-bifloris, lateralibus, & terminalibus: calycibus 5-partitis, acutis: corollis 5-petalis, integerrimis. *Stamina* in 3 plalanges elevata. *Syli* 3. *Capsula* 3-locularis, polysperma.

Habitat in cultum in Cochinchina, & Cantone Sinarum.

Hort. Cliff. pag. 380. Hypericum Orientale, flore magno. Tournef.

Inst. Corol. pag. 19.

472 A POLYADELPHIA. POLYANDRIA.

Sp. 2. HYPERICUM PETIOLATUM. β Hoang niêu thau.
Differ. spec. Hyp. floribus trigynis : foliis ovatis, petiolatis, integer-
mimis : caule fruticoso, tetragono, compresso. Lin. sp. 10.
Hab. & notæ. Caulis fruticosus, multiplex, 3-pedalis, angulatus,
diffusus. Folia lato-lanceolata, integerrima, vix tomentosa, oppo-
sita, petiolata. Flos flavo-ruber, axillaris, & terminalis, peduncu-
lis paucifloris. Staminum phalanges 3, elevatae : glandulis totidem,
alternis, magnis, ad basim sitis. Styli 3. Capsula 3-locularis, po-
lyperma. Habitat in cultum prope Cantonem Sinarum. Lin. Syst. Veget. pag. 583. sp. 7.

† Sp. 3. HYPERICUM COCHINCHINENSE. α Le nganh do.

Differ. spec. Hyp. floribus trigynis : foliis sub-petiolatis, densissimis :
caule arboreo : pedunculis sub-quinquefloris, axillaribus.
Hab. & notæ. Arbor media: 16-pedalis : ramis ascendentibus :
ramulis plurimis, obscuro-rubentibus. Folia lanceolato-ovata, obtu-
sa, integerrima, glabra, densissima, parva, opposita, sub-petiolata.
Flos coccineus, pedunculis sub-quinquefloris, axillaribus. Calyx
5-partitus, lacinias acutis, integris. Corolla petala 5, ovato-oblon-
ga, integra, patentia. Nectarium glandulis 3, magnis, reclinatis.
Stamina circiter, in tria corpora coalita. Styli 3. Capsula
ovata, colorata, 3-locularis, polysperma : seminibus oblongis, pla-
niuseulis.
Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Usus. Lignum hujus arboris rubescit : grave, durum, ac tenax est ;
ad eaque opera aptissimum, quæ pondus, & impetum ferunt ceden-
do potius ne frangantur : quales sunt navium remi, & antennæ.
Florus succus tingit colorem aureo.

† Sp. 4. HYPERICUM AUREUM. β Guéi thoung hôa.

Differ. spec. Hyp. floribus semipentagynis : pedunculis sub-divisis ;
terminalibus : caule fruticoso.
Hab. & notæ. Caulis fruticosus, 3-pedalis, erectus, multiplex, te-
rres, ramis reclinatis. Folia oblonga, obtusa, integerrima, glabra,
opposita, sessilia, nec amplexicaulia. Flos maiusculus, nitide au-
reus, staminibus, & pistillo concoloribus : pedunculis sub-divisis,
terminalibus, paucifloris. Calyx 5-partitus, coloratus. Corolla pe-
tala 5, oblonga, patentia. Stamina multa, corollâ breviora, in 5
plalanges ordinata : antheris sub-rotundis, minusculis. Stylus 1, se-
mi-5-fidus, corollæ æqualis, staminibus longior. Stigmata 5, sim-
plicia. Capsula sub-ovata, 5-locularis, polysperma : seminibus oblon-
gis, minimis.

Habitat

Habitat incultum prope Cantonem Sinarum : colitur etiam ob florū nitorem , & pulchritudinem.

Obser. Suspicio hoc esse Hypericum Monogynum. Thunb. Jap. pag. 297. Quia plures notæ convenient. Sed non valeo certò statuere , cum Vir Clarissimus , cæteroquin solers observator , nec stylum 5- fidum memoret , nec phalanges staminum recenseat.

CLAS-

POTERIÆ PESTIS TERRA ANDEA
CLASSIS XIX.
SYNGENESIA.
POLYGAMIA ÆQUALIS.

* *Semiflosculosi*: corollis omnibus ligulatis.

- | | |
|----------------|--|
| 1. CICHORIUM. | Recept. sub-paleaceum. <i>Papp.</i> sub 5-dentatus. <i>Cal.</i> calyculatus. |
| 2. PICRIS. | Recept. nudum. <i>Papp.</i> plumosus, stipitatus. <i>Cal.</i> calyculatus. |
| 3. LEONTODON. | Recept. nudum. <i>Papp.</i> plumosus, stipitatus. <i>Cal.</i> imbricatus, squamis laxis. |
| 4. SCORZONERA. | Recept. nudum. <i>Papp.</i> plumosus, stipitatus. <i>Cal.</i> imbricatus margine scariofo. |
| 5. LACTUCA. | Recept. nudum. <i>Papp.</i> pilosus, stipitatus. <i>Cal.</i> imbricatus margine scariofo. |
| 6. SONCHUS. | Recept. nudum. <i>Papp.</i> pilosus, sessilis. <i>Cal.</i> imbricatus, gibbus. |
| 7. LAPSANA. | Recept. nudum. <i>Papp.</i> nullus. <i>Cal.</i> calyculatus. |

** *Flores Capitati.*

- | | |
|----------------|--|
| 8. CARTHAMUS. | <i>Cal.</i> squamis squarrofis, foliaceis. |
| 9. CARDUUS. | <i>Cal.</i> squamis spinosis, ventricosus. |
| 10. SERRATULA. | <i>Cal.</i> squamis acutiusculis, muticis imbricatus, sub-cylindricus. |

*** *Flores Discoidei.*

- | | |
|-----------------|---|
| 11. SPILANTHUS. | Recept. nudum. <i>Papp.</i> 2-aristatus. <i>Cal.</i> sub-æqualis. |
| 12. AGERATUM. | Recept. nudum. <i>Papp.</i> 5-aristatus. <i>Cal.</i> sub-æqualis. <i>Corollulae</i> 4-fidæ. |

13. CACALIA.

Recept. nudum. *Papp.* pilosus. *Cal.* calyculatus.

14. CHRYSOCOMA.

Recept. nudum. *Papp.* pilosus. *Cal.* imbricatus. *Pist.* brevissima.

15. EUPATORIUM.

Recept. nudum. *Papp.* plumosus. *Cal.* imbricatus. *Pist.* longissima.

16. CALEA.

Recept. paleaceum. *Papp.* pilosus. *Cal.* imbricatus.

17. BIDENS.

Recept. paleaceum. *Papp.* aristatus. *Cal.* imbricatus.

18. PTERONIA.

Recept. setis partitis. *Papp.* sub-plumosus. *Cal.* imbricatus.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

* *Discoidei.*

19. ARTEMISIA.

Recept. sub-nudum. *Papp.* nullus. *Cor.* radii nulli.

† 20. CENTIPEDA.

Recept. nudum. *Papp.* nullus. *Cor.* disci 8, 4-fidæ. Sem. fetosa.

21. COTULA.

Recept. sub-nudum. *Papp.* marginatus. *Cor.* disci 4-fidæ.

22. BACCHARIS.

Recept. nudum. *Papp.* pilosus. *Cor.* fæmineæ hermaphroditis mixtæ.

23. CONYZA.

Recept. nudum. *Papp.* pilosus. *Cor.* radii 3-fidæ.

24. PLACUS.

Recept. nudum. *Papp.* pilosus. *Cor.* radii nullæ : disci 5-fidæ.

25. GNAFALIUM.

Recept. nudum. *Papp.* plumosus. *Cal.* scariosus : squamis concavis.

26. XERANTHEMUM.

Recept. paleaceum. *Papp.* sub-setaceus. *Cal.* scariosus : radio explanato.

** Flores Radiati.

27. MATRICARIA. Recept. nudum. *Papp.* nullus. *Cal.* squamis imbricatis, acutis.
28. CRHYSANTHEMUM. Recept. nudum. *Papp.* nullus. *Cal.* squamis intimis scariofis.
29. ERIGERON. Recept. nudum. *Papp.* pilosus. *Cor.* radii capillares.
30. SOLIDAGO. Recept. nudum. *Papp.* pilosus. *Cor.* radii sub-seni, remoti.
31. CINERARIA. Recept. nudum. *Papp.* pilosus. *Cal.* æqualis, simplex.
32. SENEPIO. Recept. nudum. *Papp.* pilosus. *Cal.* squamis apice sphacelatis.
33. TUSSILAGO. Recept. nudum. *Papp.* pilosus. *Cal.* squamis sub-membranaceis.
34. ASTER. Recept. nudum. *Papp.* pilosus. *Cal.* sub-squarrosum.
35. TAGETES. Recept. nudum. *Papp.* aristatus. *Cal.* 1-phyllus.
36. SIEGESBECKIA. Recept. paleaceum. *Papp.* nullus. *Radius* dimidiatus.
37. ECLIPTA. Recept. paleaceum. *Papp.* nullus. *Corollæ* disci 4-fidæ.
38. BUPHTHALMUM. Recept. paleaceum. *Papp.* marginatus. *Stigma* hermaphroditum simplex.
39. VERBESINA. Recept. paleaceum. *Papp.* aristatus. *Flocculi* radii circiter 5.

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

40. GORTERIA. Recept. nudum. *Papp.* pilosus. *Radius* corollæ ligulatus.

41. CENTAUREA. *Recept.* setosum. *Papp.* pilosus. *Radius* corollæ tubulosus.
42. COREOPSIS. *Recept.* paleaceum. *Papp.* aristatus. *Cal.* calyculatus.
43. HELIANTHUS. *Recept.* paleaceum. *Papp.* aristatus. *Cal.* squarrosum.

POLYGAMIA SEGREGATA.

44. SPHÆRANTHUS. *Recept.* multiflorum. *Papp.* nullus. *Polygamia* necessaria.
- † 45. ENYDRA. *Cal.* com. 4-phyllus : partialis 1-florus : *Flosc.* omnes tubulosi : hermaphroditi, & fœminei. *Pappus* nullus.

MONOGAMIA.

46. IMPATIENS. *Cal.* 2-phyllus. *Cor.* 5-petala, irregularis. *Caps.* supera, 5-valvis.
47. VIOLA. *Cal.* 5-phyllus. *Cor.* 5-petala, irregularis. *Caps.* supera, 3-valvis.
48. LOBELIA. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 1-petala, irregularis. *Caps.* infera, 2-locularis.
- † 49. SOLENA. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* nulla *Bacca* polyperma.

POLYGAMIA ÆQUALIS.

GENUS I. CICHLORIUM.

Char. Gener. *Receptac.* sub-paleaceum. *Cal.* calyculatus. *Papp.* sub-5-dentatus, obsoletè pilosus. Lin. sy. pl. G. 1000.

Sp. 1. CICHLORIUM ENDIVIA. β Khú tsái. α Khó thio.

Differ. spec. *Cic. floribus* solitariis, pedunculatis : *foliis* integris crenatis. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 2-pedalis, erectus, teres, crassus, ramosus. *Folia* ad radicem multa, magna, sub-cuneiformia, sinuato-dentata, utrinque glabra : suprema lanceolata, parva. *Flos* dilutè cœruleus, solitarius, pedunculatus. Sapor plantæ americans : odor nullus. Esculenta, Refrigerans.

Habitat in locis Borealibus imperii Sinensis.

Thunb. Jap. pag. 304. Intybus sativa, latifolia, sive Endivia vulgaris. Bauh. Pin. pag. 125. n. 1.

GENUS II. PICRIS.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Cal.* calyculatus. *Pappus* plumosus. *Sem.* transversè sulcata. Lin. G. 986.

† Sp. 1. PICRIS REPENS. β Hù hoám lién. α Hò hoàng lién.

Differ. spec. *Pic. perianthiis* exterioribus imbricatis, brevibus : interioribus cylindraceis, 8-phylis, laevibus : *caule* repente.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, procumbens, repens, tenuis, teres, glaber. *Folia* lanceolato-linearia, obtusa, repanda, denticulata, glabra. *Flos* semiflosculosus, luteus : pedunculis longis, paucifloris, sparsis, foliis sub-æqualibus. *Calyx* brevis imbricatus : *calyx* interior oblongus, teres, 8-phylus, foliolis linearibus, laevibus, æqualibus. *Corollulae* omnes hermaphroditæ, ligulatae, 5-fidae. *Pappus* sub-plumosus, stipitatus. *Semina* in longitudinem (non transversè) sulcata. Radix tenuis, amarissima.

Habitat spontanea Cantone Sinarum. Est alia planta, ejusdem virtutis, saporis, & nominis, sed caule erecto, & radice crassiusculâ, quam solummodo pictam vidi in herbariis Sinensis.

Virtus: radicis. Deobstruens, Antifebrilis.

GENUS III. LEONTODON.

Char. Gener. *Receptaculum nudum. Cal. imbricatus squamis laxiusculis. Pappus plumosus.* Lin. sy. pl. G. 991.

† Sp. 1. LEONTODON SINENSE. β *Pu cūm tsao.* & *Bō cong anh.*
Differ. spec. Leont. *Calyce superne reflexo: foliis oblongis: inferne runcinatis.*

Hab., & notæ. *Herba annua, acaulis. Folia turbinato-oblonga, apice rotundata, integerrima: inferius runcinata, glabra, sessilia, in orbem expansa. Pedunculi 1-flori, longi, erecti, glabri. Calyx sub-erectus, squamis acutis, laxis, supremis reflexis. Corolla aurea, tota ligulata. Receptaculum nudum. Pappus pilosus.*

Habitat incultum apud Sinas.

Virtus. Attenuans, Resolvens, Mundificans.

GENUS IV. SCORZONERA.

Char. Gener. *Receptaculum nudum. Pappus plumosus. Calyx imbricatus, squamis margine scariosis.* Lin. sy. pl. G. 985.

† Sp. 1. SCORZONERA PINNATIFIDA. γ. . . .

Differ. spec. Scor. *foliis pinnatifidis, semiamplexicaulibus: paniculā diffusa, terminali.*

Hab., & notæ. *Caulis suffruticosus, erectus, debilis, 3-pedalis, ramosus. Folia pinnatifida, denticulata, crassa, glabra, semiamplexicaulia. Flos semiflosculus, dilutè luteus, paniculā diffusā, terminatā pedunculis sub-umbellatis. Calyx oblongus, imbricatus. Receptaculum nudum. Pappus plumosus.*

Habitat spontanea in continenti Africæ, Orientalis, prope Mozambicum.

GENUS V. LACTUCA.

Char. Gener. *Receptaculum nudum. Calyx imbricatus, cylindricus, margine membranaceo. Pappus simplex, stipitatus. Semina lœvia.* Lin. sy. pl. G. 988.

Sp. 1. LACTUCA SATIVA. α *Rau diep taù.* β *Yē tsai:* Kiú.

Differ. spec. Lact. *foliis rotundatis, caulinis cordatis: caule corymboso.* Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis annuus, sesquipedalis, erectus, crassus, glaber, albicans, corymboso-ramosus. Folia turbinato-rotunda, plica-*
Ppp ii to-

480 SYNGENESIA. POLYGAMIA EQUALIS.

to-rugosa, glabra, concava, petiolata, imbricata, margine sinuata. *Flos* luteus, semiflosculosus, terminalis, bracteis cordatis: *calyx* cylindrico, imbricato: *pappo* piloso: *receptaculo* nudo: *semibus* laevibus.

Habitat culta in Cochinchinâ, & Macai Sinarum ex semine ab Europâ oriundo.

Thunb. Jap. pag. 300. Bauh. Pin. pag. 122. n. 1.

Ufus. Olus est salubre, & refrigerans, maximè gratum tempore astutatis.

Sp. 2. LACTUCA SALIGNA. α Rau diep hoang.

Differ. spec. *Lact.* foliis hastato-linearibus, sessilibus, carinâ aculeatis. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 4-pedalis, *erectus*, teres, albidans, ramosus. *Folia* sub-hastato-linearia, semiamplexicaulia, glabra, inermia, integerrima. *Flos* albus, semiflosculosus, paniculâ terminali.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

Lactuca Sylvestris altissima, foliis inferioribus dentatis, superioribus acuminatis, integris. Rai. Suppl. 135.

Sp. 3. LACTUCA INDICA. α Rau diep nhâ.

Differ. spec. *Lact.* foliis lanceolato-ensiformibus, sessilibus, inæqualiter dentatis. Lin. sp. 7.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 2-pedalis, teres, glaber. *Folia* oblongo-lanceolata, pinnato-sinuata, inæqualiter dentata, glabra, inermia: *caulina* sub-rotunda, integerrima, perfoliata. *Flos* semiflosculosus, dilutè luteus, paniculâ erectâ, terminali. *Calyx* imbricatus, oblongus. *Receptaculum* nudum. *Pappus* simplex, stipitatus.

Colitur in Cochinchinâ, sapore multò inferior Sativâ.

Obeck. It. ad Ind. Orient.

GENUS VI. SONCHUS.

Char. Gener. *Receptaculum* nudum. *Calyx* imbricatus, ventricosus. *Pappus* pilosus. Lin. sy. pl. G. 987.

Sp. 1. SONCHUS FLORIDANUS. β . Nieuw li. soi.

Differ. spec. *Sonch.* *pedunculis* sub-squamosis: *foliis* lyrato-hastatis. Lin. sp. 8.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 4-pedalis, *erectus*, teres, glaber, ramosus. *Folia* lyrato-hastata, sessilia. *Flos* luteus, terminalis, multus: *pedunculis* squamosis.

Habitat.

Habitat incultus prope Cantonem Sinarum.
Sonchus annuus Canadensis, altissimus, laciniatus, flore cærulecente.
Vaill. Act. Par. 1721. pag. 198.

Sp. 2. SONCHUS SIBIRICUS. α . Xān tū.
Differ. spec. Sonch. pedunculis squamatis: *foliis* lanceolatis, indivisis,
sessilibns. Lin. sp. 9.
Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 4-pedalis, simplex, erectus, ter-
res. *Folia* lanceolata, indivisa, sub-denticulata, glabra, sessilia.
Flos luteus, paniculâ magna, patente: pedunculis squamosis. *Calyx*
oblongus, ventricosus, imbricatus, lævis. *Receptaculum* nudum.
Pappus pilosus. *Floculi* ligulati.
Habitat incultus prope Cantonem Sinarum.
Lactuca falicis folio, flore cæruleo. Amman. Ruth. pag. 150. n. 211.
Sonch. foliis lanceolatis, sessilibus, plerumque denticulatis. Gmel.
Sibir. 2. pag. 11. tab. 3.

GENUS VII. LAPSANA

Char. Gener. *Receptaculum* nudum. *Cal.* calyculatus, *squamis* fin-
gulis interioribus canaliculatis. Lin. sy. pl. G. 998.

Sp. 1. LAPSANA RHAGADIOLUS. α Cai nhâ tl̄i.
Differ. spec. Laps. *Calycibus* fructus undique patentibus: *radiis* su-
bulatis: *foliis* lyratis. Lin. sp. 4.
Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, sesquipedalis, erectus, ter-
res, striatus. *Folia* oblonga, lyrato-dentata, laciniis acutis. *Flos*
croceus, semiflosculosus, pedunculis sub-divisis, lævibus, termina-
libus. *Calyx* calyculatus, in maturitate undique patens. *Seminis*
pappo in aliquibus piloso, in aliis nullo.
Habitat inculta in hortis, & agris Cochinchinæ.
Rhagadiolus edulis Hieracio affinis. Bauh. hist. 2. pag. 1014. Rhaga-
diolus Lapsanæ foliis. Tourn. Inst. Cor. pag. 36.

GENUS VIII. CARTHAMUS.

Char. Gener. *Cal.* ovatus, imbricatus: *squamis* apice sub-ovatis, fo-
liaceis. Lin. sy. pl. G. 1009.

Sp. 1. CARTHAMUS TINCTORIUS. α Cây Rum. Dieu Kanh. β Hùm
lân hōa.
Differ. spec. Cart. *foliis* ovatis, integris, ferrato-aculeatis. Lin. sp. 1.
Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 5-pedalis, rectus, teres,

firmus, parum ramosus. *Folia* ovato-oblonga, ferrato-aculeata, alterna, sub-petiolata. *Flos* croceo-ruber, *pedunculis* 1-2-floris, terminalibus. *Calyx* ovatus, imbricatus, squamis infimis foliiformibus, aculeatis. *Corollulae* omnes tubulosæ, hermaphroditæ, longæ, tenues, 5-fidæ. *Semina* ovata, sub-angulata, lœvia, fusco-pallida; *pappo* sub-piloso. *Receptaculum* convexo-planum, pilis longis stratum.

Habitat abundanter cultus in Cochinchinâ, & Chinâ.

Cnicus Indicus: Cassumba. Rumph. Ains. I. 8. cap. 38. tab. 79. fig. 2.

Cnicus Sativus, sive *Carthamus officinarum*. Bauh. Pin. pag. 378.

fl. I.

Virtus: seminum. Purgans. Florum Eccoprotica, Resolvens, Elmennagoga. Valet præcipue in dolore ventris, & aliis symptomatibus ex suppressione lochiorum ortis.

Ufus. Florum succo imbuuuntur telæ pulcherrimo colore roseo, coccineo, purpureo, aut violaceo. Ad extrahendam tincturam ex scissis floribus macerari debent prius cum sale aliquo fixo vegetabili: sed coloris elegantiam non exprimit, nisi postea admisceatur succus limonum, vel aliud acidum vegetabile.

GENUS IX. CARDUUS.

Char. Gener. *Cal.* ovatus, imbricatus, squamis spinosis. *Receptaculum* pilosum. Lin. sp. pl. G. 1004.

Sp. 1. *CARDUUS LANCEOLATUS*. *A* La di tsao. Siao Ky.

Differ. spec. Card. *foliis* decurrentibus, pinnati-fidis, hispidis: lacinias divaricatis: *calycibus* ovatis, spinosis, villosis: *caule* piloso. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 2-pedalis, erectus, teres, inermis, ad apicem villosus. *Folia* lanceolata, decurrentia, pinnatifida, subtus albicotia, pubescentia. *Flos* capitatus, terminalis, *pedunculis* longis, 1-floris. *Calyx* ventricoso-ovatus, imbricatus, foliolis lanceolatis, inermibus. *Corollulae* dilutè purpureæ, deorsum refractæ. *Receptaculum* semi-ovatum, pilosum. *Pappus* pilosus, longus.

Habitat incultus prope Cantonem Sinarum: ubi hâc herbâ facile nutritur porcos.

Carduus Lanceolatus, *latifolius*. Bauh. Pin. pag. 385. n. 6. Gmel. Sib. 2. pag. 66.

Sp. 2. *CARDUUS TUBEROSUS*. *B* Thu-gin sén.

Differ. spec. Card. *foliis* petiolatis, sub-decurrentibus, sub-pinnatifidis,

dis, spinosis: caule inermi: floribus solitariis. Lin. sp. 16.
Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 1-pedalis, erectus, simplicissimus, inermis, pilosus: radice tuberibus multis fasciculatis, sub-fusiformibus, carnosis, dulcibus. *Folia* oblonga, sub-decurrentia, pinnatifida, inermia. *Flos* purpureus, terminalis, binatus: calyce ventricoso, spinoso: corollulis omnibus hermaphroditis, flosculosis, erectis.

Habitat incultus prope Cantonem Sinarum. Carduus pratensis, Asphodeli radice, foliis tenuiter laciniatis. Bauh. Pin. pag. 377. n. 4. Cirsium radicibus bulbosis: foliis semipinnatis. Hall. Helv. n. 177.

Virtus. Tubera hujus Cardui a Sinensibus censentur Corrobantia, Phytisi, aut liuturno morbo laborantibus professe.

GENUS X. SERRATULA.

Char. Gener. *Cal.* sub-cylindricus, imbricatus, muticus. Lin. sy. pl. 1003.

Sp. 1. SERRATULA MULTIFLORA. Differ. spec. Serr. *foliis* lanceolatis, subtus villosis, sub-decurrentibus, integerrimis: *caule* corymboso: *calycibus* cylindricis. Lin. sp. 5.
Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 3-pedalis, erectus, corymbosoramosus, densissimus, inermis. *Folia* lato-lanceolata, serrato-lyrata, glabra, sparsa. *Flos* rubescens, parvus, plurimus: *pedunculis* terminalibus, fastigiatis: *calyce* cylindraceo, imbricato squamis brevibus, arctatis, muticis, apice conniventibus. *Corollulae* tubulosæ, minimæ. *Pappus* pilosus. *Receptaculum* lanuginosum.

Habitat inculta Cantone Sinarum. Cirsium inerne, caulis adscendentibusq; foliis linearibus, infra cineris. Gmelin. Sib. v. 2. pag. 71.

† Sp. 2. SERRATULA SCORDIUM. Cay muoi tuo: Trach Ian. & Tse Ian.

Differ. spec. Serr. *foliis* lanceolatis, serratis, semiamplexicaulibus: *floribus* fastigiatis: *radice* repente.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, perennis, sesquipedalis, semipro- cumbens, teres, crassiusculus: *ramis* paucis: *radice* longè repente. *Folia* lanceolata, acutæ, & profunde serrata, inermia, subtus tomentosa, superius nitida, succosa, odora, semiamplexicaulia. *Flos* terminalis, purpureus, fastigiatus: *calyce* sub-cylindrico, imbricato, lœvi, paucifloro. *Corollulae* omnes tubulosæ, 5-dentatæ, hermaphroditæ: pistillo longitudine æquali. *Receptaculum* nudum. *Pappus* pilosus, lessilis. *Semina* oblonga, involucro proprio cincta.

Habi-

Habitat spontanea, cultaque in Cochinchinâ, & Chinâ: hîc vero duæ aliæ plantæ, habitu prorsus diversæ eodem nomine indicantur. Virtus: totius herbæ. Resolvens, Antiputridinosa, Diaphoretica, Emmenagogæ. Internè valet in Hydrope, & mensium irregularitate. Externè in ulceribus putridis, & Gangrænâ.

GENUS XI. SPILANTHUS.

Char. Gener. *Recept.* paleaceum. *Papp.* aristis duabus: alterâ minore. *Cal.* sub-equalis. Lin. sy. pl. G. 1011.

† Sp. 1. SPILANTHUS TINCTORIUS. a Chám lón lá. 3. . . .
Differ. spec. *Spil.* *foliis* lanceolatis, serratis, glabris: *pedunculis* polyfloris, terminalibus: *caule* diffuso.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 3-pedalis, sub-procumbens, teres, diffusus: radice repente. *Folia* lanceolata, inæqualiter serrata, utrinque glabra, enervia, opposita, succosa, lætè viridia. *Flos* albo-cæruleus, terminalis, polynatus: *calyce* hemisphærico, imbricato, æquali, foliolis obtusis. *Corollæ* omnes hermaphroditæ, tubulofæ. *Receptaculum* convexum, nudum. *Pappus* aristis tribus, capitatis.

Habitat cultus in Cochinchinâ, & Chinâ.
Uſus. Folia contusa dant optimam tincturam cæruleam, viridemq; ueſciori methodo parabilem, & coloris nitore non inferiorem Indigoferæ Tinctoriæ.

Observ. Abecedaria Rumphii (Amb. l. 11. c. 35. t. 65.) vix a noſtrâ plantâ formâ differt, si pedunculos 1-floros, & laterales prætermittamus: sed imprimis diversam esse judico, quia diligens Author de uſu tinctorio prorsus tacet. Hoc uſu, & aliquibus notis convenit cum Serratulâ Tinctoriâ (Lin. sy. pl. sp. 1.): ast, præter diversa folia, Pappi aristæ ad Spilanthon revocant.

GENUS XII. AGERATUM.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Papp.* 5-aristatus. *Cal.* oblongus, sub-equalis. *Corollæ* 4-fidæ. Lin. sy. pl. G. 1016.

Sp. 1. AGERATUM CILIARE. 3. . . .
Differ. spec. *Ag.* *foliis* ovatis, crenatis, obtusis: *caule* glabro. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 2-pedalis, erectus, crassus, glaber, sub-fuscus, ramosus. *Folia* ovata, sub-acuta, crenata, venosa, glabra, opposita. *Flos* terminalis, sub-umbellatus. *Calyx* sub-ovatus,

tus, sub-æqualis. *Corollulæ* tubulosæ, hermaphroditæ, 5-fidæ. *Stamina*, & *stylus* calyci sub-æqualia. *Stigmata*. 2 filiformia, longa. *Corona* *seminum* cuspidibus 5 elevata. Receptaculum nudum. Habitat incultum propè Cantonem Sinarum. *Centaurium* ciliare minus, *Bisnagaricum*, *Origani* foliis amplioribus & floribus in umbellis. Pluk. Almag. 93. tab. 81. fig. 4.

GENUS XIII. CACALIA.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* pilosus. *Cal.* cylindricus, obtusus, basi tantum sub-caliculatus. Lin. sy. pl. G. 1013.

† Sp. 1. CACALIA PROCUMBENS. α Rau lui. β . . .
Differ. spec. Cac. *caule* suffruticoso, procumbente: *foliis* ovato-lanceolatis, sub-ferratis, carnosis: *racemis* elongatis, interruptis.
Hab., & notæ. *Caulis* perennis, 9-pedalis, multiplex, procumbens, inermis, teres, æqualis, glaber, succosus, ramosus. *Folia* ovato-lanceolata, sub-ferrata, lète viridia, carnosæ, glabra, alterna, petiolata. *Flos* aureus, racemis terminalibus, elongatis, interruptis. *Calyx* cylindricus, lævis, calyculatus. *Corollulæ* omnes hermaphroditæ, tubulosæ, paucæ, longæ, limbi laciniis erectis. *Receptaculum* nudum. *Pappus* pilosus, longus.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ tam culta, quam agrestis. *Sonchus* *Volubilis*. Rumph. Amb. I. 8. c. 78. tab 103. fig. 2. Usus. Inter olera salubria habetur, & indigenarum mensis apponitur. Est varietas caulis, & foliis subtus purpureis, cætera non differens.

† Sp. 2. CACALIA BULBOSA. α Cay Tam thát. β Sân sät.
Differ. spec. Cac. *foliis* radicalibus lyratis: *caule* sub-nudo: *panicula* pauciflorâ.
Hab., & notæ. *Radix* bulbus sub-rotundus, nodosus, perennis. *Folia* radicalia oblonga, lyrata, denticulata, sub-carnosa, petiolata, pauca. *Caulis* sesquipedalis, sub-nudus, erectus, teres. *Flos* aureus, pedunculo polyfloro, terminali. *Calyx* cylindricus: *calyculus* 5-phylloides, foliolis filiformibus, laxis. *Corollulæ* omnes tubulosæ: tubulis calycem superantibus, inflatis, reflexis: limbo brevi, connivente. *Stigmata* 2, longa, erecta.

Habitat culta, incultaque in Chinâ, & Cochinchinâ.
Virtus. Emolliens, Refrigerans, Resolvens. Usus potissimum externus. Cataplasma resolvit tumores lenitque dolores mamillarum: convenit etiam in Ersipelite. Succus foliorum prodest in Ophthalmiâ antiquâ, rubore, & doloribus oculorum. Gargarisma dolores, & inflammationem faucium mitigat.

Sp. 3. CACALIA SONCHIFOLIA. α Cây Mát tlang.

Differ. spec. Cac. *Caulis* herbaceo : *foliis* lyratis , amplexicaulibus , dentatis. Lin. sp. 9.

Hab. , & notæ. *Caulis* herbaceus , annuus , sesquipedalis , teres , erectus , interdum divisus , reclinatus. *Folia* oblonga , profunde lyra-ta , dentata , amplexicaulia , carnosa , pilosa , glauca : seminalia sub-rotunda , maculâ purpureâ lunatâ subtus notata. *Flos* purpurascens , paniculâ terminali , pauciflorâ. *Calyx* simplicissimus , oblongus , ba-fi sub-ventricosus. *Receptaculum* nudum. *Flosculi* omnes tubulosi , pedicellis longis. *Pappus* pilosus , longus.

Habitat spontanea in agris , & hortis minus cultis in Cochinchinâ. Sonchus Amboinicus. Rumph. Amb. I. 8. c. 77. tab. 103. fig. 1.

Tagolina Lusonum , flore purpureo. Petiv. Gaz. tab. 80. fig. 13.

Virtus: totius herbæ. Abstengens.

Usus. Tenera folia cruda edulia sunt.

† Sp. 4. CACALIA PINNATIFIDA. β Cieh fân sat.

Differ. spec. Cac. *foliis* pinnatifidis : *laciniis* lanceolatis , serratis : *caule* herbaceo , tortuoso.

Hab. , & notæ. *Caulis* herbaceus , 2-pedalis , erectus , tortuosus , cras-fus. *Folia* pinnato-incisa , laciniis lanceolatis , serratis , glabris , nec carnosis. *Flos* luteus , paniculâ terminali , pauciflorâ. *Calyx* oblon-gus , teres , calyculatus. *Corollæ* omnes hermaphroditæ , tubulo-sæ. *Pappus* pilosus.

Habitat prope Cantonem Sinarum inter Oryzæ segetes : unde verna-culum nomen Sinense *Cacalia Segetum*.

Observ. Invenitur apud Linnæum (sy. pl. vol. 3. pag. 712 , & Mant. pag. 281) species Cacaliæ dicta Pinnatifida , cum pinnatifida non sit , sed bipinnata , quæ hoc nomine rectius indicatur a Linnæo Juniore. Suppl. pl. pag. 353. Nostra vero , cum habeat folia sim-plicia , nec pinnata , aut bipinnata , meliori jure Pinnatifidæ nomen , & locum occupabit.

GENUS XIV. CHRYSOCOMA.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* simplèx. *Calyx* hemisphæricus , imbricatus. *Stylus* vix flosculis longior. Lin. sy. pl. 1019.

Sp. 1. CHRYSOCOMA VILLOSA. α Rau cúc.

Differ. spec. Chrys. herbacea , *foliis* lanceolatis , villosis : *calycibus* ar-ctis. Lin. sp. II.

Hab. , & notæ. *Caulis* herbaceus , sesquipedalis , erectus , teres , in-
canus ,

S Y N G E N E S I A . P O L Y G A M I A Ä Q U A L I S . 487

canus, ramosus. *Folia* lanceolato-linearia, integerrima, villosa, incana, alterna, sessilia. *Flos* luteus, umbellis parvis, terminalibus. *Calyx* arctus, pilosus, hemisphaericus, imbricatus. *Receptaculum* nudum. *Pappus* simplex.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

Coniza tomentosa, & incana, floribus luteis umbellatis. Amman. Ruth. pag. 141. n. 190. *Aster* incanus, calycibus laxis, oblongis, foliolis ex linearie lanceolatis, floribus nudis, umbellatis. Gmel. Silv. 2. pag. 192. tab. 82. fig. 2.

G E N U S X V . E U P A T O R I U M .

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* plumosus. *Calyx* imbricatus; oblongus. *Stylus* semibifidus, longus. Lin. sy. pl. G. 1015.

Sp. 1. EUPATORIUM PURPUREUM. α Cây Bach son.

Differ. spec. Eup. *foliis* quaternis, scabris, lanceolato-ovatis, inaequilater serratis, petiolatis, rugosis. Lin. sp. 14.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 3-pedalis, erectus, simplex, striatus, parum ramosus. *Folia* congesta, sub-quaterna, ovato-lanceolata, sub-serrata, rugoso-aspera, sub-sessilia, obscuro-viridia. *Flos* purpureus, corymbo fastigiato. *Calyx* imbricatus, oblongus, sub-octoflorus: flosculis tubulosis hermaphroditis: *stylus* semibifido, longo. *Receptaculum*, sub-nudum. *Pappus* pilosus.

Habitat spontaneum in agris Cochinchinæ.

Eupatorium Canadense, longioribus foliis, rugosis, integris, & caulinis ferrugineis. Moris. hist. 3. pag. 97. tab. 13. fig. 4.

† Sp. 2. EUPATORIUM SINUATUM. γ. . . .

Differ. spec. Eup. *foliis* ovatis, sinuatis, pilosis, alternis; *calycibus* sub-octofloris.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 3-pedalis, erectus, hispidus. *Folia* ovata, sinuata, denticulata, pilosa, alterna. *Flos* purpurascens, sub-octoflorus, paniculis terminalibus. *Calyx* oblongus, imbricatus, flosculis tubulosis uniformibus. *Stylus* longus, semibifidus. *Receptaculum* concavum, nudum.

Habitat agreste in insulâ Africanâ Mozambicco.

G E N U S X VI . C A L E A .

Char. Gener. *Recept.* paleaceum. *Pappus* pilosus, *Cal.* imbricatus. Lin. sy. pl. G. 1021.

† Sp. 1. CALEA CORDATA. & Cây Bạc đao.

Differ. spec. Cal. *floribus* sub-ternis : *foliis* cordatis, alternis.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 2-pedalis, erectus, ramosus. *Folia* cordata, sub-crenata, venosa, subtus tomentosa, alterna. *Flos* dilutè purpureus, pedunculis 3-4-natis, terminalibus. *Corolla* composita, uniformis, flosculis hermaphroditis, tubulosis, æqualibus. *Calyx* hemisphæricus, imbricatus. *Receptaculum* paleaceum. *Pappus* pilosus, brevis, in aliquibus sub-nullus.

Habitat spontanea in Cochinchinâ.

GENUS XVII. BIDENS.

Char. Gener. *Recept.* paleaceum. *Pappus* aristis erectis, scabris. *Cal.* imbricatus. *Cor.* rarius flosculo uno, altero ye radiante instruitur. Lin. sy. pl. G. 1012.

Sp. 1. BIDENS PILOSA. &c. . . .

Differ. spec. Bid. *foliis* pinnatis, sub-pilosis : *caule* geniculis barbatis : *calycibus* involucro simplici : *seminibus* divergentibus. Lin. sp. 7.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 3-pedalis, erectus, angulatus, geniculis barbatis. *Folia* imparipinnata, foliolis ovato-lanceolatis, ferratis, sub-pilosis. *Flos* terminalis, luteus, paniculis erectis, paucifloris. *Calyx* imbricatus, involucro patente, 5-phyllo, foliolis oblongis, parvis. *Flosculi* emnes sæpius hermaphroditi, tubulosi : interdum flosculi pauci fæminei, nudi in radio. *Semina* longiscula, angulata, divergentia : *pappo* aristato. *Receptaculum* paleis oblongis, deciduis.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

Thunb. Japon. pag. 307. Agrimonia Molucca. Rumph. Amb. I. 16 cap. 27. tab. 15. fig. 2.

Virtus. Radix Odontalgica. Folia Ophthalmica, & contra tussim, & ambustiones valere dicuntur.

Sp. 2. BIDENS BIPINNATA. & Cây Lòòng đèn. &c. . . .

Differ. spec. Bid. *foliis* bipinnatis, incisis : *calycibus* involucratis : *corollis* semiradiatis : *seminibus* divergentibus. Lin. sp. 8.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, simplex, erectus, 2-pedalis, subquadrangularis. *Folia* impari-bipinnata, bijuga : *foliolis* ovato-lanceolatis, ferrato-incisis. *Flos* aureus, axillaris, 2-natus : *calycibus* imbricatis, squarrosis, apicibus squamarum reflexis. *Corollulae* omnes hermaphroditæ ; *disci* tubulosæ, longæ : *radii* ligulatæ, paucæ,

SYNGENESIA. POLYGAMIA EQUALIS. 489

breves. Semina longissima. 4-gona, recurva: pappo 3-aristato. Receptaculum paleaceum.

Habitat spontanea in Cochinchinâ, & Chinâ.
Burm. Ind. pag. 175. Chrysanthemum Chinense foliis plurifariam divisum, Halicacabi peregrini æmulis. Pluk. Phyt. tab. 22. fig. 4.

GENUS XVIII. PTERONIA.

Char. Gener. Recept. setis multipartitis. Pappus sub-plumosus. Cal. imbricatus. Lin. sy. pl. G. 1017

† Sp. 1. PTERONIA TOMENTOSA. § Chú hōa mū.

Differ. spec. Pter. foliis lanceolatis, ferratis, tomentosis, sparsis.

Hab., & notæ. Caulis suffruticosus, sesquipedalis, simplicissimus, rectissimus. Folia lanceolata, serrata, tomentosa, petiolata, sparsa.

Flos violaceus, paniculâ terminali. Calyx imbricatus, oblongus.

Flosculi omnes tubulosi, hermaphroditi. Receptaculum setosum.

Pappus pilosus. Pistillum vix corollæ æquale.

Habitat spontanea prope Cantonem Sinarum.

POLYGAMIA SUPERFLUA.

GENUS XIX. ARTEMISIA.

Char. Gener. Recept. sub-villosum, vel nudiusculum. Pappus nullus. Cal. imbricatus squamis rotundatis, conniventibus. Cor. radii nullæ. Lin. sy. pl. G. 1025.

Sp. 1. ARTEMISIA JUDAICA. α Ngaoe phu duong. β Ngaoc fū yong.

Differ. spec. Art. fruticosa, foliis ob-ovatis, obtusis, lobatis, parvis: floribus paniculatis, pedicellatis. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. Caulis fruticosus, 1-pedalis, erectus, pollicem crassus, ramosissimus: ramis longis, patentissimis, reclinatis. Folia sessilia, sparsa, utrinque tomentosa, cinerea, crassa, graveolentia, obtusa: inferiora sub-turbinata, plerumque 3-lobata: superiora oblonga, integerrima. Flos luteus, paniculâ racemosâ, terminali. Corolla sub-rotunda, parva, composita flosculis omnibus tubulosis. Foliorum formâ convenit cum Art. Japonicâ Thunb. Jap. pag. 310.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ.

Berg. Mat. Med. pag. 708. n. 416. Artemisia tota cinerea. Gron. Orient. 259. Absinthium Santonicum Judaicum, & Alexandrinum. Bauh. Pin. pag. 139. n. 1, 2.