

Virt. Foliorum, & seminum. Tonica, Stomachica, Anthelmintica.
Sapor amarus.

Obsery. Folia non sunt ita parva ut in Palestina, sed semipollucari magnitudine.

† Sp. 2. ARTEMISIA AQUATICA. & Cây thuy tung. & Hải tảo.

Differ. spec. Art. *Arborescens*, *foliis multipartitis*, utrinque glabris: *laciniis* capillaribus: *racemis* spicatis.

Hab., & notæ. *Caulis* arboreus, tortuosus, nodosus, 8-pedalis, erus crassus: *ramis* similiter distortis, patentibus, glabris, *ramulis*, *petiolis*, & *pedunculis* fusco-rubris. *Folia* sparsa, sub-rotunda, profundè multipartita, *laciniis* capillaribus, tenuibus, glabris, atrovirentibus, inodoris. *Flos* albus, minusculus, globofus: *racemis* longis, terminalibus, in spicas lineares desinentibus. *Flosculi* omnes tubulosi. *Receptaculum*, & *semina* nuda.

Habitat culta in Cochinchinâ, & Chinâ, puto, quod etiam agrestis. Aquam amat, indeque nomen vernaculum. Per multos annos servatur in vase aquâ pleno crescens, & florens, a terrâ profus remota.

Observ. Affinitatem habet, vel fortasse est eadem cum Artemisia Capillari Thunbergii. Japon. pag. 309.

Sp. 3. ARTEMISIA ABROTANUM. & Thanh hao. & 粵 chin hao.

Differ. spec. Art. *fruticosa*, *foliis* setaceis, ramosissimis. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Caulis* erectus, 3-pedalis, (in Cochinchinâ herbaeus, annuus) striatus, rectus, glaber, ramosissimus. *Folia* sparsa, petiolata, plurima, glabra, multifida, *laciniis* setaceo-linearibus, angustissimis, pallidè viridibus. *Flos* luteus, minimus, plurimus: spicis linearibus, erectis, terminalibus. *Calyx* imbricatus, foliolis brevibus, sub-continentibus. Sapor florum amaricans: foliorum sub-acutus. Odor gratus.

Habitat incultum, cultumque in Cochinchinâ, & Chinâ.

Thunb. Jap. pag. 309. Abrotanum Campestre. Hill. Brit. herb. pag. 463.

tab. 66. fig. 16. Abrotanum Mas, angustifolium. Bauli. Pin. 136. n. 3.

Virtus: foliorum, & florum. Tonica, Pellens, Emmenagogue. Extratum cum melle prodest in Chlorosi, & Phtysi incipiente.

Sp. 4. ARTEMISIA ANNUA. & Tsao cão.

Differ. spec. Art. *foliis* triplicato-pinnatis, utrinque glabris: *floribus* sub-globosis, nutantibus: *Receptaculo* glabro, conico. Lin. sp. 15.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, erectus, simplex, rectissimus, 8-pedalis, teres, striatus, glaber, viridis, in senectute rubro-fuscus, sub-lignosus: *ramis* obliquis, trifariam alternis. *Folia* pinnata, pinnis 2-pinnatifidis, oblongis, sub-acutis, utrinque glabris. *Flos*

dilutè luteus, racemis oblongis, erectis, axillaribus, plurimis: pendunculis propriis longiusculis, bracteâ lanceolatâ, integerimâ comitante. *Calyx* hemiphæricus, imbricatus bino ordine, foliolis oblongis, incurvis, sub-concavis. *Flosculi* omnes hermaphroditi, tubulosi, 5-fidi, breves. *Receptaculum* ovatum, sub-villosum. *Pappus* nullus. Integer flos grano Piperis minor est. Tota planta suavissimum odorem spirat, etiam post longum tempus exsiccata.

Habitat prope Pekinum Sinarum: unde semina in Lusitaniam detuli, quæ hinc facile germinant, plantas ad altitudinem 10 pedum spontaneè emitentia.

Absinthium Tanaceti folio odoratissimum. Amman. Ruth. pag. 142. n. 193. tab. 23. Artemisia radice annua, foliis pinnatis: pinnis pinnatifidis: calycibus sub-rotundis, ferè erectis ex aliis copiosissimis. Gmel. Sibir. 2. pag. 125. n. 108.

Virtus: foliorum, & florum. Balsamica, Tonica. Prodest in febribus hecticis, in dysenteriâ, & ulceribus putridis.

Sp. 5. ARTEMISIA VULGARIS. & Thuoc kau. & Ngai ye.

Differ. spec. Art. foliis pinnati-fidis, planis, incisis, subtus tomentosis: racemis simplicibus, recurvatis: florum radio 5-floro. Lin. sp. 18.

Hab., & notæ. *Caulis* simplex, annuus, erectus, teres 4-pedalis: *radice* perenni, repente: *ramis* teretibus, ascendentibus. *Folia* pinnati-fida, laciniis incisis, acutis, planis, subtus incanis, tomentosis. *Flos* pallidus, sub-globosus, sub-sessilis, spicis linearibus, terminalibus. *Foliola* calycis longiuscula, rotundata, conniventa. *Corollulae* disci 5-fidæ, hermaproditæ, tubulose, breves: radii fœmineæ, paucæ. *Receptaculum* sub-villosum. *Pappus* nullus.

Habitat inculta, cultaque in Cochinchinâ, & Chinâ.

Burm. Indiæ pag. 177. Thunb. Jap. pag. 310. Artemisia Latifolia.

Rumph. Amb. I. 8. c. 54. tab. 91. fig. 2.

Virtus: foliorum, & florum. Tonica, Balsamica, Deobstruens, Emmenagoga, Stomachica, Antispasmodica. Valet in Chlorosi, Cachexiâ, Nauseâ. Externè in ventriculi doloribus, ulceribus putridis; & cum oleo sesami contusa tollit, vel saltem lenit dolores, & contractiones membrorum, eorumque motus conyulsivos: quod apud indigenas familiare remedium, & a Rumphio pariter commendatum.

Observ. Hæc planta tam formâ, quam qualitatibus est quasi media inter Artemisiam Vulgarem, & Absinthium. Odor balsamicus, nec ingratus. Sapor vix amaricans. Virtus utriusque, aut etiam superior.

Sp. 6. ARTEMISIA CHINENSIS. & Khí ngái.

Differ. spec. Art. *foliis simplicibus*, *tomentosis*, *obtusis*, *lanceolatis*: *inferioribus cuneiformibus*, *trilobis*. Lin. sp. 22.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, simplex, 2 pedes cum semife a-
furgens, rectus, crassus, multo tomento albescens, ramosus. *Folia*
inferiora obtusa, 3-loba: *superiora lanceolato-linearia*, *integerrima*,
utrinque tomentosa, *fessilia*, *plurima*, *conferta*, *sparsaque*. *Flos*
parvus, *pallidus*, *racemis terminalibus*, *erectis*. *Planta inodora*, &
fere insipida.

Habitat Cantone Sinarum.

Artemisia foliis radicalibus a caulinis diversis. Gmel. Sibir. 2. pag. 61.
fig. 1, 2.

Absinthium maritimum Sinarum, Lavendulæ folio, pulchrioribus co-
rumbis, inodorum, sapore aromatico. Pluk. Amalt. 3. tab. 153. fig. 5.

Virtus. Ex plantæ hujus foliis exsiccatis, & contusis fit *Moxa*, seu
cauterium actuale non spernendæ efficaciæ ad discutiendos tumores,
& dolores rheumaticos, ac arthriticos, levésque convulsiones. In
hunc finem solent Medici Sinenses uti hac specie Artemisiæ: at Co-
chinchinenses utuntur Artemisiâ Vulgari, supra descriptâ, sicut etiam
Japonenses, testibus Thunbergio, & Kœmpfero: quam ego expe-
rientiâ ductus judico efficaciorem. Nec audiendi sunt Leuwenhoe-
kius, & alii, qui putant eundem effectum sortiri posse *Gossypium*,
vel solum ignem; nam propria virtus hujus plantæ Antispasmodi-
ca, & Deobstruens igne actuali agitata, & intrusa proculdubio
efficacius operabitur.

† GENUS XX. CENTIPEDA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Communis imbricatus bino ordine, squamis oblongis, conca-
vis, erectis, glabris, exterioribus coloratis.

Cor. Composita discoidea: flosculi hermaphroditæ 8 circiter in disco:
foeminei petalis nudi, plurimi in radio. Propria hermaphroditis in-
fundibuliformis, brevissima: limbo 4-fido.

Stam. Filamenta hermaphroditis sub-nulla. Antheræ 5, in cylindrum
connatæ.

Pist. Hermaphroditis Germen oblongum. Stylus crassus, brevissimus.
Stigma 2-fidum, minimum.

Fœmineis similiter, sed omnia tenuiora.

Sem. Omnibus solitaria, oblonga, sub-teretia: setis inversis hispida.
Pappus nullus.

Rece-

Recept. Hemisphæricum, nudum.

Nom. Centipedam vocavi ob ramulos centuplicatos, quibus hæc plantæ terræ incumbit.

Char. Gener. Recept. nudum. *Pappus* nullus. *Cal.* imbricatus, squamis erectis, coloratis. *Sem.* setis inversis.

Sp. 1. CENTIPEDA ORBICULARIS. & Co theilum relq. missum

Differ. spec. Cent. procumbens, ramosissima: foliis dentatis: floribus axillaribus, solitariis.

Hab. Herba annua: caule 4-pollicari, procumbente, ramosissimo, terræ in orbem appresso: radice repente. *Folia* minuscula, sparsa, glabra, sub-cuneiformia, dentibus 2-4, nunc oppositis, nunc alternis. *Flos* purpurascens, solitarius, sessilis, axillaris. Odor plantæ sub-nullus. Sapor acer.

Habitat inculta in agris Cochinchinæ.

Artemisia Minima. Lin. sy. pl. v. 3. pag. 746. Burm. Ind. pag. 177. tab. 58. fig. 3.

Observe. Minus differt ad Artemisiæ Carpesium, quam Centipeda. Cur ergo illud privatum Genus afferet, non ista?

GENUS XXI. COTULA.

Char. Gener. Recept. sub-nudum. *Pappus* marginatus. *Corollulæ* disci 4-fidæ: radii fere nullæ. Lin. sy. pl. G. 1050.

Sp. 1. COTULA ANTHEMOIDES. & Rau Kaœ.

Differ. spec. Cot. foliis pinnato-multifidis dilatatis: floribus flosculosis. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 1-pedalis, sub-erectus, pilosus, ramosus. *Folia* multifida, pinnato-incisa, pubescentia. *Flos* luteus, sub-globosus, solitarius, pedunculis longis. *Calyx* sub-simplex, polyphyllus. *Corollulæ* disci 4-fidæ, tubulosæ, hermaphroditæ: flosculi radii fæminei, nudi. *Receptaculum* nudum. *Pappus* sub-nullus.

Habitat agrestis in agris, & hortis Cochinchinæ.

Cotula foliis pinnato-multifidis: corollis radio destitutis. Cliff. pag. 417. Anantocyclus Chamæmeli folio. Dill. Elth. 26. tab. 23. fig. 25.

GENUS XXII. BACCARIJS.

Char. Gener. Recept. nudum. *Pappus* pilosus. *Cal.* imbricatus, cylindricus. *Flosculi* fæminei hermaphroditis immixti. Lin. sy. pl. G. 1029.

194. SYNGENESIA. POLYGAMIA SUPERFLUA

Sp. 1. BACCHARIS DIOSCORIDIS. a Gay Tu bi. & Laot. fū Nāo
Differ. spec. Bac. *foliis* lato-lanceolatis, dentatis, sessilibus, stipulatis.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, 3-pedalis, erectus, ateres : *namis*
multis debilibus. *Folia* lato-lanceolata, dentata, sessilia, alterna,
semiamplexicaulia, atro-viridia, glabra, aromatica, stipulata. *Flos*
luteus, multus, corymbis terminalibus : *calyx* oblongo, imbrica-
to : *pappo* piloso, longo : *receptaculo* nudo.

Habitat tam agrestis, quam culta in Cochinchinā, & China.

Lin. Jun. Sup. pl. pag. 366. Coniza maior altera. Bauh. Pin. pag.

Virtus : foliorum. Tonica, Cephalicaria.

† Sp. 2. BACCHARIS SALVIA. a Gay Dai bi.

Differ. spec. Bac. *foliis* lanceolatis, denticulato-serratis, tomentosis,
basi appendiculatis : *paniculis* laxis, terminalibus.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, 8-pedalis, erectus, multiplex, te-
res, lanosus, albicans: *radice* sèpè repente. *Folia* lanceolata, den-
ticulato-serrata, rugosa, tomentosa, sparsa : *petiolis* pinnato-alatis.
Flos luteus, paniculis magnis, patentibus, terminalibus. *Calyx* oblon-
gus, sub-cylindricus, imbricatus, cinereus. *Flosculi* foeminei immix-
ti hermafroditis, tubulosis, erectis. *Pappus* pilosus flosculis lon-
gior. *Receptaculum* nudum. Odor plantæ balsamicus; salviæ Offi-
cialis æmulus. Sapor amaricans.

Conyza Balsamifera. Lin. sy. pl. 3. pag. 774. sp. 15. Conyza Odora-
ta, aut Helenium Salviæ odorem spirans. Cluf. ex Doct. Colio.
Exot. 1. 4. cap. 23. Conyza Odorata, Sombong. Rumph. Amb.
I. 10. c. 41. tab. 24. fig. 1. *Salvia Indica* Arborescens. Bont. Jav.
I. 6. c. 60.

Virtus : maximè foliorum. Calefaciens, Tonica, Stomachica, Uteri-
na, Antispasmodica. Valet, tam internè, quam externè in Paralysi,
Stomachi, & artuum debilitate, Leucorrhœa.

† Sp. 3. BACCHARIS CHINENSIS. a Xān po leng.

Differ. spec. Bac. *foliis* lanceolatis, integerrimis, subtus tomentosis,
petiolatis : *pedunculis* polyfloris, axillaribus.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 3-pedalis, erectus, simplex, te-
res. *Folia* lanceolata, integerrima, subtus tomentosa, alterna, pè-
tiolis brevibus. *Flos* luteus, oblongus, pedunculis axillaribus, po-
lyfloris. *Calyx* cylindricus, imbricatus. *Corollæ* hermafrodite tu-
bulosæ, foemineis mixtæ. *Pappus* pilosus, longus. *Receptaculum* nu-
dum.

Habitat

Habitat inculta prope Cantonem Sinarum.

G E N U S XXIII. CONYZA.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* simplex. *Cal.* imbricatus, sub-rotundus. *Cor.* radii trifidae. Lin. sy. pl. G. 1030.

Sp. 1. CONYZA PUBIGERA. α Đậu xuong trăng.

Differ. Spec. Con. *foliis* oblongis, sub-dentatis, sub-petiolatis: *pedunculis* lanatis, sub-bifloris. Lin. sp. 11.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 8-pedalis, scandens, teres, ramosus. *Folia* lato-lanceolata, basi attenuata, sub-dentata, sub-pubescentia, sparsa, petiolata. *Flos* luteus, axillaris, sub-terminalis, pedunculis paucifloris. *Calyx* lanatus, albicans, squamis imbricatis, erectis. *Corollulae* tam. hermaphroditæ, quam foemineæ omnes breves, pappo piloso immersæ, *Receptaculum* nudum.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

Sonchus Volubilis. Rumph. Amb. I. 8. cap. 78. tab. 104. fig. 1.

Sp. 2. CONYZA CANDIDA. α Bạc đài com.

Differ. Spec. Con. *foliis* ovatis, tomentosis: *floribus* confertis, pedunculis lateralibus, terminalibusque. Lin. sp. 13.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, sesquipedalis, erectus, teres, pilosus, albicans, ramosus. *Folia* ovata, utrinque tomentosa, albicanitia, integerrima, alterna. *Flos* purpureus, pedunculatus, congestus, lateralis, & terminalis. Planta grati odoris.

Habitat inculta in Cochinchinâ.

Conyzza Cretica, fruticosa, folio molli candidissimo, & tomentoso.

Tournef. Inst. Corol. pag. 33. Vaillant. Act. Paris. 1719. pag. 394.

Sp. 3. CONYZA ODORATA. $\alpha \dots$

Differ. Spec. Con. *foliis* ovatis, ferratis, sub-tomentosis, acutis: *cau-
le* corymboso: *corollis* sub-globosis. Lin. sp. 17.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, 4-pedalis, erectus: *ramis* in ferram Corymbi assurgentibus. *Folia* oblongo-ovata, sub-ferrata, tomentosa, sessilia, alterna. *Flos* purpureus, lateralis, & terminalis, polynatus, sub-rotundus, corollulis omnibus ultra calycem non prodeuntibus ob brevitatem.

Habitat agrestis in Cochinchinâ. Planta odorifera.

Burm. Ind. pag. 179. Conyzza Odorata, minor, erecta, purpurascens, corymbosa, foliis ovatis, villosis. Brown. Jam. 318.

Sp. 4. CONYZA CHINENSIS. α Rau sōung ān goi.

Differ. spec. Con. *foliis lanceolato-ovatis*, reflexo-serratis, subtus tomentosis: *floribus terminalibus*, congestis. Lin. sp. 18.

Hab. & notæ. *Caulis* suffruticosus, 4-pedalis, erectus, teres, glaber, ad apicem ramosus. *Folia* lanceolato-ovata, sub-serrata, duriuscula, petiolata, alterna. *Flos* luteus, congestus, pedunculatus, terminalis. *Calyx* imbricatus, ventricosus, ore connivens. *Corollæ* radii foemineæ, 3-fidæ, tenuissimæ. *Pappus* pilosus. *Receptaculum* sub-villosum.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

Burm. Ind. pag. 179. Senecio Amboinicus. Rumph. Amb. I. 10. c. 25. tab. 14. fig. 2.

Sp. 5. CONYZA HIRSUTA. α Co duoi hùm. β Hò mì tsao.

Differ. spec. Con. *foliis ovalibus*, integerrimis, scabris, subtus hirsutis. Lin. sp. 19.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 1-pedalis, erectus, simplex, teres, hirsutus, paucifolius. *Folia* oblonga, sub-acuta, denticulata, pilosa, sparsa. *Flos* luteus, confertus, terminalis. *Calyx* pilosus, brevis. *Flocculi* foeminei nudi in radio. *Pappus* simplex. *Receptaculum* nudum.

Habitat inculta in Cochinchinâ, & in Chinâ.

Burm. Ind. pag. 180. Miller. Dict. n. 18.

† G E N U S XXIV. P L A C U S.

Descriptio Naturalis.

Cal. Communis imbricatus, inversè turbinatus: squamis linearibus, tenuibus, erectis.

Cor. Composita calyci æqualis, erecta: corollulæ hermaphroditæ tubulosæ, 5-fidæ, paucæ in disco: Foemineæ nudæ, plurimæ in radio.

Stam. Hermaphroditis: Filamenta 5, brevissima. Anthera cylindrica, tubulosa.

Pist. Utrisque Germen longiusculum. Stylus filiformis, brevis. Stigmata 2, oblonga: hermaphroditis erecta: foeminis reflexa.

Peric. nullum. Calyx immutatus.

Sem. Omnibus oblonga: foeminis tenuiora. Pappus pilosus.

Recept. nudum, convexum.

Nom. (Πλακός placenta) ab usu apud indigenas condendi placetas succo odoro hujus plantæ.

Char.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* pilosus. *Cal.* imbricatus, inversè turbinatus: squamis linearibus. *Cor.* radii nullæ.

† Sp. 1. PLACUS TOMENTOSUS. α Cúc bánh it, hoa tím.
Differ. spec. Plac. *foliis* ovatis, obtusis, ferratis, utrinque tomentosis.

Hab. *Planta* herbacea, 2-pedalis, erecta, ramosa. *Folia* ovata, obtusa, ferrata, utrinque tomentosa, sessilia, alterna, odorifera. *Flos* violaceus, paniculis oblongis, erectis, terminalibus.

Habitat agrestis, cultusque in Cochinchinâ.

† Sp. 2. PLACUS LÆVIS. α Cúc bánh it, hoa vàng.

Differ. spec. Plac. *foliis* ovatis, acuminatis, ferratis, glabris: *paniculis* brevibus.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, sesquipedalis, erectus, teres, striatus, glaber, ramosus. *Folia* ovata, acuminata, ferrata, glabra, alterna. *Flos* pallidè luteus, paniculis brevibus, terminalibus. *Calyx* ad basim ventricosus, fóliolis linearibus, imbricatis, erectis, lævibus. *Flosculi* radii foeminei, nudi. *Receptaculum* plano-convensum, nudum. *Pappus* pilosus.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

GENUS XXV. GNAPHALIUM.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* plumosus. *Cal.* imbricatus, squamis marginalibus rotundatis, scariosis, coloratis. Lin. sy. pl. G. 1026.

Sp. 1. GNAPHALIUM INDICUM. α Cây Sơn.

Differ. spec. Gnaph. herbaceum, *foliis* lanceolatis: *caule* ramosissimo diffuso: *corymbis* inæqualibus: *calycibus* intus coloratis. Lin. sp. 42.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 1-pedalis, reclinatus, ramis multis diffusis. *Folia* lanceolata, dentata, alterna. *Flos* purpureus, discoideus, sub-rotundus, terminalis, paniculâ erectâ: *calycis* squamis rubescensibus.

Habitat agreste in Cochinchinâ.

Burm. Ind. pag. 177. Gnaph. latiore folio, minus ramosum, capitulis pallescentibus. Pluk. Almag. 172. tab. 187. fig. 5.

† Sp. 2. GNAPHALIUM SINUATUM. α

Differ. spec. Gnaph. herbaceum: *ramis* assurgentibus: *foliis* ovato-lanceolatis, sinuatis, dentatis, utrinque pilosis.

Hab.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 4-pedalis, simplex, erectus : *ramis* ascendentibus. *Folia* ovato-lanceolata, inciso-sinuata, dentata, utrinque tomentosa, alterna, magna. *Flos* luteus, paniculis terminalibus, erectis : *calycis* squamis marginalibus rubris, membranaceis.

Habitat agreste in Cochinchinâ.

GENUS XXVI. XERANTHEMUM.

Char. Gener. *Recept.* paleaceum. *Pappus* setaceus. *Cal.* imbricatus, radiatus : radio colorato. Lin. sy. pl. G. 1027.

† Sp. 1. XERANTHEMUM CHINENSE. β Siaó loué n̄gi.
Differ. spec. Xer., *caule* herbaceo, simplicissimo : *foliis* lanceolatis, ferratis.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, simplicissimus, teres, erectus, glaber, sesquipedalis. *Folia* lanceolata, ferrata, sub-glabra, alterna, petiolata. *Flos* luteus, radiatus, paniculâ terminali, pauciflorâ. *Calycis* squamæ intimæ apice reflexæ, flosculis longiores. *Semina* omnia coronata pappo multisetoso. *Receptaculum* paleis deciduis stratum.

Habitat incultum prope Cantonem Sinarum.

Sp. 2. XERANTHEMUM RFTORTUM. α Cúc râng Kua.

Differ. spec. Xer. *caulibus* frutescentibus, provolutis : *foliis* tomentosis, recurvatis. Lin. sp. 7.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, sesquipedalis, provolutus : *ramis* multis tortuosis diffusis. *Folia* oblonga, sinuato-incisa, tomentosa, incana, recurvata. *Flos* luteus, discoideus, corollis omnibus tubulosis, foemineis in radio. *Calyx* imbricatus, squamis patentibus, concoloribus, explanatis. *Receptaculum* sub-nudum. *Pappus* pilosus.

Habitat spontaneum in agris Cochinchinæ.

Xeranth. *receptaculis* nudis, *seminum* pappo plumoso. Hort. Cliff. p. 400. *Xeranthemoides procumbens*, polii folio. Dill. Elth. tab. 322. fig. 415.

GENUS XXVII. MATRICARIA.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* nullus. *Cal.* hemisphæricus, imbricatus : marginalibus solidis, acutiusculis. Lin. sy. pl. G. 1049.

† Sp. 1. MATRICARIA CANTONIENSIS. β Hí su tsu.

Differ.

Differ. spec. Matr. *foliis* inferioribus ferratis, summis integerrimis: *pedunculis* 1-floris: *flastulis* radii integris: *receptaculo* convexo.
Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, *selquipedalis*, *cespitosus*, *sub-erectus*, *ramosus*. *Folia* lanceolata, inferiora serrata, suprema integrissima. *Flos* radiatus terminalis, *solitarius*, *pedunculis* erectis. *Calyx* imbricatus hemisphaericus, *foliolis* acutis. *Flosculi* disci lutei, 5-fidi, breves, *sub-clausi*. *Flosculi* radii foeminei, *cærulei*, ligulati, integerrimi. *Receptaculum* convexum, nudum. *Pappus* nullus.

Habitat spontanea Cantone Sinarum.

Observ. Affinitatem habet, non proximam, cum Matricaria Asteroide.

Lin. sy. pl. sp. 6.

GENUS XXVIII. CHRYSANTHEMUM.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* nullus. *Cal.* hemisphaericus, imbricatus: *squamis* marginalibus membranaceis. Lin. sy. pl. G. 1048.

Sp. 1. CHRYSANTHEMUM INDICUM. α Dal cúc. β Tá Kiö hōa.

Differ. spec. Chrys. *foliis* simplicibus, ovatis, sinuatis, angulatis, ferratis, acutis. Lin. sp. 13.

Habitus, & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, radice perenni, 4-pedalis, erectus, teres: *ramis* obliquis, sub-divisis, laevibus. *Folia* ovata, acuta, pinnato-incisa, laciniis ferratis, acutis, inæqualibus, glabris, undulatis: petiolis sparsis. *Flos* sub-terminalis, pedunculis longis, sèpius 1-floris, solitariis. *Calyx* hemisphaericus, imbricatus, *foliolis* oblongis, planiusculis, arctatis, margine submembranaceis. *Flosculi* omnes ligulati. *Receptaculum* nudum. *Pappus* nullus. Hujus sunt multæ varietates, quæ aliquantulum differunt foliorum formâ, horumque, & caulis magnitudine: sed maximè florum colore, scilicet candido, rubescente, purpureo, violaceo, flavo, rufo.

Habitat in hortis Cochinchinæ, & Chinæ, latè cultum ob pulchritudinem floris, cuius diameter 3 pollices, & amplius æquat. Odor totius plantæ tenuis, nec magni faciendus.

Matricaria Sinensis. Rumph. Amb. l. 8. c. 53. tab. 91. fig. 1. Matricaria Sinensis, flore monstroso. Vail. Act. Paris. 1720. pag. 368.

† Sp. 2. CHRISANTHEMUM PROCUMBENS. α Kim cúc. β Siao Kjö hōa.

Differ. spec. Chrys. *foliis* sinuato-incisis, obtusis: *caule* procumbente. Hab., & notæ. *Caulis* perennis, 3-pedalis, procumbens, sèpè repens, tenuis, intricatus, ramosissimus. *Folia* ovata, obtusa, profundè

500 SYNGENESIA. POLYGAMIA SUPERFLUĀ.

fundè sinuata, laciniis ovatis, sub-tomentosa, petiolata, sparsa.
Flos terminalis, pedunculis polyfloris: *calyce* hemisphærico, imbricato, squamis æqualibus, sub-membranaceis: *receptaculo* nudo: *pappo* nullo. Hujus etiā inveniuntur multæ varietates. 1, flore pleno, integrè ligulato, flavo. 2, flore radiato, disco, & radio flavis. 3, disco flosculo flavo, radio ligulato albo. 4, flosculis omnibus albis, nunc semiflosculosis, nunc radiatis, hermaphroditis in disco, foemineis in radio. Omnium varietatum flores, etiam culti, semper parvi.

Habitat spontaneum, cultumque in Cochinchinâ, & Chinâ.

Matricaria Sinensis, minore flore, petalis, & umbone ochroleucis.

Pluken. Amalh. pag. 142. tab. 430. fig. 3.

Virtus: florum. Diaphoretica, Cephalica, Ophthalmica.

GENUS XXIX. ERIGERON.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* pilosus. *Cor.* radii linearēs, angustissimæ. Lin. sy. pl. G. 1031.

Sp. 1. ERIGERON PHILADELPHICUM. *Cay Con* hât.

Differ. spec. Erig. *caule* multifloro: *foliis* lanceolatis, sub-ferratis: *caulinis* semiamplexicaulibus: *flosculis* radii capillaceis, longitudine disci. Lin. sp. 9.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 3-pedalis, erectus, ramosus, multiflorus. *Folia* lanceolata, sinuata, sub-ferrata, caulina semiamplexicaulia. *Flos* luteus, paniculatus, terminalis, plurimus, oblongus: *corollis* radii tenuissimis, foemineis, erectis: *receptaculo* nudo: *pappo* piloso.

Habitat agreste in Cochinchinâ.

Observ. *Philadelphium* adoptavi, quia hujus notæ a Linnæo propositæ nostro conveniunt. Apud Auctores non inveni pleniorum descriptionem: si præterea valde differre observetur, Cochinchinense vocabitur.

Virtus: totius herbæ. Potenter menses ciet, nec tutò.

† Sp. 2. ERIGERON HIRSUTUM. *Ha sī koūc.*

Differ. spec. Erig. *caule* hispido, *foliis* linear-lanceolatis, sub-ferratis, utrinque pilosissimis.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 2-pedalis, erectus, teres, hispidus. *Folia* lanceolato-linearia, sub-ferrata, utrinque pilosissima, sparsa. *Flos* paniculâ terminali, erectâ, pauciflora. *Flosculi* disci hermaphroditæ, tubulosi, lutei: radii foeminei, ligulati, lineares, stricti, integerrimi, cærulei, multi. *Calyx* sub-squarrosus, imbricato.

SYNGENESIA. POLYGAMIA SUPERFLUACOSO

catus. *Pappus* pilosus, æqualis. *Receptaculum* nudum.
Habitat agreste circa Cantonem Sinarum.

GENUS XXX. SOLIDAGO.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* simplex. *Cor.* radii circiter 5.
Cal. squamæ imbricatæ, clausæ. Lin. sy. pl. G. 1035.

† Sp. 1. SOLIDAGO DECURRENS. *Hoàng kām siong.*

Differ. spec. Sol. *foliis* radicalibus sub-crenatis, decurrentibus : *thyrsos* terminali : radio sub-septemfloro.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, erectus, teres, simplex, 1-pedalis : radice fibrosa repente. *Folia* radicalia lato-lanceolata, sub-crenata, in petiolas longos decurrentia. *Flos* integrè luteus, thyrsos oblongo, bracteato, terminali : *corollis* radii 7 circiter, fœmineis ligulatis. *Calyx* cylindricus imbricatus, longitudine disci, foliolis lanceolato-linearibus, erectis, clausis. *Receptaculum* nudum. *Pappus* pilosus.

Habitat inculta prope Cantonem Sinarum.

† Sp. 2. SOLIDAGO CANTONIENSIS. *Kām siong hōa.*

Differ. spec. Sol. *foliis* lanceolatis, integerrimis : *caule* simplicissimo : *pedunculis* sub-terminalibus, polyfloris : *radio* sexfloro.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, simplicissimus, 10-pollicaris, erectus. *Folia* lanceolata, integerrima, glabra, sessilia, sparsa. *Flos* integrè luteus, pedunculis polyfloris, sub-terminalibus. *Corollulae* radii senæ. *Calyx* imbricatus, sub-clausus. *Receptaculum* nudum. *Pappus* pilosus. Affinitatem habet cum Sol. *Minutâ* (Lip. sp. 12) : differt maximè pedunculis polyfloris.

Habitat inculta prope Cantonem Sinarum.

GENUS XXXI. CINERARIA.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* simplex. *Cal.* simplex, polyphyllus, æqualis. Lin. sy. pl. G. 1036.

† Sp. 1. CINERARIA REPANDA. *Cau li mān.*

Differ. spec. Cin. *paniculâ* diffusa : *foliis* ovato-lanceolatis, ferrato-repandis, glabris.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, erectus, teres, glaber, 4-pedalis, ramosus. *Folia* ovato-lanceolata, ferrato-repanda, glabra, alterna. *Flos* luteus, terminalis, paniculâ diffusa : *calyce* simplici, polyphyllo, oblongo, æquali. *Corollulae* radii 8 circiter, fœmineæ,

502 SYNGENESIA. POLYGAMIA SUPERFLUA:

neæ, ligulatæ, 2-fidæ. *Receptaculum* nudum. *Pappus simplex*.
Habitat inulta prope Cantonem Sinarum.
Observ. Affinis est Ciner. Palustri, & Aureæ: a quibus differt foliis &
caule glabris, atque paniculâ diffusa.

GENUS XXXII. SENEPIO.

Char. Gener. *Receptaculum* nudum. *Pappus simplex*. *Calyx* cylindri-
cus, calyculatus: squamis apice sphaelatis. Lin. sy. pl. G. 1033.

Sp. 1. SENEPIO DIVARICATUS. β Kām sūn Lin.

Differ. spec. Sen. *corollis* nudis: *foliis* lanceolatis, dentatis, scabris:
ramulis floriferis divaricatis. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, sesquipedalis, ramosus: *ramis* su-
perioribus floriferis, divaricatis. *Folia* lanceolata, dentata, veno-
sa, tomentosa, sparsa. *Flos* spicis longis, simplicibus, terminali-
bus. *Flosculi* disci pallidi: radii nudi. *Receptaculum* nudum. *Pap-
pus simplex*.

Habitat incultus prope Cantonem Sinarum.

Osbeck. Iter ad Sinas.

GENUS XXXIII. TUSSILAGO.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus simplex*. *Cal.* squamæ æquales,
discum æquantes, sub-membranaceæ. Lin. sy. pl. G. 1032.

Sp. 1. TUSSILAGO FARFARA. β Koan tūm hōa. α Khoan doung hoa.
Differ. spec. Tuss. *scapo* imbricato unifloro: *foliis* sub-cordatis, an-
gulatis, denticulatis. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Planta* acaulis, herbacea: *radice* perenni, tereti,
tortuosa, repente. *Folia* radicalia, sub-rotunda, sub-cordata, in-
æqualiter sub-lobata, denticulata, nervosa, subtus tomentosa, ma-
gna, post florem exsurgentia, petiolis longis, erectis. *Flos* pur-
purascens, terminalis, solitarius: *scapo* erecto, squamoso, crasso,
foliis breviore. *Calyx* communis imbricatus, sub-cylindricus, lævis.
Corollulae disci hermaphroditeæ, tubulosæ: *radii* foemineæ, ligula-
tæ, erectæ. *Receptaculum* nudum. *Pappus* pilosus.

Habitat inulta in locis Borealibus imperii Sinensis.

Gmel. Sibir. 2. pag. 140. *Tussilago vulgaris*. Bauh. Pin. pag. 197. n.
1. Hill. Brit. herb. pag. 446. tab. 63. fig. 14, 15.

Virtus: totius plantæ, imprimis florum. *Pulmonica*, *Expectorans*.
Prodest in tussi, asthmate, phthisi, faucium inflammatione, & do-
lore.

Sp. 2.

Sp. 2. TUSSILAGO ANANDRIA. β Lă chău Koan tūm hōa. α Khoan doung hoa.

Differ. spec. Tuss. *scapo* unifloro squamoso, erecto : *foliis* lirato-ovatis. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* nullus. *Radix* perennis, radiculis ramosis, longè repentibus. *Folia* radicalia, sub-ovata, sub-lyrata, venosa, petiolis longis erectis. *Scapus* 1-florus, crassus, foliis brevior, squamis acutis imbricatis. *Flos* luteus, calyce erecto, sub-aperto. *Receptaculum* nudum. *Pappus* pilosus.

Habitat agrestis loca Borealia apud Sinas.

Tussilago *scapo* unifloro, calyce sub-aperto. Gmel. Sibir. 1. pag. 143, tab. 67. fig. 2.

Virtus fere eadem, quæ præcedentis.

GENUS XXXIV. ASTER.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* simplex. *Corollæ* radii plures 10. *Cal.* imbricati squamæ inferiores patulæ. Lin. sy. pl. G. 1034.

Sp. 1. ASTER INDICUS. β Mă lăn hōa.

Differ. spec. Ast. *foliis* ovato-oblongis, serratis : *floralibus* ovali-lancolatis, integerrimis : *ramulis* unifloris. Lin. sp. 27.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 2-pedalis, erectus, striatus, glaber, ramosus. *Folia* lato-lanceolata, serrata, floralia integriforma, glabra, sub-petiolata, superius obscurè, inferius pallidè viridia. *Flos* terminalis, solitarius : *calyce* hæmisphærico imbricato, squamis subsquarrosis, obtusis. *Corollulæ* disci flavæ, hermafroditæ, tubulosæ : *radii* cærulecentes, foemineæ, ligulatæ, patentæ, multæ. *Receptaculum* nudum. *Pappus* pilosus.

Habitat spontaneus, cultusque apud Sinas.

Burm. Ind. pag. 181. Thunb. Japon. pag. 316.

Virt. Sub-adstringens, Stomachica.

Observ. Aster a Linnæo, & aliis dictus Chinensis a me non visus. Suspicor, quod confundatur cum Chrysanthemo Indico ; cuius flores pulcherrimi, & magni, præ cæteris Syngenesiis a Sinenibus studiosè coluntur. Utriusque habitus, prout a Linnæo expositus parum differt. Ast in Chrysanthemo pappus nullus : estne, qui viderit in Astere Chinensi pappum pilosum, Generis proprium ?

GENUS XXXV. TAGETE.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* aristis 5, erectis. *Cal.* 1-phyl-lus, Sff ii

lus, 5-dentatus, tubulosus. *Flosculi* radii 5, persistentes. Lin. sy. pl. G. 1044.

Sp. 1. TAGETES PATULA. *a. Cuc van tho. b. . . .*
Differ. spec. Taget. *Caulis* sub-diviso, patulo. Lin. sp. 1.
Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, sesquipedalis, sub-divisus, sub-erectus, glaber, diffusus. *Folia* profundè pinnatifida, lacinia lanceolatis, ferratis, glabris, obscuro-virentibus. *Flos* solitarius, terminalis, aureus, pulcher, graveolens, magnus, pedunculo longo, erecto. *Calyx* 1-phyllo, oblongus, 8-sulcatus, apice 8-dentatus, laevis. *Corollulae* disi tubulosæ, hermaphroditæ: *radii* 30 circiter, fœmineæ, ligulatæ, magnæ, sulcato-plicatæ, patentes. *Semina* linearia, compressa, longa, sub-nigra: *pappo* aristato. *Receptaculum* nudum.

Habitat ubique culta in hortis Cochinchinæ: etiam in Chinâ, & in multis Indiæ locis.

Burm. Ind. pag. 182. Thunb. Japon. pag. 320. *Tagetes minor*, flore fulvo, maculato. Dill. Elth. 273. tab. 279. fig. 361.

GENUS XXXVI. SIEGESBECKIA.

Char. Gener. *Recept.* paleaceum. *Pappus* nullus. *Cal.* exterior 5-phyllo, proprius patens. *Radius* dimidiatus. Lin. sy. pl. G. 1057.

Sp. 1. SIEGESBECKIA ORIENTALIS. *a. Nu ao sia.*

Differ. spec. Sieg. *petiolis* sessilibus: *calycibus* exterioribus linearibus, maioribus, patentibus. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 2-pedalis, teres, erectus: *ramis* paucis, afflagentibus. *Folia* sub-ovata, utrinque acuminata, serrato-incisa, tomentosa, in petiolos decurrentia, opposita. *Flos* flavus, pedunculis longis, solitarii, 1-floris, sparsis. *Calyx* communis 5-phyllo, expansus: *foliolis* spathulatis, obtusis, papillosis, longis: *proprius* singulis flosculis spathaceus, ovatus, concavus, papillis pedunculatis similiter consitus, flosculo maturo brevior, a late-re dehiscens. *Corolla* composita semiradiata: *corollulis* hermaphroditis 10 circiter in disco: fœmineis 4 in radio. *Propria* hermaphroditis infundibuliformis, 5-fida, minuta. *Faminea* ligulata, 3-fida. *Filamenta* hermaphroditis capillaria brevissima. *Anthera* cylindracea. *Germen* oblongum. *Stylus* sub-longior staminibus. *Stigmata* 2, reflexa. *Pericarpium* nullum. *Calyx* immutatus. *Semina* omnibus turbinato-oblonga, incurva, scabra, pedicellata: *pappo* nullo. *Receptaculum*, pedicellis seminum remanentibus, hispidum, cæteroquin nudum, minimum.

Habitat.

Habitat ubique inculta in hortis Cochinchinæ: puto, quod etiam in Chinâ, sed ibi mihi non obvia. Burn. Ind. pag. 183. Thunb. Jap. pag. 321. Hort. Cliff. pag. 412. tab. 23.

Observ. Juxta systematis Linnæani principia existimo hanc plantam adscribi debere ordini Polygamiæ segregatae, cum in eâ singuli flosculi propriis calycibus instruantur, ac distinguantur. Differentia specifica Linnæana nec satis conformis, nec perspicua.

GENUS XXXVII. ECLIPTA.

Char. Gener. *Receptaculum* paleaceum. *Pappus* nullus. *Corollulae* dici 4-fidæ. Lin. sy. pl. G. 1056.

Sp. 1. ECLIPTA ERECTA. a C. muc.

Differ. spec. Ecl. *Caulis* erecto: *foliis* basi deflexis, sessilibus. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 1-pedalis, erectus, teres, hispidus, ruber, succosus: *ramis* paucis, obliquis. *Folia* lanceolata, sub-integerrima, rugosa, obscuro-viridia, subitus tomentosa, opposita, sub-sessilia, deflexa. *Flor* albus, sub-terminalis, pedunculis 1-floris, solitariis, longis, erectis. *Calyx* hemisphæricus, squamis acutis, corollam superantibus. *Flosculi* disci tubulosi hermaphroditi: radii ligulati, foeminei, breves, 4-fidi. *Receptaculum* paleaceum. *Pappus* nullus.

Habitat inculta in hortis Cochinchinæ.

Eclipta Daun. Rumph. Amb. I. 10. c. 31. tab. 18. fig. 1.

Observ. Eclipta Cochinchinensis, quæ Amboinensi proxima, nec habet folia nervosa, nec propriè ferrata, aut sessilia, neque etiam flores geminos, unde dubito an eadem cum Americanâ dici valeat.

Uſus. Succus herbæ utilis ad tingendos capillos hominum, vel pilos animalium colore nigro; ideo ab indigenis vocatur herba atramenti.

Sp. 2. ECLIPTA POSTRATA. a Cay. su. thon.

Differ. spec. Ecl. *caule* postrato: *foliis* sub-undulatis, sub-petiolatis.

Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, sub-erectus, multiplex, ſepiū repens, teres, pilosus, ruber. *Folia* ovato-lanceolata, obtuse ferrata, sub-undulata, tomentosa, sub-petiolata, opposita. *Flor* flavus, axillaris, solitarius, pedunculis longissimis. *Calyx* ovatus, imbricatus, squamis lanceolatis. *Flosculi* disci hermaphroditi, tubulosi: radii foeminei, ligulati, pauci, ſepe nulli. *Receptaculum* paleaceum. *Pappus* nullus.

Habitat

Habitat inulta in hortis Cochinchinæ.

Thunb. Jap. pag. 321. Chrysanthemum Maderaspatanum methæ arvensis folio, & facie: floribus bigemellis ad alas, pedunculis curvis. Pluk. Alm. 100. tab. 118. fig. 5. Nunquid species a nostrâ diversa?

GENUS XXXVIII. BUPHTHALMUM.

Char. Gener. Recept. paleaceum. *Pappus* margo obsoletus. Sem. latera, præfertim radii marginata. *Stigma* flosc. hermaphroditorum indivisum. Lin. sy. pl. G. 1059.

† Sp. 1. BUPHTHALMUM OLERACEUM. α Cúc tảng δ. § . . .

Differ. spec. Buph. *calycis* foliolis acutis, lateraliter connexis: *foliis* oppositis, lanceolatis, recurvis.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 2-pedalis, erectus, teres, albicans, lœvis, ramosus. *Folia* liniari-lanceolata, inæqualiter dentata, glabra, recurva, opposita, succosa, crassa, cinerea. *Flos* radiatus, magnus, solitarius. *Calix* imbricatus, hæmisphæricus, foliolis acutis, membranulâ lateralî mutuo connexis. *Corollæ* discus planus, flosculis flavis, tubulosis, hermaphroditis. *Radius* amplus, expansus, corollulis foemineis, ligulatis, 3-fidis, albis, multis. *Receptaculum* planiusculum, paleis minimis constitutum. *Pappus* seminum marginatus. *Stigma* flosculi hermaphroditi simplex.

Habitat cultum in hortis Cochinchinæ, & Chinæ.

Uſus. Planta odora, cuius folia inter olera computantur ab indigenis.

GENUS XXXIX. VERBESINA.

Char. Gener. Recept. paleaceum. *Pappus* aristatus. *Cal.* duplice ordine. *Flosculi* radii circiter 25. Lin. sy. pl. G. 1058.

Sp. 1. VERBESINA CALENDULACEA. β Fan khi Kōuc.

Differ. spec. Verb. *foliis* oppositis, lanceolatis, obtusisculis: *pedunculis* longis, 1-floris: *calycibus* simplicibus. Lin. sp. 6.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 1-pedalis, sub-erectus, multiplex, glaber, albicans. *Folia* lanceolata, sub-obtusa, integerima, glabra, opposita. *Flos* luteus, terminalis, pedunculo 1-floro, longissimo. *Calyx* hemisphærico simpliç. *Radius* 10-florus, stemonus, ligulatus. *Semina* pappo aristato, brevi. *Receptaculum* convexum: paleis tubo floscularum æqualibus.

Habitat inulta præ Cantonem Sinarum.

Burm. Ind. pag. 184. Caltha flore solitario ex alis foliorum longissimo pe-

pedunculo prodeunte. Burm. Zeyl. pag. 52. tab. 22. fig. 1.

- † Sp. 2. VERBESINA SPICATA. *a* Cúc ăn rau. *b* Thien cài tsái.
 Differ. spec. Verb. *foliis* palmato-incisis, ferratis: *spicis* linearibus;
 terminalibus.
 Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, perennis, 4-pedalis, sub-erectus;
 aliquando repens, ramosus, striatus, fusco-ruber. *Folia* inferiora
 palmato-incisa, superiora ovato-lanceolata, omnia serrata, subitus
 tomentosa, obscuro-viridia, odora, succosa, alterna: petiolis lon-
 gis, rubris. *Flos* albissimus, radiatus, minusculus: *spicis* linearibus,
 congestis, longis, erectis, terminalibus. *Calycis* foliola subu-
 lata, erecta, bino ordine disposita. *Flosculi* disci tubulosi, herma-
 phroditæ, breves, multi: *radii* foeminei, 5 circiter, ligulati, ad
 unum latus vergentes, ligulâ calycem non excedente. *Receptacu-
 lum* sub-nudum, raris paleis constitutum. *Pappus* nullus. *Semina* turbi-
 nata, obtuse tetragona, brevia.
 Habitat culta in hortis Cochinchinæ, & Chinæ: & cum acetariis
 mensis apponitur.
 Observ. Pappo nullo convenit cum Verb. Muticæ (Linnæi sp. 9.):
 sed nostræ calyx, & corolla characterem Generis ad amissim fer-
 vant, non illa.

POLYGAMIA FRUSTRANEA.

GENUS XL. GORTERIA.

Char. Gener. *Recept.* nudum. *Pappus* lanatus. *Cor.* *radii* ligulatæ:
Cal. imbricatus, squamis spinosis. Lin. sy. pl. G. 1064.

- Sp. 1. GORTERIA SETOSA. *b* . . .
 Differ. spec. Gort. *foliis* lanceolatis, decurrentibus, adnatis, ciliato-
 spinosis: *floribus* terminalibus, pedunculatis. Lin. sp. 4.
 Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, 5-pedalis, erectus, multiplex, ra-
 mosissimus. *Folia* lanceolato-ovata, ferrato-spinosa, utrinque gla-
 bra, alterna. *Flos* luteus, pedunculis polyfloris, erectis, termina-
 ibus. *Calycis* squamæ imbricatae, inermes. *Corellulæ* disci herma-
 phroditæ, tubulosæ: *radii* neutrae, ligulatae, breves. *Receptacu-
 lum* nudum. *Pappus* sub-nullus.

Habitat agrestis prope Cantonem Sinarum.

Lin. Mant. pag. 287.

GENUS XL. CENTAUREA.

Char. Gener. Recept. setosum. *Pappus* simplex. *Cor.* radii infundibuliformes, longiores, irregulares. Lin. sy. pl. G. 1066.

Sp. 1. CENTAUREA PHRYGIA. α Bac dau loung. Differ. spec. Cent. *calycibus* recurvato-plumosis: *foliis* indivisis, oblongis, scabris. Lin. sp. 7.

Hab., & notæ. *Caulis* suffruticosus, 1-pedalis, erectus, hirsutus, ramosus. *Folia* ovato-lanceolata, indivisa, tomentosa, nec scabra. *Flos* luteus paniculis terminalibus. *Calyx* sub-rotundus, squamis subbulatis, imbricatis, in senectute recurvatis, plumosis, argenteis. *Flosculi* omnes tubulosi: disci hermaphroditi: radii neutri. *Pappus* seminum pilosus.

Habitat inculta in Cochinchinâ.

Cyanus foliis sub-hirsutis, ovato-lanceolatis, amplexicaulis, dentatis: plumulis calycinis reflexis. Hall. Helv. n. 188. Jacea latifolia, & angustifolia, capitè hirsuto. Bauh. Pin. pag. 271. n. 7, 8.

GENUS XLII. COREOPSIS.

Char. Gener. Recept. paleaceum. *Pappus* bicornis. *Cal.* erectus, polyphyllus, basi radiis patentibus cinctus. Lin. sy. pl. G. 1062.

† Sp. 1. COREOPSIS LEUCORRHIZA. β Fâm sâm. α Phaong phung. Differ. spec. Cor. *foliis* pinnatis, 5-phyllis, ferrato-incisis: *radio* sexfloro: *pappo* 3-corni.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, sesquipedalis, erectus, 4-gonus, fulcatus: *radice* simplici, perpendiculari, sub-fusiformi, albâ, carâ. *Folia* 5-nata, lanceolata, serrato-incisa. *Flos* integrè croceus: pedunculis paucifloris, terminalibus. *Corollulae* disci hermaphroditæ, tubulosæ, multæ: *radii* 6, neutræ, ligulatæ, ovatæ, integerimæ. *Seminum* pappus 3-cornis, fetis inversis ramosus. *Calyx* erectus, polyphyllus. *Receptaculum* paleaceum.

Habitat agrestis propè Cantonem Sinarum.

Observ. Sunt alliæ species foliis ternatis, & trifidis, quæ a Sinis eodem nomine indicantur.

† Sp. 2. COREOPSIS BITERNATA. α Câ ap. chioç. Differ. spec. Cor. *foliis* biternatis, ovato-lanceolatis, ferratis: *panniculâ* diffusâ: *radio* sexfloro.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 2-pedalis, erectus, 4-gonus, ful-

S Y N G E N E S I A . P O L Y G A M I A F R U S T R A N E A . 509

diatus, integrè luteus: *paniculâ* sparsâ, terminali. *Radii* corollæ 6, neutræ. *Pappus* bicornis, ramosus. *Receptaculum* planiusculum, nudum.

Habitat agrestis prope Cantonem Sinarum.

G E N U S X L I I I . H E L I A N T H U S .

Char. Gener. *Recept.* paleaceum, planum. *Pappus* diphyllus. *Cal.* imbricatus, sub-squarrosum. Lin. sy. pl. G. 1060.

Sp. 1. HELIANTHUS ANNUUS. γ . . .

Differ. spec. *Hel. foliis* omnibus cordatis, trinervatis: *pedunculis* incrassatis: *floribus* cernuis. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* 7-pedalis, annuus, sub-simplicissimus, rectus, angulatus. *Folia* omnia cordata, acuta, 3-nervia, ferrata, scabra, alterna, petiolata, magna. *Flos* aureus, maximus, diametro 5-pollicari: *pedunculis* basi incrassatis, 1-floris, cernuis, solitariis, longis, sub-terminalibus. *Flosculi* radii neutri, ligulati, multi. Ab Heliantho Indico vix differt.

Habitat cultus in insulâ Africanâ Mozambico.

Burm. Ind. pag. 185. *Hel.* radice annuâ. Hort. Cliff. pag. 419.

Sp. 2. HELIANTHUS GIGANTEUS. α Hoa Kuy. β Hoâm quêi hōa.

Differ. spec. *Hel. foliis* alternis, lanceolatis, scabris, basi ciliatis: *caule* stricto, scabro. Lin. sp. 8.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, 6-pedalis, rectus, crassus, scaber, ramis paucis. *Folia* lanceolata, integerima, enervia, scabra, alterna, magna. *Flos* aureus, magnus, terminalis, solitarius. *Calyx* imbricatus, patens, squamis oblongis, sub-squarrosis. *Flosculi* radii longissimi, neutri, multi: *disci* plures, breves, tubulosi, hermaphroditi. *Receptaculum* paleaceum. *Pappus* 2-aristatus.

Habitat cultus in Cochinchinâ, & Chinâ.

Mill. Dict. n. 5. *Chrysanthemum Virginianum elatius, angustifolium, caule hirsuto, viridi.* Pluk. Phyt. tab. 159. fig. 5.

P O Y G A M I A S E G R E G A T A .

G E N U S X L I V . S P H Ä R A N T H U S .

Char. Gener. *Calyc.* 8-flori. *Corollulæ* tubulosæ hermaphroditæ, & obsoletè fœmineæ. *Recept.* squamolum. *Pappus* nullus. Lin. sy. pl. G. 1083.

Ttt

† Sp. 1.

† Sp. 1. SPHÆRANTHUS COCHINCHINENSIS. a Co bò xit. g...
 Differ. Spec. Sphær. *foliis* decurrentibus, oblongis, integerrimis: *capitulis* cordato-ovatis, sub-fsessilibus, terminalibus.
 Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, sesquipedalis, erectus, teres, glaber, albicans, ramis ascendentibus, paucis: decurrentiâ foliorum triquetrum mentiens. *Folia* oblonga, obtusa, integerrima, undulata, sub-rugosa, sessilia, alterna, lanuginosa. *Flos* albicans, parcâ purpurâ conspersus: *capitulis* cordato-ovatis, terminalibus, solitariis, parvis, pedunculis brevibus.
 Habitat spontaneus inter fegetes, & in hortis Cochinchinæ, & Chinæ.
 Observ. Sphæranthus Amaranthoides (Burm. Ind. pag. 186.) fortasse est idem, vel parum differt. Similiter diccrem de Sphær. Chinensi (Lin. sp. 3.), si non haberet folia pinnatifida, cum noster habeat integerrima.
 Virtus: totius herbæ. Emolliens, Refrigerans, Resolvens. Usus potissimum externus: cataplasma in doloribus, & tumoribus mamillarum resolvendis, succus expressus in Ophtalmiâ, gargarisina decocti in faucium inflammatione proficiunt.

† GENUS XLV. ENYDRA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Communis 4-phyllus, patens, magnus: foliolis ovatis, duobus oppositis minoribus.
 Partialis 1-phyllus, 1-florus, in tubum convolutus, apice polyfido connivente.
 Cor. Composita: hermaphroditis in disco, foemeninis in radio.
 Propria: hermaphroditis tubulosa, calyce proprio brevior: limbo 5-fido, erecto. Foemeninis tubulosa, calyce proprio brevior: limbo 3-fido.
 Stam. Filamenta 5, capillaria, brevissima. Anthera Cylindracea, con-nata.
 Pist. Hermaphroditis: Germen ovatum. Stylus filiformis longitudine staminum. Stigma 2-fidum, erectum.
 Fœmineis: Germen ovato-oblongum. Stylus filiformis, calyce, & collâ longior. Stigma 2-fidum, reflexum.
 Peric. nullum. Calyx immutatus.
 Sem. Omnibus ovata. Pappus nullus.
 Recept. convexum, nudum.

Nom. (Εὐδρός aquaticus) a loco, in quo planta vivit.

Char.

Char. Gener. *Cal.* communis 4-phyllo, partialis 1-florus. *Coroll.* omnes tubulosæ: radii 3-fidæ. *Recept.* nudum. *Pappas* nullus.

† Sp. 1. ENYDRA FLUCTUANS. α Rau ngū oung.

Differ. spec. En. *foliis* sub-hastatis, serratis, oppositis: *radice* repente.

Hab. *Caulis* herbaceus, perennis, sub-erectus, teres, inanis, glaber, ramosus: *radice* repente. *Folia* sub-hastata, serrata, glabra, opposita: *petiolis* brevissimis, semiamplexicaulibus *Flos* albus, sub-terminalis, pedunculis 1-floris.

Habitat spontanea in paludibus Cochinchinæ.

M O N O G A M I A.

G E N U S XLVI. I M P A T I E N S.

Char. Gener. *Cal.* 2-phyllo. *Cor.* 5-petala, irregularis: *nectario* cunctato. *Caps.* supera, 5-valvis. Lin. sy. pl. G. 1093.

Sp. 1. IMPATIENS CHINENSIS. β Hùm thâu kiö.

Differ. spec. Imp. *pedunculis* unifloris, solitariis: *foliis* oppositis, ovatis: *nectariis* arcuatis. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 1-pedalis, erectus, teres, ramosus. *Folia* oblongo-ovata, serrato-denticulata, glabra, sessilia, opposita. *Flos* rubro-purpureus, pedunculis axillaribus, unifloris, sub-solitariis. *Nectarii* calcar subularum, crassum, valde arcuatum, mediocre.

Habitat spontanea cultaque Cantone Sinarum.

Burm. Ind. pag. 187.

Sp. 2. IMPATIENS CORNUTA. α Cây Nác ne.

Differ. spec. Imp. *pedunculis* unifloris, aggregatis: *foliis* lanceolatis: *nectariis* flore longioribus. Lin. sp. 4.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 1-pedalis, sub-teres, diffusus. *Folia* ovato-lanceolata, serrata, hispida, alterna, petiolata, magna, suavolentia, obscuro-viridia. *Flos* albus (in aliis purpurascens) pedunculis 1-floris, paucis, longis, axillaribus. *Corolla* 5-petala, irregularis, calcare triplo longiore, sub-arcuato. *Capsula* ovata, acuminate, hispida, 5-valvis, 1-locularis, polysperma.

Habitat ubique spontanea in hortis Cochinchinæ.

Balsamina Latifolia, floris calcari longissimo. Burm. Zeyl. pag. 41. tab. 16. fig. 1.

Ufus. Decocto foliorum solent indigenæ crines, & caput abluere, qui-

quibus hæc herba, cæteroquin vilos, & trivialis, suavissimum odor rem conciliat.

Sp. 3. IMPATIENS BALSAMINA. α Maóng tay co.

Differ. Species Impat. *pedunculis unifloris*, aggregatis : *foliis lanceolatis*, superioribus alternis : *nectariis flore brevioribus*. Linn. spec. 5.

Hab., & notæ. *Caulis annuus*, 2-pedalis, erectus, teres, hispidus, aquosus, albicans : *ramis* ascendentibus. *Folia lanceolata*, ferrata, glabra, alterna, petiolata. *Flos ruber*, (in aliis albus) *pedunculis axillaribus*, longis, unifloris, sub-aggregatis ; *nectario corollâ breviore* : *capsulâ ovato-oblongâ*, lanuginofâ, 5-valvi, elasticè desiliente, polyspermâ.

Habitat agrestis, cultaque in Cochinchinâ.

Thunb. Jap. pag. 327. Lacca herba. Rumph. Amb. I. 8. cap. 52. tab. 90.

† Sp. 4. IMPATIENS MUTILA. α Maóng tay tau.

Differ. spec. Impat. *pedunculis unifloris* : *foliis lanceolatis*, ferratis, oppositis : *nectariis mutilis*.

Hab., & notæ. *Caulis annuus*, sesquipedalis, erectus, teres : *ramis* ascendentibus. *Folia lanceolata*, ferrata, glabra, opposita. *Flos coccineus*, *pedunculis unifloris*, subsolitariis. *Calyx biphillus*, parvulus, coloratus, deciduus. *Corolla petala 5*, inæqualia, patentia : *nectario cucullato*, obtuso, mutilo. *Filamenta 5*, brevia : antheris coalitis. *Capsula 1-locularis*, polysperma : valvis 5, elasticis, ad tactum se contrahentibus, semina expellentibus.

Habitat culta in Cochinchinâ, puto, quod a Sinis translata,

† Sp. 5. IMPATIENS COCHLEATA. β Tsien chi hum.

Differ. spec. Imp. *pedunculis unifloris* : *foliis oblongis*, sub-ferratis, oppositis : *nectariis cochleatis* : *radice repente*.

Hab., & notæ. *Caulis annuus*, 1-pedalis, erectus, geniculatus, ruber, sub-simplicissimus : *radice repente*. *Folia oblonga*, obtusa, sub-ferrata, parva, glabra, crassa, fessilia, opposita. *Calyx 2-phillus*, coloratus, foliolis parvulis, sub-rotundis, concavis, deciduis. *Pedunculi axillares*, 1-flori, longi, sub-solitarii. *Corolla 5-petala*, inæqualis : *nectario magno*, compresso, in spiram convoluto. *Flos coccineus*, pulcherrimus, inodorus. *Capsula elastica*, carnosâ, 5-valvis, polysperma : *seminibus* sub-rotundis, receptaculo elongato affixis.

Habitat culta Cantone Sinarum.

Observ. Ex omnibus istis speciebus, quas examinavi, nullam inveni;

quaæ

quæ constanter habeat pedunculos florum vel solitarios semper ,
vel semper aggregatos ; adeoque perperam distinguentur per numero
rum pedunculorum.

GENUS XLVII. VIOLA.

Char. Gener. Cal. 5-phyllo. Cor. 5-petala, irregularis, postice cornuta. Caps. supera, 3-valvis, 1-locularis. Lin. sy. pl. G. 1092.

Sp. 1. VIOLA ODORATA. B. & Khet tuong hoo; Differ. spec. Vi. acaulis : foliis cordatis : stolonibus reptantibus. Lin. sp. 8.

Hab. , & notæ. Planta acaulis, semipedalis : stolonibus filiformibus ,
repentibus, perennantibus. Folia radicalia, cordata, apice, &
auriculis sub-acuta, crenata, glabra, sub-rugosa, obscuro-viridia :
petiolis longis, canaliculatis, sub-erectis. Flos cæruleo-purpurens,
parvus, odore gratissimus : pedunculis filiformibus, erectis, folio
sub-æqualibus. Cal. 5-phyllo, foliolis ovato-oblongis, incurvis,
persistentibus. Corolla petala 5, inæqualia, patentia: nectario subu-
lato, brevi, curvo.

Habitat Cantone Sinarum in hortis, & prope vias: inde in Cochinchinam delata, ubi raro culta.

Thunb. Jap. pag. 326. Viola acaulis, stolonibus teretibus, reptantibus, pedunculis radicalibus. Hort. Cliff. pag. 427.

Virtus: foliorum Emolliens. Florum Pectoralis, Anodyna. Seminum Purgans, Diuretica, sub-Emetica.

Sp. 2. VIOLA PRIMULIFOLIA. B. . . .

Differ. spec. Vi. acaulis : foliis oblongis, sub-cordatis : petiolis membranaceis. Lin. sp. 5.

Hab. , & notæ. Planta acaulis, annua. Folia oblongo-ovata, sub-corda-
ta, glabra, crenata, leviter decurrentia in petiolos longos, ere-
ctos. Flos purpureus, odoratus : pedunculis longis, radicalibus, 1-
floris. A Violâ Odoratâ non multum differt, forsitan illius variatio.

Habitat inculta prope Cantonem Sinarum.

Gronov. Virgin. pag. 135.

GENUS XLVIII. LOBELIA.

Char. Gener. Cal. 5-fidus. Cor. 1-petala, irregularis. Caps. infera, 2,
3-locularis. Lin. sy. pl. G. 1091.

Sp. 1:

† Sp. 1. LOBELIA CHINENSIS. α Puón fuén lién.

Differ. spec. Lob. *foliis lanceolatis*, *integerimis*: *floribus* *solitariis*, *terminalibus*: *caule* *repente*.

Hab., & notæ. *Caulis* *herbaceus*, *filiformis*, *annuus*, *procumbens*, *repens*: *ramis* *erectis*, *5-pollicaribus*. *Folia* *lanceolata*, *integerima*, *glabra*, *alterna*, *fessilia*. *Flos* *dilute cæruleus*, *pedunculatus*, *solitarius*, *terminalis*. *Calyx* *5-fidus*, *laciniis brevibus*, *subulatis*, *interruptis*, *patulis*. *Corollæ* *tubus* *fissus*: *limbus* *5-partitus*, *laciniis lanceolatis*, *inæqualibus*. *Filamenta* *5*, *plana*, *longa*, *tubum antherarum* *sustinentia*. *Stigma* *2-fidum*, *revolutum*. *Capsula* *2-locularis*, *ovata*, *apice dehiscentia*: *seminibus* *sub-rotundis*, *plurimis*, *minimis*.

Habitat *inculta* prope *Cantōnem Sinārum*.

Observ. *Foliis integerimis*, & *pedunculis florum terminalibus* *differet* tam a *Zeylanica*, (*Lin. sp. 23.*) quam ab *Erinoide*, (*Thunb. Jap. pag. 326.*) quamvis utraque & solo natali, & habitu non *valde* *differet* a *Chinensi*.

† GENUS XLIX. SOLENA.

Descriptio Naturalis.

Cal. *Perianthium superum*, *urceolatum*, *5-dentatum*, *persistens*.

Cor. *nulla*.

Stam. *Filamentum tubus cylindricus*, *crassus*, *brevis*, *superius patulus*, *calyci insidens*. *Antheræ linea farinifera*, *supra os tubi sursum*, *deorsumque repens*, *flexu triplici*.

Pist. *Germen oblongum*. *Stylus crassus*, *calyce brevior*, *tubo staminneo circumdatus*. *Stigmata 3*, *inversè sagittata*, *magna*.

Peric. *Bacca oblongo-ovata*, *acuminata*, *flaccida*, *glabra*, *1-locularis*, *polysperma*, *cortice tenui*.

Sem. *Aliqua*, *ovata*, *sub-compressa*, *lævia*, *nidulantia*.

Nom. ($\Sigma\omega\lambda\eta\pi$ *tubus*) *ab stamine tubulo*so.

Char. Gener. *Cal. 5-dentatus*. *Cor. 0*. *Bacca infera*, *polysperma*.

† Sp. 1. SOLENA HETEROPHYLLA. α Cú nhang. β Khū lêu: Tiễn hõa fuén.

Differ. spec. *Sol. scandens*: *foliis inferis cordatis*, *superis hastatis*, *denticulatis*.

Hab. *Caulis suffruticosus*, *multiplex*, *longus*, *tenuis*, *scandens*, *cirrhis* *solitariis*. *Folia inferiora cordata*, *superiora hastata*, *omnia den-*

denticulata, alterna, petiolata, glabra. *Flos* pallidus, axillaris, pendunculatus, solitarius. *Bacca* coccinea, mediocris: seminibus nigricantibus. *Radix* tuberosa, fasciculata: tuberibus oblongis, sub-fusiformibus, farinaceis, albanticibus, edulis.

Habitat in sylvis Cochinchinæ, & Chinæ.

Obser. Hæc planta annumeranda esset Cucurbitaceis, nisi flores, qui omnes sunt hermaphroditi, prohiberent, & a Monoicis distraherent.

Virtus: radicis, & semen. Resolvens, Mundificans. Prodest in Phtysii, Dysenteriâ.

D I A N D R I A

* *Flos* diuina, galacteum.

Mel diuina, colericum.

Wax diuina, sepiatum.

Cera, bestia d. ovata. *Mel* diuina, sepiatum ex

lapis impuncte silvæ.

l-Bals. *Gel*-*balsum*. *Gel*. *infus*. *gum*.

resinæ. *Myrra*. *Betumæ* iuficissæ. *Balsæ*

3-phenæs.

A L G E R I A

Mel diuina.

Epidendrum.

Arides.

Salvia.

S Y N C E N E S I A M O N O G Y N I

C L A S S I S X X.

G Y N A N D R I A.

M O N A N D R I A.

* *Flores superi, Monogyni.*

- | | |
|--------------------|---|
| † 1. CERAIA. | <i>Cor. 5-fida, corniformis. Nectarium polyfidum, corollâ clausum.</i> |
| † 2. CALLISTA. | <i>Cor. 5-petala, ventricosa. Nectar. labium exterius convolutum, integrum.</i> |
| † 3. THRIXSPERMUM. | <i>Cor. petala 5, linearia. Nectar. labium exterius ovatum, integrum.</i> |
| † 4. GALEOLA. | <i>Cor. petala 5, ovata. Nectar. integrum, galeæforme.</i> |
| † 5. RENANTHERA. | <i>Cor. petala 5, biformia. Antheræ lobi reniformes, divaricati.</i> |
| † 6. ARISTOTELEA. | <i>Cor. petala 4: summum, & infimum 3-fida. Anthera simplex, conica.</i> |

D I A N D R I A.

* *Flores superi, Monogyni.*

- | | |
|----------------|---|
| 7. ORCHIS. | <i>Nectarium corniculatum.</i> |
| 8. EPIDENDRUM. | <i>Nectarium turbinatum.</i> |
| † 9. AERIDES. | <i>Cor. petala 5, ovata. Nectar. labium exterius incubans alteri.</i> |

T R I A N D R I A.

- | | |
|--------------|--|
| 10. SALACIA. | <i>1-gyna. Cal. 5-partitus. Cor. infera, 5-petala. Antheræ germini insidentes. Baccæ 3-sperma.</i> |
|--------------|--|

TETRANDRIA.

- † 11. BLASTUS. Polyg. *Cal.* 4-dentatus. *Cor.* infera, 4-petala. *Germina* antheris insidentia.

PENTANDRIA.

12. PASSIFLORA. 3-gyna. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* infera, 5-petala. *Bacca* pedicellata.

HEXANDRIA.

- † 13. BRAGANTIA. 1-gyna. *Cal.* o. *Cor.* supera, regularis, 3-fida. *Siliqua* 4-locularis, polysperma.

14. ARISTOLOCHIA. 6-gyna. *Cal.* o. *Cor.* supera, 1-petala, irregularis. *Caps.* 6-locularis.

OCTANDRIA.

- † 15. PHAIUS. 1-gynus. *Cal.* spatha. *Cor.* supera, petala 5, lanceolata. *Nect.* labium exterius convolutum.

DECANDRIA.

16. HELICTERES. 1-gyna. *Cal.* 1-phyllus. *Cor.* infera, 5-petala. *Capsulae* 5, 1-loculares, polyspermæ.

POLYANDRIA.

17. POTHOS. Spatha. *Cal.* o. *Cor.* 4-petala. *Bacca* 1-sperma.

18. CALLA. Spatha. *Cal.* o. *Cor.* o. *Stamina* mixta pistillis.

19. ARUM. Spatha. *Cal.* o. *Cor.* o. *Stamina* supra pistilla.

MONANDRIA.

† GENUS I. CERAIA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Spatha brevis, laciniata, 1-flora, persistens.

Perianthium 1-phylum, tubulosum, inæqualiter 5-fidum: laciniis erectis.

Cor. Monopetala, corniformis, supera: parte alterâ subulato-tubulosa, longiore: alterâ breviore dilatatâ, 5-fidâ: laciniis 3 lato-conicis: binis aliis lateralibus linearibus: omnibus longitudine æqualibus. Nectarium parvum, polyfidum, inæquale, corollâ clausum.

Stam. Filamentum 1, filiforme, breve, elasticum, pistillo adhærens. Anthera compresso-rotunda, 1-locularis, operculata.

Pist. Germen florem sustinens inter perianthium, & corollam, lineare, curvum, 6-sulcatum. Stylus brevissimus, basi laciniæ medieæ nectarii, simul cum stamine adnatus supra German. Stigma obsoletum.

Peric. Abortiens.

Nom. (Κεραία Virgula in formam cornu inflexa) a formâ corollæ subulatæ, sursum incurvatae.

Char. Gener. **Cor.** 5-fida: tubo subulato, infexo. **Nectario** polyfido, intus clauso.

Sp. 1. CERAIA SIMPLICISSIMA. a Tach hæc. p. XE hö.

Differ. spec. Cer. caule parasitico, erecto, simplicissimo: floribus lateralibus, solitariis.

Hab. Planta fruticosa, parasitica: radice fibrosa, repente: caule simplicissimo, 10-pollicari, erecto, ancipiti, supra basim tumescente, sulcato, glabro, luteo. Folia oblonga, emarginata, plana, crassa, vaginantia, erecta, parva, pauca. Flos pallidus, sub-terminalis, solitarius, erectus, pedunculatus: medio latere cornus corollini horizontaliter insidens germini.

Habitat in sylvis Cochinchinæ, & Chinæ, rupibus, ac arboribus inhaerens.

Virt. In Medicinâ Sinensi valet contra Epilepsiam, & nervorum, artuumque debilitatem.

Observ. Cum Ceraiâ aliquantulum habet similitudinis Herba supplex quarta. Rumph. Amb. I. II. c. 9. pag. IIII. tab. 51. fig. 2.

+ GE-

† GENUS II. CALISTA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Nullus, præter squamas ovato-lanceolatas, 1-floras, ante matu-
rescentiam floris imbricatas.

Cor. Petala 5, patentia, longitudine sub-equalia: horum 3 sessilia,
ovato-oblonga: 2 alia opposita unguiculata, latiora: infima basi
turgida.

Nectarium bipartitum, magnum, infra basim petalorum receptaculo
affixum: labio interiore oblongo, carnosu, basi bicorni: exteriore
turbanato, integerrimo, villoso, magno, in formam infundibuli
convoluto.

Stam. Filamentum 1, subulatum, planum, breve, apici nectarii in-
terioris insidens. Anthera operculata, biloba, lobis oblongis, com-
pressis, nitidis.

Pist. Germen filiforme, contortum, florem sustinens. Stylus, & stigma
nulla: nisi pro illis habeatur sulculus nectarii a stamine ad germe
decurrens.

Peric. Abortiens.

Nom. (*Kαλλίσα* pulcherrima) ex floris notabili pulchritudine.

Char. Gener. Cor. ventricosa, 5-petala: binis lateralibus unguiculatis.
Nectarii labium exterius convolutum.

† Sp. 1. CALLISTA AMABILIS. a Nhánh gõi lón.

Differ. spec. Cal. parasitica, *caule* sub-erecto, sulcato: *foliis* lanceo-
latis, striatis: *racemis* simplicibus, reclinatis, sparsis.

Hab. Planta parasitica, perennis: *bulbis* linearibus, intricatis: *caule*
sesquipedali, sub-erecto, crasso, tereti, sulcato, ad basim tumido.
Folia lanceolata, integerima, striata, crassa, dura, apice reflexa,
alterna, vaginantia. *Flos* candidus, nectario aureo, magno: *race-*
mis simplicibus, longis, reclinatis, lateralibus, sparsis.

Habitat in fylvis Cochinchinæ, truncis arborum adhærens.

† GENUS III. THRIXSPERMUM.

Descriptio Naturalis.

Cal. Communis amentiformis, linearis, compressus, carnosus: squa-
mis alternis, acutis, monofloris. Perianthium nullum.

Vyy ii

Cor.

520 GYNANDRIA. MONANDRIA.

- Cor. Petala 5, subulato-linearia, longa, sub-aequalia, erecta.
 Nectarium bipartitum, inter duo petala inferiora receptaculo affixum:
 labio interiore 3-fido, intra petala recepto, laciniis lateralibus ob-
 tusis, brevibus, mediâ longiore, conicâ, ascendentem: labio exterio-
 re ovato integro, extra petala infima exerto.
 Stam. Filamentum 1, filiforme, breve, pistillo inhærens. Anthera ova-
 ta, 2-locularis, operculata.
 Pist. Germen filiforme, rectum, florem sustinens. Stylus crassus, inæ-
 qualis, basi nectarii insidens. Stigma simplex.
 Peric. Capsula oblonga, trigona angulis acutè emarginatis, 3-valvis,
 1-locularis, polysperma.
 Sem. Multa, longa, tenuissima, piliformia.

Nom. ($\Theta\rho\xi$ pilus: $\sigma\pi\epsilon\rho\mu\alpha$ semen) ex seminibus piliformibus.

Char. Gener. Cor. petala 5, linearia, erecta. Nectarii labium exte-
 rius ovatum, exertum.

Sp. 1. THRIXSPERMUM CENTIPEDA. α Nhánh goi rit.
 Differ. spec. Thrix. Caule parasitico, lateraliter radicante: foliis lan-
 ceolato-linearibus: spicis distichis, axillaribus.
 Hab. Planta parasitica: caule longo, compresso, perenni: radicibus
 simplicibus, brevissimis, lateraliter adrepentibus. Folia lanceolato-li-
 nearia, integerrima, reflexa, parva, vaginantia. Flos pallido-luteus,
 nectario rubescente: spicis amentiformibus, rectis, lateralibus.
 Habitat in Cochinchinâ, ad arbores sylvestres adrepens.

† GENUS IV. GALEOLA.

Descriptio Naturalis.

- Cal. Nullus, præter squamas parvas acutas.
 Cor. Petala 5, ovata, sub-acuta, sub-aequalia, patentia.
 Nectarium magnum, sub-globosum, integerrimum, galeæforme, par-
 tes generationis occludens: basi interiori corollæ adnatum.
 Stam. Filamentum 1, membranaceum. conicum, breve, apici pistil-
 li coalitum. Anthera oblonga, bilocularis, operculata, imcumbens.
 Pist. Germen lineare, teres, æquale, longum, florem sustinens. Sty-
 lus crassus, incurvus, tubulosus. Stigma concavum, inæquale.
 Peric. Abortiens.
 Nomen. Galeola, quasi parva galea: ex formâ Nectarii.
 Char. Gener. Cor. petala 5, ovata. Nectarium sub-globosum, inte-
 grum.

† Sp. I.

† Sp. 1. GALEOLA NUDIFOLIA. & Cây Nu dee.

Differ. spec. Gal. *Caule scandente, nudifolio: racemis laxis, lateralibus.*

Hab. *Caulis fruticosus, 15 pedes longus, scandens: cirrhis crassis, solitariis. Folia nulla. Flos luteus, racemis compositis, magnis, laxis, lateralibus: bracteis parvâ, carnosâ, acutâ, racemum totum fulcidente. Radix simplex, lignosa, longa, præmorsa, radiculis crassis, paucis. Caule aphylo, & racemis accedit ad Orchem Aphylam.* Forsk. Arab. pag. 156. sp. 2.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

+ GENUS V. RENANTHERA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Spatha sub-rotunda, monoflora, persistens.

Cor. Petala 5, oblonga, longitudine sub-æqualia, expansa: duo superiora obtusa, undulata: tria inferiora lanceolato-linearia, plana. Nectarium bipartitum: labio interiore oblongo, carnofo, integro: exteriore 3-fido, laciinis lateralibus rotundatis, mediâ lanceolatâ, reflexâ, longiore.

Stam. Filamentum 1, breve, apici nectarii interioris insidens. Anthera biloba, operculata, magna: lobis reniformibus, divaricatis, lateraliter dehiscentibus.

Pist. Germen lineare, sulcatum, rectum, florem sustinens. Stylus planiusculus, ventricosus, incurvus, stamini annexus. Stigma obsoletum.

Peric. Abortiens.

Nomen Renanthera ob lobos antheræ reniformes patentes.

† Sp. 1. RENANTHERA COCCINEA. & Quách Jon dieo.

Differ. spec. Ren. *Caule parasitico, longo, lateraliter radicante: foliis oblongo-ovatis, emarginatis: racemis sub-simplicibus, sparsis.*

Hab. *Caulis perennis, parasiticus, 5-pedalis, sub-simplicissimus, teres: bulbis linearibus, longis, lateralibus, radicantibus. Folia oblongo-ovata, emarginata, plana, crassa, vaginantia. Flos coccineus, magnus, pulcherfimus, racemis longis, sub-terminalibus.*

Habitat in sylvis Cochinchinæ per arbores repens.

† GENUS VI. ARISTOTELEA.

Descriptio Naturalis.

- Cal. Spatha acuta, 1-flora, persistens.
- Cor. Petala 4, erecta: bina lateralia lanceolata, minora: summum, & infimum 3-fida, incurva, apice sub-reflexa.
- Nectarium 1-phylum, oblongum, integerrimum, sub-incurvum, carnosum.
- Stam. Filamenta nulla. Anthera 1, lato-conica, 1-locularis, operculata, apici interiori Nectarii insidens.
- Pist. Germen longiusculum, florem sustinens. Stylus. o. Stigma fossula exigua ad basim antheræ.
- Peric. Capsula oblonga, contorta, 1-locularis, 3-valvis, polypierma.
- Sem. Plurima, ovata, minima.
- Nom. ab Aristotele Philosopho, sectæ Peripateticæ Coryphæo, qui binos libros de Plantis nobis reliquit.
- Char. Gener. Cor. petala 4, summum, & infimum trifida. Nectarium integrum, curvum. Anthera sessilis, conica.

† Sp. 1. ARISTOTELEA SPIRALIS. g. Hoàn lâm.

- Differ. spec. Arist. scapo sub-nudo: foliis subulatis, 3-nerviis: spicis spirali.
- Hab. Planta sub-acaulis, annua. Radix bulbi oblongi, fasciculati. Folia radicalia, subulata, 3-nervia, curva, erecta. Scapus 8-pollucaris, teres, sub-nudus, terminatus spicâ erectâ, in spiram contortâ: floribus purpurascensibus, sessilibus, inodoris.
- Habitat inulta prope Cantonem Sinarum.
- Observ. Assimilatur Ophri Spirali (Lin. sp. 3.): sed stamine, corollâ, & nectario, quod in nostrâ non est carinatum, nec crenulatum tam specie, quam genere longè differunt: bulbis vero, & formâ spicæ cohærent.

D I A N D R I A.

GENUS VII. ORCHIS.

Char. Gener. Nectarium corniforme pone florem. Lin. sy. pl. G. 1094.

Sp. 1. ORCHIS SUSANNÆ. g. Mâ chæc lân.

Differ. spec. Orch. bulbis indivisis: nectarii alis amplioribus, ciliatis. Hab.
Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 2-pedalis, erectus, teres, simplicifimus, totus foliosus. *Radix* bulbus oblongus, crassus, indivisus. *Folia* lanceolata, glabra, alterna, vaginantia. *Flores* albi, magni, 4, 5 ad caulis apicem. *Nectarii* labium oblongum, integerrimum, recurvum: alis obtusis, fimbriatis, amplis, patentibus: *cornu* postico tereti, longissimo. *Filamenta* 2, brevia: *antheris* ovatis, operculatis. *Capsula* infera, oblonga, 6-gona, 1-locularis, polysperma: *seminibus* tenuissimis.

Habitat inculta prope Cantonem Sinarum.

Flos Sufannæ. Rumph. Amb. I. 8. c. 70. tab. 99. Thunb. Japon. pag. 25.

Sp. 2. ORCHIS MORIO. α Cu deái chōn.

Differ. spec. Orch. *bulbis* indivisis: *nectarii* labio quadrifido, crenulato: *cornu* obtuso, ascende: *petalis* obtusis conniventibus. Lin. sp. 15.

Hab., & notæ. *Caulis* sesquipedalis, erectus, teres, simplex, foliosus, annuus: *radice* perenni, bulbo sub-rotundo, emarginato. *Folia* lanceolata, crassa, vaginantia. *Flos* albus, terminalis: *spicā* simplici, erectâ, pauciflorâ. *Nectarii* labium obtusissimum, crenatum, reflexum. *Calcar* obtusum, breve. *Petala* obtusa, conniventia.

Habitat in sylvis montanis Cochinchinæ.

Orchis Morio fœmina. Bauh. Pin. pag. 82. n. 4.

Sp. 3. ORCHIS LATIFOLIA. α Hōng mòn.

Differ. spec. Orch. *bulbis* sub-palmatis, rectis: *nectarii* cornu conico: *labio* 3-lobo, lateribus reflexo: bracteis flore longioribus. Lin. sp. 22.

Hab., & notæ. *Radix* perennis, bulbi duo, oblongi, sub-recti. *Caulis* 1-pedalis, erectus, annuus. *Folia* lato-lanceolata, paucia. *Flos* rubescens, spicâ longâ, terminali: bracteis flore sub-longioribus. *Nectarii* cornu conicum: labium 3-lobum, lateribus reflexum.

Habitat in sylvis planis Cochinchinæ ad loca Borealia.

Orchis palmata palustris latifolia. Bauh. Pin. pag. 86. n. 12.

GENUS VIII. EPIDENDRUM.

Char. Gener. *Nectarium* turbinatum, obliquum, reflexum. Lin. sy. pl. G. 1101.

Sp. 1. EPIDENDRUM TUBEROSUM. α Hoa Lòn tiá. β . . .

Diff. spec. Ep. *foliis* lato-lanceolatis, nervosis, membranaceis, bulbo innatis: *scapo* vaginato: *nectario* cymbiformi, bifido. Lin. sp. 24.

Hab., & notæ. *Planta* terrestris, 1-pedalis: *caule* annuo, crasso, striato,

caulito, simplicissimo, erecto : *bulbo* radicali perenni, compresso-rotunduloidor, fusco, solido, aliquando multiplici, radiculis plurimis, linearibus, longis. *Folia* radicalia, caulinaque, lato-lanceolata, plicato-*confusa*, integerrima, glabra, erecta, vaginantia, dura, magna, paucia. *Flos* rubro-purpureus, inodorus, conspicuus, pedunculatus, racemo simplici, erecto, terminali. *Corolla* petala 5, oblonga, rotundata, sub-æqualia, sub-concava, patentia. *Nectarium* bipartitum, oblongum, nec turbinatum. *Filamenta* 2. *Capsula* infera, oblonga, 1-locularis, polysperma.

Habitat cultum in hortis Cochinchinæ, & Chinæ.

Angræcum Terrestre primum. Rumph. Amb. I. II. c. 10. tab. 52. fig. I.
Epidendrum Tuberosum. Burm. Ind. pag. 190.

Sp. 2. EPIDENDRUM ENSIFOLIUM. *à Lan hōa. & Hoa Lən tau.*

Differ. spec. Ep. caule tereti, laevi : foliis ensiformibus, striatis : petalis lanceolatis, glabris : labio recurvato, latiore. Lin. sp. 26.

Hab., & notæ. Planta terrestris, perennis, sub-acaulis : radicibus fasciculatis, rectis, parvis. Folia radicalia, ensiformia, striata, congesta, erecta, glabra, duriuscula, obscuro-virentia. Scapus sesquipedalis, sub-nudus, teres, tenuis, erectus, desinens in racemum simplicem, laxum, erectum, oblongum. Flos pedunculatus, luteo-viridis, lineolis rubris virgatus, odoris suavissimi. Calyx spatha parva, acuta, 1-flora, persistens. Corolla petala 5, lanceolata, plana, duo inferiora minora. Nectarium bipartitum : labio interiore oblongo, curvo, carnosu, staminifero : exteriore longiore, oblongo, undulato, reflexo, petalis maioribus æquali. Filamenta 2, brevia, elastica, nectario insidentia. Antheræ simplices, lenticulares, operculatæ. Germen lineare, contortum, florem sustinens. Stylus brevissimus, ad apicem labii carnosæ nectarii intus adhaerens. Stigma obsoletum. Pericarpium capsula oblonga, acutè trigona, 3-valvis, monolocularis, polysperma : seminibus plurimis, scobiformibus.

Habitat curiosè cultum in hortis Chinæ, & Cochinchinæ. Gaudet aliquibus varietatibus, quarum ea, quæ emitit flores integrè albos, omnium pretiosissima ; quia odorem suavissimum, quamvis tenuem, nocte spirat.

Osbeck. (Itin. ad Sinas) floris spatham pro bracteâ, & labium nectarii pro sexto petalo habuit.

Observ. Genus Epidendrum 30 speciebus ditatum apud Linnaeum valde obscurum manet, nec juxta characterem nimis vagum elucubrari potest : quod censeri debet de Nectario turbinato. De aliis speciebus alii autoptæ judicent : ego in binis accuratè observatis Nectarium turbinatum non inveni.

† GENUS IX. AERIDES.

Descriptio Naturalis.

Cal. Spatha ovata, parva, persistens.

Cor. Petala 5, ovata, plana, expansa, sub-æqualia.

Nectarium 2-phylum: labio interiore horizontali, oblongo, carnosso, concavo: exteriore operculiformi, incubante, hinc tubuloſo, attenuato, ascendentē, inde dilatato, 3-fido, lacinias lateralibus obtusis, mediā conicā, breviore.

Stam. Filamenta 2, brevia, elasta, apici nectarii interioris insitentia. Antheræ totidem, lenticulares, operculatæ.

Pist. Germen trigonum, tenuē, incurvum, florem sustinens. Stylus nullus. Stigma fossula minuta ad basim staminum, ducens ad Ger- men.

Peric. Abortiens.

Nomen. Aerides dicitur, quasi aeris filia, in quo nascitur & nutri- tur.

Char. Gener. Monogyna. Cor. petala 5, ovata, plana. Nectarii la- biura exterius claudens alterum.

† Sp. 1. AERIDES ODORATA. α Phaong lan. β Fum lan.

Differ. spec. Aer. foliis linearibus, reflexis: racemis simplicibus, axil- laribus.

Hab. Planta fruticosa, parasitica: bulbis radicalibus linearibus, lon- gis, intricatis, plurimis. Caulis sub-erectus, 1-pedalis. Folia linea- ria, emarginata, crassa, magna, sub-incurva, reflexa: petiolis brevibus, vaginantibus. Fl̄os pallidus, sub-carnosus, suaveolens: racemis simplicibus, longis, reclinatis, axillaribus.

Habitat in sylvis Cochinchinæ, & Chinæ, arboribus inhærens, vel ex illis pendula.

Observ. Mirabilis hujus plantæ proprietas est, quod ex sylvis domum delata, & in aere libero suspensa, absque ullo pabulo vegetabili terreo, vel aquo in multos annos duret, crescat, floreat, & ger- minet. Vix crederem, nisi diuturnâ experientiâ comprobassem.

TRIANDRIA.

GENUS X. SALACIA.

Char. Gener. Monogyna. Cal. 5-partitus. Cor. 5-petala. Antheræ germinis apici insidentes. Lin. sy. pl. G. 1105.

† Sp. I. SALACIA COCHINCHINENSIS. & Cây Tráoc mau.
Differ. spec. Sal. Caule fruticoso : foliis sub-ferratis, oppositis : floribus congestis, axillaribus.

Hab., & notæ. Caulis fruticosus, sub-erectus, 6-pedalis : ramis multis, tortuosis. Folia ovata, sub-acuminata, sub-ferrata, glabra, petiolata, opposita. Fls luteo-ruber, axillaris, congestus, parvus. Bacca sub-rotunda, inæqualis, rubescens, mediocris, edulis. Calyx inferus, 5-partitus, patens, coloratus. Corolla petala 5, sub-rotunda, concava, patentia, calyce longiora. Filamenta nulla. Antheræ 3, sub-rotundæ, bilobæ, germinis humeris insistentes, invicem distantes. Germen compresso-rotundum. Stylus nullus. Stigma punctum minimum. Pericarpium Bacca 1-locularis, 3-sperma. Semina sub-rotunda, lævia. Salaciæ Chinensem non vidi : dubito an sit eadem.

Habitat in dumetis Cochinchinæ.

TETRANDRIA.

† GENUS XI. BLASTUS.

Descriptio Naturalis.

Cal. Perianthium tubulosum, 4-gonum, quadridentatum, scabrum, eretum, inferum, persistens.

Cor. Petala 4, subulata, patentia, calyci infra dentes inhærentia, ipso longiora.

Stam. Filamenta 4, brevia, fundo calycis insistentia. Antheræ totidem, subulato-lineares, magnæ, versus stylum curvatæ : convexitate stylo adpressa.

Pist. Germina 20 circiter, ovata, lævia, glanduliformia, tergis antherarum sparsim adhærentia. Stylus subulatus, crassus, sub-tetragonus, corollâ longior. Stigma obsoletum.

Peric. Nullum, præter calycem conniventem, rotundatum, incrassatum, induratum, ore patulum, semina foventem.

Sem. Totidem, quot germina, oblongo-ovata, nuda, adhærentia receptaculo sub-quadrilatero, formato ex antheris, & stylo mutuo appressis, marcescentibus, persistentibus.

Nom.

Nom. (Βλασος german) a Germinibus plantæ exoticis.

Char. Gener. Polygynus. Cal. 4-dentatus. Cor. infera, petala 4, lanceolata. Germina antheris insidentia.

† Sp. 1. BLASTUS COCHINCHINENSIS. a Cây Mua rắng.

Differ. spec. Bl. foliis lanceolatis, 3-nerviis: pedunculis polyfloris.

Hab. Arbor parva, 6-pedalis, ramosissima. Folia lanceolata, acuminata longo, 3-nervia, integerrima, opposita. Flos albus, pedunculis sparsis, polyfloris.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Observ. Rarum quidem est, quod antheræ insideant germini: at prorsus singulare in hac solâ plantâ inventum, quod germina, & nudâ semina antheris inhærent.

PENTANDRIA.

GENUS XII. PASSIFLORA.

Char. Gener. Trigyna. Cal. 5-phyllo. Nectar. Corona. Baccæ pedicellata. Lin. sy. pl. G. 110.

Sp. 1. PASSIFLORA PALLIDA. a Cây Com lang.

Differ. spec. Pass. foliis indivisis, ovatis, integerrimis: petiolis biglandulosis. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. Caulis perennis, longus, teres, ramosus, scandens: cirrhis solitariis. Folia ovata, indivisa, integerrima, glabra, opposita: petiolis biglandulosis. Flos pallidus, magnus, axillaris, binatus: corollæ 5-petalæ, planæ: nectario coronario: baccæ ovatae parvæ, 1-loculari, polyspermæ, pedicellatae.

Habitat in dumetis Cochinchinæ.

Clematis Indica alia, flore minore, pallido. Plum. Amer. pag. 74: tab. 89. Murucuja quinta. Pis. Brasil. I. 4. cap. 60. pag. 248. fig. ibi.

Sp. 2. PASSIFLORA CÆRULEA. a Ú sī hoā.

Differ. spec. Pass. foliis palmatis integerrimis. Lin. sp. 24.

Hab., & notæ. Caulis perennis, teres, scandens, longus, cirrhosus, ramosus. Folia palmata, 5-partita, integerrima, glabra, alterna: petiolis biglandulosis. Flos luteo-viridis, axillaris, solitarius, magnus: calyx 3-phyllo: corollæ 10-petalæ: nectario coronario, cæruleo: baccæ ovatae, pedicellatae, polyspermæ.

Habitat prope Cantonem Sinarum, agrestis.

Passiflora foliis palmatis, quinque-partitis, integerrimis: involucris cordatis, triphyllis. Hort. Cliff. pag. 432. *Granadilla polyphylla*, fructu ovato. Tournef. Inst. pag. 241. sp. 10.

HEXANDRIA.

GENUS XIII. BRAGANTIA.

Descriptio Naturalis.

Cal. Nullus

Cor. Monopetala, supera: tubo globoso, 10-sulcato: limbo parvo, 3-fido, reflexo, laciniis obtusis, æqualibus.

Stam. Filamenta nulla. Antheræ 6, oblongæ, inflexæ, medio stylo in orbem adhærentes, exterius dehiscentes.

Pist. Germen lineare, inferum. Stylus crassus, corollâ brevior, Stigma concavum, integrum, erectum.

Peric. Siliqua longa, quadrangularis, 4-valvis, 4-locularis, polysperma.

Sem. oblonga, trigona, simplici ordine disposita.

Nomen plantæ communicavit Augustissimæ Domus Brigantinæ Soboles, Dom. Joannes de Bragança, Alafoniæ Dux, Academiæ Regiae Scientiarum Ulyssiponensis Præses, decus, & columen.

Char. Gener. *Monogyna*. Cal. o. Cor. supera, æqualiter 3-fida. Siliqua 4-locularis, 4-valvis.

† Sp. 1. BRAGANTIA RACEMOSA. *α* Hoa Den spuc.

Differ. spec. Brag. foliis lanceolatis, integerrimis; racemis axillariibus.

Hab. Frutex 5-pedalis, sub-erectus, ramosus. *Folia* lato-lanceolata, integerrima, venosa, magna, alterna. *Flos* fusco-ruber, racemis parvis, axillaribus.

Habitat in montibus Cochinchinæ.

GENUS XIV. ARISTOLOCHIA.

Char. Gener. Hexagyna. Cal. o. Cor. 1-petala, lingulata, integræ. Caps. 6-locularis, infera. Lin. sy. pl. G. IIII.

Sp. 1. ARISTOLOCHIA INDICA. *α* Cây Khoai cà.

Differ. spec. Ar. foliis cordatis, acutiusculis: caule volubili; pedunculis multifloris. Lin. sp. 13.

Hab.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, volubilis, teres, tenuis, multiplex, ramosus, longus, intricatus. *Folia* cordata, oblonga, acuta, integrerrima, glabra, petiolata, alterna. *Flos* fuscopurpureus: *pedunculus* multifloris, axillaribus. *Calyx* nullus. *Corolla* supera, ligulata. *Antheræ* 6, *stylo* crasso, brevissimo insidentia. *Capsula* sub-rotunda, infera, hexagona, 6-locularis, polysperma.

Habitat in sylvis Cochinchinæ, maximè in montibus dictis Nguon nhoung.

Burm. Ind. pag. 191. Radix Pularonica. Rumph. Amb. I. 9. cap. 81. tab. 177. Aristol. Indica Odorata. Burm. Zeyl. pag. 32.

Virtus: radicis. Attenuans, Deobstruens. Prodest in Colicâ, cibi inappetentia, febribus intermittentibus, obstructionibus, hydrope. Sapor totius plantæ amarus. Odor tenuis.

OCTANDRIA.

GENUS XV. PHAIUS.

Descriptio Naturalis.

Cal. Spatha ovato-lanceolata, magnâ, persistens, 1-flora.

Cor. Petala 5, lanceolata, striata, crassa, expansa, sub-æqualia.

Nectarium 2-partitum: labium interius cymbæforme, carnosum: exterius magnum, convolutum, sub-infundibuliforme, margine reflexâ, undulatâ, basi emarginatâ, appendiculata.

Stam. Filamenta nulla, præter membranam oblongam, horizontalem, rugosam, coloratam, styli basi adhærentem. *Antheræ* 8, sub-ovatae, operculatae, inæquales, dictæ membranæ bino ordine instratae.

Pist. Germ. oblongum, curvum, 6-sulcatum, florem sustinens. Stylus planus, brevis, inflexus, apici interioris nectarii insistens. Stigma simplex: apex ejusdem stylis coloratus.

Peric. Capsula oblonga, 6-lobata, curva, 1-locularis, polysperma.

Sem. Plurima, scobiformia.

Nom. ($\Phi\alpha\iota\sigma$ fuscus) a colore floris sub-nigro.

Char. Gener. Monogynus. *Cal.* spatha. *Cor.* petala 5, lanceolata, supera. *Nectar.* lab. convolutum, undulatum.

† Sp. 1. PHAIUS GRANDIFOLIUS. & Hac lön. β .
Differ. spec. Pha. foliis lanceolatis, plicato-sulcatis: scapo nudo, polyfloro.

Hab.

Hab. *Planta* terrestris, *caule* sesquipedali, simplicissimo, tereti, crasso, erecto. *Folia* lato-lanceolata, magna, plicato-sulcata, glabra, erecta, pauca, amplexicaulia. *Scapus* nudus, teres, polyflorus, caulem æquans. Color floris a facie sub-niger, a tergo albissimus. Odor nullus.

Habitat cultus in hortis Cochinchinæ, & Chinæ, pulchritudine floris æstimabilis.

DECANDRIA.

GENUS XVI. HELICTERES.

Char. Gener. Pentagyna. *Cal.* 1-phyllo, obliquus. *Petala* 5. *Neckarium* foliolis 5. *Caps.* 5, intortæ. Lin. sy. pl. G. 1114.

Sp. 1. HELICTERES ANGUSTIFOLIA. *San chi ma.*

Differ. spec. *Hel.* *foliis* lanceolatis, integerimis : *fructu* ovato, recto. Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, 5-pedalis, erectus, ramosus. *Folia* lanceolata, integerima, facie nitida, tergo venosa, tomentosa, petiolata, alterna. *Flos* dilutè purpureus, pedunculis 2-floris, axillaribus. *Calyx* tubo longo, curvo : limbo brevi, 4-fido, laciniâ sumimâ emarginatâ. *Corolla* petala 5, rotundata, parva, ad basim denticulo aucta. *Filamenta* 10, brevissima, omnia in tubum longum coalita, vel, si velis, tubo insistentia : *antheris* incumbentibus. *Stylus* 1, sub-æqualis staminibus. *Capsulae* 5, coalitæ in unam oblongo-ovatam, rectam, pedicellatam : seminibus plurimis, angulatis.

Habitat agrestis circa Cantonem Sinarum.

Osbeck. It. ad Sinas.

† Sp. 2. HELICTERES HIRSUTA. *Cay suo Chon.*

Differ. spec. *Hel.* Decandra : *foliis* cordatis, serratis : *fructu* 5-loculari, recto, hirsutissimo.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, 6-pedalis, erectus, teres, pilosus : *ramis* diffusis. *Folia* sub-cordata, apice acuta, ferrata, tomentosa, alterna, petiolata, magna. *Flos* obscuro-purpureus : *pedunculis* polyfloris, axillaribus. *Calyx* 1-phyllo, tubo longo, curvo, piloso, colorato : limbo brevi 4-fido, laciniâ supremâ emarginatâ. *Corolla* petala 5, turbinato-oblonga, inæqualia, conniventia, supra basim denticulo appendiculata ex utrâque parte : *unguis* longis receptaculo inhærentibus. *Filamenta* 10, brevia, sub-æqualia, omnia in tubum longum, curvum, receptaculo insidentem inferius terminata :

ta : antheris ovatis , bilocularibus , incumbentibus. Germen ovatum ; 5-gonum , superum , pedicello longo ad os tubi staminei elevatum. *Stylus* filiformis , tenuis , longior staminibus , germinis apici insistens. *Stigma* crassiusculum , minimum. *Pericarpium* Capsula oblonga , pedunculata , 5-valvis , 5-locularis , polysperma , obtusa , recta , hirsutissima , pilis longis ramosis , duriusculis , plurimis. *Semina* osea , angulata.

Habitat in sylvis planis Cochinchinæ.

Observ. In hâc , & præcedente specie stamina non sunt Gynandra , sed potius Monadelpha : nec pedicellus elevans germen (ab staminibus prorsus liber) pro receptaculo haberri potest.

† Sp. 3. HELICTERES UNDULATA. a Cay Uoi deai la.

Differ. spec. Hel. Decandra : foliis lanceolatis , undulatis : floribus congestis : Siliquis 5 , stellatis.

Hab. , & notæ. Arbor mediocris : ramis patentibus. Folia lanceolata , integerrima , undulata , glabra , alterna , petiolata. Flos parvus , rubro-viridis , congestus , sub-terminalis. Calyx nullus. Corolla 5-petala. Antheræ 10 , sessiles , bilocularis , germini ad basim insistentes. Germen pentagono-rotundum , pedunculatum , superum. Stylus filiformis , reflexus. Stigma orbiculatum , 5-partitum. Pericarpium siliquæ 5 , oblongæ , crassæ , coccineæ , superius rectæ , subitus convexæ , in formam stellæ horizontaliter ordinatæ. Semina pauca , ovata , levia , fusca , carnosa , utriquer valvæ pedicellis propriis adhærentia.

Habitat in Sylvis Cochinchinæ.

† Sp. 4. HELICTERES PANICULATA. a Cay Uoi tlön la.

Differ. spec. Hel. Polyandra : foliis ovatis , acutis : flore paniculato : siliquis 5 , stellatis.

Hab. , & notæ. Arbor magna : ramis patentibus. Folia ovata , sub-acuminata , integerrima , plana , glabra , alterna , petiolata. Flos rubescens , paniculis laxis , sub-terminalibus. Calyx nullus. Corolla 5-petala , patentissima. Antheræ sessiles ultra 20 , medio germini lateraliter adhærentes. Stylus filiformis , curvatus . Stigmate convexo , emarginato. Siliquæ 5 , oblongæ , bivalves , rubræ , polyspermæ , in orbem radiatæ.

Habitat in Sylvis Cochinchinæ.

POLYANDRIA.

GENUS XVI. POTHO S.

Char. Gener. *Spatha*. *Spadix* simplex. *Cal.* o. *Petala* 4, *Stam.* 4.
Baccæ 2-spermæ. Lin. sy. pl. G. 1122.

Sp. 1. POTHOS SCANDENS. a Cay Ráy leo.

Differ. spec. *Pot.* *petiolis* latitudine foliorum : *caule* radicante. Lin.
 sp. 1.

Hab., & notæ. *Planta* sub-parasitica, perennis : *radice* terrestri : *caule* tereti, longo, multiplici, parum ramoso, per arbores adrepente, *radiculis* lateralibus, brevibus, tenuibus. *Folia* oblonga, acuta, integriformis, glabra : *petiolis* longis semiamplexicaulibus, alternis, membranaceis. *Flos* pallidus, spadice oblongo, terminali, toto flosculis tecto : *spathâ* communi : *perianthio* nullo : *corollâ* 4-petalâ. *Stamina* plerumque 4, *Bacca* rubra, sub-ovata, succosa, parva. 1-2-sperma. *Folia* multo latiora sunt petiolis.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Adpendix arborum. Rumph. Amb. I. 9. cap. 86. tab. 181. fig. 2.

Observ. Adpendix duplo folio (Rumph. Amb. I. 9. pag. 490. tab. 184. fig. 1. 2. 3.) tanquam Pothos Scandens a Linnæo hoc loco citatur : quæ planta non est Pothos, sed Flagellaria Repens : prout jam supra diximus Classe sextâ, Genere 26. sp. 2. ubi videri potest.

GENUS XVIII. CALLA.

Char. Gener. *Spatha* plana. *Spadix* tectus flosculis. *Cal.* o. *Pet.* o.
Baccæ polyspermæ. Lin. sy. pl. G. 1121.

† Sp. 1. CALLA OCCULTA. a Cay Õi.

Differ. spec. *Cal.* *foliis* cordato-ovatis : *Spatha* spirali : *spadice* superne masculo.

Hab., & notæ. *Planta* l-pedalis, perennis, sub-acaulis. *Folia* cordata, ovata, glabra, multa, diffusa, petiolis longis, canaliculatis, basi dilatatis, interiores amplectentibus. *Spatha* longa, plana, in helicem voluta, flores (etiam in matrescentia) occludens. *Spadix* oblongus, totus tectus flosculis, inferius mixtis, ad apicem masculis. *Calyx* nullus. *Corolla* nulla. *Filamenta* brevia, sparsa. *Stigma* concavum, 3-fidum, sessile. *Bacca* 3-loba, 3-locularis, polysperma, lutea.

Habitat loca humida Cochinchinæ.

Dras.

Dracunculus Amboinicus, Anappur alba? Rumph. Amb. l. 8. c. 88. tab.
III. fig. 2.

GENUS XIX. ARUM.

Char. Gener. *spatha* monophylla, cucullata. *Spadix* supra nudus,
inferne foemineus, medio stamineus. Lin. sy. pl. G. 1119.

Sp. 1. ARUM DRACONTIUM. α Cu Chăoc: Bán hả. β Puón hía.

Differ. spec. Ar. *foliis* pedatis: *foliolis* lanceolatis, integerimis,
superantibus spatham spadice breviorem. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. Planta 8-pollicaris, acaulis, annua: *radice* peren-
ni, bulbo sub-rotundo, solido, extra, & intus albo, lævi. *Folia*
pedata, petiolata, erecta: *foliolis* lato-lanceolatis, integerimis,
plerumque ternis. *Spadix* generis proprius, subulatus, tenuis, tam
spatħā, quam foliis longior.

Habitat in cultum in hortis, & agris Cochinchinæ, & Chinæ.

Ar. Dracontium, acaule, foliis pedatis, receptaculo spathā longiore.

Thunb. Japon. pag. 233. Arum, sive Arisarum Virginianum, Dra-
contii folio, pene viridi, longo, acuminato. Pluk. Almag. pag. 52.
tab. 271. fig. 2.

Virtus: radicis. Exsiccans, Aperiens, Incidens. Prodest validè in
morbis pituitosis: quod frequenti usu a Medicis indigenis proba-
tum. Ut mitius operetur, sublatā nimiā acrimoniā, per coctionem,
vel infusionem in aquā Zingiberis obtinetur, & leviter ad ignem
torretur.

Sp. 2. ARUM TRIPHYLLUM. β Puón hía. α Bán hả tau.

Differ. spec. Ar. acaule, *foliis* ternatis: *floribus* monoicis. Lin. sp. 4.

Hab., & notæ. Planta 10-pollicaris, acaulis, annua: bulbo sub-ro-
tundo, albo, perenni. *Folia* lanceolata, ternata. *Spatha*, & *spa-
dix* ut praecedentis. *Spica* unica, flosculis inferioribus foemineis,
superioribus masculis. A superiore differt foliolis distinctis, non
pedatis: bulbo radicis minore, ac magis globofo, simulque virtu-
te Medicā fortiore.

Habitat in cultum in Chinâ, & Cochinchinâ.

Thunb. Jap. pag. 233. Arum, sive Arisarum minus triphyllum. Pluk.
Amalh. pag. 39. tab. 376. fig. 3.

Sp. 3. ARUM PENTAPHYLLUM. β Tiên nǎn sīn. α Nam tinh tau.

Differ. spec. Ar. acaule, *foliis* quinatis. Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. Planta 1-pedalis, sub-caulescens, erecta, annua: *ra-
dice* perenni, bulbo albo, compresso-rotundo. *Folia* quinata, lan-
ceo-

ceolata, integerrima, glabra. *Spatha*, spadix, flosculi generis proprii.

Habitat in cultum in Chinâ.

Burm. Ind. pag. 192. Ar. *Pentaphyllum Indicum*. Moris. hist. 3. pag. 540. tab. 5. fig. 27.

Virtus: radicis. Calefaciens, Attenuans, Deobstruens. Prodest in Epilepsia, Convulsionibus, Uteri obstructionibus: humores crassos inclit: morsibus animalium venenatis medetur.

Sp. 4. ARUM TRILOBATUM. α Nam tinh.

Differ. spec. Ar. acaule, foliis sagittato-trilobis: flore sessili. Lin. sp. 10.

Hab., & notæ. *Planta* 1-pedalis, acaulis, erecta, annua: radice perenni, bulbo sub-rotundo, compresso, glabro, semipollicari. *Folia* basi cordata, 3-loba, magna, pauca, lobis ovatis, sub-acutis: petiolis longis, angulatis, striatis, basi dilatatis, concavis. *Scapus* foliis brevior. *Spatha* latissima, plana, acuminata, fusco-rubra. *Spadix* sub-sessilis, subulatus, spathâ brevior, apice masculus, basi femineus, in medio cōsus villis plurimis, longis, flexuosis, rubris.

Habitat in Cochinchinâ.

Arisarum Amboinicum. Rumph. Amb. 1. 8. c. 86. tab. 110. fig. 2. *Arum trilobato* folio humilius, & minus, Zeylanicum. Herman. Parad. Bat. pag. 79. tab. 78.

Virtus: rad. Attenuans, Incidens, ferè eadem, quæ Ari *Pentaphylli*.

Sp. 5. ARUM SAGITTIFOLIUM. α Rây tiá. β Tai lei thâu.

Differ. spec. Ar. acaule, foliis sagittatis, triangulis: angulis divaricatis, acutis. Lin. sp. 11.

Hab., & notæ. *Planta* perennis, acaulis, 4-pedalis, erecta. *Folia* sagittata, basi bifidâ, divaricata, angulis omnibus acutis, fusco-viridia, magna: petiolis teretibus, rubro, & nigro maculatis. *Spatha* longa, cucullata. *Spadix* clavatus, brevior. *Scapi* breviores petiolis.

Habitat cultum, in cultumque in Cochinchinâ, & Chinâ.

Arum acaule, foliis sagittatis, triangulis, acutis: angulis extrorsum flexis. Cliff. pag. 345. sp. 3. *Arum minus*, sagittariæ foliis ex insula Barbados. Pluk. Phyt. tab. 149. fig. 2.

Usus esculentus, minus frequens, quamvis cæteris nitiis

Sp. 6. ARUM COLOCASIA. α Rây Bac hâ.

Differ. spec. Ar. acaule, foliis peltatis, ovatis, repandis, basi emarginatis. Lin. sp. 5.

Hab.

Hab., & notæ. *Planta* perennis, acaulis, 3-pedalis: *radice* magnâ, oblongâ, basi rotundatâ. *Folia* peltata, ovata, sub-acuminata, repanda, marginata, cinerea, magna, basi semibifidâ, rotundatâ: *petiolis* crassis, erectis, sub-teretibus, albicantibus, inferius dilatatis. *Scapus* brevis, spathâ subulatâ, reflexâ, planâ. *Spadix* subulatus, spathâ brevior, flosculis Ari propriis.

Habitat cultum in Cochinchinâ.

Arum Ægyptium, & Caladium sativum. Rumph. Amb. I. 8. c. 84. tab. 109. Arum maximum, Ægyptium, quod vulgo Colocasia. Bauh. Pin. pag. 195. n. 6.

Uſus. Eſca eſt ſalubris, & frequens, quamvis non delicate. Radix, & petioli cocti, folia tenera etiam cruda eduntur.

Sp. 7. ARUM ESCULENTUM. α Cây Môn. β Hải Yú.

Differ. spec. Ar. *foliis* ovatis, peltatis, integerrimis: basi emarginatis. Lin. sp. 6.

Hab., & notæ. *Planta* perennis, acaulis, 3-pedalis: *radice* bulbo magno, sub-ovato, fusco, ſolido: bulbis parvulis lateraliter accreſcentibus. *Folia* peltata, ovata, integerrima, glabra, læte viridia: basi semibifidâ, sub-rotundâ: *petiolis* teretibus, ad basim dilatatis, interiores amplectentibus. *Spatha* recta, patens, non cullata. *Spadix* brevior, apice nudus, basi foemineus, medio masculus.

Habitat frequentiſſimè in Cochinchinâ, & Chinâ, maximè ad ripas fluminum, & paludum margines in aquâ non profundâ.

Thunb. Jap. pag. 234. Caladium aquatile, Kelady Xula. Rumph. Amb. I. 8. c. 85. tab. 110. fig. 1.

Uſus. Cibus eſt communissimus in utroque regno. Radix, & petioli teneriores eduntur ſemper cocti. Folia cum ſale contufa tumores magnos refolvunt: contra morsus venenatos proficiunt.

Sp. 8. ARUM MACRORRHIZUM. α Ráy tláng. β Dea vú.

Differ. spec. Ar. acaule, *foliis* peltatis, cordatis, repandis: basi bipartitis. Lin. sp. 7.

Hab., & notæ. *Planta* perennis, acaulis, 3-pedalis: *radice* ſimplifici, longâ, obliquâ. *Folia* cordata, repanda, peltata, basi bipartita, sub-rotunda. *Spatha* cucullata, brevis. *Spadix* totus tectus, ſupernè masculus, infernè foemineus. *Bacculae* sub-rotundæ, rubræ. Habitat loca plana, præfertim humida in Cochinchinâ, & Chinâ. Burm. Ind. pag. 192. Arum Zeylanicum macrorrhizon. Burm. Zeyl. p. 34.

Sp. 9. ARUM ARISARUM. α Ráy hoang.

Differ. spec. Ar. acaule, *foliis* cordatis oblongis: *spathæ* aperturâ ovatâ, Lin. sp. 15.

Hab., & notæ. *Planta* perennis, sesquipedalis: *radice* oblongâ, crassâ. *Folia* oblonga, sub-acuta, basi cordata, aperturâ rotundatâ ad apicem petioli perductâ. *Spatha* erecta, supernè integra, cucullata, inflexa, foliis brevior. *Spadix* curvatus. *Bacculae* 1-spermæ, rubræ.

Habitat in sylvis, & sepibus Cochinchinæ.

Arisarum Latifolium maius. Bauh. Pin. pag. 196. n. 1. Hill. Brit. herb. pag. 336. tab. 49. fig. 11.

† Sp. 10. ARUM INDICUM. α Ráy Cây.

Differ. spec. Ar. Caulescens, sub-erectum: *foliis* ovatis, basi bifidis, rotundatis: *spadicibus* axillaris.

Hab., & notæ. *Caulis* perennis, 5-pedalis, brachium crassus, plurimque erectus. *Folia* maxima, ovata, sub-acuminata, basi bifida, rotundata, costis multis, transversis, parallelis: *petiolis* longis, subulatis, erectis, amplexicaulibus. *Spathæ* axillares, parvæ, acutæ, rectæ, convolutæ. *Spadix* subulatus, erectus: *flosculis* fœmineis ad basim insertis: *baccis* sub-rotundis, pallidis, parvis.

Habitat cultum in Cochinchinâ. Ejus caulis elixus esculentus est.

Arum Indicum sativum. Rumph. Amb. I. 8. cap. 81. tab. 106.

† Sp. 11. ARUM CUCULLATUM. β Chim mī vú.

Differ. spec. Ar. Caulescens, erectum: *foliis* peltatis, cordatis, auriculis cucullatis.

Hab., & notæ. *Planta* perennis, caule erecto, 2-pedali: *radice* carnosâ, magnâ, tereti, simplicissimâ. *Folia* peltata, cordata, acuminate, basis auriculis concavis: *petiolis* longis, teretibus. *Spadix* brevis, ferè totus tectus flosculis. Fœminei ad basim: *baccis* 4-spermis.

Habitat in Suburiis Cantoniensibus.

C L A S S I S X X I .

M O N O E C I A .

M O N A N D R I A .

1. ZANNICHELLIA. Masc. *Cal.* nullus. *Cor.* nulla.
Fœm. *Cal.* 1-phillus. *Cor.* nulla. *Pist.* 4.
Sem. 4.
- † 2. NYMPHANTHUS. Masc. *Cal.* multiplex. *Cor.* nulla.
Fœm. *Cal.* multiplex. *Cor.* nulla. *Stigm.*
3. *Fructus* 3-locularis, 2-spermus.
- † 3. POLYPHEMA. Masc. *Spathæ* lunatæ, claudentes *ament.*
ovatum, solidum, flosculis tectum. *Periant.* o. *Cor.* o.
Fœm. *Spathæ*, & *Am.* ut Masc. *Periant.*
o. *Cor.* o. *Styl.* 1. *Bacca* 1-sperma, par-
tialis.
- † 4. MORELLA. Masc. *Cal.* Amenti. *Cor.* o. *Anthera* ses-
filis.
Fœm. *Cal.* Am. *Cor.* o. *Stigm.* 2. *Drupa.*
5. CASUARINA. Masc. *Cal.* Amenti. *Cor.* Squamulæ bipar-
titæ.
Fœm. *Cal.* Am. *Cor.* o. *Styl.* 2-fidus. *Stro-
bilus.*

D I A N D R I A .

6. LEMNA. Masc. *Cal.* 1-phillus. *Cor.* o.
Fœm. *Cal.* 1-phillus. *Cor.* o. *Styl.* 1. *Caps.*
1-locularis.

T R I A N D R I A .

7. ZEA. Masc. *Gluma* 2-flora. *Gluma* 2-valvis.
Fœm. *Gluma.* 1-flora. *Gluma* 2-valvis. *Styl.*
1. *Sem.* 1, nudum, sub-rotundum.
8. COIX. Masc. *Gluma* 2-flora. *Gluma* 2-valvis.

Fœm.

MONOECIA.

9. OLYRA.

Fœm. *Gluma* 2-flora. *Gluma* 2-valvis. *Styl.*
2-fidus. *Sem.* 1, cortice offeo.

10. TYPHA.

Masc. *Gluma* 1-flora. *Gluma* 2-valvis.
Fœm. *Gluma* 1-flora. *Gluma*. 2-valvis. *Styl.*
2-fidus. *Sem.* 1, nudum.

† 11. RHAPHIS.

Masc. *Cal.* 3-phillus. *Cor.* o.
Fœm. *Cal.* capillaris. *Cor.* o. *Styl.* 1. *Sem.*
1, pappigerum.

12. PHYLLANTHUS.

Masc. *Involucrum* 3-florum. *Cal.* *Gluma*
2-valvis. *Cor.* *Gluma* 2-valvis.
Fœm. *Invol.* *Cal.* *Gluma* 2-valvis. *Cor.* *Gluma*
2-valvis, una aristata. *Styli* 2. *Sem.*
1, oblongum.

TETRANDRIA.

13. BUXUS.

Masc. *Cal.* 3-phillus. *Cor.* 2-petala.
Fœm. *Cal.* 4-phillus. *Cor.* 3-petala. *Sti-*
gm. 3. *Caps.* 3-locularis.

14. MORUS.

Masc. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* o.
Fœm. *Cal.* 4-phillus. *Cor.* o. *Styli* 2. *Sem.*
1, baccatum.

15. CICCA.

Masc. *Cal.* 4-phillus. *Cor.* o.
Fœm. *Cal.* 4-phillus. *Cor.* o. *Styli* 4. *Bac-*
4-sperma.

† 16. TRICARIUM.

Masc. *Cal.* 4-phillus. *Cor.* o.
Fœm. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* o. *Stigma* la-
ciniatum. *Drupa* 3-locularis.

17. URTICA.

Masc. *Cal.* 4-phillus. *Cor.* o. *Neclar.* Cy-
athiforme.
Fœm. *Cal.* 2-valvis. *Cor.* o. *Stigm.* villo-
sum. *Sem.* 1, ovatum.

PENTANDRIA.

† 18. POLYCHROA.

Masc. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* o.

Fœ-

Fœm. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* o. *Stigma* 1.
Caps. 1-sperma.

19. AMARANTHUS. Masc. *Cal.* propr. 5-phillus. *Cor.* o. *Stam.*
3, vel 5.

Fœm. *Cal.* idem. *Cor.* o. *Styli* 3. *Caps.*
circumscissa.

† 20. HEXADICA. Masc. *Cal.* 5-phillus. *Cor.* 5-petala.
Fœm. *Cal.* 6-phillus. *Cor.* o. *Stigm.* 6.
Caps. 6-locularis.

† 21. TREMA. Masc. *Cal.* 5-phillus. *Cor.* o.
Fœm. *Cal.* 5-phillus. *Cor.* o. *Stigm.* 2.
Drupa foraminosa.

22. XANTHIUM. Masc. *Cal.* comm., polyphillus, *Cor.* 5-fida.
Filam. connexa.
Fœm. *Cal.* o. *Cor.* o. *Styli* 2. *Drupa* 2-locularis.

† 23. VANIERIA. Masc. *Receptac.* commune. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* o.
Fœm. *Receptac.* idem. *Cal.* ut Masc. *Cor.* o. *Styl.* 1, *Sem.* 1. *nudum.*

HEXANDRIA.

† 24. NEPHROIA. Masc. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 3-petala.
Fœm. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 3-petala. *Stigm.* 6. *Drupæ* 6, reniformes.

25. COCOS PALMA. Masc. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 3-petala.
Fœm. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* 3-petala. *Stigm.* 3. *Drupa* trigona, cortice fibroso.

POLYANDRIA: *Stam.* plura, quam 7.

26. ARECA PALMA. Masc. *Cal.* 3-phillus. *Cor.* 3-petala. *Stam.* 9, sive plura.
Fœm. *Cal.* 6-phillus. *Cor.* 3-petala. *Pist.* 1. *Drupa* ovata, solida.

27. CARYOTA PALMA. Masc. *Cal.* 3-phillus. *Cor.* 3-petala. *Stam.* plurima.
Fœm. *Cal.* 5-phillus. *Cor.* 3-petala. *Stigm.* 2-fidum. *Drupa* globosa, solida.

28. SA-

MONOECIA.

28. SAGITTARIA.

Masc. *Cal.* 3-phyllo. *Cor.* 3-petala. *Stam.*
24 circiter.

Fœm. *Cal.* 3-phyllo. *Cor.* 3-petala. *Pistil-*
la 100. *Semina* numerosa.

29. FAGUS.

Masc. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* o. *Stam.* 12 cir-
ter.

Fœm. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* o. *Styli* 3. *Caps.*
2-sperma.

30. QUERCUS.

Masc. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* o. *Stam.* 10 cir-
citer.

Fœm. *Cal.* integer. *Cor.* o. *Styli* 5. *Glans*
coriacea.

31. JUGLANS.

Masc. *Ament.* imbricatum. *Cor.* 6-partita.
Stam. 18 circiter

Fœm. *Cal.* 4-fidus. *Cor.* 4-petala. *Styli* 2.
Drupa coriacea.

32. CLADODES.

Masc. *Cal.* 4-phyllo. *Cor.* o. *Stam.* 8.

Fœm. *Cal.* 4-phyllo. *Cor.* o. *Stigm.* 3.
Caps. 3-locularis.

† 33. PHYLLAUREA.

Masc. *Cal.* 5-phyllo. *Cor.* o. *Stam.* 30
circiter.

Fœm. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* o. *Styli* 3. *Bacca*
3-locularis.

† 34. TRIDESMIS.

Masc. *Cal.* 5-phyllo. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 20.

Fœm. *Cal.* 5-phyllo. *Cor.* o. *Styli* in 3
fasciculos collecti. *Caps.* 3-locularis.

† 35. TRIPHACA.

Masc. *Cal.* o. *Cor.* 5-fida. *Stam.* 15.

Fœm. *Cal.* o. *Cor.* 5-fida. *Styl.* 1. *Legu-*
mina 3.

† 36. DIAPHORA.

Masc. *Cal.* Gluma 2-flora. 3-valvis : inti-
ma aristata. *Cor.* Gluma 2-valvis, muti-
ca. *Stam.* 10.

Fœm. *Cal.*, & *Cor.* ut Masc. *Stigm.* 3,
sessilia. *Cém.* 1, triquetrum.

MONADELPHIA.

37. PINUS.

Masc. *Cal.* 4-phyllo. *Cor.* o. *Stam.* plu-
rima.

Fœm.

- Fœm. *Ament.* strobilaceum. *Cor.* o. *Pist.*
2. *Nuces* 2, alatae.
38. CUPRESSUS. Masc. *Amentum.* *Cor.* o. *Antheræ* 4, se-
siles.
- Fœm. *Ament.* strobilac. *Cor.* o. *Stigma*.
2. *Nux* angulata.
39. THUJA. Masc. *Amentum.* *Cor.* o. *Antheræ* 4.
Fœm. *Ament.* strobilac. *Cor.* o. *Pist.* 2. *Nux*
cincta ala.
40. CROTON. Masc. *Cal.* 5-phyllo. *Cor.* 5-petala: *Stam.*
Fœm. *Cal.* 5-phyllo. *Cor.* o. *Styli* 3. *Caps.*
3-cocca.
41. RICINUS Masc. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* o. *Stam.* multa.
Fœm. *Cal.* 3-partitus. *Cor.* o. *Styli* 3. *Cae-*
psula 3-cocca.
42. JATROPHA. Masc. *Cal.* o. *Cor.* 5-fida. *Stam.* 10.
Fœm. *Cal.* o. *Cor.* 5-petala. *Styli* 3. *Caps.*
3-cocca.
43. STERCULIA. Masc. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* o. *Stam.* 15
circiter.
Fœm. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* o. *Stylus* 1.
Caps. 5-locul.
- † 44. VERNICIA. Masc. *Cal.* 2-fidus. *Cor.* 5-petala. *Stam.* 10;
Fœm. *Cal.* ? *Cor.* ? *Stigma* obtusum, 3-fi-
dum. *Drupa*, nuce 3-loculari.

SYNOPSIS.

45. TRICHOSANTHES. Masc. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-fida, cincin-
nata. *Filam.* 3.
Fœm. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-fida, cincin-
nata. *Stylus* 3-fidus. *Ponum* oblongum.
46. MOMORDICA. Masc. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-fida. *Filam.* 3.
Fœm. *Cal.* 5-fidus. *Cor.* 5-fida. *Styl.* 3-fi-
dus. *Pomum* elasticum.
47. CUCUMIS. Masc. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-fida. *Filam.* 3.
Fœm. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-fida. *Styl.*
3-fidus.

-OM

3-fidus. Pomum : seminibus argutis.

48. CUCURBITA. Masc. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-fida. *Filam.* 3.
Fem. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-fida. *Styl.*
3- fidas. *Pomum*: fem. marginatis.

49. BRYONIA. Masc. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-partita. *Filam.* 3.
Fem. *Cal.* 5-dentatus. *Cor.* 5-partita. *Styl.* 2-fidus. *Racca*.

50. MURICIA. Masc. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* 5-petala. *Fi-*
lam. 3. Fem. *Cal.* 5. partitus. *Cor.* 5-petala. *Styl.*
sub-integer. *Bacca*: *semin.* orbiculatis.

АИЗАНЕРИУС

42. CUCUMIS.	W. 2- <i>glomeratus</i> . Ca. 2- <i>frigida</i> . Tr. 2- <i>frigida</i>
43. F. 2- <i>frigida</i> .	Psom. Ca. 2- <i>frigida</i> . Ca. 2- <i>frigida</i> . Tr. 2- <i>frigida</i>
44. MOMORDICA.	Tr. 2- <i>frigida</i> . Ca. 2- <i>frigida</i> . Tr. 2- <i>frigida</i>
45. TRICHOSENTHES.	W. 2- <i>glomeratus</i> . Ca. 2- <i>frigida</i> . Tr. 2- <i>frigida</i>

MONANDRIA.

GENUS I. ZANNICHELLIA.

Char. Gener. Masculi. Cal. o. Cor. o. Germina circiter 4. Senti
Fœminei. Cal. 1-phyllo. Cor. o. Germina circiter 4. Senti
totidem. Lin. sy. pl. G. 1124.

† Sp. i. ZANNICHELLIA TUBEROSA. Mach mon nam.

Differ. spec. Zan. foliis ensiformibus, radicalibus: floribus spicatis:
radice tuberosa.

Hab., & notæ. Planta perennis: caule nullo. Radix tuberibus plu-
rimis, fasciculatis, oblongis, utrinque acutis, albis. Folia en-
siformia, $1\frac{1}{2}$ -pedalia, plana, striata, obscurō-viridia, glabra, ses-
silis. Scapus teres, nudus, erectus, foliis brevior: spică simplici,
longa. Flos masculus apetalus, flamine unico, calyce nullo. Fœ-
mineus in eadem spicā, calyce 1-phyllo, 6-partito. Baccæ ovato-
oblongæ, monospermae.

Habitat loca humida Cochinchinæ, non frequens.

† GENUS II. NYMPHANTHUS.

Descriptio Naturalis.

* Masculi flores.

Cal. Perianthium 4-fidum, laciniis sub-rotundis, patentibus.

Cor. nulla.

Stam. Filamentum 1, crassum, subulatum, calyci æquale. Anthera ova-
ta, magna, 4-locularis, erecta. Glandulæ 4, orbiculatæ ad basim
staminis.

* Famineus flos in eodem ramo.

Cal. Perianthium 6-phylum, inferum, persistens: foliolis ovatis, pa-
tentibus.

Cor. nulla. Nectarium 6-fidum, laciniis emarginatis, marcidis.

Pist. Germen sub-rotundum. Stylus 1, crassus, calyce longior. Stigma-
ta 3, bifida.

Peric. Capsula compresso-rotunda, obtuse trigona, trilocularis, bis-
perma.

Sem. hinc gibba, inde angulata.

Nom. (Νύμφη sponsa: θεος flos.) ob flores in variis speciebus sic
dispositos, ut singuli singulis desponderi videantur, Fœminei Masculis.

Char. Gener. Masc. *Cal.* multiplex. *Cor.* o. *Stamen* 4-6-loculare.

Fœm. *Cal.* multiplex. *Cor.* o. *Fructus* 3-locularis, 2-spermus.

^{NYMPHANTHUS SQUAMIFOLIA} t Sp. 1. NYMPHANTHUS SQUAMIFOLIA. Cây Bay oué.

Differ. spec. Nymph. *foliolis* sub-rotundis, imbricatis : *floribus* solitariis.

Hab. *Arbor magna* : *ramis* ascendentibus : *cortice* fusco, crasso, fiso : *ligno* durissimo, gravi, fusco-rubro. *Folia* alternatim-pinnata, plurimi-iuga : *foliolis* sub-rotundis, minimis, sub-sessilibus, imbricatis. *Flos* axillaris, solitarius, minimus : *pedunculis* brevibus, retro curvatis, sceminae crassioribus, brevioribus, in eodem raimo, sparsis. *Capsula* 3-valvis, 3-locularis, 2-sperma.

Habitat in sylvis montanis Cochinchinæ.

Usus. Lignum ad ædificandum idoneum.

Virtus : foliorum, florum, & fructuum. Resolvens, Emolliens, Anodyna. Usus præcipue in affectionibus pectoris, renum, ac vesicæ.

^{NYMPHANTHUS PILOSA} t Sp. 2. NYMPHANTHUS PILOSA. a Cây Bot müoi.

Differ. spec. Nymph. *foliolis* ovatis, acutis, utrinque pilosis : *floribus* geminis : *fructu* baccato, axillari.

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, ramosissima, expansa. *Folia* alterne pinnata : *foliolis* ovatis, sub-acuminatis, integerrimis, utrinque pilosis. *Flos* geminus, apetalus, Masculus, & Fœmineus in eadēm axillâ. *Masculi calyx* 6-phyllo, *foliolis* lanceolatis, erectis. *Antera* 1, ovalis, sessilis, 6-locularis. *Fœminei calyx* similis. *Stylus* crassus, brevis : *stigmatibus* 3, longiusculis, erectis. *Bacca* parva, compresso-rotunda, 6-loba, 3-locularis, 2-sperma.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

^{NYMPHANTHUS CHINENSIS} t Sp. 3. NYMPHANTHUS CHINENSIS. a Siong chu tsao.

Differ. spec. Nymph. *foliis* oblongis, acuminatis : *floribus* sub-ternis, *Masculis* inferioribus : *cauli* fruticoso.

Hab., & notæ. *Caulis* fruticosus, 4-pedalis, erectus, ramosissimus.

Folia oblonga, acuminata, integerrima, tomentosa, alterna, petiolata. *Flos* uterque apetalus, lateralis, 1-3-natus, *masculus* inferior, pedunculis longioribus. *Antera* 6-locularis. *Stylus* nullus. *Germen* apice pertusum loco stigmatis. *Bacca* 3-locularis, 2-sperma.

Habitat agrestis prope Cantonem Sinarum.

^{NYMPHANTHUS RUBRA} t Sp. 4. NYMPHANTHUS RUBRA. a Cây Do sot.

Differ. spec. Nymph. *foliolis* ovatis, glabris : *floribus* axillaribus, congestis, mixtis. *Fructu* capsulari.

Hab.,

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris, ramis patentibus, ramulis rubris.

Folia alternè pinnata, multi-juga : *foliolis* ovatis, integerrimis, glabris. *Flos* apetalus, congestus, mas, & foemina in eadem axillâ. *Masculi calyx* cyathiformis, 6-sidus, laciniis brevibus, rotundatis, patentibus. *Filamentum* 1, cylindraceum, crassum. *Antheræ* 3, biloculares, oblongæ, filamento parallelæ, in longitudinem adhaerentes. *Fœminæ calyx* rotatus, 6-sidus, coloratus, laciniis rotundatis, undulatis. *Stylus* nullus. *Stigmata* 3, bifida, reflexa. *Capitula* sub-rotunda, 3-valvis, 3-locularis, 2-sperma.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

Sp. 5. NYMPHANTHUS NIRURI. Cay Chô de.

Differ. spec. Nymph. *caule* herbaceo : *foliolis* ovato-oblongis : *floribus* geminis, pedunculis retortis : *fructu* capsulari.

Habitus, & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 2-pedalis, teres, ramis paucis, erectis. *Folia* alternatim pinnata, multi-juga : *foliolis* ovato-oblongis, integerrimis, obtusis, glabris, pallide virentibus, minusculis. *Flos* 2-natus, mas, & fœmina in eadem axillâ : *pedunculis* post terga foliorum retortis. *Corolla* utriusque nulla. *Calyx* uterque campanulatus, patens, 5-partitus, laciniis lanceolato-ovatis, coloratis. *Filamentum* 1, crassum, calyce brevius : *antheris* 3, bilocularibus, sub-rotundis. *Nectarium* glandulis 5, circundantibus stamen. *Fœminæ nectarium* nullum. *Stylus* nullus. *Stigmata* 3, bifida, reflexa. *Capitula* sub-rotunda, 3-locularis, 3-valvis, 2-sperma.

Habitat inulta in hortis, & agris Cochinchinæ.

Phyllanthus Niruri. Lin. sy. pl. v. 4. pag. 121. sp. 2. Herba mœroris alba. Rumph. Amb. l. 10. c. 30. tab. 17. fig. 1. Urinaria Indica, erecta, vulgaris. Burm. Zeyl. pag. 230. tab. 93. fig. 2.

Virtus. Urinam, & menses violenter promovet, nec satis tutò. Rumphius, loco citato, prædicat hujus herbe virtutem contra dysenteriam, colicam, epilepsiam puerorum, convulsiones, & alias morbos : pro quo fidc-juslor non stabo.

Observ. Cum præcedentes 5 species Nymphanthi semper Monandras observaverim, huic ordini potius abscribendas censui, quam Phyllantho adjungere, quæ in Monoecia Triandriæ militat ; neque enim placere possunt Genera, quæ passim in charactere effentiali deficiunt, quatuorvis alioquin habitu, & aliis notis convenient. In nostris fructus constanter invenitur trilocularis, bispermus. *Flos* semper apetalus : *calyce* quidem variante, numero nunc polyfido, nunc polyphyllo, quod indicate volui termino *calyx multiplex*, cum aliud clarior non occurreret. Maiorem varietatem invenimus apud Auctores in descriptione Phyllanthi : Emblicam, & Urinariam in eodem genere, & ordine servamus, quia Triandras invenimus.

t GE-

GENUS III. POLYPHEMA.

Descriptio Naturalis.

* Masculi flores.

Cal. Spatha 1-phylla, acuta, lunata, includens Amentum ovatum, solidum, muricatum, flosculis tectum: alii spathis, & amentis successivè gravida.

Perianthium proprium nullum.

Cor. nulla.

Stam. Filamentum 1, subulatum, breve, insidens receptaculo proprio, brevi, carnosu, turbinato, 4-6-angulato. Anthera sub-rotunda, bilocularis.

* Fæminei flores in diversis Amentis ejusdem plantæ.

Cal. ut Masc.

Cor. nulla.

Pist. Germen oblongum, angulatum, inferum, Amento occultum.

Stylus subulatus, brevis, patens extra Amentum. Stigma simplex.

Peric. Bacca ovata, maxima, composita ex baccis partialibus, turbinatis, angulatis, 1-spermis, receptaculo communi, tereti affixis: intermixtis ligulis pluribus coriaceis, sub-equalibus, ex germinibus abortientibus residuis.

Sem. 1, oblongo-ovatum, muticum, cortice tenui obductum.

Nom. Polyphemam dixi a giganteâ Bacce magnitudine: cuius stamen unicum in mare, & pistillum in foemina quasi monoculam faciunt.

Char. Gener. Masc. *Spatha* lunata, continens Amentum ovatum, solidum, flosculis tectum. *Perianthium* o. Cor. o.

Fœm. *Spatha*, & Ament. ut Masc. *Perianth.* o. Cor. o.

Stylus 1. *Bacca* partialis 1-sperma, inclusa.

† Sp. 1. POLYPHEMA JACA. a Cây Mit. Y xu: Po lomat.

Differ. spec. Pol. foliis ovalibus, integerrimis, alternis, levibus.

Hab. Arbor magna: cortice scabro, crasso, fusco: ramis tortuosis, longis, sub-ascendentibus. *Folia* sub-ovalia, sub-acuminata, integerrima, glabra, alterna, petiolata, semipedem longa, plana, nitida, costis transversis, parallelis. *Amentum*, flosculis murefcentibus, 4 pollices longum, obtusum, scabrum, obscuro-viride: *Masculum* deciduum: *Fæmineum* in baccam compositam excrevit, sub-ovatam, inaequalem, muricatam, saepe binos pedes longam, unum, & amplius latam: cortice crasso, carnosu, fusco-viridi. *Baccae* partiales intus clausæ 100, vel plures, flavæ, carnosæ, dulces, odo-

odoræ, edules. Fructus pedunculis brevibus, crassis pendentes ab imo trunko, usque ad maiores ramos. Omnes arboris partes manant humore albicante, tenacissimo.
 Habitat frequentissimè culta in totâ Cochinchinâ: raro in Chinâ.
 Jaca. A-Costa. Aromat. cap. 40. Apud Clus. Exot. pag. 281. Soccus arboreus maior: Nanka. Rumph. Amb. I. 1. c. 25. tab. 30. Ubi optima icon, si Amentum cum spathis excipias.
 Usus. Lignum hujus arboris est optimum, durabile, & flavo colore pulchrum. Baccæ eduntur tam crudæ, quam elixæ: semina tosta.
 Observ. Apud Linnæum Juniorem (suppl. pl. pag. 61, & pag. 411.) invenitur genus novum Artocarpus, cuius speciem secundam facit hanc nostram Polyphemam vocans Artocarpum Integrifoliam, cum primam speciem dixisset Artocarpum Incifum, de quo judicare non possum, quia non vidi. At, supposito, quod Linnæana descriptio, & essentialis character Artocarpi compræbetur in ejus primâ specie, secundæ (quæ est nostra Polyphema) aptari nequit; siquidem in hâc non observatur Amentum Cylindricum, nec Calyx bivalvis, au Drupa, fructusve multilocularis, seminibus pilo terminatis, stigmata duo, ac pedunculi pilis longis hirsuti. Omnia hæc, & singula desiderantur in Polypheme primâ specie jam descriptâ, sicut etiam in subsequenti nunc describendâ: quæ ambæ frequenter occur-
 runt in Indiâ.

† Sp. 2. POLYPHEMA CHAMPEDEN. & Cây Mit mai.

Differ. spec. Pol. foliis oblongis, integerrimis, pilosis, rugosis, sparsis.

Hab., & notæ. Arbor supra mediocrem: trunko, & ramis rectis, effuscentibus. Folia oblonga, sub-acuta, integerrima, venosa, rugosa, pilosa, superius obscuro-viridia, subitus flavescens, sparsa, petiolis longis. Spathæ sære repando-incisæ. Amenta oblongo-ovata, scabra, flosculis propriis testa, ut in Polyph. Jacâ. Baccæ compositæ vix pedem longæ, 4 pollices latæ, muricatae, flavo-virides: baccis partialibus plurimis, ovatis, sub-angulatis, flavis, humefcentibus, parvis, edulis, nimiâ dulcedine, & intenso odore parum gratis. Tota arbor humore lactescente scatet. Fructus pendent ex summo trunko, & ramis pedunculis longis.

Habitat in altis sylvis Cochinchinæ. Colitur etiam, & Champeden vocatur a populis Malaiis circa fretum Malaccense habitantibus.

Champidaca. Bont. Jay. I. 6. cap. 31. pag. 119. Soccus arboreus minor: Tsjampadaha. Rumph. Amb. I. 1. cap. 26. tab. 31.

Usus. Lignum non minus utile, & durabile, quam præcedens: sed fibris crassioribus minus elegans, & colore minus pulchruu.

† GENUS IV. MORELLA.

Descriptio Naturalis.

* Masculi flores.

Cal. Amentum filiforme, strictum, imbricatum, squamis carnosis, trigonis, parvis.

Perianthium o.

Cor. nulla.

Stam. Filamentum nullum. Anthera 1, sub-ovata, ad basim squamæ amenti.

* Fæminei flores in eodem amento ad apicem.

Cal. Squama amenti, ut in Masculo. Perianthium nullum.

Cor. nulla.

Pist. Germen sub-rotundum. Stylus o. Stigmata 2, subulata, patentia.

Peric. Drupa sub-rotunda, pulpâ vesiculari exterius distincta.

Sem. Nux sub-ovata, lacunosa, 2-locularis: nucleis compresso-ovatis.

Nom. Morella, quasi parvum Morum, cui fructus facie similis.

Char. Gener. Mas. Cal. Amenti. Cor. o. Anthera sessilis.

Fœm. Cal. Amenti. Cor. o. Stigmata 2, sessilia. Drupa nuce lacunosa, 2-loculari.

† Sp. 1. MORELLA RUBRA. *Yam mœi: Deang mai. & Deau*

Differ. spec. Mor. foliis oblongis, sub-integerrimis, glabris, sparsis: amentis lateralibus.

Hab. Arbor 8-pedalis: caule tortuoso, fusco: ramis patentibus. Folia oblonga, sub-acuta, pleraque integerrima, aliqua interruptè serrata, glabra, sparsa, petiolata. Florum amenta lateralalia, brevia, squamis 1-floris, apetalis. Drupa rubra, acida, diametro 8 lineas æquans, exterius vesiculis succosis: facie Moro similis, nuce caver-nosâ Persico, sapore, & colore Ceraso acido.

Habitat culta in China. Agrestis, fruticosa, & multo minor in Cochinchinâ.

Observ. Suspicor hanc esse Prunum Japonicam fructu purpureo, Moro simili. Kœmpf. Hist. Jap. I. 1. pag. 101. Nec multum abhoret a Cudrano. Rumph. Amb. I. 7. cap. 14. tab. 16.

Uſus. Fructus tam palato, quam stomacho gratus est. Crudos edunt Sinenses: Europæi saccharo condunt, & farciunt placentas, Macal, & Cantone mensis apponendas. Cochinchinenses, vel semimaturos coquunt cum piscibus, vel maturos ad tempus deponunt in vasis terreis, sinuntque fermentari, ut vinum eliciant sapore, odore, & colore non contemnendum.

GENUS V. CASUARINA.

Char. Gener. Masc. *Cal.* Amenti. *Cor.* squamulæ bipartitæ.
 Fœm. *Cal.* Amenti. *Cor.* o. *Stylus* 2-fidus. *Strobilus.*
 Lin. Jun. Suppl. pl. pag. 62. G. 1428.

† Sp. 1. CASUARINA AFRICANA. γ. . . .

Differ. spec. Cas. *frondibus* filiformibus, ad apicem tumescens, ibi floriferis: *strobilis* sub-rotundis, axillaribus.

Hab., & notæ. *Arbor* supra mediocrem: *ramis* longis, diffusis, paucis: *ramulis* frondiferis, reclinatis. *Frondes* 1-pedales: sub-teretes, strictissimæ, vix folio Pini crassitie æquales, sub-articulatæ: *foliolis* tubulosis, longiusculis, integrè vaginantibus, 7-sulcatis, apice 7-fidis, laciniis acutis appressis. *Flos* *Masculus* apetalus, terminans frondem, ibi in *Amentum* incrassatam: *squamis* foliolo similibus, crassioribus, brevioribus, vaginantibus, 7-partitis: laciniâ singulâ portante singulum *filamentum* filiforme, squamâ longius: *Antherâ* ovata, 2-loculari, stante. *Flos fæmineus* Amento brevi ad axillam frondis: *squamis* crassioribus, 7-partitis, acutis, vaginantibus, *Masculi* similibus. *Corolla* nulla. *Stylus* 1, bifidus. *Pericarpium Strobilus* sub-rotundus, semipollicaris, lignosus, in 12 valvas perpendiculariter dehiscens: fissurâ singulâ loculos 3-4, monospermous aperiente: valvulis partialibus acutis. *Semen* 1 sub-ovatum, alâ membranaceâ terminatum. *Frondes* ad apicem ramulorum fasciculatæ, reflexæ.

Habitat litora arenosa continentis Africæ Orientalis.

Casuarina Equisetifolia (Lin. Jun. Supp. pag. 412. ex Forst. gen. n. 52.) & Casuarina Litorea (Rumph. Amb. l. 4. cap. 50. tab. 57.) cunctem habitum portant, & ab Africanâ specie non different, dummodo similes strobilos habeant, & frondium apices intumescentes in Amenta Mascula Convertantur, prout in Africanâ observatur. Squamulas Cor. 2-partitas non vidi.

Usus. Lignum durissimum, & gravissimum hujus arboris non facile corruptioni fit obnoxium.

DIANDRIA.

GENUS VI. LEMNA.

Char. Gen. Masc. *Cal.* 1-phyllo. *Cor.* nulla.
 Fœm. *Cal.* 1-phyllo. *Cor.* o. *Stylus* 1. *Caps.* 1-locularis.
 Lin. sy. pl. G. 1130.

Sp. 1. LEMNA MINOR. α Beo, cám.

Differ. spec. Lem. *foliis* sessilibus, utrinque planiusculis: *radicibus* solitariis. Lin. sp. 2.

Hab., & notæ. Planta minima, annua: radiculâ simplicissimâ. Folium unicum, ovatum, sub-acutum, integerimum, planum, glabrum, pallidum, sessile. Florem non observavi.

Habitat ubique in aquis stagnantibus iu Cochinchinâ.

Thunb. Jap. pag. 24. Lenticula Palustris. Bauh. Pin. pag. 362. n. 1.

TRIANDRIA.

GENUS VII. ZEA.

Char. Gen. Masc. in distinctis spicis. Cal. Gluma 2-flora, mutica. Cor. Gluma mutica.

Fœm. Cal. Gluma 2-valvis. Cor. Gluma 2-valvis. Stylus 1, filiformis, pendulus. Sem. solitaria, receptaculo oblongo immersa. Lin. sy. pl. G. 1133.

Sp. 1. ZEA MAYS. α Cây Báp. β Páo túc: Leam.

Differ. spec. Zea Culmo simplicissimo, solido: floribus Masculis terminalibus, paniculatis: Fœmineis axillaribus, sessilibus.

Hab., & notæ. Culmus annuus, 6-pedalis, erectus, crassus, solidus, simplicissimus. Folia subulata, aspera, magna, reflexa, amplexicaulia. Flos Masculus terminalis, spicis compositis, laxis: Fœmineus axillaris, spicis densis, subulatis: flosculis sessilibus, stylo pendulo, omnium longissimo: seminibus sub-rotundis, flavis, rubris, vel albis: receptaculo crassissimo, 6 pollices longo, foveis excavato undique affixis.

Habitat latè culta in Cochinchinâ, & Chinâ.

Usus Esculentus, Nutiens, Innocuus: pro frumento habetur.

Thunb. Jap. pag. 37. Mays. Tournef. Inst. pag. 531. tab. 303, 304,
305.

GENUS VIII. COIX.

Char. Gener. Masc. in spicis remotis. Cal. Gluma 2-flora, mutica. Cor. Gluma mutica.

Fœm. Cal. Gluma 2-flora. Cor. Gluma mutica. Styl. 2-partitus. Sem. calyce ossificato tectum. Lin. sy. pl. G. 1135.

Sp. 1. COIX LACHRYMA. & Cay. Bo. b2: I' di nhon. g. Y. ygin. †
Differ. spec. Co. culmo ramoso : foliis rugosis : seminibus ovatis. Lin.
sp. 1.

Hab., & notæ. *Culmus* 6-pedalis, perennis, sub-teres, solidus, articulatus, erectus, ramosus. *Folia* lanceolata, integerima, longa, subtilis rugosa, reflexa, amplexicaulia. *Flos* axillaris, pedunculo communi longo, tenui, sub-erecto : *Masculus* ad apicem, multus, spiculat sub-ovata : *Calyce*, & *Corolla* bivalvibus, muticis : *Filamentis* 3, capillaribus, *antheris* oblongis. *Eamineus* ad basim, solitarius : *calyx* bivalvi, sub-ovato, concavo, duriusculo. *Corollam* non vidi. *Styli* 2, capillares, prorsus distincti : *stigmatilis* longis, villosis. *Calycis* glumæ immature conniventes *Germini* coalescunt, fitque semen ovatum, hinc convexum, inde planiusculum, sub-acuminatum, fusco-rufum, nitidum, intrinsecus album, farinaceum, cortice olleo vestitum.

Habitat frequenter culta in Cochinchinâ, & Chinâ. †

Thunb. Jap. pag. 37. Lachryma Job Indica : Salee. Rumph. Amb. l. 8.
c. 28. tab. 75. fig. 2. Catriconda. Rheed. Malab. part. 12. pag. 133.
tab. 70.

Virtus : semen. Cotrobora, Nervina, sub-Diuretica. Prodest in ulceribus pulmonum, Hydrope, artuum, ac præcordiorum debilitate. Usus vulgaris esculentus.

Observ. Planta Rumphio dicta *Ova piscium* non est hujus Generis, ubi a Linnæo perperam citatur.

† Sp. 2. COIX AGRESTIS. & Bo. b2: hōng.

Differ. spec. Co. culmo simplicissimo : foliis lævibus : seminibus subrotundis. †

Hab., & notæ. *Culmus* 3-pedalis, cespitosus, simplicissimus, teres, solidus, articulatus, glaber : radice perenni, repente. *Folia* lanceolato-linearia, acuminata, integerima, lævia, sub-erecta, alterna, amplexicaulia. *Flos* pedunculis polyfloris, longis, erectis, axillaris, *Masculis*, & *Eamineus* ex eadem axilla. *Glumæ* ut in superiori specie. *Semen* sub-rotundum, fuscum, nitidum, minusculum.

Habitat agrestis in locis humidis : nec esculenta.

Lithospermum Amboinicum : Salee Utan. Rumph. Amb. l. 10. cap. 16.
tab. 9. fig. 1. Lachryma Job paludosa, minor. Burm. Zeyl. pag. 138.

GENUS IX. OLYRA.

Char. Gen. Masc. *Cal.* Gluma 1-flora, aristata. *Cor.* Gluma mutica.
Foem. *Cal.* Gluma 1-flora, patula, ovata. *Stylus* 2-fidus.
Sem. cartilagineum. Lin. sy. pl. G. 1136.

Aaaa ii

† Sp. 1.

† Sp. n. OLYRA ORIENTALIS. & Cây Lach khén.
Differ. spec. Ol. culmo triquetro : spicis compositis : seminibus trigonis, scabris.

Hab., & notæ. Culmus 4-pedalis, trigonus, erectus. Folia subulata, longa, semiamplexicaulia. Flos spicis compositis : spiculis partialibus distichis, oblongis, erectis. Flores Masculi plures ad basim cum jufquen Fœminæ. Calyx Masculi gluma 1-flora, aristata : staminibus tribus. Semen trigono-rotundum, asperum, album, magnum : mehill dulla cartilaginea, non compacta.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

GENUS X. TYPHA.

Char. Gen. Masc. Amentum Cylindricum. Cal. obsoletè 3-phyllus. Cor. o.

Fœm. Amentum Cylindricum infra masculos. Cal. capillo villoso. Cor. o. Sem. 1, insidens pappo capillari. Lin. sy. pl. G. 1131.

Sp. r. TYPHA LATIFOLIA. & Bô hoàng. & Pú hoám.

Differ. spec. Typh. foliis sub-ensiformibus : spicæ masculæ, fœmineæ que approximatis. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. Planta palustris, radice repente : culmo tereti, recto, 3-pedali. Folia sub-ensiformia, glabra, erecta. Flos terminatus : amento cylindrico, crasso, solido, lutescente, villoso : fœminæ inferior : masculus eidem contiguus ad apicem.

Habitat in paludibus Chinæ, & Cochinchinæ.

Typha palustris maior. Bauh. Pin. pag. 20. n. 1. Typha vulgaris. Hill. Brit. herb. pag. 506. tab. 71. fig. 28.

Virtus. Sub-adstringens. Ufus in dysenteriâ, & Gonorrhœâ, orisque ulceribus : sanguinis erassitiem resolvit, urinam promovet.

GENUS XI. RAPHIS.

Descriptio Naturalis.

* Masculi flores 2, pedunculati, involucro communi tecti.

Cal. Gluma monoflora, bivalvis : valvis subulatis, coloratis, muticis, sub-aequalibus.

Cor. Gluma bivalvis : valvis lanceolatis, membranaceis, ciliatis, muticis, calyce brevioribus.

Stam. Filamenta tria, brevia. Antheræ oblongæ.

* Fæ-

* *Fæmineus flos* 1, sessilis, infra Masculos, in eodem involucro, piloso, brevi; monophyllo.

Cal. ut *Masculi*, illo brevior.

Cor. Gluma bivalvis, calyci sub-æqualis: una aristata, aristâ acutissimâ, longiusculâ.

Pist. Germen ovatum. Styli duo, breves. Stigmata plumosa.

Peric. nullum, præter glumas permanentes.

Sem. 1, oblongum, compressum.

Nom. (*Pap's acus*) ab aristâ corollæ vestes viatorum penetrante.

Char. Gen. *Masc.* *Involucrum* 1-phyllum, 3-florum. *Cal.* Gluma 2-valvis, colorata. *Cor.* Gluma 2-valvis, ciliata.

Fœm. *Invol.* idem. *Cal.* ut *Masc.* *Corolla* 2-valvis Gluma 1, aristata. *Styli* 2. *Sem.* 1, oblongum.

† Sp. 1. RHAPHIS TRIVIALIS. & Co may. & . . .

Differ. spec. Rhaph. *culmo* tereti, sub-nudo: *spicâ* laxâ, terminali.

Hab. *Herba* annua, radice repente. *Culmus* 1-pedalis, sub-nudus, teres, tenuis, erectus, glaber, sub-simplicissimus. *Folia* sub-radicalia, lanceolata, brevia, sessilia, amplexicaulia. *Flos* spicâ terminali, solitariâ, conicâ, laxâ, pedunculis longis, rectis, assurgentibus. Habitat ubique prope vias, hominibus valde incommoda in Cochinchinâ, & Chinâ; quia vestibus adhærens tædiosè avellitur, cum excuti nequeat.

Gramen aciculatum: Cussu. Rumph. Amb. I. 10. c. 8. tab. 5. fig. 1.

Observ. Nescio a quo inductus Cel. Linnæus hanc plantam Rumphianam conjunxit cum Panico Colonum (Sy. pl. 1. pag. 155. sp. 8.).

Hæc certè (etiam prout a Rumphio describitur, & pingitur) nihil commune habet cum Panico præter stamina.

GENUS XII. PHYLLANTHUS.

Char. Gen. *Masc.* *Cal.* 6-partitus, campanulatus. *Cor.* o.

Fœm. *Cal.* 6-partitus. *Cor.* o. *Styli* 3, bifidi. *Caps.* 3-locularis. *Sem.* solitaria. Lin. sy. pl. G. 1142.

Sp. 1. PHYLLANTHUS EMBLICA. & Cây Boung ngọt. & Hac mìn sân.

Differ. spec. Phyl. *foliis* pinnatis, floriferis: *caule* arboreo: *fructu* baccato. Lin. sp. 6.

Hab., & notæ. *Arbuscula* 8-pedalis: ramis diffusis. *Folia* oblongo-ovata, integerrima, glabra, alternatim pinnata, multi-juga. *Bacca* parva sub-pyriformis, carnosa, sub-acida, edulis, 3-locularis, 2-

sper-

sperma. *Calyx* utriusque floris sub-rotatus, 6-fidus : lacinias obtusis, crassis. *Corolla* nulla. *Filamenta* nulla. *Antheræ* 3, receptaculi triangoni angulis insidentes. *Flores* Masculi, & Fœminei in eodem folio, sparsi. *Germen* 3-gonum. *Stylus* nullus. *Stigmata* 3, bifida. *Bacca* in Sinis exsucca.

Habitat agrestis in Cochinchinâ, & Chinâ.

Mirobalanus Emblica. Boa Malacca Nilikai. Rumph. Amb. Auct. c. 2. tab. 1. Nelli-Camarum. Rheed. Malab. part. 1. pag. 69. tab. 38. Mirobalanus in Javâ. Bont. Jav. l. 6. c. 24. fig. pag. 110.

Sp. 2. PHYLLANTUS URINARIA. α Co sua. β Fí yòng tsào.

Differ spec. Phyl. foliis pinnatis, floriferis : floribus sessilibus : caule herbaceo, procumbente. Lin. sp. 3.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 1-pedalis, multiplex, difusus, sub-procumbens, hispidus. *Folia* pinnata, multi-juga : foliolis ovato-lanceolatis, pilosis, fusco-viridibus, oppositis. *Flos* congestus, axillaris, multus, subfessilis, Masculus Fœmineis mixtus. *Stamina* 3. *Styli* 3, bifidi. *Capsula* trigona, trivalvis, tricocca. Tota herba lactifera : caule, foliis, & calyce rubescensibus.

Habitat, & a me observata in Cochinchinâ, Cantone Sinarum, & in Africâ Orientali.

Burm. Ind. pag. 196. Urinaria Indica supina, cauliculis rubentibus.

Burm. Zeyl. pag. 231. Herba mœroris rubra (Rumph. Amb. l. 10. cap. 30 tab. 17. fig. 2.) non satis convenit.

Virtus: totius herbæ. Emmenagoga, Diuretica.

TETRANDRIA.

GENUS XIII. BUXUS.

Char. Gen. Masc. *Cal.* 3-phillus. *Petala* 2. *Germiūis* rudimentum.

Fœm. *Cal.* 4-phillus. *Petala* 3. *Styli* 3. *Caps.* 3-rostris, 3-locularis. *Sem.* 2. Lin. sy. pl. G. 1148.

Sp. 1. BUXUS SEMPERVIRENS. α Huynh duong. β Hoâm tuōn.

Differ. spec. Bux. foliis ovatis alternis : floribus axillaribus. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. *Arbuscula* 3-pedalis ; *ramis* ascendentibus. *Folia* ova-lia, obtusa, integerrima, glabra, plana, nitida, parva, sparsa, sub-petiolata. *Flos* albus, lateralis, sparsus. Masculi *Calyx* 3-phillus, *corolla* 2-petala, *stamina* 4. Fœminei *calyx* 4-phillus. *Stigmata* 3. *Caps.* 3-sperma.

Habitat in sylvis planis Cochinchinæ, & Chinæ.

Thunb. Jap. pag. 77.

GENUS XIV. MORUS.

Char. Gener. Masc. *Cal.* 4-partitus. *Cor.* o.

Fem. *Cal.* 4-phylloides. *Cor.* o. *Styli* 2. *Cal.* baccatus.

Sem. i. Lin. sy. pl. G. 1150.

Sp. 1. MÓRUS ALBA. & Xin pě xú. a Deau tau.

Differ. spec. Mor. *foliis* obliquè cordatis, lævibus. Lin. sp. 1.

Hab., & notæ. Arbor mediocris: *cortice* albicante, *cannabino*: *ramis* patentibus. *Folia* lato-lanceolata, obliquè cordata, sub-ferrata, indivisa, lævia, petiolata, sparsa. *Flos* Monoicus. *Bacca* lateralis, succosa, pallida, oblonga, composita bacculis 1-spermis.

Habitat culta, in cultaque in Chinâ, raro in Cochinchinâ.

Burm. Ind. pag. 198. Thunb. Jap. pag. 71. Morus fructu albo. Bauh.

Pin. pag. 459. n. 2.

Ufus: foliorum ad nutriendos bombyces.

Virtus: *corticis radicis*. Aperiens, Mundificans, Diuretica, Anthelminthica. Prodest in Hydrope, Tussi, Oris ulceribus, morsu serpentum, vermis, & tæniâ. Foliorum succus juvat contra febres tertianas, & quartanas.

Sp. 2. MÓRUS RUBRA. a Deau Moi.

Differ. spec. Mor. *foliis* cordatis, subtilis villoso: *amentis* cylindricis.

Lin. sp. 4.

Hab., & notæ. Arbor mediocris: *cortice* cinereo, lævi: *ramis* longis, debilibus, patentibus. *Folia* cordata, acuta, fertata, magna, pallida, subtilis villosa, mollia, petiolata, alterna. *Bacca* cylindracea, pollicem longa, axillaris, 1-2-nata, pedunculata, rubra acridulcis, edulis.

Habitat agrestis apud Molos populos, Cochinchinæ tributarios, ad occasum sitos: colitur etiam ad nutriendos bombyces, minus frequenter.

Miller. Diction. n. 4. Morus Virginiensis arbor, loti arboris instar ramosa, foliis amplissimis. Flukens. Alin. 253. tab. 246. fig. 4.

Sp. 3. MÓRUS INDICA. a Deau se de tam.

Differ. spec. Mor. *foliis* ovato-oblongis, utrinque æqualibus: inæquater ferratis. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. Frutex 6-pedalis, sub-erectus, tenuis: *cortice* fuscō, cannabino, *ramis* paucis, longis, debilibus. *Folia* ovato-oblonga, acuta, inæqualiter ferrata, pleraque indivisa, aliqua lobata, glabra, petiolata, alterna. *Baccae* compositæ, sub-rotundæ, fusco-rubræ, his-

pi-

pidæ, parvæ, dulces, edules, axillares, solitariæ. Bacculæ 1-spermæ.

Habitat latissimè culta in Cochinchinæ agris, præcipuè ad ripas fluminum.

Burm. Ind. pag. 198. Thunb. Jap. pag. 76. Rumph. Amb. Auct. cap. 13. tab. 5.

Usus. Foliis hujus Mori præ aliis nutriunt Cochinchinenses bombyces, e quibus extrahunt quotannis immensam serici quantitatem. Quolibet triennio has plantas eradicant, sectaque virgulta iterum plantant, ut novi frutices delicatiorem escam præbeant bombycibus, & tenuiora fila producantur.

GENUS XV. CICCA.

Char. Gen. Masc. *Cal.* 4-phyllo. *Cor.* o.

Fœm. *Cal.* 4-phyllo. *Cor.* o. *Styli* 4. *Caps.* 4-cocca.

Lin. sy. pl. G. 1146.

† Sp. 1. CICCA RACEMOSA. & Cay Tam buot.

Differ. spec. Cic. *Caule arboreo : floribus racemosis : corollis 4-partitis.*

Hab., & notæ. *Arbor* mediocris : *ramis* ascendentibus. *Folia* ovata, sub-acuminata, integerrima, glabra, alterna, petiolata, disticha. *Flos* racemis compositis, brevibus, sub-terminalibus : *Masculus*, & *Fœmininus* in distinctis ramis. *Calyx* utriusque nullus. *Corolla* campanulata, 4-partita, laciñis ovatis, patentibus, colore rubra, albo punctata. *Filamenta* 4, corollâ breviora : *antheris* 2-locularibus, stantibus. *Styli* 4, *stigmatibus* simplicibus. *Bacca* sub-rotunda, semipollicaris, pallida, glabra, acida, edulis, 4-sperma : *seminibus* ovatis.

Habitat frequens in regno Champávâ : colitur raro in metropoli Cochinchinæ.

Observ. Linnæus de Ciccâ agit sy. pl. 4. pag. 125. & Mant. pag. 124. Item Lin. Jun. Suppl. pl. pag. 416. Apud utrumque Ciccæ calyx est 4-phyllo, corolla nulla. Quam nos diximus corollam, nullatenus posset calyx dici, quia tam color, quam tenuitas membranacea, quam observavimus, calycis propria non sunt.

† GENUS XVI. TRICARIUM.

Descriptio Naturalis.

* *Masculi flores.*

Cal. Perianthium 4-phylum : foliolis ovatis, sub-patentibus, coloratis ; apice conniventibus.

Cor. nulla. Nectarium glandulis 4, ovatis, procumbentibus.

Stam. Filamenta 4, calyce breviora. Antheræ sub-rotundæ.

* *Faminei flores* Masculis permixti in eadem plantâ.

Cal. Perianthium 4-partitum, inferum : laciniis ovatis, minimis.

Cor. nulla.

Pist. Germen sub-rotundum. Stylus nullus. Stigma laciniatum.

Peric. Drupa sub-rotunda, carnosa, 3-locularis, 1-sperma.

Sem. Nuces 3, sub-rotundæ, 3-fulcatæ.

Nom. (*Kαρπον* nux) a triplici nuce pericarpii.

Char. Gen. Masc. Cal. 4-phyllo. Cor. o. Nectar. glandulis 4.

Fœm. Cal. 4-partitus. Cor. o. Stigma. laciniatum. Drupa 3-cocca.

+ Sp. 1. TRICARIUM COCHINCHINENSE. a Cay Trâm ung.

Differ. Spec. Tric. foliis ovatis; spicis congestis, sub-terminalibus.

Hab. Arbor mediocris, rāmis ascendentibus. Folia ovata, integerrima, glabra, alterna, parva. Flos ruber, sub-terminalis, racemis simpli-cibus, longis, tenuibus, congestis. Drupa mediocris, lutea, glabra, esculenta.

Habitat in sylvis Cochinchinæ.

G E N U S XVII. U R T I C A.

Char. Gen. Masc. Cal. 4-phyllo. Cor. o. Nectar. centrale, cyathiforme.

Fœm. Cal. 2-valvis. Cor. o. Sem. 1. nitidum Lin. sy. pl.

Sp. 1. URTICA INTERRUPTA. a Cay Nanghai. b Tam mā.

Differ. Spec. Urt. foliis alternis, ovato-cordatis, serratis, petiolo sub-brevioribus; spicis solitariis: interruptis. Lin. sp. 17.

Hab., & notæ. Caulis herbaceus, annuus, 2-pedalis, sub-teres, hispidus, ruber, aliquando repens. Folia cordata, ovata, ferrata, utrinque

que hispida, alterna, petiolis longis folio sub-æqualibus. *Flos* rubescens, spicis longis, solitariis, interruptis: *Masculus*, & *Fœmineus* in distinctis spicis. *Calyx* in *Masculis* saepius invenitur 5-phyllo, quam 4-phyllo: *Stamina* quoque saepius numerantur 5. *Cor. o. Semen.* 1.

Habitat agrestis in Cochinchinâ, & Chinâ.

Urtica Pilulifera, foliis maioribus longissimis pediculis. Burm. Zeyl. pag. 231. tab. 110. fig. 1. Batti-Schorigeram. Rheed. Malab. part. I. pag. 75. tab. 40.

† Sp. 2. URTICA GEMINA. α Nang hai tlon la.

Differ. spec. *Urt. foliis alternis, glabris: involucris 2-floris, solitariis.*

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, simplex, teres, striatus, 1-pedalis. *Folia* ovato-lanceolata, crenata, glabra, alterna, petiolata. *Flos* axillaris, geminus, *Masculus*, & *Fœmineus* sub-eodem involucro foliaceo-cordato, solitario. *Masculi perianthium* 4-phylum: *Fœminei* nullum. *Corolla* nulla. *Stamina* 4. *Stigmata* 3, villosa, sessilia. *Capsula* 3-locularis, 1-sperma: *seminibus* oyatis.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

† Sp. 3. URTICA PILOSA. α Nang. hai loung.

Differ. spec. *Urt. foliis alternis, pilosis, lato-lanceolatis: spicis axillaribus.*

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, sesquipedalis, erectus, teres, pilosus. *Folia* lato-lanceolata, ferrata, pilosa, alterna. *Flos* spicis axillaribus simplicibus: *Fœmineus* ad basim, calyce 1-phyllo, turbinato, 12-fido. *Stigma* laciniatum. *Capsula* 3-locularis, 1-sperma.

Habitat agrestis in Cochinchinâ.

Observ. Hæc, & præcedens species, cum habeant capsulas 3-loculares, impropiè adscribi Urticis cognosco. Si ad Tragias reducere placeat, non repugnabo, maximè, quia de numero Staminum ultimæ speciei dubius maneo.

Sp. 4. URTICA NIVEA. α Cay gai. β ma.

Differ. spec. *Urt. foliis alternis, sub-orbiculatis, utrinque acutis, sub-tus tomentosis.* Lin. sp. 18.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, biennis, erectus, teres, 5-pedalis. *Folia* sub-orbiculata, apice (non basi) attenuata, acumine tenui, longo, crenata, superius obscuro-viridia, hispida, subtus tomentosa, albicantha, alterna, petiolis longis. *Flos* racemis parvis, multis, lateralibus: uterque in eodem racemo, *Fœmineus* ad apicem.

cem. Masculi *Calyx* 4-phyllos. *Cor.* nulla. *Filamenta* 4, subulata, flexuosa, calyce triplo longiora. Fœminei *calyx*, & *corolla* nulli. *Germen* sub-rotundum, filamentis multis sterilibus circumdate. *Stylus* nullus. *Stigmata* 2, oblonga, villosa. *Semen*, aut pericarpium maturum non vidi.
Habitat, & abundanter Colitur in Cochinchinâ, & Chinâ.
Burn. Ind. pag. 197. *Thunb. Jap.* pag. 71. *Urtica Racemifera maxima Sinarum*, foliis subtus argenteâ lanugine villosis. *Pluk. Amalt.* pag. 212.
Usus. Herba ista dat optima fila cannabina, ex quibus torquentur funes omnis generis, retiaque longo tempore duratura.

PENTANDRIA.

† GENUS XVIII. POLYCHROA.

Descriptio Naturalis.

* *Masculi flores*, inferiores, pedunculo communi longo.

Cal. Perianthium campanulatum, 5-fidum: laciniis sub-ovatis, incurvis, carinatis, coloratis.

Cor. nulla.

Stam. Filamenta 5, ventricosa, diaphana, divergentia, calyce longiora. Antheræ totidem, sub-sagittatae, rubescentes.

* *Fœminei flores* superiores, sub-fsessiles in eâdem plantâ.

Cal. Perianthium 5-partitum, inferum, erectum, persistens: laciniis subulatis.

Cor. nulla.

Pist. *Germen* longiusculum. *Stylus* nullus, stigma obtusum.

Peric. Capsula ovata, 1-sperma.

Sem. Ovatum, glabrum.

Nom. (Πλάντα multum: Χρώμα color) ex multiplici foliorum colore.

Char. Gen. *Masc.* *Cal.* 5-fidus. *Cor.* o.

Fœm. *Cal.* 5-partitus. *Cor.* o. *Stigma* 1, sessile. *Caps.* 1-sperma.

† Sp. 1. POLYCHROA REPENS. a Bedr. A.
Differ. spec. Pol. *caule* repente; *foliis* cordatis, crenatis: *floribns* axillaribus.

Hab. *Herba* perennis: *caule* repente, tereti, rubro, succoso, ramoso, radiculis brevibus lateralibus. *Folia* cordata, oblonga, sub-crenata,

nata, alterna, versicolora, albo, rubro, & viridi discreta, apice obtuso, basi inaequali: *stipulis* geminis, acutis. *Flos* albo-ruber, racemis parvis, axillaribus.

Habitat inulta, coliturque ob pulchritudinem, late repens per scopulos fontanos in Chinâ, & Cochinchinâ.

GENUS XIX. AMARANTHUS.

Char. Gen. Masc. *Cal.* 3, sive 5-phyllo. *Cor.* 0. *Stam.* 3, sive 5. Fem. *Cal.* maris. *Cor.* 0. *Styli* 3. *Capit.* 1-locularis, circumfissa. *Som.* 1. Lin. sp. pl. G, 1157.

Sp. 1. AMARANTHUS TRICOLOR. β Hùm hién. α Hoàng hien.

Differ. spec. Amar. *glomerulis* triandris, axillaribus, sub-rotundis, amplexicaulibus: *foliis* lanceolato-ovatis, coloratis. Lin. sp. 4.

Hab., & notæ. *Caulis* herbaceus, annuus, 3-pedalis, erectus, teres, ruber, glaber. *Folia* lanceolato-ovata, integerrima, coccinea: in aliis rubro, pallido, & viridi tricolora: *petiolis* longis, erectis. *Flos* *glomerulis* verticillatis, triandris, coloratis.

Habitat cultus in Chinâ, & Cochinchinâ.

Burm. Ind. pag. 199. Thunb. Jap. 57. Amaranthus folio variegato. Bauh. Pin. pag. 121. n. 5.

Sp. 2. AMARANTHUS POLYGAMUS. α Rau gen tláng. β Pe hién.

Differ. spec. Amar. *glomerulis* diandris, sub-spicatis, ovatis: *floribus* hermaphroditis, foemineisque: *foliis* lanceolatis. Lin. sp. 5.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, 3-pedalis, erectus, albicans, crassus, tener, glaber, striatus, ramosus. *Folia* sub-ovata, utrinque attenuata, sub-rugosa, pallida, petiolata. *Flos* polygamus, diandrus, verticillis axillaribus, & terminalibus in spicas breves interrupte ac crescentibus.

Habitat in Cochinchinâ, & Chinâ tam cultus, quam spontaneus.

Burm. Ind. pag. 199. Blitum Indicum, album. Rumph. Amb. I. 8. c. 42. pag. 231. tab. 82. fig. 1.

Usus. Ex omnibus Amaranthi speciebus, quæ in Indiâ edi solent, hæc est salubrior, & suavior; proindeque præ aliis usitior.

Sp. 3. AMARANTHUS TRISTIS. α Rau gen dat. β . . .

Differ. spec. Amar. *glomerulis* triandris, rotundatis, sub-spicatis: *foliis* ovato-cordatis, emarginatis, petiolo brevioribus. Lin. sp. 8.

Hab., & notæ. *Caulis* annuus, multiplex, ramosus, diffusus, sub-erectus, teres, tenuis, rubescens, sesquipedalis. *Folia*: sub-ovata, sub-acuta, emarginata, tomentosa, parva, alterna, longè petiolata.

Flos