



Inst. Bot. de Coimbra

Sala B

Est. 76

Táb. 4

N.º 15

FLORAE ROMANAЕ  
PRODROMUS  
EXHIBENS  
CENTURIAS XII PLANTARUM  
CIRCA ROMAM  
ET IN CISAPENNINIS PONTIFICIAE DITIONIS PROVINCIIS  
SPONTE NASCENTIUM  
SEXUALI SYSTEMATE DIGESTAS  
AUCTORIBUS  
ANTONIO SEBASTIANI M.D.P.B.P.  
ET  
ERNESTO MAURI.

.... Nullis hominum cogentibus ipsae  
Sponte sua veniunt ....

Virg. Georg. l. 3,



ROMAE MDCCXVIII.

APUD VINC. POGGIOLE R.G.A. TYPOGRAPHUM

*Superiorum permisso.*



PIO SEPTIMO  
PONTIFICI OPTIMO MAXIMO

ANTONIUS SEBASTIANI ET ERNESTUS MAURI



FELICITATEM

Tibi, Beatissime Pater, hanc de re herbaria opellam dicari, tuoque subjici patrocinio mirabitur nemo, nisi qui, quid valeant bonae omnes, licet prophanae vocentur disciplinae, quamque cum sacris illis ac praestantioribus, qua-

rum Tu es Doctor ac Magister habeant cognitionem, quantumque emolumenti adferre possint Religioni, penitus ignoret. Tibi vero, pro ea qua gaudes in omnibus doctrinis sagacitate et usu, notum probe atque perspectum est, Sapientissimum Regum disputasse *de lignis a cedro quae est in Libano usque ad hyssopum quae egreditur de pariete* (qua de causa primus memoratur et optimus Botanicus); complures alios Reges et Principes eximios plantarum cognitione ac cultu mirifice fuisse delectatos. Notum est Tibi, infinitos SS. Scripturarum locos, ut intelligantur, Botanices studium desiderare, quemadmodum interpres sacri passim testantur, ex quibus aliqui justis voluminibus plantas et flores, ad quos in Bibliis adluditur, doctissime prosecuti sunt; quorumque post vindemiam non parva superest adhuc racematio. Quid? quod ad vegetabile regnum contemplandum, ibique virtutem Dei demirandam Scripturae nos provocant? Exempli loco, quam suaviter Reparator noster Christus Jesus oculos animumque jubet intendere in *lilia agri*, ut postquam perspexerimus quam largiter illa ornarit Deus, deducamus quanto majorem curam de nobis Deus gerat, et qua fide ac spē ejus in nos providentiae inniti debeamus! Equeidem sic putamus, sic tenemus, mentem pulcherrimae Naturae spectaculo se oblectantem, decori et honesti purissimas noticias esse imbibituram; hominemque captum botanicis deliciis non posse non fieri religiosiorem, moribusque sanctiorem, utpote qui existentiam Dei, poten-

tiam, bonitatem, providentiam, cæteraque  
attributa in unaquaque plantula ac flosculo  
cernat insculpta, eorumque venerationem  
quolibet intuitu sentiat sibi insinuari; dum  
e contra, cui tales venustates sordent, duris-  
simi est animi atque in Auctorem Naturae in-  
gratissimi, et sibi suisque moribus pessime  
consnit, tot ad Deum cognoscendum aman-  
dumque incitamenta spernens, et poenas a  
Prophetis in eos qui *opera Dei non considerant*  
interminatas accersit. Quae Tu optime sciens,  
Beatissime Pater, cum omnium honorum lau-  
de Theologiae naturali subvenisti, cum Ca-  
thedram in Romano Archigymnasio novam  
constituisti, ubi per botanica et alia Naturae  
miracula invisibilia Dei sempiterna ejus vir-  
tus et Divinitas intelligenda et conspicienda  
sisterentur. Jure ergo meritoque speramus Te  
benignis oculis adspectum, et favore com-  
plexurum hoc opus eo fine susceptum abso-  
lutumque, ut tam frugifera rebusque sacris  
adeo cognata disciplina summo civium bono  
excolatur. Seposita autem praecipua dignitate  
Tua, qua Fidei Morumque Doctor es atque  
Exemplar, munuscum nostrum non despe-  
ctum iri confidimus, eo quod Rex es sub di-  
torum tuorum amantissimus, atque omnium  
quae eorum sanitatem tueri et felicitatem au-  
gere possunt studiosissimus. Porro mirum,  
quantum botanica doctrina Oeconomiae poli-  
ticae utilis sit, dum novas assidue monstrat  
opes, quae a beatissima hac terra sponte sug-  
geruntur; mirum quantum Medicinae, quae  
si vegetabilibus careat remedii, potius quam

vitae, saepe ministra mortis evadet, rapiens homines ante diem et funere mergens acerbo. Accedit in Urbe hac celeberrima, ubi auxiliis praesidiisque Tuis Scientiae florent universae non esse studium et incrementum illius praetermittendum, quae nulli cedit utilitate ac jucunditate, qua se aliae gentes ac finitimi populi jactant, ac sine qua incuriosi vel contemptores divitiarum nostrarum, stupidi bardi ac pene barbari haberemur. Qua de caussa Tu et veterem practicae Botanices Cathedram restituisti, et ampliorem Hortum botanicum dono largitus es, qui jugi ope Tua, et Praesidum curis brevi inter alios qui per Europam celebrantur aliquo nomine censemus. Accipe igitur, Beatissime Pater, hoc exiguum leveque nostrorum laborum specimen, quod si Tibi placuerit, animos viresque sumemus ad majora quae inceptavimus perficienda. Interim, dum Deum O. M. cuius vices in terris geris, ut publicis Ecclesiae et Regni commodis diu Te sospitem servet deprecamur, ac humili me pedes Tuos osculamur, benedictionem Apostolicam coelestium munera fontem amanter impertire.

Romae. Kal. Septembr. Ann. 1818.

## L. B.

**R**udimentum amplioris operis a naturae investigatoribus ardentि animo exoptati , quo plantae enumerentur in Urbis Agro et finitimiis provinciis sponte crescentes Volumine nostro proponitur . Qui hoc tibi , Lector benevole , illius quasi praeludium exhibemus , dum campum ingredimur nihil vel parum admodum exploratum excutumque , regionis nulli celebritate secundae primi dici *Floristae* gloriāmur .

Aeterna Urbs , quae populos universos armis subegit , quaeque tot tantisque calamitatibus superstes orbem pacifico Religionis sceptro dominatur , uti se ostentat refertam opibus omnigenis , quibus eam veteres triumphi artesque decorarunt , ita ubique splendet naturae bonis , sibique gaudet tam liberali manu fuisse locupletatam , ut neque hoc nomine aliae ulli regioni cedere debeat vel invidere . Et revera si intra ejus pomaeria , et in ipso telluris simu rei archeologicae et historicae indagatores , pulchrarumque artium , et literarum , nec non severiorum quoque studiorum cultores unde suam expleant aviditatem abunde inveniunt , nou minus operam naturae investigatoribus larga suppetit copia rerum ad progressum et amplificationem studiorum suorum conducentium ; quin imo ut plurimum novum prelum ipsi naturae muneribus suppeditant , novamque investigandi cupiditatem excitare valent ea loca , et veneranda antiquitatis vestigia , quae nostris mentibus a teneris unguiculis infixa , religione quadam solent nos commovere . Quo fit , ut Philosophus , dum thesaurum stupet huc a se repertum , sibi sentiat renovari notitias veterum temporum et maximorum virorum , qui loca haec ipsa aut extruxerunt , aut ornarunt , aut excoluerunt ; atque ita in altissimas rapitur contemplationes vulgaribus hominibus non concessas , et veluti adsistens illustri illi aero , ejusque particeps gloriae mira voluptate perfunditur .

Eadem ratione dum colles Urbis, planitiem, et montes qui circum stant visitat Geologus, aciem meditationum ultra historiae fines producens, vicissitudinum theatrum hocce gaudet salutare, ubi monumenta et ruinas romani imperii antiquioribus et solemnioribus superimpositas adspicit, quae remotissimis Ignis et Aquae debentur imperiis. Pariter dum vias Romae et antiqua ruderata explorat Botanophilus, aut ab oris mediterranei maris apennini dorsum concedit agros percurrentes, in quibus canones agrestium rerum immortales artis georgicae magistri didicerunt Cato, Varro, Virgilius, Columella, plurimi facere assuescit humilem muscum et squallidum lichen parietibus cretum, quae forte auro et gemmis Augustorum micabant, et sylvestrium flororum segementem ibi luxuriantem, ubi consulares manus rastra et aratra versabant, et patricius sanguis, et doctissimus quisque Romanorum secessum et otia quaerebant; ac dum refert domum manipulos gaudet ac deliciatur ipsas recognoscens herbas, quae Virgilii, Horatii, aliorumque primae notae poetarum carminibus sunt celebratae.

In solo et veteris gloriae titulis insigni et ubertate propria laetissimo uterque nostrum exercitati sumus superioribus annis, et degustavimus illecebras et delicias amabilis scientiae, quae vegetabilium historiam persequitur. Horum autem studiorum specimen aliquod benigne ab eruditis exceptum praebuit jam alter nostrum, binos evulgans *Romanarum Plantarum Fasciculos*. Sed dum copiam rerum expendebamus, quas patria tellus sponte largiebatur, passim animadvertisimus plurimum officere studiis nostris, quod deesset Catalogus philosophice digestus, enumerans divitias gazophilacii per quod incerti vagabunur. Cujus enim utilitatis esse poterat sive *Synopsis Liberati Sabbati*, sive *Catalogus plantarum Agri Romani* a Roggerio digestus et adnexus Dictionario pharmaceutico Donzellii? nec aliud hujusmodi opus extare scimus, si laboriosum illud excipias, quod a R.P. Maratta Academiae Romanae professore, aliis operibus in re botanica satis noto, quinquaginta circiter abhinc annis *Romanae Flora* titulo compositam fuisse compemus; quod tamen, cum ab auctore vivente in lu-

cem editum non fuerit, hactenus in tenebris delitescit. Ergo illico ipsi flagravimus desiderio tale opus completo junctis viribus, tum ut eorum commoditati consuleretur, qui Romae studio huic nostro in posterum operam dabunt, tum ut curiositati satisfactum fuerit exterorum, qui ex iis quae sparsim in Fabio Columna, Barrelio, Bocconio, Scheuchzerio, Michelio, Triumfetto, aliisque antiquis auctoribus inveniunt, nec non ex sententia a Linnaeo summo pronunciata magnificam imbiberunt animo opinionem de hujus soli vegetabilibus.

Nec nos latebat quibus obruatur difficultatibus quisquis nondum inchoatam Floram primus aggreditur, quas quidem immensum augebat miseranda qua premebamur librorum inopia, praesertim post Linnaeum evulgatorum, quorum maxima pars nondum in publicis prostat, nec in privatis Urbis Bibliothecis. Quod gravissimum impedimentum, aliaque non pauca nobis nostraeque conditioni propria ac peculiaria, facili quidem negotio suaserunt impossibile penitus fore ut completum opus uno ictu conficeremus; non tamen adeo valuerunt ut nos ab eo suscipiendo, quo meliori fieri posset modo, deterrent.

Qua de re constitutum fuit, ut ex plantis phaenogamis a nobis circa Romam collectis series ad numerum bis centum supra mille seligeretur, eaque opportune disposita Initium quasi Florae Urbis typis mandaretur. Cui Florae concinnandae, quatenus vires nostrae suppetant, separata in posterum edemus *Additamenta*, quae cum species exhibitura sint ad classes et genera hic expensa pertinentes, uniusquisque ad suum in Systemate generali locum ope indicum poterunt amandare. Si Numinis favor eo usque nobis aderit, ut ex sequentibus nostris voluminibus Mantissa prodeat summam romanarum plantarum, cryptogamis nullatenus exceptis, exhaustiens, tunc Index Generalis Mantissam cum Prodromo nectere poterit, et ita conjunctum opus nomen Florae Romanae sibi vindicabit. Quod nisi datum sit, et vota nostra aurae ventique diripient, viam aliquomodo iis stravisce contenti erimus, qui melioribus avibus opus hoc in posterum sint aggressuri.

¶

Floram universae Pontificiae Nationis , immensum opus ! confidere numquam cogitavimus . Provinciae quidem Orientales et quas Adriatica unda alluit , ut poten- nimum dissitae , et a naturali apennini limite sejunctae , merito ab Urbis Flora expungi posse visae sunt : nec tamen nostrum laborem intra fines peculiaris Territori- rii Urbis cohibendum existimavimus , tum quia Romanus Ager montosam regionem uberem plantarum nostratum sedem non attingit , tum ( quod maxime attendendum est ) quia ejus termini admodum irregulares , et ab arbitrio potius quam a natura constituti nec satis definiti viden- tur , nec a quovis facile dignoscuntur . Opportunius ita- que putavimus particulari Urbis Flora eam sociare vi- ciniorum Provinciarum , Latii nempe , Sabinæ , Patri- monii S. Petri , et Umbriae , ita ut nostrarum inquisi- tionum Theatrum magnis et naturalibus lineis circum- scribatur , hinc nempe aquis Tyrrheni maris , illinc fini- bus Neapolitani regni , Picenarum provinciarum , et dia- tionis Etruscae . Et hic quidem Prodromus praeter mul- tas Agri Romani indigenas species , non paucas ex iis praebet , quae extra illum in variis peregrinationibus per contiguas provincias nostris manibus collectae sunt .

Cum in hoc opere conscribendo ante omnia con- sulamus utilitati tyronum scientiae botanicae , quorum studiis in Romana Universitate praeest alter nostrum , hinc classum distributionem illis magis accommodatam seligere totis viribus studuimus ; et hoc nomine Lin- naeanum sistema caeteris anteponendum duximus , a quo tamen recentiorum aliquorum vestigiis inherentes expunimus Classes *Polyadelphiae* , et *Polygamiae* , et Ordinem *Syngenesiae monogamiae* ; eademque de causa in id praecipue incubuimus , ut accuratissimam traderemus expositionem characterum generum et spe- cierum , quatenus saltem ex notionibus quas in libris promere dabatur , et examine inito super plantas vivas , vel in herbariis nostris asservatas id exequi licuit . Ut autem differentiae inter affinia classum genera uno veluti oculorum intuitu patarent , placuit eorum characteres essentiales in totidem series digerere , quas enumerationi specierum singulae Classis in formam *Clavis* praemittimus .

Genera et species a Linnaeo constitutas religiosissime servavimus, quoties ex hac methodo nihil manifeste incongruum videretur oriri, scientiae regeneratori tutissimo tamquam sideri oculos conversos jugiter habentes. Talis enim nostra fuit opinio, nec dissimile plurimum Botanicorum longe praestantioris notae forte est judicium, bonas diagnoses accuratasque descriptiones multo facilius ad stirpium illustrationem conducere, quam irrequietam mutationum rotam, et importunam genera et species dilacerandi libidinem, quibus vexari hodie dolet res herbaria, et quae novas quotidie inventendo appellaciones, potius quam difficultatibus occurrant, eam in pristinum chaos reducere minitantur.

Synonima auctorum, eorumque icones parce opportuit allegare, et ne in aliorum verba jurasse videremur, contenti ut plurimum fuimus illos in medium afferre, quibus familiarius uti datum erat. Consueto asterisci \* signo auctorum nomina notavimus penes quos accuratas specierum descriptiones inveniebamus, ut dubitationibus obversantibus adiri utiliter possint.

Descriptiones nos ipsi fusiores e plantis vivis pro opportunitate confecimus, idque praecipue quoad *Gramineas*, et *Cyperaceas* difficillimas tyronibus familias, nec non quoad *Orchideas*, quarum stirpes indigenae accuratiorem Botanicorum illustrationem hactenus videntur desiderare; nec raro notabilem alienam observationem breviter retulimus, sive nostram, si quid novi invenisse visum fuerit, adjecimus sententiam.

Icones perpaucas ad novas, vel minus notas species illustrandas operi adposuimus, a nimio earum numero carentes, ne liber voluminis mole et pretii magnitudine iis fortasse incommodus evaderet, quorum usui fuerat prae caeteris addictus.

Loca natalia plantarum quas enumeramus sedulo indigitavimus, et praeter generalia adjuncta stationes ipsas, ubi propriis oculis minus vulgatas offendebamus, placuit memorare, quas citationes locorum vulgari idiomate conscribere maluimus, cum raro daretur sufficienti perspicuitate, et proprietate verborum eas latine reddere. Caeterum utinam Romanam Floram florido, ut tantam

pulchritudinem deceret, sermone ornare possemus, et  
hoc ipso lenocinio ad ejus studium animos allicere!

Orationi tandem finem non faciemus, quin publica  
grati animi testimonia iis reddamus scientiae amabilis  
culturibus, qui suis consiliis et ope nos in studiis no-  
stris substinerunt et excitarunt. Horum in numero pri-  
mas tenent celeberrimi viri *Bertoloni*, *Balbis*, *Savi*,  
*Targioni*, *Tenore*, *Bivona*, *Persoon* et *Decandolle*,  
quorum sententiam persaepe exquisivimus, quique nota  
eorum humanitate numquam nobis desuerunt. Ques  
illustres scientiae magistros, cum nostrarum rationum  
angustiam plane noscant, pro communis studii amore  
oramur obtestamurque, ne desinant nobis opitulari. Eni-  
xe interim a doctis omnibus Botanices cultoribus expe-  
timus, ut nostrum hocce qualemcumque opus, quod eis  
vehementer commendamus, benigno indulgentique ani-  
me excipient.

---

# NOMINUM CONTRACTORUM

## EXPLICATIO

---

- Ait Kew.* „ Aiton. Hortus Kewensis .  
*All. Ped.* „ Allioni . Flora Pedemontana .  
*Amoen. Acad.* „ Linnaei . Amoenitates Academicae .  
*Barr. ic. vel rar.* „ Barrelieri . Plantae per Galliam , Hispaniam  
 et Italiam observatae .  
*Bauh. H.* „ Johannis Bauhini . Historia plantarum universalis .  
*Bauh. Pin.* „ Gasparis Bauhini . Pinax Theatri Botanici .  
*Bauh. Prod.* „ Gasparis Bauhini . Prodromus Theatri Botanici .  
*Bert. Pl. Gen.* „ Bertoloni . Plantae Genuenses .  
*Bert. R. It. Pl. Dec.* „ Bertoloni . Rariorum Italiae plantarum  
 Decades .  
*Biv. Sic. Cent.* „ Bivona . Sicularum plantarum Centuriae .  
*Biv. Tolp.* „ Bivona . Delle Tolpidi .  
*Bocc. Mus.* „ Boccone . Museo di piante rare .  
*Bocc. rar. vel Sic.* „ Boccone . Icones et Descriptiones rariorium  
 plantarum Siciliae , Melitae , Galliae et Italiae .  
*Buxb. Cent.* „ Buxbaum . Centuriae quinque rariorium plantarum .  
*Caesalp.* „ Caesalpini . De plantis lib. XVI .  
*Cam. Ep.* „ Camerarii . Epitome de plantis .  
*Cavan. Diss.* „ Cavanilles . Monadelphiae Classis Dissertationes 10 .  
*Cavan. Ic.* „ Cavanilles . Icones et descriptiones plantarum .  
*C. B. P.* „ Gasparis Bauhini . Pinax Theatri Botanici .  
*C. B. Prod.* „ Gasparis Bauhini . Prodromus Theatri Botanici .  
*Clus. H.* „ Clusii . Plantarum Historia .  
*Col. Ecphr.* „ Fabii Columnae . Ecphrasis minus cognitarum  
 stirpium .  
*Col. Phyt.* „ Fabii Columnae Phytobasanos .  
*Crantz Umb.* „ Crantz . Classis umbellatarum emendata .  
*Cup. H. Cath.* „ Cupani . Hortus Catholicus .  
*Curt. Mag.* „ Curtis . Botanical Magazine .  
*Curt. Lond.* „ Curtis . Flora Londinensis .  
*Cyr. Fasc.* „ Cyrilli . Fasciculi plantarum .  
*Dalech. H.* „ Dalechampii . Historia generalis plantarum .  
*DC. Cat. H. Monsp.* „ De Candolle Catalogus Horti Monspe-  
 liensis .  
*DC. vel Decand. Fl. Fr.* „ Lamark et De Candolle . Flore Fran-  
 coise .  
*DC. vel Decand. Syn.* „ De Candolle . Synopsis Flora Gallicae .  
*Desf. Atl.* „ Desfontaines . Flora Atlantica .  
*Dill. Elth.* „ Dillenii . Hortus Elthamensis .

- Dod. Pempt.* „ Dodonaei . Pemptades 6 .  
*Duham. Arb.* „ Duhamel . Arbres et arbustes .  
*Enc.* „ Encyclopedie méthodique : Botanique .  
*Fl. Dan.* „ Flora Danica .  
*Fl. Ticin.* „ Balbis et Nocca . Flora Ticinensis .  
*Fuchs. H.* „ Fuchsii : Historia stirpium .  
*Gaertn.* „ Gaertner . De fructibus et seminibus plantarum .  
*Gaud. Agr.* „ Gaudin . Agrostographia Helvetica .  
*Gmel. S.Veg.* „ Gmelin . Linnaci Systema vegetabilium .  
*Gouan. Monsp.* „ Gouani . Hortus Menspeliensis .  
*Hall. Helv.* „ Haller . Historia stirpium indigenarum Helvetiae .  
*Herm. Par.* „ Hermanni Paradisus Batavus .  
*Hoffm.* „ Hoffman . Deutschlands Flore .  
*Horn. Hafn.* „ Hornemann . Hortus Hafnensis .  
*Hort. Rom.* „ Hortus Romanus .  
*Host Gr.* „ Host . Gramina Austriaca .  
*Huds. Engl.* „ Hudson . Flora Anglicana .  
*Jacq. Aust.* „ Jacquin . Flora Austriaca .  
*Jacq. rar.* „ Jacquin . Icones plantarum rariorū .  
*J. B. H.* „ Johannis Bauhini . Historia plantarum universalis .  
*L.* „ Linnaei Opera .  
*L'herit.* „ L'heritier . Stirpes novae .  
*Linn. Sp.* „ Linnaei . Species plantarum .  
*L. Mant.* „ Linnaei . Mantissa .  
*Lob. adv.* „ Lobelii . Stirpium adversaria nova .  
*Lob. ic.* „ Lobelii . Icones stirpium .  
*Lois. G. vel Loisel. Gall.* „ Loiseleur Deslongchamps . Flora Gallica .  
*Lois. Notic.* „ Loiseleur Deslongchamps . Notice sur les plantes à ajouter à la Flore de France .  
*L. Suppl.* „ Linnaei filii . Supplementum .  
*Matth. Valgr.* „ Mattioli in Dioscoride edizione del Valgrisi .  
*Mich. Cat. H. Fl.* „ Michelii . Catalogus Horti Florentini .  
*Mich. N. Pl. G.* „ Michelii . Nova plantarum genera .  
*Monti in Zann.* „ Monti in Zannoni . Historia Botanica .  
*Moris H.* „ Morison . Historia plantarum .  
*Murr. S.Veg.* „ Murray . Linnaei Systema Vegetabilium: editio 14 .  
*Nob.* „ Nobis .  
*Opusc. Scient. Bol.* „ Opuscoli scientifici di Bologna .  
*Pal. d. Beauv.* „ Palisot de Beauvois . Agrostographia nova .  
*Pers. E.* „ Persoon . Synopsis plantarum , seu Enchiridion botanicum .  
*Raii. H.* „ Raii . Historia plantarum .  
*Raii Syn.* „ Raii . Synopsis methodica stirpium britannicarum .  
*Redout. lil.* „ Redouté . Les liliacées .  
*Retz Obs.* „ Retz . Observationes botanicae .  
*Riv. mon.* „ Rivini . De plantis flore monopetalo irregulari .  
*Riv. tetr.* „ Rivini . De plantis flore tetrapetalo irregulari .

- Roem. S. Veg. „ Roemer et Schulthes . Linnaei Systema vegetabilium . Vol. 1,2.  
 Roth Cat. Bot. „ Roth. Catalecta botanica .  
 Roth Germ. „ Roth. Tentamen Florae Germanicae .  
 Savi B.E. „ Savi . Botanicon Etruscum .  
 Savi due Cent. „ Savi . Due Centurie di piante .  
 Savi Obs. in trif. „ Savi . Observationes in varias trifoliorum species .  
 Savi Pis. „ Savi . Flora Pisana .  
 Savi Tr. d. Alb. „ Savi . Trattato degli alberi della Toscana .  
 Scheuchz. Agr. „ Scheuchzeri . Agrostographia .  
 Schreb. gram. „ Schreber . Gramina .  
 Schreb. unil. „ Schreber . Plantarum unilabiatarum genera et species .  
 Scop. Carn. „ Scopoli . Flora Carniolica .  
 Seb. R. Pl. Fasc. „ Sebastiani . Romanarum plantarum Faseiculi .  
 Segu. Ver. „ Segueri . Plantae Veronenses .  
 Sibth. Graec. „ Sibthorp . Flora Graeca .  
 Smith Br. „ Smith . Flora Britannica .  
 Syst. Veg. ed. 14. „ Linnaei Systema Vegetabilium ( curante Murray ) editio 14.  
 Tabern. ic. „ Tabernemontani . Icones plantarum .  
 Targ. Ist. „ Targioni-Tozzetti . Istituzioni botaniche .  
 Ten. Fl. Nap. „ Tenore . Flora Napolitana .  
 Ten. Fl. Neap. Pr. „ Tenore . Florae Neapolitanae Prodromus .  
 Ten. Syn. Nov. Pl. „ Tenore . Synopsis novarum plantarum etc .  
 Thuil. Par. „ Thuillier . Flora Parisiensis .  
 Till. Pis. „ Tilli . Catalogus plantarum horti Pisani .  
 Tourn. Cor. „ Tournefortii . Corollarium .  
 Tourn. Inst. „ Tournefortii . Institutiones Rei herbariae .  
 Triumf. Obs. „ Triumfetti . Observationes .  
 Vahl En. „ Vahl . Enumeratio plantarum .  
 Vahl Symb. „ Vahl . Symbolae botanicae .  
 Vaill. Par. „ Vaillant . Botanicon Parisiense .  
 Vill. Dauph. vel Delph. „ Villars . Flore du Dauphiné .  
 Vitm. Sum. Pl. „ Vitman . Summa plantarum .  
 Viv. Ann. Bot. „ Viviani . Annales botanici .  
 Viv. Fl. It. Fr. „ Viviani . Florae Italicae Fragmenta .  
 W. En. H. B. „ Willdenowii . Enumeratio Horti Berolinensis .  
 W. Sp. „ Willdenow . Linnaei species plantarum .  
 Zannon. H. „ Zannoni . Historia botanica .
- 





# FLORAE ROMANAЕ PRODROMUS

---

## C L A S S I S I.

### MONANDRIA.

---

#### ORD. MONOGYNIA.

- (1) **SALICORNIA.** *Calix ventricosus, integer, 4-gonus. Petala nulla. Antherae 1-2. Stigmata 2. Semen 1, calyce inflato tectum.*

#### ORD. DIGYNIA.

- (2) **CALLITRICHЕ.** *Calix inferus, diphyllus. Capsula 2-locularis, 4-sperma, marginata. - Flores saepe monoici.*
- 

### MONANDRIA MONOGYNIA.

(1) **SALICORNIA.**

1. **HERBACEA.** *L. Herbacea, patula : articulis apice compressis, emarginato-bifidis ; spicis axillaribus oppositis, pendunculatis ; squamis obtusis. W. Sp. - Pers. Ench. - Roem. Syst. Veg. 1.*

*S. herbacea. All. Ped. - Smith Brit.-Loisel. Gall. - DC. Syn. Kali geniculatum sive salicornia. Jo. Buuh. II. 3. p. 705. n. 1, 2, 3. - Dod. Pempt. 82. S. geniculata annua. Hort. Rom. 8.t. 85.*

*In litore marino communis. Ann. Floret Julio, Augusto. Fl. virides ut planta.*

2. **FRUTICOSA.** *L. Caule erecto, fruticoso ; articulis ramulorum ancipitibus : squamis floralibus truncatis, membranaceis. W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn.-Roem. S. Veg. 1.*

*S. fruticosa. Smith Brit. - Lois. Gall. Kali. Camer. Epit. 246, S. geniculata. Hort. Rom. 8.t. 84.*

*In maritimis frequens. Perenn. Floret Julio, Augusto. Fl. colore plantae.*

A



## MONANDRIA DIGYNIA.

## (2) CALLITRICHÆ.

3. VERNÆ. *L.* Foliis trinerviis ; superne aggregatis , majoribus : seminum margine obtusiusculo . *Walemb. Fl. Carp. 2.*  
*Roem. S. Veg. 1.*  
*C. sessilis. DC. Fl. Fr.*  
*o. Foliis omnibus elongato-ovovatis. Roem. l. c.*  
*G. verna. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G.*  
*β. Foliis inferioribus linearibus , emarginatis , superioribus ovalibus . Roem. l. c.*  
*C. intermedia . W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. C. dubia . Roth.*  
*Germ.-Thuil. Par.*  
In fossis aquosis varietates ambo copiose . Ann. Floret vere ad aestatem . Fl. dilute flavi , monoici .
4. AUTUMNALIS . *L.* Foliis omnibus per caulem sparsis æquilibus , uninerviis , truncatis : seminum marginibus membranaceis . *Walemb. Fl. Carp. - Roem. S. Veg. 1.*  
*G. autumnalis. All. Ped.-W. Sp.-Pers.E-Lois. G. C. aquatica γ autumnalis . Smith. Br. Alsine aquatica minor s. fluitans . C. B. P. 257.*  
In aquis quietis . Alle paludi pontine ... Ann. Floret autumno . Fl. spurco-albi , monoici .
-

## DIANDRIA.

## ORD. MONOGYNIA.

- (3) *JASMINUM*. *Calix* 5-fidus. *Corolla* hypocrateriformis, 5-8-fida. *Bacca* dicocca. *Semina* solitaria, arillata.
- (4) *LIGUSTRUM*. *Calix* minimus 4-dentatus. *Corolla* 4-fida. *Bacca* supera unilocularis, 2-4-sperma.
- (5) *PHILLYREA*. *Calix* minimus 4-dentatus. *Corolla* brevis, 4-fida. *Bacca* unilocularis, monosperma.
- (6) *OLEA*. *Calix* 4-dentatus. *Corolla* 4-fida, lacinias sub-ovatis. *Drupa* monosperma.
- (7) *ORNUS*. *Calix* 4-partitus. *Corolla* 4-partita, segmentis longis ligulatis. *Filamenta* longa. *Capsula* plana linguiformis monosperma.
- (8) *CIRCAEA*. *Calix* diphyllus superus. *Corolla* dipetala. *Capsula* hispida bilocularis, basi dehiscens, loculis monospermis. *Stamina* exerta.
- (9) *VERONICA*. *Corolla* rotata limbo 4-partito, lacinia infima angustiore. *Capsula* supera, bilocularis.
- (10) *GRATIOLE*. *Calix* 5-fidus, basi 2-bracteatus. *Corolla* tubulosa, limbo ringens, resupinata. *Filamenta* 4 (duo saepius sterilia). *Capsula* 2-locularis polysperma.
- (11) *LYCOPUS*. *Calix* tubulosus 5-fidus. *Corolla* tubulosa, sub-aequalis, 4-fida; lacinia superiore latiore, emarginata. *Stamina* distantia. *Semina* 4, retusa.
- (12) *ROSMARINUS*. *Calix* 2-labiatus. *Corolla* ringens, labio superiore bipartito. *Filamenta* longa, curva, simplicia cum dente.
- (13) *SALVIA*. *Calix* 2-labiatus. *Corolla* ringens. *Filamenta* transverse pedicello affixa.

## ORD. DIGYNIA.

- (14) *ANTHOXANTHUM*. *Calix* bivalvis, uniflorus. *Corolla* 2-valvis, acuminata, aristata. *Glumae* duae accessoriae liberae hinc inde a corolla.

## DIANDRIA MONOGYNIA.

- (3) *JASMINUM*.

5. *OFFICINALE*. *L.* Foliis oppositis, pinnatis; foliolis acuminatis: gemmulis erectiusculis. *Ait.* Ke w. 10-W. Sp.-Pers. E.-D.C. Syn. - *Sayi Alb. d. Tosc.* 2. p. 9.

ago 1871

## DIANDRIA MONOGYNIA.

- J. officinale. All. Ped.-Lois. G. - Roem. S. Veg. 1. - Blackw. t. 13. Gelseminum, vulgatus jasminum. Lob. ic. 2. p. 105. In sepiibus passim sponte: indica planta. Vulg. gelsomino. Frutex. Floret aestate. Fl. albi.*
- (4) LIGUSTRUM.  
*6. VULGARE. L. Foliis elliptico-lanceolatis, glabris, oppositis; racemis compositis coarctatis. Vahl. - Savi Bot. E. 2. p. 1. L. vulgare. All. Ped.-Smith. Br.-W. Sp.-Pers. E.-Lois. G.-DC. Syn.-Roem. S. Veg. 1. L. Lob. ic. 2. p. 151. - Dodon. Pempt. 775. Ad sepes vulgaris. Ital. Ligastro. Frut. Floret Majo, Junio. Fl. albi.*
- (5) PHILLYREA.  
*7. MEDIA. L. Foliis oblongo-lanceolatis, integris serratis-que. Ait. Kew. 77.-W. Sp.-Pers. E.-Savi. Alb. d. Tosc. 1. p. 149. Ph. media. All. Ped.-Lois. G.-Roem. S. Veg. 1. Ph. tertia. Clus. H. 52. Ph. Matthiol. 189. - Duham. 2. t. 25. In sylvaticis circa urbem, et ad sepes. Frut. Floret Martio, Aprili. Fl. albidi.*
8. ANGSTIFOLIA. L. Foliis linear-lanceolatis, integerrimis. L.-All. Ped.-W. Sp.-Pers. E.-Lois. G.-Savi Alb. d. Tosc. 1. p. 149. - DC. Syn.-Roem. S. Veg. 1. Ph: angustifolia. Lob. ic. 2. p. 152. Ph. quarta et quinta. Pluk. H. 52. Cum praecedenti, cui nimum affinis. Frut. Floret Martio, Aprili. Fl. albidi.
- (6) OLEA.  
*9. EUROPEA. L. Foliis lanceolatis integerrimis: racemis axillaribus coarctatis. Ait. Kew.-W. Sp.-Pers. E.-Savi Alb. d. Tosc. 2. p. 128. O. europaea. DC. Syn. a. Sylvestris. L.-W. Sp.-β. Lois. G. O. oleaster. Hoffmannsegg. Foliis oblongis mucronatis, integerrimis; junioribus subtus sub-incanis: ramis spinescentibus. Fl. portug. 1. p. 287. - Roem. S. Veg. 1. Oleae sylvestris ramulus. Dod. Pempt. 821. In collibus, rupibus, muris. Vulg: ulivo salvatico. Arb. Floret Majo. Fl. albidi. A sativa Olea specie distinguendus non est Oleaster, figura licet non nihil distet, qui ex illius seminibus certe enascitur. Plantas domesticas sibi relictas ita degenerare quotidie observatur.*
- (7) ORNUS.  
*10. EUROPEA. Pers. E. Foliolis lanceolatis attenuatis, petiolatis, serratis. Savi Alb. d. Tosc. 1. p. 144. Fraxinus ornus. L.-All. Ped.-W. Sp.-Lois. G.-Roem. S. Veg. 1.*

## DIANDRIA MONOGYNIA.

5

Fr. florifera . Scop. Carn.-DC. Syn. Fr. Michel. N. Pl. G. 225.  
t. 107.

In nemorosis circa urbem , et in montibus. Tivoli , la Tolfa  
in gran copia , Villa Madama . . . Arb. Floret Aprili . Fl.  
albidi.

## (8) CIRGAEA.

11. LUTETIANA . L. Caule erecto : foliis ovatis , denticulatis ,  
opacis , pubescentibus . Smith. Br.-Savi B. Etr. 2. p. 4.

C. luteiana . W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Roem.  
S. Veg. 1. - Gaertn. t. 24. f. 1. - Lob. ic. 266. Solanifolia  
Circaea dicta major. Moris. H. 2. s. 5. t. 34. f. 1.

In nemorosis , umbrosis circa urbem frequens . A villa Ma-  
dama in copia . . . Perenn. Floret Junio-Julio . Fl. albi  
vel rosei.

## (9) VERONICA.

A. Racemis lateralibus.

12. OFFICINALIS . L. Racemis lateralibus pedunculatis : foliis  
oppositis ovato-subrotundis , dentatis , pilosis : caule pro-  
cumbente , hirta.

V. officinalis . All. Ped.-Smith. Br.-W. Sp.-Pers. E.-Lois. G.-  
DC. Syn.-Savi B. Etr. 1. p. 10.\*-Roem. S. Veg. 1. V. mas su-  
pina et vulgarissima . Camer. Epit. 461. V. mas. Fuchs.  
H. 166.-Matth. Valgr. 730.

In sylvaticis montanis , et prope urbem. Al Pigneto-Sac-  
chetti , sul Monte Mario . . . Perenn. Floret Majo-Junio .  
Fl. pallide coerulei .

13. BECCABUNGA . L. Racemis lateralibus : foliis ellipticis ,  
planis : caule repente . Smith Br.-Savi B. Etr. 1. p. 10.\*

V. beccabunga . All. Ped.-W. Sp.-Pers. E.-Lois. G.-DC. Syn.-  
Roem. S. Veg. 1. Anagallis aquatica . Dod. Pempt. 823.-  
Lob. ic. 466. V. aquatica , etc. Hort. Rom. 2. t. 50.

In aquosis , fossis , ad fontes vulgaris . Perenn. Floret Ju-  
nio . Fl. coerulei .

Caalis inferne repens , dein erectinusculus .

14. ANAGALLIS . L. Racemis lateralibus oppositis : foliis lan-  
ceolatis , serratis : caule erecto . Smith Br.-Savi B. Etr. 1.  
p. 11.\*

V. anagallis . All. Ped.-W. Sp.-Pers. E.-Lois. G.-DC. Syn.-  
Roem. S. Veg. 1. Anagallis aquatica major et minor folio  
oblongo . Moris. H. 2. s. 3. t. 24. f. 25. J. B. H. 3. p. 791.

In aquosis , fossis cum praecedente . Perenn. Floret Majo-  
Junio . Fl. purpureo-coerulei pallidi .

Racemi longiores et acutiores quam in V. beccabunga .

15. MONTANA . L. Racemis lateralibus elongatis , filiformibus ;  
foliis cordato-ovatis petiolatis , grosse serratis : caule de-  
bili petiolisque hirtis .

V. montana . All. Ped.-Smith Br.-W. Sp.-Pers. E.-Lois. G.-  
DC. Syn.-Savi . B. Etr. 1. p. 15.\*-Roem. S. Veg. 1. Alyssum

- Dioscoridis montanum. Col. Ecphr. p. 286. t. 288. V. procumbens biscutata, hederae folio. Moris. H. 2. s. 3. t. 23. f. 15.
- In nemorosis, umbrosis montium. Albano, etc. Perenn. Floret Majo. Fl. pallide coerulei.
16. CHAMÆDRYS. L. Racemis lateralibus caulem superantibus: foliis ovatis, sessilibus, rugosis, dentatis: caule bifarium piloso.
- V. chamædrys. All. Ped.-Smith Br.-W. Sp.-Pers. E.-Lois. G.-DC. Syn.-Savi B. Etr. 1. p. 13.\*-Roem. S. Veg. 1. Teucrium spurium chamædryoides. Lob. ic. 490. V. etc. Hort. Rom. 2. t. 49.
- In umbrosis, ad saepes frequens. Alla Caffarella, ad Albano in copia, etc. Perenn. Floret Majo. Fl. coerulei.
- B. Pedunculis solitariis unifloris.
17. CYMBALARIA. Bertol. Pl. Gen. p. 3. Foliis cordato-rotundatis sub-septemdentatis: calycibus fructus patentibus, laciniis ovatis: capsulis hirsutis. Bertol. l. c. - Savi B. Etr. 1. p. 16.\*-Roem. S. Veg. 1.
- V. cymbalariaefolia. Vivian. Fl. Ital. Fragm. 1. p. 14. t. 16. f. 1.\* V. hederifolia β. L.-W. Sp. V. chia cymbalariaefolia verna, flore albo, umbilico virescente. Tourn. Cor. 7.-Buxb. Cent. 1. p. 25. t. 39. f. 2.
- In viis, muris omnibus. Ann. Floret Februariae-Majo. Fl. albi.
- Folia saepe crassiuscula et subtus purpurascentia ut in An-tirrhino cymbalaria.
18. HEDERÆFOLIA. L. Foliis cordato-rotundatis 3-5-lobris: calycibus fructus clausis, laciniis cordato-acutis: capsulis glabris. Bertol. Pl. Gen. p. 3.-Savi B. Etr. 1. p. 16.\*
- V. hederæfolia. All. Ped.-Smith Br.-W. Sp.-Pers. E.-Lois. G.-Vivian. Fl. It. Frag. 1. p. 15. t. 16. f. 2.-DC. Syn.-Roem. S. Veg. 1. Morsus gallinæ folio hederulæ. Lob. ic. 463.
- Ad sepes, secus vias frequens. Al Colosseo, Villa Medi- ci, Villa Madama, etc. Ann. Floret Februario-Aprili. Fl. pallide coerulei fauce albida.
- Calyces fructus clausi pyramidati, nec compressi.
19. AGRESTIS. L. Foliis petiolatis cordato-ovatis, serratis: laciniis calycinis ovatis: caule procumbente; pedunculis folio vix brevioribus. Roem. S. Veg. 1.\*
- V. agrestis. All. Ped.-Smith Br.-W. Sp.-Pers. E.-Lois. G.-Savi B. Etr. 1. p. 14.\*-DC. Syn. Alsine media. Fuchs. H. 22.
- In herbidis, plateis, viis vulgaris. Ann. Floret Februario-Aprili. Fl. dilute coerulei.
20. ARVENSISS. L. Foliis ovato-obtusis sub-cordatis, obtuse serratis: inferioribus oppositis petiolatis; floralibus lan- ceolatis, sessilibus, pedunculo longioribus: calycis la- ciniis inæqualibus corolla majoribus.

13.  
Maggio 1801.

Floref. d.  
Cavat.

- V. arvensis. *All. Ped.-Smith Br.-W. Sp.-Pers. E.-Lois. G.-Savi B. Etr. 1. p. 17.-DC. Syn.-Roem. S. Veg. 1.* Alyssum.  
*Col. Phytob. t. 8.*  
In agris, viis etiam urbis vulgaris. Ann. Floret Aprili. Fl. pallide cœrulei.
21. ACINIFOLIA. *L.* Sub-pilosa : floribus solitariis pedunculatis : foliis inferioribus petiolatis, ovatis, crenatis ; floribus sessilibus pedunculum sub-æquantibus : capsula obcordata compressa : caule erectiusculo sub-simplici.
- V. acinifolia. *W. Sp.-Pers. E.-Lois G. (sub a). - Saci B. Etr. 1. p. 17.\*-Roem. S. Veg. 1.\** (excl. forsan synon. Barrel.). V. minima clinopodii minoris folio, glabra, romana. *Bocc. Mus. p. 19. t. 102.* V. minima annua, clinopodii minoris folio. *Vaill. Par. t. 33. f. 3.*
- In sterilissimis, muris non rara. *Sull' Amfiteatro Flavio, intorno al Circo della Villa Borghese ... Ann. Floret Aprili.* Fl. dilute cœrulei laeinia minore albida.
- Bocconii icon rem exacte refert ; Allionii vero ab auctoribus hoc relata imperfecte saltem. In hac adnotamus folia magis attenuata et profundius crenata, pedunculos breviores, calycina foliola nimis acuta capsulam superantia.
- C. Racemis terminalibus.
22. SERPILLIFOLIA. *L.* Racemo terminali subspicato : foliis ovatis, glabris, crenatis. *Bertol. R. Ital. Pl. Dec. 3. p. 1.\**
- V. serpillifolia. *All. Ped.-W. Sp.-Smith. Br.-Lois. G.-DC. Syn.-Savi B. Etr. 2. p. 2.-Roem. S. Veg. 1.* V. pratensis. *Dod. Pempt. 1.* V. pratensis serpillifolia. *Moris. H. 2. s. 3.t. 22.f. 8.*
- In pascaulis, viis, ad sepes communis. Perenn. Floret Aprili-Majo. Fl. albidi lineis cœruleis partim notati.
- (10) GRATIOLA.
23. OFFICINALIS. *L.* Foliis lanceolatis serratis, subtrinerviis : floribus pedunculatis. *Vahl En.-Roem. S. Veg. 1.\*-DC. Syn.*
- G. officinalis. *All. Ped.-W. Sp.-Pers. E.-Lois G.-Savi B. Etr. 1. p. 18. G. Dod. Pempt. 362. G. sive gratia Dei. Lob. ic. 455.*
- In pratis depressis. *Ad Ostia in copia ....* Perenn. Floret æstate. Fl. albi, vel albo-luteoli.
- (11) LYCOPUS.
24. EUROPEUS. *L.* Foliis sinuato-serratis. *L.-W. Sp.-Lois. G.-L. europaeus. Smith. Br.-Pers. E.-DC. Syn.-Roem. S. Veg. 1.\** Marrubium palustre glabrum et hirsutum. *Bauh. Pin. 230.-Rivin. t. 21.* Marrubium aquatile. *Dod. Pempt. 595.*
- Ad fossas, in depressis communis. Perenn. Floret Julio-Augusto. Fl. albi.

25. EXALTATUS. *L.* Foliis basi pinnatifido-serratis. *L.-W.*  
*Sp.-Pers. E.-Lois. G.*

*L.* exaltatus. *DC. Syn.* - *Roem.* *S. Veg.* 1. *L.* foliis in profundas lacinias incisis. *Tourn. Inst.* 191. - *Hort. Rom.* 3. t. 55. (*bona*). *Marrubium palustre* hirsutum tenuius laciniatum. *Plukn.* t. 45. f. 1. (*mala*).

In depressis, ad fossas cum præcedente, sed minus frequens. *Alla Caffarella* .... Perenn. Floret Julio-Augusto. Fl. albi.

Inviti a priore separamus cum auctoribus. Characteres quidem foliorum, et totius plantæ magis explicatæ et magis hirsutæ variationibus obnoxii visi sunt. Spontanea reapse prodierunt specimina statura et forma intermedia ita ut ad utram referenda essent specierum determinare hand facile fuerit. Hinc potius unica binis varietatibus sistenda esset species. Neq; quod *L. exaltatus* in hortis cultura perstet sat validum forsitan objectionis argumentum præbet, cum de robustiore stirpis lusu agatur.

(12) ROSMARINUS.

26. OFFICINALIS. *L.* Foliis sessilibus. *L.-All. Ped.-W. Sp.-Pers. E.-Lois. G.-DC. Syn.-Savi B. Etr.* 1. p. 20. - *Roem.* *S. Veg.* 1. *R. Riv.* t. 39. - *Hort. Rom.* 3. t. 67.

In maritimis nostris communis. Frutex sempervirens et ferre semper florens. Fl. cœrulei vel albi.

(13) SALVIA.

27. VISCOSA. *Jacq. ic. rar.* t. 5. *Villoso-viscosa*: foliis cordato-oblongis, rugosis, acutiusculis, crenulatis; bracteis cordato- subrotundis acuminatis. *Vahl En.* - *Roem.* *S. Veg.* 1.\*

*S. viscosa*. *W. Sp.-Pers. E.*

In montosis calcareis. *A Santo Polo, Monte Gennaro...*  
Perenn. Floret Junio-Julio. Fl. purpurascentes.

28. HÆMATHODES. *L.* Foliis rugosis, crenatis supra nudiusculis; inferioribus cordato-ovatis petiolatis; caulinis sessilibus, dentatis bracteisque cordatis acuminatis: caule calicibusque piloso-glandulosis: verticillis sexfloris.

α. Foliis maculis eruentis adspersis.

*S. hæmathodes*. *Scop. Carn.-W. Sp.-Pers. E.-Ettl. Salv.* 34. - *Roem.* *S. Veg.* 1. *Horminum sanguineum asphodeli radice*. *Triumph. Obs.* 69. t. 68. *H. sylvestre majus hæmathodes*, etc. *Barr. ic.* 254. t. 185. *H. sylvestre maculatum tuberosum*. *Moris. H.* 3. p. 394. s. 11. t. 14. f. 15. *Sclarea italicica maxima*, etc. *Hort. Rom.* 3. t. 20. (*male*).

β. Foliis immaculatis. *Triumph. l. c.* - *Moris. l. c.*

*S. virgata*. *Savi Bot. Etr.* 2. p. 4.\* *S. virgata*. (?) *Ait. - Jacq. Vind.* 1. p. 14. t. 37. - *Ettl. Salv.* 43. - *W. Sp.-Pers. E.-Roem.*, *S. Veg.* 1.

Var. α in Monte Circello et alibi a Triumphetto, circa Ro-

mam prope *le tre Fontane* a Barrelerio collecta, in horto Romano culta a nobis observata. Var.  $\beta$  ab eodem Tritm-  
phetto Privernum inter et Setiam, a nobis vero copiosissi-  
me in occidentali Romani agri parte reperta, præsertim  
extra Portam Portuensem ultra secundum milliarium, et  
similiter in horto Romano prope priorem vegeta asserva-  
ta. Perenn. Floret Julio-Augusto. Fl. violacei.

**Radix magna ramis incrassatis. Folia subtus pilis brevibus  
vestita. Caulis 2-4-pedalis, villosus; ramis elongatis,  
virgatis: verticilli remotiusculi 6-flori; bracteis cordatis  
apice acuminatis, inferioribus calyce longioribus vel  
sub-æqualibus; supremis brevioribus. Staminum appen-  
dices foliaceæ.**

*Salvia virgata* Aitonii plura licet hue convenire demon-  
strent, dubitanter tamen retulimus, cum opportuna vo-  
lumina consulere datum non fuerit. *Salvia cirrata* cl:Savii ex optima ejus descriptione bene quadrat cum nostra.

**29. VERBENACA.** *L.* Foliis serratis sinuatibus leviusculis: co-  
rollis calyce angustioribus. *L.-All. Ped.-Smith Br.-W.  
Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Bertol. Pl. Gen.-Savi B. Etr. 1.  
p. 20.\*-DC. Syn.-Roem. S. Veg. 1.*

Gallitrichum flore minore purpurascente et rubro. *J. B. H. 3.  
p. 513.*

Ad vias omnes. Perenn. Floret Martio-Junio. Fl. cœ-  
rulei.

Foliis plus minus profunde incisis admodum variat.

**30. CLANDESTINA.** *L.* Foliis serratis pinnatifidis rugosissimis  
glabris: spica obtusa: corollis calyce duplo longioribus.  
*Bertol. Rar. It. Pl. Dec. 2. p. 29.\*-Savi B. Etr. 1. p. 21.-  
Roem. S. Veg. 1.*

*S. clandestina. W. Sp.-Pers. E. S. pratensis minor. Savi  
Pis. 1. p. 22. ( a Pers. Ench. sub *S. pratensis* γ precox ).  
Horminum verbenæ laciniis angustifolium. *Triumph.  
Obs. 66. t. 66.**

In marginibus viarum circa urbem frequens. Perenn. Flo-  
ret Aprili, et æstate. Fl. cœrulei.

Statura minore, foliis pinnatifidis, spica obtusa, et corolla  
majore labio inferiore pallescente a præcedente præser-  
tim distineta.

**31. SCLAREA.** *L.* Foliis rugosis, cordatis, oblongis, villosis,  
serratis; bracteis cordato-acuminatis, concavis, cilia-  
tis, coloratis, calyce longioribus. *Savi B. Etr. 2. p. 3.\**

*S. sclarea. All. Ped. - W. Sp.-Pers. E. - Lois. G. - Roem. S.  
Veg. 1. Orvala. Dod. Pempt. 292. Sclarea vulgaris lanu-  
ginosa. Hort. Rom. 3. t. 2.*

In umbrosis frequens. *A Villa Borghese, Villa Pamphilii,  
Frascati, Castel Gandolfo, etc.* Bienn. Floret Junio. Fl.  
cœruleo-albi.

1. Agro  
1821
52. GLUTINOSA. L. Foliis cordato-sagittatis, serratis, acutis. L.-All. Ped.-W. Sp.-Pers. E.-Lois. G.-Sacri B. Etr. 1. p. 22.  
 S. glutinosa. Roem. S. Veg. 1. Orvala tertia. Dod. Pempt. 292. S. montana maxima foliis horminii, etc. Hort. Rom. 3. t. 23.  
 In nemoribus opacis frequens. Ad Albano, Nemi, Palazzuola, etc. Perenn. Floret Augusto. Fl. lutei.  
 53. OFFICINALIS. L. Foliis lanceolato-ovatis, crenulatis: verticillis paucifloris: calycibus mucronatis. Ettl. Saly. 1.-W. Sp.-Pers. E.  
 S. officinalis. All. Ped.-Lois. G.-DC. Syn.-Roem. S. Veg. 1. S. major. C. B. P. 237.-Dod. Pempt. 290.  
 ♂. Salvia minor aurita et non aurita. C. B. P. 237.-Dod. Pempt. 290.  
 In locis arenosis. ♂ Ad Ostia ... β Sui monti subapennini. Perenn. Floret Junio. Fl. cœrulei.

## DIANDRIA DIGYNIA.

## (14) ANTHOXANTHUM.

- 70  
April 1821
54. ODORATUM. L. Spica ovato-oblonga; flosculis sub-pedunculatis arista longioribus. L.-All. Ped.-Smith Br.-W. Sp.-Pers. E.-Lois. G.-Sacri B. Etr. 1. p. 23.  
 A. odoratum. DC. Syn.-Roem. S. Veg. 1. Gramen spicatum pratense, spica flavescente. Scheuch. Agr. 88. Gr. avenaceum odoratum spica flavescente. Monti 57. ic. 84.  
 In pratis, collibus vulgaris. Perenn. Floret Aprili, Majo. Culmus sub-pedalis. Panicula spicata lanceolata. Calix valvis binis inæqualibus. Corolla minor glumis æqualibus basim versus aristatis, aristis inæqualibus calyce inclusis, longiore geniculata. Nectarium diphyllum (aliis flosculi 2 steriles uniglumes) glumis duplo brevius, ovatum, foliolis ovato-obtusis inæqualibus.

## C L A S S I S III.

## TRIANDRIA.

## ORD. MONOGYNIA.

- (15) *VALERIANA*. *Calix superus limbo intus revoluto demum in pappum evoluto. Corolla tubulosa, basi hinc calcarata aut gibba, limbo quinquefido. Stamina 1-3. Capsula 1-locularis, 1-sperma.*
- (16) *FEDIA*. *Calix superus 3-6-dentatus. Corolla tubulosa, basi hinc gibba, limbo quinquefido. Capsula 2-3-locularis, calyce persistente coronata; loculo uno alterove sterili.*
- (17) *CROCUS*. *Corolla supera tubulosa: tubus gracilis elongatus basi subterraneus: limbus erectus sexpartitus aequalis infundibuliformis. Stigmata 3, convoluta, saepius cristata.*
- (18) *ROMULEA*. \*) *Spatha bivalvis, valvis integris oppositis. Corolla supera campanulata 6-partita, regularis, tubo brevissimo. Filamenta erecta, brevia, pilosa ad basim. Stigmata 3, bifida.*
- (19) *GLADIOCUS*. *Corolla supera tubo sub-curvato; limbo bilabiato, sexpartito laciniis inaequalibus. Stamina adscendens. Stigma trifidum.*
- (20) *IRIS*. *Corolla supera sexpartita, laciniis alternis reflexis. Stigmata 3 petaloidea incumbentia.*
- (21) *SCHOENUS*. *Squamæ paleaceæ univalves in spiculis acutis congestæ; exteriore vacuae. Corolla nulla. Stamina 2-3. Semen 1 subrotundum nudum, aut setis cinctum.*
- (22) *SCIRPUS*. *Squamæ paleaceæ undique imbricatae. Corolla nulla. Semen 1, nudum, aut setulis brevioribus cinctum.*
- (23) *CYPERUS*. *Squamæ paleaceæ distiche imbricatae, Corolla nulla. Semen 1. nudum. Spiculæ compressæ.*

\*) Ab Ixia & Moraea (Gawleri) distinctum profecto genus, a sagacissimo Maratta nostro jampridem Romulea nuncupatum, cl: Gawlero Trichonema. Auctor hic Ixiae characterem circumscribit sequentibus. *Spatha bivalvis. Corolla basi tabulosa; tubus gracilis, sexpartitus (sexodus), regularis, subaequalis, patens. Filamenta limbo pluries breviora, erecto-patentia vel curvato-erecta (glabra: an constanter?). Stigmata 3, angusta, recurva. Capsula globosa, ovata.*

## ORD. DIGYNIA.

Sect. I. Flores paniculati, aut spicato-digitati : spiculæ unifloræ.

- (24) *SACCHARUM*. *Calix 2-valvis, 1-florus, lanugine longa sericea involucratus. Corolla 1-2-valvis. Stamina 1-3.*
- (25) *LAGURUS*. *Calix 2-valvis, uniflorus : valvæ apice aristatae, aristis villosis. Corollæ gluma exterior aristis binis terminalibus, tertia dorsali geniculata.*
- (26) *STIP'A*. *Calix 2-valvis, 1-florus. Corolla brevior 2-valvis : valvula exterior arista terminali longissima, basi articulata, decidua.*
- (27) *MILIUM*. *Calix 2-valvis, 1-florus, centricosus. Corolla 2-valvis inclusa : valvula major sub apice aristata, aut mutica. Semen corolla corticatum.*
- (28) *AGROSTIS*. *Calix 2-valvis, 1-florus, compressus, valvulis acutis. Corolla bivalvis, sœpius minor et basi obsolete pilosa. Semen liberum. - Flores paniculati.*
- (29) *SANTIA*. \*\*) *Calix 2-valvis, 1-florus ; valvulis subæqualibus aristatis. Corolla minor 2-valvis, valvula exteriore aristata. Semen liberum. ( Polypogon auct )*
- (30) *CRYPSIS*. *Calix 2-valvis, 1-florus compressus, inæqualis. Corolla 2-valvis inæqualis major. Stamina 1-3. Semen liberum corollatectum.*
- (31) *ALOPECURUS*. *Calix 2-valvis, 1-florus. Corolla valvis 2 in glumam utriculiformem hinc connatis, infra medium aristata. - Panicula spiciformis.*
- (32) *BECKMANNIA*. *Calix 2-valvis, sub-2-florus ; valvis concavis, spatulæ-formibus, apice obtusis. Corolla 2-valvis longior.*
- (33) *PHALARIS*. *Calix 2-valvis, 1-florus ; valvis naviculari-compressis, nervosis, æqualibus, dorso carinatis. Corolla inclusa 2-valvis, interdum exterius valvulis accessoriis 1-2-Panicula spiciformis.*
- (34) *PHLEUM*. *Calix 2-valvis, 1-florus ; valvis compressis linearibus, truncatis, nervo carinæ producto mucronatis. Corolla inclusa 2-valvis, mutica. - Panicula spiciformis.*
- (35) *TRAGUS*. *Calix 2-valvis, 1-florus : valvula exteriore magiore, cartilaginea, aculeis uncinatis aspera ; interiori minutissima nuda. Corolla 2-valvis, calyce brevior. ( Lapago, vel Cenchrus pl. auct ).*
- (36) *PANICUM*. *Calix 2-valvis, valvula exteriore valde minore, quandoque obsoleta, 2-florus. Flosculus inferior unisexualis vel neuter glumis 1-2 herbaceis ; superior*

\*\*) Genericum nomen antiquius jure asservandum videbatur.

- hermaphroditus glumis 2 coriaceo-induratis persistentibus. - Inflorescentia caria.*
- (37) *DIGITARIA*. *Calix 2-valvis, 1-florus, valvis concavis; ad exterioris basim extus valvula accessoria minima aut obsoleta. Corolla 2-valvis. Semen corolla corticatum. - Spicæ digitatæ, rachi linearí, floribus uni-lateralibus dupli serie.*
- (38) *CYNODON*. *Calix 2-valvis, 1-florus; valvis navicularibus. Corolla 2-valvis; valvula interiorē angustissima, inclusa. Semen corolla corticatum. - Spicæ digitatæ, rachi linearí, floribus uni-lateralibus dupli serie.*
- Sect. 2. Flores paniculati. Spiculæ 2-multi-floræ.
- (39) *AIRA*. *Calix 2-valvis, 2-florus, flosculis scipius longior. Corolla 2-valvis, mutica, aut supra basim aristata. Semen liberum, corolla tectum.*
- (40) *HOLCUS*. *Calix 2-valvis, 2-5-florus, flosculo unico hermaphroditio sessili mutico; masculo solitario: (raro gemino), pedicellato, gluma altera aristata: arista geniculata, vel hamata.*
- (41) *MELICA*. *Calix 2-valvis; valvis inæqualibus, laxis, obtusis, 2-3 vel 4-florus: flosculi 1-2 hermaphroditæ, abortivo pedicellato accessorio unico, vel geminato. Corolla 2-valvis, mutica. Semen liberum corolla tectum.*
- (42) *ARUNDO*. *Calix 2-valvis, multi-florus, nudus. Corolla 2-valvis, basi lana persistente cincta.*
- (43) *AVENA*. *Calix 2-valvis, 2-multi-florus. Corollæ gluma exterior apice bifida vel erosa, dorso aristata: arista contorta, vel geniculata.*
- (44) *FESTUCA*. *Calix 2-valvis, valvulis inæqualibus, multi-florus, flosculis brevior. Spicula oblonga, disticha. Corollæ gluma exterior acuminata, aut arista terminali instructa, interior apice bifido acuto, margine nudo. (In quibusdam: exterior paulo infra apicem bidentatum setigera, interior margine scabra). - Panicula composita.*
- (45) *POA*. *Calix 2-valvis, multiflorus, flosculis brevior. Spicula ovata. Corolla bivalvis, valvulis ovatis acutiusculis, margine scariosis.*
- (46) *BRIZA*. *Calix 2-valvis, multiflorus. Corolla 2-valvis; valvis ventricosis, cordato-obtusis, muticis; interior minuta. Semen corollæ adnatum.*
- (47) *BROMUS*. *Calix 2-valvis, multiflorus. Spicula lanceolata, disticha. Corollæ gluma exterior infra apicem aristata, interior nervis marginalibus pectinato-ciliatis vel serratis. Flores paniculati (aut spicati, arista exterioris glumæ terminali.)*
- (48) *KOELERIA*. *Calix 2-valvis, 2-5-florus; valvis compresso-carinatis, altera spiculam suba quante. Corolla 2-valvis;*

*valvula exterior acuminata vel setigera* ( *setula infra apicem sub-integrum orta, aut terminali* ) ; *interior apice bifida. - Panicula spiciformis.*

Obs. *Gluma exterior margine sub-scariosa, carina ciliata vel aspera.*

Sect. 3. *Spiculæ sessiles seeus rachin spicatæ.*

(49) *ROTTBOELLA*. *Calix 1-valvis, integer vel bipartitus, 1-2-florus flosculo altero imperfecto. Corolla 2-valvis. Spica simplex, floribus in racheos sinubus immersis, 1-3-andris.*

(50) *LOLIUM*. *Calix 1-valvis, fixus, multiflorus* ( *valvula altera interior abortiva, vel minima* ) . *Spiculæ solitariae rachi parallelæ.*

(51) *HORDEUM*. *Flores terni: intermedius sessilis, fertilis; laterales stipitati, saepe steriles. Singulis involucrum diphyllum setaceum loco calycis. Corolla bivalvis.*

(52) *CYNOSURUS*. *Calix 2-valvis, 2-multi-florus. Bractea foliacea lacera ad basim spiculæ. Corolla 2-valvis, valvulis integris. - Spica aut panicula coarctata.*

(53) *SESLERIA*. *Calix 2-valvis, sub-aristatus, 2-4-florus. Spiculæ ebracteatae, aut inferiores tantum bractea instrutæ. Corolla 2-valvis; valvula exteriore apice 3-5-fida, interiore 2-fida.*

(54) *ÆGILOPS*. *Calix 2-valvis, cartilagineus, multi-aristatus, 3-4-florus: flosculi laterales perfecti, intermedii 1-2 abortivi. Corolla 2-valvis; valvula exteriore aristis 2-3 terminata. - Spica simplex.*

(55) *SECALE*. *Calix 2-valvis, solitarius, rachi dentatae oppositus, 2-florus, (saepe flosculo tertio abortivo interjecto, interdum et quarto). Corolla 2-valvis, valvula exteriore apice aristata.*

(56) *TRITICUM*. *Calix 2-valvis, solitarius, rachi dentatae oppositus, 3-multi-florus; valvulis subæqualibus aristatis vel muticis. Corolla 2-valvis valvula exteriore aristata vel sub-mutica.*

Sect. 4. *Flores polygamo-monoicii.*

(57) *ANDROPOGON*. *Flores geminati, aut terni; unico hermaphroditio sessili, altero imperfecto pedicellato, seu imperfectis pedicellatis binis, lateralibus. Calix 2-valvis, uniflorus. Corolla floris hermaphroditæ gluma altera minore aristata; incompleti glumis muticis.*

#### ORD. TRIGYNTA.

(58) *POLYCARPON*. *Calix 5-phyllo. Petala 5, minima. Capsula 1-locularis, 3-valvis. Semina plurima.*

## TRIANDRIA MONOGYNYA.

## (15) VALERIANA.

A. Stamen 1. Corolla calcarata. (*Centranthus*) .

35. RUBRA. L. Floribus monandris calcaratis : foliis ovato-lanceolatis , acuminatis , sub-integerrimis .

V. rubra. All. Ped.-Smith Br.-W. Sp.-Pers. E.-Lois. G.-Sav. B. E. 1. p. 23. - Dodon. Pempt. 91. *Centranthus ruber*. DC. Fl. Fr. et Syn.-Roem. S. Veg. 1. *Valeriana marina latifolia major rubra* . Moris. H. 3. s. 7. t. 14. f. 15 *Valerianoides latifolia* . Hort. Rom. 2. t. 17.

In moenibus urbis , parietibus hortorum communis. Perenn. Floret Aprili-aestate . Fl. pulchre rosei , interdum albi .

36. CALCITRAPA. L. Floribus monandris basi gibbis ; spicis raeemosis bipartitis : foliis pinnatifidis , radicalibus in divisis .

V. calcitrapa . All. Ped.-W. Sp.-Pers. E.-Lois. G.-DC. Syn.-Savi. B. Etr. 2. p. 5. *Centranthus calcitrapa* . Dufresne-Roem. S. Veg. 1. V. annua seu aestiva . Clas. H. 2. p. 54.

In maritimis. Presso Ostia .... Ann. Floret Majo . Fl. rubri . B. Stamina sepius 3. Corolla ecalcarata . (*Valeriana*).

37. OFFICINALIS. L. Foliis omnibus pinnatis , foliolis lanceolatis dentatis ; caule fistuloso , sulcato .

V. officinalis . All. Ped.-Smith Br.-W. Sp.-Pers. E.-Lois. G.-DC. Syn.-Savi B. Etr. 2. p. 6. V. sylvestris. Dod. Pempt. 349. Hort. Rom. 2. t. 15. Phu germanicum . Fuchs. H. 857.

In sylvaticis montium frequens . *Sui Monti Albani* , *Tusculani* , *Tiburtini* , etc. Perenn. Floret Junio-Julio . Fl. albo-subcarnei .

38. TRIPTERIS. L. Foliis dentatis ; radicalibus cordatis , simplicibus ; caulinis ternatis , ovato-oblongis , lateralibus lanceolatis . Vahl Enom.-Savi B. Etr. 2. p. 7.

V. tripterus . All. Ped.-W. Sp.-Pers. E.-Lois. G.-DC. Syn.-Roem. S. Veg. 1. V. alpina prima . C. B. Prod. 86. ic. V. alpina saxatilis minor flore albo . Barrel. ic. 742.

In subapenninis . Monte Calvo presso Subiaco .... Perenn. Floret Junio-Julio . Fl. albi , seu dilute purpurei .

## (16) FEDIA.

39. OLITORIA . Vahl En. Floribus triandris : foliis lanceolatis integerrimis : fructu obsolete tridentato : caule dichotomo glabro .

F. olitoria . Roem. S. Veg. 1. *Valeriana locusta* . L. V. olitoria . L.-All. Ped.-W. Sp.-Pers. E. *Valerianella olitoria* . DC. Fl. Fr. et Syn.-Lois. G. *Lactuca agnina* 1 , et 2. Tavern. 167.

In arvis et cultis communis . Vulgo : *Lattuchella* . Ann. Floret Martio-Aprili . Fl. albido-cerulei .

Maggio 1871  
18 1871

Similis  
15 aprile 1871  
4 maggio 1871

## (17) CROCUS.

40. VERNUS. *L.* Stigmate inclusō , trifido , staminibus longiore ; lobis cuneiformibus , incisis , crenulatis : fauce corollæ pilosa : folijs linearibus , supra linea alba canaliculatis , subtus carinatis , carina complanata .

*C. vernus. Smith. Br.-W. Sp.-Pers. E. - Lois. G.-DC. Syn. - C. sativus β. L.*

*a.* Scapo solitario , floribus lilacinis .

*C. vernus recentiorum.*

*β.* Scapo gemino , floribus lilacinis .

γ. Minor . Scapo solitario ; corolla albida , segmentis tribus exterioribus luteolis 3-listatis .

*C. vernus. var. pusillus. Ten. Fl. Neap.*

*C. vernus γ. Redout. lil. n. 81.*

In oris sylvarum , et in apricis , α Presso Roma alla Valle dell' Inferno .... presso Ronciglione , Viterbo .... β Sulla cima della Montagna di Viterbo . γ Copiosamente sul Testaccio , nelle Ville Pamfili , Borghese , etc. Perenn. Floret Februario .

En notas in singula varietate pluries observatas .

In α. Statura sub-3-4 pollicaris . Folia ut plurimum scapo solitario breviora , lineam unam vix lata . Corollæ tubus pallens , spatha valde longior ; limbus segmentis lato-lanceolatis lilacinis omnibus , ad basim obsolete lineatis , lineis sub-fuscis , superius evanidis . Stylus staminibus etiam brevior , apice tantum trifidus , laciñiis (stigmatibus ) cuneatis , margine involutis , croceis .

In β. Statura præcedentis vel major . Folia scapo gemino vel solitario , raro triplici sub-breviora , lineam unam vel amplius lata , carina lato-complanata , margine evidenter revoluto . Corollæ tubus pallens spatha longior ; limbus segmentis lato-lanceolatis obtusis , lilacinis omnibus et fere unicoloribus . Stylus staminibus parum longior , breviter trifidus , laciñiis (stigmatibus ) cuneatis , margine involutis , aurantiacis .

In γ. Floris statura pollicaris , sesqui-pollicaris , rarius ultra . Folia quam in α et β dimidio etiam angustiora et subtus anguste carinata , flore sub longiora . Corollæ tubus albidus , saepe fusco-lineatus , spatha parum longior ; limbus segmentis lanceolatis , 3 interioribus albis , basi tantum lineatis , exterioribus luteolis triplici linea atro-fusca a basi ad apicem insignitus . Stylus staminibus etiam sesqui-longior , proinde trifidus , laciñiis (stigmatibus ) antherarum fere longitudine , margine sub-involutis , inferne filiformibus , croceis .

Quos pro varietatibus hue nunciamus spectabiles plantæ insus , ut distinctas inter se species primum decepti habuimus ; accuratissima tandem inspectio solidis characte-

ribus minime posse separari edocuit; et re vera varietatis nostrae γ circa urbem passim inveniendæ, quæ ab aliis longiore itinere et constanter diversa visa fuerat, vel color, vel statura, vel genitalium proportio, vel plures simul characteres non raro in individuis prodierunt varietati α vel β pertinentibus, quæ a cæteris ejusdem loci natalis, vel sterilioris soli, vel magis apriæ regio[n]is ratione aliquomodo secedebant. Cæterum traasitio ab α in β magis luxuriantem varietatem per intermedios lusus frequens quoque fuit in speciminibus Cimini montis. Nonne suspicandum e similibus aberrationibus plures ortas esse Croci sub vere florentis species apud auctores, cum in loco natali observatae non fuerint?

## (18) ROMULEA.

41. BULBOCODIUM. Nob. Scapis unifloris subgeminatis: foliis filiformi-compressis, sulcatis, flexuosis: spathis corollæ tubum longe excedentibus: stylo staminibus longiore, stigmatibus bipartitis.

Genno. 1891.

Romulea. Maratti Diss. de binis Rom. plantis, cum ic. (mala). Ixia bulbocodium. L.-W. Sp. - Pers. E. - Jacq. rar. t. 271. Desf. Atl. 1. p. 54. Savi. Bot. Etr. 2. p. 7. I. bulbocodium var. α. major. Schousboe. Mar. I. bulbocodium B. Redout. lil. t. 88. f. B. 1., 2. I. bulbocodium A. Tenore Fl. Neap. 1. I. bulbocodium var. γ. grandiflora. Vahl En.-Roem. S. Veg. 1. Trichonema bulbocodium. Gawler Ann. of Bot. 1. p. 225. Romulea flore ex violaceo et luteo variegato. Hort. Rom. 7. t. 4. (mala). Sisyrinchium asprenum angusto folio alterum. Col. Ecphr. 2. p. 5. t. 7. f. 1. (bona). Sisyrinchium minus angustifolium flore majore variegato. C.B.P. 41. Crocus vernus angustifolius violaceo flore. Clus. H. 1. p. 298. (male).

In apricis, collibus circa urbem frequens. Alla Caffarella, presso Tor-di-Quinto, alla Farnesina, a Capo di Bove, etc. a Baccano, Monte-Rosi, sui Cimini .... Perenn. Floret Februario labente, Martio.

Bulbus obverse pyriformis solidus, radiculis ex appendice cochleariformi oblique bulbo adjecta. Folia filiformia, lateribus compressa, sulcata, superius levissime canaliculata, canaliculi marginibus arcte conniventibus, scapo longiora, recurva, flexuosa. Scapi e bulbo gemini, interdum 3, vel unicus, uniflori, sub-pollicares, erectiusculi, fructiferi recurvati. Spatha bivalvis persistens, valvulis oppositis, lanceolatis, coneavis, basi germen involuerantibus, superius corollæ adpressis; exterior foliacea rectiuseula; altera membranacea, dorso interdum virens, ultra germen libera, extus flexa. Germen cum continuo scapi apice oblique parum flori subjectum; lineam longum, obscure trigonum. Corolla erecta pollicaris et

21  
NBY NBY

ultra vel minor, tubo brevissimo, semi-lineam vix asse-  
quente, limbo sexpartito, campanulato, laciniis æquali-  
bus lanceolatis; marcescens convoluta; colore admodum  
varia, constanter fundo crocea, apicibus sub-violacea,  
cæterum ab albo ad roseum et rubro-violaceum iudit, et  
laciniæ tres exteriores, ut plurimum, dorso colore satu-  
ratiore, etiam rubro-spadiceo pinguntur. Stamina ere-  
cta corolla duplo saltem breviora, filamentis simplicibus  
kasi hirsutis, antheris sagittato-oblongis. Stylus stami-  
nibus sesqui-longior, vel ultra; stigmata tria filiformia  
profunde bipartita, nec raro omnino sex.

Magnitudine uti et colore flores hujus speciei variare non-  
nihil adnotavimus, ideoque hoc etiam referri debere du-  
cimus aliam Clusii plantam, quæ *Crocus vernus angu-  
stifolius*. Cl. I. c., seu *Ixia bulbocodium* var. β. media.  
Vahl, Roem. et Sch., aliorumque. Præterea Clusii icon  
a nobis sub specie citata ob spathæ defectum pessima.

42. COLUMNAE. Nob. Scapo unifloro sub-solitario sub-nutante:  
foliis filiformi-compressis sulcatis flexuosis: spathis co-  
rollæ tubum longe excedentibus: stylo staminibus brevio-  
re, stigmatibus apice bifidis.

Romulea var. 5. *Maratti Diss. De bin. rom. pl.* *Ixia bulboco-  
dium* var. σ. parviflora. *Vahl En.* 2. - *Roem. S. Veg.* 1.  
*I. bulbocodium* A. *Redout. lil.* 88. f. A. I. *bulbocodium* B.  
minima. *Tenore Fl. Neap.* 1. *Sisyrinchium Theophrasti.*  
*Col. Ecphr.* 1. p. 327. (ic. bona). S. minus *angustifolium*.  
*C. B. P.* 41. *Crocus vernus angustifolius* 2. *Clus. H.* 1. p. 207.  
(sat bona).

In collibus etiam urbis. Sul Testaccio e sul Gianicolo in  
copia, presso Tor-di-Quinto .... Perenn. Floret Februario  
inerente.

Bulbi et folia ut in præcedente, ejusdem fere magnitudi-  
nis. Scapus unicus (interdum geminus) brevissimus,  
terra parum elatiis, hinc nonnihil flexus, demum recur-  
vatus. Spatha præcedentis, sed minor. Germen oblique  
omnino flori subjectum et horizontaliter fere terræ in-  
cumbens, magnitudine et forma præcedentis. Corolla  
erecta vix lineas tres longa, tubo brevissimo, limbo in-  
funduliformi sexpartito, laciniis lanceolatis, 3 interio-  
ribus exteriores vix æquantibus; marcescens convoluta;  
color ex albo lutescens; laciniaæ tres exteriores, ut plu-  
rimum, dorso lineis fusco-rubris notatae; interiores al-  
bidæ. Stamina corolla triplo saltem breviora, filamen-  
tis simplicibus, ad basim oculo etiam nudo pilosis; an-  
theris sagittato-ovalibus. Stylus staminibus brevior,  
stigmatibus filiformibus brevibus, apice tantum bifidis,  
nonnisi staminibus sejunctis conspiciendus.

15.

## (19) GLADIOLUS.

43. COMMUNIS. *L.* Corollis subringentibus, laciniis spathulatis: spathis tubo longioribus: floribus secundis: foliis ensiformibus nervosis. *Savi B. Etr. 2. p. 8.*

*G. communis. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. G. floribus uno versu dispositis. Moris. H. 2. s. 4. t. 4. f. 4. G. Dod. Pempt. 209.*

In segete, arvis communis. Perenn. Floret Majo, Junio.  
Fl. purpurei vel albi.

## (20) IRIS.

A. Corollæ laciniis reflexis barbatis:  
foliis ensiformibus.

44. FLORENTINA. *L.* Caule paucifloro foliis altiore: spathis basi foliaceis, apice margineque scariosis: corollæ laciniis 3 barbatis integris.

I. florentina. *W. Sp. - Pers. E. - Roem. S. Veg. 1. I. florentina a. Targ. Ist. 2. I. alba. Savi B. Etr. 2. p. 9. I. flore albo. J. B. H. 2. p. 719. I. nostras vulgaris candidis floribus. Lob. ic. 59.*

20.  
aprile 1871  
10-15 1877

In montium sylvaticis solo sieciore. *Castel Gandolfo, Monte Gennaro . . . . Perenn. Floret Aprili, Majo. Fl. albi, odori.*

45. GERMANICA. *L.* Caule multifloro foliis altiore: spathis basi foliaceis apice margineque scariosis; corollæ laciniis 3 barbatis emarginatis.

I. germanica. *All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Roem. S. Veg. 1. I. florentina b. Targ. Ist. 2. I. violacea. Savi B. Etr. 2. p. 9. I. flore violaceo. Cæsalp. p. 421.*

In collibus, sylvaticis. *Monte Mario, Monte Gennaro, etc. Perenn. Floret Aprili, Majo. Fl. violacci.*

B. Corollæ laciniis imberbibus:  
foliis ensiformibus.

46. PSEUD-ACORUS. *L.* Corollis imberbibus, laciniis 3, interioribus erectis, stigmate minoribus.

I. pseud-acorus. *All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Roem. S. Veg. 1. Acorus adulterinus. Moris. H. 2. s. 4. t. 6. f. 11. I. palustris lutea. Hort. Rom. 6. t. 64. Psendo-Iris. Dod. Pempt. p. 284.*

In fossis, palustribus vulgaris. *Prata-lata, Caffarella in gran copia, etc. Perenn. Floret Aprili, Majo. Fl. lutei.*

47. FOETIDISSIMA. *L.* Corollæ laciniis imberbibus, 3 interioribus patulis: caule uni-angulato.

I. foetidissima. *W. Sp. - Smith. Br.\* - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 11. - Roem. S. Veg. 1. - Hort. Rom. 6. t. 65. I. foetida. Pers. E. Spathula foetida. Fuchs. H. p. 794. Dod. Pempt. p. 247.*

Ad sepes, seeus fossas communis. Perenn. Floret Majo, Junio. Fl. cinerei venaturis atris. Odor ingratus.

## TRIANDRIA MONOGYNIA.

C. Foliis tetragonis.

48. TUBEROSA. L. Imberbis, foliis tetragonis. L. - W. Sp. - Pers. E. - Roem. S. Veg. 1.

*G.  
aprile 1801*

Hermodactylus folio quadrangulo. Tourn. Cor. 5o. Iris tuberosa folio anguloso. Moris. H. 2. s. 4 t. 5 f. 1. Sisyrinchium. Hort. Rom. 6. t. 66.

In umbrosis humidiusculis, etiam in urbe. S. Croce in Gerusalemme, nelle Ville Borghese, Medici, Pamfili, etc. Perenn. Floret Februario, Martio. Fl. albo-sub-virides, lacinias exterioribus erectiusculis ultra medium reflexis lamina supra atra, velutina.

Radix tuberosa. Odor floris gratus.

(21) SCHOENUS.

49. MARISCUS. L. Culmo tereti folioso: foliis margine, dorsoque aculeatis. L. - All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 11.\*

Cladium mariscus. R. Brown Prod. 1. Cl. germanicum. Schrad. Germ. 1. t. 5 f. 7. - Roem. S. Veg. 1. Pseudo-cyperus palustris foliis et carina serratis. Scheuchz. Agr. p. 375. t. 8. f. 7. 11. - Mich. N. Pl. G. p. 55.

In profundis fossis, paludibus. Solfatara di Tivoli. . . . .  
Perenn. Floret Junio. Spiculae flavescenti-fuscæ.

50. MUCRONATUS. L. Culmo tereti nudo: foliis canaliculatis: spiculis ovatis, fasciculatis: involuero polyphyllo patente. DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 12.\*

S. mucronatus. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Roem. S. Veg. 2. Juncus maritimus panicula sub-rotunda. Barr. ic. 203. f. 1. Scirpus maritimus capite glomerato. Scheuchz. Agr. p. 367. t. 8. f. 1. Melanoschoenus maritimus humilius cyperi effigie. Mich. N. Pl. G. p. 46. n. 1. t. 31.

In maritimis frequens. Perenn. Floret Majo, Junio. Spiculae rubenti-fuscæ.

51. NIGRICANS. L. Culmo tereti nudo: capitulo ovato: involucri diphylli valvula altera subulata longiore. Smith Br.\* - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 13.\*

S. nigricans. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Roem. S. Veg. 2. Junco affinis capitulo glomerato nigricante. Scheuchz. Agr. 349. t. 7. f. 13-15. Melanostachyos palustris angustifolius, etc. Mich. N. Pl. G. 46. n. 2.

In maritimis frequens. Ad Ostia, Fiumicino . . . . Perenn. Floret Majo. Spiculae nigricantes.

(22) SCIRPUS.

A. Semine basi setulosis cincto. (Scirpus  
et Eleocharis. Brown.)

52. PALUSTRIS. L. Culmo tereti nudo, basi vaginato: spica unica ovali terminali, squamis lanceolatis acutis; radice repente.

- S.** palustris. *All. Ped.* - *Smith. Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 14. *Eleocharis palustris. Roem. S. Veg.* 2.
- a. *Sc. equiseti capitulo majore. Scheuchz. Agr.* 360. *Sc. palustris clavatus*, etc. *Mich. N. Pl. G. 50. O. 3. n. 1.*
- β.** *Sc. equiseti capitulo majore alter. Scheuchz. Agr.* 361. t. 7. f. 17. *Scirpus palustris*, etc. *Mich. l. c. O. 3. n. 4, 5.*  
In paludosis, scrobibus frequens. *Perenn. Floret Majo, Junio.*
- „ Magnitudine variat. Folia nulla, nisi culmos steriles pro „ foliis accipias „. *Smith l. c.*
- 53. LAGUSTRIS.** *L.* Culmo tereti nudo; panicula cymosa decomposita terminali; spiculis ovatis. *Smith Br.*\* - *Savi B. E.* 2. p. 16.
- S. lacustris.** *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Roem. S. Veg.* 2.\* *Juncus laevis maximus. Moris. II. 3. s. 8. t. 10. f. 1.* *Sc. palustris altissimus. Scheuchz. Agr.* 354.  
In rivulis, lacubus, staminis aqua puriore communis. *Perenn. Floret Junio, Julio.*  
Culmi 5-pedales, teretes, fusiformes.
- 54. MARITIMUS.** *L.* Culmo triquetro; panicula conglobata, foliacea, terminali; squamis mucronatis lacero-trifidis. *Smith Br.*\* - *Savi B. Etr.* 2. p. 22.\*
- S. maritimus.** *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Roem. S. Veg.* 2.
- a. *Vulgatior. Scirpus maritimus. Pers. E.* *Sc. maritimus*  $\beta$ . *Smith. l. c.* - *Savi l. c.* *S. maritimus*  $\gamma$ . *W. Sp.* *Cyperus rotundus inodorus germanicus. C. B. Prod.* 25. *cum ic. C. panicula compacta e spicis teretibus crassioribus composita. Scheuchz. Agr.* 400. t. 9. f. 9. 10. *C. palustris radice repente nodosa inodora, panicula non sparsa, capitulis crassioribus et brevioribus. Mich. N. Pl. G. 48. O. 5. n. 2.*  
In maritimis palustribus, et Agri Romani fossis. *Ostia, Fiumicino, la Marcigliana, etc. Perenn. Floret Junio, Julio.*  
Spicularum crassitie, longitudine, numero, pedunculis variat. Differentias a Michelio l. c. adumbratas a cl: Savio in Bot. Etr. l. c. una cum auctorum synonymis ad varietates diligenter relatas invenies. Novem cum Schradero enumerant in Syst. Veg. ol: Roem. et Sch.  
B. Semine nudo. (*Isolepis. Brown.*).
- 55. HOLOSCHOENUS.** *L.* Culmo tereti nudo: capitulis glomeratis, pedunculatis sessilibusve: involucro diphyllo inaequali; foliis canaliculatis. *Smith Br.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 17.\*
- S. holoschoenus.** *All. Ped.* *Isolepis holoschoenus. Roem. S. Veg.* 2.
- a. *Capitulis maxima ex parte pedunculatis.*  
*S. holoschoenus. L.-W. Sp.-Pers. E.-DC. Syn.-Lois. G. Scir-*

poides maritimum capitulis sparsis glomeratis. *Scheuchz.* *Agr.* 371. *t. 8. f. 2-5.* *Scirpoïdes maritimum*, etc. *Mich.* *N. Pl. G.* 52. *O. 1, 2. n. 1, 2, 3.*

*β. Capitulis conglobatis sessilibus:*

*S. holoschoenus β romanus.* *Smith l. c.* - *Savi l. c.* *S. romanus.* *L.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *Isolepis holoschoenus γ.* *Roem. S. Veg.* 2. *Juncus minor glaber singulare capitulo*, radice tomentosa. *Barr. ic.* 255. *f. 3.* (*mala*). *Scirpoïdes acutum maritimum capitulo glomerato solitario.* *Scheuchz. Agr.* 373. *t. 6. f. 6.* *Scirpoïdes maritimum capitulis apodibus*, etc. *Mich. N. Pl. G.* 52. *O. 3. n. 1.*

*In pratis humidis, palustribus, ad scaturigines vulgares varietares ambæ.* *Perenn. Floret Junio - Augusto.*

*S. australis.* *L.* a suo *S. romano* non differt; sunt quidem varietates *S. holoschoeni* capitulis unico, pluribus, sessilibus vel subsessilibus: quod in manuscriptis monuit Linnaeus ipse teste Smithio.

56. *SAVII.* *Nob. Spicis sub-geminis ovatis, obtusis: culmo, foliisque setaceis strictis: seminibus tuberculatis.* *Savi Bot. Etr.* 2. *p. 19.\** (sub *S. filiformi*).

*S. setaceus ... semine non striato.* *Mich. N. Pl. G.* *p. 51.* *O. 2. n. 1, 3, 4.*

*In inundatis maritimis frequens: presso Ostia, etc.* *Ann. Floret Majo.*

*Culmi 1-6-pollicares et folia setacea. Spicæ ovatæ, solitariæ, vel binæ, raro ternæ parum infra culmi apicem, ebracteatae: glumæ ovatæ, mucronatæ fuscæ. Semen absque setis, subrotundum, leviter tuberosum, nec costatum.*

*Affinis Sc. setaceo L. a quo distinctus charactere fructus.*

*\* Nova appellatione donamus acutissimi auctoris nomine mutuato, cum alia jam extet species a cl: Vahllo *Sc. filiformis* nuncupata.*

(23) *CYPERUS.*

57. *ROTUNDUS.* *L.* Culmo triquetro basi folioso: umbella multifida, radiis sub-simplicibus involucro brevioribus: spiculis lanceolatis alternis; radicum fibrillis hinc inde in tuberculos ovatos inflatis.

*C. rotundus.* *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Roem. S. Veg.* 2.\* *C. olivaris.* *Targioni Mem. d. Soc. It. Vol. 13.* - *Savi B. Etr.* 2. *p. 29.* *C. rotundus vulgaris.* *C. B. Th.* 210. *cum ic.* - *Moris. H.* 3. *s. 8. t. 11. f. 1.* *C. rotundus odoratus parvus.* *Mich. N. Pl. G.* 45. *n. 6.*

*In sabulosis, vineis, hortis nimium frequens infestissima planta.* *Vulg. radichiella, sgarzella.* *Perenn. Floret Julio.*

*Tuberculis subovatis solidis odore aromatico radices indestructibiles perpetuantur.* *Culmus pedalis.* *Folia culmo*

longiora , carinata , superiore parte ad marginem scabra . Umbella 7-9-fida , pedunculis inæqualibus , nonnullis brevissimis , nudis , superius spicatis , rarius ramosis . Spiculae in singulo pedunculo 5-7 compressæ , lanceolatæ vel sub-ensiformes , solitariæ , interdum infimæ geminatae , subsessiles , bracteola ad insertionem instructæ . Paleae navicularia acutiusculæ , carina virides , margine albidae , dorso rubro-spadiceæ nitidæ .

In auctoribus sub hac specie citatis synonima nonnulla excludenda deprehendunt cl: Roem. et Sch. in S. Veg.

58. FLAVESCENS . L. Culmo triquetro basi folioso : involucro triphylio umbella 3-4-fida longiore ; spiculis oblongo-lanceolatis , alternis , confertis ; seminibus ovoideo-compressis ; radice fibrosa .

C. flavescentia . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Sagi B. Etr. 2. p. 28. - Roem. S. Veg. 2. C. minor pulcher panicula lata compressa sub-flavescente . Moris. H. 3. s. 8. t. 11. f. 37. C. minimus panicula sparsa sub-flavescente . Scheuchz. Agr. 385.

In aquosis , circa fontes . Sulla piazza di S. Pietro , etc. Perenn. Floret Junio , Julio .

Radix fibrosa . Culmi 4-12-pollicares et ultra , tenues glabri . Folia angusta , culmo subæqualia . Involueri foliola 3-4 umbella longiora . Umbellæ radii 3,4,5 breves , inæquales , simplices ; spiculae oblongo-lanceolatæ , alternatim in apice radii insidentes , confertæ , nec umbellatae , glumis obtusiusculis flavescentibus .

59. FUSCUS . L. Culmo triquetro basi folioso ; involucro sub-triphylio longissimo : umbella 3-multifida , spiculis linearibus confertissimis ; seminibus acute triquetris ; radice fibrosa .

C. fuscus . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 28. - Roem. S. Veg. 2. C. minor panicula sparsa nigricante . Moris. H. 3. s. 8. t. 11. f. 38. - Scheuchz. Agr. 384.

In aquosis , ad fossas communis . Ann. Floret sera æstate . Culmus semi-pedalis , pedalis , flaccus . Folia linearia . Involucrum 3-4-phylum longissimum . Umbella radiis 3 , saepius pluribus , inæqualibus brevibus , centralibus sub-nullis apice decompositis , spiculis numerosis confertissimis , lineari-acutis , ob paleas acutas ister se distinetas margine serratis . Palearum color nigricans , vel fusco-virens , margine et carina viridi .

60. MONTI . L. Culmo triquetro basi folioso : umbella multifida , radiis patentibus-paniculatis ; spiculis lineari-lanceolatis turgidiusculis , late imbricatis ; involucro umbella longiore : radice repente .

C. Monti . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC.

## TRIANDRIA MONOGYNIA.

*Syn.* - *Savi B. Etr. 2. p. 29.*\* - *Roem. S. Veg. 2. C. serotinus. Rothb. - Vahl. G. serotinus odoratus radice longa, panicula locustis latis ferrugineis compactis. Monti Cat pl. Agr. lon. Prod. t. 1. n. 2.* - *Scheuchz. Agr. p. 380.* - *Mich. N. Pl. G. 45. n. 9.*

In uidis, ad fossas, ripas communis. Perenn. Floret Mayo-Augusto.

Culmus 2-3-pedalis vel ultra, triqueter. Folia superius tantum scabra. Involucrum 3-4-phylum folio uno longissimo. Umbella 7-9-fida radiis compressis inaequalibus, superne paniculatis, nec umbelliferis, ramulis patentissimis, bracteola instructis. Spiculae compressæ, sed non complanatae; glumis obtusiusculis, rubro-spadiceis, dorso margineque albidis.

61. LONGUS. *L.* Culmo triquetro, inferne folioso; involucro longissimo: umbella multifida fastigiata, pedunculis elongatis nudis umbelliferis: spiculis lineari-lanceolatis compressis alternis: radice repente.

*C. longus. All. Ped. - Smith. Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn.* - *Savi B. Etr. 2. p. 30.*\* - *Roem. S. Veg. 2.*\* *C. odoratus radice longa, etc. Scheuchz. Agr. 378. t. 8. f. 12. C. radice repente odora, etc. Mich. N. Pl. G. 45. n. 4. t. 31.*

In fossis ubique. Vulgo: *paglia da sedia*. Perenn. Floret Junio-Ju'lio.

Culmus 3-5-pedalis, foliis carinatis, striatis, margine scabris. Involucrum 4-5-phylum inaequale, longissimum. Umbella 10-12-fida radiis primariis longis, inaequalibus nudis; umbellulae radii corymbosi, centralis brevissimus, nudi, simplices, vel iterum in umbellulam decompositi, involucellis 2-4-phylis brevibus. Spiculae valde compressæ lineari-lanceolatae, nitidae, paleis spadiceis, dorso et margine albo-virentibus.

## TRIANDRIA DIGYNIA.

*Sect. I. Flores paniculati, aut spicato-digitati: spiculae unifloræ.*

## 62) SACCHARUM.

62. RAVENNÆ. *Murr. Syst. Veg.* Panieula laxa, rachi lanata, floribus aristatis: foliis planis.

*S. Ravennæ. W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 1. p. 43.*\* *Erianthus Ravennæ. Palis. de B. - Roem. S. Veg. 2. Arundo farcta vallium Ravennæ. Zannon. Hist. 64. t. 24. - Moris. H. 3. s. 8. t. 8. f. 52. Gramen arundinaceum plumosum album. Scheuchz. Agr. 136. t. 3. f. 7. a, b.*

In maritimis inundatis. Presso Ostia, Castel-susano .... Perenn. Floret Julio.

Culmus 1-12-pedalis crassus alba medulla repletus. Panicula pedalis et ultra, candicans, holoserica pilis longis albis e pedunculis et basi calycum: valvae ealycinæ mucronatæ. corollæ glumæ in equales, minor arista terminali calyce longiore.

63. CYLINDRICUM. Enc. Panicula spicata cylindrica, floribus diandris, foliis convolutis, geniculis glabris.

S. cylindricum. W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savii Bot. Etr. 1. p. 44.\* Lagurus cylindricus. L. - All. Ped. Imperata arundinacea. Cyril. Ic. rar. Fasc. 2. p. 26. t. 11. - Roem. S. Veg. 2.\* Gramen tomentosum spicatum. Scheuch. Agr. 57. l. 2. t. 4. A.

In montibus calcareis. Presso Santo-Polo .... Perenn. Floret Junio.

Culmus bipedalis. Panicula spicata niveo-sericea: pili albi sericei longi e pedunculis et basi calycum. Valvae calycinæ et corollinæ acuminatæ, albo-scariosæ, margine ciliatæ.

(25) LAGURUS.

64. OVATUS. L. Spica ovata villosa. Savi B. Etr. 1. p. 90.\*

L. ovatus. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Roem. S. Veg. 2. Gr. alopecuroides molle, spica incana. Barr. ic. 116. n. 1, 2. Gr. spicatum tomentosum, longissimis aristis donatum. Scheuchz. Agr. 58. t. 2. f. 4. B, C.

In sterilioribus, ad vias communis. In copia grande sul Testaccio, etc. Ann. Floret Aprili, Majo.

Culmus pedalis. Spica densissima ovata, albo-villosa.

(26) STIPA.

65. PENNATA. L. Aristis longissimis, plumosis, basi nudis.

St. pennata. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Sacri 2. Cent. p. 28. - Roem. S. Veg. 2.\* Gr. sparsum pennatum majus. Barr. ic. 46. Gr. spicatum aristis pennatis. Scheuchz. Agr. 153. t. 3. f. 13. b.

In siccis montanis. A Santo-Polo in copia ... Perenn. Floret Junio.

Culmus bipedalis: folia involuto-setacea. Corollæ valva exterior pilosa, arista terminali pedem circiter longa pilis albis sericeis pinnata, inferius nuda torta.

66. CAPILLATA. Pollich. Aristis longissimis curvatis nudis: foliis convoluto-juncea rigidulis intus sub-pubescentibus: panicula laxa demum rufescente.

St. capillata. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Roem. S. Veg. 2. St. juncea 3. Lam. Fl. Fr. St. aristis nudis flexuosis, calyce semine longiori. Hall. Hely. n. 153.

In montosis sterilioribus. Presso Tivoli .... Perenn. Fl. Julio.

Culmus erectus 2-pedalis. Panicula 4-pollicaris laxa, pedunculis ramosis. Calix valvis subæqualibus lanceolato-oblongis, demum rufescens. Corollæ gluma exterior dorso 5-nervia, nervis margineque villosis, in aristam longissimam nudam superne tortilem producta.

67. ARISTELLA. *Syst. Nat.* Aristis nudis (rectis) flosculo vix duplo longioribus: foliis superioribus planis. *DC.*  
*Syn.*

*St. aristella. All. Auct. Fl. Ped. 99. t. 2. f. 4. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Roem. S. Veg. 2. Agrostis bromoides. L. Mant. - Gouan. ill. 3. t. 1. f. 3.*

In montium viis aridis, ad sepes. *Sulle falde del Monte Gennaro, a Palombara ... Perenn. Floret Junio.*

Culmus 2-3-pedalis tenuis. Folia angusta convoluta, superiore planiuscula. Panicula subspicata, stricta, pedunculis sub-solitariis, bi-tri-floris. Calix valvulis sub-æqualibus oblongis, acuminatis, nervosis, margine scariosis. Corollæ gluma exterior acuta, apice aristata, aristulo flosculo sub-duplo longiore; interior membranacea, valde brevior.

(27) MILIUM.

68. EFFUSUM. *L.* Panicula diffusa; floribus ovatis, dispersis, muticis. *Roem. S. Veg. 2.*

*M. effusum. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Savi B. Etr. 1. p. 28. Agrostis effusa. DC. Fl. Fr. et Syn. Gramen sylvaticum panicula miliacea sparsa. Morris. H. 3. s. 8. t. 5. f. 10. - Scheuchz. Agr. 133.*

In nemoribus. *Presso Albano, Palazzuola, Genzano ... Perenn. Floret Majo.*

Culmi erecti 3-4-pedales. Folia plana, striata, retrorsum scabra; vaginæ glabræ, ligula oblonga, lacera. Panicula ramis inæqualibus, semi-verticillatis, capillaribus, patentibus, etiam divaricatis, ramulis brevibus, Flores ovati sub-turgidi; glumis calycinis seabinusculis, trinerviis, coriaceis, obtusis, viridibus vel viridi-purpureo-scentibus: corolle glumæ nitidæ, sub-corneæ, acutiusculæ, pallidæ, altera latiore alteram amplectente.

(28) AGROSTIS.

69. MILIUM-COMOSUM. *Poir. Enc. Suppl. 1. p. 257.* Panicula maxima nutante laxa: floribus numerosis, ovatis, levibus, aristatis; aristis rectis corolla sub-duplo longioribus: foliis glabris, superne seabinusculis.

*A. miliacea. Savi B. Etr. 1. p. 31.\* (ex descr. et spec. aucterioris). - Selast. R. I. L. Fasc. 2. p. 23. Piptatherum comosum. Roem. S. Veg. 2. Gr. miliaceum majus, nutante panicula. Barr. ic. 754. Agrorum venti spica, et gr. agrorum. Lob. ic. 3. Gr. agrorum Lobelii. J. B. H. 2. p. 461.*

In muris, montibus saxosis communis. Perenn. Floret Julio.

Culmus 3-4-pedalis, perennans. Panicula 1-2-pedalis patens, ramis verticillatis, filiformibus, ramosis, scabris. Calix ovatus, turgescens, valvis subæqualibus lanceo-lato-acuminatis, lævibus, dorso subviolaceis. Corolla minor gluma latiore aristata, arista gluma sua duplo et ultra longiore.

Huc forte spectat auctorum plurium Agrostis miliacea. Vera Linnaei Agr. miliacea dicitur differre arista breviore calycem æquante. V. Roem. et Sch. l. c. Nonne unius speciei varietates considerandæ?

70. VULGARIS. Smith Br.\* Paniculæ laxifloræ ramulis in anthesi patentibus, divaricatis, capillaribns: calycibus subæqualibus; petalis (sæpius) muticis; interiore dimidio breviore, retuso. Bertol. Rar. It. Pl. Dec. 3. p. 7.\* - id. Opusc. Scient. Bol. Fasc. 1. p. 58.\*

a. Bert. l. c. Panicula capillari erecto-patente, floribus muticis.

A. vulgaris a. Smith Br. - W. En. H. Ber. - Pers. E. - Lois. Notic. 14. - Savi B. Etr. 1. p. 32. - Roem. S. Veg. 2. A. capillaris. Enc. - Leers t. 4 f. 5., et pl. auctor. Gr. montanum panicula spadicea delicatiore. Scheuchz. Agr. 129. t. 3. f. 5. B.

b. Culmo eretto vel adscendente: flosculis aliis muticis, aliis aristatis. Bert. l. c.

A. vulgaris b. Smith l. c. - Savi l. c. A. vulgaris γ. Roem. et Sch. l. c. A. varia. Host. Gr. Aust. 4 p. 55. t. 57. A. radice repente, panicula delicata spadiceo-viridi. Scheuchz. Agr. 127. t. 3. 5. A.

x. Culmo decumbente, sæpe ad genicula radicante: (paniculæ ramis hispidis), flosculis muticis. Bert. l. c.

A. vulgaris δ. Roem. et Sch. l. c. A. alba. L. Sp. pl. - Smith Br.\* - Balbis Fl. Taur. 15. - Lois. G. - Roem. S. Veg. 2. ? A. diffusa et stolonifera. Hos. Gr. aust. 4. t. 55, 56.

Var. α vulgatissima in arenosis, collibus, ad oras nemorum. β Nei quarti di Marino intorno alla sorgente dell' acqua solfata, e sulla strada postale d'Albano in copia, etc. κ in demissioribus: intorno agli stagni d' Ostia, etc. Peregrin. Floret Junio-Julio.

„ Radix e fibris numerosis, subinde repens. Culmi striati, „ vel toti erecti, vel superiore parte tantum: folia angustæ, gustæ linearia, scabra: stipula variæ longitudinis obtusa, erosa: panicula alternatim semi-verticillata, ramulis laxe floriferis, inæqualibus, inferne nudis, ante et „ post anthesim strictissimæ, in anthesi patenti-divaricatis, trichotomis, dichotomis, scabriusculis (in α minus, in κ hispidis): calycis glumæ subæquales, acutæ, „ muticæ, sæpius carina scabra (in κ scaberrimæ, fere serrato-ciliatæ), lineam circiter longæ: petalum ma-

70.  
aprilie 1801  
h. Magg. 1801

- „ jus calyce paullo brevius : color paniculae nunc viridi-  
„ purpurascens nunc pallide-virens . „ Bertol. l. c.
71. STOLONIFERA . *L.* Panicula verticillata, ramulis dense flo-  
riferis ; calycibus undique pubescentibus .
- A. stolonifera . Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. -  
DC. Syn. - Roem. S. Veg. 2. A. verticillata . Villars  
Delph. - W. Sp. - Bert. R. It. Pl. Dec. 3. p. 10.\* A alba  
β. verticillata . Pers. E. Gr. caninum supinum minus .  
Scheuchz. Agr. 128., et Gr. radice repente panicula den-  
sa , spicata , spadiceo-viridi , etc. Ibid. p. 130.
- In humidis pratis , ad vias , juxta fontes communis . Pe-  
renn. Fl. æstate .
- Radix ramosissima . Culmi basi repentes , geniculis infimis  
sæpius radicantibus , etiam 12-15-pollicares . Folia plana ,  
nervosa , scabra , apice mucronata : ligula lacera . Pan-  
icula ramis verticillatis ab insertione ad apicem dense flo-  
riferis , inferioribus remotiusculis , superioribus approxi-  
matis , coarctatis . Flores lineari-lanceolati . Calycis val-  
vae æquales , muticæ , undique pubescentes , nec carina  
tantum scabræ , sæpe purpurascentes . Corollæ glumæ  
breviores , inæquales , muticæ .
- (29) SANTIA .
72. PLUMOSA . Savi Mem. d. Soc. Ital. T. 8. P. 2. p. 479. Pa-  
nicula coarctata , subspicata : calycinis valvis sub-pube-  
scentibus , margine glabris , sub apice aristatis .
- S. plumosa . Savi 2. Cent. p. 21. Polypogon Monspeliense .  
Desf. Atl. 1. p. 67. - W. Act. Nov. Soc. Nat. Ber. v. 3. -  
Pers. E. - DC. Fl. Fr. - Lois. G. - Roem. S. Veg.
- a. Paniculæ ramis divulsis . Savi l. c.
- Alopecurus monspeliensis . L. Phleum crinitum . Schreb. gram.  
151. t. 20. f. 3. - Smith Br. 1. Agrostis panicea α. W. Sp.  
Polypogon Monspeliense β. Auct. citat. Gr. alopecurum  
majus spica virescente divulsa , pilis longioribus . Barr.  
ic. 115. f. 2. - Scheuchz. Agr. 155. Alopecurus altera an-  
glica maxima paludosa , etc. J. B. H. 2. p. 474. - Moris.  
H. 3. p. 19. s. 8. t. 4. f. 8.
- β. Paniculæ ramis adpressis . Savi l. c.
- Alopecurus paniceus . L. Cynosurus paniceus . Sp. pl. ed. 1.  
Phleum crinitum β. Smith l. c. Agrostis panicea β. W. Sp.  
Polypogon Monspeliense β. Auct. cit. Gr. alopecurum ma-  
jus spica virescente divulsa . Barr. ic. 115. f. 1. Gr. alo-  
pecurum minus spica longiore . C. B. P. 4. - Scheuchz.  
Agr. 154.
- In pratis maritimis uidis , α præsertim frequens . In copia  
ad Ostia , etc. Ann. Floret Junio , Julio .
- Culmus semi-pedalis , sesqui-pedalis . Panicula 2-6 - polli-  
caris , viridi-lutescens , plumosa , lobata . Calycis valva  
pilis minutissimis conspersæ , parum infra apicem aristata .

tæ . Corollæ glumæ inæquales , major parum infra apicem emarginatum aristata , minor acuminata , mutica . -Varietas β promiscue cum specie venit ; eaque minor et tenerior , nulla autem in floribus differentia , monente etiam Smithio : hinc male Scheuchzerus *folliculum* ( corollam ) muticum illi tribuit .

## (30) CRYPSIS .

73. ACULEATA . Ait. Kew. Culmis ramosis compressis : paniculis subspicatis , hæmispheoericis , involucro foliaceo cinctis ; floribus 2-andris . Schrad. - Roem. S. Veg. 2.

C. aculeata . Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Saci B. Etr. 1. p. 41. C. aculeata α. W. Sp. Schoenus aculeatus. L. Sp. Pl. Schreb. Anthoxanthum aculeatum . L. Suppl. 89. Agrostis aculeata. Scop. Carn. - All. Ped. Gramen album capitulis aculeatis italicum . Scheuchz. Agr. 85. - Moris. H. 3. p. 195. s. 8. t. 5. f. 3.

In maritimis humen tibus . Ad Ostia presso il ponticello .... Bienn. Floret æstate .

Culmus 6-12-pollicaris procumbens ramosus : folia rigido-pungentia . Spicæ capitatæ , sub-rotundæ , foliis vaginatis , brevibus , pungentibus , horizontalibus involucratæ , sæpe purpurascentes .

## (31) ALOPECURUS .

74. AGRESTIS . L. Culmo erecto , superne seabriuscule : panicula spicata , cylindracea , attenuata ; calycibus nudisculis , valvis basi connatis ; corolla glabra .

A. agrestis . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Roem. S. Veg. 2. Phleum flavum. Scop. Carn. Gr. typhinum plantaginis spica , aristis geniculatis . Barr. ic. 699. f. 2. Gr. spicatum , spica cylindracea tenuissima longiore . Scheuchz. Agr. 69. t. 2. f. 16.

In pratis , pascuis communis . Ann. Floret Majo .

Culmus 1-2-pedalis . Spica sesqui-2-pollicaris cylindrica attenuata , viridi-spadicea vel purpurascens . Calycis valvae lanceolato-acutæ , basi connatæ , carina tenuissime ciliatae . Corolla glabra calyce parum major , basi aristata ; arista geniculato-recurva , inferne lævis .

75. UTRICULATUS . Pers. E. Racemo spicato , ovato ; valvis calycinis compressis , angulo dorsali callosis , carina pilosis : arista articulata : vagina superiore inflata utriculata .

A. utriculatus . Roem. S. Veg. 2. Phalaris utriculata . L. - All. Ped. - Scop. Del. Ins. 1. p. 28. t. 12. - W. Sp. - Lois. G. - DC. Syn. Tozzettia pratensis . Saci Mem. d. Soc. It. T. 8. P. 2. p. 477. - id. 2. Cent. p. 18.\* - Targ. Istit. 2. p. 74. Gr. pratense spica purpurea ex utriculo prodeunte , etc. Scheuchz. Agr. 55. t. 2. f. 3. B, D, G, H.

In pratis , pascuis vulgaris . Ann. Floret Aprili .

Culmus 1-sesqui-pedalis. Spica pollicaris ovata ex albo viridi, subinde spadiceo intermixto, e vagina superiore utriculata florescentiae tempore erumpens. Calyx subrhomboidalis valvis triangularibus, angulo dorsali calloso. Corolla vix longior, valvis hinc longitudinaliter connatis, lanceolato-acutis: arista basilaris medio articulata.

## (32) BECKMANNIA.

76. ERUCÆFORMIS. Host. Gr. 3. p. 5. t. 6. Panicula patente; spiculis linearibus distichis 30-40-floris, fructiferis adpressis: radice bulbosa. Host. l. c. - Ten. Fl. Neap. 1. p. 16.

B. erucæformis. Roem. S. Veg. 2.\* Phalaris erucæformis. L. - Pers. E. - Savi B. Etr. 1. p. 37. Cynosurus erucæformis. Ait. Kew. - W. Sp. Gr. palustre locustis erucæformibus. Barr. ic. 2.

In locis humidis, fossis. Nella Macchia d'Ostia, presso Albano .... Perenn. Fl. Majo.

Culmus 1-4-pedalis. Panicula sub-semipedalis ramlis inferioribus ternis, medio longiore, superioribus solitariis, omnibus secundis, patentibus, fructiferis adpressis. Flores uni-laterales. Calix 1-2-florus valvis obtusis, concavis, nec compressis carinatis. Corolla longior gluma altera acuminata.

## (33) PHALARIS.

77. CANARIENSIS. L. Panicula spiciformi ovata: valvis calycinis navicularibus carina alata integra: corolla valvulis binis accessoriis.

Ph. canariensis. Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Roem. S. Veg. 2. Ph. major semine albo. C. B. P. 28. - Scheuchz. Agr. 52. - Moris. H. 3. p. 186. s. 8. t. 3. f. 1.

In pratis, pascuis sponte communis. Ann. Floret Majo. Culmus 2-3-pedalis, striatus, geniculis fuscis. Folia striata, vaginis ventre inflatis. Spica ovata densa semipollinæ longa. Calycis valvae membranaceo-alatae, albidae striis binis viridibus utrinque pictæ. Corella 4-valvis: valvulae duæ exteriores lanceolatæ minutæ, calyci alternae; interiorum major sericeo-villosa minorem glabram arcte amplectens. Semen ovato-compressum, nitidum.

78. NODOSA. L. Panicula spiciformi oblongo-ovata; valvis calycinis naviculari-lanceolatis, carina integra vix alata: corolla villosa, valvula tertia accessoria: radice nodosa; culmo adscendente.

Ph. nodosa. Marsch. a Bieber. - Silth. Fl. Græc. - Roem. S. Veg. 2. Ph. perennis major, radice nodosa. Moris. H. 3. p. 187.

In pascuis nonnullis ad urbis occidente. In copia presso l'Osteria di Ponte Galera, e ne' luoghi vicini, etc. Perenn. Floret Junio, Julio.

Radix nodis tumentibus , fibrisque donata . Culmi plures 3-5-pedales , etiam altiores , basi geniculati , adscendentes internodiis distantibus , nodis zona ampla fusca notatis , superne nudi . Folia plana , striata acuta , rigidula , margine scabra . Vaginæ striatæ , suprema leviter ventricosa . Ligula ampla , bifida , lacera . Panicula spiciformis lobata , oblongo-ovata , fere lanceolata , obtusa , sesquipollucaris vel ultra , tota pallida . Calix oblongus , compressus , glaber ; valvis navicularibus lanceolatis , acutis carinatis , carina vix alata , integra , æquali , scabra ; nervis utrinque binis virescentibus , altero juxta marginem , altero proprius carinam . Corolla glumis binis villoso-sericeis , altera majore ovato-acuta , altera angustiore lanceolata , ad cuius basim extus valvula tertia accessoria minima subulata .

Conf. Ph. bulbosa albo semine . Scheuchz. Agr. 53. cui auctori forte valvula illa minima in conspectum non venit .

79. MINOR . Retz. Panicula spiciformi oblonga : valvis calycinis navicularibus carina alata dentata : corolla villosa , valvula tertia accessoria .

Ph. minor . W. En. H. Ber. Ph. aquatica . W. Sp. - Schrad. Ger. - Pers. E. - Lois. G. add. Ph. aquatica et Ph. communata . Roem. S. Veg. 2. Gr. typhinum phalaroideum minus bulbosum aquaticum . Barr. ic. 700. f. 2. Ph. major semine nigro . Raii H. 1248. (ex descr.) . Gr. phalaroides angustifolium sub-glaucum spica oblonga . Scheuchz. Agr. 54. (ex descr.) .

In pascuis frequens : locis aquosis inundatis non gaudet . Ann. Floret Majo .

Radix fibrosa , quandoque nodis ad culmi basim incrassatis , approximatis . Culmi 2-3-pedales , superne nudi . Folia plana , striata , acuta , minus rigida , vaginis laxieusculis . Ligula magna , alba , obtusa , bifida . Panicula spicata , ovato-oblonga , obtusa , sesquipollucaris , viridis , ex pallido , et saturatiore colore variegata . Valvae calycine naviculares , semi-ovatae , acuminatae , carina prominenti membranaceo-alata dentata , dentibus 2-3 , sèpius infra apicem truncata , margine membranacea , dorso pallidae striis utrinque binis viridis . Corolla ut in præcedente .

80. AQUATICA . L. Panicula spiciformi cylindracea ; valvis calycinis navicularibus carina alata dentata : corolla bivalvi sub-glabra : radice bulbosa .

Ph. bulbosa . W. Sp. - Lois. Fl. Gall. Add. - DC. Fl. Fr. Suppl. - DC. Syn. - Roem. S. Veg. 2. Ph. tuberosa . Pers. E. Gr. typhinum phalaroides majus bulbosum aquaticum . Barr. rar. 1200. t. 700. f. 1. Gr. phalaroides hirsutum spica longissima . Buxb. Cent. 4. p. 30. t. 53.

In pascuis et secus fossas communis . Perenn. Floret Majo ,

Radices bulbosæ . Culmi 2-3-pedales et ultra . Folia angusta , acuta , striata , minus rigida : vaginæ laxiusculæ ; ligula membranacea obtusa . Panicula spiciformis , cylindracea , pallide-viridis , sub-violaceo , vel fusco colore variegata . Calix , dum clansus , obovatus : valvae naviculares , carina prominenti , membranaceo-alata , dentata , dentibus pluribus , apice acuminatae , pallidæ , superius sub-violaceæ , utrinque nervis binis viridibus . Corolla oculo armato vix manifeste pilosa , glumis binis inæqualibus , valvula accessoria nulla .

Conf. Ph. bulbosa semine albo . Park. Th. 2. - Raii H. 1249. Plantam hanc nostram cum Ph. bulbosa L. conuenire primum suasus , ad eam speciem synonimon Barrelieri evidenter huic spectans amandandum mouuit alter nostrum in suo Roman. Plant. Fasc. 1. p. 62. Verum cum diversa profectores Ph. bulbosa L. hodie demonstretur , et minus fauste Willdenowium in Sp. Pl. , auctoresque plures eas conjunxisse apparent e recentiorum scriptis et præsertim e el: Roemer et Schultesii Syst. Veg. 2. p. 381. , quo genuinam Ph. bulbosam L. sub nomine Acnodontonis Bellardi afferunt , dubium nec quidem restat quod icon Barrelieri ( qui ad Tyberim specimina legebat ) , nec non Buxbaumii illa superius citata , ambo perfecte speciem nostram reddentes veram Ph. aquatica L. sibi vindicent , quacum sapientissimo auctore associate fuerant . Præterea quemnam proprium Phalaridis minoris Retzii indigitavit characterem Linnæus , de Phalaride aquatica verba faciens , qui Botanicos congruentiam harum specierum doceret ?

81. PARADOXA . L. fil. Dec. 35. t. 18. Panicula spicata oblonga obtusa : calycibus sterilibus erosis pluribus ; fertilibus lanceolatis , apice longe acuminatis , carina alata truncata .

Ph. paradoxa . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 1. p. 36. - Roem. S. Veg. 2.\* Ph. præmorsa . Lam. ill. 164. Gr. phalaroides spica brevi reclinata ex utriculo prodeunte . Moris. H. 3. p. 187. s. 8 t. 3 f. 6. In pratis et inter segetes frequens . Ann. Floret Majo , Junio .

Culmus 1-2-pedalis vel ultra , inferne ramosus geniculatus . Spica 1-2- pollicaris , oblongo-ovata , obtusissima , lobata , ante florescentiam vagina foliorum supremâ ventricosa involuta . Florum fertilium calyx valvis acuminatis carina infra apicem alata , ala membranacea , truncata , acuta , margine scabra . Flores plurimi in ramulis steriles , minores , calyce apice præmorsa , forma varii .

82. SUBULATA . Savi Giorn. Pis. T. 4. p. 225. f. 1, 2, 3. Spica subulata : calycibus ovato-acutis , valvis navicularibus

compressis , minime alatis , dorso asperis trinerviis ,  
margine membranaceis .

Ph. subulata . *Savi B. Etr. 1. p. 35.*\* Phleum tenue . *Schrad.*  
*Germ. Phleum Bellardi . W. En. H. Ber.* (utr. excl. syn.).  
Achnodonton tenue . *Roem. S. Veg. 2.* Gr. typhinum longissima spica , molli albicante . *Barr. Ic. 14 f. 1.*

In pratis , collibus , viis vulgaris . Ann. Floret Junio .

Radix fibrosa , quandoque ad culmi ortum incrassata . Culmi sub-filiformes , tenaces , pedales , inferne sub-ramosi ; superne nudi , nitidi , rubro-spadicei . Panicula spicata , densa , cylindrica , tenuis , elongata , 1-3-pollicaris : valvae calycinæ navicularares , albideæ , mucrone brevi terminatæ , nervis 3 viridibus , lateralibus binis , tertio carinæ loco ; tota dorsi superficie aculeis minutissimis scabre , margine membranaceæ . Corollæ valvula exterior similiter scabra , apice denticulata .

83 ARENARIA . *Huds.* Spica oblongo-lanceolata , obtusa : calycinis valvis naviculari-compressis lanceolatis , acuminatis , cariua ciliatis : culmis basi ramosis .

Ph. arenaria . *Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois G. - Savi B. Etr. 1. p. 54.* - DC. Syn. Phleum arenarium . L. - All. Ped. Grypesis arenaria . Desf. Atl. Chilochoea arenaria . Roem. S. Veg. 2. Gr. typhinum maritimum minus . Plak. phyt. t. 53. f. 8. - Scheuchz. Agr. p. 65.

In maritimis pratis frequens . Presso Ostia , etc. Ann. Floret Junio .

Radix fibrosa . Culmi 3-pollicares , pedales , superne nudi , amethystini . Vaginae laxæ , suprema ventricosa . Spica ovato-lanceolata apice obtuso , basi attenuata . Calix , clausus , lanceolatus , valvis compressis apice breviter acuminatis trinerviis , carina superius ciliis validis instructa , margine scaniosa apicem versus sub-ciliato . Corolla minor inclusa ,

(34) PHLEUM .

84. PRATENSE . *Huds.* Spica cylindrica : calycinis valvis retuso-truncatis , nervo dorsali in mucronem calice breviorem producto ; carinæ ciliis rigidis .

Phleum pratense . *Smith Br.\* - Savi B. Etr. 1. p. 38.\* - Roem. S. Veg. 2.*

a. *Huds. - Smith l. c. - Savi l. c.* Spica longissima , radice fibrosa .

Phleum pratense . L. - All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Gr. typhoides maximum spica longissima . C. B. Prod. 10. cum ic. - Moris. H. 3. s. 8. t. 4. f. 2. - Scheuchz. Agr. 60. Gr. cum cauda muris longa majus . J. B. H. 2. p. 472.

b. *Huds. - Smith l. c. - Savi l. c.* Spica mediocri , radicee incrassata .

Gr. typhoides asperum primum. C. B. P. 4. - Scheuchz.  
Agr. 61. Gr. cum cauda muris minus. J. B. H. 471.

Hac Varietas

7. Huds. - Smith l. c. - Savi l. c. Spica brevi, radice bulbosa.

Phleum nodosum. L. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC.

Syn. Ph. bulbosum pl. auctorum. Gr. typhoides asperum alterum. C. B. P. 4. - Scheuchz Agr. 62. Gr. typhoides minus nodosum. Moris. H. 3. s. 8. t. 4.f. 3. Gr. cum parva cauda muris, radice nodosa repens. J. B. H. 2. p. 472.

In pratis humidis ad montium radices:  $\alpha$  alle falde del Monte Gennaro, etc.  $\beta$  et  $\gamma$  passim in argillosis, collibus, pascuis. Perenn. Floret Junio, Julio.

Culmi altitudine varii, erecti, superne nudi. Spica cylindrica, obtusa, densa, in  $\alpha$  etiam 4-pollicaris, in  $\beta$  et  $\gamma$  gradatim brevior usque ad figuram ovalem. Calix compressus valvis truncato-retusis, margine membranaceo albo, carina ultra medium ciliata, ciliis paucioribus validis, in mucronem brevem seabrum, non nihil divergentem producta. Corolla 2-valvis, inclusa, antheras violaceis, in  $\beta$  albis.

85. MICHELII. All. Ped. Spica elongata, cylindrica, superius attenuata, hirsuta: calycinis valvis oblique truncatis, nervo dorsali producto cuspidatis, carina ciliatis.

Ph. Michelii. Roem. S. Veg. 2. Phalaris Michelii. Savi Giorn. Pis. 4. p. 250. f. 2. - id. Bot. Etr. 1. p. 36. Phalaris alpina. DC. Fl. Fr. n. 1489. - id. Syn. - Lois. G. Phleum phalarideum. Villars. Delph. 2. p. 60. Gr. typhinum junceum perenne. Barr. ic. 21. f. 2. Gr. typhoides alpinum spica graciliore delicata et villosa. Scheuchz. Agr. 65.

In agris, viis communis. Perenn. Floret Junio.

Culmus glaber, striatus, 1-2-pedalis vel ultra, e radice bulbosa. Folia brevia; vaginæ laxiusculæ; ligula obtusa mucronata. Panicula spicata densa cylindrico-attenuata, lobata, 2 3-pollicaris. Calycinæ valvæ compressæ, carina rectiuscula fere lineares, albidæ, margine membranaceo, superne oblique tantum truncato et continuo cuspidi rectæ e dorso productæ, cujus ope calyx etiam clausus bicornis evadit. Nervum dorsale viride pilis longiusculis patentibus ciliatum. Corolla 2-valvis inclusa.

(35) TRAGUS.

8 i. RACEMOSUS. All. Ped. Panicula simplici coaretata spiciformi.

Tr. racemosus. DC. Syn. - Roem S. Veg. 2.\* Tragus. Hall. Helv. 1413. Cenchrus racemosus. L. - Lois. G. Cenchrus linearis. DC. Fl. Fr. Lappago racemosa. W. Sp. - Pers. E. Gr. caninum maritimum spica echinata. Scheuchz.

*Agr. 76. Gr. caanum maritimum spicatum echinatis glu-*  
*mis. Barr. ic. 718.*

In collibus , siccis , plateis non rarus . *Sul Monte della Croce di Tivoli ; sulle piazze del Quirinale , del Vaticano ... Ann. Floret Julio.*

Culmus semipedalis ramosus . Panicula coarctata , ramulis 3-5-floris . Valva calycis exterior nervosa , nervis uncinate-aculeatis , semen caucalidis referens .

## (36) PANICUM .

A. Floribus involucre setoso suffaltis .

( *Setaria . Palis. de Beauv.* ).

87. VERTICILLATUM . L. Panicula spiciformi cylindrica : involucellis aristaeformibus deorsum hispidis . *Savi B. Etr. 2. p. 39.*

P. verticillatum . *All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Setaria verticillata. Roem. S. Veg. 2.\* Gr. panicum spica aspera . Scheuchz. Agr. 47. - Moris. H. 3. s. 8 t. 4. f. 11.*

In hortis , cultis , ambulacris commune . Ann. Floret aestate .

Panicula elongata subverticillata . Racemuli multiflori in singulo verticillo circiter 4. Setæ sub-binæ ad quemvis florem , rigidæ , denticulato-hispidae , dentibas reversis .

88. VIRIDE . L. Panicula spiciformi cylindrica : involucellis aristaeformibus sursum hispidis ; seminibus minutissime muricatis . *Savi B. Etr. 2. p. 40.*

P. viride . *All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. P. crus-galli . Fl. Dan. t. 852. Setaria viridis . Roem. S. Veg. 2.\* Gr. panicum , sive panicum sylvestre spica simplici . Scheuchz. Agr. 46. - Moris. H. 3. p. 139. s. 3. t. 4. f. 10.*

In hortorum ambularis , ad vias ubique : vulgo *panica-strella* . Ann Floret tota aestate .

Culmus pedalis . Panicula spiciformis cylindrica . Pedicelli 2-5-flori . Setae rigidulae , sub-quaternae , hispidae aculeis sursum spectantibus . Semina minutissime muricatae .

89. GLAUCUM . L. Panicula spiciformi cylindrica : involucellis mollibus sursum hispidis : seminibus tranverse undulato-rugosis . *Savi B. Etr. 2. p. 40.*

P. glaucum . *All. Pet. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Biv. Sic. Cent. 1. p. 63. Setaria glauca . Roem. S. Veg. 2. Panici effigie gramen simplici spica . Lob. ic. 13.*

In cultis , vineis , viis montium praesertim frequens . Ann. Floret aestate .

Herba pallida . Culmus pedalis vel minor . Panicula spiciformis sub-ovata vel cylindrica lutescens . Pedicelli 1-2-flori . Setae plures , molliusculae , longae , hispidae aculeolis

sursum spectantibus. Semina transversim rugosa , nec muricata .

B. Calycis valvulis acutis , hirtis , flosculi incompleti exteriore similiter hirta , acuminata vel aristata.

( *Echinochloa* . P. de Beauv. )

90. CRUS-GALLI . L. Racemis spicatis alternis conjugatisque , sub-divisis : spiculis muticis vel aristatis , hispidis : rachi sub-quinque-angulari . Saci B. Etr. 2. p. 41.

P. crus-galli . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Biv. Sic. Cent. 1. p. 64. *Echinochloa crus-galli* . Roem. S. Veg. 2. Gr. paniceum spica divisa . Moris. H. 3. s. 8. t. 4. f. 15, 16. - Scheuchz. Agr. 48, 49.

In cultis , ad vias solo humido haud infrequens . Ann. Floret Junio .

Culmi 1-sesqui-pedales . Rachis 3-5-angularis , angulis scabra , setis longis ad ramorum basim . Spiculae biflorae . Calix valvis binis valde inaequalibus hispidis . Flosculus hermaphr. calycem aequans bivalvis cartillagineus ; neuter gluma exteriore calycinae majori simili , hispida , nervo dorsali in muerontium , vel in aristam longitudine admodum variam producto .

(37) DIGITARIA .

91. SANGUINALIS . Scop. Carn. Spicis digitatis erecto-patulis sub-quaternis , basi interiore nodosis : floribus geminatis ; calycinis valvis margine pubescentibus : vaginis fotiisque pilosis .

D. sanguinalis . All. Ped. - Pers. E. - W. En. H. Ber. - Roem. S. Veg. 2. *Panicum sanguinale* . L. - W. Sp. - Smith Br.\* *Dactylon sanguinale* . Villars Dclph. *Syntherisma vulgare* . Schrad. - Lois. Notic. p. 12. *Paspalum sanguinale* . Enc. - DC. Syn. Gr. dactylon folio latiore. Scheuchz. Agr. 101. t. 2. f. 2. 9. h. *Ischaenum gr. sanguinarium* . Tabern. ic. 222.

Communis in areis domuum , ad vias . Ann. Floret Junio , Julio .

Radix fibrosa . Culmi decumbentes pedales . Folia uti et vaginæ papilloso-pilosæ . Spicae digitatae erecto-patentes ; rachis compresso-alata , basi interius nodosa . Flores biserialis , secundi , geminati altero pedicellato . Calix valvis binis inaequalibus , corollæ adpressis , exteriore concava valide trinervia ad ejus basim squamula cordata minutissima oculo nudo male conspicua , quandoque nec armato . Corolla calyce vix longior , glumis acuminatis , durusculis .

(38) CYNODON .

92. DACTYLON . Pers. Spicis digitatis patentibus sub-quaternis , basi interiore villosis : floribus solitariis sessilibus : calyce patentissimo scabro : foliis margine ciliatis ,

**C.** dactylon. *W. En. H. Ber.* - *Roem. S. Veg.* 2.\* *Panicum dactylon*. *L.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Lois.* *G. Digitaria dactylon*. *Scop. Carn.* - *All. Ped.* *Paspalum dactylon*. *Enc.* - *DC. Syn.* *Gr. crucis sen cruciatum tetradactylon*. *Barr. ic. 753*, 1. *Gr. dactylon cum radice repente*, sive officinarum. *Scheuchz. Agr.* 154. *t. 2.f. 11. i.* *Gr. dactylon majus*. *Zannich. Ven.* 117. *t. 192.*

Ubique ad vias, plateas, in cultis. Vulgo: *gramigna*, *gramiccia*, *erba canina*. Perenn. Fl. Junio, Julio.

Radix repens longissima. Culmi decumbentes, tenues, 2-4-pollicares. Spicae digitato-patentes, ternae-quinae. Rachis compresso-augulata, basi interius villosa. Flores secundi biseriales, seriebus approximatis sub-contiguis, solitarii, purpurascens. Calix valvis binis patentibus lanceolatis parum inequ alibus, margine scariosis, carina denticulata. Valvula accessoria nulla. Corolla calyce longior nitida.

*Sect. II. Flores paniculati. Spiculæ 2-multi-floræ.*

(39) **AIRA.**

**A.** Calice bi-(rarius 3-)floro, floculis longiore: corollis aristatis, arista geniculata.

93. **CARYOPHYLLEA.** *L.* Panicula divaricata, ramis trichotomis; flosculis calyce minoribus; arista geniculata calycem excedente: foliis setaceis, ligula lanceolata acuta. *W. En. H. Ber.*

**A. caryophyllea.** *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers.* *E.* - *Lois.* *G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 1. *p. 56.* - *Fl. Ticin.* 1. *p. 39.* - *Roem. S. Veg.* 2.\* *Gr. phalaroides sparsa panicula minimum angusti-folium*. *Barr. ic. 44. f. 1.* *Gr. paniculatum minimum molle*. *Scheuchz. Agr.* 215. *t. 4. f. 15.*

In glareosis, arenosis, muris vulgaris. Ann. Floret Majo. Exigua tenuissima planta culmo rarius 6-8-pollices elato. Panicula laxa ramis capillaribus trichotomis. Flores parvi, calyce nitido, valvis acutis. Flosculi bini; uterque sessilis, basi pilosus, et infra medium glumae exterioris aristatus, arista geniculata calycem excedente.

**B.** Calyce 2-floro flosculis longiore: corollis aristatis, arista clavata infra medium stellato-nodosa.

*(Corynephorus. P. de Beauv.).*

94. **CANESCENS.** *L.* Foliis setaceis, summo spataceo: flosculis basi aristatis; aristis inclusis, clavatis. *Savi B. Etr.* 1. *p. 54.\**

**A. canescens.** *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers.* *E.* - *Lois.* *G.* - *DC. Syn.* *Corynephorus canescens. Palis. de B.* - *Roem. S. Veg.* 2.\* *Gr. foliis junceis oblongis, radice alba. Moris. H. 3. p. 200. f. 8. t. 3. f. 10.* - *Scheuchz. Agr.* 242. et radice jubata. *ibid. 243.*

In arenosis maritimis. *Ad Ostia .... Ann. Floret Junio.*

**Planta** glauca. Culmi 4-pollicares-sesqui-pedales. Folia setacea; vagina suprema ventricosa. Panicula patens, demum coarctata, sub-secunda. Calix valvis acuminatis cinereo vel stramineo-argenteis; flosculi bini calyce duplo breviores; alter pedicellatus. Corollae gluma externa major, basi pilosa et aristata, arista calyce inclusa, inferne tortili, nigrescente, medio articulata, anulo denticulorum notata.

**C. Calice** 1-5- ( saepius bi - )floro valvis obtusis : corolla mutica calycem xcidente. (*Catabrosa*.  
P. de Beauv. ).

**95. AQUATICA**. L. Panicula diffusa: calycibus sub-2-floris, corollis muticis obtusis laevibus calyce longioribus: culmo basi repente: foliis planis.

**A. aquatica**. All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. Poa aroides. Koel. gram. 194. - DC. Fl. Fr. - id. Syn. Gr. aquaticum miliaceum. Scheuchz. Agr. 176. - Vaill. Par. 89. t. 17. f. 7.

In udis, fossis aquaticis communis. In copia nella Grotta della Ninfa Egeria, etc. Perenn. Floret Majo.

Culmi adscendentes, basi repentes, ut plurimum super aquam natantes geniculis radicantibus, fistulosi, sesquipedales. Folia glabra. Panicula 3-4-pollicaris, pyramidalis, ramis semi-verticillatis tenuissimis, inaequalibus, patentissimis. Calix 2-florus saepe etiam 1-florus valvis inaequalibus obtusis ex viridi spadiceis. Corollae glumae calyce triplo longiores subaequales apice membranaceae obtusae, sub-erosae.

(40) **HOLCUS**.

**96. LANATUS**. L. Calycibus pubescentibus; flosculo altero masculo, arista arcuato-recurva calyce inclusa: vaginis lanuginosis.

**H. lanatus**. All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Roem. S. Veg. 2.\* Savi B. Etr. 1. p. 49.\* Avena lana-ta. Koel. Gr. 303 - DC. Fl. Fr. - id. Syn. Gr. pratense paniculatum molle. Scheuchz. Agr. 234. t. 14. f. 24.a, b.

In pratis, ad sepes communis. Perenn. Floret Majo, Junio.

Culmus 2-pedalis. Folia pallida, subtus praecipue pubescentia, mollia. Vagina suprema ventricosa. Panicula 2-3-pollicaris. Calix valvis pubescentibus, albis, carina ciliatis, altera latiore nervis 3 viridibus. Flosculi bini; hermaphroditus subsessilis muticus glumis subaequalibus; masculinus pedicellatus, gluma majore sub apice aristata; arista arcuato-recurva, calyce brevior.

(41) **MELICA**.

**97. CILIATA**. L. Flosculi inferioris petalo exteriore ciliato :

panicula spiciformi cylindracea; spiculis erectis demum patentibus.

M. ciliata. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 47. - *Roem. S. Veg.* 2.\* Gramen avenaceum spica simplici, etc. *Scheuchz. Agr.* 174. t. 3. f. 16. *G, H, I, K.* Gr. sparteum alopecurum spica sericea grumosa typhina. *Barr. ic.* 3. f. 2.

In saxosis, muris communis. Perenn. Floret Majo.

Culmi sub-2-pedales. Vaginae inferiores pilosae. Ligula alba triangularis. Panicula sub-spicata: calix glumis paleaceo colore, nitidis, lanceolato-acuminatis, inaequalibus. Flosculi duo vel tres; inferior gluma externa majore tota longe piloso-ciliata; superior sterilis.

98. UNIFLORA. *Retz. Obs.* 1. p. 10. Panicula laxa ramosa secunda; spiculis longe pedunculatis erectis bifloris, flosculo altero imperfecto; petalis imberbis: foliis planis.

M. uniflora. *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Vivian. Ann. Bot.* 2. p. 140.\* - *Roem. S. Veg.* 2.\* *M. Lobellii. Vill. Delph.* t. 3 f. 3. Gr. avenaceum rariore grano nemorense danicum. *J. B. H.* 2. p. 434. Gr. avenaceum locustis rarioribus. *Scheuchz. Agr.* 173.

In nemrosis communis. In copia a Villa Borghese, etc. Perenn. Floret Majo.

Culmi pedales, sesquipedales, erecti, tenues. Folia plana, retrorsum scabra: vaginae scabiae: ligula brevissima appendicibus binis lateralibus membranaceo-filiformibus elongatis (polymorpha Smith). Panicula laxa pauciflora ramis racemosis, imis geminis, floribus erectis. Calix spadiceus valvis concavis ovatis subaequalibus: flosculi bini adpresso, altero neutro pedicellato.

99. PYRAMIDALIS. *Roem. et Sch. S. Veg.* 2.\* Panicula ramosa, ramis racemosis sub-patentibus, inferioribus geminatis inaequalibus sub-simplicibus: spiculis nutantibus trifloris; calycinis valvis acutis; petalis imberbis: ligula truncata lacera.

M. (innominata). *Bertol. Rar. It. Pl. Dec.* 2. p. 7.\* M. ramosa. *Sebast. Rom. Pl. Fasc.* 2. p. 38. Gr. avenaceum angustifolium paniculatum pyramidale. *Barr. ic.* 95. f. 1. - *Scheuchz. Agr.* 173. (utr. imperf. quoad folia, optime quoad paniculam).

In aridis, collibus, maris veteribus communis. Sul Colosseo, sul Monte Mario, a Civitavecchia in copia, etc. Perenn. Floret Majo.

Culmus 2-3-pedalis, saepius simplex. Folia linearia, acuminata lineam, sequilineam lata, striata, margine et pagina inferiore deorsum scabra praecipue dum sicca, vaginaria, arefactione tantum convoluta: ligula alba, membranacea, linearis longitudinis, raro ultra, truncata,

*Simile  
27. aprile  
1871*

laciniato-lacera, laciniis extremis intermedias superantibus, nec oblonga apice erosa. Panicula semipedalis apice racemosa, ramis remotis sub-patulis, inferioribus germinatis altero longiore magisque patente, simplicibus, vel in ramulum unum alterumve pauciflorum subdivisis, superioribus gradatim minoribus, subsolitariis, magis simplicibus. Flores secundi nutantes duas lineas et amplius longi, pedicellis brevibus apice pubescentibus. Calix valvis purpurascensibus, lanceolato-acutis, inaequalibus, glabris, margine scariosis, triflorus flosculo superiore imperfecto.

Barrelieri et Schenckzeri synonima hue procul dubio spectantia minns recte in Syst. Veg. cl: Roem. et Sch. videntur relata ad *M. minutam* L., quae diversa profecto res nobis patet ab exemplaribus Januensibus a cl: Bertolonio acceptis, et ab hac praeceps distincta: planta minore, tenuiore; foliis convoluto-setaceis, et vagina magis aspera; ligula oklonga, fere lanceolata, apice erosa; panicula racemiformi sub-simplici, ramis, si qui inferne extant, simplicissimis strictis, paucifloris; floribus minoribus, calycibus minus acutis, pallidioribus. (Nonne illi reducenda potius sit Barrelieri tab. 95. fig. 2?) Linnaei autem genuina *M. nutans*, cujus exemplaria nondum praे oculis habuimus, ex auctorum quos datum est consulere descriptionibus discrepare videtur: statura minore, foliisque angustioribus; ligula nulla (vel brevissima, aetate fusca); panicula racemiformi, vix ramosa (?), calycibus valde obtusis (Smithio quadrifloris). Plura forte extant *M. huic pyramidalis* associanda recentiorum synonima, quae non nisi autoptis adhuc extricanda; siquidem descriptiones apud auctores de nimis affinum specierum existentia non suspicentes characterum illorum silentio ut plurimum laborant, e quibus solida dumtaxat talium specierum discrimina erui queunt.

Conf. praesertim *M. pyramidalis*. Desf. Atl. 1. p. 72. *M. pyr.* Schousboe Maroc. 1. p. 25. *M. pyr.* Lam. Fl. Fr. 3. p. 585, quae *M. ramosa*. DC. Fl. Fr. n. 1540. *M. pyr.* Poir. It. 2. p. 95. *M. pyr.* Hornemann H. Hafn. 1. p. 87. *M. ramosa*. Villars. Delph. 2. p. 91.

(42) ARUNDO.

A. Calycibus 1-floris. (*Calamagrostis* anct.)

100. ARENARIA. L. Panicula spiciformi: floribus erectis; calycinis valvis acutis flosculo longioribus; corolla mutica, basi villosa, pilis flosculo triplo brevioribus: foliis involutis.

A. arenaria. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Savi B. Etr. 1. p. 88. *Calamagrostis arenaria*. Roth Germ. - DC. Syn. *Psamma arenaria*. Roem. S. Veg. 2. Gr. spica-

tam secalinum maritimum maximum, etc. Scheuchz. Agr.  
138. t. 3 f. 8. a, b, c.

In maritimis arenosis. A Fiumicino, presso Ostia, etc.  
Perenn. Floret Junio, Julio.

Culmi 1-4-5-pedales. Folia involuta, rigida, pungentia,  
extus glabra. Panicula contracta, spicata, 2-5-pollicaria.  
Calycis valvae oblongo-lanceolatae, compressae,  
subaequales, nervo dorsali scabro. Corolla minor basi  
pilis sericeis brevibus cineta.

101. EPIGEJOS. L. Panicula stricta, contracta, lanceolata:  
calycibus acuminatis corolla longioribus: pilis basilari-  
bus, calycem subaequantibus; arista dorsali recta pilis  
breviore.

A. epigejos. All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois.  
G. - Savi B. Etr. 2. p. 65. - Roem. et Sch. S. Veg. 2. Cala-  
magrostis epigejos. Roth Germ. C lanceolata. DC. Fl. Fr.  
et Syn. Gr. arundinaceum panicula molli spadicea majus,  
et minus. Scheuchz. Agr. p. 122. t. 3. f. 3. b, c, d. et p. 123.

In nemorosis collibus prope urbem satis frequens. Alla  
Spalletta della Caffarella, etc. Perenn. Floret Junio.

Culmus 2-6-pedalis, interdum basi ramosus. Folia fere  
lanceolata. Panicula augusta, stricta, sub-violacea. Ga-  
lix valvis subaequalibus acuminatis. Corolla calyce valde  
brevior, aristata; arista tenuis, infra medium glumae  
inserta, recta, lanam corollae vix aequans.

102. PLINII. Vitm Summ. Pl. 1. p. 128. Panicula stricta:  
calycibus unifloris: corellae gluma exteriore calyce lon-  
giore in aristam brevem producta; pilis superne a bas-  
nudiuscula insertis, calyce brevioribus; interiore glabra.  
Calamagrostis Plinii. Gmel S. Veg. A. semi-fareta Rheni  
Bononiensis Plinii. Zannon. H. p. 29. t. 19. f. 2., et Mon.  
ti in Zann. dict. fig. A. Tyberina D. Sherardi. Raii H. 3i  
p. 516. - Scheuchz Agr. 125. t. 3. f. 3. a, c, d.\*

A. mauritanica. Desf. Atl. - W. Sp. - Pers. E. Donax mauri-  
tanicus. Roem S. Veg. 2.

Ad sepes, fossas circa urhem frequens. In copia intorno  
al Monte Mario nelle Valli, etc. (Hab. quoque in Vesu-  
vio, fide speciminum; nec non ad Rhenum Bononien-  
sem.) Perenn. Floret Septembri.

Culmus 3-8-pedalis, intime fistulosus. Folia linearia, acu-  
ta, nervosa, margine et apice retrorsum scabriuscula,  
caeterum omnino glabra; vagina similiter glabra, tene-  
rior pilis oppositifoliis. Panicula pedalis et ultra, stri-  
cta, ramis erectis, semi-verticillatis, ramosis multiflo-  
ris, pallide viridis, vel caeruleo et sub-violaceo colore  
variegata. Calix uniflorus valvis acutissimis parum inae-  
qualibus; corolla anulo pilorum patentium calycem non  
excedentium lineam fere unam superne a basi cineta, ba-

si ipsa brevissime hirsuta ; gluma exterior , cui solum pili innixi , lanceolato-acuta , nervosa , calyce parum longior , in acumen aristaeforme i-sesqui-lineare producta ; interiorem minorem , acutam , membranaceam , omnino glabram includens .

Hujus calatum sagittis praestantissimum commendasse videtur Plinius l. 16. cap. 36. propriam Rheni Bononiensis plantam faciens , quae nostris temporibus circa Roman adeo diffusa ! Vide Monti l. c.

*A. mauritanica* . Desf. fide auctorum nobis citata , Floram enim Atlanticam consulere nondum fuit concessum : dolendum porro nullibi apud nos prostare pretiosum opus ! Calycem 1-2-3florum *A. Mauritanice* Desf. tribuant autores , qui in nostra uniflorus constanter se ostendit , ut ex auctorum , quos supra citavimus , et propria patet observatione . An re probata *A. Plinii* Vitmanni et *A. Mauritanica* Desfontainesii una eademque omnino res sint ?

Superest adnotemus speciem hanc peculiari pilorum insertione a congeneribus discrepantem , facillime in novum genus tali charactere distinctum posse revocari . Plantae autem habitus , et manifesta coeterarum partium congruens Arundini vindicant : nec ullo pacto hujusmodi genera naturalia dilaniandi videtur indulgendum furori .

B. Calycibus multifloris .

**103. DONAX . L.** Calycibus sub-5-floris : panicula densa ; culmo suffruticoso .

*A. donax* . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois G. - DC. Syn. *Donax arundinaceus* . Roem. S. Veg. 2. A. sativa quae donax Dioscoridis . Scheuchz. Agr. 159. - Monti ic. 1.

*Vulgaris* utilissima planta , undique culta . Vulg. *Canna* , *Cannone* . Perenn. Floret Septembri .

Culmus sub-15-pedalis fistulosus , foliis alternis . Panicula sesqui-pedalis , diffusa ramis compositis scabris . Calycis valvae inaequales , acuminatae , glabrae . Flosculi 3-5 basi villis sericeis longissimis muniti . - Variat foliis versicoloribus .

**104. PHRAGMITES . L.** Calycibus sub-quinque-floris : panicula laxa , nutante ; culmo herbaceo rigido .

*A. phragmites* . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etv. 1. p. 90. - Roem. S. Veg. 2. A. vulgaris palustris . J. B. H. 2.p. 485. - Mois. H. 3.s. 8.t. 8.f. 1. A. vulgaris s. phragmites Dioscordis . Scheuchz. Agr. 161. t. 3. f. 14.

In fossis , paludibus , nemrosis ubique . Vulgo : *Cannucia* , *Spazzola* . Perenn. Floret Julio , Augusto .

Culmus 8-10-pedalis , fistulosus . Folia plana , laevia , margine scabra . Panicula patens ramulis capillaribus , sca-

briunculis, subviolacea. Calix valvis inaequalibus acuminatis. Flosculi 3-6 basi villis longis sericeis cincti.

105. AMPELODES莫斯. *Cyrill. Neap. Fasc. 2. p. 30. t. 12.* Spiculis compressis sub-quadrifloris, glumis mucronatis; panicula subnudante: foliis radicalibus planis, caulinis subconvolutis.

A. ampelodesmos. *Savi B. Etr. 1. p. 89.* A. festucoides. *Desj. Atl. 1. p. 168. t. 34.* - Pers. E. A. tenax. *Vahl Symb. 2. - W. Sp.* A. mauritanica. *Poiret Voy. 2. Donax tenax Roem. S. Veg. 2.* Gramen avenaceum altissimum ... caule pleno rigido. *Till. Pis. 74.*

In montibus calcareis. In copia grande presso Tivoli, Santo Polo ... Al Capo Circello, etc. vulgo: strama. Perenn. Floret Junio, Julio.

Culmus 3-5-pedalis, firmus. Folia rigida; radicalia plana, caulinia convoluta, extus glabra atro-viridia, intus scabra pallidiora. Panicula sesqui-pedalis sub-secunda, ramis alterne semi-verticillatis ramosis, angulatis. Calix valvis inaequalibus, acuminatis, margine scariosis, dorso scabris. Flosculi saepius 4, basi pilosi gluma externa in acumen aristae-forme producta.

(43) AVENA.

A. Panicula composita. Arista dorsali plicata tortili. (*Avena genuina.*)

106. STERILIS. L. Paniculata: calycibus sub-quadrifloris; flosculis calyce minoribus, exterioribus aristatis et inferne hirsutis, interioribus muticis glabris; radice fibrosa annua.

A. sterilis. *W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Bertol. R. It. Pl. Dec. 1.\* - Savi B. Etr. 2. p. 64. - Roem. S. Veg. 2.* A. fatua  $\beta$ . *DC. Fl. Fr.* Festuca dumetorum utriculis lanugine flavescentibus. *Barr. ic. 75. n. 2.* Gr. avenaceum utriculis lanugine flavescentibus. *Scheuchz. Agr. 250. t. 5. f. i.*

In pratis, ad vias communis. Ann. Floret Majo.

Culmi 4-5-pedales. Panicula laxa, sparsa pedunculis inaequalibus, subsimplicibus, apice incurvatis. Spiculae pollicem etiam longae, valvis calycinis subaequalibus acuminatis, nervosis. Flosculi 4 vel 5; exteriores 2 vel 3 basi pilosi, arista dorsali contorta geniculata; interiores bini minores, mutici, glabri, pedicellati, imperfecti.

107. FATUA. L. Paniculata: calycibus subtrifloris: flosculis calyce minoribus, omnibus aristatis et inferne hirsutis: radice fibrosa annua.

A. fatua. *All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Bertol. R. It. Pl. Dec. 1. - Savi Bot. Etr. 2. p. 63. - DC. Syn. - Roem. Syst. Veg. 2.* A. erratica pilosa aristis intortis. *Morris. H. 3. s. 8. t. 7. f. 5.* Gr. avenaceum lanuginosum utriculis lanugine flavescentibus. *Scheuchz. Agr. 241.*

In pratis , ad vias ubique . Ann. Floret Majo .

Culmi 2-3-pedales . Panicula laxa , sparsa , pedunculis semi-verticillatis saepe ramosis , apice incurvatis . Spiculae semi-pollicares vel breviores : valvae calycinae subaequales acuminatae . Flosculi 2-3 omnes basi pilosi , dorso aristati , arista contorta , geniculata .

B. Spica -Arista dorsali plicata tortili .

( *Gaudinia* . Pal. de Beauv. ) .

**108. FRAGILIS** . *L.* Spica tereti , articulata , fragili : calycibus 4-5-floris , flosculis distantibus .

A. fragilis . *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Enc.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 1. p. 87. *Gaudinia fragilis* . *Roem. S. Veg.* 2. Gramen loliaceum spurium hirsutum aristis geniculatis . *Barr. ic.* 905. *f. 1, 23.* Gr. loliaceum lanuginosum spica fragili articulata glumis pilosis ( et glumis glabris ) articulatis . *Scheuchz. Agr.* 32 , 33 .

In viis , cultis vulgaris . Ann. Floret Majo , Junio .

Culmi sub-pedales , tenues . Spica articulis fragilibus . Spiculae sub-5-florae , flosculis distantibus , supremo saepe sterili . Calix valvis valde inaequalibus , viridibus , margine scariosis , glaber vel pilosus . Gluma exterior corollae dorso aristata , arista tenui geniculata , viridi-flavescens ; interior membranacea , candida .

C. Gluma exteriore apice fissa , biseta ,  
dorso uniseta . (*Trisetum Pers.*)

**109. NEGLECTA** . *Savi Pis.* 1. p. 132. *t. 1. f. 4.* Panicula densa , spiculis nitidis 4-6-floris ; glumis apice bifidis , arista dorsali sub-geniculata : foliis planis , pilosis , mollibus .

A. neglecta . *Savi Bot. Etr.* 1. p. 84. - *W. Mag. 2.* A. panicea . *Lam. ill. n. 1117.* - *Desf. Atl.* 1. p. 102. - *Lois. Notic.* 23. A. loeflingiana . *Lam. Dict.* 1. p. 332. - *DC. Syn.* *Trisetum hispanicum* β pisanum . *Pers. E.* T. neglectum . *Roem. S. Veg.* 2. *Avena* foliis hirsutis panicula stricta , locustis trifloris , etc . *Hall. Suppl. ad Scheuchz. Agr.* p. 54. n. 53 .

In pratis , viis passim . Ann. Floret Junio .

Facies aliquomodo *Koeleriae phleoidis* quacum monente Hallero Scheuchzerus confundebat . Culmi tenues , semi-pedales , sesqui-pedales , basi ramosi . Panicula 1-3-pollicaris densa elongata ante florescentiam spicam aemulans , dein laxiuscula , pyramidalis . Spiculae compressae 3-4-florae , glabrae , nitidae , viridi et argenteo variegatae . Corollae glumae bifidae : externa supra dorsi dimidium aristata , arista tenui sub-geniculata , glumae longitudine .

D. Flosculo inferiore masculino , superiore hermaphrodito sub-mutico . (*Arrhenatherum* . *Roem. et ch.*)

**110. ELATIOR** . *L.* Panicula sub-contracta , nutante : calyci-

bus glabris, bifloris, flosculo hermaphrodito sub-nautico, stipitato, masculo aristato : foliis glabris.  
 A. elatior. W. Sp. - Pers. E. - Enc. - Lois. G. - DC. Syn. - SaciBot. Etr. 2. p. 82.\* Holcus avenaceus. Scop. Carn. - All. Ped. - Smith Br. Arrhenantherum avenaceum. Roem. S. Veg. 2. Gr. avenaceum elatius juba argentea longiore. Moris. H. 3. s. 8.t. 7.f. 37. Gr. avenaceum elatius juba longa splendente. Scheuchz. Agr. 239.

In sylvis montium. Sul Monte Gennaro ... Perenn. Floret Junio.

Radix nodosa. Culmus 4-pedalis, geniculis glabris. Panícula pedalis contracta nutans. Calycis valvae inaequales, scariosae, acuminatae, major trinervia. Flosculi 2, nervosi pubescentes, basi pilosi ; alter hermaphroditus substipitatus, saepius muticus, interdum apice glumae mucronatus, vel infra apicem brevissime aristatus ; alter masculus sessilis, arista dorsali geniculata ; rarius uterque muticus.

#### (44) FESTUCA.

A. Arista exacte terminali : glumae interioris  
margin'e nudo.

111. DURIUSCULA. L. Panícula secunda ramis erecto-patulis; flosculis aristatis : culmo tereti ; foliis radicalibus setaceis, caulinis planis supra glabris : radice fibrosa.

F. duriuscula. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. F. duriuscula. A. Roem. S. Veg. 2. F. duriuscula  $\alpha$  et  $\beta$  Bertol. Op. Sc. Bol. Fusc. 1. p. 62.\* Gr. pratense panicula duriore laxa unam partem spectante. Scheuchz. Agr. 285. - Raii Syn. 413. t. 19. f. 1.

In montium sylvis. Sul Monte Gennaro, Monte Albano ... Perenn. Floret Junio-Julio.

Radix fibrosa fusca. Culmus sub-sesquipedalis strictus, glaber, teres. Folia angustissima, radicalia involuto-setacea longiora. Panícula secunda ramis sub-patentibus demum erectiusculis, breviuscula. Calix valvis inaequalibus, acutis, glabris. Corollae gluma exterior lanceolata, glabra vel carina et margine sub-aspera, arista terminali corolla breviore, longitudine varia. Gluma interior subaequalis, angustior, apice bifido.

112. OVINA. L. Panícula oblonga, secunda, ramis strictis; flosculis aristatis muticisve : culmo subtetragono ; foliis omnibus setaceis scabris : radice fibrosa.

F. ovina. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. F. ovina  $\alpha$ . Roem. S. Veg. 2. F. duriuscula  $\lambda$ . Bertol. Op. Scient. Bol. F. 1. p. 63.\* Gr. foliis junceis brevibus majus, radice nigra. Scheuchz. Agr. 279. t. 6. f. 8.

In montium sylvis opacis frequens. Sul Monte Gennaro, sul Cimino ... Perenn. Fl. Junio-Augusto.

30.  
maggio 1871.

Radix fibris nigris, capillaribus. Culmus sub-pedalis apice leviter tetragonus. Folia omnia tenuissima angulato-setacea, scabra. Panicula *Festucæ durusculæ*, magis oblonga, ramis strictioribus. Flores etiam *F. durusculæ* conformes, minores; flosculis, in exemplaribus nostris, aristatis.

Maxima profecto affinitas speciem hanc inter et praecedentem. Nec desunt varietates numerosae ab auctoribus diversimode distinctae, quae nexum constituant. Quarum plurimas examini subjectas, simulque duas hasce sub unica specie nomine *F. durusculæ* recenseri jubet cl. Bertoloni l. c.

**113. BROMOIDES.** L. Panicula spiciformi secunda, erecta: spiculis sub-sexfloris, glabris: flosculis subulatis apice scabris, longe aristatis.

F. bromoides. Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 1. p. 71. - Roem. S. Veg. 2.\* F. sciuroides. Roth Germ. - W. Sp. (?) Bromus Dertonusis. All. Ped. B. ambiguus. Cyr. Neap. F. 1. t. 2. Gr. paniculatum bromoides minus, etc. Pluck. Phyt. t. 33. f. 10. Gr. bromoides panicula heteromalla, longiorikns aristis donata. Scheuchz. Agr. 290. t. 6. f. 10. et Gr. bromoides pubescens, etc. Id. p. 291.

In sterilissimis, collibus. Al Pigneto-Sacchetti, alla Caffarella, etc. Ann. Floret Majo, Junio.

Culmi spithamei vel pedales erecti tenues glabri. Folia brevia setacea glabra. Panicula erecta secunda semi-pollicaris-pollicaris, pedunculis brevibus, simplicibus, solitariis, inferne saepius geminis, bifidis. Spiculae erectae, glabrae valvis calycinis inaequalibus, dorso scabris, 5-8-florae, flosculis subulatis, sub-remotis: Gorollae gluma externa apice et carina scabra, arista longa terminali scabra; interna acuta, margine ciliata.

**114. MYUROS.** L. Panicula sub-spicata, secunda, elongata, nutante: spiculis sub-sex-floris, scabriusculis; flosculis carina exasperatis, longe aristatis, monandris.

a. Major: glumis margine et carina denticulato-scabris.

F. myuros. All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois G. - DC. Syn. - Roem. S. Veg. 2.\* Gr. festucea in myurum elatius, etc. Barr. ic. 99. f. 2. - Scheuchz. Agr. 293. t. 6. f. 11. Gr. avenaceum murorum, etc. Moris. H. 3. f. 8. t. 7. f. 43.

b. Minor: glumis margine hirsuto-ciliatis.

F. ciliata. DC. Fl. Fr. et Syn. - Lois. G. - Roem. S. Veg. 2.\*

F. ciliata. Link ap. Schrad. Journ. 2. - Pers. E. (?) Gr. festuceum myurum minori spica heteromalla. Barr. ic. 79. f. 1. - Scheuchz. Agr. 294. t. 6. f. 12.

In sterilissimis, muris siccis varietas utraque vulgaris.  
Ann. Floret Majo, Junio.

Culmi pedales, sesquipedales, vaginis induiti. Folia setacea. Panicula elongata, etiam semipedalis nutans, in  $\beta$  erectiuscula, brevior, simplicior, colore pallido vel rufescente, pedunculis inferioribus ramosis. Spiculae 5-8-florae. Calix valvis inaequalibus, altera minima. Corollae gluma externa carina et margine scaberrima, in  $\beta$  margine et basi pilis longis hirsuta.

B. Arista paullo infra apicem inserta: glumae interioris margine saepe scabriuscule.

115. ELATIOR. L. Sp. Panicula erectiuscula: ramis decompositis scabris: spiculis 4-6-floris ovato-lanceolatis compressis glabris: glumis sub apice brevissime aristatis.

F. elatior. Smith Br. F. arundinacea. Schreb. - DC. Fl. Fr. et Syn. - Lois. G. - Savi B. Etr. 2. p. 55. - Pers. E. - Sebast. R. Pl. F. 2. p. 44. Bromus arundinaceus. Koeler. B. litoreus. W. Sp. - Pers. E. Schoenodorus elatior. Roem. - S. Veg. 2.\* Gr. arundinaceum locustis viridi-spadiceis, loliaeis, brevius aristatis. Scheuchz. Agr. 266. t. 5. f. 18.

In pratis humidis, ad fossas, inque maris roridis communis. Perenn. Fl. Majo, Junio.

Culmus 3-pedalis erectus. Panienla palmaris-sesquipedalis apice parum nutans; ramis scabris, basi nudiusculis, suberectis, inferioribus alternis, superioribus sub-binatis inaequalibus, decompositis; ramulis secundariis tertiarisque sub-binatis, floribus paucis donatis: flores solitari vel geminati, altero longius pedunculato, apice sub-violacei: calycis valvae acutae inaequales: corollae gluma externa lanceolata, margine scariosa, arista tenui brevissima parum infra apicem orta; interior margine scabro, nec evidenter ciliato.

116. GIGANTEA. Vill. Delph. 2. Panicula nutante; spiculis 4-6-floris lanceolatis glabris aristatis, aristis gluma longioribus sub apice ortis: foliis ensiformibus, nervosis.

F. gigantea. Smith Br.\* Bromus giganteus. L. - All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Roem. S. V. 2.\* Gr. bromoides aquaticum latifolium, etc. Scheuchz. Agr. 264. t. 5. f. 17.

Ad sepes locis humidiusculis. Nella Valle dell'Inferno ...  
Perenn. Floret Junio.

Culmus 3-4-pedalis, erectus. Folia ensiformia, lata, acuminate, nervosa, ligula auriculata fusca. Panicula elongata, nutans, ramis angulato-scabris, saepius geminatis, ramosis multifloris: flores ovato-lanceolati glabri, pallide virides, raro sub-violacei, flosculis 4-6. Calix valvis acutis, inaequalibus, carinatis: corollae gluma externa lanceolata, aristata; arista evidenter infra apicem biden-

tatum inserta , gluma duplo saltem longior , capillaris , scabra ; gluma interna vix brevior , margine scabro , nec ciliato .

117. SEROTINA . L. Sp. Panicula patente , ramis divaricatis , calycibus acutis brevibus ; corollae glumis lanceolatis , sub-aristatis , variegatis : culmo vaginis obtecto ; foliis brevissimis .

F. serotina . DC. Fl. Fr. - Lois. G. - Saci B. Etr. 1. p. 70. Agrostis serotina . L. Mant. - All. Ped. - W. Sp. Pers. E. Schoenodorus serotinus . Roem. S. Veg. 2. Gr. loliaceum serotinum , etc. Segu. Ver. 3. p. 146. t. 3 f. 2.

In aridis montium . A Tivoli presso S. Antonio ... Perenn. Floret Septembri .

Culmi sesqui-pedales , vel ultra . Panicula pauciflora , ramis demum patentibus . Spiculae ramis adpressae 2-5-florae , flosculis distantibus basi pilis cinctis . Corollae glumae acutae ; externa subaristata maculis atris transversis picta .

118. SEGETUM . Saci Pis. 1. p. 116. t. 1 f. 3. Panicula aequali , patente , ramis capillaribus ; spiculis glabris , nitidis , 3-4-floris , corollae gluma exteriore infra apicem longe aristata : foliis planis pilosis .

F. segetum . Saci Bot. Etr. 1. p. 69.\* Avena parviflora . Desf. Atl. 1. p. 103. t. 32. Trisetum parviflorum . Pers. E. - Roem. S. Veg. 2. Gr. paniculatum arvense latifolium hirsutum annum locustis viridibus et aristatis . Mich. Cat. H. Pis. 75.

In segete et ad sepes . Presso Acqua-Aacetosa ... Ann. Floret Junio .

Culmi 1-2-pedales . Folia plana pilosa . Panicula aequalis , patens , pyramidalis , ramis semi-verticillatis , capillaribus , ramosis . Spiculae plurimae , parvulae , nitidae , viridi-argenteae , 3-4-florae . Calycis valvae valde inaequales , acuminatae . Corollae gluma externa carina scabra , arista tenui , longa , flexili parum infra apicem inserta ; interna angustior margine non ciliato , apice bifida .

Species forte alio generi amandanda ob spiculas paucifloras , breves , calycis valvam alteram parum excedentes in Festucis non obvias . Ab Avenis vel Trisetis auctorum distat , ut videtur , arista non exacte dorsali , nec contorta , aut geniculata , et glumae apice haud biseto . Cum Koelerii quidem rectius militaret quoad floris formam ; sed obstat panicula effusa .

(45) POA .

A. Gluma exteriore mutica , caduca .

119. PRATENSIS . Smith Br. Panicula diffusa ; spiculis 4-floris glumis lanceolatis 5-nerviis villo connexis ; ligula abbrevi-

30.  
aprilie 1801.

- viata, obtusa. *Smith Br.*\* - *Savi Bot. Etr.* i. p. 58. - *Roem.*  
*S. Veg.* 2.
- a. *Smith*, *Savi*, *Roem.* l. c. Vaginis omnibus glabris.  
*P. pratensis*. *L.* - *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* -  
*DC. Syn.* Gr. pratense paniculatum majus latiere folio.  
*Scheuchz. Agr.* 177.
- β. *Smith*, *Savi*, *Roem.* l. c. Vaginis inferioribus scabris: foliis  
radicalibus longioribus, angustissimis.  
*P. angustifolia*. *L.* - *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois.*  
*G.* - *DC. Syn.* Gr. pratense paniculatum majus angustio-  
re folio. *Scheuchz. Agr.* 178.
- In pratis, pascuis, β praesertim sylvaticis, communis.  
Perenn. Floret Majo.
- Culmus laevis, sesqui-, 2-pedalis. Folia angusta, in β infe-  
riora magis, sub-convoluta et longiora. Vaginae folio-  
rum longitudine omnes laeves, at in varietate inferiores  
scabriuscule. Ligula obtusa brevis. Panicula pyramidalis  
diffusa, ramulis minus scabris, in β minor, pedunculis  
minus divaricatis. Spiculae 4-florae, in α et 5-florae, vi-  
rides, subinde purpurascentes.
120. TRIVIALIS. *L.* Panicula diffusa, spiculis 3-floris; glumis  
lanceolatis, 5-nerviis, basi villo connexis: ligula elon-  
gata. *Smith Br.*\* - *Savi B. Etr.* i. p. 57.
- P. trivialis. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Roem.*  
*S. Veg.* 2.\* *P. scabra*. *Erhart.* - *DC. Fl. Fr.* et *Syn.* Gr. pra-  
tense paniculatum medium. *Scheuchz. Agr.* 180. (?)
- Ad vias ubique vulgaris. Perenn. Floret Majo.
- Culmus sesqui-pedalis, teres: parum scaber (varietas culmo  
laevi, ut distincta species adducitur a cl. Decand. l. c.  
nomine *Poae Koeleri*). Folia subtus scabriuseula, uti et  
vaginae. Ligula elongata, lanceolata, acuta, qua nota  
statim a *P. pratensi* dignoscenda. Panicula elongata dif-  
fusa, ramis alternatim decompositis, horizontaliter pa-  
tentibus. Spiculae saepius 3-4-florae, purpureo-virentes.
121. ANNUA. *L.* Panicula divaricata subsecunda; spiculis ob-  
longo-ovatis 5-7-floris; flosculis remotiusculis, 5-nerviis,  
liberis: culmo subcompresso: radice fibrosa.
- P. annua. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC.*  
*Syn.* - *Roem.* *S. Veg.* 2.\* Gr. pratense paniculatum minus  
album. *Scheuchz. Agr.* 189.
- Ad vias, ambulacra nil vulgatus. Ann. Floret ab hyeme  
ad aestatem.
- Culmus semi-pedalis leviter compressus. Folia margine sub-  
undulata, flaccida. Panicula ramis binatis, divaricatis,  
sub-secundis, parum ramosis. Spiculae ovato-oblongae,  
nitidae, viridi alboque variegatae. Flosculi 4-5 remo-  
tiusculi, liberi, nec pilis connexi.
122. NEMORALIS. *L.* Panicula elongata: (spiculis 2-5-floris)

*corollis sub-nervosis : ligulis sub-nullis : foliis basi plicatis , vagina latioribus longioribusque . Gaud. Agr. Hely.*  
*1. - Roem. S. Veg. 2.*

*P. nemoralis . Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois G. - Savi B. Etr. 1. p. 60.*

*a. P. nemoralis vulgaris . Panicula pauciflora nūtante ; calyx speculas ovatas sub-trifloras aequante ; corollis liberis : culmo debili . Roem. et Sch. l. c.*

*P. nemoralis a. Smith l. c. P. nemoralis . DC. Syn. et auctorum . Gr. paniculatum angustifolium alpinum , etc. Scheuchz. Agr. 164. t. 2.*

*In montium sylvis opacis . Presso la cima del monte Cavi... Perenn. Floret Junio , Julio .*

*Culmi tenues erecti 1-2-pedales . Folia tenuia acutissima , patentia , subscabra . Ligula brevissima crenata . Panicula pallida , diffusa , tenuis , ramis brevibus , gracilibus , flexuosis , sub-ramosis , semi-vorticillatis . Spiculae saepe 2-florae , nitidae . Calix valvis acuminatis , trineriiis , carina scabris . Corollae glumae externae obscure quinquenerviae , basi pilosae , sed liberae .*

*123. BULBOSA . L. Panicula ovata , patentiuscula , sub-secunda : spiculis 4-5-floris , flosculis basi villo connexis : culmo basi bulboso : radice fibrosa .*

*P. bulbosa . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Bertol. Pl. Gen. 13.\* - Bivon. Sic. Cent. 1. - Savi B. Etr. 2. p. 51. - Roem. S. Veg. 2. Gr. Xerampelimum , miliacea , etc. Scheuchz. Agr. 185. Gr. vernum radice ascalonica . Vail. Par. t. 17. f. 8.*

*b. Spiculis in foliola abeuntibus .*

*P. crispa . Thuit. P. bulbosa β vivipara. auct. cit. Gr. arvense angustifolium panicula densa foliacea , etc. Scheuchz. Agr. 211. t. 4. f. 13.a , b , c. Gr. arvense panicula crispa ... majus et minus . Barr. ic. 793. f. 1, 2.*

*In pascuis , muris varietas β vulgaris . Perenn. Floret Aprili , Majō .*

*Bulbilli aliquot conferti e quibus culmi et foliorum fascielli ortum habent . Culmi palmares : folia angusta brevia , margine scabra . Panicula sub-secunda , ramulis geminatis ternatisve , patentiusculis . Spiculae compressae , glaucae , ex albo purpureoque variegatae , 4-5-florae ; superioribus flosculis saepius in foliola linearia , curvula , etiam semipollucaria transeuntibus .*

*124. COMPRESSA . L. Panicula secunda coaretata ; flosculis ( 5-7 ) angulosis , basi villo complicato connexis : culmo adscendente compresso . Smith Br.\* - Savi B. Etr. 1. p. 64*

*P. compressa . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Roem. S. Veg. 2.\* Gr. paniculatum radice repente ,*

Maggio 1871

6 id. 1871

culmo compresso, etc. Scheuchz. Agr. 198. - Vaill. Par. t. 18. f. 15.

In siccis, collibus, muris. *Sulla sponda del Tevere a Ripetta, sul Tuscolo, etc.* Perenn. Floret Julio.

Culmi sesqui-pedales valde compressi, glabri, basi procumbentes, et saepe radicantes. Folia brevia glabra; vaginæ ancipites. Panicula secunda coaretata, ramis saepius binatis inaequalibus compositis primum culmo adpressis, sub florescentia patulis, mox denuo adpressis. Spiculae sub-sessiles ovato-lanceolatae 5-7-florae. Gluma corollina exterior angulata, carinata, margine et apice scariosa, infra apicem macula violacea, basi villosa.

B. Gluma exteriore mutica persistente.

(*Eragrostis*. P. de Beauv.).

125. PILOSA. L. Panicula aequali, demum diffusa; ramis inferioribus semi-verticillatis, ad basim et ramifications pilosis; spiculis linearibus 7-9-floris: pilis vaginalibus oppositifolis.

P. pilosa. W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Vivianè Ann. Bot. 2. p. 141. - Saci B. Etr. 2. p. 48.\* P. eragrostis. Vill. Dauph. 2. - Balbis Misc. 10. Eragrostis pilosa. Roem. S. Veg. 2. Gr. paniculis elegantissimis majus, locustis purpureo-spadiceis minoribus. Scheuchz. Agr. 193. t. 4. f. 3. Gr. phalaroides sparsa panicula minimum angustifolium. Barr. ic. 44. n. 1.

16.  
april 1871  
id. 1870

In maris, ad sepes frequens Romae .... Ann. Floret Julio.

Culmi gracieles 1-2-pedales, geniculati. Pili aliquot longi oppositifoli, e vaginalum orificio; cacterum vaginæ nudæ. Panicula semipedalis vel ultra, demum patula, ramis tenuissimis, ramosis, infimis semiverticillato-subquaternis, pilis paucis ad insertionem et ramifications primarias munitis; superioribus geminatis vel alternis, basi nuda. Spiculae tenues, parvulae sub-8-florae, compressæ, violaceæ, floribus distinctis, liberis. Calix deciduus valvis inaequalibus, minusculis. Corolla glumis enervibus, externa violacea, margine scariosa, apice acuta, vel sub lente levissime retusa et mucronulo minuto donata.

Synonimon Scheuchzeri a specie hac nullo pacto amoendum.

C. Gluma exteriore emarginata, inter lacinias mucronata. (*Megastachya*. P. de Beauv.)

126. MEGASTACHYA. Schrad. Germ. 1. Panicula contracta, lanceolata; ramis alternis, patulis, ramosis, glandula alari villosa; spiculis lanceolatis sub 20-floris; corollis 3-nerviis: pilis vaginalibus oppositi foliis.

P. megastachya. Koel. gr. - Pers. E. - DC. Syn. - Saci B. Etr. 2. p. 49.\* Briza eragrostis. L. - All. Ped. - W. Sp. - Lois.

*G. Megastachya eragrostis. P. de Beauv. - Roem. S. Veg. 2. Gr. paniculis elegantissimis, sive eragrostis majus. Scheuchz. Agr. 194. t. 4. f. 4. Gr. eranthemum, etc. Barr. ic. 43, 743, 744*

Communis in iuctulis, ambulacris hortorum, viis urbis.  
Ann. Floret Junio, Julio.

Culmi palmares-sesquipedales adscendentes, basi subramosi. Pili longi densi oppositifolii e vaginarum orificio. Folia acuta, rigidula. Panicula 2-3-pollicaris lanceolata ramis erecto-patulis solitariis, ramosis, flexuosis, rigidis, superne scabriusculis; glandula ramorum alis imposita villis paucis, saepe unico instructa, subinde et obsoleta. Spiculae elegantissimae, sub-lanceolatae, compressae, a semi-linea ad lineas duas longae, pallidae, nitidae, flosculis 15-25. Gluma exterior corollae valide trinervis.

127. *RIGIDA*. L. Panicula coarctata disticho-secunda, rigida, glabra; rachi marginata; spiculis sub-7-floris; flosculis teretibus, liberis, obsolete nervosis.

P. rigida. All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 1. p. 62. \* *Megastachya rigida*. P. de Beauv. - Roem. S. Veg. 2.

a. *Muralis*. Culmi fere per totam longitudinem vaginis tecti. Savi l. c.

Gr. panicula multiplice minus. Scheuchz. Agr. 272. t. 6. f. 3. Gr. arvense filicina duriori panicula, gracilis. Barr. ic. 49.

b. *Maritima*. Culmi maxima longitudinis parte nudi. Savi l. c. Gr. panicula multiplice majus. Scheuchz. Agr. 271. t. 6. f. 2. Gr. filicinum rigidiusculum. Vail. Par. t. 18. f. 4. Gr. lolliaceum murorum duriusculum, etc. Moris. H. 3. f. 8. t. 2. f. 9.

In muris, tectis, viis communis:  $\beta$  in maritimis, ad Ostia ... Ann. Floret Junio, Julio.

Culmi basi ramosi adscendentes, nitidi. Ligula membranacea, lacera. Panicula lanceolata, secunda, rigida, rachi alata: rami alterni, ramosi, in  $\beta$  minus, basi hanc pilosi, spiculae breviter pedicellatae 4-10-florae. Calix valvis acuminatis, carinatis. Corolla glumis obtusiusculis, fere enervibus. Color plantae saturate viridis, in  $\beta$  saepe sub-violaceus.

D. Valvis calycinis truncatis, corollina exteriore erosa: spiculis teretibus.

(*Glyceria*. Brown.)

128. *FLUITANS*. Scop. Carn. 106. Panicula ramosa divaricata, spiculis adpressis, elongatis, sub-teretibus, sub-10-floris; flosculis obtusissimis, liberis, 7-nerviis.

8.  
Maggio 1800.  
1800.

P. fluitans. *Smith Br.\* - DC. Syn. Festuca fluitans. L. - All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. Glyceria fluitans. Brown Prod. 1. - Roem. S. Veg. 2. Gr. aquaticum flui- rans multiplici spica. Scheuchz. Agr. 199. Gr. loliaceum fluviatile longissima panicula. Moris. H. 3. s. 8. t. 3. f. 16.*

In fossis, rivulis communis. Perenn. Floret Majo-Julio.

Culmi oblique in aqua adscendentes, inferne radicantes, 2-3-pedales. Panicula valde ramosa, ramis demum divaricatis; spiculis viridibus ramo adpressis, tereti-compressis, et fere cylindraceis, tres etiam lineas longis. Valvae calycinae inaequales apice trunatae, erosae. Gluma corollina exterior apice erosa, margine scarioso-alba, nervis 7 inferne duplicitibus distincta; interior emarginata.

(46) BRIZA.

129. MAXIMA. L. Panicula nutante depauperata; pedunculis sub-simplicibus: spiculis cordato-ovatis 10-20-floris.

B. maxima. *All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 1. p. 66.\* - Roem. S. Veg. 2. Gr. phalaroides majus ferrugineum, nutante panicula. Barr. ic. 15. n. 1. Gr. tremulum maximum. Scheuchz. Agr. 202. t. 4. f. 7. - Moris. H. 3. s. 8. t. 6. f. 78.*

Ad oras nemorum, et in arvis communis. Ann. Floret Majo, Junio.

Culmus pedalis-sesquipedalis, tenuis. Ligula obtusa mediocris lineam longa. Panicula floribus 2-6 raro amplius; pedunculis simplicibus solitariis, interdum inferius geminis, aut bipartitis. Spiculae majusculae ovato-cordatae, compresso-torosae, nutantes, nitidae, flosculis circiter 15. Valvae calycis cochleariformes, obtusae, margine scarioso albo, dorso viridi, vel spadiceo: glumae conformes, internae minores, integrae.

130. MEDIA. L. Panicula ereta, laxa, multiflora: spiculis ovato obtusis sub-7-floris: calyce flosculis breviore: ligula obtusa brevi, libera.

B. media. *All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 1. p. 67.\* - Roem. S. Veg. 2. Gr. tremulum vulgare minus. Moris. H. 3. s. 8. t. 6. f. 45. Gr. tremulum majus. Scheuchz. Agr. 204. t. 4. f. 8. Gr. phalaroides minus erecta collectaque panicula. Barr. ic. 15. n. 2.*

In siccioribus montosis. Sul Monte Gennaro .... Perenn. Floret Junio.

Culmus 1-2-pedalis. Folia margine scabra, vaginis longis, laxiusculis; ligula brevis obtusa, libera, nec longitudinaliter folio adnata. Panicula ramis alterne geminatis, tenuibus, ramosis. Spiculae nutantes, tremulae, ovatae superne rotundatae, basi leviter cordatae. Calycis valvae

aprile 1891

id. h. magg. 1801.

Planta media inter medianam et TRIANDRIA DIGYNIA.

minorem a. Maggio  
1801.

cochleariformes, obtusae, margine scarioso albo, dorso sub-violaceo flosculis parum breviores: corollae glumae conformes, interior emarginata.

231. MINOR. L. Panicula erecta, diffusa; spiculis triangulis sub-7-floris, calyce flosculis longiore: ligula longa, lanceolata.

B. minor. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Savi B. Etr. 1.p. 67.\* - Roem. S. Veg. 2. Gr. tremulum minus locusta deltoide. Moris. H. 3. s. 8. t. 6. f. 47. Gr. tremulum phalaroides minus, etc. Barr. ic. 16.

Communis inter segetes, et in hortorum ambulacris. Ann. Floret Junio.

Culmus palmaris-pedalis. Ligula longa, acuminata, superne folio adnata. Panicula diffusa aequalis, ramis geminatis, diehotomis, capillaribus. Spiculae nutantes, tremulae, deltoideae, nitidae. Calicis valvae glumis evidenter longiores.

(47) BROMUS.

A. Floribus paniculatis: arista, saepius, infra apicem glumae.

232. SQUARROSUS. L. Panicula nutante simplicissima, sub-secunda; spiculis lanceolatis, tumidis, glaberrimis, aristis demum refracto-divaricatis.

B. squarrosus. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 58. - Roem. S. Veg. 2.\* Gr. phalaroides acerosum, nutante spica. Barr. ic. 24. f. 1. - Monti ic. 52. Festuca graminea glumis vacuis. Scheuchz. Agr. 251. t. 5. f. 11.

B. Minor: spiculis angustissimis, coloratis.

B. squarrosus γ. Gaud. Agr. Helv. (?) Gr. phalaroides sparsa et nutante Brizae panicula, obliquis aristis minus. Barr. ic. 82.

Species in montibus sub-apenninis ad vias non rara: β frequens loco ipsissimo quo legebat Barrelierus; Sulla riva del Tevere fra la Porta del popolo ed il Ponte molle.... Ann. Floret Junio, Augusto.

Culmus pedalis, et ultra. Folia mollia, vaginis villo dense. Panicula nutans, pedunculis simplicibus, apice incrassatis; inferioribus semi-verticillato-sub-ternis. Spiculae majusculae, ovato-lanceolatae, tumidae, glabrae, nitidae. Gluma exterior viridis, margine albo-scarioso splendente, apice emarginato: arista scabra rigida, primum erectiuscula; demum extus flexa, divaricata, inferioris ab emarginatura glumae inserta, flosculo sub aequalis. In β statura vix pedalis; spiculae duplo saltem minores, valde angustiores, numerosiores, dorso glumae exterioris fusco virenti, vel sub-spadiceo.

233. RACEMOSUS. L. (?). Panicula erectiuscula diffusa; pe-

dunculis simplicibus; spiculis ovatis sex-floris; flosculis imbricatis depresso, nervosis, glabris; (foliis vaginisque pilosis). *Smith Br.* 128\*

*B. racemosus*. *DC.* *Syn.* - *Sebast. R. Pl. Fasc.* 2. *p. 30.* *B. racemosus*. *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* (?) *B. simplex*, *Gaud. Agr. Helv.* 1. *B. Gaudini.* *Roem. S. Veg.* 2. *Gr. avenaceum pratense* gluma squamosa longiore glabra. *Moris. H. 3. s. 8. t. 7.f. 19.* *Gr. avenaceum hirsutum annuum* panicula ampliore, etc. *Till. Pis.* 74.

In pratis, pascuis communis. *Ann. Floret Majo*, *Jnnio*. Culmus 1-2-pedalis et ultra, superne, ut plurimum, leviter scaber. Folia subtus saltem pilosa: vaginæ, inferiores praesertim, pilis deflexis hirsutæ. Panicula rara, diffusa, nec coarctata, simplex, pedunculis sebris, inferioribus semi-verticillato-subternis, indivisis. Spiculae ovato-lanceolatae forma fere ut in *Bromo mollis*, dorso leviter compressæ, glabrae 6-7-floræ. Gluma corollina exterior minus evidenter nervosa, glaberrima, et carina superne scabra, arista fere ex ipso apice orta, recta, scabra, glumæ longitudine.

*B. racemosus* *Smithii*, *Decandolii* et plurium auctorum ab hoc diversus non censendus. Forte quod gramen cl: *Roem.* et *Sch.* eum nuperioribus exclusive *B. racemoso*. L. referunt, melius verbis auctoris respondens est hujusvarietas gracilior, quam præ oculis habuit Linnaeus speciem sistens, affirmante Smithio in l. c. Hujus specimen a cl: *Persoonio* dono missum gaudet planta tota graciliore, magis nuda, culmo breviore, laevi; vaginis foliisque minus pilosis, potius pubescensibus; racemis quinque-floris, pedunculis solitariis, infimis tantum binatis, inaequalibus; spiculis lanceolatis glabris, omnino nitidis, tantillum brevioribus.

154. *MOLLIS*. - *L.* Panicula erecta, contracta; pedunculis ramosis; spiculis oblongo-ovatis sub-turgidis pubescentibus; aristis rectis glumæ longitudine: vaginis, foliisque mollissime pubescentibus.

*B. mollis*. *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 1. *p. 75.* - *Roem. S. Veg.* 2. *Gr. avenaceum pratense*, gluma breviore squarrosa et villosa. *Moris. H. 3. s. 8. t. 7.f. 18.* *Gr. avenaceum locustis villosis angustis, candicantibus et aristatis*: *Scheuch. Agr. 254. t. 5.f. 12.*

In agris, pascuis, viis vulgaris. *Ann. Floret Majo*. Culmus 1-2-pedalis erexit. Folia molliter villosa. Panicula erecta, densa, 2-4-pollicaris, pedunculis ramosis, raro simplicibus, semi-verticillatis, pubescentibus. Spiculae ovato-lanceolatae, parum compressæ, 5-10-floræ, calycibus densius pubescentibus.

135. *ERECTUS. Huds.* Panicula stricta ; pedunculis semiver-  
ticillatis sub-simplicibus erectis ; spiculis compressis , li-  
nari-lanceolatis ; aristis gluma brevioribus : foliis radica-  
libus angustissimis sub-ciliatis .
- B. erectus. Smith Br.\* - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi 2. Cent. p. 25. - Roem. S. Veg. 2.\* B. pratensis. Lam. Enc. B. agrestis. All. Ped. B. perennius. Villars Delph. Fe-  
stucula montana. Savi Pis. 1. p. 118. Gr. quod festuca pratensis  
pratense, foliis praeter culmum angustissimis, etc. Scheuch.  
Agr. 225. t. 5. f. 13. Gr. lolium locustis longe aristatis.  
Monti Prod. 35. f. 2. Gr. sparteum longa et spicata panicula,  
lolii utriculis, festucae potius, majus. Barr. ic. 13. f. 1.  
In arvis, collibus siccioribus frequens. Perennis. Floret  
Junio .*
- Culmus 2-3-pedalis , erectus . Folia scabra , striata , radi-  
calia angustissima , apud nos ciliato-pilosa , subinde  
involuta . Vaginae striatae , glabrae: ligula brevissima ,  
erosa . Panicula erecta , ramis semiverticillato-subquinis ,  
erectis , simplicibus , interdum 2-3-floris , inaequalibus .  
Spiculae linearis - oblongae , erectae , compressae sub-9-  
florae , saepe purpurascentes . Aristae glumis breviores ,  
parum infra apicem insertae ; glumae internae ciliis minus  
conspicuis . Antherae croceae , quibus statim species di-  
gnoscenda .
136. *ASPER. L. Suppl. 111.* Panicula nutante , laxa , peduncu-  
lis sub-ramosis ; spiculis linearis - oblongis , compressis ,  
sub-pubescentibus , pendulis ; aristis gluma brevioribus :  
foliis sub-hirsutis , vaginis inferioribus hirtis .
- B. asper. Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 1. p. 74.\* - Roem. S. Veg. 2. B. ramo-  
sus. L. Syst. Veg. ed. 13. - All. Ped. B. dumetorum. Lam. Enc. Gr. avenaceum dumetorum juba longiore , spi-  
ca divisa . Moris. H. 3. s. 8. t. 7. f. 27.  
In nemorosis frequens etiam circa urbem . Perenn. Floret Jn-  
nio , Julio .*
- Culmus erectus , 2-4-pedalis . Folia plana , longa , latitudine  
fere conformia , nervosa , pilosa , scabra . Vaginae , in-  
feriores praesertim pilis deflexis insigniter hirsutae . Pan-  
icula nutans , ramis elongatis , asperis , plerumque bi-  
ternatis sui-ramosis , ramulis 1-2-floris , solitariis , gemi-  
natisve . Spiculae pendulae , linearis - oblongae , compres-  
sae , post anthesim triangulares , 6-9-florae , flosculis de-  
taum remotiusculis , carina asperis : arista flosculo du-  
plo cireiter brevior sub apice orta .
137. *STERILIS. L.* Panicula patula , apice nutante ; pedun-  
culis sub-simplicibus , spiculis compressis linearis - oblongis ,

scabris; aristis rectis gluma nervosa longioribus: vaginis foliisque pubescentibus.

B. sterilis. *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois.* G. - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 1. p. 79\* *Roem. S. Veg.* 2. *Gr. loliaceum* locustis longissimis, modo purpurascenscentibus, modo viridibus. *Monti* 35. *ic.* 1. *Festuca avenacea* sterilis elatior. *Moris. H.* 3. p. 212. s. 8. t. 7. f. 11. *Gr. avenaceum* panicula sparsa, locustis majoribus et aristatis. *Scheuchz. Agr.* 258. *t.* 5. *f.* 14. et *Gr. bromoides* locustis maximis lanuginosum italicum. *Id. p.* 261.

In agris, sylvaticis, ad vias, sepes vulgatissimus. *Ann. Floret Majo.*

*Culmus* 1-4-pedalis. *Folia scabra*, breviter pilosa: *vaginae inferiores* pilis deflexis densis brevibus: *ligula triangularis*, lacera. *Panicula semi-1-pedalis*, laxa, pedunculis longis inaequalibus, scabris, saepius simplicibus, unifloris, interdum et bifloris, parum sub specula inerassatis, 3-6 in quovis semi-vorticello. *Spiculae* 6-8-florae, nutantes, lanceolatae, demum triangulares, etiam sesqui-pollicares. *Glumae externae* nervis septem prominentes, scaberimae, pilis brevissimis rigidis constanter apud nos hirsutae.

*Scheuchzeri* synonima ambo hue spectant, quorum prius plantam graciliorem, magis nudam, alterum vero robustiorem, et, uti apud nos obvium, partium omnium magnitudine luxuriantem pingit.

238. MADRITENSIS. *L.* *Panicula* erecto-patente, contracta; pedunculis sub-ramosis, pedicellis apice incrassatis, spiculis linearibus scabris: aristis rectis gluma nervosa longioribus: staminibus 2-3.

B. madritensis. *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois.* G. - *DC. Syn.* - *Bivon. Sic. Cent.* 2. p. 14. - *Roem. S. Veg.* 2. *B. diandrus.* *Smith Br.*\* - *Savi B. Etr.* 1. p. 80. - *Sebast. R. Pl. Fasc.* 2, p. 31. *B. sterilis* erecta panicula majus. *Barr. ic.* 76. n. 1. *Gr. bromoides* pumilum locustis erectis majoribus, aristatis. *Scheuchz. Agr.* 260.

In muris, viis urbis vulgaris. *Ann. Floret Majo.*

*Culmus* sub-pedalis, erectus. *Folia*, uti et *vaginae*, pilis longis tecta, subinde glabra. *Ligula obtusa*, lacera. *Panicula* sesqui-pollicaris et ultra erecta, fastigiata, ramis scabriusculis parum ramosis, erectis, ad basim spicularum parum incrassatis. *Spiculae* linear-lanceolatae erectae, saepe fuscescentes, scabrae, flosculis apud nos diandris.

239. LIGUSTICUS. *All. Ped.* *Panicula* contracta, nutante, secunda, pedunculis dilatatis; gluma calycina altera vix conspicua. *Savi B. Etr.* 1. p. 77. - *Sebast. R. Pl. Fasc.* 2. p. 31. - *Roem. S. Veg.* 2.

B. ligusticus. *Vivian. Ann. Bot. 1. P. 2. p. 145.* - *Bio. Sic. Cent. 1. p. 21.* *Festuca ligistica. Bertol. Opusc. Scient. Bologn. Fasc. 1. p. 64.* *F. stipoides Lois. Notic. p. 21.* (excl. syn.). Gr. bromoides festucea, tenuique panicula minus. *Scheuchz. Agr. p. 296. t. 6. f. 13.* - *Barr. ic. 76. n. 2.* (minus bene).

In pratis, muris, viis vulgatissimus. Ann. Floret Majo, Junio.

Culmus semi-, 1-pedalis et ultra. Panicula 1-4-pollicaris, contracta, unilateralis, nutans, ramis geminatis, inaequalibus, ramosis, pedicellis sensim dilatatis. Spiculae 3-5-florae. Valva calycina altera minutissima, oculo armato conspicienda, altera elongata, spiculae subaequalis, aristata. Corollae gluma exterior apice aristata; interior ciliata.

140. BARBATUS. *Savi B. Etr. 2. p. 61.\* (Fl. Rom. Prod. Tab. I. f. 1.)* Panicula racemosa contracta: pedunculis alternis, spiculisque compressis: calyce nudo, valva altera minima: corollae gluma exteriore apice aristata, margine barbato-ciliata: culmo basi geniculato; foliis sub-convolutis.

B. barbatus. *Sebast. R. Pl. Fasc. 2. p. 5. ic. 1.* *Festuca ciliata. Linck ap. Schrad. Journ. 5. - Pers. E. - Roem. et Sch. S. Veg. 2.* (excl. pl. syn.). Gr. bromoides spicatum, maritimum annuum glabrum, spica heteromalla, locutis amplioribus, etc. *Mich. Cat. H. Pis. p. 76.*

In litore arenoso maris nostri vulgaris. Ad Ostia, Fiumicino, etc. Ann. Floret Majo, Junio.

Radix fibrosa, fibris capillaribus, sub-villosis. Culmi 1-sesquipedales, adscendentes, basi caespitosi, ramosi, ad nodos geniculati, foliosi, superne nudi. Folia angusta, sub-convoluta. Vaginae striatae, glabrae, sub-caeruleo-virentes, uti et exterior folii pagina. Ligula minima truncata, crenata. Panicula 2-3-pollicaris, racemiformis. contracta, saepe nutans. Pedunculi 2 lineas longi, simplices, compressi, erectiusculi. Spiculae tres fere lineas latae, compressae, lanceolatae, demum triangulares, scabrae, colore viridi et sub-caeruleo variegatae, 6-8-florae, valvis calycinis acutis, margine nudis, altera squamiformi oeties breviore, rachim spectante. Gluma corollina exterior apice aristata, arista ejusdem cum gluma longitudinis, carinata, carina sub-aspera; margine inferne praesertim barbato-ciliata, caeterum glabra; gluma interior margine dense breviter ciliata.

*Festuca alopecurus Schousboe ex descriptione Poiretii in Enc. Meth. statim differt,, calycis valvis aequalibus, villosis, ciliatis,,. Caeterum gramen hoc, quod ob glutinam interiorē ciliatam *Bromis* adscribimus cum cl: Savio, nullam prorsus habet affinitatem cum *Festuca cilia-**

**2a** Decandolii et Hostii , eni tamen referri mallingt  
cl: Roem. et Sch. in Syst. Veg. Tom. 2., et quae a nobis  
relata sub *Festuca myuros var. β.*

B. Floribus spicatis : arista terminali .

(*Brachipodii* sp. Roem. et Sch.).

**241. PINNATUS.** L. Spica erecta simplici : spiculis alternis  
sub-sessilibus , compressiusculis: aristis terminalibus glu-  
ma brevioribus : culmo sub-simplici , nodis albo-lanatis :  
radice repente .

B. pinnatus . W. Sp. - Smith Br.\* - Pers. E. - Lois. G. - Sa-  
vi B. Etr. 1. p. 81. Triticum pinnatum . DC. Fl. Fr. et Syn.

**a.** Spiculis , vaginis , foliisque pubescentibus .

Brachipodium pinnatum . Pal. de Beauv. - Roem. S. Veg. 2.

Gr. sparteum spicata brizae panicula et corniculata .

Barr. ic. 25. Gr. loliaceum corniculatum . Scheuchz. Agr. 35.

Triticum , etc. Hall. Helv. n. 1431.

**β.** Spiculis incurvis , vaginis , foliisque glabris .

B. rupestris . Host Gr. Aust. 4. Brachipodium rupestre .

Roem. S. Veg. 2. Triticum pinnatum γ. DC. Suppl. Triti-  
cum , etc. Hall. Helv. n. 1431. var. γ.

In dumetis , sepibus , viis communis : species in aridiori-  
bus , ad Tyberim ; β vulgatior ad sepes , in herbidis .  
Perenn. Floret Junio , Julio .

**142. SYLVATICUS.** Pollich. Spica simplici , spiculis alternis ,  
erectis , teretibus ; aristis terminalibus supremis gluma  
longioribus : foliis mollibus ; radice fibrosa .

B. sylvaticus . Smith Br.\* - Lam. Enc. Brachipodium syl-  
vaticum . Roem. S. Veg. 2.

**a.** Spiculis villosis .

B. gracilis . Pers. E. B. sylvaticus . Savii B. Etr. 2. p. 59.\* -  
Lois. G. Triticum sylvaticum . DC. Syn. Gr. loliaceum  
corniculatum spica partiali sub-hirsuta , fragili Scheuchz.  
Agr. 38.

In umbrosis , sylvaticis communis . Ann. Floret Majo ,  
Junio .

Culmus 2-3-pedalis , debilis . Folia pagina superiore molli-  
ter villosa . Spica simplex , spiculis 6-8 alternis , tereti-  
bus , ( villosis ) 8-10-floris . Arista terminalis , in flo-  
sculis saltem supremis , gluma longior ; gluma interior  
pectinato-ciliata .

**143. DISTACHYOS.** L. Spica simplici ; spiculis paucis approxi-  
matis , erectis compressis , lanceolatis: aristis terminali-  
bus gluma longioribus : culmo glabro .

B. distachyos . W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Savii B. Etr. 1.  
p. 81.\* Festuca distachya . W. En. H. Ber. Triticum ci-  
liatum . DC. Fl. Fr. et Syn.

**a.** Spicula solitaria terminali .

B. monostachyos . Lam. ill.

- g. Spiculis terminalibus geminis.  
 B. distachyos. *Lam. l.c.* Gr. spica Brizae minus. *C.B.P. 9.*  
 7. Spiculis pluribus.  
 B. polystachyos. *Lam. l.c.* Festuca gracilis, paucis utriculis. *Barr. ic. 83. f. 2.*  
 In apricis collibus solo sterili  $\alpha$  et  $\beta$  promiscue. *A Villa Pamfili, a Palombara, etc.*  $\gamma$  vulgaris in muris siccis, moenibus urbis. *Ann. Floret Majo.*  
 Culmi 2-6-pollicares adscendentes, glabri, nodis binis pubescentibus: folia pilosa, ciliata. Spiculae unica, binae, plures approximatae, rigidae, lanceolatae, compressae, erectae. Gluma exterior arista terminali longa recta instructa; interior longe ciliata ciliis exertis. *Antherae 2-3.*

## (48) KOELERIA.

144. CRISTATA. *Pers. E.* Panicula spiciformi basi interrupta, glabriuscula; spiculis 2-4-floris; glumis acutissimis vel sub-aristatis: foliis inferioribus ciliato-pubescentibus; culmo glabro.  
*K. cristata. DC. Cat. H. Mons. p. 116.\* - Roem. S. Veg. 2.*  
*Aira cristata. L. - Smith Br. - Lois. G. Poa cristata. Murr. S. Veg. - W. Sp. - Savi B. Etr. 2. p. 50. Gr. spica cristata sub-hirsutum. Scheuchz. Agr. 166.*  
 In montibus calcareis. *Sul Monte Gennaro ... Perenn. Floret Junio, Julio.*  
 Culmi sesqui-pedales laeves, subinde prope paniculam levissime pubescentes. Folia angusta, acuta, superiora glabra, inferiora ciliato-villosa plana, arefactione sub-convoluta. Vaginae inferiores sub-villosae, superiores saepius nudiusculae. Panicula spiciformis elongata, lobata, inferne sub-interrupta, pedunculis brevissimis pubescentibus. Spiculae compressae glabrae, nitidae, paleaceae, interdum apicibus sub-violaceis 3-florae, subiude rudimento quarti floris extante. Calycis valvae inaequales compressae lanceolato-acuminatae, margine scarioso, dorso sub-virenti fere opaco, carina seabra; major spiculam aequans. Corollae gluma exterior compresso-lanceolata, acutissima, in nostris speciminiibus mutica, nitida, carina tantum seabra: interior parum minor, argentea, superne bifida.  
 Forte quae apud nos venit varietas intermedia censenda inter geminam *Poam cristatam* W., et *P. nitidam* Lam seu *Koeleriam gracilem* Pers. (quae *K. cristata var.  $\gamma$  DG.*) Haec in specimine a cl: Persoonio misso distincta habitu toto graciliore, spica omnino nitida, spiculis bifloris.  
 145. VILLOSA. *Pers. E.* Panicula spiciformi, oblonga, compacta; calycibus sub-2-floris valvis acutis, villosis, ca-

11.  
Giugno 1871

rina ciliatis ; arista brevissima infra apicem glumae inserita : foliis planis molliter villosis.

K. villosa . DC. Cat. H. Monsp. 118.\* - Roem. S. Veg. 2. Aira pubescens . Vahl En. - W. Sp. - Savi B. Etr. 1. p. 57. Phalaris pubescens . Lam. Enc. - Lois. G. Alopecurus litorneus . All. Ped. Gr. typhinum maritimum longius radicum . Barr. ic. 717.

In arenosis maritimis communis . Ad Ostia , Fiumicino , etc. Ann. Floret Junio .

Culmi 8-10-pollicares adscendentibus . Folia utrinque villosa , mollia . Vaginae laxiusculae , suprema ventricosa . Panicula spicata , densa , Phalaridem aemulans . Spiculae compressae , 1-saepius 2-florae , subinde etiam flosculo tertio imperfecto . Calix valvis compressis , sub-aequalibus carina ciliata , ciliis densis , mollibus , margine scarioso argenteo . Gluma corollae exterior carina scabra , infra apicem aristata , arista gluma 3-plo 4-plo breviore , quandoque sub-nulla ; interior margine ciliata , superne bifida .

146. PHLEOIDES . Pers. E. Panicula spiciformi , lobata , cylindracea , stricta ; spiculis sub-5-floris sub-hispidis ; corollae gluma exteriore sub-apice aristata : foliis planis pilosis .

K. phleoides . DC. Cat. H. Monsp. 119. - Roem. S. Veg. 2.\* Poa phleoides . Lam. ill. Festuca phleoides . Desf. Atl. 1. - Bertol. R. It. Pl. Dec. 1. - Bivon. Sic. Cent. 1. p. 39. Bromus trivialis . Savi Pis. 1. p. 124. t. 2. f. 2. - Bot. Etr. 2. p. 63. - Sebast. R. Pl. Fasc. 2. p. 31. Gr. loliaceum molli spica viridi e pluribus spicis congesta . Monti Prod. 42. f. 22. Gr. alopecurum viridi et molli spica . Barr. ic. 123. n. 1. Gr. typhoides molle . Scheuchz. Ag. 246. t. 5. f. 5.

Ubique communis ad vias , in pascuis . Ann. Floret Majo . Culmus semi-pedalis , pedalis , geniculatus . Folia plana , pilosa . Spica sub-cilindrica , elongata , evidenter lobata ; spiculae compressae sesqui-lineares . Calix sub-pubescentes , margine scarioso . Gluma exterior laxe pilosa , ciliata , viridis , margine scarioso albido , infra apicem aristata , arista valde tenui flosculo breviore , in flosculis inferioribus subaequali ; interior scariosa margine ciliata , superne bifida .

Sect. III. Spiculae sessiles , secus rachin spicatae .

(49) ROTTBOELLA .

A. Galyc minuto , indiviso : corolla aristata , monandra ( Asprella . Host ).

147. MONANDRA . Cavanill. Pl. H. 1. Spica erecta filiformi : valvula calycina squamiformi minima : flosculis monandris aristatis , solitariis , geminatisve interiore minore pedicellato .

R. monandra . Pers. E. - Vivian. Ann. Bot. 2. p. 147. Nardus aristata . L. - All. Ped. - W. Sp. - Lois. G. - DC. Syn. - Vill. Delph. 2. p. 58. t. 2. - Savi 2. Cent. p. 12.\* - Biv. Sic. Cent. 2. p. 37. Asprella nardiformis . Host. Gr. Aust. 4. t. 29. Monerma monandra . Palis. de B. - Roem. S. Veg. 2.\* Gr. exile arundinaceum minimum acumine reflexo . Bocc. Mus. t. 57. - Scheuchz. Agr. 41. t. 1. f. 7. k. Gr. junceum nodosum minimum capillare . Barr. ic. 117. n. 1.

In collibus sterilibus circa Romam , et in plateis non rara .  
A Villa Patrizi , sul Monte Mario .. Ann. Floret Junio .

Culmi caespitosi , semi-pedales , pedales , filiformes . Spica 3-6-pollicaris , filiformis , racheos articulis alternatim excavatis . Flosculi in sinus reconditi , saepius binati altero pedunculato , interdum solitarii sessiles . Squamula triangularis minata loco calycis . Corollae gluma exterior scabra , aristata . Spiculam terminalem calyce valvis binis oppositis praeditam deprehendit cl: Hostius , quod et in sequentibus Rottboellis , nec non in Loliis a nobis observatum .

B. Calyce indiviso corollam occultante .

148. SUBULATA . Savi Giorn. Pis. 4. p. 230. f. 4, 8. Spica tereti erecta subulata ; calyce ensiformi acuminato adpresso indiviso flosculo longiore .

R. subulata . Savi 2. Cent. p. 35.\* - id. B. Etr. 1. p. 27. - DC. Fl. Fr. Suppl. 281. R. cylindrica . W. Sp. ( excl. syn. L. et Poir. ) . Monerma subulata . P. de Beauv. - Roem. S. Veg. 2.\* Gr. loliacenn junceum majus . Barr. ic. 5.

In agrorum semitis , locis sterilibus frequens . Fuori della porta S. Sebastiano , alla Caffarella , etc. Ann. Floret Junio , Julio .

Culmi caespitosi , ramosi , diffusi , a semi-pede ad pedem longi , articulati , articulis sub-fuscis . Folia angusta , acuminata , brevia , patentia , striata , glabra , superne scabra . Vaginae glabrae , striatae : ligula brevissima , truncata . Spica crassiuscula , subulata , glabra , plerumque recta , rachi flexuosa , striata . Galix 1-valvis . Valva ensiformis , acuminata , rigida , nervosa , adpressa , in anthesi tantum patens . ( Flosculus solitarius membranaceus ) . Glumae calyci sub-aequales , interna paucio breviore . Savi B. Etr. 1. c.

C. Calyce bipartito corollam occultante .

149. FILIFORMIS . Roth Cat. Bot. 1. Spica filiformi , sub-compressa , erectiuscula : calyce bipartito , valvis lineariacutis , demum patentibus : flosculo solitario , mutico .

R. filiformis . W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Vivian. Ann. Bot. P. 2. p. 140. R. erecta . Savi Giorn. Pis. 4. p. 230. f. 5, 6. - Bot. Etr. 1. p. 26.\* - DC. Fl. Fr. Suppl. 280. Ophiurus filiformis . Roem. S. Veg. 2. Gr. myuros ere-

etum minimum arundinaceum. *Bocc. Mus. t. 59.* Gr. loliaceum juncicum minus. *Barr. ic. 6.* Gr. loliaceum spicis articulosis erectis majus. *Scheuchz. Agr. p. 43.* Gr. parvum spicarum loco ferens caules, etc. *Lael. Triumph. ap. J. B. Triumph. Obs. p. 64.*

In argilloso agris, juxta semitas, inter stipulas frequens.  
*A Villa Pamfili, a Bravetta, etc. Perenn?* Floret *Junio, Julio.*

Culmi tenues, semi-pedales, basi ramosi, caespitosi, ascendentes, articulis sub-fuscis. Folia brevia, angustissima, glabra, superne scabriuscula, ligula brevissima truncata. Spica filiformi-sub-compressa glabra, erecta vel parum arcuata 4-pollicaris. Calix 2-partitus, valvis ensiformibus angustis, demum patentibus ( alternis magis ), uniflorus. Corollae glumae membranaceae, angustissimae calycis fere longitudine. - Radicem hujus perennem, affinis *Rotboellae incurvatae L.* annuam dicunt auctores.

(50) *LOLIUM.*

*150. PERENNE.* *Smith Br.*\* Spica mutica; spiculis calyce longioribus; flosculis lanceolatis; culmo laevi; radice perenni.

L. perenne. *Roem. et Sch. S. Veg. 2.*

a. *Smith l. c. - Roem. l. c.* Spiculis compressis 6-9-floris.

L. perenne. *L. - All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn.* Gr. loliaceum spica simplici vulgare. *Moris. H. 3 s. 8. t. 2. f. 2.* Gr. loliaceum angustiore folio et spica. *Scheuchz. Agr. 25.*

b. *Smith l. c. - Roem. l. c.* Spiculis sub-teretibus 3-4-floris.

L. tenue. *L. - All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn.* Graminis oliacei angustiore folio et spica C. B. varietas spica tereti angustissima. *Scheuchz. Agr. 28.*

Secus vias, in aggeribus utraque varietas communis. Perenn. Floret Aprili-Junio.

Culmus pedalis et altior, laevis. Spica disticha spiculis calyce duplo fere longioribus latere externo valvae calycinæ imposito, interno in racheos scrobiculo inserto, in  $\alpha$  compressiusculis 6-10-floris, in  $\beta$  angustioribus flosculis tantum 3, 4.

*151. TEMULENTUM.* L. Spica aristata; spiculis calyce brevieribus; flosculis ellipticis: culmo superne scabro: radice annua.

L. temulentum. *All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 1. p. 92. - Roem. S. Veg. 2.* Gr. loliaceum spicalongiore, seu lolium Dioscoridis. *Scheuchz. Agr.*

Inter segetes nimum frequens. Vulgo: *gioglio, zizania.* Ann. Floret Junio.

8.  
Maggio 1803  
18 1803

15

Culmus 1-2-cubitalis, firmus, foliosus, superne scaber.  
Spica disticha, rachi scabra, spiculis 4-multi-floris. Calix linear-lanceolatus planus, rigidus, striatus, spiculis constanter longior. Flosculi elliptici, turgidiusculi, aristati; arista capillacea alba glumae longitudine, interdum sub-nulla.

*30.*  
*Maggio 1801.*  
**152. MULTIFLORUM.** *Lam.* Spica aristata: spiculis lanceolatis, compressis, sub-18-floris, calyce triplo longioribus: culmo laeviusculo.

*L. multiflorum.* *Lois. G. - DC. Syn. - Roem. S. Veg. 2. Gr. Ioliaceum angustiore folio et spica, aristis donatum.*  
*Vaill. Par. t. 17. f. 3.*

In arvis, aggeribus viarum commune. Perenn. Floret Majo. Culmus 1-2-pedalis adscendens praecedenter gracilior, saepe laevis. Spica elongata pedalis et ultra, hinc saepe curvata, spiculis numerosis, compressis ovato-lanceolatis calyce duplo vel triplo longioribus. Calix lanceolatus, muticus, striatus. Spiculae flosculis 13-20 laxiusculis. lanceolatis, angustis, aristatis; arista tenuis, recta, scabra, sub apice glumae inserta, in flosculis superioribus gluma ipsa longior, in infimis sub-nulla.

*(51) HORDEUM.*

*96.*  
*aprile 1801.*  
*1. Maggio 1801.*  
**153. STRICTUM.** *Desf. Atl. 1. p. 113. t. 37.* Flosculis lateralibus masculis, pedicellatis, muticis; intermedio perfecto, longe aristato: involuculis setaceis, scabris.

*H. strictum.* *Pers. E. - Bivon. Sic. Cent. p. 31. - Roem. S. Veg. 2.\* H. nodosum. *Savi 2. Cent. p. 37.* H. bulbosum. *Bert. Pl. Gen. - Vivian. Ann. Bot. 1. p. 147.* - *Desf. emend. ad calc. d. voluminis.* - *Sebast. R. Pl. Fasc. 2. p. 50.* Gr. secalinum bulbosa radice, seu ex Alepo Bauhini. Scheuch. *Agr. 19.* (ex deser. et loc. nat., nec ad *bulbosum L.*).*

In pratis, pascuis nil communius. Perenn. Floret April-Junio.

Radix bulbosa. Culmus etiam 5-pedalis. Spica 2-3-pollicaris, vel ultra, Flores laterales masculi breviter pedicellati, gluma exteriore acuminata mutica; medius hermaphroditus sessilis, gluma exteriore aristata, arista flore duplo longiore: flores omnes ad insertionem glumae interioris alia arista tenui, brevi, ciliata muniti. Involucella scabra, nec ciliata, bina lateralia setiformia longiora, reliqua basi dilatata.

Male speciei hujus auctor semetipsum emendans reducendam monet ad *H. bulbosum L.*, quod apprime distinctum flosculis omnibus hermaphroditis. Nec confundenda nostra haec planta cum *H. nodoso L.*, quod ad *pratense Huds.* cum Smithio referunt nuperi.

*76.*  
*April 1801.*  
*14. maggio 1801.*  
**154. MURINUM.** *L.* Flosculis lateralibus masculis, aristatis;

involucellis setaceis, scabris: intermedio perfecto; involucellis linear-lanceolatis, ciliatis.

H. murinum. *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois.* G. - *DC. Syn.* - *Roem. S. Veg.* 2. Gr. secalinum vulgatum viarum. *Moris. H. 3. s. 8. t. 6. f. 4.* Gr. hordeaceum minus et vulgare. *Scheuchz. Agr.* 14.

Ubique ad vias, muros. Ann. Floret Martio-Augusto.

Culmi 1-2-pedales. Vaginae sub-ventricosae. Spica bi-pollicaris. Flores terni, omnes aristati; laterales stipitati masculi, involucellis setaceis scabris; intermedius hermaphroditus sessilis, involucellis linear-lanceolatis aristatis, ciliatis.

355. MARITIMUM. *With.* Flosculis lateralibus masculis, dorso pubescentibus, brevius aristatis; involucellis setaceis scabris, masculorum interiore semi-lanceolato.

H. maritimum. *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois.* G. - *DC. Syn.* - *Bivon. Sic. Cent.* 2. H. geniculatum. *All. Ped.* 2. p. 239. t. 91. - *Savi Pis.* 1. Gr. spicatum secalinum maritimum minus. *Scheuchz. Agr.* 18.

Commune in viis urbis, marginibus agrorum, maritimis. Ann. Floret Majo, Junio.

Culmi semi-pedales, pedales. geniculati. Vaginae leviter ventricosae. Spica densa: flosculi terni aristati; laterales masculini, dorso sub-hirsuti, arista breviore mutata. Calix singulus ex involucellis setaceis scabris, masculorum interiore basi dilatato, semi-lanceolato.

(52) CYNOSURUS.

156. CRISTATUS. L. Spica sub-disticha, lineari, secunda: bracteis pinnato-distichis muticis. *Savi B. Etr.* 2. p. 54. G. cristatus. *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois.* G. - *DC. Syn.* - *Roem. S. Veg.* 2. Gr. typhinum plantaginis spica, etc. *Barr. ic.* 27. f. 1. Gr. pratense cristatum, seu spica cristata laevi. *Scheuchz. Agr.* 79. t. 2. f. 8. A, B, C.

In pratis, pascuis obvius. Perenn. Floret Majo, Junio.

Culmus 1-2-pedalis. Racemus spiciformis sesqui-pollicaris, secundus, linearis, rachi flexuosa. Bracteae pinnatifidae spiculas subaequantes. Calix 3-4-florus, valvis mucronatis sub-aequalibus; glumae mucronato-sub-aristatae.

157. ECHINATUS. L. Panicula conglomerata, ovata, secunda; bracteis paleaceo-pinnatis flosculisque longissime aristatis.

C. echinatus. *Alt. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois.* G. - *DC. Syn.* *Crysurus echinatus.* P. de Beauv. - *Roem. S. Veg.* 2. Gr. alopecurum spica aspera. *Barr. ic.* 123. f. 2. *Scheuchz. Agr.* 80. Gr. paniceum spica aspera latiore. *Moris. H. 3. s. 8. t. 4. f. 13.*

In pascuis sterilioribus frequens . Perenn. ? Floret Majo ,  
Junio .

Culmus cubitalis . Panicula ramosa secunda in capitulum  
ovatum coarctata . Bractae pinnatae e paleis alternis , ner-  
vosis , scabris , longissime aristatis . Spiculae 2-3-florae ,  
flosculis pariter aristatis .

(55) SESLERIA .

158. COERULEA . Arduin . Sp. 2. p. 18. t. 6.f. 3-5. Spica im-  
briata , spiculis inferioribus bractea sub-erosa instructis;  
glumis acuminatis , aristatis . Bert. R. It. Pl. D. 3. p. 11.\*  
id. Op. Scient. Bol. Fasc. 1. p. 61.

S. coerulea . Scop. Carn. - All. Ped. - Smith Br.\* - Pers. E.-  
DC. Syn. - Roem. S. Veg. 2. Cynosurus coeruleus . L. -  
W. Sp. - Lois. G. Gr. glumis variis . C. B. Prod. 21.f. 1.  
In sylvaticis montosis . Sul Monte Gennaro ... Perenn. Flo-  
ret Majo .

Culmus sub-pedalis erectus . Spica erecta , brevis , obtusa ,  
caeruleo vel fusco varia , nitida , sub-simplex . Bractea  
solitaria sub una , alterave spicularium inferiorum , sub-  
erosa vel laciniata . Spiculae saepius binatae , pedicellatae ,  
sub-3-florae . Calycis valvae subaequales brevius ari-  
statae . Corollae gluma exterior tridentata , dente inter-  
medio in aristam brevem producto ; interior bidentata .

159. ECHINATA . Host. Gr. Aust. 3. p. 6. t. 8. Racemo spicato  
globoso , sub-nudo , spiculis sub-bifloris , gluma corollina  
exteriori 4-5-aristata , aristis subulatis rigidis . Schrad.  
Germ. 1. p. 277.

Cenchrus capitatus . L: - W. Sp. Echinaria capitata . Desf.  
Atl. 2. - Pers. E. - DC. Fl. Fr. et Syn. Gr. spica sub-rotun-  
da echinata . Scheuchz. Agr. 74. Gr. montanum echina-  
tum tribuloides capitatum . Col. ecphr. 1. p. 340. t. 338.  
f. 1. Gr. minimum spica globosa echinata . Barr. ic. t. 28.  
f. 1., t. 862. f. 2.

In subapenninis montibus ad margines viarum frequens . A  
Subiaco , e ne' luoghi vicini .... Ann. Floret Junio ,  
Julio .

Culmi 1-6-pollicares erecti . Spica brevis sub-rotunda , aut  
oblonga , conferta , spiculis breviter pedicellatis , ebra-  
cteatis , vel bracteis quibusdam parvulis variis extanti-  
bus . Galix valvis mucronatis , sub-biflorus , flosculo alte-  
ro imperfecto . Gluma exterior apice 5-fida lacinias subu-  
lato-aristatis inaequalibus rigidis , intermedia gluma du-  
plo longiore .

(54) EGILOPS .

160. OVATA . L. Spica ovata : valvis calycinis 3-4-aristatis ,  
scabris : culmis adscendentibus .

Ae. ovata . All. Ped. - W. Sp. - Pers. - Lois. G. - DC.

## TRIANDRIA DIGYNIA.

67

*Syn.* Festuca altera capitulis duris. C. B. P. 10. Gr. spicatum durioribus et crassioribus locustis, spica brevi. Scheuchz. Agr. 11. t. 1. f. 2. A, B, C.

In collibus, ad vias communis. Ann. Floret Majo, Junio. Culmi palmares, pedales, geniculati, adscendentes: folia acuminata, brevia, supra praesertim, et margine pilis longiusculis instructa. Vaginae villosae, ligula brevissima erosa, pilis aliquot oppositifoliis. Spica ovata vix pollicaris, rachi compressa, flexuoso-articulata, spiculis 3-5. Calix 2-valvis, valvis concavis, crassis, duris, striatis, sebris, apice laeziato-aristatis, aristis elongatis saepius 4, interdum et in eadem planta 3, vel 5. Gluma 3-ariectorollina exterior valvis conformis, minor, laevis, 3-aria stativa, arista rachim spectante fere semper obsoleta. Gluma interior margine ciliata. Accedit rudimentum quarti floris, pedicellatum, minusculum, flori intermedio, sterili, subsessili adpressum.

Satura, proportione spicae, et numero aristarum passim variat. Synonimon Schenckzeri, qui Romae plantam videt, hoc cum Linnaeo citare non dubitamus. Vehementer quidem suspicandum quod Willdenowius varietatem luxuriantem *Aegilopis ovatae* L. pro distincta specie dederit statuens suam *Aegilopem triaristatum* Scheuchzeriano synonimo munitam.

### (55) SECALE.

161. *VILLOSUM*. L. Calycinis valvis compresso-cuneiformibus, truncatis, aristatis, glumisque corollae exterioribus dorso villoso-ciliatis.

*S. villosum.* W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Saci B. Etr. 1. p. 93.\* *Triticum villosum*. Palis. de Beauv. - Roem. S. Veg. 2.\* *Hordeum ciliatum*. Lam. Enc. Gr. hordeaceum distichon majus, ciliaribus glumis durius. Barr. Jc. 112. f. 1. - Scheuchz. Agr. 21. (ex deser. et loci autops.)

In viis urbis et agrorum vulgare. Ann. Floret Aprili, Majo. Culmus 2-4-pedalis. Spica 2-pollicaris et ultra. Spiculae biflorae, saepe flosculo tertio accessorio, rarius et quarto. Calix valvis compresso-cuneiformibus, truncatis, nervosis, nervo dorsali villis albis fasciculatis ciliato, in aristam longam sebaram producto. Gluma corollina exterior lanceolata, aristata, nervosa, nervo dorsali superius villis albis fasciculatis ciliato; interior mutica.

### (56) TRITICUM.

162. *JUNCEUM*. L. Spica disticha stricta; calycibus sub-5-floris corollisque obtusis, truncatis, muticis: rachi laevi; foliis glaucis, rigidis, sub-convolutis: radice repente. T. juncicum. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. (excl. pl. syn.) - Pers. E. - Lois. G. - Saci B. Etr. 1. p. 94.\* T. glaucum. DC. Syn. Agropyrum juncicum. Pal. de Beauv. -

## TRIANDRIA DIGYNIA.

- Roem. S. Veg. 2. Gr. maritimum spica loliacea , foliis pungentibus nostras . Pluk. t. 33. f. 4.*
- In maritimis arenosis communis . Perenn. Floret Junio . Culmus 1-sesqui-pedalis tenax . Folia saepius involuta , rigida , pungentia . Rachis articulata , alterne excavata , spiculis sessilibus , oblongis , compressis , 4-6-floris , glablinae conformes , apice truncatae . Tota planta g anca .
163. *REPENS . L. Spica disticha : spiculis compressis 4-8-floris ; valvis calycinis sub-5-nerviis flosculisque acutis , muticis aristatisve : radice repente longissima .*
- T. repens . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. et En. H. Ber. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Biçon. Sic. Cent. 2. - Sav. B. Etr. 1. p. 94.\* Agropyrum repens .... Roem. S. Veg. 2.*
- a. Vulgatius . Foliis planis viridibus : valvis omnibus acuminate sub-muticis , calycinis flosculum aequantibus .*
- T. caninum vulgatius . Moris. s. 8. t. 1. f. 3.*
- b. Glaucescens . Foliis involutis ; rachi hispidula ; loculis approximatis , sub-lanceolatis , multifloris ; flosculis aristatis ; calycinibus acuminatis flosculo brevioribus .*
- T. repens ? Smith Br. (?) T. glaucum . Pers. E.-Lois. Notic. 29. (?) Agropyrum glaucum. Roem. S. Veg. 2. (?) T. repens var. Sav. l. c.*
- In agris , segete , viis varietas utraque passim . Vulgo : *gramigna , gramiccia* . Perenn. Floret Junio , Julio . Radix longa , repens , sobolifera . Culmus 2-3-pedalis erectus . Folia planiuscula , in β involuta , pungentia . Spiculae compressae , latae , 4-6-florae , in β longiusculae marginae acutae , vel acuminato-sub-aristatae flosculum primum superantes , in β breviores . Gluma corollae exterior acuminata vel acuminata producto aristata ; interior ciliata .
164. *CANINUM . L. Spica disticha ; spiculis teretibus sub-5-floris , flosculis aristatis ; calycinis valvis sub-trinerviis brevius aristatis : foliis planis : radice fibrosa perenni .*
- T. caninum . All. Ped. - Smith Br.\* - Pers. E. - Lois. G. W. En. H. Ber. T. sepium . Lam. Enc. - DC. Syn. Elymus caninus . L. - W. Sp. Gr. caninum aristatum radice non hirsutum , aristatum , aristis longioribus . Scheuchz. Agr. 10.*
- In sylvis montium . Sul Monte Gennaro .... Perenn. Flore Junio .*
- Culmi 2-4-pedales , stricti , glabri . Folia plana , striata aspera , superiorius sub-hirsuta . Spica 2-3-pollicaris , dumnum saepe nutans . Spiculae alternae , inferiores quandoque geminae . Calix glumis aequalibus , nervosis , la-

viter aristatis , 4-5-florus . Flosculi lanceolati , teretes , nervosi , aristati ; arista terminalis gluma duplo vel triplo longior .

165. MARITIMUM . *L.* Culmo et spica ramosa ; spiculis stipitatis erecto-patentibus , lanceolatis , compressis ; flosculis mucronulatis .

*T.* maritimum . *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Cyrill. Neap. Fasc. 2. p. 9. t. 2.\** - *Vivian. Ann. Bot. 2. p. 188.* - *id. Fl. It. Fragm. 1. p. 27.\** - *Savi B. Etr. 1. p. 95.* - *Biv. Sic. Cent. 1. Festuca maritima . DC. Syn. Brachipodium maritimum . Roem. S. Veg. 2. Gr. maritimum panicula loliacea . C. B. Prod. 19. ic. 18. Gr. lo iacea panicula ramosa maritimum . Scheuchz. Agr. 274 t. 6. f. 5. Gr. maritimum paniculus asperis loliaceis . Bocc. Mus. 135. t. 95.*

In maritimis nostris communis . *A Fiumicino , Ostia, Terracina . . . Bienn. Floret Majo , Junio .*

Culmi semi-pedales , ramosi , purpurascentes . Spica ramosa , ramis subsimplicibus angulatis , rigidis . Spiculae pedicellis brevissimis incrassatis stipitatae , demum patentes , sub-sexflorae , lanceolatae . Valvae calycinae acutae ; gluma corollae exterior apice acuminata , mucronulata , vel mutica .

*Sect. IV. Flores polygamo-monoici .*

(57) ANDROPOGON .

*A. Calycibus muticis : floribus spicatis .*

*(Andropogon genuinus) .*

166. HIRTUS . *L.* Culmo ramoso , ramis simplicibus : spicis conjugatis , floribus geminatis ; rachi , pedicellisque hirsutis : calycibus omnibus hirsutis muticis .

*A. hirtus . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Savi 2 Cent. p. 205.\* - Biv. Sic. Cent. 1. p. 15. - DC. Syn. - Roem. S. Veg. 2. Gr. bicornis sive distachiophorum . Bocc. Mus. 315. t. 8. f. 1. Gr. dactylon spica gemina . Scheuchz. Agr. 95.*

In viarum aggeribus , collibus circa urbem haud rarus . Perenn. Floret Julio .

Culmi 1-4-pedales , superne ramosi , ramis 3-5 simplicissimis . Vaginae ad culmi divisiones elongatae , ventricosae . Spicae terminales geminae , altera pedunculata , floribus binatis altero pedicellato masculo . Rachis , pedicelli , calycesque omnes hirsuti . Floris hermaphroditae arista e basi glumae minoris , elongata , contorta , geniculata .

167. ISCHÆMUM . *L.* Spicis fasciculatis sub-senis ; floribus geminatis ; rachi pedicellisque lanatis , calycibus muticis , ciliatis , nudiusculis , basi lana longa cinctis .

*A. ischaemum . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn. - Roem. S. Veg. 2. Gr. dactylon spicis villosis . Scheuchz.*

*Agr.* 94. *Gr.* dactylon spicis aristatis geniculatis. *Earr.* *ic.* 753. *f.* 2.

In collibus arenosis, aggeribus circa urbem frequens. *Perennis.* Floret Junio, Julio.

Culmus sesquipedalis et ultra. Spiae 5 ad 10 in culmi apice fasciculatae, pedunculatae, pedunculis saepius oppositis. Flores geminati; hermaphroditus calice basi lana cineto, corolla uniglami, arista tenui geniculata contorta basi parum dilatata loco glumae alterius (vel si minus arista in gluma minima terminalis). Flores masculi calyx nudiusculus, pedicello lana longiore instructo suffultus.

B. Calycibus muticis. Floribus paniculatis.

(*Sorghum auctorum*).

168. *ARUNDINACEUS.* *Scop.* *Carn. n.* 1236. Panicula laxa, ramis compositis, floribus geminatis, ternatisque, pedicellis barbatis: calycibus pubescentibus muticis: floris hermaphroditis gluma corollina altera emarginata aristata, muticave.

*A. arundinaceum.* *All. Ped.* *A.* Halepense. *W. En.* *H. B.* Holeus halepensis. *L.* - *W. Sp.* - *Savi B. Etr.* 1. *p.* 149. - *DC. Syn.* *Sorghum halepense.* *Pers. E.* - *Roem. S. Veg.* 2. *Gr. arundinaceum* paniculatum, locustis partim muticis, partim aristatis. *Scheuchz.* *Agr.* 509. *t.* 11. *f.* 12-15

In vineis, cultis, pascuis vulgaris. *Perenn.* Floret Julio, Augusto.

Culni erecti 5-6-pedales medulla repleti. Folia striata, glabra. Panicula pedalis, sesquipedalis, pyramidalis, laxa, nutans, ramis ad insertionem villis albis munitis, superius ramosis. Flores saepe fusco-violacei, terni; hermaphroditio sessili, lateralibus pedicellatis masculis binis, quorum alter desideratum in inferiore ramorum parte. Floris hermaphroditis calix pubescens, valvis lanceolatis sub-equalibus, muticis, depresso; corollae gluma altera minor profunde emarginata, ex emarginatura aristata; arista tortilis, geniculata, flore longior, in inferioribus abortiva. Flores masculi valvis calicinis minus pubescentibus, lanceolato-acutis, corolla mutica, pedicellis barbatis suffulti.

C. Calycibus omnibus aristatis. (*Pollinia. Spreng.*)

169. *GAYLUS.* *L.* Panicula effusa, ramis simplicibus, verticillatis trifloris: calycibus omnibus valva altera aristata; hermaphroditis ciliatis, basi barbatis, gluma altera corollina brevissima apice longius aristata.

*A. gryllus.* *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *DC. Syn.* - *Savi 2.* *Cent.* *p.* 203. *Pollinia gryllus.* *Spreng. Pug.* 2. - *Roem. S. Veg.* *Aegilops bromoides* juba purpurascente. *J. B. H.* 2.

## TRIANDRIA DIGYNIA.

71

p. 436. - Scheuchz. Agr. 267. t. 6. f. 1. a, b, c. Gramen spar-  
teum festuceum, etc. Barr. ic. 18. f. 2.

In pascuis, marginibus agrorum frequens. Perennis. Floret  
Majo, Junio.

Culmus 2-3-pedalis. Panicula patens, pedunculis simplici-  
bus, apice trifloris. Flores saepe fusco-violacei. Medius  
hermaphroditus, sessilis, basi pilis sericeis fulvis cinctus,  
valvis calycinis margine ciliatis, altera apice bifida, al-  
tera aristata. Corolla brevior, gluma altera acuminata, al-  
tera minuta, apice aristata; arista longissima, contorta,  
medio articulata. Flores laterales masculi pedicellati, ca-  
lycibus laevibus, valva altera aristata; corolla mutica.

## TRIANDRIA TRIGYNIA.

### (58) POLYCARPON.

170. TETRAPHYLLUM. L. Suppl. Caule ramoso, prostrato, fo-  
liis quaternis. L. - W. Sp. - Pers. E. - Lois G. - DC.  
Syn. - Sayi B. Etr. 2. p. 77.\*

P. tetraphyllum. All. Ped. - Smith Br.\* - Roem. S. Veg. 2.  
Mollugo tetraphylla. L. Sp. Marina incana anthyllis alsine-  
folia narbonensium. Lob. ic. 468. Anthyllis alsinefolia  
polygonoides major. Barr. ic. 534.

In hortis, viis urbis, atriis domuum vulgare. Ann. Floret  
aestate. Petala alba minima.

## CLASSIS IV.

## TETRANDRIA

## ORD. MONOGYNIA.

Sect. I. Flores monopetali, monospermi, inferi.

- (59) *GLOBULARIA*. Flores aggregati. Calix communis imbricatus; proprius tubularius, inferus. Corolla irregularis, labio superiore bipartito vel integro, inferiore tripartito. Receptaculum paleaceum.

Sect. II. Flores monopetali, monospermi, superi. (*Aggregate*).

- (60) *DIPSACUS*. Flores aggregati. Calix communis polyphyllus; proprius duplex, persistens, margine integer. Receptaculum paleis spinosis.

- (61) *SCABIOSA*. Flores aggregati. Calix communis polyphyllus; proprius duplex, uterque varie divisus. Corolla 4-5-loba, staminibus 4-5. Receptaculum pilis vel paleis hirtum.

Sect. III. Flores monopetali, monocarpi, inferi.

- (62) *PLANTAGO* Calix 4-fidus. Corolla 4-fida limbo reflexo. Capsula bilocularis, circumscissa.

Sect. IV. Flores monopetali, dicocci, superi. (*Stellatae*).

- (63) *SHERARDIA*. Corolla infundibuliformis, 4-fida. Fructus dispermus, nudus, calycinis dentibus coronatus.

- (64) *ASPERULA*. Corolla infundibuliformis, 3-4-fida. Baccæ siccæ, coalitæ, monospermæ, non coronatae.

- (65) *GALIUM*. Corolla rotata, aut campanulata, 4-fida. Semina duo subrotunda, non coronata.

- (66) *VALANTIA*. Flores polygami. Herm. Corolla campanulata 4-fida. Stylus bifidus. Fructus semine altero saepius abortivo. Masc. Corolla 3-4-fida, 3-4-andra, pistillo abortivo.

- (67) *CRUCIANELLA*. Corolla infundibuliformis, tubo filiformi, limbo brevi 4-5-fida. Calix bipartitus. Semina duo oblonga non coronata.

- (68) *RUBIA*. Corolla campanulata 4-5-fida, staminibuc 4-5. Baccæ duæ monospermæ sub-globosæ glabrae.

Sect. V. Flores 4-petali.

- (69) *CORNUS*. Calix 4-dentatus deciduus. Corolla 4-petala supera. Drupa nucleo biloculari.

Sect. VI. Flores apetalii.

- (70) *ALCHEMILLA*. Calix 8-fidus lacinii alternis minoribus,

*Corolla nulla. Semen 1, calyce tectum (rarius 2). Stamina 1-4.*

## ORD. DIGYNIA.

- (71) *CUSCUTA*. *Calix 4-5-fidus. Corolla monopetala limbo 1-5-fido. Stamina 4-5 corollæ fauce inserta, laciñis alterna. Capsula bilocularis, basi circumcisata, loculis dispermis.*

## ORD. TETRAGYNIA.

- (72) *ILEX*. *Calix 4-dentatus. Corolla rotata. Stylus nullus. Baccæ 4-sperma.*
- (73) *POTAM GETON*. *Calix nullus. Petala 4. Stylus nullus. Semina 4, nuda.*
- (74) *RUPPIA*. *Calix 2-valvis deciduus. Corolla nulla. Semina 4, pedicellata.*
- (75) *SAGINA*. *Calix 4-partitus. Petala 4. Capsula 4-locularis, 4 valvis, aut 1-locularis apice dehiscens, polysperma.*
- 

## TETRANDRIA MONOGYNIA.

*Sect. I. Flores monopetali, monospermi, inferi.*

## (59) GLOBULARIA.

171. *VULGARIS*. *L. Caule herbaceo folioso; foliis radicalibus petiolatis, obovatis, integris vel apice dentatis; caulinis lanceolatis. Savi Bot. E. 2. p. 78.*

*G. vulgaris*. *All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn. - Lois. G. Bellis coerulea caule folioso. Moris. H. 3. s. 6. t. 15. f. 46. Bellis coerulea sive Globularia monspeliensium. Lob. Ic. 478.*

*In collinis, montosis apricis. Intorno Tivoli .... Perenn. Floret Majo-aestate. Fl. coeruleo-albidi.*

172. *CORDIFOLIA*. *L. Caule sub-nudo; foliis cuneiformibus, tricuspidatis, dente intermedio minimo. L. - W. Sp. - Lois. G. - Savi - B. Etr. 2. p. 79.*

*G. cordifolia*. *All. Ped. - Pers. E. - DC. Syn. Scabiosa bellidis folio humilis, caule nudo, etc. Moris. H. 3. s. 6. t. 15. f. ult. Scabiosa montana repens. Clus. H. 2. p. 5.*

*In subapenninis jugis. Al Monte Calvo di Sua iaco .... Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. coeruleo-purpurascentes.*

*Sect. II. Flores monopetali, monospermi, superi. (Aggregatae).*

## (60) DISPACUS.

173. *SYLVESTRIS*. *Syst. Veg. ed. 14. Folii sub-connatis, serratis: paleis recus: involucris capitulo longioribus.*

3. 95 180

D. sylvestris. *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 80.\* D. fullonum *a. L. Sp.* *Labrum veneris.* *Lob. ic.* 2. p. 18. D. sylvestris. *Dod. Pempt.* 735.

Ad vias, secus fossas communis. Bienn. Floret Junio. Fl. dilute-purpurei.

## (61) SCABIOSA.

A. Corollis 4-fidis 4-andris.

174. TRANSYLVANICA. L. Corollulis 4-fidis aequalibus; calyculis paleisque aristatis: foliis imis lanceolatis lyratisque sub-serratis; caulinis pinnatifidis.

*Sc. transylvanica.* *All. Ped.* n. 594. t. 48.\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *Sc. altissima annua* foliis agrimoniae, etc. *Moris. H. 3. s. 6. t. 13. f. 13.*

In siccioribus, collibus frequens. *Sul Monte - testaccio*, etc. Ann. Floret Junio, Julio. Fl. dilute purpureo-coerulei.

175. LEUCANTHA. L. Corollulis 4-fidis subaequalibus: foliis lyrato-pinnatifidis: paleis obtusis: semine tetragono: urceolo dentato, glanduloso. *Savi Bot. E.* 1. p. 118.\*

*Sc. leucantha.* *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Vivian. Fl. It. Fragm.* 15. t. 17.\* *Montana scabiosa calidarum regionum.* *Lob. ic.* 538. *Sc. fruticans angustifolia alba.* *Moris. H. 3. s. 3. t. 13. f. 12.*

In apriis, aridis montium. *Sul Monte della Croce presso Tivoli* ... Perenn. Floret Julio, Augusto. Fl. albi.

176. ARVENSIS. L. Corollis 4-fidis radiantibus: foliis pinnatifidis incisis: caule hispido. *Smith Engl. bot.* t. 659. - *Bertol. in Opusc. Scient. Bol. Fosc.* 2. p. 65.\*

*a. Sc. arvensis.* L. - *Savi Bot. E.* 1. p. 120. *Sc. vulgaris major.* *Dod. Pempt.* 122. *Sc. major communior hirsuta folio laciniatu.* *J. B. H. 3. p. 2. f. super.*

*b. Foliorum inferiorum segmentis ovatis dentatis; foliis superioribus integris vel inferne laciniatis.* *Bert. lc.* (sub δ.) *Sc. integrifolia: var. foliis lyratis.* *Savi Pis. 1. p. 162. t. 2. f. b. c. - id. Bot. E.* 1. p. 120.

*γ. Foliis omnibus indivisis.* *Bert. t. Lc.* (sub ε.) *Sc. integrifolia.* *Savi Pis. 1. p. 162. t. 2. f. 1.* *Sc. major communior hirsuta folio non laciniatu.* *J. B. H. 3. p. 2. fig. solit. in p. 3.*

In arvis, ad sepes: *α* in montibus; *Albano* ... *β* ubique circa urbem: *γ* ibidem nec infrequens. Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. rosei.

B. Corollis 5-fidis 5-andris.

177. RUTAEFOLIA. *Vahl.* Corollulis 5-fidis subaequalibus: foliis pinnatifidis crassiusculis, basi connatis ciliatis; lacinias linearibus sub-dentatis; involuero monophyllo: calyculo brevi extenso; stellula 5-radiata.

*Sc. rutaefolia.* *Savi B. Etr.* 2. p. 81.\* *Sc. maritima rutae caninae folio.* *Bocc. Sic.* 74. t. 40. f. 1.

In litore marino: presso Ostia. Perenn. Floret Majo, Junio. Fl. carnaei.

178. COLUMBARIA. L. Corollulis 5-fidis radiantibus: foliis imis ovatis lyratisque, crenatis; caulinis pinnatis; pinnis attenuatis, summis linearibus. calyculo plicato margine involuto: pappo 5-seto.

Sc. columbaria. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 1. p. 121. (excl. syn. nonnullis). Sc. minor vulgaris. J. B. H. 3. p. 3.

In incultis, sylvaticis, secus vias vulgatissima. Perenn. Floret Majo - Julio. Fl. purpureo coerulei. - Capitulum fructiferum ovatum.

179. GRAMUNTIA. L. Pubescenti-virens: (corollulis 5-fidis radiantibus) foliis radicalibus oblongis crenatis: caulinis superioribus bipinnatifidis, laciniis linearibus: calyculo plicato margine extenso: pappo 1-5-seto deciduo. Bertol. in Opusc. Scient. Bol. Fasc. 2. p. 67.\*

a. Sc. gramuntia. All. Ped. - W. Sp. - Encycl. - Desf. Atl. - Lois. G. Sc. gramuntiana. Gouan H. R. Monsp. 62. n. 7. Fl. Monsp. 15. n. 8. Sc. ceratophylla. Ten. Fl. Neap. 1. p. 31. n. 27. t. 8. Sc. capitulo globoso, foliis in tenuissimas lacinias divisus. C. B. P. 271.

b. Herba luxuriante; foliorum caulinorum segmentis latioribus incisis. Bert. l. c.

Sc. unisetia. Savi Pis. 1. p. 167. t. 2, h, f. Sc. tenuifolia β coerulea. Savi Bot. Etr. 1. p. 122. Sc. Columnae, Ten. Fl. Neap 1. p. 29. t. 7. Sc. unisetia. Ten. ibid. p. 30. Sc. capitulo globoso major. C. B. P. 270. Phytheuma Dioscoridis. Column. Phyt. §. 99. t. 22. Sc. minor s. columbaria. Lob. ic. 535. Sc. quinta. Clus. H. 2.

In montosis sylvaticis, β praesertim frequens. Presso Albano, Tivoli, etc. Bienn. Floret Junio. Fl. pallide coerulei.

Sect. III. Flores monopetalii, monocarpi, inferi.

(62) PLANTAGO.

180. MAJOR. L. Scapo tereti, nudo: spica floribus imbricatis; capsulae loculis polyspermis: foliis glabriusculis, ovatis, integris vel subdentatis, petiolo brevioribus. Savi B. Etr. 2. p. 93.

Pl. major. All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Pl. latifolia glabra vulgaris. Moris. H. 3. s. 8. t. 15. f. 2.

Ad vias vulgaris: offic. Piantagine. Perenn. Fl. aestate. Fl. albidi in spica longissima.

181. LANCEOLATA. L. Scapo angulato pubescente; spica subovata nuda: foliis 3-5-nerviis lanceolatis, utrinque attenuatis. Savi B. Etr. 2. p. 94.

Pl. lanceolata, All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. -

1. Giugno 1872

3. Maggio 1872  
8. 1872

## TETRANDRIA MONOGYNIA.

- Lois. G. - DC. Syn. Pl. quinquenervia, sivo lanceola.  
Lob. ic. 305. Pl. bulbosa, etc. Hort. Rom. 2. t. 5.*
181. *Scapo 3-4-pedali : spica sub-cylindrica : foliis dentatis.  
Pl. altissima. L. - Jacq. obs. 4. t. 83. - W. Sp. - Pers. E. -  
Lois. G. Pl. montana crasso glabro canaliculato tenuire-  
que folio, spica oblongo-cylindrica, scapo, angulato.  
Till. Pis. 136.*
- In sterilibus, ad vias ubique. β. Intorno alla fontana Pao-  
la, presso i fossi della Caffarella ed altrove. Perenn.  
Floret aestate. Fl. spurco-albi in spica plus minus oblonga.  
Var. β quae gaudens solo humidiore omnibus partibus magis  
explicatis luxuriat solidis characteribus a specie distincta  
nobis non videtur.*
182. *LAGOPUS. L. Scapo subtereti piloso : spica ovata lanata ;  
foliis lanceolatis, sub-dentatis, nervosis, pilosis, basi  
lanuginosis.  
Pl. lagopus. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. -  
DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 95. Pl. angustifolia paničula  
lagopi. Moris. H. 3. s. 8. t. 16. f. 13.*
- In arvis frequens. Ann. Floret Majo, Junio. Fl. albidi.  
Scapus teres in robustiore planta leviter sulcatus evadit : fo-  
lia nervis 5 validioribus.*
183. *BELLARDI. All. Ped. n. Zoo. t. 35. f. 3. Hirta : scapo tereti ;  
spica oblongo-ovata ; bracteis subulatis flore longioribus:  
foliis linear-lanceolatis sub-nervosis. Savi Bot. Etr. 2.  
p. 94.*
- Pl. Bellardi. W. Sp. - Pl. pilosa. Lam. - DC. Syn. Pl. Bellar-  
di: β pilosa. Pers. E. Pl. pilosa: β holostea. Lois. G.  
In sterilissimis, collibus communis. Sul Monte Mario, sul  
Monte-testaccio, etc. Ann. Floret Majo. Fl. pallentes fau-  
ce rubeola.  
Scapus, ut plurimum, lipolicaris.*
184. *CORONOPUS. L. Scapo tereti : capsulis 3-4-loocularibus, lo-  
culis monospermis : foliis linearibus pinnato-dentatis.  
Savi B. Etr. 2. p. 95.*
- Pl. coronopus. All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. -  
Lois. G. - DC. Syn. Coronopus. J. B. H. 3. p. 509. Herba  
stella s. cornu cervinum. Dod. Pempt. 109. Pl. seu coro-  
nopus. Hort. Rom. 2. t. 9.  
Ad vias, in arenosis, praesertim maritimis. Perenn. Flo-  
ret aestate. Fl. pallidi. - Hirsutie variat.*
185. *MARITIMA. L. Scapo tereti : foliis linearibus, canalicu-  
latis, ecarinatis, integerrimis, basi lanatis.  
Pl. maritima. All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Lois. G. -  
DC. Syn. P. marina. Raii Syn. 315.*
- ε. dentata. W. Sp. - Pers. E. Foliis lanceolatis carnosis, pla-  
niusculis, glabris, tricostatis, hinc inde dentatis; den-*

## TETRANDRIA MONOGYNIA.

77

- tibus remotis teretiusculis : scapo tereti . Roth germ. 1.  
p. 61. , 2. p. 173. P. marina . Lob. ic. 306.  
In maritimis frequens . Perenn. Floret Junio . Fl. spurco-albi .
186. PSYLLIUM . L. Caule erecto herbaceo : foliis linearibus sub-integris recurvatis : pedunculis axillaribus : capitulis ovatis ; bracteolis lanceolato-acuminatis flore brevioribus .  
Pl. psyllium . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. Pl. psyllium majus erectum . Hort. Rom. 2. t. 10. Psyllium .  
Dodon. Pempt. 115.  
In sterilissimis arenosis communis . Ann. Floret Aprili-Junio . Fl. sordide albi .  
Bractae interiores capitulorum floribus vix longiores , nec appendiculatae , apice sub-incurvae : folia frequenter dentibus utrinque 1-2 .
187. CYNOPS . L. Caule ramoso suffruticoso : foliis linearis-subulatis integerim basi ciliatis : pedunculis axillaribus , capitalis sub-globosis : bracteolis late ovatis acuminatis flores sub-aequantibus .  
Pl. cynops . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Psyllium semperfervens . Moris. H. 3. p. 262. s. 8. t. 47. f. 1.  
In subapenniis jugis . Presso Subiaco . Perenn. Floret Junio . Fl. albidi .  
Sect. IV. Flores monopetali , dicocci , superi . ( Stellatae )
- (63) SHERARDIA .
188. ARVENSIS . L. Foliis omnibus verticillatis senis : floribus umbellatis terminalibus .  
Sh. arvensis . All. Ped. - W. Sp. - Smith Br. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi Bot. Etr. 2. p. 82. Rubia parva flore coeruleo se spargens . J. Bauh. H. 2. p. 719. Aparine supina pumila flore coeruleo se spargens . Hort. Rom. 1. t. 80.  
In viis , plateis , pascuis vulgaris . Ann. Floret Februario ad Junium . Fl. coerulei .
- (64) ASPERULA .
189. ARVENSIS . L. Foliis senis vel octonis obtusis : floribus terminalibus , sessilibus , aggregatis ; bracteis ciliatis .  
DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 83.  
A. arvensis . All. Ped - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. A. coerulea arvensis . Moris . H. 3. s. 9. t. 22. f. 2. - Dod. Pempt. 352.  
Inter segetes frequens . Presso Capo di Bove , etc. Ann. Floret Junio . Fl. coeruleo-purpurascentes .
190. ODO RATA . L. Foliis octonis lanceolatis : corymbis terminalibus pedunculatis : fructibus echinato-hispidis . W. Sp. - Savi B. Etr. 2. p. 83.  
A. odorata . All. Ped. - Smith Br. - Lois. G. - Pers. E. - DC.

## TETRANDRIA MONOGYNIA.

*Syn.* A. sive rubeola montana odorata. *Moris. H. 3. s. 9. t. 22. f. 4.* A. odorata flore albo. *Dod. Pempt. 552.*  
In montium sylvaticis. *Presso Albano, Frascati; sul Monte Gennaro, etc.* Perenn. Floret Majo, Junio. Fl. albi odori.

191. LÆVIGATA. *L. Mant.* 1. Foliis quaternis, ellipticis, uninerviis, laevibus: fructibus scabris. *DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 85.*

A. laevigata. *W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. A. rotundifolia. L. Mant. 2. Galium rotundifolium* β. *L. Sp. Rubia quadrifolia seu rotundifolia. C. B. P. 534.*  
In nemorosis, umbrosis circa urbem communis. *A. Villa Borghese, Parcili, etc.* Perenn. Floret Aprili, Majo. Fl. albi.

192. TAURINA. *L. Foliis quaternis ovato-lanceolatis trinerviis: floribus polygamis fasciculatis vel verticillatis terminalibus. DC. Syn. - Savi B. Etr. 1. p. 84.*

A. Taurina. *All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. Rubia quadrifolia et latifolia laevis. C. B. P. 534. - Moris. H. 30. s. 9. t. 21. f. 1. R. laevis Taurinensis. Lob. ic. 800.*  
In umbrosis montium frequens. *Sul Monte Caci, presso Albano, etc.* Perenn. Floret Aprili-Junio Fl. albi, subcoerulei, odori.

193. CYNANCHICA. *L. Foliis linearibus quaternis, superioribus maxime inaequalibus: floribus 4-fidis: fructu glabro. Smith Br. - Savi B. Etr. 2. p. 84.\**

A. cynanchica. *All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Rubia cynanchica. Moris. H. 3. s. 9. t. 21. f. 9. Galium montanum latifolium cruciatum. Col. Ecphr. 296. t 297.*

In saxosis, aridis montium. *Presso Tivoli ... Perenn. Floret Julio, Augusto. Fl. carnei rubro lineati.*

(65) GALIUM.

A. Fructu aevi.

194. PALUSTRE. *L. Foliis quaternis sensive, obovatis obtusis, inaequalibus: caule diffuso tetragono. DC. Syn.*

G. palustre. *All. Ped. - W. Sp. - Smith Br. - Pers. E. - Lois. G. - Savi B. Etr. 2. p. 85. - Bertol. in Opusc. Scient. Bol. Fasc. 2. p. 69. G. aquaticum flore albo. Barrel ic. 82.*

In fossis communi. Perenn. Floret Majo. Fl. candidi.

195. VERUM. *L. Foliis octonis linearibus, sulcatis, integrerimis, scabris: floribus paniculatis congestis. Smith br. - Savi B. Etr. 2. p. 86.*

G. verum. *All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - J. B. H. 3. p. 126. G. Inteum. Dod. Pempt 351. - Hort. Rom. 1. t. 81.*

In angerebus, pratis vulgare. Perenn. Floret Majo - Julio. Fl. lutei.

Aprile 1891  
15. id 1890.

v

196. *MOLLUGO*. *L.* Foliis octonis, ellipticis, obtusiusculis, mucronulatis, margine scabris: floribus paniculatis divaricatis. *Smith Br.* - *Bertol. in Opusc. Scient. Bot. Fasc. 2.* p. 72.\*
- G. mollugo*. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr. 2.* p. 86. *G. album*. *J. B. H. 3* p. 821. *Mollugo*. *Dod. Pempt.* 351.
- In sepibus vulgarissimum. Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. albi, sub-citrini.
197. *LUCIDUM*. *All. Ped. n. 21. t. 77. f. 2.* *Glabrum*: foliis suboconis, linearibus subulatis, aristatis: floribus paniculato-condensatis; corollae lacinii mucronulatis. *Bertol. Opusc. Scient. Bot. Fasc. 2.* p. 69.\*
- G. lucidum*. *Pers. E.* - *Savi B. Etr. 2.* p. 88. *G. rigidum*. *Vill. Dauph. 2.* p. 319.
- In saxosis, aridis montium. *Sul Monte della Croce presso Tivoli*.... Perenn. Floret Junio. Fl. albi.
198. *RUBRUM*. *L.* (excl. syn. *Clus.*) *Pubescent*: foliis sub-oconis linear-setaceis; ramis nutantibus, pedunculo bracteis sub-longiore. *Bertol. Pl. Gen.* p. 31.\*
- G. rubrum*. *All. Ped.* - *DC. Fl. Fr. 4.* - *id. Syn. G. purpureum*. *W. Sp.* - *id. Enum. H. Ber.* - *Pers. E.* - *Savi B. Etr. 2.* p. 87. - *Flor. Tic. 1.* p. 73. et 403. t. 3.\*
- In montosis sylvaticis. *A Palombara, sul Monte-Gennaro*. Perenn. Fruticul. Floret Julio, Augusto. Fl. atro-rubri lacinii acutis.
- B. *Fructu hispido*.
199. *PARISIENSE*. *L.* Foliis sub-senis lanceolatis, mucronatis cauleque scabris: pedunculis bifidis: fructu hispido. *Bert. Rar. It. Pl. Dec. 3.* p. 15.\* - *Savi B. Etr. 2.* p. 89.
- \* *G. parisiense*. *L.-W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Vill. Delph. G. litigiosum*. *DC. Fl. Fr. Syn.*
- ¶ *Fructu nudo granulato*, *Bert. l. c.*
- G. parisiense*. *Reh. 67.* - *Enc. meth. bot. 2.* p. 578. *Gr. anglicum*. *Huds.* - *Smith Br.* et *Engl. Bot. t. 384.* - *DC. Fl. Fr. et Syn.* - *Thuil. Par.* - *Lois. G. Aparine minima*. *Raii Syn. 225. t. 9. f. 1.*
- In arenosis, rupestribus, collibus vulgare circa urbem. Ann. Floret Majo, Junio. Fl. minimi luteoli, vel purpurascentes.
200. *APARINE*. *L.* Foliis octonis obovato-lanceolatis: carinis scabris, retrosum aculeatis: caule flaccido, geniculis villosis: fructus setis uncinatis.
- G. aparine*. *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr. 2.* p. 89. *Aparine. Lab. ic. 800.* - *J. B. H. 3.* p. 713. *A. vulgaris*. *Hort. Rom. 1.* t. 78.
- Ad sepes, in sylvaticis ubique. Ann. Floret Majo. Fl. albi.

aprite 1801

18.

Maggio 1801

folia lisca

201. MURALE. *All. Ped. n. 34. t. 77 f. 1.* Foliis ciliatis senis; floralibus quaternis binisve, oppositis binis floribus.

G. murale. *DC. Syn. Sherardia muralis. L. Sp. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Savi B. Etr. 2. p. 81.* Asperula verticillata muralis minima. *Col. Ecphr. 302. t. 300.*

In muris vetustis, atriis domuum frequens. Ann. Floret Majo. Fl. lutescentes.

(66) VALANTIA.

202. SPURIA. *Pers. E.* Caule simplici, folisque sub-octonis, margine retrorsum aculeatis: pedunculis 3-floris; floribus omnibus pedicellatis. fructu granulato reflexo.

V. spuria. *Savi B. Etr. 1. p. 124.* Galium tricornis. *With. - Smith Br.\* - DC. Syn. G. spurium pl. auct. Aparine semine laevi. Vaill. Paris. t. 4. f. 3. a, a.*

In segete haud infrequens. *Presso Capo di Bove, etc.* Ann. Floret Junio. Fl. albi. - Facies Galii aparines.

203. MURALIS. *L.* Foliis quaternis ellipticis: floribus ternis; lateralibus masculis, trifidis, germini intermedii insidentibus.

V. muralis. *All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 1. p. 125.* Cruciatia muralis minima romana. *Column. Ecphr. 1. p. 298. t. 297.* Valantia annua quadrifolia, etc. *Mich. N. Pl. G. p. 13. f. 7. - Hort. Rom. 1. t. 83.*

In veteribus muris, rupium fissuris communis. Ann. Floret Martio-Majo. Fl. pallide virentes.

204. GLABRA. *L.* Caule inferne piloso; foliis quaternis, ellipticis, trinerviis, ciliatis; pedunculis capillaribus, dichotomis, nudis fructibusque glabris. *Savi B. Etr. 2. p. 90.*

V. glabra. *W. Sp. - Pers. E. - Lois. G.* Galium vernum. *Scop. - All. Ped. - DC. Syn. Rubia quadrifolia glabra angustifolia. J. B. H. 3. p. 717.*

In umbrosis montium. *Presso Frascati, Albano, nella Fajola .... Perenn.* Floret Majo, Junio. Fl. viridi-lutescentes.

205. CRUCIATA. *L.* Foliis quaternis, elliptico-oblongis, trinerviis, reticulatis, hispidis; pedunculis ramosis glabris bracteatis, bracteis oblongis: fructibus glabris. *W. Sp. - Savi B. Etr. 2. p. 91.*

V. cruciata. *Pers. E. - Lois. G.* Galium cruciata. *Scop. - All. Ped. - Smith Br.\* - DC. Syn. Cruciatia. Dod. Pempt. 353. - Hort. Rom. 1. t. 82. G. minor. Lob. ic. 804.*

In umbrosis, ad sepes ubique communis. Perenn. Floret Aprili-Junio. Fl. lutei.

(67) CRUCIANELLA.

206. ANGUSTIFOLIA. *L.* Erecta: foliis senis, linearibus, floribus spicatis. *L. - All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn.*

*Rubia spicata angustifolia*. Barr. ic. 550.

In subapenninis lapidosis. Presso Rio-freddo . . . Ann.  
Floret Junio. Spica viridi alboque variegata.

207. MARITIMA. L. Procumbens, suffuticosa: foliis quaternis, mucronatis, floribus oppositis quinquefidis. L.-W.Sp.-  
Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 91.

*Rubia marina*. Dodon. Pempt. 357. - Clus. H. 2. p. 176.

In arenosis maritimis. Presso Ostia, etc. Ann. Floret Ma-  
jo. Fl. rubeoli.

(68) RUBIA.

208. TINCTORUM. L. Foliis annuis, lanceolatis, sub-senisis:  
corollae lobis oblongis, sub-callosis. caule scandente,  
aspero.

R. tinctorum. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. -  
DC. Syn. - Savi B. E. 2. p. 92. R. tinctorum sativa. Mor-  
ris. H. 3. s. 9. t. 21. f. 1. - Hort. Rom. 1. t. 77. R. major.  
Lob. ic. 798. - Clus. H. 2. p. 177.

Ad sepes vulgaris. Perenn. Floret Junio. Fl. luteoli (sac-  
pius 5-fidi). - Caulis scandens aneius.

209. PEREGRINA. L. Foliis perennantibus, quaternis senisive,  
sub-ellipticis: corollae lobis 5 mucronato-aristatis: cau-  
le diffuso aspero.

R. peregrina. Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. -  
DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 92.\* R. tinctorum. With.  
R. sylvestris aspera quae sylvestris Dioscoridis. Raij  
Syn. 223. - Morris. H. 13. s. 9. t. 21. f. 2.

In litore arenoso maris. Presso Ostia . . . Perenn. Floret  
Junio. Fl. flavescentes.

Cl: Savini l. c. hic reducit R. Bocconi Petagnae.

Sect. V. Flores quadripetalii.

(69) CORNUS.

210. MASCULA. L. Arhorea: umbellis involucrum aequanti-  
bus. L. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Savi Tr. d. Alb.  
Tosc. 1. p. 92.

C. mas. All. Ped. - DC. Syn. C. et C. mas pumilio. Clus.  
H. 12, 13. C. Lob. ic. 2. p. 169.

In sylvis, sepibus. Vulgo. Corniolo, grugnale. Arb. Flo-  
ret Februario-Martio. Fl. lutei.

211. SANGUINEA. L. Ramis rectis: foliis ovatis concoloribus:  
cymis depresso. L' Herit. - W. Sp. - Pers. E. - Savi Tr.  
d. Alb. 1. p. 90.

C. sanguinea. All. Ped. - Smith Br. - Lois. G. - DC. Syn.  
C. foemina. Lob. ic. 169. Virga sanguinea. Dod. Pempt. 782.

Ad sepes communis. Vulgo: Sanguinella. Frut. Floret  
April. Majo. Fl. albi.

Sect. VI. Flores apetali.

(70) ALCHEMILLA.

212. APHANES. Leers. Foliis tripartitis, laciinis trifidis pu-

besceribus : floribus axillaribus , glomeratis , monandris . *W. Sp.* - *Lois. G.* - *Savi. B. Etr.* 2. p. 99.

- A.** arvensis . *Smith Br.\** - *DC. Syn.* *Aphanes arvensis* . *L.* - *Pers. E.* *Alchemilla minima montana*, *Col. ephr.* 145.t. 146. In plateis urbis , ruderatis , agris . *Sulla Piazza di S. Pietro* , sul *Tempio della Pace* , etc. *Ann. Floret Aprili* . Fl. herbacei minimi . - *Plantula* 1-2-pollicaris .

## TETRANDRIA DIGYNIA.

## (71) CUSCUTA.

*Agosto 1801.* 213. **EUROPEA** . *L.* Floribus sub-sessilibus ; corolla 4-5-fida ; staminibus basi nudis ; stigmatibus acutis . *DC. Syn.* ( sub *C. majore* ).

*C. europaea* . *Smith Br.* - *Lois. G.* *C. vulgaris* . *Pers. E.* *C. europea*  $\alpha$ . *W. Sp.* *C. major*. *C. B. P.* 219.

Parasitica in urticis , cannabi , carduis . *Ann. Floret aestate* . Fl. albi .

214. **EPITHYMMUM** . *L.* Floribus sessilibus ; corollis 4-fidis ; staminibus basi squama crenata instructis ; stigmatibus simplicibus . *DC. Syn.* ( sub *C. minore* ).

*C. epithymum* . *Smith Br.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *C. europaea*  $\beta$ . *W. Sp.* *Epithymum sive cusenta minor*. *C. B. P.* 219.

Parasitica in ericis , thymis , plantaginibus , etc. *Ann. Floret aestate* : Fl. albi .

*Praecedenti minor* , et frequentior .

## TETRANDRIA TETRAGYNIA.

## (72) ILEX.

215. **AQUIFOLIUM** . *L.* Foliis acutis , spinosis , nitidis , undulatis ; floribus axillaribus , sub-umbellatis . *Ait.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Savi Tr. d. alb.* 1. p. 126.

*I. aquifolium* . *All. Ped.* - *Smith Br.* - *Lois. G.* *Agrifolium* . *Dod. Pempt.* 758.

In montium sylvis communis . *Intorno Albano* , alla *Tolfa* , etc. *Vulg. Agrifoglio* . Arb. *Floret Majo* . Fl. albi .

## (73) POTAMOGETON.

216. **NATANS** . *L.* Foliis natantibus , petiolatis , ellipticis acutis basi rotundatis sub-cordatis . *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.*

*P. natans* . *All. Ped.* - *Smith Br.\** *P. Dod. Pempt.* 582.

In stagnis : intorno ad Ostia . Perenn. *Floret Majo* . Fl. fuscovirides .

217. **CRISPUM** . *L.* Foliis lanceolatis , alternis oppositis , undulatis ; stipulis lacero-ciliatis . *DC. Syn.*

*P. crispum* . *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.*

## TETRANDRIA TETRAGYNIA.

83

In rivulis, fontibus vulgaris; herba submersa. Perenn. Floret Majo. Fl. sub-virides emersi.

218. MARINUM. L. Foliis linearibus alternis distinctis, inferne vaginantibus. L. - All. Ped. - W. Sp. - Lois. G. P. marinum. DC. Syn. P. pectinatum  $\beta$ . maritimum. Smith Br. et plur. auctor. P. ingens gramineo folio longiori. Vaill. Par. t. 32. f. 5.

In stagnis salsis. Presso Ostia, Castel Fusano .... Perenn. Floret Majo. Fl. spurco-virides.

## (74) RUPPIA.

219. MARITIMA. L. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn.

Bucciferrea maritima foliis acutissimis. Mich. N. Pl. G. 72. t. 35. Potamogeton maritimum gramineis longioribus foliis, fructu fere umbellato. Rati Syn. 154. t. 6. f. 1.

In stagnis maritimis, salsis. A Terracina .... Ann. Floret aestate. Fl. spurco-virides.

## (75) SAGINA.

220. PROCUMBENS. L. Caulibus glabris procumbentibus. Pers. E. - DC. Syn.

S. procumbens. All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Lois. G. Al sine pusilla graminea, etc. Segu. Veron. 421. t. 5. f. 3. In aridis, arenosis frequens. Ann. Floret Aprili, Majo. Fl. albidi.

221. APETALA. L. Caule erectinculo pubescente; floribus sub-apetalis. Pers. E.

S. apetala. All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Lois. G. - DC. Syn. S. caulinus erectis radice annua, floribus apetalis. Ard. Sp. 2. t. 8. f. 1.

In siccioribus, arenosis, collibus frequens. Al Pigneto - Sacchetti, etc. Ann. Floret Aprili. Fl. herbacei.

222. ERECTA. L. Caule erecto, glabro, sub-unifloro: foliolis calycinis acutis; capsula 1-loculari.

S. erecta. All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Lois. G. - DC. Syn. Alsinella erecta. Moench. Moenchia quaternella. Ehrh. Moenchia glauca. Pers. E. Alsine verna glabra. Vaill. Par. 6. t. 3. f. 2.

In collibus, glareosis, sterilibus frequens. A Capo di Bo ve, nella Macchia de' Mattei, etc. Ann. Floret Aprili. Fl. albi.

## CLASSIS V.

## PENTANDRIA.

## ORD. MONOGYNIA.

Sect. I. Flores monopetalii, inferi, 1-5-spermii ( seminibus nudis, aut corticatis).

- (76) *HELIOTROPIUM*. Calix tubulosus 5-dentatus. Corolla hypocrateriformis, 5-fida, dentibus 5 interjectis, fauce nuda. Semina 4.
- (77) *LITHOSPERMUM*. Calix 5-partitus. Corolla infundibuliformis, 5-loba, fauce percisa nuda. Genitalia inclusa. Semina 4.
- (78) *PULMONARIA*. Calix prismatico-pentagonus, 5-fidus. Corolla infundibuliformis, erecto-patens, fauce nuda. Semina 4.
- (79) *ECHIUM*. Calix 5-partitus. Corolla tubo brevi, limbo ampliore, campanulato, oblique quinquelobo, inaequali, fauce nuda. Semina 4.
- (80) *ONOSMA*. Calix 5-oaritus. Corolla tubulosovenitcosa, limbo erecto 5-dentato, fauce nuda. Semina 4.
- (81) *CERINTHE*. Calix 5-fidus. Corolla tubulosoventricosa, 5-fida, fauce nuda. Stamina vix exerta. Nuces 2, bilobares, dispermæ.
- (82) *SYMPHYTUM*. Calix 5-fidus. Corolla tubulosovenitcosa, limbo erecto 5-dentato, fauce clausa squamis subulatis conniventibus. Semina 4.
- (83) *MYOSOTIS*. Calix 5-fidus. Corolla hypocrateriformis, limbo plano 5-lobo, fauce clausa squamulis convexis. Semina 4.
- (84) *ANCHUSA*. Calix 5-fidus. Corolla infundibuliformis, limbo 5-fido integro, fauce clausa squamulis ovatis preminulis. Semina 4, basi insculpta.
- (85) *CYNOGLOSSUM*. Calix 5-partitus. Corolla brevis, infundibuliformis, 5-fida, fauce clausa squamulis convexis. Semina 4 depressa, interiorē latere stylo affixa.
- (86) *LYCOPSIS*. Calix 5-fidus. Corolla infundibuliformis tubo incurvato, limbo inaequali 5-fido, fauce clausa squamulis convexis. Semina 4.
- (87) *BORAGO*. Corolla rotata 5-loba, fauce clausa squamulis obtusis emarginatis. Semina 4, calice connivente cincta.
- (88) *PLUMBAGO*. Calix tubulosus, glanduloso-hispidus 5-dentatus. Corolla infundibuliformis, limbo 5-lobo tubo elongato. Filamenta basi dilatata. Stigma 5-fidum. Semen unicum oblongum, tunicatum.

- Sect. II. Flores monopetali, inferi, angiospermi.
- (89) *ANAGALLIS*. Corolla rotata 5-loba. Filamenta hirsuta. Capsula globosa circumscissa.
- (90) *LYSIMACHIA*. Corolla rotata 5-fida. Capsula globosa, mucronata, apice dehiscens, 10-valvis.
- (91) *PRIMULA*. Calix 5-dentatus. Corolla hypocrateriformis, tubo cylindrico, fauce pervia non glandulosa. Stigma globosum. Capsula 1-locularis, multivalvis.
- (92) *CYCLAMEN*. Corolla monopetala, tubo urceolato brevissimo, limbo 5-partito reflexo. Capsula carnosa, globosa, 5-valvis.
- (93) *SAMILUS*. Corolla hypocrateriformis, quinque-fida, squanis 5 filiformibus interstincta. Stamina imo tubo inserta. Capsula 1-locularis, semi-infera.
- (94) *VERBASCUM*. Corolla rotata, 5-loba, inæqualis. Filamenta inclinata, saepius barbata. Capsula 2-locularis, 2-valvis, subovata.
- (95) *HYOSCIAMUS*. Corolla infundibuliformis, limbo oblique quinquelobo inæquali. Stamina inclinata. Capsula operculata, bilocularis.
- (96) *DATURA*. Calix tubulosus 5-angulatus, deciduus, basi orbiculata persistente. Corolla infundibuliformis, 5-pliata, 5-acuminata. Capsula bilocularis, 4-valvis.
- (97) *ATROPA*. Corolla campanulata. Stamina dstantia. Baccæ globosa, 2-locularis, calyci insidens.
- (98) *PHYSALIS*. Corolla campanulato-rotata. Antheræ conniventes. Baccæ globosa, calyce ampliato vesicario tecta.
- (99) *SOLANUM*. Calix persistens. Corolla rotata aut campanulata 5-loba, 5-pliata. Antheræ apice poro gemino dehiscentes. Baccæ 2-locularis, polysperma.
- (100) *CONVOLVULUS*. Corolla campanulata 5-pliata. Stigma bifidum. Capsula 2-3-4- locularis, loculis 1-2-spermis.
- (101) *VINCA*. Corolla hypocrateriformis, fauce pentagona, limbo 5-lobo, plano. Folliculi dæo erecti, angusti. Semina oblonga, nuda.
- (102) *CHIRONIA*. Calix 5-fidus. Corolla infundibuliformis, limbo 5-lobo. Stamina 5 tubo corollæ inserta. Antheræ demum spirales. Stylus declinatus. Capsula supera, valvis binis inflexis bilocularis.
- Sect. III. Flores monopetali superi.
- (103) *CAMPANULA*. Corolla campanulata 5-fida. Filamenta basi latiora. Stigma 3-5-fidum. Capsula longissima prismatico-cylindrica, 2-3-locularis, apice dehiscens.
- (104) *PRISMATOCARPUS*. Corolla rotata, pliata, 5-loba. Capsula longissima prismatico-cylindrica, 2-3-locularis, apice dehiscens.

- (105) *TRACHELIUM*. Corolla infundibuliformis, tubo elongato. Stylus exertus, stigma globosum. Capsula 3-lo-  
cularis.
- (106) *JASIONE*. Flores aggregati, involucro polyphylo. Calix 5-partitus. Corolla rotata, 5-fida, lacinia linearibus.  
Antherae coalitae ad basin. Capsula 5-gona, 2-lo-  
cularis, calyce coronata.
- (107) *LONICERA*. Calix 5-dentatus. Corolla tubulosa, 5-fida, irregularis. Baccia 2-3-4-lo-  
cularis, polysperma.
- Sect. IV. Flores pentapetali inferi.
- (108) *EVONYMUS*. Calix planus 5-fidus. Corolla 5-petala.  
Capsula 5-gona, 5-lo-  
cularis 5-valvis. Stamina glandu-  
lis 5-imposta. Semina 5 calyprata. (Interdum partium  
numerus quadrinarius).
- (109) *RHAMNUS*. Calix urceolatus 4-5-fidus. Petala 4-5 mi-  
nima, squamiformia, calyci inserita. Stigma 2-3-4-fidum.  
Baccia 2-4-lo-  
cularis, 2-4-sperma.
- (110) *VITIS*. Petali 5 apice coherentia, emarginata. Baccia  
1-lo-  
cularis 5-sperma.
- (111) *VIOLA*. Calix 5-partitus, lacinia basi appendiculatis.  
Corolla irregularis, petalis 5 inaequalibus, supremum  
basi siccipius calcaratum. Antherae apice membranaceo  
siccipius coalitae. Capsula supera, uni-lo-  
cularis, 3-valvis.
- (112) *IMPATIENS*. Calix 2-phyllos. Corolla 5-petala irreg-  
ularis, nectario cucullato. Antherae primo connatae.  
Capsula 5-valvis, elastice dissiliens.
- Sect. V. Flores pentapetali, superi.
- (113) *HEDERA*. Petala 5 oblonga. Antherae basi bifurcate.  
Baccia 5-sperma calyce cincta.
- Sect. VI. Flores apetali.
- (114) *THESIUM*. Calix monophyllus 4-5-fidus, summo tubo  
stamina ferens. Corolla nulla. Nux infera manosperma,  
calice persistente coronata.

## ORD. DYGYNIA.

Sect. I. Flores apetali.

- (115) *HERNIARIA*. Calix 5-partitus. Corolla nulla. Filamen-  
ta 5 sterilia, staminibus alterna. Capsula 1-sperma  
non dehiscens calyce tecta.
- (116) *CHENOPODIUM*. Calix 5-phyllos, 5-gonus, persistens,  
immutatus. Corolla nulla. Semen unicum lenticulare,  
superum.
- (117) *ATRIPLEX*. Polygamomonoica. Fl. hermaphr. Calix  
5-phyllos. Corolla nulla. Stylus bipartitus. Semen 1  
depressum, fl. foem. Calix 2-phyllos. Semen 1 com-  
presso.

- (118) *BETA*. *Calix 5-phyllo*. *Corolla nulla*. *Semen reniforme intra substantiam baseos calycis*.
- (119) *SALSOLA*. *Calix 5-phyllo*, *demum capsularis appendice scariosa in laciniarum dorso accretus*. *Corolla nulla*. *Stylus 2-3-fidas*. *Semen 1 cochleatum*.
- (120) *ULMUS*. *Calix 4-5-dentatus*, *coloratus*, *persistens*. *Corolla nulla*. *Stamina 3-6*. *Samara sub-orbiculata*, *compresso-plana*, *membranacea*, *medio intumescens*, *mono-sperma*.
- (121) *CELTIS*. *Poligamo-monoica*. *Fl. herm.* *Calix 5-partitus*. *Coroll: nulla*. *Drupa globosa*, *monosperma*. *Fl. masc.*  
*Calix 6-partitus*. *Stamina 6*.
- Sect. II. Flores monopetali.
- (122) *GENTIANA*. *Corolla basi tubulosa*, *campanulata*, *aut infundibuliformis limbo 4-10-fido*. *Capsula supera*, *1-lo-  
cularis*, *2-valvis*. *Semina plurima valearum marginibus  
inserta*.
- Sect. III. Flores 5-petali, superi, dispermi. (*Umbelliferae*)\*)
- (123) *ERYNGIUM*. *Involucrum polyphyllum*. *Flores sessiles*, *capitati*, *palpis intermixti*. *Calix proprius 5-phyllo*, *superus*. *Petala 5*, *oblonga*, *inflexa*. *Fructus coro-natus*, *bipartibilis*.
- (124) *SANICULA*. *Umbellae confertae*, *subcapitatae*. *Petala apice inflexa*. *Fructus aculeatus*, *non bipartibilis*. *Flo-  
res disci abontientes*.
- (125) *ECHINOPHORA*. *Umbellae flores marginales masculi*, *pedicellati*; *centralis femineus*, *sessilis*. *Semen perfectum unicum*, *umbellulae receptaculo incrassato immersum*.
- (126) *HYDROCOTYLE*. *Involucrum 4-phyllo*. *Umbella sim-  
plex*. *Petala integra aequalia*, *Semina semi-orbiculata*, *compressa*.
- (127) *BUPLEURUM*. *Involucrum 3-5-phyllo*, *sæpius um-  
bella majus*, *interdum monophyllum*, *vel nullum*. *Peta-  
la integra tequalia*, *involuta*. *Fructus sub-rotundus*, *compressus*, *striatus*. - *Folia ind'visa*. *Fl. lutei*.
- (128) *TORDYLIUM*. *Involucra polyphylla*, *simplicia*. *Petala inflexo-cordata*; *exteriora radii majora*, *bifida*. *Fructus orbicularis*, *margine calloso crenato*. *Semina plana*.
- (129) *CAUCALIS*. *Involucrum polyphyllum foliolis indigisis*, *vel nullum*. *Petala inflexo-cordata*; *radii exteriora ma-  
jora*, *emarginata*. *Fructus ovali-oblongus*, *setis hi-  
spidus*.

\*) Hujusc sectionis genera quibus non insunt lutei flores, albis vel purpurascenibus constanter donantur.

- (130) *DAUCUS*. *Involucrum foliolis pinnatifidis*. *Petala inflexo-cordata*; *exteriora radii majora*. *Fructus ovatus*, *striatus*, *hispidus*. *Umbella florens plana*, *fructifera concavo-contracta*.
- (131) *AMMI*. *Involucrum foliolis pinnatifidis*. *Petala inflexo-cordata*, *in radio inaequalia*. *Flosculi omnes hermaphroditi*. *Fructus subrotundus*, *laevis*, *striatus*.
- (132) *CONIUM*. *Involucrum polyphyllum*. *Involucella dimidiata sub-tri-phylla*. *Petala inaequalia*, *inflexo-cordata*. *Fructus sub-globosus*, *seminibus 5-costatis*, *costis crenulato-crispis*.
- (133) *CRITHMUM*. *Involucra polyphylla simplicia*. *Petala subaequalia*, *integra*, *apice inflexa*. *Fructus ovalis*, *compressus*, *striatus*.
- (134) *FERULA*. *Involucra polyphylla*, *simplicia*; *universale caducum*. *Petala integra*, *subaequalia*, *apice inflexa*. *Fructus ovalis*, *presso-planus*, *seminibus dorso trinerviis*. - *Fl. lutei*.
- (135) *LASERPITIUM*. *Involucra polyphylla simplicia*. *Petala patentia*, *emarginata*, *apice inflexa*. *Fructus oblongus*. *Semina costis 4 membranaceis*.
- (136) *BRIGNOLIA*.\*\*) *Involucra polyphylla foliolis filiformibus reflexis*. *Petala integra*, *aequalia*, *inflexa*. *Semina cylindracea*, *striata*, *glabra*. - *Fl. lutei*.
- (137) *ANGELICA*. *Involucra polyphylla*; *universale saepe nullum*. *Petala aequalia*, *lanceolata*, *incurva*. *Fructus subrotundus*, *angulatus*, *solidus*, *stylis reflexis*.
- (138) *SIUM*. *Involucra polyphylla*, *interdum universale subnullum*. *Umbella multiradiata*. *Petala cordata*, *inflexa*, *subaequalia*. *Fructus sub-ovatus*, *compressus*, *striatus*.
- (139) *SISON*. *Involucra sub-4-phylla*. *Umbellae pauci-radiatae*. *Petala lanceolata*, *inflexa*, *subaequalia*. *Fructus ovatus*, *striatus*.
- (140) *OENANTHE*. *Involucra simplicia*; *universale 1-polyphyllum*, *vel nullum*. *Flores disci sessilis*, *steriles*; *petalis inflexo-cordatis*, *sub-aequalibus*; *radii majoribus*, *diformibus*. *Fructus oblongus*, *aut ovatus*, *sulcatus*, *calyce stylisque coronatus*.
- (141) *PHELLANDRIUM*. *Involucrum nullum*. *Involucella polyphylla*, *simplicia*. *Flosculi omnes fertiles*, *disci minores*, *petalis inflexo-cordatis*. *Fructus ovatus*, *sub-compressus*, *vix sulcatus*, *calyce stylisque coronatus*.
- (142) *SCANDIX*. *Involucrum nullum*. *Involucella polyphyl-*

\*\*) Genus a cl: Bertolonio conditum, in Diar. Bot. Paris, ann. 1813.  
T. 2. evulgatum.

- la . Petala inaequalia , emarginata . Fructus tenuiter striatus , sub-hispidus , rostro longissimo terminatus .*
- (145) *CHÆROPHYLLUM . Involucrum nullum . Involucella polyphylla reflexa . Petala emarginata , inaequata . Fructus oblongus , gluber , striatus , aut laeviusculus , stylo persistente coronatus .*
- (144) *SESELI . Involucrum nullum , vel sub-monophyllum . Involucella 1-polyphylla , simplicia . Umbellulae sub-globosae . Petala aequalia , inflexo-cordata . Fructus parvus , ovatus , striatus .*
- (145) *PASTINACA . Involucra 1-poly-phylia simplicia , vel nulla . Petala integra , incurva , subaequalia . Fructus ellipticus compresso-planus . - Fl. lutei .*
- (146) *SMYRNIUM . Involucrum , et involucella nulla . Petala acuminata , carinata , sub-aequalia . Fructus sub-ovatus , gibbosus . Semina semi-lunata , dorso costis 3 prominulis instructa . - Fl. lutei .*
- (147) *ANETHUM . Involucrum et involucella nulla . Petala aequalia , integra , involuta . Fructus sub-ovatus compressus . Semina hinc plana , inde convexa , 5-costata . - Fl. lutei .*
- (148) *PIMPINELLA . Involucrum , et involucella nulla . Petala sub-aequalia , integra , inflexo-cordata . Stigma sub-globosa . Fructus ovali-oblongus , striatus .*
- (149) *APIUM . Involucrum sub-monophyllum . Petala aequalia , sub-rotunda , apice inflexa . Fructus sub-ovatus . Semina externe convexa , costis 5 parvis , prominulis . - Fl. lutei .*
- (150) *ÆGOPODIUM . Involucrum et involucella nulla . Petala inflexo-cordata , inaequalia . Fructus ovali-oblongus , utrinque 3-5-costatus .*

## ORD. TRIGYNIA.

- (151) *VIBURNUM . Calix 5-partitus , superus , bracteolatus . Corolla campanulata , 5-fida . Bacca monosperma .*
- (152) *SAMBUCUS . Calix 5-partitus , superus . Corolla rotata , 5-fida . Bacca 1-loccularis , 3-sperma .*
- (153) *STAPHYLEA . Calix 5-partitus , inferus . Petala 5 . Capsulae sub-binae , vesicariae , basim versus coalitae . Semina sub-bina , ossea , sub-globosa , ad hylum truncata . Styli 2-3 .*
- (154) *PALIURUS . Calix 5-fidus , inferus , patens . Petala 5 , squamiformia . Drupa oricularis , peltata , cortice suberosa , margine alato , trilocularis , trisperma .*
- (155) *TAMARIX . Calix 5-partitus , inferus , persistens . Petala 5 . Capsula 1-loccularis , triplatis . Semina conia instructa .*

## ORD. PENTAGYNYA.

- (156) *ARMERIA*. Flores capitati, bractea reflexa tubulosa. Involucrum polyphyllum: receptaculum p. leaceum. Calix proprius 1-phyllo, plicatus, scariosus. Petala 5. Capsula evalvis monosperma, calyce tecta.
- (157) *STATICE*. Flores distincti. Calix monophyllus integer, plicatus, scariosus. Petala 5. Capsula evalvis, monosperma, calyce tecta.
- (158) *LINUM*. Calix 5-phyllo. Petala 5 unguiculata. Filamenta basi sub-coalita. Capsula globosa, mucronata, multilocularis, multivalvis: loculis monospermis.
- 

## PENTANDRIA MONOGYNYA.

*Sect. I. Flores monopetalii, inferi, 1-5-spermi. Semina nuda aut tunica corticata.*

- (76) *HELIOTROPIUM*.
223. *EUROPÆUM*. L. Foliis ovatis, integerrimis, tomentosis, rugosis; spicis conjugatis: caule erecto herbaceo. DC. Syn. H. europaeum. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. H. majus. Clus. II. 2. p. 46. H. majus Dioscoridis. Hort. Rom. 2. t. 33.  
Ad vias, in arvis communis. Ann. Floret Augusto, Septem-  
bri. Fl. albi, inodori.
- (77) *LITHOSPERMUM*.
224. *OFFICINALE*. L. Seminibus laevibus: corollis calycem vix superantibus; foliis lanceolatis, acutiusculis, veno-  
sis. Smith Br.  
L. officinale. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. L. majus erectum. Hort. Rom. 2. t. 29.  
In pascuis circa urbem minus frequens. A Fiumicino... Perenn. Floret Majo. Fl. albidi.
225. *ARVENSE*. L. Seminibus rugosis: corollis calyceem vix superantibus: foliis ligulatis, obtusis, aeniis.  
L. arvense. All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Echiodes flore albo. Riv. t. 9.  
In arvis, segete, muris siccis communis. Perenn. Floret Majo, Junio. Fl. lactei.
226. *PURPUREO-COERULEUM*. L. Seminibus laevibus: corollis calyceem multoties superantibus: foliis lanceolatis acutis: caulis erectis; sterilibus repentibus.  
L. purpureo-coeruleum. All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. L. umbellatum latifolium. Bocc. Sic. 75. t. 40, 41. L. majus flagellis oblongis. Hort. Rom. 2. t. 28.
- Scanno 1871  
3. Maggio 1880  
18  
14. aprile 1871  
15. D. 1871  
15. 1871  
15. 1871

- In umbrosis , nemorosis vulgare . Perenn. Floret Aprili ,  
Majo . Fl. a rubro ad coeruleum
227. APULUM . Vahl. Seminibus muricatis : foliis linearis-lan-  
ceolatis acutis : spicis terminalibus secundis ; bracteis  
lanceolatis . Vahl Symb. 2. - W. Sp. - DC. Syn.
- Myosotis apula . L. - All. Ped. - Lam. ill. - Lois. G. -  
Pers. E. Echioides lutea minima apula campestris . Col.  
Ecphr. 1. p. 184. t. 192.
- In pratis maritimis : presso Civitavecchia ... Ann. Floret  
Majo . Corolla lutea calyce parum longior .
- (78) PULMONARIA .
228. OFFICINALIS . L. Foliis radicalibus ovato-cordatis scabris,  
L. - All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. Lois. G. - DC. Syn.
- P. maculosa . Lob. ic. 586. P. italorum . Hort. Rom. 2. t. 26.
- In montium sylvis frequens . Presso Albano , Rocca di  
Papa , etc. Perenn. Floret Aprili . Fl. a purpureo ad coe-  
ruleum . Folia maculis albis notata .
- (79) ECHIUM .
229. ITALICUM . L. Strigoso-hispidum : caule stricto : foliis  
lineari-lanceolatis : corollis extus pilosis , limbo sub-  
aequali , staminibus longe exsertis .
- E. italicum . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. -  
Lois. G. E. flore albo . Camer. Ep. 738. E. majus flore al-  
bo . J. B. H. 3. p. 588.
- In pascais , ad vias commune . Bienn. Floret Junio , Julio .  
Corollae albae leviter pilosae .
230. VULGARE . L. Caule tuberculato-hispido , herbaceo; foliis  
caulinis lanceolatis hispidis ; floribus spicatis lateralibus .
- L. - All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn.
- E. vulgare . Smith Br.\* - Clus. H. 3. p. 143. E. Dodon.  
Pempt. 631.
- Ad vias , in incultis commune . Bienn. Fl. Julio , Augusto .  
Fl. obscure violacei . - Variat planta strigosa , et hispida .
231. VIOLACEUM . L. Caule hirsuto herbaceo : foliis caulinis  
cordato-oblongis , hirsutis : corollis tabo brevissimo , lim-  
bo expanso , stamina glabra aequantibus .
- E. violaceum . W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn.
- Ad vias , in arvis vulgare . Ann. Floret Majo , Junio , Fl. a  
rubro ad violaceum .
- (80) ONOSMA .
232. ECHIOIDES . L. Corollis cylindricis , obtusis ; fructibus  
erectis ; foliis lanceolatis , hispidis . W. Sp. - Pers. E. -  
DC. Syn. - Savi 2. Cent. p. 51.
- O. echioides . All. Ped. - Lois. G. Anchusa echioides lutea ,  
cerinthes flore , montana . Col. Ecphr. 1. p. 182. Anch.  
lutea major . Hort. Rom. 2. t. 32.
- In sterilibus montosis arvis . A Santo Polo ... Perenn. Flo-  
ret Junio , Augusto . Fl. luteoli .

## (81) GERINTHE.

253. *ASPERA*. *Roth Cat.* 1. p. 33. Corollis obtusis, patulis, calyce longioribus. foliis sub-ciliatis asperis. *DC. Syn.*  
*C. aspera*. *W. Sp.* - *Lois. G.* *C. major*  $\beta$ . *L.  $\beta$* ? *aspera. Pers. E.*  
*C. quorundam major*. *Hort. Rom.* 1. t. 12.  
 In agris, cultis, ad sepes communis. Ann. Floret Aprili, Majo. Fl. lutei basi saepe purpurascentes.

## (82) SYMPHYTUM.

254. *OFFICINALE*: *L.* Foliis ovato-lanceolatis decurrentibus. *L.* - *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.*

*S. consolida major*. *Hort. Rom.* 2. t. 30.  
*S. Purpureum*. Calice patente. *Pers. E.*  
*S. patens*. *Sibth. Ox.* 70.

Ad fossas, in pratis humidis frequens:  $\beta$  alle *Paludi Pontine*... Perenn. Floret Majo, Junio. Fl. albi, in  $\beta$  purpurei.

- 4. Apriile 1801*  
*15. 1800*  
 255. *TUBEROSUM*. *L.* Foliis ovato-oblongis; inferioribus petiolatis, petiolo alato; floralibus oppositis sessilibus, semi-decurrentibus.

*S. tuberosum*. *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *S. majus tuberosa* radice. *Hort. Rom.* 2. t. 31.

In fossis, umbrosis communis. Perenn. Floret Aprili, Majo. Fl. albo-luteoli. Radix alba, quae in praecedenti nigra.

## (83) MYOSOTIS.

- 27. Apriile 1801*  
*18. 18. 1800*  
 256. *SCORPIOIDES*. *W. Sp.* Seminibus laevibus: foliis lanceolato-ligulatis, scabris, nudiusculis: tubo corollae calycibus sub-longiore.

*M. scorpioides*. *Pers. E.* *M. perennis*. *Moench.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *M. palustris*: *All. Ped.* - *Roth.* - *Lam. Fl. Fr.* - *Savi 2. Cent.* p. 50. *M. scorpioides*  $\beta$  *palustris*. *L. Sp.* *M. scorpioides*  $\delta$ . *Smith Br.* *Scorpiurus palustris*. *Moris. H. 3. s. 11. t. 31. f. 4.* *Scorpioides tertium*. *Dod. Pempt. 72.*

In montium umbrosis, sylvaticis communis. *Ad Alba-* no, etc. Perenn. Floret Majo, Junio. Corolla pulchre coerulea fauce lutea.

- 26. Apriile 1801*  
 257. *ARVENSIS*. *All. Ped.* Seminibus laevibus: caule basi ramoso, foliisque obovato-lanceolatis hirtis: corollae tubo calycibus breviore.

*M. arvensis*. *Hoffm.* - *Roth.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* *M. annua*. *Moench.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *M. scorpioides*  $\alpha$ . *L. Sp.* - *Smith Br.* *Alsine myosotis* sive *auricula muris*. *Lob. 461.*

Ad vias, in arvis, nemoribus vulgatissima. Ann. Floret Majo. Corolla coerulea, fauce luteola.

## (84) ANCHUSA.

258. *ITALICA*. *Retz Obs.* 1. p. 12. Caule exaltato; foliis luci-

- dis, strigosis, oblongis, utrinque attenuatis; racemis bipartitis; floribus fauce barbatis. DC. Syn.
- A. Italica. W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. A. officinalis. Lam. Enc. Buglossum perenne majus sativum. Moris. H. 3. s. 11. p. 438. t. 26. f. 1. Buglossa vulgaris. Dod. Pempt. 628. Ad vias campestres vulgaris. Perenn. Flore Junio, Julio. Fl. intense coerulei, fauce barbate alba.
239. ANGUSTIFOLIA. L. Foliis lanceolato-oblongis hirsutis integris; racemis conjugatis: calycibus 5-fidis acutis, fructiferis sub-erectis, vix inflatis.
- A. angustifolia. W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Buglossum angustifolium. All. Ped. B. angustifolium minus. Moris. H. 3. p. 438. s. 11. t. 26. f. 4. Borago sylvestris perennis flore rufo Kermesino. Zan. H. 49. t. 20. In agris, vineis, securis vias frequens. Perennis. Floret Majo, Junio. Fl. coeruleo-violacei. Varietas fl. roseo a nobis lecta all' Aricia.
240. HYBRIDA. Tenor. Fl. Neap. 1. p. 45. t. 11. Foliis oblongo-lanceolatis, sinuato-dentatis, undulatis (hirsutis): racemis confertis bipartitis; calycibus quinquefidis obtusiusculis; fructiferis inflatis cernuis: corolla clausa squamis brevibus obtusis. Tenor. l. c.
- Ad vias, in agris vulgaris. Perenn. Floret Aprili-Junio. Fl. coeruleo-violacei.
- Media videtur inter A. officinale, et A. undulatum Linnaei, quae forte hujus tantum varietates considerandae.
- (85) CYNOGLOSSUM.
241. PICTUM. Ait. Kew. 1. Foliis lanceolatis, tomentosis; superioribus basi cordatis; corollis calyci subaequalibus venosis: fructibus convexis. DC. Syn.
- C. pictum. W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. C. creticum. Vill. Delph. 2. - All. Auct. 4. C. folio molli, incano, flore coeruleo striis rubris variegato. Moris. H. 3. p. 449. In agris, viis, plateis frequens vulgo: lingua di cane. Bienn. Floret Aprili, Majo. Fl. pallide coerulei, vel purpurascentes venis atro-rubris picti.
- Pro officinali Cynoglosso adhibetur.
242. APENNINUM. L. Foliis tomentosis, ovato-lanceolatis acutis: staminibus corollam aequantibus.
- C. apenninum. W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Cynoglossa montana frigidarum regionum. Col. Ecphr. 1. p. 168. t. 170.
- In montosis sylvaticis. Sul Monte Gennaro .... Perenn. Floret Junio. Fl. coerulei.
- (86) LYCOPSIS.
243. BULLATA. Cyr. Pl. Neap. Fasc. 1. p. 34. t. 11. f. 5.\* Caulibus procumbentibus; foliis bullatis, strigoso-hispidis, ovato-lanceolatis, sub-repando-dentatis, sessilibus; ra-

6  
aprilie 1891  
10.10.1892

9 Maggio

dicalibus sub-spathulatis: calycibus florescentibus erectis.  
In montium apricis, saxosis. *Sul Campo d' Annibale in  
gran copia, presso Acqua-pendente, etc.* Ann. Floret  
Martio-Majo. Fl. purpurei, demum coerulei.  
Caules procumbentes, vel adscendentes, saepe purpura-  
scentes. Folia hispida, callis albis, nitidis, prominulis  
adspersa, margine sub-repanda, lanceolata, vel sub-ova-  
ta, acuta, semi-amplexicaulia; radicalia basim versus at-  
tenuata, obtusa.

## (87) BORAGO.

- April 1801  
9 May 1800*
244. OFFICINALIS. *L. Hispida*: foliis alternis, caulinis sessi-  
ibus; pedunculis ramosis; calycibus patentibus.  
*B. officinalis*. *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Lois. G.* - *DC.*  
*Syn. B. Dodon. Pempt.* - *Hort. Rom. 2. t. 20, 21.*  
In viis campestribus, cultis, vineis communis. Vulgo: *bora-  
gine*. Ann. Floret Aprili, Majo. Fl. coerulei, inter-  
dum albi, aut carnei.

## (88) PLUMBAGO.

- 51 Ago  
1821*
245. EUROPEA. *L. Folii sebris; ovato-lanceolatis, basi au-  
ri culata amplexicaulibus.*  
*P. europaea*. *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC.* *Syn.* - *Savi 2.*  
*Cent. p. 52.* \* *Tripolium Dioscoridis*. *Col. Ecphr. 1.p. 160.*  
*t. 161. Pl. quoruudam*. *Hort. Rom. 2.t. 39.*  
In sepibus omnibus, ad vias etiam urbis vulgaris. Perenn.  
Suffr. Floret Julio - Septembri. Fl. purpureo-violacei.  
*Sect. II. Flores monopetali, inferi, angiospermi.*

## (89) ANAGALLIS.

246. ARvensis. *L. Caule diffuso nudo: petalis integris, pla-  
nis, margine pilis capitatis*. *Pers. E.*  
*A. phoenicea*. *All. Ped.* - *DC.* *Syn.* - *Lois. G.* *A. mas.*  
*Villars. Delph.* *A. arvensis* *a.* *Smith Br.* - *b. W. Sp.*  
*A. phoeniceo flore*. *Hort. Rom. 2. t. 45.*  
In arvis, marginibus viarum vulgaris. Ann. Floret Majo.  
Fl. rubri.

247. COERULEA. *All. Ped.* Caule erectiusculo, sub-alato, pe-  
talibus dentatis, demum reflexis. *Pers. E.*  
*A. coerulea*. *Lois. G.* - *DC.* *Syn.* *A. arvensis* *a.* *W. Sp.* -  
*γ. Smith Br.* *A. foemina*. *Vill. Delph.* - *Camer. Epit. 395:*  
*A. coeruleo flore*. *Hort. Rom. 2. t. 46.*  
In arvis, marginibus frequens. Ann. Floret Majo. Fl. coe-  
rulei, rarius a bi.

## (90) LYSIMACHIA.

248. VULGARIS. *L. Folii oppositis ternisque, lanceolatis,  
panicula terminali*. *DC.* *Syn.*  
*L. vulgaris*. *All. Ped.* - *Smith Br.* \* - *W. Sp.* - *Pers. E.* -  
*Lois. G.* *L. lutea major*. *Hort. Rom. 2. t. 41.*  
Ad fossas et paludes vulgaris. *Al Portonaccio, alla Cappa-  
rella, etc.* Perennis. Floret Junio, Julio. Fl. flavi.

249. PUNCTATA. *L.* Foliis ternis, quaternisque, subsessilibus: caule erecto; pedunculis axillaribus verticillatis, unifloris.

*L.* punctata. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *L.* lutea secunda. *Clus. H. 2. p. 52. f. 2.*

Ad fossas cum praecedenti. Perenn. Floret Junio, Julio  
Fl. lutei, punctis notati.

## (91) PRIMULA.

250. ACAULIS. *All. Ped.* Foliis obovatis, oblongis, rugosis, dentatis: seapis unifloris: corollae limbo plano, tubo calycinis laciniis acuminatis vix longiore.

*P.* acaulis. *Jacq. Misc. 1.* - *Pers. E.* *P. grandiflora. Lam.* - *Lois. G.* - *DC. Syn. P. sylvestris. Scop. Carn. P. vulgaris. Huds.* - *Smith Br.\* Alisma sylvarum. Column. Phy-*  
*tob. t. 6. f. 1.*

In sylvis montosis. *A* monte Gennaro ... Perenn. Floret Februario, Martio. Fl. sulphurei.

## (92) CYCLAMEN.

251. HEDERAEOFOLIUM. *Ait. Kew. 1.* Foliis cordatis oblongis, acuminatis, angulatis, denticulatis: corollae laciniis lanceolato-linearibus elongatis.

*C. hederaefolium. W. Sp.* - *Pers. E.* - *C. hederaefolium α. Bertol. in Opusc. Scient. Bol. Fasc. 2. p. 75.* \* *C. vernum. Lob. ic. 605. Cyclaminus verno tempore florens. Clus. H. 2. p. 265. C. Aprile florens, etc. Hort. Rom. 2. t. 68.*

In umbrosis sylvaticis frequens. Nella Villa Borghese, intorno Albano, etc. Vulgo: pan-porcino. Perenn. Floret vere. Flores pulchre rosei.

252. NEAPOLITANUM, *Ten. Fl. Neap. Prod. Suppl. 1. p. 66.* Foliis hysteranthiis, cordato-oblongis, acuminatis, angulatis, denticulatis; corollae laciniis ovatis, obtusis.

*C. hederaefolium β. Bert. in Op. Scient. Bol. Fasc. 2. p. 74.* \* *C. europaeum. Savi Pis. 1. p. 213. Cyclaminus vulgo Pan-*  
*porcinus. Cesalp. de plant. p. 392. C. inodoro purpura-*  
*scente flore. Clus. H. 2. p. 265. C. orbicularis. Dod.*  
*Pempt. 337. C. folio hederae. Lob. ic. 605.*

In umbrosis sylvaticis ubique circa urbem, et in montosis; et hoc vulgo: pan-porcino. Perenn. Fl. Septembri, Octobri. Fl. pulchre rosei.

Diffrerit a precedente laciniis corollae latioribus, obtusioribus; radice ampliore, depressa; floribus ante folia erumpentibus, et florendi tempore. Gaeterum plane simile.

## (93) SAMOLUS.

253. VALERANDI. *L.* Caule erecto: foliis obtusis: racemo multifloro. *Pers. E.*

*S. Valerandi. All. Ped.* - *Smith Br.\* - W. Sp.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Bauh. H. 3. p. 791.* - *Hort. Rom. 2. t. 47.*

In uliginosis, sylvaticis opacis frequens. Intorno alle fon-

April 1801  
15. i. 1801

*tane della Piazza di S. Pietro, nella Villa Madama, etc.*  
Perenn. Floret Majo-Julio. Fl. albi.

## (94) VERBASCUM.

254. THAPSUS. *L.* Foliis decurrentibus utrinque tomentosis : caule simplici ; spica terminali , floribus confertis.

*V. thapsus.* *All. Ped.* - *Smith Br.\** - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *V. latius.* *Dod. Pempt.* 143. - *Hort. Rom.* 2. t. 53.

*In Giugno 1600.* In glareosis , viis , campis commune . Vulgo : *tasso barbas-*  
*so.* Bienn. Floret tota aestate . Fl. lutei.

255. PULVERULENTUM . *Vill. Delph.* 2. Foliis sessilibus ovato-  
oblongis sub-crenatis , utrinque pulverulento-tomentosis ;  
caulinis acuminatis semi-amplexicaulibus : caule tereti  
paniculato .

*V. pulverulentum.* *Smith Br.\** - *Pers. E.* - *Lois G.* - *DC. Syn.*  
*V. lychnitis a.* *W. Sp.* et pl. auct. *V. pulverulentum* flore  
luteo parvo . *J. B. H.* 3. p. 872 , 873.

*In arvis sterilibus, viis circa Romanam, et abunde intorno*  
*Marino, Castel Gandolfo, Albano, etc.* Bienn. Floret  
tota aestate . Fl. Intei grandiores , filamentis barbatis  
albis , antheris miniatis.

256. SINUATUM . *L.* Foliis radicalibus oblongis pinnatifido-  
repandis , tomentosis ; caulinis amplexi caulibus rameis-  
que cordatis nudiusculis . *DC. Syn.*

*V. sinuatum.* *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *V. ni-*  
*grum* foliis papaveris corniculati . *Camer. H.* 403. t. 403.  
*V. crispum* et *sinuatum* . *J. B. H.* 3. p. 822.

Ad margines viarum , in glareosis vulgare , et in ipsa ur-  
be. Bienn. Floret tota aestate . Fl. lutei.

257. BLATTARIA . *L.* Foliis amplexicaulibus , crenatis , ob'on-  
gis , glabris ; radicalibus sinuatis : pedunculis solitariis :  
caule ramoso . *DC. Syn.*

*V. blattaria.* *All. Ped.* - *Smith Br.\** - *W. Sp.* - *Pers. E.* -  
*Lois. G.* *Blattaria lutea.* *J. B. H.* 3. p. 874. - *Hort.*  
*Rom.* 2. t. 56. *B. Plinii. Lob. ic.* 554.

*In arvis, marginibus viarum vulgatissimum.* *Ann.* Floret  
Junio , Julio . Fl. lutei .

## (95) HYOSCIAMUS.

258. ALBUS . *L.* Foliis caulinis petiolatis , cordatis , sinuatis ,  
acutis , floralibus integerrimis ; floribus sub-sessilibus ;  
corellis ventricosis . *DC. Syn.*

*H. albus.* *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *H. albus ma-*  
*jor.* *Hort. Rom.* 1. t. 91.

*In ruderatis, ad muros frequens; copiose in Foro Romano.*  
*Ann.* Floret Junio-Augusto . Fl. albo-luteoli . - Herba fo-  
teus vi venenata narcotica metuenda .

## (96) DATURA.

259. STRAMONIUM . *L.* Pericarpis ovatis spinosis ; foliis ova-

*o. Agosto 1601.*

tis, sinuatis, glabris, basi in petiolum attenuatis. DC.  
Syn.

D. stramonium. Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G.  
Stramonium foetidum. Scop. Carn. - All. Ped. Solanum  
maniaeum Dioscoridis. Column. Phyt. 47.

In ruderatis, fimetis, ad vias prope pagos vulgaris. Ann.  
Floret Julio-Augusto. Fl. candidi magni. - Planta viru-  
lenta, narcotica, quam Americanam dicunt.

## (97) ATROPA.

260. BELLADONNA. L. Caule herbaceo : foliis ovatis integris.  
L. - W. Sp. - Lois. G.

A. belladonna. Pers. E. - DC. Syn. Solanum lethale. Dod.  
Pempt. 456. - Clus. II. 2. p. 86.

In montium sylvis. A Monte Gennaro ... Perenn. Floret  
Junio, Julio. Fl. obscure-purpurei.

## (98) PHYSALIS.

261. ALKERENGI. L. Foliis geminis, integris, acutis : caule  
herbaceo, inferne sub-ramoso. L. - W. Sp. - Pers. E. -  
Lois. G.

Ph. alkekengi. All. Ped. - DC. Syn. Solanum vesicarium.  
Dod. Pempt. 454. Alkekengi officinarum. Hort. Rom. 2.  
t. 65.

In umbrosis, sepibus, scrobibus frequens. A Villa Borghese,  
Villa Madama, etc. Perenn. Floret Junio. Fl. albidi.

## (99) SOLANUM.

262. DULCAMARA. L. Caule inermi, fruticoso, scandente, fo-  
liis cordatis, glabris, superioribus auriculatis : corymbis  
oppositifoliis. W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn.

S. dulcamara. All. Ped. - Lois. G. Dulcamara. Dod.  
Pempt. 402.

In humentibus, ad sepes frequens. Perenn. Floret Majo -  
Augusto. Fl. violacei.

263. NIGRUM. L. Caule inermi herbaceo ; foliis ovatis, den-  
tato-angulatis : racemis distichis, nutantibus. L. - W. Sp.  
(sub var. a.) - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn.

S. hortense. Dod. Pempt. 454. S. officinarum acinis ni-  
gricantibus. Hort. Rom. 2.t. 60.

In ruderatis, viis, olitorii commone. Ann. Floret Junio,  
Julio. Fl. albi.

264. VILLOSUM. Lam. Dict. 4. Caule inermi, herbaceo, api-  
ce villoso : foliis ovatis angulatis, sub-villosis, racemis  
nutantibus. DC. Syn.

S. villosum. W. En. H. Ber. - Lois. G. S. nigrum γ villosum.  
L. Sp. - W. Sp. S. nigrum \* villosum. Pers. E. S. annuum  
hirsutum baccis luteis. Dill. Elth. 365. t. 247. f. 353. S. of-  
ficinale acinis puniceis. Hort. Rom. 2.t. 61.

In cultis, viis cum praecedente commone. Ann. Fl. Ju-  
nio-Augusto. Fl. albi. Fructus lutei, vel rubelli.

18  
Giugno 180

## (100) CONVOLVULUS.

265. SEPIUM. *L.* Caule volubili; foliis sagittatis postice truncatis; pedunculis tetragonis, unifloris, bracteis cordatis maximis. *DC. Syn.*  
*C. sepium.* *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Savi B. Etr. 2.* p. 225. *Smilax laevis major.* *Dod. Pempt. 392.*  
 In sepibus sub-humidis communis. Vulgo: *campanella*. Perenn. Floret Majo, Junio. Fl. candidi.
266. ARVENSIS. *L.* Caule volubili; foliis sagittatis, utrinque acutis; pedunculis unifloris, bracteis linearibus. *DC. Syn.*  
*C. arvensis.* *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Savi B. Etr. 2.* p. 226. *Smilax laevis minor.* *Dod. Pempt. 393.*  
 In arvis, plateis passim. Vulgo: *corregidla*. Perenn. Floret Majo-aestate. Fl. albi extus purpurascentes.
267. CANTABRICA. *L.* Caule ramoso, erectiusculo: foliis linearie-lanceolatis, acutis, sericeis; pedunculis sub-bifloris; calycibus pilosis. *DC. Syn.*  
*C. cantabrica.* *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Savi B. Etr. 2.* p. 227. *Cantabrica quorundam Clus. H. 2.* p. 49.  
 In arvis siecioribus, collibus abunde. Perenn. Floret Junio-Julio. Fl. rosei.
268. ALTHEOIDES. *L.* Sericeo-argenteus: caule volubili; foliis radicalibus cordatis, crenatis; caulinis pinnatifido-lobatis, sub-palmatis, summis palmato-dissectis: pedunculis sub-unifloris.  
*C. altheoides.* *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Savi Bot. Etr. 2.* p. 226.\* *C. argenteus folio altheae.* *Bauh. Pin.* 295. *C. betonicae altheaeque foliis argenteus.* *Barr. ic. 312.*  
 In maritimis pascuis, collibus. *A Terracina, Ostia, Civitavecchia ...* Perenn. Floret Majo, Junio. Fl. rosei.
269. HIRSUTUS. *Ten. Fl. Neap. 1.* p. 60. t. 15. Caule volubili, hirsuto: foliis radicalibus cordatis rugosis, repandis, dentatis; caulinis palmato-incisis, hirsutis; pedunculis bifloris. *Ten. l. c.*  
*C. altheoides.* *DC. Fl. Fr. 6.* p. 423. et pl. auct.  
 In marginibus agrorum mare versus copiose. *A Ponte-Galera, intorno Civitavecchia, etc.* Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. rosei.
- Praecedente, cuius nomine ab autoribus pluribus salutatur, major; caule scandente, elatiore, herba atrovirenti hirsuta, scabra, nec sericeo-argentea, foliisque non adeo tenuiter dissectis donata.
270. TRICOLOR. *L.* Caule declinato: foliis lanceolato-oblongis, non lineatis; pedunculis axillaribus, unifloris, folio longioribus.

C. tricolor. W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn. - Targ. Istit. 2. p. 133. C. peregrinus coeruleus, folio oblongo, etc. Mo-  
nis. H. 2. p. 17. s. 1. t. 4. f. 4.

In agris Cornetanis: verso le Allumiere. Ann. Floret Majo, Junio. Fl. tricolores, fundo flavi, medio albi, disco pal-  
chre coerulei.

Bracteolae binae ultra medium pedunculorum. Tota sub-  
hirsuta, foliis et calycinis laciinis angustioribus, acutio-  
ribus quam in hortensi C. tricolore.

271. SOLDANELLA. L. Caule prostrato: foliis reniformibus gla-  
bris; pedunculis unifloris. DC. Syn.

C. soldanella. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E.-  
Lois. G. - Saci. B. Etr. 2. p. 227.\* C. maritimus nostras ro-  
tundifoliis. Moris. H. 2. s. 1. p. 11. t. 3. f. 2. - Hort. Rom. 1.  
t. 20.

In maritimis frequens. Ad Ostia, Fiumicino, etc. Perenn.  
Floret Majo, Junio. Fl. incarnati.

(101) VINCA.

272. MAJOR. L. Caulibus erectiusculis: foliis ovato-sub-ro-  
tundis, junioribus margine ciliatis: pedunculis solita-  
riis; calycinis dentibus setaceis.

V. major. Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn.  
Biv. Sic. Cent. 1. p. 83. Pervinca major. All. Ped. Clematis  
daphnoides major. Dod. Pempt. 406. Pervinca vulgaris  
Latifolia. etc. Hort. Rom. 1 t. 94.

In montium sylvaticis. Sul Monte Gennaro ... Perenn. Flo-  
ret Aprili, Majo. Fl. coeruleo-violacei.

273. MINOR. L. Caulibus procumbentibus: foliis lanceolato-  
ovatis, margine glabris: pedunculis solitariis, folio lon-  
gioribus; calycinis dentibus lanceolatis.

V. minor. Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn.  
Pervinca minor. All. Ped. Clematis Daphnoides. Dod.  
Pempt. 405. Pervinca vulgaris angustifolia. Hort. Rom. 1.  
t. 95.

In nemorosis, ad sepes frequens prope urbem. A Villa Bor-  
ghese, etc. Perenn. Floret Aprili. Fl. coerulei.

(102) CHIRONIA.

274. CENTAURIUM. Schmidt Bohem. Foliis oblongo-ovalibus,  
basi rosaceis, congestis; caule elongato; floribus fasci-  
culato-paniculatis, basi squamis 1-2 cinctis. Pers. E. (sub  
Erythraea Centaurio).

Ch. centaurium. W. Sp. - Smith Br.\* - Lois. G. - DC. Syn.  
Gentiana centaurium. L. Sp. - All. Ped. Centaurium mi-  
nus. Dod. Pempt. 336.

In sylvaticis, pascuis, herbidis communis, Offic: Centau-  
rea minore. Ann. Floret Júnio-Augusto. Fl. rosei.

275. PULCHELLA. Swartz Act. Holm. 1783. p. 85. t. 3. f. 8, 9.  
Caule ramosissimo, dichotomo-sub-corymboso; foliis,

2  
en Febbrō 1801  
Marzo 1801

## PENTANDRIA MONOGYNIA.

- oblongis; floribus solitariis, axillaribus terminalibusque, sub-pedunculatis, basi squamis destitutis: calycinis laci-  
niis subulatis, adpressis.
- Ch. pulchella. Smith Br.\* - Lois. G. - DC. Syn. Ch. Gerardi. Schmidt. Ch. centaurium & Gerardi. W. Sp. Erythraea ramosissima. Pers. E. E. pulchella. Flor. Ticin. 1. p. 110. Gentiana centaurium & L. Centaurium minus palustre, ramosissimum, flore purpureo. Vaill. Par. 32. t. 6. f. 1.
- In sylvaticis communis cum praecedente ejus vice sumitur. Ann. Floret Junio, Julio. Fl. rosei.
- A praecedente dignoscenda calyce profundius inciso laci-  
niis adpressis, corollae tubum fere aequantibus: squamis nullis ad basim florum axillarium: caule saepius humilio-  
re, ramosissimo.
276. LUTEA. Bertol. Rar. It. Pl. Dec. 2. p. 32.\* Foliis multi-  
nervibus, inferioribus ovatis, superioribus oblongo-lanceolatis: caule tetragono dichotomo-paniculato: corollae laci-  
niis ellipticis: floribus monogynis; stylo bifido. Ber-  
tol. l. c.
- Centaurium minus luteum, lalifolium, non perfoliatum. Barr. ic. 468. Centaurium luteum novum. Col. ecphr. 2.  
p. 78. t. 77. f. 2.
- In maritimis, et in collibus sterilibus circa urbem frequens.  
Ad Ostia, al Pigneto di Sacchetti, etc. (nei colli presso  
Ponte Salara Barr.) Ann. Floret Junio. Fl. citrino-lutei.  
Ch. maritima W. gaudet corolla majore, laci-  
niis lanceolato-linearibus acuminatis, caule tereti.
- Sect. III. Flores monopetalii superi.
- (103) CAMPANULA.
277. RAPUNCULUS. L. Foliis undulatis, pilosis; radicalibus lanceolato-ovalibus, caulinis linear-lanceolatis: panicu-  
la coarctata. DC. Syn.
- C. rapunculus. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E.  
Lois. G. Rapunculum. Dod. Pempt. 165. C. radice esca-  
lenta. Hort. Rom. 1. t. 74.
- In avis, marginibus, sylvaticis ubique. Vulgo: raponzo-  
lo. Bienn. Fl. Majo, Junio. Fl. coerulei.
278. TRACHELIUM. L. Caule angulato; foliis petiolatis, cor-  
dato-lanceolatis, acute serratis, scabris: calycibus ci-  
liatis; pedunculis axillaribus, 1-3-floris.
- C. trachelium. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E.  
Lois. G. - DC. Syn. Cervicaria major. Dod. Pempt. 164.
- C. vulgaris foliis urticae. Hort. Rom. 1. t. 73.
- In sylvaticis, ad sepes communis. Perenn. Floret Julio-Sep-  
tembre. Fl. coeruleo-violacei.
279. PERSICIFOLIA. L. Glabra: foliis radicalibus obovatis, in  
petiolam attenuatis, caulinis lanceolato-linearibus, sub-  
serratis, sessiliis, remotis. DC. Syn.

30-

Maggio 1871.

10 Giugno 1871

1. Ago

1871.

- C.** persicifolia . *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.*  
*C. media* . *Dod. Pempt.* 166.  
 In saxosis montanis , sub-apenninis . *A Monte Gennaro ,*  
*sul Monte-calvo , presso Subiaco* . Perenn. Floret Junio .  
*Fl. coerulei , interdum candidi .*
280. **GRAMINIFOLIA** . *L.* Foliis linearis-subulatis : capitulo terminali . *L.* - *W. Sp.* - *Pers. E.*  
*Trachelium tragopogifolium mortanum* . *Col. Phyt.* 2. p. 25.  
*t. 34.* - *J. B. H.* 2. p. 802. *Tr. minus gramineum coeruleo-violaceum* . *Barr. ic.* 332.
- In montosis apricis . *Sul Monte Gennaro dalla parte di Valle-scoperta* . Perenn. Floret Junio , Julio . *Fl. coerulei .*
281. **GLOMERATA** . *L.* Caule angulato , simplici ; foliis scarabis , denticulatis ; radicalibus oblongo-lanceolatis ; canalis oblongo-cordatis , semi-amplexicaulibus : capitulo terminali .
- C. glomerata* . *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *DC. Syn.* *Trachelium minus multis* . *J. B. H.* 2. p. 300. *Rapunculus sylvaticus coeruleus umbellatus* . *Barr. ic.* 523. n. 3.
- In montosis aridis . *Sul Monte Gennaro . . .* Perenn. Floret Junio , Julio . *Fl. coerulei* . - *Herba sub-hirsuta .*
282. **ERINUS** . *Pubescens* : caule dichotomo , foliis sessilibus ovatis , profunde dentatis , superioribus oppositis : floribus axillaribus subsessilibus . *DC. Syn.*
- C. erinus* . *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *Erinis rupiculi minimum genus* . *Column. Phyt.* 122. t. 28.  
 Ad muros , et in marginibus viarum obvia . Ann. Floret Aprili-Junio . *Corollae pallide coeruleae , parvae .*
- (104) **PRISMATOCARPUS** .
283. **SPECULUM** . *L'* *Herit. Sert. Angl.* p. 1. *Sub-pubescent* : caule ramosissimo , diffuso , flexuoso : foliis oblongo-ovatis , crenatis , pedunculis subtrifidis : corollis calyce minoribus .
- P. speculum* . *DC. Syn.* *Campanula speculum* . *L.* - *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *Legousia arvensis* . *Durand. Fl. de Bourg.* *Campanula arvensis minima* . *Dod. Pempt.* 168.
- In marginibus viarum , segete obvius . Ann. Floret Majo . *Fl. sub-violacei .*
- Varietas luxurians foliis basi sub-lobatis a nobis lecta prope Rio-freddo .
284. **HIRTUS** . *Ten. Fl. Neap.* 1. p. 76. t. 19. *Caule erectiusculo ; ramis patentibus sub-trifloris : foliis oblongis , subcrenatis , obtusis : corollis calycem superantibus .*
- In agris , inter segetes cum praecedente cui valde similis . Ann. Floret Junio . - *Corollae sub-violaceae calycem excudentes* : herba hirsuta . Nonne huc potius spectet *P. hybrida* . *DC. Syn.* ?
285. **HYBRIDUS** . *L' Herit.* *Caule stricto : foliis oblongis un-*



15.  
*Maggio 1871*  
*sui Mur*

16  
*Maggio 1871*  
*V*

dulatis sub-ciliatis; calycis laciniis lanceolatis, ciliato-scabris, corolla multo longioribus: capsulis longissimis strictis.

P. hybridus. DC. Syn. (?) Campanula hybrida. L. - All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. C. arvensis minima erecta. Moris. H. 2. p. 457. s. 5. t. 2. f. 22.

In segete frequens. Ann. Floret Junio. Corollae violaceae calyce erectiusculo minores (Decandollio majores!). Caulis saepe basi ramosus.

286. FALGATUS. Ten. Fl. Neap. 1. p. 77. t. 20. Laevis: caule erecto simplicissimo: foliis ovatis subcrenatis: floribus axillaribus sessilibus; calycinis laciniis falcatis, acuminate, corolla duplo longioribus.

In umbrosis, ad sepes. Presso Albano, a Santo-Polo... Ann. Floret Majo. Fl. carnei.

(105) TRACHELIUM.

287. COERULEUM. L. Ramosum erectum: foliis ovatis, serratis, planis: floribus corymbosis. Pers. E.

Tr. coeruleum. W. Sp. Tr. azurreum. Hort. Rom. 2. t. 14. Valeriana coerulea urticaefolio. Barr. ic. 683, 684.

Ad muros frequens: abunde in monte Janiculo ad viam maiorem cis portam D. Pancratii et alibi in urbe. Bienn. Floret Junio. Fl. triste coerulei.

(106) JASIONE.

288. MONTANA. L. Fellis linear-lanceolatis, basi angustioribus, hispidis, undulato-crispis. Lam. ill. t. 724. f. 1. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G.

J. montana. All. Ped. - Smith Br.\* - DC. Syn. Rapuntium montanum capitatum leptophyllum. Col. Ecphr. 1. p. 226. t. 227. Scabiosa 3. minor. Dod. Pempt. 122.

Ad oras nemorum communis prope urbem. Ann. Floret Junio, Augusto. Fl. coerulei.

(107) LONICERA.

289. CAPRIFOLIUM. L. Floribus ringentibus, verticillatis, terminalibus: foliis glabris; summis connato-perfoliatis: inferioribus petiolis tantum connatis. Savi B. Etr. 2. p. 224.\*

L. caprifolium. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Caprifolium italicum. Dod. Pempt. 406. Peryclimenum perfoliatum. J. B. H. 2. p. 104.

In sylvaticis, ad sepes vulgaris. Floret Aprili, Majo. Fl. albo-lutescentes, tubo rubello, odori.

290. ETRUSCA. Savi in Santi Viagg. 1. p. 113. t. 1.\* Floribus ringentibus, capitatis plerumque ternis: foliis pubescens-tibus, summis connato-perfoliatis; inferioribus petiolis tantum connatis. Savi l. c., et Bot. Et. 2. p. 225.

L. etrusca. Lois. Notic. p. 42. Caprifolium italicum perfolia-

26  
Siugno 1891

26  
Aprile 1891  
10. 1. 8. 1891.

26  
Maggio 1891.

tum subhirsutum et serotinum foliis oblongis. *Mich. Cat.*  
*H. Flor.* p. 21.

In sylvaticis frequens: presso la Grotta di Egeria, etc. Frutex. Floret Majo, Junio. Fl. flavescentes tubo rubello, graviter olentes.

Sect. IV. *Flores pentapetalii inferi.*

(108) RHYNCHOCLETA.

291. EUROPAEUS. *L.* Floribus plerisque tetrandris, quadrifidis; stigmatibus subulatis; pedunculis compressis multifloris. foliis glabris.

*E. europaeus.* *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi Tr. d. Alb.* 1. p. 111. *E. Dodon. Pempt.* 783.

Ad sepes, in sylvaticis communis. Vulgo: fusaggine, berretta da prete. Frutex. Floret Aprili. Fl. albidi.

(109) RHAMNUS.

292. CATHARTICUS. *L.* Erectus: spinis terminalibus, foliis ovatis dentatis; floribus quadrifidis dioicis.

*Rh. catharticus.* *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi Tr. d. alb.* 1. p. 180. *Rh. solutivus. Dod. Pempt.* 726.

In montium sylvis. Vulgo: Spino-merlo. Frut. Floret Aprili. Fl. albo-virescentes.

293. ALATERNUS. *L.* Inermis: foliis serratis semper virentibus: floribus polygamis, stigmate triplici.

*Rh. alaternus.* *All. Ped.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi Tr. d. Alb.* 1. p. 183. *Rh. alaternus*  $\alpha$ ,  $\beta$ . *W. Sp.* *Rh. alaternus*  $\alpha$ ,  $\gamma$ . *Pers. E.* *Spina bourgi Monspeliensium. J. B. H.* 1. p. 542. *Alaternus* 1, 2. *Clus. H.* 1. p. 50.

In sylvaticis, sepiibus, muris vetustis vulgaris. Frut. Floret Februario, Martio. Fl. luteo-virides.

(110) VITIS.

294. VINIFERA. *L.* Foliis palmato-lobatis, sinuatibus, nudis vel sub-tomentosis.

*V. vinifera.* *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Savi Tr. d. Alb.* 2. p. 191. *V. sativa.* *DC. Syn.* *V. vinifera*  $\downarrow$  *Dod. Pempt.* 415.

Ad sepes, in umbrosis. Vulgo: vite selvatica, ciamburisco. Frut. Floret Aprili. Fl. subvirides.

(111) VIOLA.

A. Stigmate acuto recurvo. (*Viola*).

295. HIRTA. *L.* Acaulis: foliis cordatis, acutis petiolisque et capsulis piloso-hispidis: stolonibus sub-nullis.

*V. hirta.* *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *V. martia hirsuta inodora. Moris. H.* 2. p. 475. s. 5. t. 35. f. 4.

In nemorosis haud infrequens. *A Villa Borghese incopia,*

aprile 1871  
10. 12. 1871

luglio 1871  
17

*al Pigneto-Sacchetti, etc.* Perenn. Floret Februario, Martio. Fl. albi vel sub-coerulei leviter odori.

10. 296. **ODORATA.** L. Acaulis: foliis cordatis petiolisque glabriusculis; stolonibus reptantibus.  
*V. odorata.* All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. *V. nigra sive purpurea.* Dod. Pempt. 166. ic. 1, 2.

*In nemoribus, ad sepes umbrosas ubique. Vulgo: viola mammola.* Perenn. Floret Januario-Aprili. Fl. saturatae violacei vel coerulei, rarius albidi.

6. 297. **CANINA.** L. Caule adultiore adscendente, sub-triguetro; foliis cordatis, acutis; stipulis elongatis, dentato-ciliatis: calycibus acutis. DC. Syn.  
*V. canina.* All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Gmel. Sib. 4. p. 98. t. 49. f. 1. *V. martia coerulea inodora sylvatica in cacumine semen ferens.* J. B. H. 3. p. 543.

*In nemorosis ubique.* Perenn. Floret Martio-Majo. Fl. coerulei fere inodori.

B. Stigmate erecto infundibuliformi (*Jacea*).

13. 298. **TRICOLOR.** Fl. Dan. t. 623. Glabra; caule angulato, ramoso, diffuso: corollis calyce duplo majoribus; stipulis pinnatifidis. DC. Syn.  
*V. tricolor.* Pers. E. - Lois. G. - Rivin. t. 120. - Hort. Rom. 7. t. 51. *V. tricolor*  $\beta$ . L. Sp. - W. Sp. *V. tricolor*  $\alpha$ . All. Ped. In montosis sylvaticis opacis. Sul Monte Albano, etc. vulgo: *Suocera, e nuora.* Ann. Floret Aprili, Majo. Flores albo luteoque varii, petalo majore violaceo.

10. 299. **ARVENSIS.** Murr. Prod. 93. Glabra: caule angulato, ramoso, diffuso; petalis calyce *vix* longioribus; stipulis basi pinnatifidis. DC. Syn.

*V. arvensis.* Pers. E. - Lois. G. *V. tricolor*  $\alpha$ . L. Sp. - W. Sp. *V. tricolor*  $\beta$ . All. Ped. *V. bicolor arvensis.* C. B. P. 200. In arvis, cultis, segete frequens. Ann. Floret Aprili-Junio. Fl. albo luteoque varii.

Folia quam in praecedente magis attenuata; corollae minores, pallidiores.

300. **GRANDIFLORA.** L. Mant. Caule simplici, erectiusculo, glabro; foliis oblongis; stipulis pinnatifidis; corollis calyce duplo majoribus, calcare petalis breviore. Lois. G. *V. grandiflora.* W. Sp. - Pers. E. *V. calcarata* C. All. Ped. *V. montana lutea grandiflora.* Barr. ic. 692. - Hall. Helv. n. 566. t. 17.

*In elatioribus calcareis montibus. Sul Monte Gennaro ...* Perenn. Floret Majo. Fl. lutei magni.

*Stipulae pinnatifidae laciniis linearibus et folia oblongo-eliptica crenata, petiolata, oculo armato minutissime ci-*

liata. Pedunculi longissimi. - Affinis magnopere *V. calcicratae* W., quae a nobis adhuc lecta in proximis Apuliae apenninis.

## (112) IMPATIENS.

301. NOLI-TANGERE. L. Pedunculis multifloris solitariis; foliis ovatis; geniculis caulinis tumentibus. L. - All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn.

Balsamina altera noli me tangere. Col. ecphr. 1. p. 149. t. 150.  
Balsamita lutea polonica. Barr. ic. 1297.

In umbrosis sub-apenninis. Presso Subiaco ... Perenn. Floret Julio. Fl. lutei.

Sect. *V.* Flores pentapetalii superi.

## (113) HEDERA.

302. HELIX. L. Foliis 3-5-lobis; floralibus ovatis: umbella erecta. W. Sp. - Pers. E.

H. helix. All. Ped. - Smith Br.\* - Lois. G. - DC. Syn. H. Dodon. Pempt. 413.

In arboribus, sepibus, muris veteribus nimis communis.  
Vulgo: Ellera. Frutic. Floret sero autumno. Fl. subflavi.

Sect. *VI.* Flores apetalii.

## (114) THESIUM.

303. LINOPHYLLUM. L. Panicula foliacea: foliis linearibus; floribus plerisque quinquefidis. Lois. G.

Th. linophyllum. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn. Anonymos linifolia. Clus. H. 1. p. 324.

In pascuis sicciioribus montium. Presso Tivoli, a Roviano .... Perenn. Floret Junio. Fl. spurco-albi.

## PENTANDRIA DIGYNIA.

Sect. I. Flores apetalii.

## (115) HERNIARIA.

304. GLABRA. L. Herbacea, diffusa, glabra: florum glomerulis axillaribus, multifloris, glabris.

H. glabra. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. H. Dod. Pempt. 114. Anthyllis valentina Clusii. Lob. ic. 421.

In glareosis, sabulosis, aridis. Alla Solfatara di Tivoli, sulla Montagna di Viterbo copiosamente, etc. Perenn. Floret tota aestate. Fl. herbacei.

305. HIRSUTA. L. Diffusa: caulinis duriusculis, hirsutis: florum glomeratis axillaribus, paucifloris, hirsutis.

H. hirsuta. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. H. hirsuta Raii. Zannich. ic. 284.

In glareosis montium, praecedente minus frequens. A Santo Polo, e nei contorni ... Perenn. Floret aestate. Fl. herbacei.

## (216) CHENOPDIUM.

306. BONUS-HENRICUS. *L.* Foliis triangulari-sagittatis, integrerrimis: spica erecta terminali, spiculisque axillaribus compositis, aphyllis.  
*Ch. bonus-henricus.* *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.-Lois. G.* - *DC. Syn. Bonus Henricus.* *J. B. H.* 2. p. 965.  
*Tota bona.* *Dodon. Pempt.* 651.
- In montibus ad vias.* *Sul Monte Gennaro . . . .* Perenn. Floret Majo, Junio. Fl. herbacei.
307. MURALE. *L.* Foliis ovato-delthoidibus, inequaliter dentatis, acutis, nitidis: racemis terminalibus, corymbosis, nudis: caule ramoso sub-patulo. *DC. Syn.*  
*Ch. murale.* *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.-Lois. G.* *Atriplex dicta* pes anserinus. *J. B. H.* 2. p. 975.  
*Ad vias urbis, secus muros, in ruderatis commune.* Ann. Floret Julio, Augusto. Fl. herbacei.
308. ALBUM. *Huds.* Foliis rhomboideo-ovatis, erosis, postice integris; superioribus oblongis integerrimis: seminibus laevibus. *Smith Br.*  
*Ch. leiospermum.* *DC. Syn.*  
*a. Huds.* Foliis oleoso-pulverulentis, albidis.  
*Ch. album.* *L.* - *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.-Lois. G.* *A. sylvestris.* *Fuchs. H.* t. 119.  
*b. Huds.* Foliis viridibus angustioribus; racemis laxioribus.  
*Ch. viride.* *L.* - *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.-Lois. G.* *Ch. album.* *Smith Br.* *Ch. opuli folio.* *Vaill. Par.* 36. t. 7.f. 4.  
*In ruderatis, cultis, oleraceis commune.* Ann. Floret aestate. Fl. herbacei.
309. BOTRYS. *L.* Foliis oblongis, pinnatifido-sinuatis, viscidis: racemis nudis, multifidis.  
*Ch. botrys.* *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.-Lois. G.* - *DC. Syn.* *Botrys.* *Dodon. Pempt.* 34.  
*Ad ripas Tyberis, et in arenosis frequens.* Ann. Floret Julio, Augusto. Fl. herbacei.
310. AMBROSIOIDES. *L.* Foliis lanceolatis remote dentatis: racemis axillaribus, simplicibus, foliatis: caule herbaceo. *W. En. H. Ber.*  
*Ch. ambrosioides.* *W. Sp.* - *Pers. E.-Lois. G.* - *DC. Syn.* *Botrys odorata* suaveolens Americana, Mexicanave. *Moris. H.* 2. p. 605. s. 5. t. 35.f. 8.  
*Ad ripas Tyberis frequens.* Ann. Floret aestate. Fl. herbacei.
311. VULVARIA. *L.* Foliis rhombeo-ovatis, sub-integerrimis, floribus conglomeratis axillaribus: caule diffuso. *DC. Syn.*  
*Ch. vulvaria.* *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.-Lois. G.* *Ch. olidum.* *Smith Br.* *Atriplex foetida.* *Moris. H.* 2. p. 605. s. 5. t. 31. f. 9. *Garosmus.* *Dod. Pempt.* 616.

**Ad vias**, aggeres, in olitoriiis vulgare . Ann. Floret Julio - Septembri . Fl. herbacei pulverulent. - Herba foetidissima.

**312. MARITIMUM** . *L.* Foliis glabris, subulatis , carnosis, semi-teretibus ; floribus glomeratis axillaribus . *DC. Syn.*

*Ch. maritimum* . *All. Ped.* - *Smith. Br.\** - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* Kali minus album , semine splendente . *Moris. H. 2. p. 610. s. 5. t. 33. f. 3.*

In maritimis . *Ad Ostia* .... Ann. Floret Julio , Augusto . Fl. herbacei .

(117) **ATRIPLEX** .

**313. PATULA** . *L.* Caule herbaceo , patulo ; foliis triangulari-hastatis , acuminatis, sub-dentatis : calycibus fructus rhombis, apice denticulatis , disco sub-muricatis . *W. Sp.*

*A. patula* . *All. Ped.* - *Smith Br.\** - *Pers. E.* - *Lois. G. A. sylvestris* annua folio delthoide triangulari-sinuato , etc. *Moris. H. 2. p. 607. s. 5. t. 32. f. 14.*

In ruderatis , incultis vulgaris . Ann. Floret aestate . Fl. herbacei .

Calyces foeminei fructiferi , saepius disco muricati , margine denticulati . Racemi axillares et terminales foliosi .

**314. ANGUSTIFOLIA** . *Smith Br.\** Caule herbaceo divaricato : foliis infimis hastatis sub-dentatis ; superioribus lanceolatis , integerrimis ; calycibus fructiferis hastato-lanceolatis , integerrimis . *W. Sp.*

*A. angustifolia* . *Lois. Gall.* - *DC. Syn.* *A. patula* . *DC. Fl. Fr.* ( non Linn.) . *A. vulgaris angustifolia* . *J. B. H. 2. p. 973.*

In ruderatis , incultis vulgaris . Ann. Floret aestate . Fl. herbacei .

**315. PORTULACOIDES** . *L.* Caule fruticuloso , basi procumbente: foliis oppositis , sub-petiolatis , oblongo-obovatis , integerrimis , albido-glaucis .

*A. portulacoides* . *Smith Br.\** - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *Halimus sive portulaca marina* . *Dod. Pempt. 771.*

In maritimis uidis , salsis . *Ali ponticelli d'Ostia in copia* , etc.

Fruticulus subpedalis . Floret Julio , Augusto . Fl. luteoli .

(118) **BETA** .

**316. MARITIMA** . *L.* Caule basi prostrato : foliis triangularibus petiolatis : floribus geminis .

*B. maritima* . *All. Ped.* - *Smith Br.\** - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.*

In arenosis , ad vias campestres circa urbem frequens : Bienn. Floret Junio . Fl. sub-virides .

**317. VULGARIS** . *Enc.* Caule erecto ; foliis radicalibus petiolatis , caulinis sessilibus ; floribus ternis , quaternisve .

*B. vulgaris* . *DC. Syn.* - *Targ. Istit. T. 2. p. 203.\**

*a.* Floribus ternis , spicis longissimis , radice alba .

B. ciela, L. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. B. candida. Dod.  
Pempt. 620.

Ad vias, secus sepes, hortorum semitas sponte. Bienn. Fl.  
Julio, Augusto. Fl. sub-virides.

Varietas radice rubra ubique colitur, vulgo: *Carota rossa*.

(119) SALSOLA.

318. KALI. L. Caule herbaceo, prostrato; foliis subulatis, spinosis, scabris, calycis lacinias margine scariosis. DC.  
Syn.

S. Kali. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G.  
Kali spinoso affinis. Mois. H. 2. s. 5. t. 33 f. 11.

In maritimis arenosis. Presso Ostia .... Ann. Floret Junio,  
Julio. Fl. spurco-albi.

(120) ULMUS.

319. CAMPESTRIS. L. Foliis duplicato-serratis, basi inaequalibus: floribus sub-sessilibus, conglomeratis pentandris:  
fructibus glabris. W. Sp. - Lam. ill. 185. - Pers. E. - Lois.  
G. - Savi Tr. d. Alb. 1. p. 228.

Ulmus. Dod. Pempt. 857.

In campestribus, ad vias, in sylvaticis. Vulgo: *Olmo*.  
Arb. Floret Februario, Martio. Fl. spurco-albi, sub-purpurei.

320. SUBEROSA. Moench. Foliis duplicato-serratis, basi subaequalibus: floribus subsessilibus, conglomeratis tetrandratis: ramulis suberoso-alatis. Pers. E. - Savi Tr. d. Alb. 1.  
p. 230.

U. suberosa. W. Sp. - Lois. G. U. tetrandra. Schkuhr.

Ad sepes, in sylvaticis vulgatissima. Arb. Floret Martio.  
Fl. spurco-albi, sub-purpurei.

(121) CELTIS.

321. AUSTRALIS. L. Foliis oblongo-lanceolatis, acuminatis,  
argute serratis, supra scabris, subtus pubescenti-mollibus, basi inaequalibus. W. Sp. - Savi Tr. d. Alb. 1. p. 80.

C. australis. All. Ped. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Lotus  
arbor. Lob. ic. 186.

In sepibus, ad rupes circa urbem frequens. Vulgo: *Bozzarago*. Arb. Floret Aprili. Fl. albido-virentes.

Sect. II. Flores monopetalii.

(122) GENTIANA.

322. LUTEA. L. Foliis latis, ovatis, nervosis: corollis 5-8-fidis, acutis, rotatis, verticillatis, pedicellatis; calyci-cibus membranaceis, unilateralibus. DC. Syn.

G. lutea. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. G. major  
lutea. Hort. Rom. 1. t. 13. G. Clus. H. 311. - Dod. Pempt.  
342.

In elatioribus montium nostrorum pascauis. Sul Monte Genaro, sul Monte Calvo presso Subiaco ... Perenn. Floret  
Junio, Julio. Fl. flavi.

15. Maggio 1800

Temp. C.

1800

323. CRUCIATA. *L.* Corollis 4-fidis imberibus : floribus verticillatis, sessilibus : foliis decussatis connato-vaginantibus. *Pers. E.*  
*G. cruciata*. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Lois. G.* - *DC. Syn. G.* minor cruciata. *J. B. H.* 3. p 520. - *Barr. ic. 65.*  
 In sylvis editiorum montium. *Sul Monte Gennaro* .... Perenn. Floret Julio, Augusto. Fl. coerulei.
324. Verna. *L.* Caule simplici, pumilo, unifloro; corella majuscula 6-fida, lacinii subacutis, basi auriculatis: foliis ovato-acutis; radicalibus confertis majoribus.  
*G. verna*. *All. Ped.* - *Smith Br.\** - *W. Sp.* - *Lois. G.* - *DC. Syn. G.* minor verna. *Clus. H.* 515. - *Barr. ic. 98, 109.*  
 In elatioribus sub-apenninis jugis. *Sul Monte-Calvo presso Subiaco*, etc. Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. cyanei.  
 Sect. III. Flores 5-petali, superi, dispermi. ( Umbelliferae.)
- (125) ERYNGIUM.
325. CAMPESTRE. *L.* Foliis dentato-spinosis; radicalibus petiolatis, tripartitis, segmentis obovatis apice sub-trilobis; caulinis pinnatifidis amplexicaulibus: caule ramosissimo.  
*E. campestre*. *All. Ped.* - *Smith Br.\** - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn. E. vulgare*. *Hort. Rom.* 6. t. 16.  
 In arvis, in cultis vulgatissimum. Perenn. Floret Augusto. Fl. albidi.
326. AMETHYSTINUM. *L.* Foliis dentato-spinosis; radicalibus petiolatis, trifidis, basi sub-pinnatis: caule simplici: involuero squamis subulatis basi cincto.  
*E. amethystinum*. *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Savi 2. Gent.* 61.\* *E. montanum amethystinum*. *Moris. H.* 3. s. 7. t. 25.f. 2. - *Hort. Rom.* 6. t. 18.  
 In montosis. *A Palombara, a Santo-Polo, sul Tuscolo*, etc. Perenn. Floret sera aestate. Fl. albidi.  
 Caulis et summa folia amethysteo-violacea. Involucri foliola saepius simplicia, lanceolata, interdum et trifida, basi spinulis subulatis, interjectis obvallata.
327. MARITIMUM. *L.* Foliis radicalibus sub-rotundis, plicatis, spinosis: capitulis pedunculatis: paleis tricuspidatis. *L.* - *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.*  
*E. maritimum*. *Smith Br.\** - *DC. Syn.* - *Hort. Rom.* 6. t. 17.  
*E. marinum*. *Clus. H.* 2. p. 169.  
 In maritimis vulgare. Perenn. Floret Junio. Fl. sub-cinerari.
- (124) SANICULA.
328. EUROPEA. *L.* Foliis palmato-lobatis: caule sub-nudo; flosculis omnibus sessilibus. *Lois. Gall.*  
*S. europaea*. *All. Ped.* - *Smith Br.\** - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *DC.*

Giugno 1801  
Caule multifid  
Corolla 5-fida  
lacinii's ovatis

15. Agosto  
1801.

*Syn.* *S. officinarum*. *Hort. Rom.* 5. t. 100. *Sideritis* *tertia* *Dioscoridis*. *Col. Phytab.* 71. t. 16.

In umbrosis, nemorosis collibus frequens. *Sul Monte Mario*, *intorno Albano*, *Frascati*, etc. Perenn. Floret *Ma-*  
*jo-Julio*. Fl. albi.

## (125) ECHINOPHORA.

329. SPINOSA. *L.* Foliis pinnatis, foliolis subulato-spinosis canaliculatis.

*E. spinosa*. *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *Crithmum spinosum*. *Dod. Pempt.* 705.

In maritimis communis. *A Fiumicino*, etc. Perenn. Floret *Junio*, *Augusto*. Fl. albi.

Involucrum, involucella, et calycina segmenta spinosa, per-  
sistenta.

## (126) HYDROCOTYLE.

330. VULGARIS. *L.* Foliis peltatis, orbiculatis, crenatis: um-  
rella 5-8-flora. *DC. Syn.*

*H. vulgaris*. *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *Cotyledon palustris*. *Dod. Pempt.* 133.

In palustribus. *Intorno ad Ostia* ... Perenn. Floret *Majo*.  
Fl. albi.

## (127) BUPLEURUM.

331. ROTUNDIFOLIUM. *L.* Involucris universalibus nullis; fo-  
liis perfoliatis. *L.* - *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* -  
*Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.*

*B. perfoliatum latifolium*. *Hort. Rom.* 5. t. 78. *Perfoliata*.  
*Dod. Pempt.* 104. - *Riv.* t. 45.

Inter segetes, praesertim ad montium radices. Ann. Floret  
*Junio*. Fl. lutei.

332. ODONTITES. *L.* Involucris involucellisque flores supe-  
rantibus, pentaphyllis, lanceolatis, aristatis: foliis li-  
neari-lanceolatis: caulis divaricato-ramosis.

*B. odontites*. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* -  
*DC. Syn.* - *Savi 2. Cent. p. 63.* - *Biv. Sic. Cent. 2. p. 15.*  
*Perfoliatum angustifolium montanum*. *Col. Ecphr.* 84.  
t. 247.

In collinis, montosis siccoribus. *Sul Monte Mario*, *a Pa-*  
*lombara*, *sul Monte della Croce a Tivoli* .... Ann. Floret  
*Junio*, *Julio*. Fl. lutei.

333. JUNCEUM. *L.* Involucro triphyllum foliolis linearis-lanceo-  
lates, inaequalibus, umbella sub-trifida brevioribus; in-  
volucellis pentaphyllis umbellulam 3-5-floram vix aqua-  
tilibus: caule erecto, ramoso: foliis linearibus.

*B. junceum*. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* -  
*DC. Syn.* *B. angustifolium*. *Dodon. Pempt.* 474. *B. gra-*

*mineo longiore glauco et glabro folio*. *Hort. Rom.* 5. t. 79.  
In montium sylvis opacis, sepibus. *Presso Palombara*,

Agosto 1811

*sulla Paranzana*, etc. Ann. Floret Julio, Augusto. Fl. lutei.

Involucrum umbella valde brevius. Umbella 2-3-fida (4-fidam non invenimus). Folia graminea multinervia, superiore ad latus flexa, sub-falcata.

## (128) TORDYIUM.

334. OFFICINALE. *L.* Foliorum inferiorum foliolis ovatis, incisis, crenatis; superiorum linearibus, dissectis. DC. Syn. *T. officinale*. Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. Sese-li creticum. Dod. Pempt. 314. Caucalis minor pulchro semine, siye Bellonii. J. B. H. 3. p. 84.

In arvis, viis, messibus ubique. Ann. Floret Aprili-Junio. Fl. albi.

335. MAXIMUM. *L.* Foliis pinnatis, foliolis lanceolatis, serato-inceisis, terminali elongato: caule scaberrimo.

*T. maximum*. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Hort. Rom. 6. t. 2. Caucalis major. Clus. H. 2. p. 101. C. major semine minus pulchro hirsuto. J. B. H. 3. p. 85.

In arvis, marginibus, ad sepes frequens. Ann. Floret Junio, Julio. Fl. albi.

## (129) CAUCALIS.

A. Fructuum costis aculeatis;  
aculeis compressis.

336. GRANDIFLORA. *L.* Involucris, involucellisq[ue] pentaphyl-lis lanceolatis, margine albo-scariosis; petalis exterioribus maximis: foliis bipinnatis.

*C. grandiflora*. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Echinophora picnocarpos. Col. ephr. 1. p. 91. t. 94. Lap-pula canaria flore pulchro magno albo. J. B. H. 3. p. 79.

In montium saxosis communis. Intorno a Palombara, presso Santo-Polo, a Palazzuola, etc. Ann. Floret Junio. Fl. albi.

337. DAUCOIDES. *L.* Umbellis sub-trifidis, aphyllis; umbellulis sub-tri-carpiris, involucellis tri-phyllis: caule glabriusculo; foliis decompositis.

*C. daucoides*. Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. *C. arvensis echinata* parvo flore. Moris. H. 3. s. 9. t. 14. f. 6.

In agris, sepibus, segete haud rara. Ann. Floret Majo, Junio. Fl. sub-purpurascentes, vix radiantes.

338. LATIFOLIA. *L.* Umbellis 3-4-fidis, involucris 3-4-phyl-lis; umbellulis 5-carpiris, involucellis 5-phyllis: caule hispido; foliis pinnatis, serratis.

*C. latifolia*. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. *C. arvensis echinata latifolia*. Moris. H. 3. s. 9. t. 14. Echiphora 4 major platyphyllos purpu-

3.  
Aprile 1891  
Giugno 1891

- rea . *Column. ecphr.* 1. p. 98. t. 97. f. 1. *Lappula canaria latifolia* . *J. B. H.* 1. p. 81.  
 In montium segete . *A Roviano* , etc. Ann. Floret Junio .  
 Fl. purpurascentes .
339. MARITIMA . *All. Ped.* Umbella 2-5-fida , involucro 2-3-phyllo ; umbellulis sub-3-carpis , involucellis 5-phyllis .  
*foliis supra-decompositis* , cauleque decumbente villosis :  
*C. maritima* . *Enc.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Biv. Sic. Cent.* 2. p. 20. *G. pumila* . *Gouan. Monsp.* - *Vahl Symb.* - *W. Sp.* *Daucus muricatus*  $\beta$  . *L. Mant.* 352. *Lappula canaria* , sive *caerulealis maritima* . *J. B. H.* 3. p. 81.  
 In marino litore . *A Fiumicino* , *Ostia* , etc. Ann. Floret Majo . Fl. sub-purpurascentes .
340. PLATYCARPOS . *L.* Umbella 3-fida ; involucris involucellisque triphyllis : umbellulae fructibus 1-2 ovatis majusculis : foliis decompositis .  
*C. platycarpos* . *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *C. monspeliaca* echinato magno fructu . *Moris. H.* 3. s. 9. t. 14. *Echinophora altera* asperior *platycarpos* . *Col. ecphr.* 1. p. 95. t. 94. f. 2.  
 In montium messibus . *A Roviano* , etc. Ann. Floret Junio .  
 Fl. albi extus purpurascentes .  
 B. Fructuum aculeis numerosis , sparsis .
341. ARVENSIS . *Ait. Kew.* Umbella multifida , involucro subnullo ; involucellis polyphyllis : caule ramosissimo : foliis bipinnatis , foliolis ovato-lanceolatis incisis , terminali elongato .  
*C. arvensis* . *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *C. infesta* . *Curtis.* - *Smith Br.* *C. Helvetica* . *Murr. Syst. Veg. Scandix infesta* . *L. Syst. Nat. ed.* 12. v. 3. p. 572.  
 In arvis , ad vias , sepes vulgaris . Ann. Floret Majo-Julio . Fl. albi .
342. NOBIFLORA . *Lam. Fl. Fr.* Umbellis axillaribus , simplicibus , sub-sessilibus ; fructibus exterioribus hispidis : caule prostrato ; foliis decompositis .  
*C. nodiflora* . *All. Ped.* - *DC. Syn.* *C. nodosa* . *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *Tordylium nodosum* . *L. Sp.* *C. nodosa* echinato semine . *J. B. H.* 3. p. 83.  
 Ad vias , margines , sepes frequens . Ann. Floret Majo .  
 Fl. albi .
- (130) DAUCUS .
343. CAROTA . *L.* Fructibus hispidis : foliis pilosis , 2-3-pinnatis ; foliolis lanceolatis , dentatis , acutis ; petiolis subtus nervosis .  
*D. Carota* . *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.*  
*g. Sylvestris* : floscu'o centrali rubro , sterili . *Pers. l. c.*

Giugno 1807  
18 1807

- D. Carota  $\beta$  sylvestris . Savi 2 Cent. p. 64.\* D. vulgaris. Clus. H. 2 p. 198. Hort. Rom. 5. t. 74.  
In pascuis omnibus , marginibus , viis varietas occurrit : species in olitoris colitur nomine: carota gialla . Bienn. Floret Junio , Julio . Fl. albi ; in 3 centrales 1, 2, 3, atro-sanguinei , steriles .
344. MURICATUS . L. Mant. Seminibus triglochidi-aculeatis . L. - Geuan. ill. 9. - W. Sp. - Pers. E.  
Caucalis major daucoides tingitana . Moris. H. 3. s. 9. t. 14. f. 4.- Herm. Par. 111. t. 111. Echinophora altera asperior platycarpos . Col. ecphr. 1. p. 95. t. 94.  
In arvis circa urbem frequens . Alla Villa Pamfili , etc. Bienn. Floret sera aestate . Fl. albi .
- (151) AMMI .
345. MAJUS . L. Foliis inferioribus pinnatis , foliolis lanceolatis ; superioribus multifidis, lacinii lanceolato-linearibus . DC. Syn.  
A. majus . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. Apium ammi-majus . Crantz. - Targ. Inst. Bot. 2. p. 231. Ammi vulgare . Dod. Pempt. 301.  
In arvis , hortis , viis commune . Ann. Floret Junio , Julio . Fl. albi .
346. VISNAGA . Lam. Dict. 1. Umbella fructifera conniventia contracta ; receptaculo communi tumido , sub-carnoso : foliis decompositis , foliolis linearibus .  
A. visnaga . Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Daucus visnaga . L. - W. Sp. Apium visnaga . Targ. Inst. 2. p. 252. Gingidium alterum . Dod. Pempt. 702.  
In arvis , marginibus secus Tyberim abunde . A Ponte Salara , Ponte Fratto , Tor di Valle , etc. Vulgo . Stuzzicadenti . Ann. Floret Julio , Augusto . Fl. albi .
- (152) CONIUM .
347. MACULATUM . L. Caule ramosissimo , maculato ; seminibus striatis . Pers. E.
- C. maculatum . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Lois. G. Cicuta major . Lam. ill. t. 195. f. 1. - DC. Syn. - Hort. Rom. 5. t. 70. Cicuta officinalis . Crantz. - Targ. Inst. 2. p. 226. Cicuta . Dod. Pempt. 461.  
Secus fossas , ad sepes humidas nil communius . Vulgo , et officie. Cicuta . Bienn. Floret Junio , Julio . Fl. albi :
- (153) CRITHMUM .
348. MARITIMUM . L. Foliolis lanceolatis , carnosis . L. - All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn.  
C. sive phoeniculum maritimum . Hort. Rom. 5. t. 94. C. marinum . Dod. Pempt. 705.  
In litore arenoso maris obvium . Vulgo : finocchio marino . Perenn. Floret aestate . Fl. albi .

29.  
April 1871.  
No 5 Aug 1880

## (134) FERULA.

349. COMMUNIS . *L.* Foliolis linearibus longissimis simplicibus , umbellis ternatis . *DC. Syn.*

*F.* communis . *All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. F.* foemina Plinii . *Hort. Rom. 6. t. 5. F. Dod. Pempt. 321.*

Ad rupes , muros antiquos communis . Perenn. Floret Aprili , Majo . Fl. latei .

## (135) LASERPITIUM .

350. SILER . *L.* Foliis bipinnatis ; foliolis ovali-lanceolatis , integerrimis , sim plicibus ternatisque , petiolatis : seminum costis obtusis .

*L.* siler . *W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn.* Siler montanum . *All. Ped. Seseli , sive Siler montanum vulgare . J. B. H. 3. p. 168.*

In montium petrosis . *Sul Monte Gennaro ....* Perenn. Floret Majo , Junio . Fl. albi .

## (136) BRIGNOLIA .

351. PASTINACEFOLIA . *Bertol. Diar. Bot. Par. 1813. T. 2. p. 76. - Sebast. Rom. Pl. Fasc. 2. p. 8. t. 2.\**

Ligusticum balearicum . Foliis pinnatis ; foliolis infimis acutis foliolo . *L. Mant. 218.\* - W. Sp. - Pers. E.* Sium siculum . *L. Sp. - W. Sp. - Pers. E.* Daucus pastinacaefolio siculus . *Zannon. H. 78. t. 30.*

In arvis ab Urbis occidente . *Fuori della Porta Portese lungo la strada maestra fra il settimo , e l'ottavo miglio in gran copia .* Perenn. Floret Junio . Fl. flavi .

## (137) ANGELICA .

352. SYLVESTRIS . *L.* Foliis bipinnatis ; foliolis aequalibus ova-to-lanceolatis serratis . *Lois. G.*

*A. sylvestris . Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Targ. Inst. 2. p. 213. Selinum sylvestre. Crantz. - All. Ped. A. sylvestris. Dodon. Pempt. 318.*

In syvaticis , humidiusculis . *Presso il Ponte Lugano ....* Perenn. Floret Julio . Fl. carnei .

## (138) SIUM .

353. NODIFLORUM . *L.* Foliis pinnatis ; umbellis oppositifoliis sub-sessilibus : involucro universalis subnullo . *Lois. G.*

*S. nodiflorum . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn.* Gienta nodiflora . *Crantz. - Targ. Inst. 2. p. 225. Sium sive Apium palustre . Hort. Rom. 5. t. 75.*

In rivulis , fossis , ad fontes . Vulgo : *Cannei.* Perenn. Floret Junia , Julio . Fl. albi .

Involucrum monophyllum simplex vel nullum .

## (139) SISON .

354. AMOMUM . *L.* Foliis inferioribus pinnatis , foliolis ovatis sub-incisis denticulatis ; superioribus compositis ; umbellis sub-4-fidis , floriferis erectis .

**S.** amomum . *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* Sium  
amomum . *DC. Syn.* *Cicuta amomum* . *Crantz.* - *Targ.*  
*Inst. 2.* p. 225. *Petroselinum macedonicum* *Fuchsii* . *Dod.*  
*Pempt.* 697.

Ad sepes , in umbrosis frequens . *A villa Pamfili*, etc. Bienn.  
Floret Julio-Septembri . Fl. albi .

## (140) OENANTHE .

355. **PIMPINELLOIDES** . *L.* Foliis radicalibus supra-decompositis , lacinii cuneatis fissis ; caulinis linearibus pinnatis , supremis longissimis simplicibus .

*Oe. pimpinelloides* . *All. Ped.* - *Smith Br.\** - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *Oe. aquatica pimpinellae saxifragae divisura nostras* . *Pluk. Phyt. t. 49. f. 4.* - *Hort. Rom. 4.* t. 83.

In humentibus pratis , sylvaticis vulgaris . Perenn. Floret Majo , Junio . Fl. albi .

## (141) PHELLANDRIUM .

356. **AQUATICUM** . *L.* Foliis amplis , tripinnatis , pinnulis laciniisque divaricatis .

*Ph. aquaticum* . *All. Ped.* - *Smith Br.\** - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *Oenanthe phellandrium* . *Enc.* - *Savi 2 Cent.* p. 72.\* - *DC. Syn.* *Ligusticum phellandrium* . *Crantz.* - *Targ.* *Inst. 2.* p. 222. *Cicutaria palustris* . *Lob. ic. 735.* *Ph. Dod. Pempt.* 591. - *Hort. Rom. 5. t. 42.*

In humentibus pascuis , fossis frequens . *Tor Pignattara* , *acqua-bollante* , *le tavernucole* , *Isola-Farnese* , etc. Bienn. Floret Majo . Fl. albi .

## (142) SCANDIX .

357. **PECTEN-VENERIS** . *L.* Foliolis multifidis : seminibus inter costas glabris : rostro compresso , dorso glabro. *DC. Syn.* *Sc. pecten-Veneris* . *Smith Br.\** *Sc. pecten* . *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *Myrrhis pecten-Veneris* . *All. Ped.* *Cherophyllum pecten-Veneris* . *Crantz.* - *Targ.* *Inst. 2.* p. 216. *Sc. pecten-Veneris* . *Dod. Pempt.* 701. *Sc. semine rostrato vulgaris* . *Hort. Rom. 6. t. 14.*

In messibus vulgaris . *Ann. Floret Junio* . Fl. albi .

*Umbellae radii sub-binis* . *Involucella foliolis apice simplibus* , *vel 2-multi-fidis* .

## (143) CHEROPHYLLUM .

358. **TEMULUM** . *L.* Fructu striato : caule maculato , scabro ; geniculis tumidiuseculis . *DC. Syn.* 16. *Maggio*.  
*Ch. temulum* . *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *Ch. temulentum*.  
*Smith Br.\** *Myrrhis temula* . *All. Ped.* *Myrrhis annua vulgaris* caule fusco . *Moris. H. 3. p. 302. s. 9. t. 10. f. 7.*

Ad sepes , in umbrosis vulgatissimum . Perenn. Floret Aprili-Junio . Fl. albi . - *Umbellae nubiles cernuae*.

## (144) SESELI .

359. **MONTANUM** . *L.* Petiolis ramiferis membranaceis , oblon-

all'Eremita

aromaticum

Mansa affatto.

a. Maggio

1871

1872

1871

- gis , integris : foliis radicalibus bi-pinnatis , caulinis angustissimis .
- S. montanum . W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Saxifraga montana minor italica , foliis in breviores partes divisus . Moris. H. 3. p. 272.
- In montosis calcareis . Presso Subiaco ... Perenn. Floret aestate . Fl. albi .
360. TORTUOSUM . L. Caule rigido , divaricato-ramoso ; ramis diffusis , tortuosis : foliis bipinnatis ; foliolis linearibus , longissimis : seminibus striatis , asperis .
- S. tortuosum . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Foeniculum tortuosum . J. B. H. 3. P. 2. p. 16.
- In siccioribus montosis . Sul Monte della Croce presso Tivoli ... Perenn. Floret Augusto , Septembri . Fl. albi .
361. AMMOIDES . L. Caule ramosissimo : foliis pinnato-multifidis ; radicalibus foliolis imbricatis ; caulinis laciniis capilariibus , sub-simplicibus .
- S. ammoides . W. Sp. - Pers. E. - Jacq. Hort. t. 52. Saxifraga annua acris millefolii terrestris folio tenuissimo . Moris. H. 3. p. 272.
- In arvis siccioribus , aggeribus . Copiosamente sul Testaccio , ad Acqua-acetosa , Tor di Quinto , etc. Ann. Floret Julio . Fl. albi .
- Involucella polyphylla . Umbellulae difformes vix globosae .
- (145) PASTINACA .
362. OPOGANAX . L. Foliis bi-pinnatis , foliolis basi antica exocysis : petiolis paleaceo-strigosis .
- P. opopanax . W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. P. oponanax . All. Ped. - Savi 2 Cent. p. 74. Selinum opopanax . Crantz. - Targ. Inst. 2. p. 212. Panax costinum . Moris. H. 3. s. 9. t. 17. f. 1. 2.
- In arvis , ad vias communis . Perenn. Floret Julio . Fl. lutei .
- Involucra , et involucella sub-4-phyllo .
363. SATIVA . L. Foliis simpliciter pinnatis . L. - All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Selinum pastinaca . Crantz. - Targ. Inst. 2. p. 211.
- β. Pastinaca latifolia sylvestris . Dodon. Pempt. 680. - R. v. t. 6. In herbosis , ad Tyberim varietas β: species in olitoris culta . Bienn. Floret Junio , Julio . Fl. lutei .
- Involucra et involucella saepius nulla .
- (146) SMYRNIUM .
364. PERFOLIATUM . L. Foliis caulinis simplicibus , amplexicaulinibus ; inferioribus compositis : caule alato . Enc. - Savi 2 Cent. p. 76.
- S. perfoliatum . W. Sp. - Pers. E. S. Amani montis . Dod. Pempt. 698.
- In montosis . Sul Monte Gennaro ... Bienn. Floret Junio , Julio . Fl. lutei .

365. OLUSATRUM . L. Foliis caulinis ternatis ; petiolatis , ser-  
ratis ; radicalibus tri-ternatis .

S. olusatrum . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. -  
Lois. G. - DC. Syn. - Hort. Rom. 5. t. 91. Hippoſelinum.  
Dod. Pempt. 698.

Ad vias , juxta sepes vulgatissimum . Bienn. Floret Majo ,  
Junio . Fl. viridi-luteoli .

(147) ANETHUM .

366. PHOENICULUM . L. Foliis decompositis , laciniis capillari-  
bus : seminum costis subaequalibus . DC. Syn.

A. phœniculum . Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G.  
Ligusticum phœniculum . Crantz. - Targ. Inst. 2. p. 221.  
Fœniculam primum . Dod. Pempt. 297.

In arvis commune . Vulgo : *finocchiella* . Varietas in olito-  
riis colitur vulgo : *finocchio dolce* . Perenn. Floret aesta-  
te . Fl. lutei .

(148) PIMPINELLA .

367. PEREGRINA . L. Foliis radicalibus pinnatis ; foliolis sub-  
rotundis , crenatis ; caulinis superioribus incisis , laciniis  
linearibus , umbellis nubilibus nutantibus ; fructibus  
hirtis .

P. peregrina . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. Daucus  
tertius Dioscoridis . Col. ephr. 1. p. 108. t. 109.

In sterilibus pascuis , ad margines vulgaris ; copiosissime  
seus Appiam viam . Perenn. Floret Julio . Fl. albidi . -  
Planta viridi-flavescens .

(149) APIUM .

368. GRAVEOLENS . L. Foliis caulinis ternatis , foliolis cunei-  
formibus : caule sulcato .

A. graveolens . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. -  
Lois. G. - DC. Syn. - Targ. Inst. 2. p. 230. A. palustre .  
Hort. Rom. 5. t. 67. Eleoselinum . Dod. Pempt. 695.

In fossis , rivis commune . In olitorii cultum esculentum.  
Vulgo : *Selleri* . Bienn. Floret aestate . Fl. luteoli .

(150) ÆGOPODIUM .

369. PODAGRARIA . L. Foliis inferioribus biternatis ; summis  
ternatis . Lois. G.

Ae. podagraria . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. -  
DC. Syn. Ligusticum Podagraria . Crantz. - Targ. Inst. 2.  
p. 221. Podagraria . Riſin. t. 46. Herba Gerardi . Dod.  
Pempt. 320.

Ad sepes , in umbrosis . Alla Valle dell' Inferno ... Perenn.  
Floret Julio . Fl. albi .

31. Ago 1871

15. Agosto 1870

## PENTANDRIA TRIGYNIA:

## (151) VIBURNUM.

76  
april 1801.  
10. id. 1801.

370. *TINUS*. *L.* Baoca coronata : foliis integerrimis , ovatis , ramificationibus venarum subtus villosa - glandulosis . *DC. Syn.*

V. tinus. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Savi Tr. d. Alb.* 1. p. 231. *Tinus prior*. *Clus. H.* 1. p. 49.  
In sepibus communis . Vulgo: lauro-tino . Frut. Floret hyme- me et vere . Fl. albi .

## (152) SAMBUCUS.

1. Ago  
ugno 1801.

371. *EBULUS*. *L.* Cymis tripartitis : stipulis foliaceis : caule berbaceo . *L. Sp.* - *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois G.* - *DC. Syn.*

*Ebulus* . *Dod. Pempt.* 381.  
Ad vias , juxta fossas vulgatissima . Perenn. Floret Junio , Julio . Fl. albi . Odor ingratus .

76.  
Maggio 1801.  
18. 1801.

372. *NIGRA* . *L.* Cymis 5-partitis : foliis pinnatis , foliolis sub- ovatis , serratis : caule arboreo . *Lois. G.*

*S. nigra* . *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *DC. Syn.* - *Savi Tr. d. Alb.* 1. p. 200. *S. Dodon. Pempt.* 845.  
In sepibus omnibus frequens . Vulgo: Sambuco . Arbusc. Floret Majo , Junio . Fl. albi , odori .

## (153) STAPHYLEA.

76.  
aprile 1801.  
Maggio 1801.

373. *PINNATA* . *L.* Foliis pinnatis . *L.* - *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi Tr. d. Alb.* 2. p. 181.  
*S. pinnata* . *Smith Br.*\* Staphyloendron . *J. B. H.* 1. p. 274.  
*Nux vesicaria* . *Dod. Pempt.* 818.

In sylvaticis , praesertim sub-humidis frequens . In copia intorno ai laghi d'Albano e Nemi , e nei boschi vicini . Vulgo : sambuchella . Arb. Floret Aprili , Majo . Fl. albo-luteoli .

## (154) PALIURUS.

374. *ACULEATUS* . *Lam.* Aculeis geminis , inferiore reflexo : foliis ovatis , sub-dentatis , 3-nerviis : floribus axillari- bus , laxe racemosis . *DC. Syn.*

*P. aculeatus* . *Lois. G.* *Rhamnus paliurus* . *L.* - *All. Ped.* - *Pers. E.* - *Savi Tr. d. Alb.* 1. p. 184. *Zizyphus paliurus* . *W. Sp.* - *Lob. ic.* 2. p. 179. - *Dod. Pempt.* 576.

Sepibus instruendis usitatissimus . Frut. Floret Majo , Ju- nio . Fl. lutei .

## (155) TAMARIX.

375. *GALLICA* . *L.* Floribus 5-andris ; spicis lateralibus : foliis lanceolatis , amplexicaulibus , imbricatis . *W. Sp.* - *Pers. E.* - *DC. Syn.* - *Savi Tr. d. Alb.* 1. p. 209.

*T. gallica* . *Smith Br.* - *Lois. G.* *Tamariscus gallicus* . *All. Ped.*\* *Tamarix* . *Dod. Pempt.* 765, 766.

PENTANDRIA TRIGYNYIA.

119

Ad ripas Tyberis copiose. Vulgo: *Tamarisco*, *Tamari-*  
*gio*. Frut. Floret Majo. Fl albo-rosei.  
 Ovibus gratum pabulum, antiquorum *Myrica*.

PENTANDRIA PENTAGYNYIA.

(156) ARMERIA.

376. DENTICULATA. *Bertol.* Glaberrima: scapo simplici, capitulo: foliis linearibus planis, primariis latioribus denticulatis, reliquis sub-integris. involueri foliolis ovato-lanceolatis, acuminatis. *Bertol. Rar. It. Pl. Dec. 2. p. 54.\**  
 (sub *Statice*).

A. dentieulata. *Hornem.* *Hort. Hafn.* - *DC. Hort. Monsp. Cat.*  
*Gramen polyanthemum majus*. *Dod. Pempt.* 564(?)

In montium nostrorum rupestribus frequens. Perenn. Floret Aprili-Junio. Fl. carnei.

Scapus 1-2-pedalis vel ultra, glaber, inferius scaber. Folia linearia, planiuscula, leviter nervosa, acuminata, basi parum attenuata: primaria latiora, margine denticulata, et nonnihil crispati; successiva angustiora, integra. Involuerum polyphyllum majuscum, foliolis acuminatis. Calix dentibus 5 setaceis, lineam longis.

(157) STATICE.

377. LIMONIUM. *L.* Scapo paniculato tereti: foliis margine undulatis, oblongis, glabris, obtusis, sub apice mucronatis. *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.*

S. limonium. *All. Ped.* - *Smith Br.\** Limonium maritimum majus. *Hort. Rom.* 6.t. 38. Valerianae rubrae similis pro limonio missa, *Dod. Pempt.* p. 351.

In maritimis frequens. Presso Ostia in gran copia, etc. Perenn. Floret Junio-Augusto. Fl. violacei.

(158) LINUM.

378. USITATISSIMUM. *L.* Foliolis calycinis ovatis, acutis, trinervibus; petalis crenatis; foliis lanceolatis, alternis; caule sub-solitario. *Smith Br.\**

*L. usitatissimum*. *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *L. sativum*. *Dod. Pempt.* 533.

Undique colitur et in arvis sponte occurrit. Vulgo: *Lino*. Ann. Floret Majo, Junio. Fl. coerulei.

379. TENUIFOLIUM. *L.* Galycibus acuminatis ciliato-glandulosis; foliis linear-setaceis, retrorsum sebris. *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 133.\*

*L. tenuifolium*. *All. Ped.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *L. tenuifolium* a *L.* - *W. Sp.* *L. sylvestre angustifolium* flore magno. *Moris. H. 2. s. 5. t. 26. f. 14.*

In collibus siccis. Intorno a Tivoli.... Perenn. Floret Junio. Fl. albo-violacei.

380. VISCOSUM. *L. Pilosum*, pilis brevibus apice glandulif. Maggio 1801

- ris: calycibus acuminatis; foliis ovato-lanceolatis 3-5-nerviis.
- L. viscosum.** *W. Sp. - Pers. E. - Bertol. Pl. Gen.* 47. *L. hirsutum.* *All. Ped.* *L. sylvestre latifolium*, caule viscoso, flore rubro. *C. B. P.* 214.
- In subappenninis jugis. *Da Santo-Polo al Monte Gennaro*.... Perenn. Floret Junio. Fl. coeruleo-purpurascentes.
- 381. GALLICUM.** *L. Calycinis foliolis subulatis acutis: foliis linear-lanceolatis, alternis; inferioribus confertis: petalis calyce sub-longioribus.* *Savi B. Etr.* 2.p. 131.\*
- L. gallicum.** *All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC.* Syn. *L. sylvestre minus flore luteo.* *C. B. P.* 214.
- In aridis, collibus commune. *Sul Monte Mario*, etc. Ann. Floret Junio. Fl. flavi.
- 382. STRICTUM.** *L. Floribus sub-glomeratis, sessilibus: calycinis foliolis subulatis: foliis lanceolatis, strictis, mucronatis, margine scabris.* *Savi B. Etr.* 2.p. 132.\*
- L. strictum.** *All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC.* Syn. *Passerina Lobelii.* *J. B. H.* 3.p. 454.
- In arvis, collibus circa urbem frequens. Ann. Floret Major, Junio. Fl. lutei.
- 383. CAMPANULATUM.** *L. Foliis glaucis; inferioribus spathulatis, obtusissimis, basi bi-glandulosis.* *Bertol. Opusc. Scient. Bol. Fasc.* 2.p. 77.\*
- L. campanulatum.** *All. Pped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC.* Syn. - *Savi B. Etr.* 2.p. 132. (excl. pl. synon.) *Campanula lutea linifolia montis lupi flore volubili.* *Lob. adv.* 177. et *ic.* 414. *Linifolia campanula lutea.* *J. B. H.* 2.p. 817.
- In elatioribus sub-apenninis jugis. *Presso Subiaco*.... Perenn. Floret Junio, Fl. lutei.
- Distinctam rem esse a *L. flavo* auctorum fuse disserit cl. Bertolonius I. c.
- 384. CATHARTICUM.** *L. Foliis oppositis obovato-lanceolatis: caule superne dichotomo; petalis acutis.* *Smith Br.*\* - *Savi B. Etr.* 2.p. 134.\*
- L. catharticum.** *All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC.* Syn. *Chamaelinum subrotundo folio.* *Barr. ic.* 1165. f. 1.
- In montium sylvaticis. *Sul Monte Gennaro*.... Ann. Floret Junio, Julio. Fl. albi.
- 385. NODIFLORUM.** *L. Foliis ovato-lanceolatis, laevibus, basi biglandulosis, superne a dichotomia caulis oppositis; floribus axillaribus, sessilibus, solitariis; calycibus fructu quadruplo longioribus.*
- L. nodiflorum.** *W. Sp. - Pers. E.* L. luteum ad singula genicula floridum. *Moris. H.* 2.p. 574. s. 5.t. 6.f. 11. L. luteum sylvestre latifolium. *Col. ecphr.* 2.p. 74. t. 80.
- In sterilibus, petrosis montium. *A Tivoli negli oliveti*

*presso S. Antonio in copia .... (Ad Aspra. Col.) Perenn.  
Floret Junio . Fl. luteoli .*

Caulis erectus , basi simplex , vel parum ramosus ramis sterilibus ; superius dichotomus , vel tantum bifidus . Folia ovato-lanceolata , obtusiuscula , trinervia , nuda , basi biglandulosa , marginc cartilaginea scabra , ala cartilaginea in caulem decurrente ; inferiora alterna , ultra dichotomiam opposita , minora , angustiora . Flores ex axillis foliorum oppositorum subsessiles , solitarii , rarius binati . Calix segmentis foliaceis , linearibus , erectis , corollae tubum superantibus . Corolla monopetala , limbo campanulato , 5-partito , albo-luteola . Fructus sub-rotundus , acuminatus , calyce quadruplo brevior :

---

## C L A S S I S VI.

## HEXANDRIA.

## ORD. MONOGYNIA.

Sect I. Flores spatha , loco calycis , instructi.

- (519) *GALANTHUS* . Corolla supera hexapetala , petalis 3 interioribus brevioribus obcordatis . Stigma simplex .
- (160) *NARCISSUS* . Corolla supera , sexpartita aequalis , patens . Nectarium monophyllum sub-infundibuliforme ad faucom . Stamina intra nectarium .
- (161) *AMARYLLIS* . Corolla supera infundibuliformis , sexpartita , varia , fauce squamulis 6 instructa . Filamenta saepius declinata , vel inaequalia . Stigma trifidum , raro simplex .
- (162) *ALLIUM* . Corolla infera , sexpartita , saepius patens . Stigma simplex . Capsula triquetra . -Umbella terminalis floribus congestis , saepe bulbifera .

Sect II. Flores calyce et spatha destituti .

- (163) *LILIUM* . Corolla infera , campanulata , profunde sexpartita ; laciinis erectiusculis aut revolutis , sulco longitudinali nectariero interius exaratis .
- (164) *ORNITHOGALUM* . Corolla infera , sexpartita , supra medium patens , persistens . Filamenta laciinis corollae insita , tria exteriora basi dilatata , aut subulata . Semina sub-rotunda , nuda .
- (165) *SCILLA* . Corolla infera , sexpartita , saepius patens et caduca . Staminum filamenta glabra , filiformia . Semina rotundata . -Radix bulbosa .
- (166) *ASPHODELUS* . Corolla infera sexpartita . Filamenta basi dilatata , fornicate - recurvata , germen obtegentia . Semina angulata .
- (167) *PHALANGIUM* . Corolla infera , sexpartita , patens . Filamenta nuda , saepius glabra , filiformia . Semina angulata . -Folia plana .
- (168) *ASPARAGUS* . Corolla infera , sexpartita , erecta , petalis tribus interioribus apice reflexis . Baccula trilocularis , loculis dispermis .
- (169) *CONVALLARIA* . Corolla infera , sexfida , varia . Baccula globosa , maculata , 3 -locularis , 3 -sperma .
- (170) *HYACINTHUS* . Corolla infera campanulata aut sub-rotunda , sexfida , profunde aut brevi incisa , laciinis ae-

*qualibus patulis. Stamina corollae medio inserta. Capsula trigona.*

Sect. III. Flores apetalii calyce instructi.

- (171) *JUNCUS*. *Calix inferus, sexphyllus, glumaceus. Corolla nulla. Stigmata 3. Capsula 3-locularis, 3-valvis. Semina plurima. - Folia teretia, glabra.*
- (172) *LUXULA*. *Calix inferus, sexphyllus, glumaceus. Corolla nulla. Capsula 1-locularis, 3-valvis, 3-sperma. - Folia plana, pilosa.*

Sect. IV. Flores completi.

- (173) *BERBERIS*. *Calix sexphyllus. Petala 6, basi interna glandulis binis. Stigma umbilicatum, sessile. Baccia 1-locularis, 2-4-sperma.*

#### ORD. TRIGYNYA.

- (174) *RUMEX*. *Calix 3-phylloides. Corolla e valvulis tribus conniventibus, persistentibus. Semen 1, triquetrum. - Fl. hermaphroditici, aut diclini.*
- (175) *TRICLOCHIN*. *Calix sexpartitus laciniosis tribus interioribus petaloideis. Styli nulli. Capsula supera 3-6-locularis, loculis monospermis.*
- (176) *VERATRUM*. *Calix nullus. Corolla hexapetala e glandulosa. Capsulae tres polyspermae. Semina margine membranacea. - Flores plurimi inflorescendi, pistillo imperfecto.*
- (177) *COLCHICUM*. *Spatha. Corolla tubulosa, bullo innascens, limbo campanulato, sexpartita. Capsulae tres, connexae, inflatae, polyspermae.*
- (178) *CHAMÆROPS*. *Polygamo-dioica. Spatha compressa. Spadix ramosus. Calix 3-partitus. Corolla 3-petala. Filamenta sub-monadelpha. Diupae tres monospermae.*

#### ORD. PENTAGYNYA.

- (179) *ALISMA*. *Calix 3-phylloides, persistens. Corolla 3-petala. Capsulae plures monospermae.*
- 

#### HEXANDRIA MONOGYNIA.

Sect. I. Flores spatha, loco calycis, instructi.

(180) *GALANTHUS*.

386. *NIVALIS*, L. Scapo unifloro. *Lois. G. - Sayi B. Etr. 2. p. 219.*

*G. nivalis. All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn. Leucoium bulbosum triphyllum Dod. Pempt. 250.*

15  
Marzo 1871  
24  
Feb. 1871

In umbrosis montosis. *Sui monti Albani, Tusculani, etc.*  
Perenn. Floret Februario, Martio. Fl. candidi, petalis  
brevioribus pallide virentibus.

## (160) NARCISSUS.

25.  
Aprile 1801.  
v  
387. POETICUS. *L.* Spatha uniflora : nectario rotato, brevisimo, scarioso, crenulato; foliis obtuse carinatis, margine reflexis.

N. poeticus. *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G. et Notic.* p. 158. - *DC. Syn.* N. medio purpureus. *Dodon. Pempt.* 223.

In sylvis montium communis. *A Rocca di Papa, sul Tuscolo, etc.* Perenn. Floret Aprili. Fl. candidi nectarii margine purpureo, suaveolentes.

388. BIFLORUS. *Curt.* Spatha biflora; nectario rotato, brevissimo, scarioso, crenato: foliis acute carinatis, margine inflexis. *Smith Br.*\* - *Pers. E.*

N. biflorus. *W. Sp.* - *Lois. Notic.* p. 159.

In montium sylvis praecedente minus frequens. *A Castel Gandolfo, sul Tuscolo, etc.* Perenn. Floret Aprili, Mayo. Fl. ochroleuci nectarii margine albido.

Affinis admodum praecedenti.

389. PSEUDO-NARCISSUS. *L.* Spatha uniflora : nectario campanulato, eretto, criso, aequante petala ovata. *L. All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Bertol. Rar. It. Pl. D. 3.* p. 16.

N. pseudo-narcissus. *Smith Br.*\* - *Lois. G. et Notic.* p. 158. - *DC. Syn.* N. luteus sylvestris. *Dod. Pempt.* 227. N. flavus tubo oblongo. *Hort. Rom.* 6. t. 56.

β. Nectario petalis dimidio breviore. *Bertol. l. c.*

N. incomparabilis. *Curt.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* N. odoratus A. *Gouan.* - *Enc. N. Gouani.* *Roth.* - *Lois. Notic.* p. 51.

γ. Nectario, staminibusque in segmenta petali-formia multiplicita fatiscentibus. *Bert. l. c.* (sub δ.).

N. pseudo-narcissus β. *L.* - *W. Sp.* N. sylvestris multiplex. *Dod. Pempt.* 227.

10.  
Marzo 1801.  
id 1801.  
In montibus Tusculanis presso Monte Compatri speciem et varietatem β promiscue crescentes legit, et communicavit amicus Leander Giuffa botanices cultor aestuatissimus. Var. γ in hortis hinc inde culta sponte venit supra forniciem Templi Pacis. Perenn. Floret Martio, Aprili. Fl. lutei magni.

Speciem in varietatem β transire observat cl: Bertolonius l. c.

15. Aprile  
1801.  
390. TAZZETTA. *L.* Scapo sub-cylindrico 4-8-floro; nectario cyathiforme vix crenato (aureo), petalis ovatis aequalibus (albis) duplo breviore; foliis planiusculis glaucescentibus. *Lois. Notic.* p. 160.

N. tazzetta. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *DC. Syn.* N. medio luteus. *Dod. Pempt.* 223.

In pratis argillosis, Tyberinis praesertim vulgatissimus :  
Perenn. Floret Martio, Aprili. Fl. albi, nectario aureo.

## (161) AMARYLLIS.

391. LUTEA. *L.* Spatha uniflora : corolla campanulata, aequa-  
li, cum genitalibus erecta; staminibus alternis breviori-  
bus; stigmate simplici.  
A. lutea. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.*  
*Narcissus autumnalis major.* *Dod. Pempt.* 228.

In montosis pratis, nec non in maritimis. *A Santo-Polo,*  
*ad Ostia ...* Perenn. Floret Septembri. Fl. lutei.

## (162) ALLIUM.

- A. Foliis planis : staminibus alternis  
tricuspidatis.

392. AMPELOPRASUM. *L.* Umbella capsulifera globosa : petalis  
exterioribus carina sebris : foliis planis, carinatis : bul-  
bo sobolifero.

A. ampeloprasum. *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* -  
*DC. Syn.* - *Vivian. Ann. bot. P. 2. p. 165.* - *Savi B. Etr.* 2.  
p. 208.\* *Ampeloprasum.* *Dod. Pempt.* 690.

In incultis, siccis frequens. Perenn. Floret Junio. Fl. albi-  
do-purpurascentes.

B. Foliis planis : staminibus omnibus sulculatis.

393. SUBHIRSUTUM. *L.* Umbella capsulifera plana: foliis linea-  
ribus, sub-hirsutis. *DC. Syn.*

A. subhirsutum. *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Biy. Sic.*  
*Cent. 1. p. 17.* *Moly Dioscoridis.* *Clus H.* 192.

In aridissimis, ad muros vulgare. *Copiosamente sul Testac-  
cio, etc.* Perenn. Floret Aprili, Majo. Fl. candidi.

394. ROSEUM. *L.* Umbella planiuscula: petalis obtusis apice  
crenulatis; staminibus simplicibus brevioribus: spatha  
monophylla, scariosa, quadrifida. *Savi B. Etr.* 2. p. 210.

A. roseum. *All. Ped.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Biy.*  
*Sic. Cent. 1. p. 18.* - *Vivian. Ann. bot. P. 2. p. 66.*

a. Umbella capsulifera. *Savi l. c.* - *Lois. l. c.* - *Biy. l. c.*

A. roseum. *W. Sp.*

b. Umbella bulbifera. *Savi l. c.* - *Lois. l. c.* - *Biy. l. c.*

A. carneum. *Savi ap. Santi Viagg.* 3. p. 315. t. 6. - *Bertol.*  
*Par. It. Pl. Dec.* 1. p. 7. *Moly serpentinum* vocatum. *Lob.*  
*ic. 160.*

In agris, ad margines varietas  $\beta$  obvia. Perenn. Floret Ma-  
jo. Fl. pulchre rosei.

395. ALBUM. *Savi. ap. Santi Viagg.* 1. p. 352. t. 7. Umbella ca-  
psulifera, pauciflora; staminibus simplicibus, breviori-  
bus; petalis ovatis sub-crenatis: scapo sub-triquetro. *Sa-*  
*vi l. c. et Bot. Etr.* 2. p. 211.\*

A. album. *Biy. Sic. Cent. 1. p. 16.* *All. montanum* foliis nar-  
cissi. *Hort. Rom.* 6. t. 97.

11.  
Giugno 1871.

- Ad sepes vulgare . Perenn. Floret Martio , Aprili . Fl. candidi , antheris viridibus .
- No* 396. TRIQUETRUM . *Mill.* Umbella capsulifera pauciflora : petalis lanceolato-acutis ; staminibus simplicibus brevioribus : scapo acute triquetro ; foliis sub-triquetris . *Saci Etr. 2. p. 211.\**
- aperte 1801.* 397. TRIQUETRUM . *All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Biw. Sic. Cent. 1. p. 17.* Moly caule et foliis triangularibus . *Park. par. 142. t. 143. f. 4.*
- In sylvaticis . *Da Albano a Palazzuola in gran copia , etc.* Perenn. Floret Aprili , Majo . Fl. candidi nutantes .
397. CHAMAEOLY . *L.* Umbella capsulifera subradicali , pauciflora ; foliis linearibus sub-pilosis scapo longioribus . *DC. Syn.*
- A. chamaemoly . *W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Saci Bot. Etr. 2. p. 212. - Biw. Sic. Cent. 1. p. 19.* Saturnia . *Maratti Diss. de binis rom. pl. cum ic.* Chamaemoly an moly Diosecoridis . *Column. ecphr. 525. t. 326. - Moris. H. 2. s. 4. t. 16. f. 8.*
- In marginibus viarum , locis aridis . *Sull' Aventino , sul Testaccio , e sul Gianicolo in copia .* Perenn. Floret Januario , Februario . Fl. albi .
- C. Foliis teretibus , vel semi-teretibus : staminibus omnibus simplicibus .
398. PALLENS . *L.* Umbella capsulifera laxa : floribus pendulis truncatis , staminibus sub-inclusis , stylo brevissimo : foliis semi-teretibus . *DC. Syn. - Saci Bot. Etr. 2. p. 212.\**
- A. pallens . *All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. Gethioides sylvestre . Column. ecphr. 2. p. 6. t. 7.f. 2.*
- In agris , hortis , viis campestribus commune . Perenn. Floret Julio . Fl. spurco-albidi vel rubescentes .
- Scapus 2-3-pedalis . Spatha bivalvis .
399. PANICULATUM . *L.* Umbella capsulifera laxa , pedicellis capillaris effusis : spatha ( bivalvi ) longissima : staminibus sub-exertis : foliis semi-teretibus . *DC. Syn. - Saci Etr. 2. p. 212.\**
- A. paniculatum . *All. Red. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G.* A. foliis teretibus vagina bicorni umbella pendula suave purpurea . *Hall. de All. n. 25. t. 1.*
- In montibus ad viarum margines . *Sui Monti Tusculani , presso Viterbo , Terni , etc.* Perenn. Floret Junio , Julio . Fl. rubro-violacei .
- Scapus sub-pedalis . Spatha bivalvis longissima .
- D. Fo iis teretibus : staminibus alternis tricuspidatis .
400. VINEALE . *L.* Umbella bulbifera densa globosa : foliis teretibus , fistulosis : caule tereti . *DC. Syn.*

- A. vineale. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Savi B. Etr. 2. p. 265.*\* A. sylvestre tenuifolium. *Dod. Pempt. 683.* Scorodoprasum campestre juncifolium, etc. *Mich. N. Pl. G. p. 25. n. 3. t. 2. f. 1. et n. 4, 5, 6, 7.*

Inter segetes minus frequens: in amphitheatro Flavio. Perenn. Floret Junio. Fl. purpurascentes.

Capitulum solitarium, aut duplex, triplex bulbis confertum, nec raro floribus penitus destitutum.

*Sect. II Flores calyce et spatha destituti.*

(163) LILIUM.

401. BULBIFERUM. *L.* Foliis sparsis: corollis campanulatis erectis, intus scabris. *L.* - *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.*

g. Caule non bulbifera.

- L. crocineum. Pers. E.* *L. purpureo-croceum majus. Hort. Rom. 6. t. 82.* *L. purpureum majus et minus. Dod. Pempt. 198.*

In montium umbrosis frequens citata varietas. *Intorno ad Albano, sul Monte Gennaro, etc. Vulgo: giglio rosso.* Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. crocei, intus lineolis brevibus, ni gris notati. - *Folia 3-5-nervia.*

(164) ORNITHOGALUM.

402. UMBELLATUM. *L.* Racemo sub-corymboso, paucifloro: filamentis subulatis, basi complanatis: pedunculis scapo altioribus.

- O. umbellatum. All. Ped.* - *Smith Br.\* - W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr. 2. p. 214.*\* Bulbus len- canthemus minor. *Dod. Pempt. 221.*

In incultis arvis, pomariis commune. Perenn. Floret Aprili, Majo. Fl. albi, petalis medio dorso viridibus.

403. PYRENAICUM. *L.* Racemo longissimo, pedunculis subaequalibus, fructiferis adpressis: corollis sub-patulis, petalis linearibus obtusis; filamentis lanceolatis.

- O. pyrenaicum. All. Ped.* - *Smith Br.\* - W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr. 2. p. 215.*\* *Scilla sylvestris. Savi, 2 Cent. p. 88.* O. majus primum. *Clus. H. 187.* Asphodelus bulbosus Galeni. *Dod. Pempt. 209.*

In arvis, ad oras nemorum. *A Villa Madama, alla spalletta della Crescenza, a Palazzuola, etc. Perenn. Floret Majo. Fl. ochroleuci.*

Scapus lipedalis et ultra. Racemus oblongus 3-8-pollicaris. Bracteae membranaceae basi dilatatae, acutissimae. Corolla sub-patula.

404. NARBONENSE. *L.* Racemo sub-conico elongato: pedunculis floribusque patentibus: petalis oblongo-obovatis: filamentis lanceolatis membranaceis.

*O. narbonense. All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* -

70.  
Giugno 1871  
10 1871

70.  
Giugno 1871  
convenit  
cum asphodel  
fistulosa  
1871

*DC. Syn.* - *Savi B. Etr. 2. p. 215.\* - Dod. Pempt. 222.* Scilla montana. *Savi 2 Cent. p. 89.*

In arvis, oris nemorum, ad sepes commune. *A Villa Pamfili, alla Caffarella, alla Crescenza, etc.* Perenn. Floret Majo. Fl. albi.

Scapus pedalis, sesqui-pedalis. Racemus 3-6-pollicaris, pedunculis patentibus, inferioribus longiusculis, fructiferis scapo approximatis ut in praecedente. Bracteae lanceolato-acuminatae membranaceae. Corolla patens, intus candida, extrinsecus herbacea.

405. **NUTANS.** *L.* Racemo paucifloro: filamentis dilatatis bicornibus, alterne majoribus, conniventibus. *Savi Bot. Etr. 2. p. 216.\**

O nutans. *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* O. neapolitanum. *Clus. app. 2. p. q. t. 9.* Hyacinthus arvorum ornithogali flore. *Column. Ecphr. t. 532.*

In incultis et pomariis nonnullis. *A Monte Mario, in copia nella Villa Pamfili presso il Palazzo, etc.* Perenn. Floret Martio. Fl. majusculi, candidi, petalis medio dorso virentibus, demum penduli.

(165) **SCILLA.**

406. **MARITIMA.** *L.* Foliis lanceolatis: racemo conico elongato; bracteis refractis, subtus calcaratis. *DC. Syn.* - *Savi B. Etr. 2. p. 218.\**

Sc. maritima. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* Scilla et Pancratium. *Dod. Pempt. 690, 691.* Ornithogalum maritimum. *Hort. Rom. 6. t. 93.*

In maritimis. *A Fiumicino ... Offic. Scilla.* Perennis. Floret Augusto, Septembri. Fl. albi.

Scaps ante folia. Bulbus crassus, tunicis albis vel rufescens.

407. **BIFOLIA.** *L.* Foliis radicalibus (lanceolato-linearibus) sub-binis, scapum amplexantibus: floribus laxe racemosis sub-nutantibus. *Savi B. Etr. 2. p. 217.\**

Sc. bifolia. *All. Ped.* - *Smith Br.\** - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* Hyacinthus Fuchsii. *Dod. Pempt. 219.*

In montium nemorosis frequens. *Sui Monti Albani, Tuscolani, Cimini, etc.* Perenn. Floret Martio, Aprili. Fl. intense coerulei. - Bracteae sub-nullae.

408. **CAMPANULATA.** *Ait.* Racemo multifloro, oblongo, subconico; corollis campanulatis; bracteis dupliceibus, altera pedunculo longiore; foliis lanceolatis.

Sc. campanulata. *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Savi B. Etr. 2. p. 218.* Sc. hyacinthoides. *Jacq. ic. rar. 1.t. 65.* Hyacinthus stellaris saturate coeruleus. *C. B. P. 46.*

In luco quodam nella villa Borghese. Perenn. Floret Aprili. Fl. pallide violacei.

15.  
Feb 1821  
3 May 1807.

Bracteae binae coloratae ad singulum florem ; altera exterior sub-foliacea , pedunculo longior ; altera interior subulata , minor ad latus pedunculi erumpens .

(409) AUTUMNALIS . *L.* Foliis filiformi-canaliculatis histeranthiis ; pedunculis ebracteatis , fructiferis inflexis . Vivian. Ann. Bot. P. 2. p. 107.\*

*Sc. autumnalis* . All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 218. Hyacinthus stellaris autumnalis minor . J. B. H. 2. p. 574. - Moris. H. 2. s. 4. t. 12. f. 18. - Dod. Pempt. 219. - Lob. ic. 102.

In sterilioribus collinis , montanis et maritimis . Al Pigneto - Sacchetti , sul Monte Gennaro , ad Albano , Ostia , etc. Perenn. Floret Septembri . Fl. violacei , parvi .

(410) ASPHODELUS .

410. RAMOSUS . *L.* Caule nudo , ramoso ; bracteis angustis , triangulo-subulatis , pedicello sub-aequalibus : foliis carinatis . Savi Bot. Etr. 2. p. 213.\*

*A. ramosus* . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. A. primas . Clus. H. 196.

In marginibus , collibus , dumetis vulgarissimus . Perenn. Floret Aprili , Majo . Petala albida lineola dorsali fusca .

411. ALBUS . *L.* Caule nudo sub-simplici ; bracteis triangulis pedicello longioribus : foliis carinatis . Savi Bot. Etr. 2. p. 213.\*

*A. albus* . W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Dod. Pempt. 206. A. secundus . Clus. H. 197.

In montium siccis , dumetis . Copiosamente presso Genzano , l'Aricia ... Perenn. Floret Aprili , Majo . Petala candida lineola dorsali viridi .

Caulis ut plurimum simplex , racemosus . Foliorum color luteo-virens .

412. FISTULOSUS . *L.* Scapo nudo , apice sub-ramoso : foliis strictis , subulatis , striatis , sub-fistulosis . DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 214.\*

*A. fistulosus* . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Sebast. R. Pl. Fasc. 2. p. 28. A. minor . Clus. H. 197. - Dod. Pempt. 206. A. angustifolius floribus ex albo dilute rubentibus . Hort. Rom. 6. t. 43.

In ruderibus Amphitheatri Flavii . Perenn. Floret Februario-Majo . Petala albida , linea dorsali rufescente .

(4167) PHALANGIUM .

413. LILIAGO . Schreb. Foliis planis ; caule simplicissimo , floribus racemosis ; pistillo declinato . DC. Syn.

*Ph. liliago* . Pers. E. Anthericum liliago . L. - All. Ped. - W. Sp. - Lois. G. Ph. non ramosum . Dod. Pempt. 106.

In montanis apricis. *Sul monte Gennaro nella Valle-sco-perta.... Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. candidi.*

## (168) ASPARAGUS.

414. ACUTIFOLIUS. *L.* Caule fruticoso, inermi, angulato: foliis aciformibus, rigidulis, perennantibus, mucronatis, aequalibus. *L.* - *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.*

Corruda prior. *Clus. H. 2. p. 77.* Asp. sylvestris, seu corruda prior. *Dod. Pempt. 703.* A. aculeatus. *Hort. Rom. 5. t. 52.*

Ad sepes ubique: Vulgo: corona delle Streghe. Perenn. Floret Septembri. Fl. luteoli, odori.

415. TENUIFOLIUS. *Lam. Dict. 1.* Caule herbaceo, tereti, erecto, ramosissimo; foliis tenuissimis fasciculatis: floribus hermaphroditis; pedunculis longis sub flore articulatis. *DC. Syn.*

*A. acutifolius. Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Cat. H. Monsp. p. 81.*\*  
*A. sylvestris tenuissimo folio. C. B. P. 490.* *A. sylvestris. Matth. 478.*

In monte Artemesio a se collecta specimina communicavit doctissimus Schow Danus. Perenn. Floret Majo.. Fl. albo-flavescentes.

## (169) CONVALLARIA.

416. MULTIFLORA. *L.* Caule incurvo, tereti: foliis alternis, amplexicaulibus, ellipticis, nervosis: pedunculis axillaribus multifloris; floribus cylindricis. *Savi B. Etr. 2. p. 222.*\*

*C. multiflora. W. Sp.* - *Smith Br.*\* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn. Polygonatum. Dod. Pempt. 345.* *P. latifolium primum. Clus. H. 275.*

In sylvaticis montium communis. Presso Albano, Rocca di Papa, etc. Perenn. Floret Aprili, Majo. Fl. albi, dentibus virescentibus.

## (170) HYACINTHUS.

- 28 april 1823 417. ROMANUS. *L.* Corollis campanulatis, semi-sex-fidis, angulatis, racemosis; filamentis membranaceis. *Sebast. Rom. Pl. Fasc. 2. p. 10.t. 1. f. 2.*\*

*H. romanus. W. Sp.* - *Pers. E.* *H. comosus albus cum coeruleis staminibus. J. B. H. 2.p. 584.* - *Lobel. Adv. 460.* *H. comosus albo flore. Clus. H. 2. p. 180.*

In pascuis omnibus, marginibus, hortis copiose. Perenn. Floret Martio, Aprili. Fl. albi, senio sordidi. Antherae coeruleae.

418. COMOSUS. *L.* Corollis angulato-cylindricis, sexdentatis; summis sterilibus, longissime pedunculatis.

*H. comosus. W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *Muscari comosum. W. En. H. Ber.* - *DC. Syn. M. arvense latifolium coma*

16.10.1877.

*coerulea*. *Hort. Rom.* 6. t. 49. H. comosus spurius tertius.  
*Dod. Pempt.* 218.

In agris, cultis communis circa urbem. Perenn. Floret Martio, Aprili. Fl. coeruleo-virescentes, summi steriles, late violacei.

419. BOTRIOIDES. *L.* Floribus globosis, sexdentatis, inferioribus remotioribus : foliis strictis sub-linearibus, basi angustatis.

*H. botryoides*. *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *Muscari botryoides*. *Mill.* - *W. En.* *H. Ber.* - *DC. Syn.* *H. botryoides* *coeruleus amoenus*. *Lob. ic.* 108.

In Tusculanis montibus presso Monte-compatri. Specimina communicavit laudatus Leander Ciuffa. Perenn. Floret Aprili. Fl. coerulei margine albi.

420. RACEMOSUS. *L.* Floribus ovatis, sexdentatis, confertis, summis sessilibus : foliis laxis dependentibus, carinatis, linearibus.

*H. racemosus*. *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Dod. Pempt.* 217. *Muscari racemosum*. *Mill.* - *W. En.* *H. Ber.* - *DC. Syn.* *M. arvense juncifolium coeruleum minus*. *Hort. Rom.* 6. t. 51. *H. botryoides primus*. *Clus. H.* 1. 181.

In herbosis vulgaris. Perenn. Floret Aprili. Fl. intense coerulei.

Sect. III. Flores apetali, calyce instructi.

(171) JUNCUS.

421. ACUTUS. *Smith Br.* Culmo nudo, tereti, mucronato ; panicula terminali ; involucro diphyllo, spinoso ; capsulis rotundis, mucronatis. *Smith l.c.* - *Pers. E.*

*J. acutus a.* *L.* - *W. Sp.* *J. maritimus Lam.* *Enc.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *J. acutus maritimus anglicus*. *Moris. H. 3. s. 8.* t. 10. f. 14.

In arenosis maritimis commune : *giunco da macellari*. Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. fusco-virides. - Ad vincendum utilissimus.

422. EFFUSUS. *L.* Culmo nudo, stricto ; panicula laterali, effusa, supradecomposita, capsulis obtusis. *Smith Br.* - *Savi B. Etr. 2. p. 67.\**

*J. effusus*. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *J. laevis*. *Dod. Pempt.* 606. *J. laevis* *panicula sparsa major*. *Moris. s. 8. t. 10. f. 4.*

In udis, pascuis depresso frequens. Perenn. Floret Junio-Julio. Fl. sub-fusci.

Bractea sub panicula brevissima, sesquilinearis. - Ad vincendum utilis.

423. GLAUCUS. *Sibth.* Culmo nudo, stricto, glauco ; panicula laterali, erecta ; capsulis ellipticis, acutis. *Smith Br.* - *Savi B. Etr. 2. p. 67.*

J. glaucus. *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn. J.* inflexus. *Lam. Fl. Fr.* J. acutus vulgatus. *Lob. ic. 85.* - *Moris. H. 3. s. 8. t. 10. f. 13.*

Secus fossas, in depressis freqnens. Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. sub-fusci acuminati.

Culmi apice sub-inflexi. Panicula decomposita magis erecta, ramis elongatis. Bractea sub panicula 4-5-lineas longa. Ad vineendum utilis.

**424.** *BULBOSUS.* L. Culmo folioso, compresso; foliis linearibus, canaliculatis; corymbo decomposito, erecto, terminali: capsula ovata, foliolis calycinis longiore.

J. bulbosus. *All. Ped.* - *Smith Br.\** - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr. 1. p. 117.* J. repens apocarpos minor. *Barr. ic. 114. n. 1.* et *Gramen junceum sorghi capitulis.* *Ibid. ic. 741. n. 1.*

In pratis humidis communis. Perenn. Floret Majo, Junio. Fl. viridi-spadicei.

Corymbus terminalis, pedunculis inaequalibus, iterum atque iterum in corymbos decompositis, erectis, bracteis bracteolisque instructus.

**425.** *BUFONIUS.* L. Culmo folioso, dichotomo; foliis linearibus canaliculatis; floribus oblongis solitariis sessilibus.

J. bufonius. *All. Ped.* - *Smith Br.\** - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr. 2. p. 115.\** *Gramen bufonium erectum angustifolium majus.* *Barr. ic. 264.* J. palustris erectus caule cubitali. *Mich. N. Pl. Gen. p. 40.*

In locis spongiosis, inundatis, circa fontes vulgaris. Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. sub-virides.

**426.** *AQUATICUS.* All. Ped. Culmo folioso adscendente; foliis nodoso-articulatis, compresso-teretiusculis: panicula composita; calycinis foliolis aequalibus, obtusiussculis.

J. aquaticus. *Roth Germ.* - *Pers. E.* J. articulatus  $\alpha$ . *L. Smith Br.* J. articulatus. *W. Sp.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *Gramen junceum folio articulato aquaticum.* *Scheuchz. Agr. 331.*

In inundatis, ad Tyberim communis. Perenn. Floret Junio. Fl. fusci.

Calycina foliola constanter mucronata nobis visa.

**427.** *SYLVATICUS.* All. Ped. Culmo folioso, erecto; foliis nodoso-articulatis; panicula cymosa, decomposita; floribus fasciculatis; calycinis foliolis aristatis, interioribus longioribus:

J. sylvaticus. *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* J. articulatus  $\gamma$ . *L. \beta. Smith Br.\** *Gramen junceum folio articulato sylvaticum.* *Scheuchz. Agr. 334.* Gr. junceum articulatum palustre erectum et elatius. *Moris. H. 3. s. 8. t. 9. f. 1.*

In humentibus sylvaticis, et ad fossas frequens. Perenn.  
Floret Majo. Fl. spadicei saepe proliferi.

## (172) LUZULA.

428. VERNALIS. DC. Fl. Fr. Foliis pilosis; corymbo sub-simplici, pedunculis unifloris nutantibus; calycinis foliolis ovatis acutis: capsulis obtusis. DC. Syn.

L. pilosa. W. En. H. Ber. Juncus pilosus. L. - All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Savi B. Etr. 1. p. 114. Gr. nemorosum latifolium majus Moris. H. 3. s. 8. t. 9. f. 1. Gr. hirsutum latifolium minus. Scheuchz. Agr. 315.

In nemorosis umbrosis communis. Perenn. Floret Martio-Majo. Fl. fusci.

Sect. IV. Flores completi.

## (173) BERBERIS.

429. VULGABIS. L. Ramis simplicibus, pendulis; foliis obovatis, ciliato-dentatis. W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi Tr. d. Alb. 2. p. 52.

B. vulgaris. All. Ped. - Smith Br.\* Spina acida, sive oxyacantha. Dod. Pempt. 750.

In sepibus nonnullis sponte. A Villa Borghese, etc. Frut. Floret Aprili. Fl. lutei.

## HEXANDRIA TRIGYNIA.

## (174) RUMEX.

A. Valvulis corollinis tuberculo graniformi notatis. (Lapathum)

430. CRISPUS. L. Floribus hermaphroditis; valvulis ovatis, integris, omnibus graniferis: foliis lanceolatis, undulatis, acutis. Smith Br.\*

R. crispus. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Lapathum acutum crispum. Tabern. ic. 436. - J. B. H. 2. p. 988.

In pratis humidis, secus fossas communis. Perenn. Floret Majo, Junio. Fl. herbacei.

431. NEMOLAPATHUM. L. Suppl. Floribus hermaphroditis: valvulis linearibus obtusis, integerimis, graniferis; verticillis remotis, ramis patentibus; foliis inferioribus cordato-lanceolatis, superioribus lanceolatis undulatis.

R. nemolaphatum. W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. R. conglomeratus. Roth. R. crispus β. Pollich. Lapathum acutum minimum. Lob. ic. 284.

In nemorosis humidis, ad riyulos frequens. Perenn. Floret Majo, Junio. Fl. herbacei, parvuli, nutantes.

432. ACUTUS. L. Floribus hermaphroditis; valvulis oblongo-

April 1871  
v

1800  
8.  
Maggio 1871

18. Maggio  
1871 Sia  
sed mollis  
succulentus

76.  
Maggio 1800  
v

- gis , subdentatis , omnibus graniferis : foliis cordato-oblongis acuminatis ; racemis foliolosis . *Smith Br.\* - DC. Syn.*
- R. acutus . *All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. Lopathum sylvestre sive oxylaphathum . Dod. Pempt. 648.*  
Ad vias , in arvis vulgatissimus . Perenn. Floret Majo , Junio . Fl. herbacei .
26. Maggio 1801.
433. PULCHER . *L. Floribus hermaphroditis ; valvulis dentatis , unica praeципue granifera ; foliis radicalibus panduraeformibus ; caule glabro , divaricato-ramoso .*
- R. pulcher . *All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Lopathum ramosum procumbens pericarpio spinoso , folio fidium instar . Moris. H. 5. t. 27. f. 13.*  
Ad vias frequens . Perenn. Floret Junio , Julio . Fl. sub-herbacei .
- B. Valvulis tuberculo graniformi destitutis . -  
Sapor acidus . (*Acetosa*).
3. aprile 1801.
434. BUCEPHALOPHORUS . *L. Floribus hermaphroditis , ternatis ; valvulis dentatis nudis : pedicellis planis , recurvatis , incrassatis .*
- R. bucephalophorus . *All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Biv. Sic. Cent. 1. Acetosa ocyminifolia bucephalophoras . Col. ecphr. 1. p. 151. t. 150.*  
In agris , collibus vulgaris . Ann. Floret Majo . Fl. sub-herbacei .
16. Maggio 1801.
6. id 1801.
435. ACETOSA . *L. Floribus dioicis ; valvulis sub-orbicularibus , integris , minuto granulo notatis ; foliis oblongis sagittatis , caulinis amplexicaulibus .*
- R. acetosa . *All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Oxalis . Dod. Pempt. 648.*  
In nemorosis circa urbem communis . Alla Valle dell' Inferno , Macchia de' Mattei , etc. Perenn. Floret Majo , Junio . Fl. albido-rubentes valvulis majusculis , sub-membranaceis .
- In olitoriis colitur ad usum culinarium .
3. Maggio 1801.
436. ACETOSELLA . *L. Floribus dioicis ; valvulis integris , nudis ; foliis lanceolato-hastatis , auriculis integris .*
- R. acetosella . *All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Oxalis minima . Dod. Pempt. 650. n. 7.*  
In sterilissimis pascuis , collibus frequens . Perenn. Floret Aprili , Majo . Fl. herbacei , rubescentes .
26. Maggio 1801.
- (175) TRIGLOCHIN .
437. PALUSTRE . *L. Capsulis trilocularibus , laevibus , linearibus , basi attenuatis . W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn.*

T. palustre . *All. Ped.* - *Smith Br.* Calamagrostis 4. *Dalech.*  
H. 1006.

In uidis maritimis . *Presso Ostia* ... Perenn. Floret Majo ,  
Junio . Fl. albo-virides .

## (176) VERATRUM .

438. ALBUM . *L.* Foliis ovalibus plicatis ; racemo supradecom-  
posito ; corellis erectis ; bracteis lanceolatis . *Pers. E.*

V. album . *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* Hellebo-  
rum sive Veratrum album . *Dod. Pempt.* 385.

In montosis frequens . *Sul Monte Gennaro* , *sul Monte Cal-*  
*vo presso Subiaco* ... Offic. *Elleboro bianco* . Perenn. Flo-  
ret Junio . Fl. albido-virentes .

## (177) COLCHICUM .

439. AUTUMNALE . *L.* Corollae lacinii ellipticis : foliis lato-  
lanceolatis , strictis , hysteranthiis . *Bertol. Opusc. Scient.*  
*Bol. Fasc. 2. p. 79\**

C. autunnale . *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* -  
*DC. Syn.* C. vere et autumno florens . *Hort. Rom. 6. t. 53.*  
*C. Dod. Pempt.* 460.

In depressis pascuis circa urbem abuunde . *Al Portonaccio* ,  
*a Grotta-perfetta* , *a Villa Borghese* , etc. Perenn. Floret  
Septembri . Fl. intense rosei , rarius albi .

Folia et fructus vere perficit .

## (178) CHAMAEROPS .

440. HUMILIS . *L.* Frondibus palmatis , plicato-flabelliformi-  
bus ; stipitibus spinosis .

Ch humilis . *All. Ped. emend.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* -  
*DC. Syn.* Chamaeriphes . *Dod. Pempt.* 820.

In maritimis . *Presso Terracina* , *sul Circello* ... Flores  
luteoli .

Palma nostras ; caudice sub-nullo donata .

## HEXANDRIA PENTAGYNYIA .

## (179) ALISMA .

441. DAMASONIUM . *L.* Foliis cordato-oblongis : capsulis sex  
stellatim patentibus , subulatis . *DC. Syn.*

A. damasonium . *Smith Br.\** - *W. Sp.* - *Lois. G.* Damaso-  
nium stellatum . *Pers. E.* - *Dalech.* H. 1058. *Plantago*  
aquatica minor altera . *Lob. ic. 301.*

In stagnis . *Ad Ostia* ... Floret Aprili , Majo . Fl. albi .

442. PLANTAGO . *L.* Foliis ovatis acutis : capsulis obtuse  
trigonis . *L.* - *All. Ped.* - *Smith Br.\** - *W. Sp.* - *Pers. E.* -  
*DC. Syn.*

A. plantago . *Lois. G.* Plantago aquatica . *Dod. Pempt.* 606.  
Damasonium maximum , etc. *Hort. Rom. 4. t. 92.*

Ad ripas Tyberis , in stagnis , fossis vulgaris . Perenn. Flo-  
ret Junio . Fl. albo rosei .

- Variat foliis angustioribus. - Planta venenata.
443. RANUNCULOIDES . *L.* Folii linear-lanceolatis : capsulis pentagonis in fructum globoso-squarrosum aggregatis.
- A. ranunculoides . *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *S. vi B. Etr.* 1. p. 134.\* *Plantago aquatica humilis angustifolia* . *J. B. H.* 3. p. 788. - *Lob. ic. 300.*
- In stagnis. Presso Ostia... Perenn. Floret Majo , Junio .  
Fl. rosei .
-

## CLASSIS VIII.

## OCTANDRIA.

## ORD. MONOGYNIA.

- (180) *EPILOBIUM*. *Calix tubulosus*, limbo 4-partito caduco. Petala 4. Pollen non viscosum. *Capsula infera elongata*, 4-gona, 4-locularis, 4-valvis, polysperma. Semina papposa.
- (181) *ACER*. *Calix 5-fidus*. Petala 5. *Samarae duae basi uniae*, alato-membranaceae, 1-loculares, 1-2-spermae, superae. -Flores polygamо-monoici, vel dioici.
- (182) *CHLORA*. *Calix 8-phillus*. *Corolla hypocraheriformis*, limbo 8-fido. *Capsula 1-locularis*, 2-valvis, polysperma.
- (183) *ERICA*. *Calix 4-phillus persistens*. *Corolla campanulata*, saepe ventricosa, 4-fida, persistens. *Antherae bifidae*. *Capsula membranacea*, 4-8-locularis, loculis polyspermis. *Dissepimenta e valvularum margine*.
- (184) *DAPHNE*. *Calix corollinus*, tubulosus, 4-fidus, marescens, stamina includens. *Corolla nulla*. *Bacca 1-sperma*.
- (185) *STELLERA*. *Calix corollinus*, 4-5-fidus. *Corolla nulla*. *Stamina brevissima*, sauce calycis inserta. *Semen 1*, durum, nitidum, rostratum.
- (186) *PASSERINA*. *Calix corollinus*, 4-fidus. *Corolla nulla*. *Stamina tubo calycis imposita*. *Stylus filiformis*, *lateralis*, longus. *Semen 1*, corticatum.

## ORD. DIGYNIA.

- (187) *MOEHRINGIA*. *Calix 4-phillus*. Petala 4. *Capsula 1-locularis*, 4-valvis.

## ORD. TRIGYNIA.

- (188) *POLYGONUM*. *Calix nullus*. *Corolla calycina 5-partita*. *Semen 1*, angulatum, tectum. *Stamina 5-9* (saepe 8). *Styli 2-3*.

## ORD. TETRAGYNIA.

- (189) *ADOXA*. *Calix superus*, 4-fidus, basi extus squamis binis persistentibus. Petala nulla. *Bacca globosa*, 4-locularis, loculis 1-spermis. -Flores capitati; lateralibus numerus partium quinarius, stamina 10.

## OCTANDRIA MONOGYNYA.

## (180) EPILOBIUM.

Ser: Floribus regularibus; staminibus erectis;  
petalis emarginatis.

444. HIRSUTUM. L. Caule ramosissimo hirsuto: foliis oppositis alternisque sub-amplexicaulibus, ovato-lanceolatis, serratis, venis hirsutis: stigmate 5-partito. DC. Syn.

E. hirsutum. Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. E. grandiflorum. All. Ped. E. amplexicaule. Enc. - Savi 2. Cent. p. 94.\* Lysimachia siliquosa hirsuta magno flore. Moris. H. 2. s. 5. t. 11. f. 5.

Secus rivulos, ad stagna communis. *A Villa Pamfili, alla Caffarella, etc.* Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. rosei grandiusculi.

Folia inferiora semi-decurrentia.

445. PUBESCENS. Roth Germ. 1. Caule sub-simplici villoso; foliis oppositis alternisque sub-sessilibus, lanceolatis, denticulatis, utrinque molliter pubescentibus: stigmate 4-partito.

E. pubescens. W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. E. hirsutum β. L. Sp. E. hirsutum. All. Ped. E. parviflorum. Smith Br.\* E. molle. Lam. Enc. - DC. Syn. Lysimachia siliquosa hirsuta parvo flore. Moris. H. 2. s. 5. t. 11. f. 4.

Secus rivulos, ad stagna frequens. *A Villa Pamfili, Villa Borghese, sul Tevere, etc.* Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. rosei.

446. TETRAGONUM. L. Caule sub-tetragono, glabriuscule: foliis lanceolatis, glabris, denticulatis, sessilibus; imis oppositis: stigmate indiviso.

E. tetragonum. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Lysimachia minor. Tabern. ic. 184. Ad fossas, stagna, locis umbrosis. *Sullago e nei viali della Villa Borghese, etc.* Perenn. Floret Junio. Fl. rubelli.

Caulis saepius glaberrimus, sub-teres, superne ramosus. Folia sessilia, glabra, lanceolata, angusta, acuta; supra lanceolato-linearia.

447. MONTANUM. L. Caule tereti, sub-pubescente, stricto: foliis ovatis basi rotundatis, brevissime petiolatis, dentatis, glabris, oppositis: stigmate 4-partito.

E. montanum. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Pseudo-lysimachium purpureum primum. Dod. Penapt. 85.

In montium sylvaticis. *Sul Monte Gennaro, sui Monti Tuscani....* Perenn. Floret Julio. Fl. pulchre rosei.

448. LANCEOLATUM. Nob (Fl. Rom. Prod. Tab. 1. f. 2.) Caulis tereti, incurvo: foliis lanceolatis, in petiolum attenuatis, dentatis, glabris: stigmate 4-partito.

Scigno 1891.

In umbrosis , ad oras nemorum , sepes circa Romam frequens . Copiosamente intorno ai boschetti della Caffarella presso la Grotta di Egeria , etc : intorno a Viterbo sotto le siepi .... Perenn . Floret Julio , Augusto . Fl. dilute rosei , vel carnei , parvi .

Caulis pedalis , quandoque bipedalis et ultra , ascendens , apice sub-nitante incurvus , teres , glaber , superiore parte oculo armato puberulus , inferne sub-simplex , senio purpurascens . Folia opposita vel alterna omnino lanceolata 8-10-lineas longa , 3-4-lineas lata , basi in petiolum lineam longum attenuata , margine subundulata , dentibus acutis remotis instructa , inferne integerrima , apice obtusiuscula , glabra , lacte viridia , vel aetate purpureo colore suffusa . Racemus terminalis , foliolosus , 4-8-florus , floribus pedunculatis , alternantibus , remotiusculis , erectis . Petala rosea , vel allida , emarginato-bifida vix sessuilineam longa , calyceam superantia . Stamina erecta stylum subaequantia , antheris albo-luteolis . Stigma omnino quadrilobum albidum . Germen tetragonum cum contiguo calyce indutum lanugine albida sub lente manifesta .

Conf. Lysimachia ramosa , glabra , violae surrectae foliis splendentibus . Bocc. mus. 52. t. 16.

(18) ACER .

449. PSEUDO-PLATANUS . L. Foliis quinquelobis , inaequaliter serratis , subtus glaucis : racemis pendulis . Enc. - Savi Tr. d. alb. 1. p. 58.

A. pseudo-platanus . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. A. major . Dod. Pempt. 840.

In montium sylvaticis vulgare . Ad Albano , Castel Gandolfo , Frascati , etc . Vulg: acero fico . Arb. Floret Aprili , Majo . Fl. sub-virides .

450. CAMPESTRE . L. Foliis quinquelobis integris , subtus subpubescentibus , lobis majoribus obsolete sinuatis ; racemis erectis ; samaris sub-glabris , alis patentibus . Savi Tr. d. alb. 1. p. 54.\*

A. campestre . All. Ped. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. A. minor . Dod. Pempt. 840.

In sylvaticis , et ad sepes passim . Vulgo : acero , oppio , stucchio . Arb. Floret Aprili , Majo . Fl. sub-virides .

451. MONSPESSULANUM . L. Foliis trilobis , coriaceis , glabris , integris ; samaris alis parallelis . Savi Tr. d. alb. 1. p. 57.\*

A. monspessulanum . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois G. - DC. Syn. A. trilobatum . Enc. A. trifolium . Pluk. Alm. t. 251. f. 3.

In montosis minus freqnens . Sul Monte Gennaro .... Arb. Floret Aprili . Fl. sub-virides .

3.  
Maggio 1801.

## (182) CHLORA.

452. PERFOLIATA . L. Mant. Foliis perfoliatis . L. - Smith Br.\*  
W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn.  
Gentiana perfoliata . L. Sp. - All. Ped. Centaurium luteum  
perfoliatum . Moris. H. 2. p. 565. s. 5. t. 26. f. 1, 2.  
In collibus , pascuis siccis , ad muros frequens . Ann. Flo-  
ret Junio , Julio . Fl. lutei .

## (183) ERICA.

453. ARBOREA . L. Antheris aristatis ; corollis campanulatis ,  
stylo exerto ; foliis ternis , ramulis incanis , villosis .  
Pers. E. - Savi Tr. d. alb. 1. p. 106.  
E. arborea . All. Ped. - W. Sp. - Lois. G. - DC. Syn. E. major  
flore albo . Lob. ic. 2. p. 214.  
In sterilissimis collibus circa urbem , et mare versus vulga-  
tissima . Frut. Floret Martio-Majo . Fl. albi , sub-carnei .  
Hujus ramis scopas conficiunt .
454. MULTIFLORA . L. Antheris muticis , exertis ; stylo exer-  
to ; corollis campanulatis ; floribus axillaribus ; pedun-  
culis longitudine floris ; foliis quinis linearibus , glabris .  
W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Savi Tr. d. alb. 1. p. 107.  
E. multiflora . Biv. Sic. Cent. 1. p. 33. E. foliis corios multi-  
flora . J. B. H. 1. p. 356.  
In sterilibus maritimis abunde . Intorno ad Ostia , etc. Frut.  
Floret autumno . Fl. purpurascentes .

## (184) DAPHNE.

- Feb 10. 1807?  
455. LAUREOLA . L. Racemis axillaribus , quinque-floris ; fo-  
liis lanceolatis , glabris , perennantibus . Savi B. Etr. 2.  
p. 228.\*  
D. laureola . Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. - E. Lois. - G. - DC.  
Syn. Thymaelaea laureola . All. Ped. Laureola . Dod.  
Pempt. 365.

In montium umbrosis communis . Presso Palazzuola , Fra-  
scati , etc.

Hanc in officinis nostris sumunt pro Mezereo .

456. GNIDIUM . L. Racemis terminalibus , paniculatis ; foliis  
lineari-lanceolatis , acuminato-cuspidatis , perennantibus .  
W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 229.\*  
D. gnidium . Lois. G. Thymaelaea gnidium . All. Ped. Th.  
Dod. Pempt. 364.

In ericetis , sylvaticis circa urbem , et mare versus . A  
Monte Mario , nella Valle dell' inferno , ad Ostia , etc.  
Frutic. Floret autumno . Fl. albidi .

457. COLLINA . Smith Spicil. t. 18. Floribus fasciculatis termi-  
nalibus : foliis obovatis obtusis , supra glaberrimis , sub-  
tus villosis . Smith l. c. - W. Sp. - Pers. E. - Savi Tr. d.  
alb. 1. p. 105.

Chamelaea alpina incana . Lob. ic. 378.

In sylvaticis , ericetis mari proximis . In copia nella mae-

## OCTANDRIA MONOGYNIA.

141

*chia di Castel Fusano, etc. Frut. Floret Aprili. Fl. extus albo-tomentosi, intus rubelli.*

### (185) STELLERA.

458. PASSERINA. *L. Floribus axillaribus, sessilibus, quadrididis: foliis linearibus, W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn.*

*S. passerina. All. Ped. - Lois. G. Linaria altera botryoides montana. Column. Ecphr. 1. p. 82. t. 80.*

*In collibus, ericetis. Alla Valle dell' Inferno .... Ann. Floret Julio. Fl. albido-sub-lutei.*

### (186) PASSERINA.

459. HIRSUTA. *L. Floribus hermaphroditis axillaribus; foliis carnosis, extus glabris; caulis tomentosis. DC. Syn.*

*P. hirsuta. W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Biv. Sic. Cent. 1. p. 65. Sanamunda tertia. Clus. H. 89. Sesamoides parvum Dalechampii. J. B. H. 1. p. 595.*

*In maritimis arenosis. Ad Ostia, a Civitavecchia, etc. Frut. Floret vere ad autumnum. Fl. luteoli.*

## OCTANDRIA DIGYNIA.

### (187) MOEHRINGIA.

460. MUSCOSA. *L. Foliis linearibus connatis. Pers. E.*

*M. muscosa. All. Ped. - W. Sp. - Lois. G. - DC. Syn. Alsine saxifraga augustinifolia minima montana. Column. ecphr. 1. p. 292. t. 290.*

*Ad fissuras rupium in umbrosis montium. A Monte Gennaro, presso l'Aricia, etc. Perenn. Floret Junio. Fl. albi.*

## OCTANDRIA TRIGYNIA.

### (188) POLYGONUM.

*A. stylo bifido, ant staminibus minus octo.*

461. AMPHIBIUM. *L. Floribus pentandris semi-digynis: spica ovata, foliis lanceolatis.*

*P. amphibium. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Potamogeiton. Dod. Pempt. 582.*

*In stagnis, fluviis natans, vel ad eorum margines. Sul Tevere alla Renella, a Marmorata, etc: copiosamente intorno al Lago d' Albano .... Perenn. Floret Augusto. Fl. rosei.*

462. HYDROPIPER. *L. Floribus hexandris semi-digynis: spicis fiformibus nutantibus: foliis lanceolatis, immaculatis, ochreis sub-muticis.*

*P. hydropiper. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Hydropeperi. Dod. Pempt. 6c7.*

*Secus fossas, in aquosis frequens. Ann. Floret Augusto Septembri. Fl. pallide rubri vel albidi, remotiusculi.*

Ob saporem acrem loco piperis adhibent interdum villici.

463. PERSICARIA . *L.* Floribus hexandris semi digynis : spicis oblongis ; foliis lanceolatis ; pedunculis laevibus , ochreis ciliatis .

*P. persicaria . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Persicaria mitis maculosa. Hort. Rom. 8. t. 58. P. Dod. Fempt. 608.*

Secus fossas , vias , ripas passim . Floret aestate . Fl. rosei . Folia insipida , saepius macula nigra semilunata .

*B. Floribus octandris trigynis , axillaribus .*

464. MARITIMUM . *L.* Floribus axillaribus sub-quaternis , pedunculatis : foliis elliptico-lanceolatis sub-carnosis ; ochreis bilobis , lobis integris : caule suffruticoso , prostrato .

*P. maritimum . All. Ped. - W. Sp.\* - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Hort. Rom. 8. t. 59. - Camer. Epit. 691.*

In maritimis nostris communis . Perenn. Floret aestate . Fl. dilute purpurei , campanulati .

30. Ago 1801  
365. FLAGELLARE . Bertol. ined. (\*) Floribus axillaribus , sub-quaternis , pedunculis flore longioribus : foliis lanceolato-linearibus , ochreis laceris : caule suffruticoso , prostrato .

*P. majus longissimis flagellis donatum Romanum . Bocc. mus. 66. t. 58. P. angustifolium majus . Barr. obs. 1141. ic. 546.*

In arvis , viis , aggeribus e polvere puteolano ( vulgo pozolana ) conflatis passim circa Romanam , et in clivis Albanis , Tuscanis , Vejentanis , Ciminis . Perenn. Floret Julio-Octobri . Fl. pulchre rosei , aetate rubri .

Radix sub-lignosa , tenacissima , fusca , longa . Caules flagelliformes , suffruticosi , viminum ad instar flexiles ( viciendi usui apti ) , tenacissimi , fusco-rubri , basi subsimplices sub-aphylli , cortice ramentaceo , superne ramosi , 5 pedes etiam longi , prostrati , vel ab acclivibus viarum aggeribus pendentes , perennantes . Folia polygoni ayicularis lanceolato-angusta , magis acuta et glaucescentia , pagina inferiore valde nervosa , margine revoluta sub-cripso . Nodi valde crebri , ochreis longis admodum laceris , albo-membranaceis . Paulo infra nodum glandulae fuscae , 5 circiter , rarius in tenuissimam radiculam abeuntes . Flores axillares 3-4 , interdum 2 , alter sub-sessilis , reliqui pedunculati : pedunculi tenues ,

(\*) Religiose nomen servamus a cl: Bertolonio impositum speciei huic , jundiu a se in Horto Bononiensi cultae , ut ipse affirmavit in literis , cum indigena specimina stirpis a nobis repertae accepisset .

apice subnutantes, ultimus flore suo sesqui-longior. Corolla campanulata P. maritimi, parum minor, carneus, vel roseus, centro intensius purpurea, demum rubra. Antherae aureae. - Dum floret elegantissima planta, et a P. aviculari distinctissima, quocum tenerior facie nonnihil convenit.

466. AVICULARE. L. Floribus axillaribus, sub-geminatis; foliis lanceolato-angustis margine scabris; ochreis membranaceis laceris: caule herbaceo procumbente.  
 P. aviculare. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. P. mas. Dod. Pempt. 113. P. angustifolium minus. Barr. obs. 1142. ic. 545.
- In incultis, ad vias ubique. Offic. centinodia. Annuum. Floret Augusto. Fl. albo-carnei, parvuli.
467. BELLARDI. All. Ped. 2052. t. 90. f. 2. Floribus axillaribus sub-ternis; foliis elliptico-lanceolatis; ochreis laceris: caule erecto, ramoso.
- P. Bellardi. W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. In incultis, areis hortorum frequens. A Villa Medici, Villa Borghese, etc. Ann. Floret Augusto. Fl. purpurascentes. Caulis erectus, ramosissimus, firmior quam in P. aviculari.
- C. Floribus octandris, trigynis, paniculatis.
468. DUMETORUM. L. Foliis triangulari-sagittatis; caule volubili, sub-striato; valvulis seminalibus alatis. DC. Syn. P. dumetorum. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. Convolvulum nigrum. Dod. Pempt. 396.
- Ad sepes et in umbrosis montium, et circa urbem. Ann. Floret aestate. Fl. spurco-albi.

## OCTANDRIA TETRAGYNIA.

## (189) ADOXA.

469. MOSCHATELLINA. L. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi 2 Cent. p. 102.\* - Hort. Rom. 2. t. 69.
- Moscatellina adoxa All. Ped. - M. foliis fumariae bulbosae. J. B. H. 3. p. 206.
- In montium umbrosis. Sulla cima del Monte Cavi... Perenn. Floret Aprili. Fl. sub-virides.

10. Ago  
1871

20. Marti 180

## CLASSIS IX.

## ENNEANDRIA.

## ORD. MONOGYNIA.

- (190) LAURUS. *Calix nullus. Corolla 4-6-partita. Filamenta 8-12 dupli serie: exteriora omnia fertilia; interiora alterna sterilia, altera fertilia et basi bi-appendiculata, aut bi-glandulosa. Drupa carnosa, monosperma.*

## ORD. HEXAGYNIA.

- (191) BUTOMUS. *Calix nullus. Corolla sexpetala. Capsulae 6, polyspermae, superae.*

## ENNEANDRIA MONOGYNIA.

## (190) LAURUS.

26  
April 1871  
Scorrecta

470. NOBILIS. *L. Foliis lanceolatis, coriaceis, sub-undulatis, venosis, perennantibus: floribus sub-4-fidis, dioicis.*

*Pers. E. - Savi Tr. d. Alb. 1. p. 133.  
L. nobilis. All. Ped. - W. Sp. - Lois. G. - DC. Syn. L. Dod. Pempt. 849.*

In viridariis omnibus culta, et in arvis, collibus, ad fo-  
veas saepe sponte. Vulgo: lauro. Arb. Floret sub hymen,  
et primo vere. Fl. albi.

## ENNEANDRIA HEXAGYNIA.

## (191) BUTOMUS.

471. UMBELLATUS. *L. - All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn.*

*Juncus floridus. J. B. H. 2. p. 524. Gladiolus aquatilis. Dod. Pempt. 601.*

In montium fossis. Presso Tivoli... Perenn. Floret Ju-  
nio, Julio. Fl. rosei.

## C L A S S I S X.

## DECANDRIA.

## ORD. MONOGYNIA.

- (192) *CERCIS*. *Calix campanulatus*, 5-dentatus, inferne gibibus. *Corolla papilionacea*, petalis unguiculatis. *Carina dipetala*, vexillo aequalis, alis brevior. *Legumen compressum*, polyspermum.
- (193) *TRIBULUS*. *Calix 5-partitus*. *Petala 5, patentia*. *Stylus nullus*. *Stigma 5-lobum*. *Capsulae 5, approximatae*, spinosae, polyspermae.
- (194) *RUTA*. *Calix 5-partitus*. *Petala 5, concava*, unguiculata. *Receptaculum punctis melliferis 10 cinctum*. *Capsula globosa*, 5-locularis, 5-loba. - *Partium floris numerus interdum quaternarius*, staminibus 8.
- (195) *ARBUTUS*. *Calix minimus 5-partitus*. *Corolla ovata*, limbo parvo, quinquefido, revoluto. *Bacca 5-locularis*, supera.
- (196) *STYRAX*. *Calix campanulatus*, sub-integer, inferus. *Corolla 5-7-partita*, tubo brevi, calyci inserta. *Filamenta basi coalita*. *Drupa globosa*, exsuccea, nuce ossea, monosperma.

## ORD. DIGYNIA.

- (197) *SAXIFRAGA*. *Calix 5-partitus*, persistens. *Corolla 5-petala*. *Capsula birostris*, unilocularis, polysperma, inter rostra dehiscens.
- (198) *GYPSOPHYLA*. *Calix campanulatus*; angulatus, margine membranaceus. *Petala 5*, vix unguiculata. *Capsula globosa*, 1-locularis, 5-valvis.
- (199) *SAPONARIA*. *Calix tubulosus*, 5-dentatus, basi squamis destitutus. *Petala 5 unguiculata*. *Capsula oblonga* 1-locularis.
- (200) *DIANTHUS*. *Calix tubulosus*, 5-dentatus, basi squamis 4 circiter instructus. *Petala 5, unguiculata*. *Capsula cylindrica* 1-locularis.

## ORD. TRIGYNIA.

- (201) *CUCUBALUS*. *Calix campanulatus*, instatus, quinquefidus. *Petala 5, unguiculata*. *Fructus carnosus* 1-locularis, polyspermus, non dehiscens.
- (201) *SILENE*. *Calix tubulosus*, aut centricosus, 5-dentatus.

- Petala 5, unguiculata, fauce squamis coronata, rarius destituta. Capsula 3-locularis, apice dehisces, polysperma.*
- (203) *STELLARIA*. *Calix 5-phylus, patens. Petala 5, bifida. Capsula ovata, unilocularis, 6-valvis, polysperma.*
- (204) *ARENARIA*. *Calix 5-phylus, patens. Petala 5, integra. Capsula 1-locularis, polysperma, in valvas 3 dehisces.*

## ORD. PENTAGYNYA.

- (205) *COTYLEDON*. *Calix 5-fidus. Corolla monopetala, tubulosa, 5-fida lobis rectis acutis. Squamae nectariferae 5 ad basim germinis. Capsulae 5.*
- (206) *SEDUM*. *Calix 5-fidus. Petala 5. Squamae 5 ovatae, obtusae, integrae ad basim geminis. Capsulae 5 -Partium numerus saepe quaternarius-septenarius, staminum duplex.*
- (207) *OXALIS*. *Calix 5-phylus. Petala 5 ungue subcoalita. Stamina alterna longiora, submonadelpha. Capsula 5-gona, 5-locularis, 5-valvis, elastice dissiliens.*
- (208) *LYCHNIS*. *Calix tubulosus, 5-dentatus. Petala 5, unguiculata, emarginata, vel lacinata, fauce saepius coronata. Capsula uni-aut 5-locularis.*
- (209) *CERASTIUM*. *Calix 5-phylus. Petala 5 bifida, quandoque sub-integra. Capsula supera unilocularis globosa, vel cylindracea, apice dehisces ore decendentato.*

## ORD. DECAGYNYA.

- (210) *PHYTOLACCA*. *Calix nullus. Petala 5, calycina. Baccia supera, 10-locularis, decasperma. Flores 7-20-andri, 5-10-gyni.*
- 

## DECANDRIA MONOGYNIA.

- (192) *CERCIS*.
472. *SILIQUASTRUM*. *L. Foliis cordato-orbiculatis glabris. L. - All. Ped. - DC. Syn.*  
*C. siliquastrum. W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Saci Tr. d. Alb. 1. p. 85. Arbor Judae. Dod. Pempt. 786.*  
*In sylvaticis, et ad sepes passim. Vulgo: albero di Giuda. Alb. Floret Martio-Aprili. Fl. intense rosei.*
- (193) *TRIBULUS*.
473. *TERRESTRIS*. *L. Foliis sub-6-jugis, subaequalibus: caulinibus prostratis; capsulis 4-cornibus.*

## DECANDRIA MONOGYNIA.

147

*Tr. terrestris. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Hort. Rom. 5. t. 17. - Dod. Pempt. 557.* Tr. ter-  
restris minor, incanus hispanicus. *Barr. ic. 558.*

Ad vias campestres et urbanas vulgaris. Ann. Floret Julio-  
Octobri. Fl. lutei.

(194) RUTA.

474. CHALEPENSIS. *L.* Foliis decompositis, foliolis oblongis;  
petalis ciliato-dentatis; bracteis cordatis.

*R. chalepensis. W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn.*  
*R. chalepensis angustifolia, petalis villis scatentibus. Mo-*  
*ris. H. 2. p. 508. s. 5. t. 35. f. 8.*

Ad muros frequens. Perenn. Floret Majo, Junio. Fl. luteo-  
virentes.

(195) ARBUTUS.

475. UNEDO. *L.* Arborea: foliis glabris, obtuse serratis: pa-  
nicula terminali: baccis polyspermis.

*A. unedo. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. -*  
*Lois. G. - DC. Syn. - Savi Tr. d. alb. 1. p. 68. A. Dod.*  
*Pempt. 804.*

In sylvaticis, montium praesertim communis. Ital. *Corbez-*  
*zolo*. Arb. Floret Novembri. Flores albi. - Fructus edu-  
les vulgo: *cerase-marine*.

(196) STYRAX.

476. OFFICINALIS. *L.* Foliis ovatis, subtus villosis, racemis  
simplicibus, folio brevioribus. *Ait. - W. Sp. - Pers. E. -*  
*Lois. G. - DC. Syn. - Savi Tr. d. Alb. 2. p. 183.*

*St. officinalis. All. Ped. St. folio mali cotonei. C. B. P. 452.* -  
*Duham. T. 1. t. 19.*

In agro Tiburtino copiose: *Nella Villa d'Adriano, e da*  
*quella fino a Palombara. Frut. Floret Aprili, Majo.*  
Fl. albi.

## DECANDRIA DIGYNIA.

(197) SAXIFRAGA.

477. ROTUNDIFOLIA. *L.* Foliis omnibus petiolatis, rotundato-  
reniformibus, dentatis: caule paniculato: germe supero.

*S. rotundifolia. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. -*  
*DC. Syn. - Savi 2 Cent. p. 210.\* Sanicula montana secun-*  
*da. Clus. H. 307.*

In montosis umbrosis. *Sul Monte Gennaro...* Perenn. Flo-  
ret Iunio. Fl. albi sanguineis punctis notati.

478. GRANULATA. *L.* Foliis rotundato-reniformibus lobatis,  
caulinis sub-sessilibus: caule sub-racemoso; radice gra-  
nulata: germe semi-infuso.

*S. granulata. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. -*  
*Lois. G. - DC. Syn. S. alba. Dod. Pempt. 316.*

10. Magg. 1800

In sylvaticis montosis. *A Rocca di Papa sul rapillo ... Perenn.* Floret Aprili; Mayo. Fl. albi impunctati.

- 1*  
*aprile 1891 -*
479. TRIDACTYLITES. *L.* Foliis cuneiformibus, trifidis, alternis; summis indivisis; caule paniculato: germine infero. S. tridactylites. *All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. Lois. G. - DC. Syn. - Biv. Sic. Cent. 1. S. verna annua, etc. Hort. Rom. 4. t. 82. Paronychia altera. Dod. Pempt. 113.*  
In muris, tectis, glareosis vulgatissima. Ann. Floret primo-vere. Fl. albi.

(198) GYPSOPHILA.

480. SAXIFRAGA. *L.* Calycibus angulatis, squamis 4 basi instructis; petalis emarginatis: foliis linearibus.  
G. saxifraga. *W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 1. p. 157.\* Dianthns saxifragus. L. Sp. - Biv. Sic. Cent. 1. p. 32. Lychnis pumila caryophyllata flore rubello Barr. ic. 998.*

In rupestribus, ad muros vulgatissima. Perenn. Floret tota aestate. Fl. rosei.

(199) SAPONARIA.

481. OFFICINALIS. *L.* Calycibus cylindricis glabris; foliis ovato-lanceolatis. *DC. Syn.*  
S. officinalis. *All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. Lois. G. S. Dod. Pempt. 179. Lychnis sylvestris, quae Saponaria vulgo. Hort. Rom. 6. t. 33.*  
In sepibus communis. Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. rosei.

482. VACCARIA. *L.* Calycibus pyramidatis quinque-angulatis: foliis ovatis, acuminatis, sessilibus. *L. - All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 1. p. 138.\**

Vaccaria. *Dod. Pempt. 104.*

Inter segetes montium. *Presso Santo-Polo ... Ann. Floret Mayo. Fl. rosei.*

483. OCYMOIDES. *L.* Calycibus cylindricis villosis: calibus ramosissimis prostratis; foliis ovato-lanceolatis. *DC. Syn.*  
S. ocymoides. *All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. Ocymoides repens polygonifolia. Lob. ic. 341.*

In montosis. *Sul Monte Gennaro ... Perenn. Floret Junio. Fl. purpurascentes.*

(200) DIANTHUS.

484. BARBATUS. *L.* Floribus aggregatis, fasciculatis; squamis calycinis ovato-subulatis tubum aequantibus: foliis lanceolatis. *L. - All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. DC. Syn.*

In sylvaticis, umbrosis montium. *Presso Albano, sul Monte Cavo in copia, etc. Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. rosei, purpurei.*

485. ATRO-RUBENS. *All. Ped.* n. 1545.\* Floribus aggregatis, capitatis; squamis calycinis ovatis aristatis tubo brevioribus; involucro ovato aristato longitudine capituli; foliis linear-lanceolatis, connato-vaginantibus, enerviis.

D. atro-rubens. *W. Sp.*\* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Jacq. rar.* 3. t. 467. *Caryophyllum sylvestris*, flore rubro plurimo, etc. *Segu. Ver.* 1. t. 7. f. 2.

In collibus arenosis sylvaticis. *Alla Macchia de' Mattei lungo la strada .... Perenn.* Floret Junio, Julio. Fl. purpurei. - Gaules 2-4-pedales.

486. ARMERIA. *L.* Floribus aggregatis, fasciculatis: squamis calycinis lanceolatis villosis tubum aequantibus. *L.* - *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.*

*Caryophyllum barbatus. Segu. Veron.* 1. t. 7. f. 4. *Armeria sylvestris altera. Lob. ic.* 448.

In arvis sterilibus communis. Ann. Floret Junio, Julio. Fl. rubri.

487. PROLIFER. *L.* Floribus aggregato-capitatis; squamis calycinis ovatis obtusis, muticis, tubum superantibus. *L.* - *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.*

*Caryophyllum sylvestris prolifer. Segu. Veron.* 1. t. 7. f. 1. *Armeria prolifera. Lob. ic.* 449.

In glareosis, sterilibus arvis vulgaris. Ann. Floret Majo: Fl. rosei, ephemeri. - Variat flore solitario.

## DECANDRIA TRIGYNIA.

## (201) CUCUBALUS.

488. BACCIFER. *All. Ped.* Calycibus campanulatis; petalis distantibus: ramis divaricatis; foliis ovatis. *DC. Syn.*

*C. baccifer. Smith Br.*\* *C. bacciferus. L.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *Silene baccifera. L.* - *W. Sp.* *Alsine repens. Dod. Pempt.* 403. *C. Plinii. Hort. Rom.* 6. t. 34.

In umbrosis, ad sepes. *Nella Valle dell' Inferno .... Perenn.* Floret Julio, Augusto. Fl. albidi.

## (202) SILENE.

A. Calyce glabro.

489. INFLATA. *Smith Br.* Calycibus inflatis, reticulato-venosis; petalis fauce sub-nudis: foliis ovato-lanceolatis: caule erecto, paniculato-dichotomo; floribus e dichotomia longe pedunculatis.

*S. inflata. DC. Syn.* *Cucubalus Behen. L.* - *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *Behen album sive Polemonium. Dod. Pempt.* 172. *Lychnis sylvestris quae Behen album vulgo. Hort. Rom.* 6. t. 29.

In avis, ad vias frequens. Perenn. Floret Majo, Junio.  
Fl. albi.

- 6.*  
*maggio 1871.*
490. CRETICA. L. Erecta, laevis; caule filiformi superne paniculato-dichotomo, paucifloro; floribus erectis longe pedunculatis; calycibus glabris decemangularibus; petalis bifidis, patulis.

S. cretica. W. Sp. - Pers. E. Visago foliis inferioribus hellichis, superioribus tunicae. Dill. Elth. 422, t. 314 f. 404., 405.

In montium viis umbrosis. Presso ad Albano, Castel-Gandolfo, sul Monte Gennaro, sull'Artemisio, etc. Ann. Floret Majo, Junio. Fl. purpurei.

491. ACAULIS. L. Caespitosa, depressa, acaulis: foliis linearibus patulis: flore solitario; petalis emarginatis. S. acaulis. All. Ped. t. 79 f. 1. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. Lois. G. - DC. Syn.

*7.*  
*Settembre 1871.*

β. Excpa: flore sessili fructibus sub-rotundis. All. Ped. t. 79 f. 2.

In editissimis montium jugis. Sul monte Calvo presso Subiaco ... Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. purpurei.

492. ARMERIA. L. Floribus fasciculatis, fastigiatis; petalis integris, acute-coronatis: foliis superioribus cordatis, glabris.

S. armeria. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. Lois. G. - DC. Syn. Armerius flos quartus. Dod. Pempt. 176.

In avis, sylvaticis frequens etiam circa urbem. Ann. Floret Junio, Julio. Fl. purpurei. - Caulis glaucescens sub geniculis valde viscidus.

B. Calyce pubescente, aut hirsuto.

493. OTITES. Smith Br.\* Dioica: floribus paniculatis sub-vermicillatis; pedunculis glabris: petalis linearibus indivisis, undulatis, fauce nudis; foliis inferioribus sub-spathulatis, caulinis linearibus.

S. otites. Pers. E. - DC. Syn. Cucubalus otites. L. - All. Ped. - W. Sp. - Lois. G. Sesamooides magnum salmanticum. Clus. H. 295.

In saxosis montanis. Presso Terni, sul Monte Gennaro .... Floret Julio. Fl. albo-virentes, parvuli.

- 90*  
*April 1871.*  
*19. 8. 1871.*
494. ITALICA. DC. Pubescens: foliis ovato-lanceolatis: paniculae ramificationibus oppositis, patentibus; floribus erectis; calycibus clavatis; petalis semibifidis, fauce nudis.

S. italicus. Pers. E. Cucubalus italicus. L. - Jacq. Obs. 4 t. 79. - All. Ped. - W. Sp. - Lois. G. - Sebast. Rom. Pl. Fasc. 2. p. 40.

In umbrosis, ad sepes collium et montium praesertim vulgarissima, et in Amphitheatro Flavio. Bienn. Floret Aprili, Majo. Fl. albi.

495. **CONICA.** *L.* Caule superne paniculato-dichotomo, pauci-floro; petalis bifidis, coronatis; calycibus fructus conicis, striis 3o: foliis linear-lanceolatis molibus.  
*S. conica.* *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *Lychnis sylvestris* altera incana caliculis striatis. *Lob. ic. 338.*
- In aridis. Presso il canale della Solfatara andando a Tivoli. Ann. Floret Majo, Junio. Fl. rosei, odori.
496. **PENDULA.** *L.* Pubescens: caule adscendente ramoso: foliis ovato-lanceolatis: floribus racentosis, laxis, secundis: calycibus fructiferis inflatis, pendulis, costis 10 scabris piloso-glandulosis.
- S. pendula.* *W. Sp.* - *Pers. E.* *Viscago hirsuta* sicula lychnidis aquatica facie supina. *Dill. Elth.* 421. t. 312. f. 404.
- In arvis haud infrequens. Sui colli di Prata-lata, ad Albano presso S. Paolo, a Tivoli, etc. Ann. Floret Aprili, Majo. Fl. saturate rosei. - Caulis saepe procumbens.
497. **GALLICA.** *L.* Hirsuta: caule sub-simplici; foliis ob-ovato-cuneiformibus: floribus sub-spicatis alternis, secundis, erectis; petalis indivisis, lamina obliqua.
- S. gallica.* *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *Viscago hirta gallica*, flore parvo carneo, petalis integris. *Dill. Elth.* 419. t. 310. f. 399.
- In arvis sterilibus vulgaris. Ann. Floret Majo. Fl. carni.
498. **SERICEA.** *All. Ped.* 1573. t. 79. f. 3 (mala). *Holosericea* sub incana: caulibus sub-diffusis, ramis adscendentibus; foliis inferioribus elliptico-spathulatis: floribus subnutantibus alternis (oppositis) pedunculatis, pedunculo bracteis longiore; petalis bipartitis; fructibus erectis.
- S. sericea.* *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Bert. Rar. It. Pl. Dec.* 4. p. 22. et *Opusc. Scient. Bol. Fasc.* 3. p. 147.\* *S. bipartita.* *Desf. Atl.* 352. t. 100. - *Savi B. Etr.* 1. p. 158.\* *S. canescens.* *Ten. Fl. Neap.* 1. p. 236. t. 39. *S. decumbens.* *Biv. Sic. Cent.* 1. p. 75. t. 6.
- In arenosis maritimis frequens. A Fiumicino, etc. Ann. Floret Majo. Fl. rosei.
- Statura, pubescentia, foliorum forma non nihil variat. Flores alternos pauciores in racemo terminali solitario vel gemino et pedunculos bracteis ovato-acuminatis sub-duplo longiores adhuc vidimus. Auctoritate cl: Bertolonii, qui cum Molineriano specimina contulit, huic associamus synonima clarissimorum Bivonae, et Tenorii. Retzii *S. vespertina* quoad descriptionem recte cum sequenti planta convenire visa est, et ejus synonimon huc a Bertoloni citatum illi praeponendum.
499. **VESTITA.** *Retz. Obs.* p. 31. Calycibus clavatis palestinentibus erectis: petalis bifidis; corona connata: racemis geminatis terminalibus secundis, flore intermedio pe-



dunculato : foliis obovato-lanceolatis basi ciliatis. W.Sp.  
Pers. E.

In viis campestribus , oris nemorum ab urbis occidente prae-  
sertim frequens . Nel foro Romano , a Villa Pamfili ,  
fuori di porta Portese sulla via di Fiumicino in copia , etc.  
Ann. Floret Majo , Junio . Fl. rosei .

Caulis 2-3-pedalis geniculatus : herba tota sub-hirsuta , in-  
ferne praesertim : folia ad basim evidenter ciliata . Race-  
mi geminati inaequales , altero interdum sub-nullo : flos  
intermedius pedunculatus , caeteri pedunculo brevissimo ,  
extremi sessiles . Bracteae lineares , pedunculo subiecto  
constanter longiores , margine non membranaceo , qua  
nota statim distinguenda species haec a *S. sericea* , et *di-  
chotoma* . Calix hirsutus , pilis longiusculis , mollibus ,  
albis . Petala ungue libero , corona in nectarium cyathi-  
forme porrectum crenulatum connata , lamina sub-re-  
flexa , semi-bifida , lacinias sub-involutis .

*S. hirsuta* . Poiretii , quae et *S. hispida* Desfontainesii forte  
ab hac non diversa .

500. **TRINERVIA** . Nob. ( *Fl. Rom. Prod. Tab. 2.* ) Caule di-  
chotomo , pubescenti-scabro : foliis linear-lanceolatis  
subtus trinerviis : racemis terminalibus , floribus ere-  
ctiusculis secundis : calyce clavato , costis decem sca-  
bris , hispidis , pilis sursum imbricatis .

In arvis circa urbem , et ad radices montium . Alla Cappa-  
rella presso il Fonte di Egeria , sui colli della Farnesina ,  
presso Palombara .... Ann. Floret Julio . Fl. rosei .

Caulis erectus , interdum sub-diffusus , 1-3-pedalis , dicho-  
tomo-ramosus , ramis patentibus , raro simpex , genicu-  
lis tumidis rubicundis , sub-compressus , minime visco-  
sus , tactu scaber , pilis adpressis brevibus pubescens , ba-  
sim versus patentioribus , longiusculis ; colore pallido ,  
aetate sub-cinereo . Folia opposita linear-lanceolata , sub-  
hirsuta , margine basim versus longius ciliato , inferiori  
pagina valide trinervosa , nervis lateralibus abasi ad api-  
cem fere usque juxta marginem procurrentibus , apice  
acuto , puncto calloso subtus prominulo . Racemi in ra-  
mis terminales sub-secundi , solitarii , interdum et gemini , tunc flore interjecto longius pedunculato . Flores ere-  
cto-patuli , demum stricti ; bracteae binae folio conformes ,  
pedunculo longiores . Calyx clavatus , 4 lineas longus ,  
apice 5-dentatus , dentibus hinc et inde membranaceis ,  
ciliatis , denticulis 5 brevioribus apice pilosis interjectis .  
*Calyois costae 10 valde prominulae , virides , dorso cre-  
nulatae , pilis albo-diaphanis sursum flexis , sub-uncinatis  
dupli serie munitae . Sulci costis interpositi sub lente  
tantum mucronulis albis sursum versis instructi . Petala  
lamina patenti , apice obtusa , emarginato-bifida , inten-*

se rosea , basi subtus luteo-venosa , fauce squamula biloba lobis emarginatis . Stamina 10 inaequalia , 5 exerta . Antherae cipereae . Germen clavatum, intra calycem longe stipitatum , glabrum .

## (203) STELLARIA .

501. NEMORUM . *L.* Foliis cordatis , petiolatis ; panicula dichotoma . Pers. E. - DC. Syn.

St. nemorum . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Lois. G. Alsine hederacea montana maxima . Col. ecphr. 290. f. 2.

In sylvaticis montium . Sul Monte Gennaro , sul Monte Albano , etc. Perenn. Floret Majo . Fl. albi .

502. MEDIA . Smith Br.\* Caule procumbente , latere alterno villoso : foliis ovatis sub-cordatis , petiolo ciliato : florig. bus 5-10-andris , petalis bipartitis .

Alsine media . L. - All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. A. minor . Dod. Pempt. 29. A. altissima nemorosa . Hort. Rom. 4. t. 73.

In hortis , ruderatis , muris ubique . Vulgo : centocchio . Ann. Floret Aprili , Majo . Fl. albi .

Variat magnopere statura ; foliis in petiolum decurrentibus vel sub-sessilibus ; corollis calyce minoribus , vel duplo majoribus ; staminibus 5 ad 10 .

503. HOLOSTEA . *L.* Caule erecto , stricto : foliis lanceolatis , margine scabro-serrulatis ; petalis calice triplo longioribus . DC. Syn.

St. holostea . All. Ped. - Smith Br.\* - V. Sp. - Pers. E. - Lois. G. Gramen . Fuchs. H. 136. Alinastrum gratiolae folio . Hort. Rom. 4. t. 74.

In umbrosis , ad sepes frequens . Nelle Ville Borghese , Medici , etc. Perenn. Floret Aprili . Fl. albi .

## (204) ARENARIA .

504. SERPILLIFOLIA . *L.* Foliis sub-ovatis acutis , sessilibus , laevibus : corollis calyce brevioribus . L. - All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn.

A. serpillofolia . Smith Br.\* Alsine nnor. Fuchs. H. 23. - Tabern. p. 708.

In glareosis , ad muros obvia . Ann. Ioret Majo . Fl. albi .

505. TENUIFOLIA . *L.* Foliis subulatis setaceis , oppositis , exstipulatis : caule ramosissimo dicotomo : petalis lanceolatis calyce strijato brevioribus .

A. tenuifolia . All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - J. B. H. 3. p. 94. - Vaill. Par. 7. t. 3. f. 1.

In glareosis , ad muros vulgaris . nn; Floret Majo . Fl. albi .

506. MARINA . Smith Br. Caulibus proratis ; foliis semi-cylindricis , carnosis , glabris ; stipulis scariosis , vaginatis : seminibus compressis ala embranacea cinctis .

Aprile 1871.

15.  
Maggio 1871

- A. marina . *Savi B. Etr.* 2. p. 139. A. marginata . DC. Syn.  
 A: rubra β. *Fl. Dan.* - *W. Sp.* - *Lois.* G. Alsine maritima etc. *Mich. Cat. H. Fl.* p. 5. n. 10.  
 In arenosis maritimis. Presso Civitavecchia .... Perenn. Floret Augusto . *Fl. dilute carnei.*  
 Caules tenues glaberrimi ; inflorescentia pubescenti-glandulosa : folia sub-secunda internodiis sub-aequalia . Capsula calyce sub-duplo longior.

## DECANDRIA PENTAGYNIA.

## (205) COTYLEDON.

- 15  
*Maggio 1801.*  
*G. Ped. 1801.*
507. UMBILICUS . *Huds.* Foliis peltatis , crenatis : caule sub-simplici ; floribus racemosis pendulis ; bracteis integris : radice tuberosa .  
 C. umbilicus . *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois.* G. C. umbilicus β. *L. Sp.* Umbilicus pendulinus . DC. Syn. G. umbilicus venens . *Clus. H.* 2. p. 63. - *All. Ped.* G. major . *Hort. Rom.* t. 35.  
 In muris umbrosis communis . Perenn. Floret Majo , Junio : *Fl. rubro-flavescentes.*

## (206) SEDUM.

- 30  
*Maggio 1801.*
508. TELEPHIUM . *L.* Foliis sparsis , aut oppositis ovatis serratis : caule recto ; corymbo folioso . DC. Syn.  
 S. telephium . *Ill. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois.* G. Anaxampseros vulgo Faba crassa . *J. B. H.* 3. p. 681.  
 In saxosis . Presso Albano , sul Tuscolo . Perenn. Fl. Julio : *Fl. dilute purprei.*
509. STELLATUM . *L.* Foliis sparsis , ovatis , angulatis ; floribus lateralibus sessilibus , solitariis ; folliculis stellatim patentibus . DC. Syn.  
 S. stellatum . *Al. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois.* G. Semipervivum tertium . *Col. Phytob.* 32. t. 11.  
 In sterilissimis , axosis frequens . Presso Albano , all' Isola-Farnese in cqua , etc. Ann. Floret Junio . *Fl. albo-rubricundi.* - Variatfoliis vix angulatis , caule unifloro .
510. GALLIOIDES . *A. Ped.* 1742. t. 65. f. 3. Caule adscendente : foliis infericibus sub-quaternis verticillatis , spathulatis ; petalis auminato-aristatis . *Bertol. Rar. It. Pl. Dec.* 3. p. 23.\*  
 S. gallioides . *Lois G.* - *DC. Syn.* S. cepaea β. *W. Sp.* S. cepaea \* gallioides *Pers. E.* S. spathulatum . *Waldst. et Kit. Pl. R. Hung.* p. 108. t. 104.  
 In umbrosis , sylvacis , ad muros vulgare . Bienn. Floret Junio . *Fl. albidi*

B. Foliis teretibus.

511. ALBUM. *L.* Foliis sparsis, teretiuseculis, oblongis, obtusis, sessilibus, patentibus; cyma ramosa.

*S. album.* *All. Ped.* t. 65. f. 2. - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *Sempervivum minus alterum. Dod. Pempt.* 129.

In tectis, muris, saxosis obvium. Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. albi, vel rubicundi.

512. DASYPHYLLUM. *L.* Foliis oppositis, ovatis, obtusis, pinguisibus: caulis infirmis, apice pubescentibus: floribus laxe racemosis, saepius hexapetalis. *DC. Syn.*

*S. dasypyllum.* *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *S. minus folio circinato. Moris. H. 3. s. 12. t. 7. f. 35.*

In montium petrosis. *A Tivoli sul Monte della Croce ... Perenn.* Floret Julio, Augusto. Fl. albo-rubelli.

513. ACRE. *L.* Foliis sub-ovatis adnato-sessilibus, gibbis, erectiuseculis, alternis: cyma trifida. *L.* - *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.*

*S. acre.* *Smith Br.*\* *Illecebra*, sive *Sempervivum tertium. Dod. Pempt.* 129.

In muris sterilissimis, montium saxosis. *Sul Monte Genaro, intorno a Roma .... Perenn.* Floret Junio, Julio. Fl. flavi. - Herba acris.

514. SEXANGULARE. *L.* Foliis teretibus, adnato-sessilibus sub-patulis, ternatim verticillatis; in surculis sexfariam imbricatis: cyma trifida. *DC. Syn.*

*S. sexangulare.* *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *Sempervivum minimum. Camer. epit. 836.*

In petrosis montium. *A Tivoli sul monte della Croce .... Perenn.* Floret Junio, Julio. Fl. flavi. - Herba non acris.

515. REFLEXUM. *L.* Foliis sparsis, subulatis, basi solutis, erectis: floribus cymosis, sub-corymbosis; cymae ramis virgineis reflexo-nutantibus. *DC. Syn.*

*S. reflexum.* *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *S. minus quintum. Clus. H. 60.*

In montium saxosis, umbrosis. *Presso Albano, Rocca di Papa, Tivoli sul Monte della Croce, etc. Perenn.* Floret Junio, Julio. Fl. aurei.

Caulis basi infirmus, saepe dependens vel assurgens. Folia viridia, inferiora reflexa, decidua. Calix sex-partitus, acutus.

516. ANOPETALUM. *DC. Voy. Bot.* 80. Foliis tereti-depressis mucronatis, incurvis, basi solutis, glaucis, sparsis: cyma sub-4-fida, ramis bifidis; petalis 6-7 linearibus, patentibus: capsulis rostratis, calyce obtuso duplo longioribus.

*S. anopetalum.* *DC. Cat. Hort. Monsp.* 143. - *Lois. Notic.* 71.

16.

Maggio 180

*S. hispanicum*. *Fl. Fr. ed 3. non Linn.* *S. rupestre*. *Vill.*  
*Dauph. 3. p. 679.* *S. rufescens*. *Tenor. Fl. Neap. 1. p. 248.*  
*t. 41.* *S. minus narbonense glaucum*, ramulis inflexis,  
*flore albo*, staminibus luteis. *Raii Suppl. 363.* *S. minus*  
*quartum*. *Clus. H.2. p. 60.*

In veteribus muris, tectis, hortorum parietibus Romae vul-  
gare. Perenn. Floret aestate. *Fl. albo-luteoli.*

*Caulis strictus vel assurgens*, saepe inferne rufescens, fir-  
muis. *Folia acumine aristaeformi terminata*, inferiora 5-  
fariam conferta, glauca, subinde rufescentia.

(207) OXALIS.

517. CORNICULATA. *L.* Caule ramoso, decumbente, radican-  
te: pedunculo sub-umbellato petiolis breviore; foliis ter-  
natis, obcordatis: stylis longitudine staminum interio-  
rum. *DC. Syn.* - *Savi B. Etr. 2. p. 130.*

*O. corniculata*. *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* -  
*Lois. G. Oxys lutea*. *Hort. Rom. 1. t. 32.* *O. sive trifoli-  
lum acetosum flore luteo*. *Dod. Pempt. 579.*

Ad margines viarum, juxta sepes, muros vulgaris. Ann.  
Floret Majo ad autumnum. *Fl. flavi.*

(208) LYCHNIS.

A. Capsula 1-loculari: petalis coronatis,  
limbo 2-multi-partito. (*Lychnis*).  
Daggio 1871

518. FLOS-CUCULI. *L.* Floribus laxe paniculatis; petalis laci-  
niatis: capsula sub-rotunda. *DC. Syn.*

*L. Flos-cuculi*. *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* -  
*Lois. G. Caryophyllus pratensis*. *Tabern. 291.* *Armerius*  
*sylvestris*. *Dod. Pempt. 177.*

In pratis, herbosis communis. Vulgo: *margherite rosse*.  
Perenn. Floret Majo. *Fl. rosei.*

8. 519. DIOICA. *L.* Foliis sub-ovatis integris: floribus dioicis  
bracteatis; petalis semi-bifidis.

*L. dioica*. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Smith Br.* - *Pers. E.*

a. *Alba* - *Pers. E.* Sub-villosa: caule geniculato, erecto: pe-  
tal is ob-cordatis, albis.

*L. dioica*. *DC. Fl. Fr. et Syn.* - *Lois. G.* - *W. En. H. Ber.* *L.*  
*sylvestris*, noctiflora alba simplex calyce amplissimo.  
*Till. Pis. 105. t. 41. f. 1.*

30. b. *Rubra*. *Pers. E.* Hirsuta: caule geniculato debili: foliis ova-  
tis; floribus rubellis, saepe hermaphroditis.

*L. sylvestris*. *DC. Fl. Fr. et Syn.* - *Lois. G.* - *W. En. Hort.*  
*Ber.* *L. sylvestris rubello flore*. *Raii Syn. 239.*

Ad sepes, vias ubique;  $\beta$  in umbrosis. Perenn. Floret tö-  
ta aestate. *Fl. ex albo ad roseum*; in  $\beta$  intensius ru-  
belli.

B. Capsula 1-loculari: petalis coronatis, limbo  
sub-integro. (*Agrostemma*).  
Agosto 1871

520. CORONARIA. *Enc.* Tomentosa: foliis ovato-lanceolatis;

pedunculis elongatis, unifloris; petalis emarginatis, serratis. DC. Syn.

*Agrostemma coronaria*. L. - All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. L. *coronaria*. Dod. Pempt. 170.

In sylvaticis collinis et montosis. *Alla Lucchina*, *alla Marigiana*, *sul Monte Gennaro*, etc. Perenn. Floret Junio. Fl. purpurei.

C. Capsula uniloculari: petalis fauce nudis, limbo sub-integro. (*Githago*).

521. *GITHAGO*. Scop. Carn. Hirsuta: calycinis dentibus foliaceis, corolla longioribus, deciduis.

L. *githago*. Enc. - DC. Syn. *Agrostemma githago*. L. - Smith Br.\* - All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. *Lolum*. Fuchs. H. 127.

Inter segetes solo macriori frequens. *Sul Monte Mario*, etc. Ann. Floret Junio. Fl. rubro-violacei.

(209) CERASTIUM.

A. Petalis calycem non superantibus.

522. *VULGATUM*. L. *Hirsutum*; sub-viscidum: foliis sub-ovatis: panicula dichotoma; floribus pedunculo longioribus: petalis calycem aequantibus.

C. *vulgatum*. Smith Br.\* - W. Sp. (excl. syn. Vaill.) G. viscosum. Curt. Lond. F. 2. t. 35. - Pers. E. C. ovale. Pers. l. c. *Alsine hirsuta major*, foliis sub-rotundis dilute virentibus. Moris. Oxon. s. 5. t. 23. f. 10. *Myosotis arvensis hirsuta* parvo flore. Vaill. Par. t. 30. f. 3. (bona). *Auricula muris quorumdam* flore parvo, vasculo tenui longo. J. B. H. 3. p 359. (male).

B. Minus: floribus paucioribus sub-5-andris.

C. *semidecandrum*. Sebast. Rom. Pl. Fasc. 2. p. 35.

In arvis, aggeribus, muris vulgare. Ann. Floret a Februario ad Majum. Fl. albi.

Caulis caespitosus vel simplex, diffusus vel errectus, viridis vel pallens, ramis erectis vel parum divaricatis, laxe vel dense hirsutus pilis nec semper viscidis, foliis late vel oblongo-ovatis obtusis, interdum sub-spathulatis, dichotomis crebris vel remotiusculis: ast constanter flores pedunculo proprio longiores subaequales. Macriora occurunt individua staminibus aliquot (saepius 5, filamentis non exceptis) orbata, quae varietatem ♂ constituunt, non confundendam cum C. *semidecandro* L., cui monente Smithio folia infima glabrata.

523. *Viscosum*. L. *Hirsutum*, sub-viscidum: foliis lanceolato-oblongis obtusis: panicula dichotoma; pedunculis flore longioribus: corollis calyce sub-brevioribus.

C. *viscosum*. Smith Br.\* - W. Sp. (excl. syn. Vaill.) G. *vulgatum*. Curt. Lond. Fasc. 2. p. 34. - Pers. E. *Alsine hirsuta altera viscosa*, foliis longis, saturatius virentibus.

*Moris. Ox. s. 5. t. 23. f. 11. Myosotis hirsuta altera viscosa. Vaill. Par. t. 30. f. 1. ( bona ).*

*In aggeribus, muris, saxosis, arenosis commune. Ann. Floret Martio, Aprili. Fl. albi.*

*Species pariter varia partium omnium forma, statura, dispositione, hirsutie, viscositate. Caulis ramosissimus vel simplex, diffusus vel erectus, pilis longis vestitus, saepe superioribus adpressis, interdum patentibus omnibus. Rami et pedunculi ut plurimum divaricati, etiam refracti, aut erectiusculi. Folia saepius oblongo-lanceolata, obtusa, interdum sub-ovata, quandoque spathulata. Pedunculi constanter flore multoties longiores. Petala calyce breviora, vel subaequalia. Stamina 10, interdum 5-6. Macriora individua caule sub-simplici, foliis latiusculis spathulatis, panicula contracta, floribus paucioribus sub-pentandris, bracteis calicibusque apice scariosis, tota herba laetius virente admodum viscida, rem primo intuitu a specie diversam ostendunt, quae nihilominus hoc reduci debere videtur. Nonne similiter *C. brachipetalum* DC. et aliae nonnullae auctorum species locum inter adnotatos lusus invenire censemur sit?*

B. Petalis calyce longioribus:  
capsulis oblongis.

524. *CAMPANULATUM. Vivian. Ann. Bot. T. 1. P. 2. p. 171.\**  
*(Fl. Rom. Prod. Tab. 3. f. 1.) Adscendens, diffusum, villosum: foliis radicalibus spathulatis; caulinis oblongis: panicula dichotoma; petalis semi-bifidis calyce duplo longioribus. Sebast. Rom. Pl. Fasc. 2. p. 12. t. 3. f. 1.*

*C. ligusticum. Vivian. Cat. Hort. di Negro. G. praecox. Ten. Fl. Neap. Prod. p. 27:*

*In arvis, sterilioribus praesertim vulgare. Ann. Floret Martio, Majo. Fl. albi.*

*Caulis saepe sub-simplex, floribus paucioribus.*

525. *ARVENSE. L. Adscendens: foliis linear-lanceolatis obtusis, pubescentibus, ciliatis; panicula dichotoma; petalis emarginatis, calyce duplo longioribus.*

*C. arvense. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Myosotis arvensis hirsuta flore majore. Vaill. Par. t. 30. f. 4.*

*In aggeribus, praesertim umbrosis, nemorosis frequens. Perenn. Fl. Aprili. Fl. candidi.*

526. *LINEARE. All. Ped. 2 app. p. 365. t. 88. f. 4. Foliis linear-lanceolatis, acutis, patentibus, sub-pubescentibus; pedunculis sub-unifloris tomentosis: petalis calyce majoribus, acutis, bifidis.*

*C. lineare. W. Sp. - Pers. E. - Lois. G.*

*Sul monte Gennaro ... Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. albi.*

C. Petalis calyce longioribus : capsulis  
sub-rotundis .

527. REPENS . L. Caule basi procumbente : foliis lanceolato-acutis , mollibus ! panicula dichotoma , petalis calyce majoribus , capsulis sub-rotundis .

C. repens . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. Ocyoides lychnitis reptante radice . Column. Phytob. 115. t. 31. Myosotis arvensis polygoni folio . Vail. Par. 141. t. 30. f. 5.

In montosis . Sul Monte Gennaro , presso Subiaco ... Perenn. Floret Junio , Julio . Fl. albi .

528. TOMENTOSUM . L. Albo-tomentosum : foliis linearis-oblongis ; floralibus lanceolatis , margine scariosis ; panicula pauciflora , petalis calyce multo majoribus ; capsulis oblongis .

C. tomentosum . W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Caryophyllus holosteus tomentosus angustifolius . C. B. P. 210.

In jugis sub-apenninis . Sul Monte-Calvo presso Subiaco ... Perenn. Floret Junio , Julio . Fl. albi .

529. MANTICUM . L. Am. Acc. 4. p. 315.\* Glabrum : caule stricto , gracili ; foliis lanceolatis acutis : floribus paniculatis ; calycibus laevibus , margine scariosis : capsulis sub-globosis .

C. manticum . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. Stellaria mantica . DC. Syn. Alsine caryophylloides glabra florum pediculis longissimis . Segu. Veron. 3. p. 178. t. 4 f. 2.

In pratis , pascuis . Vicino all'Anguillara copiosamente ... Ann. Floret Majo . Fl. albi .

Stigmata 5 , capsula ore 10-dentato ,

### DECANDRIA DECAGYNIA.

#### (210) PHYTOLACCA.

530. DECANDRA . L. Floribus decandris , decagynis . L. - W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn.

Ph. vulgaris . Dill. Elth. 318. t. 239. f. 309. Ph. americana majori fructu . Hort. Rom. 5. t. 51.

In ruderatis , circa vineas , ad sepes Romae communis . Vulgo : Uvetta Spagnuola . Perenn. Floret Julio , Augusto . Fl. albidi .

Fructuum succo atro-sanguineo saturatiorem colorem vino conferunt .

Maggio 1841.

31. Ago 1841

## C L A S S I S XI.

## DODECANDRIA .\*)

## ORD. MONOGYNIA.

- (211) *PORTULACA*. *Calix 2-valvis. Corolla 5-petala. Capsula 1-locularis circumscissa polysperma, receptaculis seminiferis centralibus.*  
 (212) *LYTHRUM*. *Calix cylindricus 6-12-dentatus. Petala 6, rarius 4-5, calyci inserta. Capsula tecta, 2-locularis, 2-valvis, polysperma. Stamina 2-12.*

## ORD. DIGYNIA.

- (213) *AGRIMONIA*. *Calix 5-dentatus, involucello bilobo cinctus. Petala 5. Semina duo calyce capsulae-forme inclusa.*

## ORD. TRIGYNIA.

- (214) *RESEDA*. *Calix 4-6-partitus. Petala 4-6 irregularia, saepius laciniate. Capsula supera, angulosa, apice hians, polysperma. Stamina 10-20. Styli 3-5.*  
 (215) *EUPHORBIA*. *Calix 1-phyllo, ventricosus, inferus, 4-5-lobus. Petala 4-5 calyci insidentia. Squamulae plurimae staminibus interjectae. Capsula 3-cocca, 3-sperma, stipitata.*

## ORD. PENTAGYNIA.

- (216) *GLINUS*. *Calix 5-phyllo. Corolla nulla. Nectarium setis bifidis. Capsula 5-angularis, 5-locularis, 5-valvis, polysperma. Semina funiculo setiformi affixa receptaculo columnari.*

## DODECANDRIA MONOGYNIA .

(211) *PORTULACA*.

531. *OLERACEA*. *L. Caule ramoso prostrato; foliis cuneiformibus; floribus confertis sessilibus. Lois. G.*

\*) Stamina 12 - 19.

## DODECANDRIA MONOGYNIA.

161

P. oleracea . *All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn. P. sylvestris . Dod. Pempt. 661. P. latifolia . Hort. Rom. 4. t. 59.*

In locis arenosis , ambulacris-hortorum passim . Vulgo : *porcaccia* . Ann. Floret Julio . Fl. lutei .

## (212) LYTHRUM.

532. SALICARIA . *L. Caule recto tetragono : foliis oppositis , cordato-lanceolatis , sub-hirsutis ; floribus spicatis dodecandris .*

*L. salicaria . All. Ped. - W. Sp. - Smith Br.\* - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Salicaria vulgaris . Hort. Rom. 4. t. 84. Lysimachia purpurea communis major . Clus. H. 2. p. 51. Ad Tyberim et in aquosis communis . Perenn. Floret Julio , Augusto . Fl. purpurei .*

533. HYSSOPIFOLIA . *L. Caule prostrato , ramoso , ramis erectis : foliis linearibus alternis : floribus axillaribus , hexapetalis , hexandris .*

*L. hyssopifolia . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Hyssopifolia . C. B. Prod. 108. cunic. In sabulosis irriguis , humentibus vulgaris circa urbem . Ann. Floret Junio . Fl. purpurei .*

## DODECANDRIA DIGYNIA.

## (213) AGRIMONIA .

534. EUPATORIUM . *L. Calycibus fructigeris hispidis ; foliis interrumpente pinnatis , foliolis ovato-oblongis , impari petiolato .*

*A. eupatorium . All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. A. officinarum . Hort. Rom. 5. t. 57. A. sive eupatorium . Dod. Pempt. 28.*

Ad margines et in pascuis obvia. Perenn. Floret Junio-Octobre . Fl. lutei .

## DODECANDRIA TRIGYNIA.

## (214) RESEDA .

535. LUTEOLA . *L. Foliis lanceolatis , undulatis , integris : calycibus 4-fidis : caule erecto . DC. Syn.*

*R. luteola . All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. Lutum herba . Dod. Pempt. 80.*

Ad vias campestres , et in muris quibusdam . Bienn. Floret Majo-Julio . Fl. albo-virides .

Ob luteum colorem colitur usui tinctorio .

536. LUTEA . *L. Foliis sub-3-fidis , undulatis ; inferioribus pinnatifidis : calycibus sexpartitis ; capsulis oblongis , trigonis , apice truncatis .*

L

15 giugno 1871

16  
Maggio 1871  
Flor. alli

R. lutea . *All. Ped.* - *Smith Br.\* - W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *J. B. H.* 3. p. 467.

In ruderatis , arenosis, ad ripas Tyberis frequens . *Nel cortile di S. Marco , a Nemi , a Viterbo , etc.* Perenn. Floret Aprili-Augusto . Fl. luteoli , parvi .

**537.** ALBA . *L.* Foliis pinnatifidis sub-undulatis : floribus 4-gynis ; calycibus 5-partitis . *DC. Syn.*

R. alba . *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E. (?) - Lois. G. (?)* R. undata . *Sebast. R. Pl. Fasc. 2.* p. 66. R. maxima . *Lab. Hist.* 110.

In muris antiquis , locis saxosis communis . *Sul Colosseo , a Palazzo* , etc. Perenn. Floret Martio-Junio . Fl. albi. Planta etiam 5-pedalis caule striato , foliolis undulatis lanceolatis decurrentibus sub-aequalibus : spica elongata , acuta , floribus constanter 4-gynis , fructibus 4-aculeatis. Calyces omnino 5-partitos , nec cum Linnaeo , aliisque 6-partitos vidimus .

*74. April 1870.* **538.** PHYTEUMA . *L.* Foliis radicalibus spathulatis , integerimis ; caulinis semi-trilobis ; calycibus 5-6-partitis corolla sub-duplo majoribus .

R. phyteuma . *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* Erucago apula 3-fida 5-folia . *Col. ecphr.* 1. p. 267. t. 269.

Ad vias , in incultis vulgatissima . Ann. Floret Aprili-aestate . Fl. albi .

(215) EUPHORBIA .

A. Capsulis glabris laevibus .

**539.** CHAMAEZYGE . *L.* Dichotoma procumbens ; foliis crenulatis , subrotundis , glabris : floribus solitariis , axillaribus ; seminibus tetragonis , transversim rugosis . *DC. Syn.*

E. chamaesyce . *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* Chamaesyce . *Dod. Pempt.* 377. - *Clus. H.* 2. p. 187.

Ad vias urbis inter lapides , in sabulosis , hortorum fictilibus vulgaris . *In copia sulla scala della Trinità de' Monti , etc.* Ann. Floret Junio-Augusto . Fl. obscure purei .

**540.** PEPLIS . *L.* Dichotoma , procumbens ; foliis integerimis , semi-cordatis obtusis ; floribus solitariis axillaribus : seminibus ovatis , laevibus .

E. peplis . *All. Ped.* - *Smith Br.\* - W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* Peplis . *Dod. Pempt.* 376. - *Clus. H.* 2. p. 187.

In arena maritima , *A Fiumicino , presso Ostia , etc.* Ann. Floret Aprili-Augusto . Fl. lutescentes .

**541.** PEPLUS . *L.* Umbella trifida , dichotoma ; bracteolis ovatis , obtusis : foliis integerimis , obovatis , petiolatis .

E. peplus . *All. Ped.* - *Smith Br.\* - W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* Peplus . *Tabern.* 597. - *Dod. Pempt.* 375.

- In cultis , ad vias obvia . Ann. Floret Februario ad aestatem . Fl. lutei lobis calycinis bicornibus .
542. **FALCATA** . *L.* Umbella 2-5-fida , dichotoma ; bracteolis sub-cordatis mucronatis : foliis lanceolatis, mucronulatis ; ( calycinis lobis 4 , bicornibus; fructibus laevibus : ) seminibus sub-tetragonis transverse sulcati . *DC. Syn.*
- & Lois.* *G.* Foliis bracteolisque acuminato-mucronatis : capsulis conoideis ; caule ramoso .
- E. acuminata* . *Lam. Enc.* - *Savi B. Etr.* 1. p. 145.\* *E. falcata* \* *acuminata* . *Pers. E.* Peplis annua foliis acutis flore musoso . *Bocc. Sic.* 24. t. 13. f. 1. - *Moris. H. 3.* s. 10. t. 1. f. 3 Pityusa angustis acutisque esulae foliis . *Barr. ic.* 752.
- In arvis varietas haud infrequens . *Alla Caffarella* , etc. Ann. Floret Majō-Julio . Fl. luteo-virides .
- Speciem ut Linnaeus describit foliis obtusiusculis non inventimus .
543. **EXIGUA** . *L.* Umbella 2-4-fida, dichotoma : bracteolis lanceolatis ; foliis linearibus ; calycinis lobis 4 , bicornibus ; seminibus transverse sulcati .
- E. exigua* . *All. Ped.* - *Smith. Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 1. p. 141.\* Esula exigua Tragi . *Lob. ic.* 357. *Tithymalus minimus* angustifolius annus . *J. B. H. 3.* p. 664.
- In sterilissimis , arenosis , collibus . *Al Pigneto Sacchetti* , *Tor di Quinto* , *Civitavecchia* , etc. Ann. Floret Majo ad aestatem . Fl. lutei .
544. **LATHYRIS** . *L.* Umbella 4-fida dichotoma : foliis oppositis , integerrimis , lanceolatis , 4-fariis . *Pers. E.*
- E. lathyris* . *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* Lathyris . *Fuschs. H.* 455. - *J. B. H. 3.* p. 880.
- In vineis , etiam circa urbem . Offic. *catapuzia* . Bienn. Floret Junio . Fl. pallide lutei . - Semina vi drastica pollent .
545. **PARALIAS** . *L.* Umbella sub-5-fida , bifida ; bracteolis cordatis reniformibus ; foliis lanceolato-oblongis , concavis , sursum imbricatis .
- E. paralias* . *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 1. p. 144.\* *Titymalus paralias* . *Dod. Pempt.* 370.
- In arenosis maritimis . *A Fiumicino, presso Ostia .... Perenn.* Floret Majo . Fl. luteoli .
- 546 **SEGETALIS** . *L.* Umbella 5-8-fida , dichotoma ; foliis linearibus , superioribus amplioribus basique dilatatis : ramis axillaribus floriferis : bracteolis lato-cordatis : fructuum angulis scabris .
- E. segetalis* . *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *Titymalus annuus* lunato flore , linariae folio longiore . *Moris. H. 3.* p. 339. s. 10. t. 2. f. 3.

In arvis, ad muros nonnullos circa urbem. *Sui muri delle Vigne fuo i di Porta S. Pancrazio ... Ann. Floret Junio, Julio. Fl. luteoli calycinis lobis falcatis.*

Inferne ab umbella ex axillis foliorum latiorum rami floriferi dichotomi. Umbella etiam 8 fida. Bracteolae lato-cordatae, integerrimae, obtusae constanter nobis visae, nonnulli concavae. Semina foveolata.

- 3. Aprile 1821.*  
547. HELIOSCOPIA. L. Umbella 4-fida, radiis trifidis, bifidis; foliis cuneiformibus et involucellis obovatis serrulatis; seminibus ovatis, reticulatis.

E. helioscopia. *All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. Lois. G. - DC. Syn. Tithymalus helioscopius. Dod. Pempt. 371.*

In arvis, ruderatis, cultis vulgatissima. Ann. Floret Aprili ad aestatem. Fl. luteoli calycinis lobis integris.

548. NICÆNENSIS. *All. Ped. 1029. t. 69. f. 1.\* Umbella 4-7-fida, bifida: foliis sub-coriaceis, glabris, oblongo-spathulatis; superioribus ovatis et bracteolis cordato-reniformibus mucronatis; seminibus laevibus.*

E. nicaensis. *W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. E. Barrelieri. Savi B. Etr. 1. p. 145.\* E. neapolitana. Ten. Fl. Neap. 1. p. 266. t. 42. Tithymalus marinus latifolius italicus. Barr. ic. 823.*

In maritimis. *Al Pigneto di Chigi ... Perenn. Floret aestate. Fl. luteoli calycinis lobis lunulatis.*

Herba glaucescens, caule inferne sub-lignoso.

549. CYPARISSIAS. L. Umbella multifida dichotoma, bracteolis late-cordatis: foliis linearis-sub-capillaceis confertis; ramis pluribus sterilibus.

E. cyparissias. *All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 1. p. 146. Tithymalus cyparissias. Moris. H. 3. s. 10. t. 2. f. 29. - Dod. Pempt. 371.*

In sterilibus montosis. *In g. an copia sulla Montagna di Viterbo, etc. Perenn. Floret Majo. Fl. lutei lobis calycinis 4, bicornibus.*

550. SYLVATICA. L. Pubescens. umbella 5-multifida, bifida; bracteolis perfoliato-connatis, sub-cordatis: foliis perennantibus obovato-lanceolatis, imis petiolatis: caule basi frutescente.

E. sylvatica. *All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Tithymalus lunato flore. Col. ephr. 2. p. 56. t. 57. T. sylvaticus lunato flore. Moris. H. 3. s. 10. t. 1. f. 3.*

In nemorosis communis circa urbem. Perenn. Floret Aprili, Majo. Fl. sub-virides (axillaris saepe rubicundus) calycinis lobis lunatis.

Folia apice acuto terminata, in summo caule minuscula, obtusa, omnino difformia.

*4. Maggio 1821.*

*1. Aprile 1821.*

*25. Marzo 1821.*

551. DENDROIDES. *L.* Arborea, umbella multifida, dichotoma; bracteolis sub-cordatis, primariis triphyllis: foliis lanceolatis, angustis.
- E. dendroides. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Biv. Sic. Cent.* 1. *Tithymalus arkoreus*, seu dendroides. *Moris. H. 3. s. 10. t. 1. j. 11, 12*
- In maritimis. Presso Terracina, a' piedi del Circello ....  
Arb. Floret Majo. Fl. luteoli.
- B. Capsulis pilosis, aut tuberculatis.
552. CHARACIAS. *L.* Pubescens: umbella multifida, bifida; bracteolis connato-perfoliatis: foliis confertis, oblongo-lanceolatis; caule frutescente, capsulis tomentosis.
- E. characias. *All. Ped.* - *Smith Br.\** - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn. Titymalus characias. Clus. H. 2. p. 188.* - *Matth. Valgr. 1250.*
- In marginib[us], arvis. Fuori di porta S. Sebastiano presso la Basilica in copia, etc. Perenn. Floret Februario-Majo. Fl. calycinis lobis atro purpureis lunatis.
553. PLATYPHYLLA. *L.* Umbella sub-quinquefida, trifida, dichotoma; bracteolis ovato-rhombeis et foliis lanceolatis serrulatis, sub-mucronatis: caule erecto.
- a. Glabriuscula; foliis bracteolisque carina pilosis; capsulis verrucosis glabris.
- E. platyphyllos. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Smith Br.\** - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr. 1. p. 142.\* Titymalus platyphyllos. Fuchs. H. 413. - J. B. H. 3. p. 360.*
- b. Tota villosa-pubescentia: capsulis verrucosis, pilosis.
- E. pubescens. *Vahl.* - *Desf. Atl. 586.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.*
- Species in pratis humidis, ad fossas abunde circa urbem; varietas in maritimis: a Fiumicino, etc. Ann. Floret Junio. Fl. luteoli, calycinis lobis 4, rotundatis.
- Folia, superiora saltem, basi sub-cordata. Quae ad mari- num litus exemplaria legimus ad varietatem nostram spectantia ob densam pubescentiam, et folia ut plurimum latiuscula diversissima a specie primo intuitu videbantur. Sedula vero observatio suasit plantam hanc mirum in modum pro ratione soli variam pubescentiam induere, quod et summae notae Botanici confirmarunt. Insuper bracteolarum et foliorum proportiones in speciei etiam exemplaribus varias videre datum fuit, et caule modo simplicem, modo ramosissimum invenimus.
554. SPINOSA. *L.* Umbella sub-quinque-fida simplici; bracteolis ovatis; foliis oblongis integerrimis; caule fruticoso, ramis senescentibus sub-spinosis: capsulis verrucosis, glabris.
- E. spinosa. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi E. Etr. 1. p. 143.\* Titymalus ragusinus flore luteo*

*Similis  
Villoso*  
78. aprile 1801.

## DODECANDRIA TRIGYNIA.

- pentapetalo . Herm. *Lugd.* 600. t. 601. *Esula frutescens*,  
sive *Pithyusa Romanorum* . Barr. ic. 197.  
 In montium siccis . *A Tivoli presso S. Antonio* , sul Monte  
*Gennaro* . . . Perenn. Floret Martio-Junio . Fl. luteoli,  
 calycinis lobis 5 , integris .
555. PALUSTRIS . *L.* Umbella multifida , sub-trifida , bifida ;  
 bracteolis ovatis , obtusis : foliis lanceolatis , glabris : ra-  
 mis pluribus sterilibus : capsulis verrucosis glabris .  
*E. palustris* . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn.  
*Titymalus palustris fruticosus* . Moris. H. 3. s. 10. t. 2.  
*f. 1.* E. major . Dod. Pempt. 374.  
 In palustribus , pratis uidis . *Presso Ostia , a Castel Fusano* . . . Perenn. Floret Majo , Junio . Fl. luteoli , calycinis  
 lobis integris .

## DODECANDRIA PENTAGYNYIA .

## (216) GLINUS .

556. LOTOIDES . *L.* Caule piloso , foliis obovatis . *Loefl.* it.  
*W. Sp.* - *Pers. E.*  
*Alsine lotoides Sicula* . Bocc. Sic. 21. t. 11. - Moris. H. 2.  
*p. 552.* Portulaca baetica luteo flore , spuria , aquatica  
*Barr. rar. 478. t. 336.*  
 In inundatis . *Alle Paludi pontine* . Legit et communicavit  
 benebole doctissimus Moricandius . Ann. Flores lutei .
-

## CLASSIS XII.

## ICOSANDRIA. \*)

## ORD. MONOGYNIA.

- (217) *MYRTUS*. *Calix* 5-fidus, superus. *Petala* 5. *Bacca* ovata, 2-3-locularis, loculis 1-5-spermis.  
 (218) *PRUNUS*. *Calix* 5-fidus, inferus. *Petala* 5. *Drupa* carnosia, laevis, pulvere glauco obtecta; nucleus ovatus, subcompressus, margine sulcato, anguloso.  
 (219) *CERASUS*. *Calix* 5-fidus, inferus. *Petala* 5. *Drupa* succulenta, laevis, nitida; nucleus subrotundus, sutura prominula.

Manca  
Philadelphia  
Coronavirus  
Syringa

## ORD. DIGYNIA.

- (220) *CRATÆGUS*. *Calix* 5-fidus, superus. *Petala* 5. *Pomum* 2-5-spermum, farinosum. *Semina* ossea. *Styli* duo, interdum 1, aut 5.  
 (221) *SORBUS*. *Calix* 5-fidus, superus. *Petala* 5. *Pomum* 2-3-spermum. *Semina* cartilaginea. *Styli* 2-3.

## ORD. PENTAGYNIA.

- (222) *MESPILUS*. *Calix* 5-fidus superus, laciniis (saepius) foliaceis, serratis. *Petala* 5. *Pomum* 5-spermum, carnosum. *Semina* ossea. *Styli* 5. Folia indivisa.  
 (223) *PYRUS*. *Calix* 5-fidus, superus. *Petala* 5. *Pomum* turbinatum, apice umbilicatum, 5-loculare, loculis dispermis. *Semina* cartilaginea. *Styli* 5, basi liberi.  
 (224) *MALUS*. *Calix* 5-fidus, superus. *Petala* 5. *Pomum* sphæroideum, basi et apice umbilicatum, 5-loculare, loculis dispermis. *Semina* cartilaginea. *Styli* 5, basi coaliti, saepius hirsuti.  
 (225) *SPIRÆA*. *Calix* 5-fidus, patens, inferus. *Petala* 5. Capsulae 3-12, intus bivalves 1-3-spermae.

## ORD. POLYGYNIA.

- (226) *ROSA*. *Calix* urceolatus, collò coarctatus, limbo 5-partitus laciniis foliaceis. *Ovaria* monostyla plurima, dein semina hispida intra calycis tubum bacciformem.

L 4

\*) Stamina plura quam 19 calyci vel corollæ, nec thalamo inserta.

- (227) *RUBUS*. *Calix* 5-fidus. *Petala* 5. *Bacca* supera, composita acinis monospermis.
- (228) *FRAGARIA*. *Calix* 10-fidus, inferus. *Petala* 5. *Semina* nuda, affixa receptaculo demum acreto, ovoideo, pulposo, deciduo.
- (229) *POTENTILLA*. *Calix* 10-fidus, inferus. *Petala* 5. *Semina* nuda, affixa receptaculo parvo exsucce, persistenti.
- (230) *GEUM*. *Calix* 10-fidus, laeiniis alternis, minoribus. *Semina* longe barbata, seu aristata, affixa receptaculo oblongo, hirsuto.
- 

## ICOSANDRIA MONOGYNIA.

## (217) MYRTUS.

557. *COMMUNIS*. *L.* Floribus solitariis, involucre diphyllo. *L.* - *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *DC. Syn.* - *Savi Tr. d. Alb.* 1. p. 140.

*M. vulgaris sylvestris*. *J. B. H.* 1. p. 510.

In collibus sterilibus, marinis litoribus vulgaris. Frut. Floret Junio. Fl. albi.

## (218) PRUNUS.

558. *SPINOSA*. *L.* Fruticosa : pedunculis solitariis foliis elliptico-lanceolatis, subtus pubescentibus : ramis spinosis. *Pers. E.* - *Savi Tr. d. Alb.* 1. p. 167.

*P. spinosa*. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *P. sylvestris* seu *acacia germanica*. *Dod. Pempt.* 753.

In dumetis, ad sepes vulgatissima. Frut. Floret Martio. Aprili. Fl. albi.

## (219) CERASUS.

559. *AVIUM*. *Moench.* Floribus umbellatis subsessilibus : foliis ovato-lanceolatis, subtus sub-pubescentibus ; ramis patulis; fructu ovato, molli, non acido. *DC. Syn.*

*Prunus avium*. *L.* - *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Savi Tr. d. Alb.* 2. p. 220. *C. sylvestris* fructu nigro et rubro. *J. B. H.* 1. p. 220.

In sylvaticis, sepibus montium. *Intorno a Frascati*, etc. Offic: *cerasa nera*. Arb. Floret Aprili. Fl. albi.

## ICOSANDRIA DIGYNIA.

## (220) CRATÆGUS.

560. *PYRACANTHA*. *Pers. E.* Semper-virens, spinosa : foliis ovato-lanceolatis, crenatis : calycibus fructus obtusis. *Pers. L. c.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 107.\*

*Mespilus pyracantha*. *L.* - *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Lois. G.* -

**D.C. Syn.** Pyracantha quibusdam. *J. B. H.* 1. p. 51. Rhamnus tertius Dioscoridis. *Lob. ic. 2. p. 182.*

In montium sepibus; maritimis sylvaticis frequens. *A Palombara, Monte Gennaro, a Castel-Fusano, etc.* Frut. Floret Majo. Fl. albi, fructus eocinei.

561. **OXYACANTHA.** *L.* Spinosa: floribus digynis; fructu subrotundo: foliis glabris; basi cuneatis sub-trilobis; lobis obtusis, dentatis: calycibus glabriusculis, segmentis lanceolatis aenatis.

*C. oxyacantha.* *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 106.\* *C. oxyacanthoides.* *Thuil. Par.* - *Lois. G.* *Mespilus oxyacantha.* *Scop.* - *All. Ped.* - *Smith Br. M.* *oxyacanthoides.* *D.C. Fl. Fr. et Syn.* *Oxyacantha.* *Matth.* p. 181. - *Lob. ic. 2. p. 200.*

In montium sepibus. *Sui monti Tusculani, a Monte - Compatri ... Communicavit amicissimus L. Ciuffa.* Frut. Floret Aprili. Fl. albi.

562. **MONOGYNA.** *Jacq. Aust.* t. 292. f. 1. Spinosa: floribus monogynis; fructu sub-ovali; foliis glabris 3-5-lobis, acutiusculis incisis: calycibus sub-pubescentibus, segmentis acuminatis.

*C. monogyna.* *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 106.\* *C. oxyacantha.* *Fl. Dan.* t. 634. - *Lois. G.* *Mespilus monogyna.* *All. Ped. M.* *oxyacantha.* *D.C. Fl. Fr. et Syn.*

Ubique in sepibus. Vulgo: *spino bianco*. Frut. Floret Aprili. Fl. albi, odori.

(221) **SORBUS.**

A. Floribus digynis: fructu duriore:  
foliis sub-integris. (*Aria*).

563. **ARIA.** *Crantz Aust. Fasc.* 1. t. 2. f. 2. Foliis subrotundovalvis, inciso-dentatis, subtus albido-tomentosis: floribus corymbosis. *Pers. E.* - *Savi Tr. d. alb.* 1. p. 203.

*Crataegus aria.* *L.* - *Lois. G.* - *D.C. Syn.* *Pyrus aria.* *Smith Br.* - *W. Sp.* *Mespilus aria.* *Scop. Carn.* - *All. Ped.* *Aria Theophrasti effigie alni.* *Lob. ic. 2. p. 167.*

In montanis sylvaticis frequens. *Sul Monte Gennaro, etc.* Arbusc. Floret Majo. Fl. albi.

B. Floribus trigynis, fructu molli: foliis  
pinnatis. (*Sorbus genuina*).

564. **DOMESTICA.** *L.* Foliis pinnatis; foliolis aequalibus, subtus villosis. *Savi Tr. d. Alb.* 1. p. 202. et *Bot. Etr.* 2. p. 108.\*

*S. domestica.* *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *D.C. Syn.* - *Lob. ic. 106.* *Pyrus domestica.* *Smith Engl. Bot.* t. 350, et *Fl. Br.*\* *Mespilus domestica.* *All. Ped.* *Sorbus legitima.* *Clus. H.* 1. p. 10.

In montium sylvaticis. Vulgo: *Sorbo*. Arb. Floret Majo. Fl. albi, fructus rubicundi.

Maggio 1871

Maggio 1871

10-Aprile 1872

## ICOSANDRIA PENTAGYNYIA.

## (222) MESPILUS.

565. GERMANICA . *L.* Spinosa : foliis ovato-lanceolatis , sub-dentatis , subtus tomentosis : floribus solitariis sessilibus terminalibus ; calycis laciniis elongatis , acutis .  
*M. germanica* . *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi Tr. d. Alb.* 1. p. 159. *M. Dod. Pempt.* 801.

In sylvis . *A Villa Borghese nei boschetti presso il Palazzo* , a Corneto , etc. *Vulg. Nespolo* . *Arb. Floret Majo* . *Fl. albi* .

## (223) PYRUS .

566. COMMUNIS . *L.* Foliis ovato-lanceolatis sub-dentatis , supra laevibus : pedunculis corymbosis . *DC. Syn.*  
*P. communis* . *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Savi Tr. d. Alb.* 2. p. 156.  
*a. Pyraster*. Fructibus parvis aceribus .  
*P. sylvestris* . *Dod. Pempt.* 800.  
 In dumetis , sepibus frequens . *Vulgo* : *perazzo* . *Arb. Floret Aprili* . *Fl. albi* .  
 Varietates plurimae in pomariis coluntur .

## (224) MALUS .

567. COMMUNIS. *DC.* Foliis ovatis , acutiusculis , sub-dentatis : floribus umbellato sessilibus . *DC. Syn.*  
*Pyrus malus* . *L.* - *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Savi Tr. d. alb.* 2. p. 156.  
*a. Silvestris* . Fructibus parvis , aceribus .  
*M. sylvestris* . *Dod. Pempt.* 690.  
 In nemoribus communis . *Arb. Floret Majo* . *Fl. albo-rosei* .  
 Varietates plurimae in pomariis cultae .

## (225) SPIREÆA.

568. FILIPENDULA . *L.* Herbacea : foliis interrupte pinnatis , foliolis uniformibus , serratis , ovato-oblongis : floribus paniculato-corymbosis , polygynis .  
*S. filipendula* . *All. Ped.* - *Smith Br.* \* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi Bot. Etr.* 2. p. 110. \* *Filipendula* . *Dod. Pempt.* 56. *F. vulgaris* . *Hort. Rom.* 5. t. 39.  
 In pratis montanis humidis frequens . *Perenn. Floret Majo* . *Fl. albi* .

## ICOSANDRIA POLYGYNIA.

## (226) ROSA.

569. GALLIGA . *L.* Calycum tubis ovatis , sub-hispidis ; pedunculis sub-unifloris , hispidis : caule petiolisque hispido-aculeatis : foliis subtus glaucescentibus , serraturis glandulosis .

*R. gallica*. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.*  
*R. rubra*. *Lam. Fl. Fr.*

Ad oras nemorum circa urbem frequens. *Alla Caffarella*, al  
*Pigneto-Sacchetti*, etc. *Frutie. Floret Majo.* Fl. intense  
*rosei*.

570. **SEMPERVIRENS**. *L.* *Calycum tubis ovatis pedunculisque*  
*hispidis; caule petiolisque aculeatis: floribus sub-umbel-*  
*latis; bracteis lanceolatis: foliolis ovato-lanceolatis gla-*  
*bris, nitidis, perennantibus.*

*R. sempervirens*. *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.*  
*Savi Tr. d. alb. 1. p. 190.* *R. sempervirens Jungermanni.*  
*Clus. H. 2. app. alt.* - *Dill. Elth. 326. t. 246.*

Ad sepes in nemorosis frequens, et in Amphitheatro Flavio:  
*Frut. Floret Aprili, Majo.* Fl. albi.

571. **CANNA**. *L.* *Calycum tubis ovatis pedunculisque glabris,*  
*limbi lacinias pinnatifidis: caule petiolisque adunco-acu-*  
*leatis; foliolis ovatis; acutis, argute serratis, glabris.*

*R. canina* *All. Ped.* - *Smith Br.\** - *W. Sp.* - *Pers. E.* -  
*Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi Tr. d. alb. 1. p. 189.* *R. canina*  
*vulgo dicta.* *Dod. Pempt. 187.* *R. sylvestris alba cum ru-*  
*bore, etc.* *J. B. H. 2. p. 43.*

Ad sepes vulgatissima. *Frut. Floret Majo.* Fl. dilute carnei.

(227) **RUBUS**.

572. **IDÆUS**. *L.* *Foliis quinato-pinnatis, ternatisque subtus*  
*albido-pubescentibus, petiolis canaliculatis: caule acu-*  
*leato sub-recto.*

*R. idaeus*. *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* -  
*Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi Tr. d. alb. 1. p. 192.* - *Dod.*  
*Pempt. 743.* *R. idaeus spinosus.* *Lob. ic. 2. p. 212.*

In montium umbrosis. *sylvaticis. Sul Monte Gennaro ...*  
*Frut. Floret Junio.* Fl. albo-rosei.

*Fructus edulis ruber vulgo: frambesia, lampone.*

573. **FRUTICOSUS**. *Foliis quinatis, ternatisque subtus incano-*  
*tomentosis, foliolis lateralibus petiolatis: caulibus angu-*  
*losis, aculeis aduncis.* *DC. Syn.*

*R. fruticosus*. *All. Ped.* - *Smith Br.\** - *W. Sp.* - *Pers. E.* -  
*Lois. G.* - *Savi Tr. d. alb. 1. p. 192.* *R. Dod. Pempt. 742.*  
*R. major fructu nigro.* *J. B. H. 2. p. 57.*

In sepiibus, dumetis, *sylvaticis ubique. Vulgo: rogo.* *Frut.*  
*Floret Junio-Augusto.* Fl. albo-rubelli.

*Fructus edules nigri vulgo: more.*

574. **CORYLIFOLIUS**. *Smith Br.\** *Foliis quinatis, ternatisque*  
*subtus sub-pilosis; foliolis lateralibus sessilibus: caulibus*  
*sub-angulosis, aculeis rectiusculis.* *DC. Syn.*

*R. corylifolius.* *Pers. E.* - *Lois. G.*  
*In sepiibus circa urbem frequens cum praecedente, cui si-*  
*milis.* *Frut. Floret Junio-Augusto.* Fl. albo-subcarnei.

*Folia subtus pallide viridia, nequaquam incana.*

13. Giugno  
 1873.

25.  
 Maggio 1873

3. I. 1873

10. Giu  
 1873

4

10

**TOMENTOSUS**. *W. Sp.* Foliis ternatis obovatis acuminatis, inaequaliter dentatis utrinque molliter tomentosis; foliolis lateribus petiolatis, hinc sub-lobatis: caulinis aculeatis vix angulosis.

R. tomentosus. *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Flor. Ticin.* 1 tab. 8.\*  
R. fruticosus  $\beta$  tomentosus. *Pers. E.*

In dumetis, rupibus. *In copia sulla rupe di Tor di Quinto*, etc. *Frutic. Floret Junio. Fl. albi.*

Foliola rhomboe-ovata basi fere cuneata sub-integra, ultra medium grosse inaequaliter dentata, apice acuto pro-ducta.

(228) **Fragaria**.

576. **VESCA**. *L.* Calyce fructus reflexo; foliis subtus sub-secisis, longe petiolatis. pubescentia petiolorum patentissima. *DC. Syn.*

*F. vesca*. *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.*  
*F. vulgaris*. *Hort. Rom.* 5. t. 44. *F. Dod Pempt.* 672.

In umbrosis, nemorosis passim circa urbem, et in montibus. *Vulg. fravole*. *Perenn. Floret Aprili. Fl. albi.*

(229) **POTENTILLA**.

577. **RECTA**. *L.* Foliis septenatis quinatisque, foliolis obserse lanceolatis, grosse profundeque dentatis, utrinque pilosis; stipulis margine exteriore sub-incisis: caule erecto; petalis calyce majoribus.

*P. recta*. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.*  
Quinque folium alterum vulgare. *Dod. Pempt.* 116. *Quinquefolium rectum luteum*. *Hort. Rom.* 5. t. 49.

In collibus circa urbem, et in montium viis umbrosis. *Sul Monte Mario*, a *Palazzuola*, *presso Viterbo*, etc. *Perenn. Floret Majo*, Junio. *Fl. pallide lutei*.

578. **AUREA**. *L.* Caule erectiusculo: foliis radicalibus quinatis, caulinis ternatis, subsessilibus; foliolis cuneatis apice dentatis, margine albo-villosis: petalis obcordatis calyce majoribus.

*P. aurea*. *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *Pentaphyllum alpinum splendens aureo flore*. *J. B. H.* 2. p. 398.

In elatioribus subapenninis jugis. *Sul Monte Calvo presso Subiaco* .... *Perenn. Floret Junio. Fl. aurei*.

579. **REPTANS**. *L.* Foliis quinatis sub-hirsutis, foliolis ovatis obtusis, dentatis: caule repente; pedunculis axillaribus, unifloris. *DC. Syn.*

*P. reptans*. *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 113. *Quinquefolium majus luteum*, *Fuchs. H.* 623. *Quinquefolium majus repens*. *Hort. Rom.* 5. t. 45.

In subhumidis, ad vias, secus rivulos vulgatissima. *Perenn. Floret Majo*, Junio. *Fl. flayi*.

580. FRAGARIOIDES. *Vill. Delph. 3.* Foliis ternatis ovalibus, obtusis, crenatis, subtus sericeis: caulinibus decumbentibus hirsutis; petaljs obcordatis, calyci aequalibus.  
*P. fragariastrum*. *Pers. E. P. emarginata*. *Desf. Atl. P. fragaria*. *DC. Syn. Fragaria sterilis*. *L. - All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Lois. G. Comarum fragarioides*. *W. En. H. Ber. Fragaria sylvestris minime vesca, seu sterilis*. *Lob. ic. 698.*
- In sylvaticis montium frequens. *Copiosamente intorno a Roccadi Papa, etc.* Perenn. Floret Aprili. Fl. albi. Facies omnino Fragariae.
- (230) GEUM.
581. URBANUM. *L.* Foliis ternatis, radicalibus lirato-pinnatifidis; stipulis rotundatis incisis: floribus erectis; seminum aristis uncinatis nudis. *Savi B. Etr. 2. p. 114.*  
*G. urbanum*. *Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Garyophyllata urbana*. *All. Ped. G. vulgaris*. *Hort. Rom. 5. t. 43. C. Dod. Pempt. 137.*
- In umbrosis, ad vias passim. Perenn. Floret Aprili, Majo. Fl. lutei.

## C L A S S I S XIII.

## POLYANDRIA. \*)

## ORD. MONOGYNIA.

- (231) *CAPPARIS*. *Calix* 4-*phyllus*, *coriaceus*, *deciduus*.  
*Petala* 4. *Stamina longa*. *Stigma capitatum*. *Siliqua carnos*a, *pedicellata*.
- (232) *CHELIDONIUM*. *Calix* 2-*phyllus*. *Petala* 4. *Siliqua bivalvis unilocularis*, *linearis*. *Semina plurima*, *cristata*.
- (233) *GLAUCIUM*. *Calix* 2-*phyllus*. *Petala* 4. *Siliqua 2-locularis*, *2-3-valvis*, *linearis*. *Semina plurima*, *punctata*.
- (234) *PAPAVER*. *Calix* 2-*phyllus*, *caducus*. *Petala* 4. *Stigma sessile*, *planum*, *supra multiradiatum*, *persistens*.  
*Capsula oblongo-globosa sub stigmatis corona poris dehiscens*.
- (235) *TILIA*. *Calix* 5-*phyllus*. *Petala* 5. *Nux globosa*, *basi dehiscens*, *5-locularis*, *loculis 4 abortientibus monosperma*.
- (236) *CISTUS*. *Calix* 5-*phyllus*. *Petala* 5. *Capsula 5-locularis*, *5-valvis*, *polysperma*. *Folia opposita*, *exstipulata*.
- (237) *HELIANTHEMUM*. *Calix* 5-*phyllus*, *foliolis binis minoribus*. *Petala* 5. *Capsula 1-locularis*, *trivalvis*, *polysperma*.

## ORD. TRIGYNIA.

- (238) *DELPHINIUM*. *Calix nullus*. *Corolla irregularis*, *5-6-partita*, *lacinia superiore calcarata*. *Nectarium petaloideum*, *1-2-phyllum calcaratum*, *corollae calcare tectum*.  
*Capsulae solitariae*, *aut ternatae*, *erectae*.

## ORD. PENTAGYNIA.

- (239) *AQUILEGIA*. *Calix nullus*. *Petala* 5. *Nectaria 5 petaloidea*, *cuculliformia*, *corniculata*, *ungue laterali petalis interjecta*. *Capsulae 5-distinctae*.
- (240) *NIGELLA*. *Calix nullus*. *Petala* 5. *Nectaria 5-8, petaloidea*, *bilabiata*, *petalis breviora*. *Capsulae 5-10, distinctae*, *aut coalitae*, *singulæ stylo persistente coronatae*.

\*) *Stamina plura quam 19 thalamo inserta*.

- (241) *HYPERICUM*. *Calix* 5-partitus. *Petala* 5. *Filamenta* in fasciculis 5, vel 3 coalita. *Styli* 1-2-3-5. *Capsula loculis et valvis numero stylorum* (*rarius baccata et incomplete trilocularis*).

## ORD. POLYGYNIA.

- (242) *ANEMONE*. *Calix* nullus. *Petala* 5-15. *Capsulae plures monospermae, mucronatae, vel caudato-plumosae. Involucrum triphyllum, a flore remotum.*
- (243) *CLEMATIS*. *Calix* nullus, vel minimus, bilabiatus, *Petala* 4, vel 5. *Capsulae plures compressae, stylo persistente caudatae.*
- (244) *THALICTRUM*. *Calix* nullus. *Petala* 4-5, caduca. *Capsulae plures, teretes, sulcatae, mucrone terminatae.*
- (245) *ADONIS*. *Calix* 5-phyllos. *Petala* 5 vel plura, ungue nudo. *Semina plura, ovata, sub-mucronata, nuda.*
- (246) *FICARIA*. *Calix* 3-phyllos, caducus. *Petala* 8-9, intus basi squamula instructa. *Semina compressa, obtusa, nuda.*
- (247) *RANUNCULUS*. *Calix* 5-phyllos. *Petala* 5, intus basi squamula donata. *Semina plura, laevia, vel tuberculata.*
- (248) *ISOZYRUM*. *Calix* nullus. *Petala* 5. *Nectaria* 5, petaloidea, minora, tubulosa, trifida. *Capsulae plurimae, recurvae, polyspermae.*
- (249) *HELLEBORUS*. *Calix* nullus. *Petala* 5, aut plura:necta ia totidem petaloidea, minora, tubulosa, bilabiata. *Capsulae 5-6, compressae, erectiusculae, polyspermae:*
- 

## POLYANDRIA MONOGYNIA.

- (251) *CAPPARIS*.

582. *SPINOSA*. *L.* Pedunculis 1-floris, solitariis; stipulis spinosis vel nullis; foliis subrotundis, obtusis, glabris, annuis: capsulis ovalibus.

*C. spinosa*. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn. C. retuso folio. Lob. ic. 635.* *C. non spinosa fructu majore. Hort. Rom. 5. t. 8.*

Ad muros antiquos vulgaris, stipulis spinescentibus carens. Perenn. Floret Julio. Fl. albi, centro sub-violacei.

- (252) *CHELIDONIUM*.

583. *MAJUS*. *L.* Pedunculis umbellatis: foliis pinnatis; pinnis lobatis, crenatis.

*Ch. majus*. *All. Ped.* - *Smith Br.\* - W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn. - Dod. Pempt. 48.* - *Hort. Rom. 4. t. 46.*

20  
aprilie 1871  
5. d. 1871

In umbrosis , ad sepes ubique . Perenn Floret Majo , Junio .  
Fl. lutei .

## (233) GLAUCIUM .

584. LUTEUM . Scop. Carn. 2. Pedunculis unifloris : foliis amplexicaulibus , sinuatis : caule glabro ; siliquis scabris .  
Gl. luteum . Smith Br.\* - Pers. E. Gl. flavum . All. P d. Chelidonium glaucium . L. - W. Sp. - Lois. G. - DC. Syn. Gl. flore luteo . Hort. Rom. 4. t. 87.

In arenosis maritimis . Ad Ostia , Fiumicino , etc. Ann.  
Floret Junio , Julio . Fl. flavi .

## (234) PAPAVER .

585. RHÆAS . L. Capsulis glabris , sub-globosis : caule multifloro hispido , pilis omnibus patentibus ; foliis bipinnatifidis , incisis . Smith Br.\* - Savi B. Etr. 1. p. 150.\*

P. Rhaeas . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. - G. - DC. Syn. P. erraticum . Dod. Pempt. 447. - Hort. Rom. 4. t. 64. In cultis , in cultis , vineis passim . Vulgo : rosolacci . Ann. Majo . Fl. punicei .

586. DUBIUM . L. Capsulis glabris oblongis : caule multifloro piloso , pilis pedunctorum adpressis ; foliis bipinnatifidis . Smith Br.\* - Savi B. Etr. 1. p. 150.\*

P. dubium . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Argemone capitulis longioribus , glabris . Moris. H. 2. s. 3. t. 14. f. 11.

In in cultis cum praecedenti frequens . Ann. Floret Majo .  
Fl. pallide punicei .

## (325) TILIA .

587. PLATYPHYLLOS . Scop. Carn. 641. Foliis cordato-subrotundis , acuminatis , inaequaliter serratis : capsula turbinata , costis prominentibus insignita , lignosa , crassa . Venten. Monogr. Til. t. 1. f. 2. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 1. p. 151.\*

T. europaea  $\alpha$ . L. - All. Ped. - W. Sp. T. europaea  $\beta$  grandifolia . Pers. E. T. europaea . Lois. G. T. vulgaris platiphyllos . J. B. H. 1. p. 333. T. foemina . Dod. Pempt. 838.

In sylvaticis montium . Ai Riformati di Castel Gandolfo ,  
presso Palazzuola , etc. Arb. Floret Junio . Fl. albi .

## (236) CISTUS .

588. VILLOSUS . L. Fruticosus : foliis ovatis , rugosis , hirtis ; petiolis basi dilatatis ; ramis , pedunculis sub-simplicibus calicibusque villosis .

C. villosus . W. Sp. - Pers. E. - Desf. atl. 1. - Lois. Notic. p. 65. - Savi B. Etr. 2. p. 125. C. mas major folio rotundiore . J. B. H. 2. p. 2.

In maritimis . Presso Civitavecchia ... Frut. Floret Majo .  
Petala crenata , rubra .

589. MONSPELIENSIS . L. Fruticosus : foliis linear-lanceolatis

sessilibus utrinque villosis, trinerviis : pedunculis ramosis, villosis.

C. monspeliensis. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 127. C. ladaniifera, sive Le-  
don monspessulanum angusto folio nigricans. *J. B. H.* 2.  
p. 10.

In maritimis frequens. *A. Maccarese*, presso *Civitavecchia*... Frut. Floret Majo. Fl. albi.

Herba glutinosa.

590. SALVIFOLUS. *L. Fruticosus*: foliis petiolatis, ovatis, rugosis, utrinque hirsutis, pilis stellatis : pedunculis longis unifloris.

C. salvitolius. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 126. C. foemina monspeliaca. *J. B. H.* 2. p. 4.

In collibus, ericotis circa urbem vulgaris. *Sul Monte Mario*, *alla Valle dell' Inferno*, etc. Frut. Floret Aprili. Pe-  
tala alba emarginata.

591. INCANUS. *L. Fruticosus* : foliis sessilibus, spathulatis, rugosis, sub-tomentosis ; superioribus angustioribus, acutiis. *Enc.* - *Savi B. Et.* 2. p. 126.\*

C. incanus. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* C. mas secundus, folio longiore. *J. B. H.* 2. p. 2.

In collibus, ericotis circa urbem haud infrequens. Frut.  
Floret Aprili. Petala rosea, crenulata.

(237) HELIANTHEMUM.

*A. Foliis exstipulatis.*

592. HALIMIFOLIUM. *DC. Fruticosum exstipulatum* : foliis op-  
positis, lanceolato-ovobatis, sub-trinerviis, incanis : pe-  
dunculis longis, ramosis, calycibusque glabris.

H. halimifolium. *Pers. E.* - *DC. Syn.* *Cistus halimifolius*.  
*L.* - *W. Sp.* - *Lois. G.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 153. C. halimi  
minoris folio. *Barr. ic.* 281.

In maritimis. *A Castel-Fusano*. Frut. Floret Majo, Junio.  
Petala lutea, macula atra ad basim.

593. FUMANA. *Desf. Suffraticosum*, exstipulatum, proeum-  
bens : foliis alternis linearibus, margine sebris ; pedun-  
culis unifloris.

H. fumana. *Pers. E.* - *DC. Syn.* *Cistus fumana*. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Lois. G.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 127. C. minor brevi  
vermiculato folio hispanicus. *Barr. ic.* 280.

In aridis montium, et in arenosis maritimis. *A Santo-Po-*  
*lo*, *sul Monte Gennaro*, presso *Ostia*, *Terracina* ....  
Suffr. Floret Majo, Septembri. Fl. lutei.

594. ITALICUM. *Pers. E.* *Suffruticosum exstipulatum* : foliis  
oppositis, hispidis, inferioribus ovatis, superioribus lan-  
ceolatis : ramis patentibus. *Pers. l. c.*

*Cistus italicus*. *L.* - *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Lois. G.* - *Savi B.*

*Etr. 2. p. 128. Helianthemum oelandicum γ italicum. DC.  
Cat. H. Monsp. H. serpilli folio villoso, flore pallido italicum. Barr. ic. 366.*

*In elatis montibus. Presso Terni .... Suffr. Floret Junio, Petala lutea, sub-integra.*

**595. GUTTATUM.** *Mill. Herbaceum, exstipulatum: foliis oppositis, oblongis, trinerviis, hirtis; radicalibus obovatis; racemis laxis ebracteatis; petalis integris, serratis.*

*H. guttatum. Pers. E. - DC Syn. Cistus guttatus. L. - All. Ped. - W. Sp. - Lois. G. Hel. flore maculoso. Col. ecphr. 2. p. 78. t. 77.*

**β.** *Serratum. DC. Cat. Hort. Monsp.*

*H. plantagineum β serratum. Pers. E. Cistus serratus. Can. v. 175. f. 1. - W. Sp. - Lois. Not. 85.*

**γ.** *Immaculatum. DC. l. c.*

*In oris sylvarum, collibus sterilibus circa urbem frequens.*

*Alla Valle dell' Inferno, etc. Ann. Floret Majo, Junio.*

*Petala lutea basi macula atro-purpurea, margine sub-denticulata, in γ immaculata.*

*B. Foliis basi stipulatis.*

**596. VULGARE.** *DC. Suffruticosum, procumbens: stipulis lanceolatis, foliis ovato-oblongis, sub-pilosis, margine revolutis, subtus pallidis; calycinis nervis pilosis.*

*H. vulgare. DC. Syn. - Bertol. Rar. It. Pl. Dec. 3. p. 24.<sup>9</sup>  
Cistus helianthemum. L. - α. W. Sp.*

**α.** *Foliis sub-pilosis, subtus incanis.*

*H. vulgare. Pers. E. Cistus Helianthemum. Smith. Br. - Lois. G. - Sayi Pis. 2. p. 13.*

**β.** *Foliis sub-hirsutis, subtus pallide viridibus.*

*H. vulgare. × Bertol. l. c. H. obscurum. Pers. E. Cistus hirsutus. Thuil. - Lois. G. C. barbatus. Sayi Pis. 2. p. 13.  
C. ovatus. Vivian. Fl. Ital. Fragm. Fasc. 1. p. 6. t. 8. f. 2.  
Hel. vulgare flore luteo. Hort. Rom. 4. t. 78.*

*In montosis, collibus, arvis siccioribus varietas tantum β apud nos communis. Perenn. Floret Majo, Junio. Fl. lutei.*

*Species haec ludit herba tota plus minus hirsuta, foliisque obtusioribus et margine minus manifeste revolutis. Hinc C. ovatus cl: Viviani in Gimini collectus hoc reducendus monente quoque cl: Bertolonio l. c.*

**597. PULVERULENTUM.** *DC. Suffruticosum, prostratum; foliis oblongis, revolutis, utrinque cano-pubescentibus; calycibus sub-tomentosis. DC. Syn.*

*H. pulverulentum. Pers. E. Cistus pulverulentus. Thuil. Par. - Lois. G. C. polifolius. Lam. Dict. 2.*

*In subapenninis montibus. Suffr. Floret Junio. Fl. albi.*

**598. APENNINUM.** *DC. Suffruticosum, patulum; foliis oblongis*

- go-lanceolatis, revolutis, subtus incanis, superne demum glabris; calycibus pubescentibus. DC. Syn.  
*H. apenninum*. Pers. E. *Gistus apenninus*. L. - W. Sp. - Lois. G. *H. album germanicum*. Tabern. ic. 1062.  
In collibus siccis. Presso Corneto .... Suffr. Floret Majo, Junio. Fl. albi.

## POLYANDRIA TRIGYNIA :

## (238) DELPHINIUM .

599. CONSOLIDA . *L. Capsula solitaria*: nectariis monophyllis: caule brachiatu diffuso; floribus sparsis.  
*D. consolida*. All. Ped. - Smith. Br. \* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. *Cuminum sylvestre secundum*. Matth. Valgr. 2. p. 118.  
In agris, segete ad montium radices. Ann. Floret Junio. Fl. saturate coerulei.  
600. PEREGRINUM . *L. Capsulis ternatis*: nectariis diphyllis; corollis enneapetalis: foliis multipartitis, laciniis linearib-  
ri-oblongis.  
*D. peregrinum*. All. Ped. 1503. t. 25. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. *Consolida regalis latifolia parvo flo- re*. Moris. H. 3. p. 466. s. 12. t. 4. f. 3.  
In sterilibus, ad vias passim. Ann. Floret aestate. Fl. in-  
tense coerulei.

1. luglio 1801  
Medium  
6. capulam solita  
nectar. diphylli:  
caule pentaventili  
foliis multipartitis

## POLYANDRIA PENTAGYNIA :

## (239) AQUILEGIA .

601. VULGARIS . *L. Nectariis incurvis*; caule folioso multifloro; foliis ternatis, foliolis tripartitis lobatis, lobis rotundatis.  
*A. vulgaris*. All. Ped. - Smith Br. \* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. A. Dod. Pempt. 181.  
In montium sylvis. Sul Monte Gennaro, Monte Artemisio ... Perenn. Floret Junio. Fl. coerulei.

## (240) NIGELLA .

602. DAMASCENA . *L. Floribus pentagynis involucro folioso*  
multifido cinctis.  
*N. damascena*. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. *N. arvensis cornuta*. Hort. Rom. 4. t. 94. Melianthium damascenum. Dod. Pempt. 304.  
In marginibus, ad sepes vulgaris. Ann. Floret Junio, Ju-  
lio. Fl. coerulei. - Semina odore fragorum.

## (241) HYPERICUM .

- Ser. Floribus trigynis.  
603. ANDROSÆMUM . *L. Floribus trigynis, terminalibus*: ca-  
lycinis foliolis inaequalibus, subrotundo-ovatis, obtusis;

30.  
Maggio 1801.

fructibus baccatis : foliis ovatis sessilibus ; caule fruticoso , ancipiti . *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Savi B. Etr. 2. p. 100.*

*Androsaemum officinale* . *All. Ped.* - *DC. Syn. A. Dod. Pempt. 79.* - *J. B. H. 380.* - *Hort. Rom. 4. t. 80.*

In nemorosis . *Sul Monte Mario a Villa Madama . . .* Perenn. Floret Junio . Fl. aurei .

*604. PERFORATUM* . *L.* Floribus trigynis , terminalibus , paniculatis ; foliolis calycinis lanceolatis : foliis obtusis pellucido-punctatis ; caule ancipiti . *Savi B. Etr. 2. p. 101.*

*H. perforatum* . *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn. H. vulgare* . *Dod. Pempt. 76.* - *Hort. Rom. 4. t. 89.*

*In arvis , aggeribus vulgare* . *Offic. ipperico* . Perenn. Floret Junio , Julio . Fl. flavi .

*605. MONTANUM* . *L.* Floribus trigynis corymboso-paniculatis ; calycibus serrato-glandulosis : foliis ovato-oblongis , amplexicaulibus , margine nigro-punctatis ; caule tereti , erecto , simplici , glabro .

*H. montanum* . *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr. 2. p. 101.* *Androsaemum campoclarense* . *Col. ecphr. 74.*

*In nemorosis , sylvis montium praesertim communis* . *A Castel Gandalfo , sul Monte Albano , Monte Gennaro , presso Civitavecchia , etc.* Perenn. Floret Junio , Julio . Fl. flavi .

Calices elegantissimi . Folia punctis pellucidis sparsis in margine , interdum et in disco , nigris .

*606. HIRSUTUM* . *L.* Floribus trigynis , thyrsideo-panienlatis ; calycibus serrato-glandulosis : foliis oblongis , basi attenuatis , pellucido-punctatis , subtus pubescensibus : caule tereti , erecto , pubescente . *W. Sp.* - *Savi B. Etr. 2. p. 103.*

*H. hirsutum* . *All. Ped.* - *Smith Br.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *Androsaemum alterum hirsutum* . *Col. ecphr. 1. p. 74.*

*In nemorosis circa urbem . Nella Macchia de' Mattei , etc.* Perenn. Floret Julio . Fl. flavi .

### POLYANDRIA POLYGYNIA.

#### (242) ANEMONE.

*607. CORONARIA* , *L.* Scapo unifloro ; involuci foliolis laciniatis : foliis radicalibus ternato-decompositis dentibus mucronatis ; seminibus muticis , lanatis . *Savi B. Etr. 2. p. 121.*

*A. coronaria* . *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn. A. teritia* . *Dod. Pempt. 434.* *A. tenuifolia* . *J. B. H. 3. p. 400.*

In pratis apricis nonnullis sponte. Nelle Ville Pamfili, Ludovisi, Borghese ... et in hortis culta. Perenn. Floret Martio, Aprili. Fl. varii, albi, coerulei, violacei, sanguinei, coccinei, carnei.

608. HORTENSIS. L. Scapo uniflоро; involuci foliolis lanceolatis, sub-divisis: foliis radicalibus tripartitis, lobis varie incisis: petalis linear-lanceolatis; seminibus muticis, lanatis.

A. hortensis. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. A. stellata. Enc. - Savi B. Etr. 2. p. 122. A. prima. Dod. Pempt. 434. A. latifolia, saniculae folio. Hort. Rom. 5. t. 35.

Ubique in viis, arvis, nemorosis. Perenn. Floret Januario-Aprili. Fl. rubri, vel carnei, stellati.

609. APENNINA. L. Scapo uniflоро; involuci foliolis petiolatis, triphyllis, lobis pinnatifidis inciso-dentatis; foliis radicalibus conformibus: petalis linearibus; seminibus muticis, lanatis.

A. apennina. Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Savi B. Etr. 2. p. 113. A. secunda. Dod. Pempt. 434.

In nemorosis, collibus circa urbem, et in montosis. Villa Borghese, Villa Pamfili, sul Monte Mario, etc. Perenn. Floret Aprili. Fl. candidi, vel coerulei, petalis sub-duodenis.

610. NEMOROSA. L. Scapo uniflоро: involuci foliolis petiolatis triphyllis, lobis lanceolatis, inciso-dentatis, foliis radicalibus conformibus: petalis oblongis senis: seminibus muticis, lanatis.

A. nemorosa. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 1. p. 157. A. quinta. Dod. Pempt. 435.

In nemorosis montium abunde. Presso Rocca di Papa, nella Fojola, etc. Perenn. Floret Aprili. Fl. albi, extus sub-purpurascentes, petalis sub-senis.

611. RANUNCULOIDES. L. Scapo sub-bifloro; involuci foliolis sub-sessilibus, triphyllis, lobis, lanceolatis, incisis; foliis radicalibus foliolis conformibus sub-quinis: seminibus muticis, lanatis.

A. ranunculoides. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 123. Nemorus ranunculus lutens. Lsb. ic. 674.

In sylvis montium vulgaris, Presso Albano, Rocca di Papa, etc. Perenn. Floret Aprili. Fl. aurei.

(243) CLEMATIS.

612. VITALBA. L. Caulibus sarmentosis; foliis pinnatis, foliolis cordatis inciso-lobatis integris, petiolo scandentibus.

C. vitalba. All. Ped. - Smith. Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois.

18  
Aprile 1871

10  
Marzo 1871

18. 3. 1871

10  
V

13  
Giugno 1871  
10 1871

- G. - DC. Syn. C. latifolia integra et dentata. J. B. H. 2.  
p. 125. C. sylvestris latifolia. Hort. Rom. 5. t. 40.  
In sepiibus omnibus. Frut. Floret Junio, Julio. Fl. albi.  
**613. FLATIMULUM.** L. Caulibus sarmentosis; foliis inferioribus pinnatis, foliolis ternatis ovatis sub-lobatis, petiolo scandentibus; superioribus simplicibus ternatisque, lanceolatis, integris.  
 G. Flammula. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Flammula. Dod. Pempt. 440 G. flammula scandens tenuifolia. Hort. Rom. 5. t. 41.  
 In amphitheatro Flavio, et ad margines nemorum circa urbem frequens. Perenn. Floret Julio. Fl. albi, odori.
- (244) **THALICTRUM.**  
**614. FLAVUM.** L. Caule folioso sulcato: foliis bipinnatis, foliolis subovatis simplicibus trilobisque; panicula multiplex, erecta.  
 Th. flavum. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Th. nigricans. Jacq. Aust. 5. t. 421. (ex Engl. Bot.) - Fl. Ticin. 1. p. 259. Th. nigrius caule et semine striato. J. B. H. 3. p. 586.  
 In pratis humidis, ad fessas commune. Perenn. Floret Majo, Junio. Fl. luteoli.
- Maggio 1871.*  
**615. AQUILEGIFOLIUM.** L. Caule tereti: foliis bi-tri-pinnatis, foliolisque stipulatis: fructibus pendulis, triangularibus, rectis.  
 Th. aquilegiforme. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi Bot. Etr. 1. p. 155.\* Th. majus folliculis angulosis, caule laevi. J. B. H. 3. p. 487. Th. alpinum majus, aquilegiae foliis. Hort. Rom. 5. t. 24.  
 In marginibus agrorum, ad fossas frequens. Perenn. Floret Majo, Junio. Petala alba.
- (245) **ADONIS.**  
**616. ANNUA.** Gouan. Caule glabro, superne sulcato: foliis multifido-linearibus; petalis 5-8, ovato-oblongis, ungue nitido basi notatis; seminibus glabris. DC. Syn.  
 A. aestivalis. Targ. Istit. p. 492. Eranthemum. Dodon. Pempt. 260.  
 a. A. aestivalis. L. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G.  
 In arvis, segete frequens. In copia a Pratalata, sui monti di Lante, etc. Ann. Floret Aprili, Junio. Fl. cum calycibus rubri.
- (246) **FICARIA.**  
**617. RANUNCULOIDES.** Roth Germ. Foliis cordatis, sub-angulatis, petiolatis; caule unifloro. DC. Syn.  
**F. verna.** Huds. - Pers. E. Ranunculus ficaria. L. - All. Ped. - Smith. Br. - W. Sp. - Lois. G. Chelidonium minus. Dod.
- Marzo 1871.*  
*1871. 1871.*

*Pempt.* 49. *Ranunculus vernus rotundifolius major*. *Hort. Rom.* 5.t. 37.

In umbrosis , pratis spongiosis , argillosis vulgaris . Perenn. Floret Februario , Martio . Fl. flavi .

(247) RANUNCULUS .

618. FLAMMULA . *L.* Foliis ovato-lanceolatis , petiolatis , integris serratis : caule declinato .

*R. flammula* . *All. Ped.* - *Smith Br.\* - W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Biv. Sic. Cent. 2.* p. 47. *Flammula ranunculus et F. r. folio serrato* . *Dod. Pempt.* p. 432.

In paludosis . *Ad Ostia...* Perenn. Floret Aprili , Majo . Fl. flavi .

619. SCELERATUS . *L.* Foliis glabris , inferioribus palmato-incisis , petiolatis ; superioribus digitatis , sessilibus : floribus numerosis ; fructibus oblongis .

*R. sceleratus* . *All. Ped.* - *Smith Br.\* - W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *R. sylvestris* 1. *Dod. Pempt.* 426.

In pratis depressis , aquosis frequens . *Alla Caffarella* , etc. Ann. Fl. Majo , Junio . Fl. lutei parvi , numerosi . Semina plurima .

620. REPENS . *L.* Calycibus patulis ; pedunculis sulcatis ; foliis ternatis , sub-trifidis , incisis ; sarmentis repentibus .

*R. repens* . *All. Ped.* - *Smith Br.\* - W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *R. hortensis primus* . *Dod. Pempt.* 425.

In pascuis humidis , locis aquosis vulgatissimus . Perenn. Floret Majo-Julio . Fl. aurei .

Varietas flore pleno in hortis culta nomine : *Botton d'oro* .

621. BULBOSUS . *L.* Calycibus retroflexis ; pedunculis sulcatis : caule erecto , multifloro ; foliis decompositis : radice bulbosa . *DC. Syn.*

*R. bulbosus* . *All. Ped.* - *Smith Br.\* - W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Lob. ic. 666.* *R. tertia species* . *Fuchs. H.* 160.

In pratis , pascuis , viis vulgatissimus . Perenn. Floret Martio-Junio . Fl. flavi .

622. PHILONOTIS . *Retz.* Calycibus demum reflexis , setosis ; pedunculis sulcatis : foliis tripartitis inciso-lobatis , hirsutis : fructu sub-globoso . *Retz.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.*

*R. philonotis* . *DC. Syn.* *R. agrarius* . *All. Auct.* - *Poir. Enc.* *R. hirsutus* . *Ait.* - *Smith Br.\* - Biv. Sic. Cent. 2.* p. 48.

In pascuis praesertim humidis , argillosis frequens . Ann. Floret Aprili-Junio . Fl. flavi .

623. LANUGINOSUS . *L.* Calycibus patulis : pedunculis teretibus : caule petiolisque hirsutis : foliis 3-fidis , lobatis , crenatis , holosericeis . *L.* - *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.*

*R. magnus* valde hirsutus flore luteo . *J. B. H.* 3. p. 417.

apriile 1891  
10-12-1891

6  
apriile 1891  
6 maggio 1891

- In pascais , sylvaticis ; marginibus fossarum communis .  
Perenn. Floret Aprili-Junio . Fl. pallide flavi .  
Ad fossas umbrosas etiam 6-pedalis .
- 624. CHÆROPHYLLOS .** *L.* Calycibus patulis , sub-glabris : foliis bipinnatis ; foliolis alternis laciniatis obtusis : caule eretto , sub-unifloro , villoso : fructibus oblongis .  
*R. chaerophyllos . W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. R. montanus letophyllos asphodeli radice . Col. ecphr. 1. p. 312. t. 311.*
- In montium arvis frequens . *A Frascati nella Villa Mon-dragone copiosamente , presso Albano , etc. Perenn. Flo-ret Aprili . Petala flava , basi intus spurco-lutea .*
- 625. ARVENSIS .** *L.* Seminibus aculeatis : foliis tripartitis , de-compositis , laciniis linearibus .  
*R. arvensis . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. R. sylvestris 3 Dod. Pempt. 427.*
- In collibus , montium arvis . *Presso Civitavecchia , intorno a Tivoli . . . Ann. Floret Majo , Junio . Fl. Intei.*
- Pecoribus , equis omnium perniciosissimus dicitur : acetum veluti specificum contra hujus effectus commendant .
- 626. MURICATUS .** *L.* Seminibus aculeatis : foliis glabris ; tri-lobatis , lobis apice sub-incisis , obtusiusculis : caule diffuso .  
*R. muricatus . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. R. palustris echinatus . J. B. H. 3. p. 858.*
- In aquosis , ad rivulos circa urbem non rarus . . . Ann. Flo-ret Majo . Fl. lutei .
- 627. AQUATILIS .** *L.* Foliis submersis capillaceis ; emersis 3-vel 5-lobis , reniformibus : petalis obovatis : seminibus transverse striatis .  
*R. aquatilis . Smith Br.\* - DC. Syn.*
- a.** *L. - Smith Br. - W. Sp.* Foliis emersis 3-5lobis reniformibus .  
*R. heterophyllus . Hoffm. - Roth. R. aquatilis . Lois. G. - Dod. Pempt. 587.*
- b.** Foliis omnibus capillaceis , laciniis divergentibus  
*R. aquatilis . Hoffm. - Roth. R. aquatilis γ. L. - W. Sp. R. ca-pillacens . Thuil. Par. - Lois. G. - Pers. E. R. aquaticus albus foeniculi folio . Barr. c. 566.*
- γ.** Foliis omnibus dichotomo-capillaceis , laciniis parallelis longissimis .  
*R. aquatilis δ. L. Smith Br. R. peucedanifolius . All. Ped. 1469-Desf. Atl. 1. - Lois. G. R. fluvialis . Hoffm. - Roth. - W. Sp. - Pers. E. R. sive polyanthemo aquatili albo affinis , etc. J. B. H. 3. p. 774.*
- In aquis stagnantibus α et β intorno Roma , ad Ostia , Fiumicino . . . γ praesertim in aquis fluentibus , rivis circa urbem . Perenn. Floret Aprili , Majo . Fl. albi .**

## (248) ISOPYRUM.

628. THALICTROIDES . L. Foliis bi-tri-ternatis ; stipulis ovatis : petalis obtusis .

I. thalictroides . W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. Helleborus thalictroides . Lam. Enc. - DC. Syn. Thalictrum batrachioites minus , etc. Barr. ic. 480.

In sylvis montanis . Sul Monte Gennaro ... Perenn. Floret Junio . Fl. albi .

## (249) HELLEBORUS .

629. VIRIDIS . L. Caule multifloro folioso : foliis inferioribus pedatis , superioribus digitatis : floribus patentibus .

H. viridis . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 1. p. 159.\* Veratrum nigrum secundum Dod. Pempt 385. - Clus. H. 275.

In montium sylvaticis , communis . Presso Albano , etc. Perenn. Floret Januario , Februario . Fl. virides .

630. FOETIDUS . L. Caule ramoso , multifloro , folioso : foliis pedatis , petalis sub-conniventibus .

H. foetidus . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 1 p. 159.\* Helleboraster maximus , etc. Lob. ic. 679.

In montium sylvaticis vulgaris . Perenn. Floret Februario , Martio . Fl. herbacei , margine purpurascente .

Feb 10.  
1800.

## CLASSIS XIV.

## DIDYNAMIA.

## ORD. GYMNOSPERMIA.

( Labiatae )

## Sect. I. Corolla sub-unilabiata .

- (250) *AJUGA*. *Calix* 5-fidus subaequalis . *Corolla* bilabiata , labio superiore minimo , 2-dentato ; inferiore trilobo , lobo medio magno obcordato .
- (251) *TEUCRIUM*. *Calix* 5-fidus . *Corolla* unilabiata , labio 5-lobo , lobo medio magno . *Stamina* e fissura posticis exerta .

## Sect. II. Corolla bilabiata : calyx quinquefidus .

- (252) *SATUREJA*. *Corollae labium superius* erectum , obtusum , leviter emarginatum ; *inferius* 3-lobum , lobis subaequalibus . *Stamina* distantia .
- (253) *SIDERITIS*. *Calix* 5-fidus , subaequalis , aut bilabiatus . *Corollae labium superius* emarginatum ; *inferius* trilobum lobo intermedio latiore , crenulato . *Stamina* non exerta . *Stigma* brevius involvens alterum .
- (254) *MENTHA*. *Calix* 5-fidus . *Corolla* subaequalis , 4-fida , lacinia superiore latiore , saepius emarginata . *Stamina* erecta distantia .
- (255) *GLECOMA*. *Corollae labium superius* bisidum , *inferius* trisidum , lacinia intermedia majore . *Antherae per paria* in geminam-crucem conniventes .
- (256) *LAMIUM*. *Calix* dentibus 5 aristatis , apice patulis . *Corollae fau<sup>x</sup>* inflata , utrinque dente marginali reflexo ; *labium superius* majus fornicateum , saepe integrum ; *inferius* bilobum . *Antherae hirsutae* .
- (257) *GALEOPSIS*. *Calix* dentibus 5 aristato-sub-spinosis . *Corollae fau<sup>x</sup>* dilatata , utrinque dente marginali ; *labium superius* fornicateum , crenatum ; *inferius* trilobum .
- (258) *BETONICA*. *Calix* dentibus 5 aristatis . *Corollae labium superius* adscendens , planiusculum ; *inferius* trilobum ; *tubus* gracilis , incurpus .
- (259) *STACHYS*. *Corollae labium superius* fornicateum , emarginatum ; *inferius* trilobum , lobis lateralibus reflexis , intermedio majore emarginato . *Stamina* diflora<sup>a</sup> ad latus utrinque reflexa .
- (260) *MARRUBIUM*. *Calix* campanulatus , 5-gonus , 10-striatus , 5-vel 10-dentatus , rigidus . *Corollae labium superius* rectum , lineare , semibifidum .

- (261) *BALLOTA*. *Calix campanulatus*, 5-gonus, 10-striatus, 5-dentatus. *Corollae labium superius crenatum*, concavum; inferius trilobum. *Semina triquetra*.
- (262) *PHLOMIS*. *Calix angulatus*. *Corollae labium superius incumbens*, fornicate, compressum, villosum, sub-bifidum; inferius trilobum.
- Sect. III. *Corolla bilabiata*: *calix bilabiatus*.
- (263) *CLINOPODIUM*. *Calix supra trifidus*, infra bipartitus. *Corollae labium superius erectum*, planum, emarginatum; inferius trifidum. - *Verticilli bracteis setaceis cincti*.
- (264) *ORIGANUM*. *Calix 5-dentatus vel bilabiatus*. *Corollae labium superius erectum*, planum, emarginatum; inferius trifidum, laciniis subaequalibus. - *Flores in capitulis strobiliformibus*, bracteis latis interjectis.
- (265) *THYMUS*. *Calix striatus*, supra ridentatus, infra bifidus, fauce villis clausa. *Corollae labium superius planum*, emarginatum; inferius trilobum.
- (266) *MELISSA*. *Calix supra planus denticulis 3*, infra bifidus, fauce nuda. *Corollae labium superius fornicate* emarginatum; inferius trilobum, lobo medio obcordato.
- (267) *MELITTIS*. *Calix campanulatus*, corollae tubo amplior, ore obliquus, inaequaliter 3-4-fidus. *Corollae labium superius planum*, integrum: inferius 3-lobum. *Antherae cruciatae*.
- (268) *SCUTELLARIA*. *Calix labio utroque integro*, squamula cava sup rius incumbente demum operculatus, clavus. *Corollae tubus elongatus*, adscendens.
- (269) *PRUNELLA*. *Calix 2-labiatus*. *Corolla bilabiata*. Staminum filamenta bifurca, apice altero antherifera. *Stigma bifidum*.
- (270) *PRASIUM*. *Calix campanulatus*, bilabiatus, *Corolla bilabiata*, longior. *Semina 4, baccata*.

## ORD. ANGIOSPERMIA.

- (271) *VERBENA*. *Calix 5-fidus*. *Corolla infundibuliformis*, tubo curvo, limbo sub-bilabiato, 5-fido, inaequali. *Stamina 4 fertilia*. *Textus utricularis nectens semina 4*.
- (272) *VITEX*. *Calix 5-dentatus*. *Corollae limbus sub-bilabiatus*, 5-6-lobus, inaequalis. *Drupa 4-locularis*, 4-sperma.
- (273) *EUPHRASIA*. *Calix cylindricus*, 4-fidus, subaequalis. *Corolla personata*, basi tubulosa, labio inferiore trifido, laciniis obtusis, aut emarginatis. *Antherae basi aristatae*, aut acuminatae. *Capsula 2-locularis*, ovato-oblonga.
- (274) *BARTSIA*. *Calix compresso-turgidus*, brevis, ore bilobus, lobis bidentatis. *Corolla personata*, basi tubulosa,

- labio superiore integro , inferiore trifida . Capsula 2-locularis , ovata , compresso-turgida , acuminata .
- (275) RHINANTHUS . Calix inflatus , compressus , ore coarctato , 4-dentato . Corolla personata , basi tubulosa , labio inferior trifidus . Capsula bilocularis compresso-plana , obtusa , in fundo calycis . Semina alata .
- (276) MELAMPYRUM . Calix 4-fidus . Corolla personata ; labium superius marginè replicato . Capsula 2-locularis , oblonga , oblique acuminata . Semina solitaria , oblonga .
- (277) LINARIA . Calix 5-partitus . Corolla ringens , rictu clauso , palato ad saucem prominulo , basi calcarea . Capsula ovata , bivalvis , apice in lacinulas 4-5 dehiscens .
- (278) ANTIRRHINUM . Calix 5-partitus . Corolla ringens , rictu clauso , palato ad saucem prominulo , nisi gibba , non calcarea . Capsula basi obliqua , valvis , apice foraminulis tibibus dehiscens .
- (279) SCROPHULARIA . Calix 5-fidus . Corolla sub-globosa , limbo coarctato , bilabiato ; labio superiore bilobo , squama intus saepe interjecta ; inferiore breviore , trilobo . Capsula subrotunda , acuminata , bilocularis , dissepiamento dupli .
- (280) DIGITALIS . Calix 5-partitus . Corolla campanulata , ventricosa , limbo oblique quadrilobo , lacinia superiore emarginata , infima majore . Capsula ovata , acuminata , bilocularis .
- (281) ACANTHUS . Calix 4-partitus , sub-bilabiatus , 3-bracteatus . Corolla 1-labiata , labio d'fexo trilobo , tubo villis clauso . Antherae villosae . Stigma bifidum . Capsula ovata , bilocularis .
- (282) LATHRAEA . Calix campanulatus , 4-fidus . Corolla 2-labiata , superius galeata . Germen basi glandula depressa . Capsula 1-locularis .
- (283) OROBANCHE . Calix ex foliis duobus lolatis lateribus . Corolla 2-labata 4-5-loba . Germen basi glandulosum . Capsula 1-locularis .

## DIDYNAMIA GYMNOSPERMIA.

## Sect. I. Corolla sub-unilabiata .

(350) AJUGA .

6. April 1846.  
Pyramidalis

631. REPTANS . L. Caule simplici erecto ; stolonibus reptantibus . Schreb. unilav. - Savt B. Etr. 2. p. 136.

A. reptans . Smith. Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. DC. Syn. Bugula reptans . All. Ped. B. Bod. Pempt. 135. - Regin. t. 75. - Hort. Rom. 3. t. 99.

- In humidis , nemorosis , communis . Offic: *consolida media* .  
 Perenn. Floret Aprili . Fl. azurei , coerulei , carnei .
632. CHAMÆPITYS . Schreb. unil. Caule diffuso ; foliis trifidis : floribus solitariis axillaribus , folio brevioribus . Schreb. l. c. - W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 135.\*  
*Tenerium chamaepitys* . L. - Lois. G. *Bugula chamaepitys* .  
*Scop. Carn.* - *All. Ped.* Chamepitys prima . Dod. Pempt. 46.  
*Ch. vulgaris* folio trifido . Hort. Rom. 3. t. 97.
- In sterilibus arvis , saxosis communis . Offic. *Iva artetica* .  
 Ann. Floret Majo . Fl. lutei .
633. IVA . Schreb. unil. Foliis spathulato-linearibus , paucidentatis ; floribus axillaribus , solitariis , sessilibus .  
*A. iva* . W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 1. p. 160.\*  
*Teuerium iva* . L. - *All. Ped.* - Lois. G. Chamaepitys spuria prior . Dod. Pempt. 47.
- In aridis montium . *A Tivoli presso S. Antonio* .... Ann.  
 Floret Junio . Fl. rubri .
- (251) THUCRIUM .
634. FRUTICANS . L. Foliis lanceolatis , integerrimis , subtus niveis ; floribus solitariis . Schreb. unil. - W. Sp. - Pers. E. - Savi B. Etr. 1. p. 160.
- T. fruticans . Lois. G. - DC. Syn. T. fruticans boeticum .  
*J. B. H.* 3. p. 291. - Dill. Elth. t. 284. T. caesio et amplioris marini flore . Barr. ic. 512.
- In rupibus maritimis . *Intorno Cicitavecchia , sul Circello* ....  
 Frutic. Floret Martio-Majo . Fl. coerulei .
635. SCORODONIA . L. Foliis cordatis , crenatis , sub-pubescentibus , petiolatis ; racemis secundis axillaribus , terminalibusque : caule erecto , herbaceo .
- T. scorodonia . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 161.\* *Scorodonia salviae* fo iis , etc. Hort. Rom. 3. t. 95. *Salvia agrestis* , seu sphacelus . Dod. Pempt 289.
- In sylvaticis montium . *Sul Tusculo , presso Genzano* ... Perenn. Floret Junio , Julio . Flores ochroleuci tubo et antheris rubicundis .
636. SCORDIUM . L. Foliis ovato-oblongis , sessilibus , dentatis : floribus axillaribus pedunculatis , subgeminis , caule diffuso , pubescente .
- T. scordium . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 136.\* *Scordium* .  
 Dod. Pempt. 126. - *J. B. H.* p. 292.
- In pratis depressis frequens . Perenn. Floret Julio , Augusto . Fl. rubri , vel coeruleo-antes .
637. CHAMÆDRYS . L. Foliis ovatis , inciso-crenatis , basi cuneatis : floribus axillaribus , sub-ternis : caulinibus superciliamentibus , villosis .
- T. chamaedrys . All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. -

70.

Giugno 1871

id 1872

1. luglio  
1871

1872

1872

*Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 137. Chamaedrys major et minor repens. Dod. Pempt. 43. - Hort. Rom. 3. t. 88.*

In aggeribus, pascuis commune. Vulgo : *cerquignola*. Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. rubri.

638. **FLAVUM.** *L.* Foliis ovatis, crenatis, petiolatis; floralibus integerrimis, acutis, concavis : verticillis sexfloris; caule fruticoso pubescente.

*T. flavum. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 138.\* Chamaedrys assurgens. Dod. Pempt. 44. Ch. frutescens. Hort. Rom. 3. t. 89.*

, In muris veteribus vulgare. *Sul Colosseo, etc.* Frutic. Floret Majo, Junio. Fl. luteoli.

639. **POLIUM.** *L.* Capitulis subrotundis, breviter pedunculatis; foliis oblongo-obtusis, crenatis, margine revolutis, tomentosis: caule basi prostrato, suffrutescente.

*T. polium. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 138. Polium montanum. Lob. ic. 486. P. montanum album serratum latifolium supinum majus. Barr. ic. 1074.*

In siccis, collinis etiam prope urbem. Offic: *polio montano*. Perenn. Floret Julio. Fl. albi.

*Sect. II. Corolla bilabiata: calix 5-fidus.*

(252) **SATUREJA.**

640. **GRÆCA.** *L.* Calyce 10-striato, hispido, fructifero villis clauso: foliis ovato-lanceolatis hispidulis, subtus venosis: pedunculis axillaribus 3-6-floris, subgeminis; bracteolis minimis.

*S. graeca. All. Ped. - W. Sp.\* - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Clinopodium minus exoticum, thymi folio majore, inodorum. Pluk. Alm. 110. t. 84 f. 8. (mediocr.). Calamintha frutescens saturejae folio, facie, et odore. Hort. Rom. 3. t. 64. (bona).*

Super urbis moenia, muros siccios vulgaris. *Sulla Cupola di S. Pietro, sul Colosseo, etc.* Perenn. Floret Majo, Junio. Fl. purpurascentes.

Corollae tubus extus villosus, faux inferius alba punctis 2-3 purpureis.

(253) **SIDERITIS.**

641. **ROMANA.** *L.* Herbacea, ebracteata: calycibus spinosis, labio superiore ovato, corolla minoribus: foliis spathulatis, apice crenatis.

*S. romana. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 141.\* S. genus verticillis spinosis. J. B. H. 3. p. 428.*

In siccioribus, ad vias vulgaris. Ann. Floret Majo, Junio. Fl. albi.

642. **MONTANA.** *L.* Herbacea, ebracteata: calycibus spinosis,

1. luglio  
1801

labio superiore trifido, corolla majoribus : foliis oblongo-spathulatis apice dentatis.

S. montana . W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. S. montana parvo flore nigro purpureo, etc. Col. ephr. 198. t. 196.

In subapenninis elatioribus. Ann. Floret Julio. Flores eroci, in margine purpureo-ferruginei.

643. SYRIACA. L. Suffruticosa, tomentoso-lanata : foliis lanceolatis sub-integerrimis : floribus verticillato-spicatis ; bracteis caudato-acutis tomentosis. W. Sp. - Pers. E.

S. cretica tomentosa candidissima flore luteo. Tourn. coll. 12. - Hort. Rom. 3. t. 40.

In montibus sub-apenninis frequens. Presso Rio-fredo, etc. Perenn. Floret Junio. Fl. lutei.

(254) MENTHA .

644. SYLVESTRIS. L. Spicis oblongis, sub-continnis : staminibus corolla longioribus : foliis oblongo-ovatis, argute inaequaliter serratis, sessilibus, tomentosis : bracteis subulatis.

M. sylvestris . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Menthastrum . Fuchs. H. 292. - Dod. Pempt. 96.

In humidis, pratis depressis communis. Vulgo : *mentastro*. Perenn. Floret Julio, Augusto. Fl. dilute purpurei.

Foliorum figura, tomento et colore admodum variat. Rami saepe divaricati.

645. ROTUNDIFOLIA. L. Spicis oblongis, interruptis : foliis ellipticis, rugosis, crenatis, sessilibus, subtus villosis ; bracteis lanceolatis.

M. rotundifolia . All. Ped. - W. Sp. - Smith Br.\* - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Menthastrum folio rugoso rotundiore, etc. J. B. H. 3. p. 219.

In pratis depressis, ad Tyberim, fossas communis. Vulgo : *mentone*. Perenn. Floret Julio, Augusto. Fl. albo-purpurascentes.

Variat foliis plus minusve rotundatis.

646. VIRIDIS. L. Spicis interruptis, acutis : staminibus exercitis : pedicellis glabris : foliis lanceolatis, serratis, sessilibus, nudis.

M. viridis . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. M. hortensis tertia, et quarta . Dod. Pempt. 95.

In humidioribus, seclus vias non infrequens, in hortis culta, vulgo : *menta romana*. Perenn. Floret Augusto. Fl. purpurascentes.

647. HIRSUTA . Tr. of Linn. Soc. v. 5. Floribus capitatis verticillatisve, foliis petiolatis subsessilibusve, ovatis,

1. ago  
1801  
15 luglio 1801

*serratis, pubescentibus: calyce hirsuto; pedicellis retrorsum hispidis.*

*M. hirsuta. Smith Br.\* (excl. syn. *M. sativae* L. etc.) - DC. Syn. *M. aquatica*. Pers. E. *M. aquatica* et *M. hirsuta*. L. - All. Ped. - W. Sp. - Lois. G.*

*In aquosis minus frequens. Presso la sponda del Tevere fuori di Po ta del Popolo . . . Perenn. Floret Julio, Augusto. Fl. purpurascentes. - Odor camphoratus.*

*1. Ago  
1871*  
**648. PULEGUM.** *L. Floribus verticillatis, calyce villis clauso: foliis ovatis, obtusis, sub-crenatis: caulis repentibus.*

*M. pulegium. All. Ped. - Smith. Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. *Pulegium Fuchs.* H. 19. - J. B. H. 3. p. 256. *M. aquatica* sive *Pulegium vulgare*. Hort. Rom. 3. t. 49.*

*In humidis, ad Tyberis ripas frequens. Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. purpurascentes, staminibus exertis.*

*90.  
Aprile 1871*  
**(255) GLECOMA.**

*649. HEDERACEA. L. Foliis petiolatis, cordato-reniformibus, crenatis: verticillis dimidiatis.*

*Gl. hederacea. All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 142.*

*In umbrosis, ad sepes circa urbem, et in montosis. A Villa Pamphilii copiosamente, etc. Vulgo: edera terrestre. Perenn. Floret Aprili. Fl. purpureo-violacei.*

*1.  
Aprile 1871.*  
**(256) LAMIUM.**

*650. ORVALA. L. Corollae labio superiore dentato, fance dilatata; foliis cordatis inaequaliter dentatis; caule laevi.*

*L. orvala. All. Ped.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. L. pannonicum. Scop. Carn. t. 27. Galeopsis maxima pannonica. Clus. H. 2. p. 35. L. montanum saxatile ferme glabrum, etc. Till. Pis. t. 34. f. 1.*

*In montanis sylvis. Sul Monte Genna o . . . Perenn. Floret Junio. Fl. purpurei, antheris villosi.*

*651. LÆVIGATUM. L. Foliis cordatis, rugosis, serratis, petiolatis: caule sub-laevi: calycibus glabris longitudine tubi corollae; verticillis sub-6-floris. DC. Syn.*

*L. laevigatum. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. L. subrotundo rugoso folio, flore rubro. Bocc. mus. 2. t. 23. Hort. Rom. 3. t. 34.*

*In viis, ad sepes ubique. Perenn. Floret Martio-Junio. Fl. purpurascentes.*

*Corolla labio inferiore patente, nec lobis reflexis parallelis. W. L. c.*

*652. MACULATUM. L. Foliis cordatis acuminatis, serratis, petiolatis: verticillis 10-floris. DC. Syn.*

*L. maculatum. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. L.*

*1.  
Aprile 1871.  
S. 18 1871*

Plinii montanum Campoclaresium . Col. ecphr. 1. p. 190.  
t. 185.

In umbrosis sylvaticis , ad sepes commune . Perenn. Floret Aprili-Junio . Fl. purpurei .

Folia saepe linea longitudinali alba superius notata . Corolla intensius purpurea quam in praecedente , fauce utrinque dentibus binis , superiore setaceo : labium superius denticulatum , inferius lobis lateralibus deflexis . - Odor saepe moschatus .

653. ALBUM . L. Foliis cordatis , acuminatis , serratis , petiolatis , verticillis 20-floris . L. - All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn.

Galeopsis . Camer. Epit. 865. - Rivin. t. 62.

In umbrosis , ad sepes haud infrequens . Vulgo , cum binis praecedentibus : Urtica morta . Perenn. Floret Majo . Fl. albi vel carnei .

654. BIFIDUM . Cyr. Rar. Fasc. 1. p. 22. t. 7. ( opt. ) . Corollae galea bifida , laciniis divaricatis , foliis petiolatis , cordatis , inciso-crenatis .

L. bifidum . W. Sp. - Pers. E. - Savi B. Etr. 2. p. 144.\* L. parvum flore albo , cum labio superiori bifido . Till. Pis. 93.

In umbrosis herbidis , ad sepes frequens . Ann. Floret Martio . Fl. albi .

Folia ut plurimum linea longitudinali argentea superius notata .

655. PURPUREUM . L. Corollae galea obtusa , sub-emarginata ; calycibus aristatis : foliis cordatis , obtusis , crenatis , petiolatis ; supremis confertis , acutiusculis . Savi B. Etr. 2. p. 143.\*

L. purpureum . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Urtica iners altera . Dod. Pempt. 163.

In umbrosis , ad sepes vulgare . Ann. Floret Martio , Aprili . Fl. albido-purpurascentes . - Folia pallida .

656. AMPLEXICAULE . L. Corollae galea obtusa , integra ; foliis sessilibus rotundatis , crenato-incisis ; infimis petiolatis , cordatis , lobatis .

L. amplexicaule . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 144.\* L. folio caulem ambiente . Lob. ic. 463.

In vineis , cultis , ruderatis commune . Ann. Floret Martio , Aprili . Fl. pulchre purpurei .

(257) GALEOPSIS .

657. LADANUM . L. Calycibus pubescentibus , dentibus subulato-spinulosis , patulis ; verticillis remotis , caule pubescente geniculis vix incrassatis ; foliis lanceolatis , sub-serratis .

G. ladanum . All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois.

1. Ago 1871

Vertic. dimidiat  
v. Ballota de

20

Marto 1871

April 1871  
7. Magg. 1871

4.  
April 1871

G. - DC. Syn. Ladanum segetum flore rubro . J. B. H. 3.  
p. 839.

In montium messibus , et in urbe ad Tyberim . A ripetta .... Ann. Floret Julio , Augusto . Fl. rosei .

(258) BETONICA .

658. OFFICINALIS . L. Spica interrupta ; corollae galea integra ; labii inferioris lacinia intermedia emarginata ; calycibus glabriuseulis ; foliis cordato-oblongis , crenatis . Savi B. Etr. 2. p. 146.

B. officinalis . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E.-Lois G. - DC. Syn. B. Dod. Pempt. 40.

In sylvaticis prope urbem , et in montosis communis . Off betonica . Perenn. Floret Julio , Fl. rubelli .

(259) STACHYS .

659. SYLVATICA . L. Verticillis 6-8-floris : foliis cordato-ovatis , acutis , serratis , petiolatis : caule erecto , hirto .

St. sylvatica . All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E.-Lois G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 146. Galeopsis legitima . Clus. H. 2. p. 85. G procerior foetida spicata . Hort. Rom. 3. t. 59.

In umbrosis sylvaticis , ad sepes vulgaris circa urbem . Perenn. Floret Majo , Junio . Fl. sanguinci .

660. PALUSTRIS . L. Verticillis sub-8-floris : foliis oblong-lanceolatis , serratis , semi-amplexicaulibus ; caule erecto , hirto .

St. palustris . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E.-Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 147. St. aquatica . Tabern. ic. 577.

Ad ripas Tyberis , et ad fossas circa Romanam frequens . Perenn. Floret Julio . Fl. purpurei inferiore labio variegato .

661. GERMANICA . L. Verticillis multifloris , densissime villosis , sub-spicatis : foliis tomentosis , cordato-oblongis , crenatis , petiolatis ; superioribus lanceolato-oblongis sub-serratis , sessilibus : caule lanato .

St. germanica . All. Fed. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E.-Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 150. St. montana . Riv. monop. t. 27. St. alba latifolia major . Barr. ic. 297.

In aggeribus viarum , et ad oras nemorum frequens . A Tor di Quinto , Ponte Salara , Prata-lata , presso la grotta di Igeria , etc. Perenn. Floret Junio , Julio . Corolla purpurea labio superiore villosissimo .

Caulis saepe basi ramosus , superne densius albo-villosus : folia tomenti densitate varia , alblicantia .

662. MARITIMA . L. Verticillis sub-6-floris : foliis tomentosis , radicalibus petiolatis ellipticis crenatis , floralibus oblongis , integerrimis : corollis calyce mutico duplo longioribus .

St. maritima . W. Sp.: - Pers. E.-Lois. G. - DC. Syn. B. toni-

10.

Giugno 1671.

*ea heraclea latifolia Dioscoridis. Bocc. mus. 2. p. 164.  
t. 127.*

In arena maritima . Presso Civitavecchia . Perenn. Floret Junio . Fl. lutei .

663. *HIRTA* . *L.* Verticillis 6-floris : corollae galea divaricato-bifida : foliis cordatis , crenatis ; inferioribus obtusis , petiolatis ; floralibus apice spinescentibus .

*St. hirta. All. Ped. 113. t. 2.f. 3.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2.p. 148.\* Ocymum valentinum. Clus. H. 2. p. 42.*

In sylvaticis collibus circa urbem frequens . *Copiosamente sul Monte Mario ... Perenn. Floret Majo, Junio . Corolla alba , labio inferiore lateolo punctis purpureis .*

Caulis adscendens vel erectus . Calyces spinalosii .

664. *RECTA* . *L.* Verticillis 6-floris , sub-spicatis : foliis crenatis ; inferioribus ellipticis , lanceolatis , obtusis , in petiolum attenuatis ; superioribus oblongis , acutiusculis : caule adscendente .

*St. recta. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Savi B. Etr. 2. p. 149. St. sideritis. Vill. Dauph. - DC. Syn. Sideritis hirsuta vulgaris. J. B. H. 3. p. 425. ( male ) . - Riv. t. 70.*

In montium sterilibus , ad vias . *Intorno Palombara , etc. Perenn. Floret Julio-Septembri . Fl. flavescentes , lineolis rufis .*

Folia forma varia ; margine dentata , serrata , vel crenata ; suprema floralia sub-integerrima .

665. *ARVENSIS* . *L.* Verticillis 6-floris ; calycibus corollam subaequantibus ; foliis ovatis obtusis , cordatis , crenatis ; caule debili piloso .

*St. arvensis. All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 147. St. arvensis minima. Riv. Mon. irr. t. 27. f. 2.*

In arvis sterilissimis . *A Bravetta verso il Pigneto di Bichi . Ann. Floret Aprili , Majo . Corolla carnea , calix rufescens .*

(260) **MARRUBIUM** .

666. *PEREGRINUM* . *L.* Calycibus 5-dentatis , dentibus subulatis ; foliis incano-tomentosis , rugosō-venosis , ellipticis , dentatis , dentibus apicem versus majoribus .

*M. peregrinum. W. Sp. - Pers. E. M. alterum pannonicum. Clus. H. 2. p. 34.*

In montium sicciорibus , ad vias . *A Santa Polo , sui Cimi... Perenn. Floret Augusto. Fl. albi .*

Pro sequente in officinis nostris sumitur . Odore magis aromatico gaudet .

667. *VULGARE* . *L.* Calycibus 10-dentatis , dentibus setaceis ,

1. luglio  
1891

uncinatis , foliis ovato - subrotundis , rugoso - venosis , crenatis .

*M. vulgare* . *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Savi B. Etr. 2. p. 152.* *M. album* . *Lob. ic. 517.* - *Hort. Rom. 3. t. 59.*

In siccis praesertim montium , ad vias frequens . Off. *Marrubio bianco* . Perenn. Floret Junio , Julio . Fl. albi .

(261) *BALLOTA* .

668. *NIGRA* . *L. Sp. ed. 1.* Foliis ovatis , sub - cordatis , aequilater serratis .

*B. nigra* , *Huds.* - *Smith Br.* - *Lois. G.* *B. foetida* . *Lam. Fl. Fr.* - *DC. Syn.*

*a.* Flore purpureo ; foliis sub - cordatis .

*B. nigra* . *L. Sp. ed. 2.* - *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* *Marrubium nigrum foetidum* , *C. B. P. 230.* *Ballote* . *Tourn. Inst. 185. t. 85. f. 3.* - *Vaill. Par. 20.* *B. Dioscoridis* . *Hort. Rom. 3. t. 35.*

*b.* Flore albo ; foliis sub - ovatis : verticillis paucifloris .

*B. alba* . *L. Sp. ed. 2.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* *Ballote flore albo* . *Tourn. Inst. 185.* - *Vaill. Par. 20.* - *Hort. Rom. 3. t. 36.*

Ad sepes , vias vulgaris ; varietas  $\beta$  fra il Colosseo e l'Arco di Costantino .... Perenn. Floret Junio - aestate .

Dentes calycini in utraque varietate acuminati , in  $\beta$  majores , magis patentes .

(262) *PHLOMIS* .

669. *HERBA-VENTI* . *L.* Foliis ovato-lanceolatis , serratis , subtus hirtis ; calycinis dentibus lanceolato-subulatis , erectis : bracteis subulatis cauleque hirtis . *DC. Syn.*

*Ph. herba-venti* . *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *Herba venti monspeliensis* . *J. B. H. 3. p. 854.* *Ph. narbonensis* hormini folio , etc. *Hort. Rom. 3. t. 17.*

In subapenninis montibus ad margines haud infrequens . Perenn. Floret Junio , Julio . Fl. purpurascentes .

*Sect. III. Corolla bilabiata : calyx bilabiatus* .

(263) *CLINOPODIUM* .

670. *VULGARE* . *L.* Caule simplici : foliis ovato-lanceolatis , subdentatis villosis : floribus verticillatis , sub - capitatis : bracteis setaceis , hispidis .

*Cl. vulgare* . *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr. 2. p. 154.* \* *Cl. origano simile* . *Hort. Rom. 3. t. 65.*

In viis sylvaticis , ad oras nemorum vulgatum . Perenn. Floret tota aestate . Corella intense rosea .

(264) *ORIGANUM* .

671. *VULGARE* . *L.* Capitulis paniculatis glomeratis , subrotundis ; calycibus fauce pilosis : bracteis ovatis coloratis ealyce longioribus : foliis ovatis .

*Foliis cordatis*

- O. vulgare.** *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 155. *O. sylvestre* sive *vulgaris*. *Dod. Pempt.* 284. - *Fachs. H.* 552. - *Rivin. t.* 60. *O. sylvestre* cunila *bubula* *Plinii*. *Hort. Rom.* 3. t. 75.  
**In collibus, arvis siccis, sylvaticis commune.** Vulgo: *regalo*. Perenn. Floret Julio. Fl. purpurascentes.

## (265) THYMUS.

- 672. SERPILLUM.** *L.* Floribus capitatis: foliis planis ovatis, obtusis, basi ciliatis: caulibus decumbentibus. *Smith Br.*\*  
*Th. serpillum.* *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 155. *Serpillum vulgare*. *Dod. Pempt.* 276. - *Vaill. Par.* t. 32. f. 7, 8, 9. - *Hort. Rom.* 3. t. 69.

*In apriis siccioribus, ad oras nemorum communis.* In *Villa Medici*, *Villa Pamfili*, *Borghese*, etc. Vulgo: *serpollo*. Perenn. Floret Aprili, Majo. Fl. purpurascentes.

- 673. ACINOS.** *L.* Verticillis 6-floris, pedunculis simplicibus: corollis calyce gibboso duplo longioribus: foliis ovato-acutis antice serratis: caule adscendente basi ramoso.

*Th. acinos.* *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Biv. Sic. Cent.* 2. p. 65. - *Savi Bot. Etr.* 2. p. 156. *Calamintha arvensis*. *Savi Pis.* 2. p. 62. *Acinos vulgaris*. *Pers. E.* A. multis. *J. B. H.* 3. p. 259.

- 674. Lois. G.** Major, hirsuto-villosus: caule ramosissimo; foliis ovatis, corollis calyce duplo longioribus.

*A. villosus*. *Pers. E.*

*In montium siccis, arenosis, saxosis. Sul Monte Cavi, etc.*  
*presso Tivoli, Palombara, Santo-Polo in gran copia.*

*Ann. Floret Junio, Julio. Fl. sub-violacei.*

- 674. CALAMINTHA.** *Smith Br.* Pedunculis multifloris, dichotomis, verticillatum dispositis: villis calycinis inclusis; foliis ovatis obtusis, serratis, sub-hirsutis. *Savi B. Etr.* 2. p. 157.

*Th. calamintha.* *W. En. Hort. Ber.* - *DC. Syn.* *Melissa calamintha.* *L.* - *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *Calamintha.* *Dod. Pempt.* 98.

*In montibus ad vias vulgaris. Ad Albano, Frascati, Tivoli, etc.* Perenn. Floret Julio, Augusto. Fl. purpureo-violacci.

*Calycis dentes bini inferiores longiores, ciliati. Odor gratus.*

- 675. NEPETA.** *Smith Br.* Pedunculis multifloris, dichotomis, verticillatum dispositis: villis calycinis prominentibus, foliis ovato-obtusis, crenatis, sub-hirsutis. *Savi B. Etr.* 2. p. 157.

*Th. nepeta.* *W. En. H. Ber.* - *DC. Syn.* *Melissa nepeta.* *L.* - *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *Pulegium sylvestre*? *s. Calamintha altera.* *Dod. Pempt.* 98.

In siccis, viis ubique. Vulgo: *mentuccia*. Perenn. Floret aestate tota. Fl. albi, sub-carni.

**Calycis dentes bini inferiores reliquis parum longiores.**

Odor acris Pulegii.

(266) MELISSA.

1. Ago  
1891  
15. Luglio 1891

676. OFFICINALIS. L. Verticillis dimidiatis, subsessilibus: foliis ovato-sub-cordatis, acutis, crenatis, pilosis.

M. officinalis. All. Ped. - W. Sp. - Lois. G. - DC. Syn. M. officinalis. Pers. E. M. vulgaris odore citri. J. B. H. 3. p. 232.

2. Hirsuta; foliis cordatis ovatisque, ramis ex axillis floriferis.

M. cordifolia. Pers. E.

In sylvaticis, ad sepes ubique frequens,  $\beta$  praesertim (quae tota robustior). Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. albi.

(267) MELITTIS.

7. Maggio 1891  
4. Agosto 1891

677. MELISSOPHYLLUM. L. Calyce piloso trilobo; lobo superiore majore integro vel bidentato: foliis oppositis.

M. melissophyllum. All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Saci B. Etr. 2. p. 158. Melissa humilis latifolia. Hort. Rom. 3. t. 63. Herba sacra quorundam. Dalech. H. 1336.

In umbrosis montium abunde. Presso Albano, Rocca di Papa, etc. Perenn. Floret Majo-Julio. Fl. albi, carni sanguineo maculati.

(268) SCUTELLARIA.

678. MINOR. L. Foliis ovato-lanceolatis, basi cordatis, hastatisve, sub-integerrimis: floribus axillaribus geminis secundis.

Sc. minor. All. Ped. 144.\* - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Cassida palustris minima flore purpurascente. Raii Syn. 244.

Ad Tyberis ripas. Ad Acqua acetosa, Ponte Molle, etc. Perenn. Floret Julio. Fl. rubiundi.

Folia margine integerrima, nec crenata; inferiora saepe basi utrinque unidentata.

679. COLUMNE. All. Ped. 145. t. 84. f. 2.\* Foliis pubescentibus cordatis, obtuse serratis: racemis elongatis, secundis; floribus internodio longioribus.

Sc. Columnae. W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Biy. Sic. Cent. 2 p. 51. Cassida. Col. ephr. 1 p. 187. t. 189.

In sylvaticis, umbrosis montium communis. Perenn. Floret Junio-Julio. Fl. coeruleo-violacei.

(269) PRUNELLA.

11. Siugno 1891  
1891

680. VULGARIS. L. Caule adscendente; foliis petiolatis, ova-to-oblängis, basi sub-dentatis: calycis labio superior dilatato, truncato, trisetoso.

Siugno 1891  
1891

*P. vulgaris*. *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.*\* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 159. *Brunella vulgaris*. *DC.* *Syn.* *B. major* folio non dissecto. *Hort. Rom.* 3. t. 52. *B. Dod. Pempt.* 156. - *Rivin.* t. 29.

In aggeribus, sylvaticis vulgaris. Perenn. Floret Aprili-Julio. Fl. violacei.

681. *LACINIATA*. *L.* Foliis petiolatis, ovato-oblongis; superioribus lanceolatis, dentatis pinnatifidisque: calycis labio superiore trilobo, lobis brevissimis obtusis mucronatis. *DC. Syn.* (sub *Brunella*).

*P. laciñata*. *All. Ped.* - *Pers. E.* - *Lois. G. P.* grandiflora *g.* *W. Sp.* *Brunellae altera icon.* *Dod. Pempt.* 156. *B. folio laciniato*. *Rivin.* t. 30. - *Hort. Rom.* 3. t. 31.

In sylvaticis communis. Perenn. Floret Junio, Julio; Fl. albidii.

(270) *PRASIUM*.

682. *MAJUS*. *L.* Foliis ovato-oblongis, serratis. *L.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Savi B. Etr.* 1. p. 164.\*

*Pr. majus*. *H. Rom.* 3. t. 37. *Teucrium fruticans* albo et ampio flore italicum. *Barr. ic.* 895.

In vetustis muris, rupibus maritimis. *Copiosamente sul Sepolcro di Cecilia Metella, sul Colosseo, intorno al Porto di Trajano, etc.* Frutic. Floret Janio. Fl. albi.

Folia apice cuspidata, suprema integerrima.

DIDYNAMIA ANGIOSPERMIA.

(271) *VERBENA*.

683. *OFFICINALIS*. *L.* Spicis filiformibus paniculatis; foliis lyrate-pinnatifidis, incisis; caule erecto. *Savi B. Etr.* 2. p. 161. *V. officinalis*. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *V. communis* coeruleo flore. *Hort. Rom.* 3. t. 56. Verbenaca recta. *Dod. Pempt.* 150.

In pascuis, viis ubique. Vulgo: *vermena*, erba di S. Giovanni. Perenn. Floret aestate. Fl. purpureo-coerulei.

(272) *VITEX*.

684. *AGNUS-CASTUS*. *L.* Foliis digitatis, septenatis quinatis, foliolis lanceolatis sub-integerrimis; spicis verticillatis, paniculatis. *DC. Syn.*

*V. agnus-castus*. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Savi Tr. d. alb.* 1. p. 255. *Agnus castus officinarum*, *Zob. ic.* 2. p. 133. *V. Dodon.* *Pempt.* 774.

In paludosis maritimis. A Terracina, presso Ostia, Civitavecchia... Arb. Floret Julio. Fl. purpurei, sub-eovalei, vel albi.

(273) *EUPHRASIA*.

685. *PRATENSIS*. *Noh.* Viscoso-pubescenti; caule erecto simplici; foliis lanceolatis, acuminatis, serratis; superiori-

*bus alternis : floribus axillaribus , solitariis , laxe spicatis : antheris hirsutis .*

**Bartsia viscosa .** L. - All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Rhinanthus viscosa. Enc. Savi Bot. Etr. 1. p. 165.\* R. maxima . Desf. Fl. Atl. Pedicularis lutea viscosa serrata pratensis . Tourn. Inst. 172. Alectorolophos Italica luteo-pallida . Barr. ic. 665.

**In maritimis , collibus pratisque aridis circa urbem frequens .** A Villa Borghese nel Circo , al Pigneto-Sacchetti , Ostia , etc. Ann. Floret Majo , Junio . Fl. flavi .

**Calix et fructus omnino Euphrasiae .** Antherae in hac uti et in pluribus hujusce generis acuminatae , non aristatae . - Caulis quandoque superne ramosus .

**686. LATIFOLIA .** L. Caule erecto sub-simplici : foliis margine revolutis ovatis dentatis ; floralibus palmato-incisis : floribus spicatis ; labii inferioris corollae laciniis obtusis .

**E. latifolia .** All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Saci B. Etr. 2. p. 162. E. tertia latifolia pratensis . Col. ecphr. 200. t. 202. f. 2. E. vulgaris latifolia atro-purpurea . Barr. ic. 276. f. 3.

**In pascauis , pratis circa urbem vulgatissima .** Ann. Floret Martio , Aprili . Fl. purpurei , vel albi .

**687. OFFICINALIS .** L. Caule erecto , sub-ramoso ; foliis ovatis , argute dentatis ; laciniis labii inferioris corollae emarginatis .

**E. officinalis .** All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Saci B. Etr. 2. p. 162.\*

**In montosis pascauis .** Sul Monte Gennaro .... Ann. Floret Junio . Fl. albi .

**688. ODONTITES .** L. Foliis lanceolatis , serratis ; racemis spiciformibus laxifloris ; bracteis flore longioribus . Bertol. Opusc. Scient. Bol. Fusc. 3. p. 153. ( sub Bartsia Odontide ).\*

**E. odontites β verna .** W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. E. verna . Bellard. App. ad Fl. Ped. - DC. Fl. Fr. 6. Bartsia odontites . Smith Br. B. verna . Bertol. Rar. It. Pl. D. 3. p. 28.\* Euphrasia altera . Dod. Pempt. 55. - Lob. ic. 496.

**In montium sylvaticis .** Intorno a Castel Gandolfo , nei castagneti di Monte Compatri ... Ann. Floret Majo ad medium aestatem . Fl. purpurascentes . - Sequente major .

**689. SEROTINA .** Lam. Fl. Fr. 2. Foliis lanceolatis , serratis ; racemis spiciformibus densifloris ; bracteis flore brevioribus . Bertol. Opusc. Scient. Bol. Fusc. 3. p. 153. ( sub Bartsia serotina ).\*

**E. odontites β .** L. E odontites . Saci B. Etr. 2. p. 163. et pluri. auct. E. sylvestris major purpurea . Col. ecphr. 1. p. 202. - Barr. ic. 276. f. 2. ( utr. haud bene ).

15 agò 1801.

In campis, arvis vulgaris. Ann. Floret Septembri, Octobri. Fl. purpurascentes.

Folia valde minora, et angustiora quam in praecedente: bractae flore minores vel subaequales.

690. LUTEA. L. Foliis linearibus serratis; floralibus integerimis, racemis spiciformibus subsecundis; calycibus pubescentibus: corollae labio inferiore lacinias lateralibus denticulatis.

E. lutea. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.*  
E. lutea montana angustifolia major altera. *Col. ecphr. 1.*  
*p. 204. t. 203.* E. pratensis lutea. *Moris. H. 3.* p. 432.  
*t. 24. f. 16.*

In aridis collinis circa urbem et in montanis. *Alla Valle dell' Inferno*, etc. Ann. Floret Septembri. Fl. lutei.

(274) BARTSIA.

691. VERSICOLOR. DC. Syn. Pubescens: caule sub-simplici; foliis oppositis linear-lanceolatis, profunde obtuse dentatis; bracteis conformibus basique ampliatis: spica terminali brevi, floribus confertis.

B. versicolor. *Pers. E.* Rhinanthus versicolor. *Desf. Atl.* - *W. Sp.* - *Savi B. Etr. 1. p. 166.*\* Rh. versicolor  $\beta$ . *Lam. Enc.* Alectorolophos italica versicolor, spicata. *Barr. ic. 666.*

In collibus circa urbem frequens. *Alla Passeggiata del Pincio*, al *Pigneto-Sacchetti*, etc. Ann. Floret Majo, Junio. Fl. albo roseo que variegati, labio inferiore flavescente.

692. MAXIMA. DC. Syn. Pubescens: caule ramoso; foliis oblongo-lanceolatis, remote grosse dentatis; superioribus alternis; bracteis ovato-acuminatis sub-integris; spicis terminalibus, elongatis, tetragonis; floribus imbricatis.

B. maxima. *Pers. E.* Rhinanthus maximus. *W. Sp.* - *Lois. G.* Rh. versicolor  $\alpha$ . *Lam. Enc.* Bellardia Trixago. *All. Ped. n. 200.* (excl. syn.). Trixago altius serratis foliis. *Barr. ic. 774. n. 2.*

In arvis sterilibus a meridie et ab occidente urbis frequens. *Sulla Via Appia alla Selce, Fioranello*; sui colli di Ponte Galera, etc. Ann. Floret Junio. Fl. albido-luteoli, vel purpurascentes.

(275) RHINANTHUS.

693. CRISTA-GALLI. L. Caule recto, sub-simplici, glaberrimo; foliis lanceolato-oblongis, dentatis, floribus sub-spicatis; calycibus glaberrimis.

Rh. crista-galli. *W. Sp.* - *Smith Br.* - *Lois. G.* Rh. glabra. DC. Syn. Alectorelophus glaber. *All. Ped. 206.* Crista galli foemina. *J. B. H. 3.* p. 436. Pedicularis pratensis lutea. *Hort. Rom. 3. t. 6.*



17

Maggio 1871  
10.17.1871

In montanis pascuis: *Sul Monte Cavi, Monte Gennaro* ...  
Ann. Floret Majo, Junio. Fl. lutei coeruleo maculati.

*10. Magg: 1803;* 694. **HIRSUTA.** *Lam. Fl. Fr.* Caule sub-hirsuto; foliis lanceo-lato-oblongis dentatis; floribus sub-spicatis; calycibus hirsutis. *Lois. G.* ( sub Rh. alectorolopho ).

Rh. hirsuta. *DC. Syn.* Rh. alectorolophus. *Poll. Pal.* 580., et pl. auct. Rh. villosus. *Pers. E.* Rh. crista-galli γ. *W. Sp.* Crista-galli mas. *J. B. H.* 3. p. 436.

In Sabinae montibus. Ann. Floret Majo, Junio. Fl. lutei coeruleo maculati.

(276) **MELAMPYRUM.**

695. **ARVENSE.** *L.* Spicis conicis laxis; bracteis dentato-pinnatifidis, coloratis: calycinis dentibus sebris.

*M. arvense.* *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Riv. t.* 79. *M.* purpurascente coma. *Hort. Rom.* 3. t. 8. *Triticum vaccinum.* *Dod. Pempt.* 541.

In montium messibus abunde. *Presso Tivoli, etc.* Ann. Floret Junio. Fl. purpurei, fauce flava: bracteae purpureae.

(277) **LINARIA.**

696. **CYMBALARIA.** *Mill.* Foliis cordatis quinquelobis, alternis, glabris; caulis procumbentibus. *DC. Syn.*

*L. Cymbalaria.* *W. En.* *Antirrhinum Cymbalaria.* *L.* - *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Smith Br.\** - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 169. *Cymbalaria* floribus purpurascensibus. *J. B. H.* 3. p. 685.

In marorum fissuris ubique. Perenn. Floret Aprili-Junio. Fl. albidi violaceo striati, palato luteo.

697. **PILOSA.** *DC. Fl. Fr.* Foliis reniformibus, crenatis, pilosissimis, alternis; caulis procumbentibus. *DC. Syn.*

*L. pilosa.* *W. En.* - *Biv. Sic. Cent.* 1. p. 50. *Antirrhinum pilosum.* *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *L. clematitis saxatilis* rotundo hederae folio hirsuta, etc. *Bonann. t.* 24.

Ad rupium fissuras in montosis. *Sul Monte Gennaro, sul Circello* .... Perenn. Floret Majo, Junio. Fl. albido-sub-violacei.

698. **ELATINE.** *Desf. Atl.* Pilosa: foliis petiolatis; imis ovatis, oppositis; superioribus hastatis alternis: caulis procumbentibus, pilosis.

*L. elatine.* *DC. Syn.* *Antirrhinum elatine.* *L.* - *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Smith Br.\** - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 168. *Elatine foemina* folio anguloso. *J. B. H.* 3. p. 572.

In agris communis. Ann. Floret Junio-Augusto. Fl. lutei galea violacea.

699. **SPURIA.** *Mill.* Villosa: foliis petiolatis, ovato-sub-roundis; inferioribus oppositis; superioribus alternis; caulis procumbentibus.

**L. spuria.** DC. Syn. *Antirrhinum spurium*. L. - All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. Elatine mas folio subrotundo. J. B. H. 3. p. 372.

In montium arenosis, et ad Tyberis ripas communis. Ann. Floret Julio, Augusto. Fl. flavi, galea atro-purpurea.

**700. PURPUREA.** Mill. Foliis lanceolato-linearibus; inferioribus verticillatis, superioribus sparsis; caule erecto; racemis spiciformibus, elongatis, terminalibus.

*Antirrhinum purpureum*. L. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. L. altera purpurea. Dod. Pempt. 183. L. alpina flore parvo purpureo, tithymali cyparissi folio. Cup. Panph. 2. t. 79.

In arvis, viis montium praesertim frequens. Copiosamente intorno Tivoli, Albano, etc. Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. purpureo-violacei, calcare extus curvato.

**701. PELLISSERIANA.** DC. Syn. Gaule florifero erecto; foliis linearibus sparsis; sureculorum sterilium foliis ovato-lanceolatis ternis: racemo terminali simplici; calcare recto flore longiore.

**L. pellisseriana.** Biv. Sic. Cent. 2. p. 84. *Antirrhinum pellisserianum*. L. - All. Ped. - W. Sp. - Lois. G. A. pellisserianum. Pers. E. (?) Chamaelinaria violacea italica. Barr. ic. 1162.

In aridissimis arvis frequens. *Sui Colli del Pigneto-Sacchetti, della Caffarella, etc.* Ann. Floret Majo, Junio. Fl. coeruleo-violacei.

**702. MINOR.** Desf. Atl. Foliis lanceolatis, obtusis, pubescentibus, plerisque alternis; caule erecto, ramosissimo: floribus axillaribus, solitariis, pedunculatis; calcare acuto, brevi.

**L. minor.** DC. Syn. - W. En. H. Ber. *Antirrhinum minus*. L. - All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. Savi B. Etr. 2. p. 167. A. minus villosum, etc. Barr. ic. 758. A. minimum. J. B. H. 2. p. 465.

In agris arenosis montium, et circa urbem secus Tyberim frequens. *A Ponte Molle, Acqua-acetosa, etc.* Ann. Floret Junio, Julio. Fl. albido-violacei.

Folia imma opposita sub-spathulata.

**703. VULGARIS.** Desf. Atl. Foliis lanceolato-linearibus, confertis: caule erecto, racemis spiciformibus terminalibus: calycibus glabris calcare brevioribus.

**L. vulgaris.** DC. Syn. - W. En. H. Ber. *Antirrhinum Linaria*. L. - All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. Savi B. Etr. 2. p. 169. L. vulgaris lutea, flore majore. J. B. H. 3. p. 456.

In campis, in cultis communissima. Perenn. Floret Julio, Augusto. Fl. lutei, palato flavo.

1. luglio  
1871  
1871  
1871

704. CHALEPENSIS. *Mill.* Foliis lanceolato-linearibus; inferioribus verticillatis: caule erecto: calycinis foliolis 4 corollae sub-aequalibus, quinto minori; calcare subulato elongato.

L. chalepensis. *DC. Syn.* - *W. En. Hor. Ber.* - *Bertol. Opusc. Scient. Bol. Fasc. 3. p. 153.*\* *Antirrhinum chalepense.* *L.-W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G. A. Osyrus.* *Cyrill. Neap. Fasc. 2. p. 21. t. 9.*\* *A. album.* *Lam. Fl. Fr.* *L. annua angustifolia, flosculis albis longius caudatis.* *Triumph. Obs. 87.* (cum ic. pessima).

In marginibus circa urbem, et in montosis. *A. Riofredo....* (Prope colles Farnesianos a Triumph.) Ann. Floret Junio. Fl. albi.

(278) ANTIRRHINUM.

705. MAJUS. L. Foliis lanceolatis oppositis alternis; caule erecto; floribus racemosis; calycinis segmentis glandulosi-pilosis, ovatis, obtusis.

A. majus. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Smith Br.*\* - *Lois. G.* - *Savi B. Etr. 2. p. 165.*\* - *Pers. E.* (err. sub Orentio). *A. tortuosum.* *Enc. A. siculum*  $\beta$  *tortuosum.* *Pers. E.* (err. sub Orentio). *A. majus angustifolium romanum.* *Barr. ic. 638.* - *Hort. Rom. 3. t. 2.* *A. Dod.* *Pempt. 182.*

Ad muros ubique communis. Perenn. Floret Aprili ad aestatem. Fl. purpurei.

Colore florum, pubescentia, et praesertim foliorum figura variat. Synouimon Barrelieri, aequa ac Horti Romani varietatem refert in urbe vulgatissimam foliis angustioribus glabrioribus, quae a specie non videtur separanda.

706. ORONTIUM. L. Foliis inferioribus lanceolato-oblongis, oppositis; superioribus linearibus alternis: caule erecto; floribus axillaribus, calycinis segmentis linear-lanceolatis corollam aequantibus.

A. orontium. *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Lois. G.* - *Savi B. Etr. 2. p. 167.* - *Pers. E.* (err. sub Orentio arvense). *A. sylvestre* s. *Phyteuma.* *Dod.* *Pempt. 182.* *A. minis* flore albo ampio flore. *Barr. ic. 656.* *A. flore albo oris rubris.* *Hort. Rom. 3. t. 1.*

In ruderatis, vineis, agris vulgare. Ann. Floret Junio-Augusto. Fl. sub-carnei labiis rubro pictis. - Venenata planata. *Pers. l. c.*

(279) SCROPHULARIA.

707. NODOSA. L. Foliis cordato-lanceolatis, acutis, serratis, opacis: caule acute tetragono, petiolis arete decurrentibus; stylo exerto, deflexo.

Sc. nodosa. *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr. 2. p. 169.* *Sc. Dod.* *Pempt. 50.* *Camer. Epit. 866.*

- In umbrosis , sylvaticis frequens . Da Albano a Palazzuola , etc. Perenn. Floret Majo , Junio . Fl. viridi-luteoli , labio superiore atropurpureo . - Radix tuberosa granulata .
708. AQUATICA . L. Foliis cordato-oblongis , obtusis , crenatis : caule petiolis late decurrentibus quadri-alato ; stylo exerto , reflexo .
- Sc. aquatica . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 170. Sc. aquatica major . Hort. Rom. 2. t. 89. Betonica aquatilis . Dod. Pempt. 50.
- In aquosis , ad fossas communis circa urbem . Perenn. Floret Majo . Fl. atro-purpurei .
709. VERNALIS . L. Foliis cordatis , duplicato-serratis , pubescentibus : pedunculis axillaribus , solitariis , dichotomis , foliolosis . Smith Br.
- Sc. vernalis . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Sc. montana maxima latifolia . Barr. ic. 273.
- In sylvaticis montanis . Sul Monte Gennaro .... Bienn. Floret Aprili-Junio . Fl. luteoli .
710. PEREGRINA . L. Foliis cordatis , acutis , dentatis , lucidis ; pedunculis axillaribus 2-4-floris ; stylo inclusu .
- Sc. peregrina . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 171. Sc. flore rubro . J. B. H. 3. p. 422.
- Secus vias in sub-humidis . Intorno Roma , Tivoli , Albano , Civitavecchia , etc. Ann. Floret Majo , Junio . Fl. purpurascentes .
711. LUCIDA . L. Foliis inferioribus bipinnatis , sub-carnosis , glaberrimis ; racemulis bipartitis , bracteis oblongis ; palato corollae subtus appendiculato . DC. Syn.
- Sc. lucida . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Bivon. Sic. Cent. 2. p. 50. Sc. saxatilis lucida , laserpitii massiliensis folio . Bocc. Mus. 2. p. 165. t. 117. Sc. cretica prima . Clus. H. 2. p. 209.
- In elatioribus sub-apenninis . Sul Monte Calvo presso Subiaco .... Perenn. Floret Junio . Fl. pallide purpurascentes , labio superiore rubro . - Calix margine membranaceo albo .
712. CANINA . L. Foliis pinnatis ; pinnis inciso-dentatis : panicula terminali , pedunculis bifidis ; floribus breviter pedicellatis ; squamula corollina nulla ; stylo exerto inclinato .
- Sc. canina . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 171. Ruta canina . Lob. ic. 2. p. 55. Clus. H. 2. p. 209. Sc. ruta canina dicta . Hort. Rom. 2. t. 90.
- In montium lapidosis . Sopra Rocca di Papa , nel pascolare

*di Marino, sui Cimini, etc. Bienn. Floret Majo-Julio. Fl. atro-purpurei. - Calix margine membranaceo albo.*

## (280) DIGITALIS.

*LUTEA. L. Foliis glaberrimis lanceolato-oblongis; sub-dentatis; floribus racemosis imbricatis: calycis lacinias lanceolatis; corollis acutis labio superiore bifido.*

*D. lutea. W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. D. parviflora. All. Ped. - Lam. Fl. Fr. - DC. Syn. D. major lutea. Hort. Rom. 2. t. 88. D. lutea parva. Lob. ic. 573.*

*In umbrosis, ad sepes montium obvia; circa urbem non infrequens. A Ponte Molle, Villa Madama; copiosamente intorno Albano, sul Monte Gennaro, etc. Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. pallide latei.*

*FERRUGINEA. L. Foliis lanceolato-oblongis, sub-integerrimis; bracteis lanceolatis, glabris, calycis longitudo; calycinis lacinias glabris obtusissimis; corollae labii inferioris lacinia intermedia oblonga, hirsuta, concava.*

*D. ferruginea. All. Ped.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. D. latifolia, etc. Hort. Rom. 2. t. 85.*

*In montium umbrosis. Sulla Montagna di Viterbo per la via postale in copia .... Perenn. Floret Julio, Augosto. Fl. luteo-ferruginei.*

*Corollae labium inferius productum, barbatum. - Statura 6-pedalis.*

## (281) ACANTHUS.

*MOLLIS. L. Foliis sinuato-pinnatifidis, inermibus.*

*A. mollis. W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - A. sativus. Dod. Pempt. 719. - Hort. Rom. 3. t. 13.*

*In collibus circa urbem frequens, et in Amphitheatro Flavio. Perenn. Floret Majo, Junio. Fl. albi.*

## (282) LATHRÆA.

*SQUAMARIA. L. Caule simplici: floribus racemosis pendulis; labio inferiore corollae trifido.*

*L. squamaria. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Anblatum cordi sive aphyllum. J. B. H. 2. p. 783. Δ. Dod. Pempt. 553. Dentaria. Matth. 964.*

*In sylvis opacis. Nelle Macchie dell' Alcina .... Perenn. Floret Majo. Fl. albo-purpurascentes.*

## (283) OROBANCHE.

*A. Corollis 4-lobis; floribus unibracteatis.*

*MAJOR. L. Caule simplissimo; corollis 4-fidis, inflatis; staminibus inferne glabris; stigmate bilobo, lobis distantes; stylo superne pubescente. DC. Syn.*

*O. major. Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. O. quarta. Lob. ic. p. 269.*

*In nemoribus. Presso i Cappuccini d' Albano, sul Monte*

- Cavi*, intorno all'*Anquillara*, etc. Perenn. Floret Majo-  
Julio. Fl. purpureo-rubiginosi, inodori.
718. CARYOPHYLLACEA. Smith Act. Soc. Linn. 4. p. 169.\* Caule  
simplici; corolla inflata, fimbriato-crispa, labio inferiore lacinias obtusis aequalibus: staminibus intus basi  
hirsutis. Smith l. c. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G.
- O. vulgaris. Lam. Dict. 4. - DC. Syn. O. major caryophyl-  
lum olens. Hort. Rom. 3. t. 11. (male). Limodorum. Dod.  
Pempt. 552.
- In cultis ad leguminum radices nimis frequens. Vulgo: mal-  
erba. Perenn. Floret Majo. Fl. albidi, rubro-lineati, ca-  
ryophyllum olentes.
- Orobanche major thyrso florum specioso Buxbaumii Gent. 3.  
p. 2. t. 2. hue videtur spectare.
719. CRUENTA. Bertol. Rar. It. Pl. Dec. 3. p. 56.\* Caule sim-  
plici: corolla inflata, fimbriato-crispa; filamentis latere  
inferiore undique hirsutis; germinis apice, styloque pu-  
bescentibus. Bert. l. c.
- O. caryophyllacea. Viv. Ann. bot. P. 2. p. 175.
- β. Caule humiliore, 4-8-floro: stylo leviter piloso.
- O. epithymum. DC. Fl. Fr. n. 2456. et Syn. (?) . O. minor β.  
Lois. G. (?)
- In Sabinis montibus sylvaticis. Sul Monte Gennaro ....  
β intorno alla solfatara di Tivoli (parasitica ad radices  
Thymi serpilli.) Perenn. Floret Majo, Junio. Fl. rubro-  
ferruginei, intus cruenti.
- Pubescentia omnis apice glandulifera . „ Differt ab O. ma-  
„ jore statim aspectu; staminibus latere interiore undi-  
„ que hirsutis, nec inferne nudis; corollae labio supe-  
„ riori emarginato-concavo, nec integro, margine refle-  
„ xo: labio inferiore trilobo, lobis obtusis, medio paullo  
„ majori, nec trifido lacinias acutis aequalibus; demum  
„ colore florum. Ab O. caryophyllacea vero distinguitur  
„ filamentis ab imo ad summum latere interiore undi-  
„ que hirsutis, nec basi tantum: germine superne pilo-  
„ so, nec glabro: stigmatis lobis antice luteis, nec pur-  
„ pureis; colore floris; odore levissimo, fugacissimo.... „,  
Bert. l. c. In β etiam corolla inflata; stamina a basi ad  
apicem, leviter licet, pilosa, uti stylus.
720. MINOR. Sutton. Act. Soc. Linn. 4. p. 179. Caule simplici;  
corolla tubulosa; staminibus inferne pilosis; stylo su-  
perne glabro, stigmate reflexo, retuso.
- O. minor. Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC.  
Syn.
- In sylvaticis, ad vias umbrosas communis. Perenn. Flo-  
ret Majo, Junio. Fl. purpurascentes.

15 luglio 1801

17

May 16 1801

B. Corollis 5-lobis; floribus 3-bracteatis.

721. RAMOSA. L. Caule ramoso, vel simplici. bracteis ternis; calycibus brevibus inaequaliter 4-fidis; corollis 5-fidis, lobis obtusis.

O. ramosa. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 171. - Hort. Rom. 3. t. 12. O tertia. Clus. H. 271.

Ad radices cannabis, nec non in sylvis, muris frequens, praesertim varietas caule simplici. Perenn. Floret Mayo. Fl. purpureo-cyanei.

---

## CLASSIS XV.

## TETRADYNAZIA.

## ORD. SILICULOSA.

- (284) *MYAGRUM*. *Calix* sub-patulus. *Silicula* suberosa, evalvis, loculis 2-3 super-impositis, unico fertili, monospermo.
- (285) *CAKILE*. *Calix* sub-clausus. *Silicula* rhombeo-tetragona, biarticulata, ad articulos secedens; articulis evalvibus, monospermis.
- (286) *BUNIAS*. *Calix* patens. *Silicula* sub-tetraedra, septis binis, altero horizontali altero verticali, quadrilocularis; loculis monospermis.
- (287) *LÆLIA*. *Silicula* numentacea, evalvis, subrotunda, rugosa, 1-loquularis, 1-sperma. *Filamenta* simplicia.
- (288) *RAPISTRUM*. *Silicula* numentacea, rotundata, acuminata, bivalvis, sponte non dehiscens, bilocularis; dissepsimentum membranaceum valvis parallelum. *Semina* solitaria.
- (289) *ISATIS*. *Calix* sub-patens. *Stigma* sessile, capitatum. *Silicula* linguae-formis, compressa, non dehiscens, valvis navicularibus, intus suberosis, monosperma.
- (290) *CAMELINA*. *Silicula* membranacea ovata, aut rotunda, bivalvis, bilocularis, polysperma, glabra. *Filamenta* edentula. *Stylus* persistens. *Semina* oblonga, laxe striata.
- (291) *COCHLEARIA*. *Calix* hiulcus, foliolis concavis. *Petala* patentia. *Silicula* turgida, rugosa, polysperma, valvulis gibbis obtusis.
- (292) *CORONOPUS*. *Calix* hiulcus. *Petala* patentia. *Silicula* reniformis, compressa, corrugata, bilocularis, 2-valvis, valvis non dehiscentibus.
- (293) *IBERIS*. *Calix* patens. *Corolla* irregularis, petalis 2 exterioribus majoribus. *Silicula* orbicularis, sub-compressa, margine acuto, supra emarginato, cincta; valvis navicularibus dissepsimento contrariis, loculis monospermis.
- (294) *LEPIDIUM*. *Calix* patens. *Corolla* regularis. *Silicula* integra, cordato-sub-orbicularis, polysperma; valvulis navicularibus carinatis, dissepsimento contrariis.
- (295) *THLASPI*. *Calix* patens. *Corolla* regularis. *Silicula* compressa apice emarginata, obcordata vel sub-orbicularis valvis navicularibus marginato-carinatis, dissepsimentero contrariis, loculis 1-poly-spermis.

- (296) *DRABA*. *Calix erectus*. *Petala sub-patentia*, *integra* aut *emarginata*. *Stylus brevissimus*. *Silicula ovato-oblonga*, *integra*, *valvulis planiusculis*, *dissepimento parallelis*.
- (297) *ALYSUM*. *Calix connivens*. *Petala apice patentia*. *Silicula orbiculata*, *compressa*, *valvulis sub-planis dissepimento parallelis*. *Semina pauca*.—*Filamenta bina interdum denticulo introrsum notata*.
- (298) *LUNARIA*. *Calix foliolis binis basi gibbis*. *Silicula elliptica*, *compresso-plana*, *pedicellata*, *integra*; *valvis planis dissepimento aequalibus*, *parallelis*.

## ORD. SILIQUOSA.

- (299) *DENTARIA*. *Calix connivens*. *Siliqua elastice dissiliens*, *valvulis a basi ad apicem revolutis*, *dissepimento brevioribus*. *Stigma emarginatum*.
- (300) *CARDAMINE*. *Calix sub-hians*. *Siliqua linearis*, *elastice dissiliens*, *valvulis a basi ad apicem revolutis*, *dissepimento aequalibus*. *Stigma integrum*.
- (301) *SISYMBRIUM*. *Petala patentia*, *ungue brevi*. *Siliqua teres valvis rectis non elasticis*, *dissepimento parum brevioribus*. *Stigma obtusum*.
- (302) *ERYSIMUM*. *Calix connivens*, *clausus*. *Discus ovarii biglandulosus*. *Siliqua columnaris*, *quadrigona*.
- (303) *CHEIRANTHUS*. *Calix connivens*, *foliolis binis majoribus basi gibbris*. *Discus ovarii biglandulosus*. *Stigma bifidum*. *Siliqua longa*, *compressa*, *aut sub-4-gona*, *interdum apice 1-3-rostrata*. *Semina marginata*.
- (304) *HESPERIS*. *Calix connivens*, *foliolis binis majoribus basi gibbris*. *Petala*, *saepe*, *oblique flexa*. *Discus ovarii liglandulosus*. *Stigma lilamellatum*, *connivens*. *Siliqua teres*, *aut compressa*. *Semina non marginata*.
- (305) *ARABIS*. *Calix connivens*, *foliolis binis majoribus basi gibbris*. *Siliqua longa*, *compressa*, *linearis*. *Glandulae 4 squamiformes reflexae intra calycis foliola*.
- (306) *TURRITIS*. *Calix connivens erectus*. *Siliquae longissimae*, *lineares*, *angulatae*, *striatae*, *strictae*. *Discus ovarii biglandulosus*.
- (307) *SINAPIS*. *Calix patentissimus*. *Discus ovarii 4-glandulosus*. *Siliqua torulosa*, *dissepimento longe producto rostrata*.
- (308) *RAPHANUS*. *Calix connivens*. *Discus ovarii 4-glandulosus*. *Siliqua teres toroso-sub-articulata*, *1-multi-locularis*, *loculis superimpositis*.
-

## TETRADYNAMIA SILICULOSA.

(284) MYAGRUM.

722. RUGOSUM. *L.* Siliculis sulcatis, pilosis, rugosis asperis: foliis oblongis, obtusis, sub-dentatis; radicalibus lyratis.  
*M.* rugosum. *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Savi B. Etr.* 1. p. 168.\* *Rapistrum rugosum*. *All. Ped.* t. 78. *Cakile rugosa*. *DC. Syn.*

In sterilibus, ad margines viarum vulgare. Ann. Floret Junio, Julio. Fl. lutei.

723. PERFOLIATUM. *L.* Siliculis obcordatis, subsessilibus, loculo infimo fertili: foliis glaberrimis, caulinis amplexicaulinibus acuminatis.

*M. perfoliatum*. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 174.\* *Cakile perfoliata*. *DC. Syn.* *M. monospermon*. *J. B. H.* 2 p. 894 - *Hort. Rom.* 4. t. 3.

Ad margines viarum, in arvis frequens. *A. Ponte Molle, Ponte Salaru*, etc. Ann. Floret Aprili, Majo. Fl. lutei.

(285) CAKILE.

724. MARITIMA. *Scop. Carn.* Foliis carnosis pinnatifidis; pinnis linearibus sub-dentatis: siliculis ovatis, laevibus, ancipitibus. *Savi B. Etr.* 2. p. 176.\*

*C. maritima*. *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lam. ill. t. 554. f. 1.* - *DC. Syn.* *Bunias cakile*. *L.* - *Smith Br.*\* - *Hort. Rom.* 4. t. 49. *C. Serapioni's*. *Lob. ic. 223.*

In arena maritima communis. Ann. Floret Majo, Junio. Fl. dilute violacei.

Siliculae articulus inferior saepe sterilis.

(286) BUNIAS.

725. ERUCAGO. *L.* Siliculis tetragonis, angulis cristato-sinuatis; foliis radicalibus rancinatis; caulinis oblongis, subdentatis.

*B. erucago*. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 175. *Myagrum erucago*. *Crantz crucif.* - *Enc. Sinapi echinatum*. *J. B. H.* 2. p. 856. *Erucago segetum*. *Hort. Rom.* 4. t. 48.

In arvis vulgaris. Ann. Floret Junio. Fl. lutei.

(287) LAELIA.

726. COCHLEARIOIDES. *Pers. E.* Foliis oblongis, dentatis; caulinis amplexicaulinibus: racemis longis, laxis, simplicibus.

*Bunias cochlearioides*. *W. Sp.* - *Waldst. et Kitaib.* t. 107. - *DC. Syn.* *Myagrum erucaefolium*. *Vill. Delph.* - *Lois. G.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 174. - *Sebast. Rom. Pl. Fasç.* 2. p. 59. *Crambe Corvini*. *All. Ped.* 937. *Myagrum supinum album* *erueae* foliis. *Barr. ic.* 1552.

Ad margines viarum frequens. Bienn. Floret Majo. Fl. albi.

10  
aprile 1871

Similis

alla qui vetus

Cochlearia

11 aprile 1871

## (288) RAPISTRUM.

727. PANICULATUM. *Gaertn. T. 2. p. 285. t. 141.* Siliculis reticulato-rugosis, sub-globosis : foliis sebris lanceolatis, subdentatis ; caulinis sagittatis amplexicaulibus.  
*R. paniculatum. Pers. E. Myagrum paniculatum. L. W. Sp. - Lois. G. - Savi B. Etr. 2. p. 173.\* Grambe paniculata. All. Ped. 935. Bunias paniculata. DC. Syn. Myagro affinis herba capitulis rotundis. J. B. H. 2. p. 895.*  
 In montium segete frequens. Ann. Floret Junio. Fl. lutei.

## (289) ISATIS.

728. TINCTORIA. *L. Caule recto, superne ramoso : foliis radicalibus oblongis, petiolatis ; caulinis sessilibus, sagittatis : floribus paniculatis, siliculis oblongis. Lois. Gall. I. tinctoria. W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn. I. sylvestris. Fuchs. H. 332. I. sativa. Hort. Rom. 4. t. 5.*  
 Inter segetes in montibus. Vulgo : guado. Bienn. Floret Majo, Junio. Fl. lutei.

## (290) CAMELINA.

729. SAXATALIS. *Pers. E. Caule recto, superne paniculato : foliis oblongo-ligulatis ; radicalibus petiolatis sub-dentatis, eaespitosis : siliculis sub-globosis.*  
*Myagrum saxatile. L. - W. Sp. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 173.\* Alyssum myagrodes. All. Ped. Cochlearia saxatilis. Scop. Carn. - Enc. Thlaspi petraeum myagrodes. Clus. H. 2. p. 338.*

*In calcareis jugis. A Santo-Polo ... Perenn. Floret Junio. Fl. albi.*

## (291) COCHLEARIA.

730. DRABA. *L. Caule erecto : foliis ovato-lanceolatis, dentatis ; caulinis amplexicaulibus, auriculatis : siliculis cordatis. Savi B. Etr. 2. p. 182.*  
*C. draba. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Draba prima vulgaris. Clus. H. 2. p. 123. - Matth. 602.*  
*In marginibus agrorum, secns Tyberis ripas frequens. Perenn. Floret Majo, Junio. Fl. albi.*

## (292) CORONOPUS.

731. RUELLII. *All. Ped. Siliculis integris, cristato-muricatis ; stylo porrecto : corymbis paucifloris. Smith Br.\* - Savi B. Etr. 2. p. 182.\**

*Cochlearia coronopus. L. - W. Sp. - Lois. G. Seneciera coronopus. Pers. E. Coronopus vulgaris. DC. Syn. Ambrosia. Matth. 899.*

*In marginibus viarum frequens. Ann. Floret Majo, Junio. Fl. albidi. - Folia pinnatifida.*

## (293) IBERIS.

732. PINNATA. *L. Caule herbaceo, ramoso : foliis pinnatifidis, pinnae linearibus : floribus corymboso-racemosis. Lois. G. I. pinnata. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn. Thlaspi*

alterum minus umbellatum nastursii hortensis folio. *Lob.*  
*ic.* 218.

In montibus ad margines viarum, in agris. *A Palombra* .... Ann. Floret Junio. Fl. albi,

## (294) LEPIDIUM.

733. GRAMINIFOLIUM. *L.* Caule paniculato, virgato; foliis radicalibus pinnato-lyratis; superioribus linearibus integrerrimis: floribus hexandris. *Lois. G.*

*L.* graminifolium. *W. Sp.* - *Pers. E.* Iberis. *Matth.*  
*Valgr.* 293.

In ruderatis, viarum marginibus etiam in urbe obvium,  
Perenn. Floret Julio et tardius. Fl. albi, calycibus sub-  
purpurascensibus,

## (295) THLASPI.

A. Silicula triangulari non marginata.

734. BURSA-PASTORIS. *L.* Foliis radicalibus pinnatifidis integrisve; caulinis lanceolatis, sagittato-amplexicaulibus; siliculis triangulari-obcordatis non marginatis.

*Th. bursa-pastoris.* *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 181.\* *Bursa pastoris.* *J. B. H.* p. 936. - *Hort. Rom.* 4. t. 16. *Pastoria bursa.* *Dod. Pempt.* 103.

In viis etiam urbis vulgare. Ann. Floret toto fere anno. Fl. albi.

B. Silicula obcordata, sub-orbiculata,  
marginata.

735. PERFOLIATUM. *L.* Glaberrimum: caule ramoso; foliis radicalibus ovatis, petiolatis; caulinis cordatis, subdentatis, amplexicaulibus: corollis longitudine calycis: siliculis obcordatis. *Lois. G.*

*Th. perfoliatum.* *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 180.\* *Th. alterum* mitius rotundifolium bursae pastoris fructu. *Col. ecphr.* 1. p. 278. t. 276. f. 2. *Th. cordatum* minus flore albo insipidum. *Barr. ic.* 815.

In collibus, siccis, ad muros circa urbem commune. Ann. Floret Martio-Majo. Fl. albi.

736. SAXATILE. *L.* Caule adscendente glaberrimo: foliis lanceolatis, obtusis, integerrimis, carnosis: siliculis subrotundis. *Lois. G.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 179.\*

*Th. saxatile.* *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *DC. Syn. Linthonthlaspi parvum carnosum rotundo folio.* *Col. ecphr.* 1. p. 279. t. 277. *Th. montanum* pingui folio, carneo flore, etc. *Barr. ic.* 845.

In fissuris calcareis montium. *A Santo Polo* .... Perenn. Floret Junio. Fl. albo-rubelli.

## (296) DRABA.

737. VERA. *L.* Scapis nudis, paniculatis; foliis spatulato-

Simile 1871

27. aprile

1. Maggio 1871

Febbo 1871  
Caste della Molara

lanceolatis, sub-dentatis : petalis obtusis, bifidis. Lam. ill. t. 556. f. 1. - Savi B. Etr. 2. p. 176.\*

D. verna. All. Ped. - Smith. Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Paronichia vulgaris. Dod. Pempt. 112. P. alsinaefolia. Lob. ic. 469.

In viis, plateis, muris vulgatissima. Ann. Floret Februario, Martio. Fl. albi. - Plantula 1-2-pollicaris.

738. MURALIS. L. Caule ramoso : foliis radicalibus ovatis ; caulinis cordatis, sessilibus, amplexicaulibus, dentatis : petalis integris ; siliculis patentibus, glabris. Savi B. Etr. 2. p. 177.\*

D. muralis. Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. D. minima muralis discoidea. Col. ephr. 1. p. 274. t. 272. Myagroides subrotundis serratisque foliis, flore albo. Barr. ic. 816.

In marginibus viarum, et ad muros frequens. Copiosamente nel Colosseo, etc. Ann. Floret Martio, Aprili. Fl. albi.

(297) ALYSSUM.

739. MARITIMUM. All. Ped. Caulibus suffruticosis, diffusis : foliis linear-lanceolatis, acutis, sub-incanis : petalis integris ; filamentis simplicibus ; siliculis sub-rotundis. Savi B. Etr. 2. p. 183.\*

A. maritimum. W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Clypeola maritima. L. Thlaspi montanum perenne flore albo. Barr. ic. 844.

Ad vias urbis, margines agrorum frequens. Copiosamente nella via di Porta S. Pancrazio, etc. Perenn. Floret Martio ad aestatem. Fl. albi.

740. INCANUM. L. Caule erecto : foliis lanceolatis, integerimis, incanis : racemis floriferis subcorymbosis : petalis bifidis.

A. incanum. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Thlaspi incanum machlinense. Clus. H. 2. p. 130. Leucoium minus peltatum romanum. Col. ephr. 2. p. 58. t. 60.

Ad vias, in siccis, arenosis maritimis commune. Intorno Roma, Viterbo, Civitavecchia, etc. Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. albi.

741. CALYCINUM. L. Caulibus herbaceis : foliis oblongis obtusis, incanis ; staminibus omnibus dentatis ; calycibus persistentibus ; siliculis sub-emarginatis. DC. Syn.

A. calycinum. W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. Clypeola calycina. All. Ped. A. minimum. Clus. H. 2. p. 133. Thlaspi alysson incanum. Barr. ic. 908. f. 2.

In montibus calcareis ad margines. A Santo-Polo... Ann. Floret Mayo, Junio. Fl. lutei.

742. MONTANUM. L. Caulibus herbaceis diffusis ; foliis incanis ; inferioribus ellipticis, acutis ; superioribus sub-lan-

## TETRADYDYNAMIA SILICULOSA.

215

ceolatis : racemo simplici. *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.*

*Thlaspi thymi* folio utriculo subrotundo mucronato hispanicum. *Barr. ic.* 807. - *Bocc. Mus.* 72. t. 67. *Th. montanum luteum*. *J. B. H.* 2. p. 928. t. 929.

In calcareis montibus ad margines. *Ai Santo-Polo*, etc. Perenn. Floret Majo, Junio. Fl. lutei.

## (298) LUNARIA.

743. REDIVIVA. *L.* Foliis alternis mucronato-dentatis : siliculos oblongis utrinque attenuatis. *DC. Syn.*

*L. rediviva*. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *Viola latifolia lunaria odorata*. *Clas. H.* 297.

In montium umbrosis. *Ai Riformati di Castel Gandolfo*, sul Monte S. Oreste, etc. Perenn. Floret Majo. Fl. violacei, odorei.

## TETRADYDYNAMIA SILIQUOSA.

## (299) DENTARIA.

744. ENNEAPHYLLA. *L.* Foliis ternis ternatis, dentatis, foliorum axillis nudis; staminibus longitudine corollae. *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.*

*D. euneaphylla*. *All. Ped.* - *Lois. G.* *D. triphyllus*. *Clus. H.* 2. p. 121.

In montium sylvaticis. Sul Monte Gennaro .... Ann. Floret Majo. Fl. albi.

745. PINNATA. *L.* Foliis omnibus pinnatis; foliolis oblongis, acuminatis, aequaliter dentatis. *W. Sp.* - *Pers. E.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 186.

*D. pinnata*. *Lois. G.* *D. octava heptaphyllos*. *Clus. II. 2.* p. 123. *Viola dentaria altera*. *Dod. Pempt.* 162. *Alabastrites altera*. *Lob. ic.* 686.

In montium sylvaticis frequens. *Copiosamente sul Monte Albano*, etc. Perenn. Floret Majo. Fl. albo-sub-violacei.

746. BULBIFERA. *L.* Foliis inferioribus pinnatis, superioribus simplicibus; axillis bulbiferis. *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 183.\*

*D. bulbifera*. *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Lobel. ic.* 687. *D. quarta baccifera*. *Clus. H. 2.* p. 121.

In montium sylvaticis, Sul Monte Gennaro, Monte Arteniso .... Perenn. Floret Majo. Fl. albi, sub-violacei.

## (300) CARDAMINE.

747. CHELIDONIA. *L.* Foliis quinato-pinnatis; foliolis ovato-subrotundis dentatis, impari maximo; petiolis basi auriculatis. *Savi B. Etr.* 2. p. 187.\*

*C. chelidonia*. *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Waldst. et Kit.* t. 140. Si-

apriile 1871.  
4. Magg. 1872.

*symbrium montanum latifolium, flore purpureo. Barr. ic. 156.*

*In sylvaticis maritimis. Presso Fiumicino .... Perenn. Floret Junio. Fl. purpurei.*

*Foliola lateralia saepe ternata.*

748. IMPATIENS. *L. Foliis pinnatis; pinnis ovato-lanceolatis lobatis, incisis; petiolis basi auriculatis. Savi B. Etr. 2. p. 187.\**

*C. impatiens. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Sisymbrium montanum tenuifolium flore muscoso. Barr. ic. 155. Sisymbrii cardamines species quaedam insipida. J. B. H. 2. p. 886.*

*In montium umbrosis frequens. In gran copia presso Palazzuola, sul Monte Gennaro, etc. Bienn. Floret Aprili-Junio. Fl. albidi.*

749. HIRSUTA. *L. Foliis pinnatis; pinnis radicalibus sub-roundis, caulinis lanceolatis; petiolis inferne ciliatis. Savi B. Etr. 2. p. 188.\**

*C. hirsuta. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Biv. Sic. Cent. 1. p. 22. C. sylvestris minor italica. Barr. ic. 455.*

*In pratis, marginibus, viis urbis vulgatissima. Ann. Floret Februario, Martio. Fl. albi. - Planta aspectu glaberrima.*

750. AMARA. *L. Foliis pinnatis; inferiorum foliolis sub-roundis, superiorum oblongis: caule basi stolonifero. DC. Syn. - Savi Bot. Etr. 2. p. 189.\**

*C. amara. All. Ped. 56. f. 1. - Smith Br\*. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. Nasturtium cardamine, sive nasturtium aquaticum flore majore elatius. J. B. H. 2. p. 885.*

*Secus rivos. Alla Marrana di Porta S. Giovanni .... Perenn. Floret Junio. Fl. albi.*

(301) SISYMBRIJUM.

*A. Siliquis oblongis brevibus.*

751. NASTURTIUM. *L. Caule adscendente: foliis pinnatis; foliolis obovatis, impari majore: floribus corymboso-racemosis; siliquis declinatis sub-incurvis, pedicello sub-brevioribus. Savi B. Etr. 2. p. 189.\**

*S. narturium. All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. S. aquaticum. Hort. Rom. 4. t. 31. Nasturtium aquaticum. Dod. Pempt. 581.*

*Ubique ad rivos, fontes. Vulgo: crescione. Perenn. Floret Majo. Fl. albi.*

752. SYLVESTRE. *L. Siliquis declinatis, teretibus: foliis pinnatifidis; foliolis lanceolatis acutis, inciso-serratis: radice repente: petalis calyce longioribus. Savi B. Etr. 2. p. 192.\**

*S. sylvestre. Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. -*

15

Febbraio 1871.

⑤

3.

aprile 1871.

⑥

*DC. Syn. S. vulgare. Pers. E. Eruca sylvestris. Fuchs.*  
*H. 263.*

**I**n ruderatis, pratis secus Tyberim frequens. *Copiosamente presso Ponte Molle, ad Acqua acetosa, etc. Perenn. Floret Majo. Fl. lutei.*

753. **A**MPHIBIUM. *L.* Siliquis declinatis, turgidis: foliis oblongis, serratis pinnatifidisque; radice fibrosa: petalis calyce longioribus. *Savi B. Etr. 2. p. 192.\**

**S.** amphibium. *Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Brachiolobos amphibius. All. Ped. Raphanus sylvestris officinarum aquaticus. Lob. ic. 319.*

**J**uxta Tyberim. *All' acqua-acetosa, etc. Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. lutei.*

754. **T**ERRESTRE. *Smith Br.\** Siliquis declinatis, turgidis; foliis pinnatifidis inaequaliter dentatis; radice simplici; petalis calyce brevioribus. *Smith l. c. - Savi B. Etr. 2. p. 191. - Bertol. Rar. It. Pl. Dec. 3. p. 29.\**

**B**rachiolobos sylvestris. *All. Ped. 1012. t. 56. f. 2. Raphanus aquaticus foliis in profundas lacinias divisis. C. B. Prod. p. 38. cum ic.*

**A**d ripas Tyberis. *A Fiumicino . . . Ann. Floret Julio. Fl. lutei.*

**B.** Siliquis linearibus.

755. **V**IMINEUM. *L.* Acaule: foliis lyratis, brevibus; scapis adscendentibus; petalis calyci sub-aequalibus. *DC. Syn.*

**S.** vimineum. *All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Savi B. Etr. 2. p. 190.\* - Biv. Sic. Cent. 2. p. 61. Eruca pumila Sicula bursae pastoris folio. Bocc. Sic. 19. t. 10. - Bonann. t. 45.*

**I**n maritimis. *Ai Ponticelli d' Ostia . . . Ann. Floret aestate. Fl. lutei.*

756. **T**ENUIFOLIUM. *L.* Glaucescens: siliquis erectis: foliis glabris, pinnatifidis, sub-integerrimis; supremis integris.

**S.** tenuifolium. *All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Eruca tenuifolia. J. B. H. 2. p. 861. - Hort. Rom. 4. t. 34. Synapi sylvestre. Dod. Pempt. p. 707.*

**A**d muros, rupes, vias frequens. *Sul Colosseo, presso la Torre di Quinto, etc. Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. lutei. - Odor erucae.*

757. **P**OLICERATIUM. *L.* Siliquis axillaribus, sessilibus, subulatis, aggregatis: foliis repando-dentatis. *L. - W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 191.\**

**S.** polyceratum. *All. Ped. - Lois. G. Erysimum alterum italicum et Matthioli. Lob. ic. 206. Irio altera. Camer. Epit. 344. - Dalech. II. 653. Erysimum polyceratum. Hort. Rom. 4. t. 38.*

In ruderatis , securis vias etiam urbis commune . Ann. Floret Majo , Junio . Fl. lutei .

758. IRIO . L. Siliquis erectis : foliis runcinatis dentatis , nudis ; caule laevi . W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn.

S. Irio . All. Ped. Irio laevis apulus erucae folio , Col. ecphr. 1. p. 264. t. 265.

Ad muros . Sul Colosseo . Ann. Floret Majo , Junio . Fl. lutei .

(302) ERYSIMUM

759. OFFICINALE . L. Siliquis spicae adpressis : foliis runcinatis . L. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn.

E. officinale . Lois. G. Sisymbrium officinale . All. Ped. E. vulgare . Hort. Rom. 4. t. 34. Verbena recta s. mas. Fuchs. H. 592.

In ruderatis , viis ubique . Ann. Floret Majo - Julio . Fl. lutei .

760. BARBAREA . L. Foliis inferioribus lyratis , lobo terminati rotundato ; superioribus obovatis dentatis . Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn.

E. barbarea . All. Ped. - Lois. G. Sanctae Barbarae herba . Fuchs. H. 746.

In humidis , ad ripas fossarum vulgare . Perenn. Floret Majo - Julio . Fl. lutei .

761. CHEIRANTHOIDES . L. Foliis lanceolato-oblongis , sub-integerrimis ; siliquis erectis , pedicellis fructiferis patentibus .

E. cheiranthoides . Smith Br.\* - W. Sp. - Lois. G. - DC. Syn.

E. parviflorum . Pers. E. Myagro affinis planta siliquis longis . J. B. H. 2. p. 894.

In siccioribus , petrosis commune . Intorno Tivoli , Castel Gandolfo , Nemi , etc. Ann. Floret Junio , Julio . Fl. lutei .

(303) CHEIRANTHUS .

762. CHEIRI . L. Foliis lanceolatis , acutis , glabris ; ramis angulatis ; caule sub-fruticoso . DC. Syn.

Ch. cheiri . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. Leucocium luteum . Dod. Pempt. 160.

In muris antiquis communis . Vulgo : Viole-gialle . Perenn. Floret Februario . Fl. ferrugineo-lutei .

763. INCANUS . L. Foliis lanceolatis , integerrimis , obtusis , incanis : siliquis apice truncatis , compressis ; caule suffruticoso . L. - W. Sp. - Pers. E.

Ch. incanus . Loisel. Gall. - DC. Syn. Viola alba et purpurea . Lob. ic. 329. Leucocium purpureum vel rubrum . Hort. Rom. 4. t. 26.

In maritimis frequens . Ad Ostia , etc. Colitur in hortis

omnibus nomine : *Viole-rosse*, *violaccioche*. Perenn.  
Floret Aprili, Majo. Fl. purpurei.

764. TRISTIS. *L.* Foliis linearibus sub-sinuatis; floribus sessilibus, petalis undatis: caule suffruticoso. *L.* - *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *DC. Syn.*

*Ch. tristis*. *Lois. G.* Leucoum minus lavandulae folio, obsoeto flore, angustifolium. *Barr. ic. 803.*

In montium sterilibus, saxosis. *Sul Monte Calvo presso Subiaco*.... Perenn. Floret Majo. Fl. ferruginei.

(304) HESPERIS.

- 765 ALLIARIA. *Lam.* Foliis cordatis, dentatis. *DC. Syn.*

*Erysimum alliaria*. *L.* - *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Savi B. Etr. 2. p. 193.*\* *Alliaria. Lob.* *ic. 530.* - *Dod. Pempt.* 674.

In umbrosis vulgaris. Bienn. Floret Majo, Junio. Fl. albi. - *Allium redoleat*.

766. MATRONALIS. *L.* Caule simplici, erecto; foliis ovato-lanceolatis, denticulatis: petalis obtuse emarginatis sub-mucronatis. *DC. Syn.*

*H. matronalis*. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *Viola purpurea*. *Fuchs. H. 459.* *V. matronalis*. *Dod. Pempt. 161.*

In montium umbrosis, sylvaticis. *In copia presso Castel Gandolfo*, etc. Perenn. Floret Majo-Julio. Fl. purpurei.

767. Verna. *L.* Caule erecto, ramoso: foliis caulinis cordatis, amplexicaulibus, serratis, villosis. *DC. Syn.*

*H. verna*. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Bivon. Sic. Cent. 1. p. 42.* *Leucoum bellidis* folio minus et leucoum minus, etc. *Barr. ic. 875, 876.*

In sterili missimis montium. *Presso Rocca di Papa sul rapillo*.... Ann. Floret Majo. Fl. purpurei.

768. PARVIFLORA. *DC. Pl. Gall. rar. t. 35.* Foliis oblongis, obtusis, sub-sinuatis, tomentosis; siliquis pubescentibus, rostro brevi glabro acuto. *DC. Syn.* - *Savi B. Etr. 2. p. 195.*

In maritimis arenosis. *Presso Ostia*. Ann. Floret Junio. Fl. purpurei.

(305) ARABIS.

769. THALIANA. *L.* Foliis ciliatis; radicalibus ovato-spathulatis, dentatis, petiolatis; caulinis lanceolatis, integris, sessilibus; siliquis glabris: caule basi hirto. *Savi B. Etr. 2. p. 196.*

*A. thaliana*. *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Bivon. Sic. Cent. 1. p. 20.* *Draba angustifolia minima*. *Barr. ic. 269.*

In locis arenosis, ad vias, muros frequens. Ann. Floret Aprili. Fl. albi.

770. ALPINA. *L.* Foliis oblongo-lanceolatis, amplexicaulibus,

30  
maggio 1871  
10 id 1871

*H. Flav.*

Vide *Erysimum*  
*Barbarea*.  
*Scorrello*

10 Apr. 1871

24  
#

1.  
aprile 1871  
10

16.  
aprile 1871

sinuato-acute-dentatis, ineanis; siliquis compressis. *Sav. vi B. Etr. 2. p. 195.*\*

*A. alpina*. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.*  
*Draba altera et Draba tertia succulento folio*. *Clus. H. 2.*,  
*p. 124.*

In jugis sub-apenninis. *Sul Monte Calvo presso Subiaco ...*,  
Perenn. Floret Junio. Fl. albi.

*3. Aprile 1871.*  
771. *TURRITA*. *L. Caule sub-simplici*; *foliis amplexicaulis oblongis*, *denticulatis*; *radicalibus petiolatis sub-sinuato-dentatis*: *siliquis decurvatis planis*, *linearibus*, *margine incrassatis*. *Sav. B. Etr. 2. p. 196.*\*

*2 Maggio 1870.*  
772. *A. turrita*. *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *Turrita major Plateau*. *Clus. H. 2.*,  
*p. 126.* *Brassica sylvestris* albido flore, nutante siliqua;  
*Bocc. Mus. t. 72.* - *Barr. ic. 355.*

In nemorosis frequens. *Sul Monte Mario, intorno Albano in copia*, etc. Ann. Floret Aprili, Majo. Fl. ochro-leuci.

*(306) TURRITIS.*

*10. Maggio 1871.*  
772. *SAGITTATA*. *Bertol. Pl. Gen. 185 Inferne hirsuta*: *foliis radicalibus ovato-oblongis petiolatis*; *caulinis sessilibus sagittatis*: *siliquis compresso-planis*. *Bert. l. c.* - *Vivian. Ann. Bot. 2. p. 132.*

*10. Maggio 1870.*  
772. *T. hirsuta* \* *planisiliqua*. *Pers. E.* *Arabis hispida*. *Enc. (non Linn.) T. Segu. Veron. 1. p. 383.* *T. n. 2, var. Ger. Gallopr. 367.* *T. Lobel. ic. 220.* *Turrita vulgarior*. *Clus. H. 126.*

Ad muros, et in sylvaticis arenosis, saxosis vulgaris. Perenn. Floret Aprili, Majo. Fl. albi.

Caulis sub-bipedalis, inferne tantum hirsutus pilis simplicibus furcatisque. Folia radicalia ovato-oblonga in petiolum attenuata; caulina sagittata, dentibus paucis acutis, omnia ciliata. Racemus florens sub-corymbosus, fructiferus sub-pedalis erectus, mox superne natans; siliquae compresso-planae, striatae, nitidae, erectae.

Haec species a pluribus auctoribus, praeeunte Linnaeo, cum Turritide hirsuta fuit confusa, a qua se jungenda, ut monet Smithius in Fl. Br. 2. p. 717. *Bert. l. c.*

*(307) SINAPIS.*

*6. aprile 1871.*  
773. *ALBA*. *L. Siliquis hispidis, rostro longissimo ensiformi basi pubescente*; *pedunculis patentibus*: *foliis pinnatifido-sub-lyratis scabris*.

*S. alba*. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Smith Br.*\* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *Sinapi primum genus*. *Fuchs. H. 538.*

In tectis, muris, aggeribus vulgatissima. Ann. Floret Februario. Martio. Fl. flavi.

774. *ERUCOIDES*. *L. Siliquis laevibus, aequalibus*; *foliis lyratis*; *oblongis, glabris*: *caule scabro*. *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.*

S. erucoides. DC. Syn. - Bivon. Sic. Cent. 1. p. 77. Eruca sylvestris flore albo italicica. Barr. ic. 132. - Hort. Rom. 4. t. 35. In agris, marginibus nil communius. Perenn. Floret ab autumno ad aestatem. Fl. albi.

## (308) RAPHANUS.

775. RAPHANISTRUM. L. Foliis lyratis; siliquis teretibus, articulatis, laevis, unilocularibus. W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn.

R. raphanistrum. Smith Br. - Lois. G. Raphanistrum segetum flore luteo vel pallido. Hort. Rom. 4. t. 43. Raphanistrum flore albo striato. J. B. H. 2. p. 851.

In agris passim. Vulgo: rapaccidle. Ann. Floret Majo, Junio. Fl. lutei.

Folia sub hyeme excocata edulia.

be  
Anno 1871.

## CLASSIS XVI.

## MONADELPHIA.

## ORD. PENTAGYNYA.

- (309) *ERODIUM*. *Calix 5-phyllo. Petala 5. Filamenta 5 sterilia, fertilibus alternantia. Glandulæ 5 melliferae ad basim staminum. Arilli 5, monospermi, aristati, aristis spirilibus introrsum basatis, stylo persistenti adnatis.*

## ORD. DECANDRIA.

- (310) *GERANIUM*. *Calix 5-phyllo. Petala 5 regularia. Stamina 10, 5 alterna longiora glandulis 5 melliferae ad basim. Arilli 5, monospermi, aristati, aristis nudis stylo persistenti adnatis.*

## ORD. POLYANDRIA.

- (311) *ALTHÆA*. *Calix duplex: interior 5-fidus, exterior profunde 6-9-fidus. Capsulae plurimae monospermae.*
- (312) *MALVA*. *Calix duplex: interior 5-fidus, exterior 5-phyllo. Capsulae plurimae monospermae in orbem dispositae.*
- (313) *LAVATERA*. *Calix duplex: interior 5-fidus, exterior monophyllus, trifidus. Capsulae plurimae in orbem dispositae.*
- (314) *MALOPE*. *Calix duplex: interior 5-partitus, exterior 3-phyllo. Capsulae plures, capitato-aggregatae, monospermae.*

## MONADELPHIA PENTANDRIA.

- (309) *ERODIUM*.

776. *CICONIUM*. *W. Sp. Pedunculis multifloris; foliis interrupte bipinnatifidis, laciniatis; petalis oblongis, obtusis, binis emarginatis: caule erectiusculo, scabro.*  
*E. ciconium. Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 198.\* Geranium ciconium. L. - All. Ped. - Cavaill. Diss. 4. t. 95. f. 2. - Bivon. Sic. Cent. 2. Geranium apulum coriandrifolio. Col. ephr. 1. p. 156. t. 155. G. chrisanthemi eretici folio, etc. Bocc. mus. 2. p. 39. t. 83.*

- In marginibus herbosis non rarum . *Alla Trinità de' Monti , nella Villa Ludovisi , etc.* Ann. Floret Aprili . Fl. coeruleo-violacei .
777. CICUTARIUM . *L. Herit.* Pedunculis multifloris , hirtis : foliis pinnatis ; pinnis oblongis , pinnatifidis , incisis : corollis calyce majoribus : caule prostrato , hirta .
- E. cicutarium . W. Sp. - Smith Br. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 197.\* Geranium cicutarium . L. - All. Ped. G. chaerophyllum . Cavan. Diss. 4. t. 95. f. 1. G. septimum sive G. gruinum . Dod. Pempt. 64.*
- In aggeribus , ad vias commune . Perenn. Floret Aprili , Majo . Fl. purpurei .
778. ROMANUM . *W. Sp.* Acaule : pedunculis multifloris ; foliis pinnatis , pinnis ovatis pinnatifidis : petalis aequalibus calyce majoribus . *Pers. E.*
- E. romanum . Lois. Notic. p. 98. Geranium romanum . L. - Cavanill. Diss. 4.t.94.f.2. - Bivon. Sic. Cent. p. 40. G. myrrhinum tenuifolium , etc. Barr. ic. 1245.*
- In plateis , aggeribus , pascuis vulgatissimum . Ann. Floret Martio , Junio . Fl. purpurei .
779. MOSCHATUM . *L' Herit.* Pedunculis multifloris ; foliis pinnatis ; foliolis sub-petiolatis , basi inaequalibus , ovalibus , inciso-dentatis : petalis aequalibus calyce majoribus : caule procumbente .
- E. moschatum . W. Sp. - Smith Br. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 198. Geranium moschatum . L. - All. Ped. - Cavanill. Diss. 4. t. 94. f. 1. - Rivi. Pentap. t. 110.*
- In aggeribus , plateis frequens . Ann. Floret Martio , Aprili . Fl. purpurascentes . - Moschum redolent .
780. LACINIATUM . *W. Sp.* Pedunculis 5-8-floris glabris : foliis bipinnatifidis , lacinulatis linear-lanceolatis ; stipulis involucrisque scariosis : caule prostrato .
- Geranium laciniatum . Cavanill. Diss. 4. p. 228. t. 113. f. 3. - Desf. Atl. 2. - Bivon. Sic. Cent. 2. p. 27. G. etc. Cup. Panph. 2. t. 11, 150, 257.*
- In pascuis maritimis . Presso Ostia . Ann. Floret Majo . Fl. purpurascentes .
- Caules prostrati , sesquipedales , inferne uti et petioli hispidi , pilis deflexis . Petioli oppositi , alterne altiores ; inferiores folio triplo etiam longiores , superiores brevissimi . Folia viridia , glabriuscula , margine breviter ciliata ; primaria ovata , sub-lobata , crenata et sub-incisa ; reliqua profunde pinnatifida , pinnis paucis , inferioribus tantum iterum pinnatifidis ; segmentis omnibus linear-lanceolatis acutis . Pedunculi folio longiores 5-8-flori et pedicelli glaberrimi . Stipulae et involucra obtusa , membranaceo-scariosa , grandiuscula . Calycina segmenta api-*

15.  
Maggio 1881

ce acuminata , seta terminata , extus pilis simplicibus sursum versis hispida . Acusesqui-bi-unciale , subulatum , hispidulum .

781. BOTRYS'. Bertol. Opusc. Scient. Bol. Fasc. 3. p. 155.\* Hispidum : pedunculis bifloris : foliis sinuato-pinnatifidis , segmentis obtusis , dentatis : caule erecto . Bert. l. c.

E gruinum β. W. Sp. E. gruinum \* botrys . Pers. E. Geranium botrys . Cavanill. Diss. 4. p. 218. t. 90. f. 2. G. supinum botrys folio aco sursum spectante . Bocc. Mus. p. 145. t. 109.

*Ad Albano sul margine della strada fra S. Paolo ed i Capuccini . Ann. Floret Majo ineunte . Fl. purpurascentes .*

Caulis erectus ( apice nutans , 6-10-pollicaris ) , inferne hispidus setis albis deflexis . Folia sinuato-pinnatifida ; segmentis oblongis , obtusis , dentatis , superioribus successive minoribus .... Folia caulina superiore brevius aut vix petiolata , segmentis angustioribus , acutis .... Bert. l. c. Pedunculi 2-3-flori , pedicelli et calyces pilis patentibus glanduliferis vestiti .

782. MALACOIDES . W. Sp. Pedunculis multifloris : foliis cordatis sub-lohatis , obtusis ; caule declinato . Savi B. Etr. 2. p. 199.

E. malacoides . Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Geranium malacoides . L. - All. Ped. - Cavanill. Diss. 4. t. 91. - Lob. ic. 662. G. 6. Matth. p. 907.

In marginibus herbosis communie . Ann. Floret Martio , et tardius . Fl. purpureo-sub-violacei .

783. MARITIMUM . L' Herit. Pedunculis 2-3-floris : foliis cordatis , incisis , orenatis , scabris ; inferioribus longissime petiolatis : aristis imberibus ; caulis depresso .

E. maritimum . Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 199. Geranium maritimum . L. - All. Ped. - Cavan. Diss. 4. p. 218. t. 88. f. 1. G. pusillum supinum maritimum , etc. Pluk. Phyt. t. 31. f. 4.

In arena maritima . Presso Ostia ... Ann. Floret Majo . Petala carnea , fugacia .

### MONADELPHIA DECANDRIA .

#### (310) GERANIUM .

784. SANGUINEUM . L. Pedunculis unifloris : foliis orbiculatis , 5-7-partitis , laciinis trifidis . Savi B. Etr. 2. p. 200.\*

G. sanguinenm . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Cavanill. Diss. 4. t. 76. f. 1. - Bivon. Sic. Cent. 1. p. 41. G. septimum haemathodes . Clus. H. 2. p. 102.

In umbris , sylvaticis mentium . Intorno ad Albano , sul

*Monte Artemisio, Monte Gennaro, etc. Perenn. Floret Junio. Fl. sanguinei, majusculi.*

785. *PHÆUM . L. Pedunculis bifloris oppositifoliis, foliis alternis, hirsutis, palmato-quinquelobis, dentato-inceisis: calycibus sub-aristatis; petalis undulatis: caule erecto.* *Lois. G.*

*G. phaeum . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn. - Cavan. Diss. 4. p. 210. t. 89 f. 2. G. columbinum majus . Hort. Rom. 5. t. 19.*

*In elatioribus subapenninis ad sepes . Perenn. Floret Junio, Julio . Fl. purpurei.*

786. *LUCIDUM . L. Pedunculis bifloris: foliis lucidis 5-lobis rotundatis: calycibus transverse corrugatis: arillis multi-carinatis . DC. Syn.*

*G. lucidum . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Cavan. Diss. 4. t. 80. f. 2. - Savi B. Etr. 2. p. 208. - Bivon. Sic. Cent. 1. p. 41. G. rotundifolium saxatile montanum . Col. ephr. 1. p. 138. t. 137.*

*In montium saxosis, praesertim ad rupes umbrosas roridas frequens . Intorno ad Albano, Nemi, Genzano, etc. Ann. Floret Majo, Junio. Petala rosea, integra.*

787. *MOLLE . L. Pedunculis bifloris folio longioribus: foliis alternis, reniformi-rotundatis 7-9-lobis, lobis 3-fidis obtusis: petalis bifidis calyce longioribus: arillis glabris transversim rugosis; seminibus laevibus.*

*G. molle . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 203.\* - Cavan. Diss. 4. t. 83. f. 3. G. columbinum villosum, petalis bifidis purpureis. Vaill. Par. 15. f. 3.*

*In marginibus viarum, ad sepes et in sylvaticis vulgatissimum . Ann. Floret Aprili, Majo. Petala bifida rubro-violacea venis purpureis.*

788. *COLUMBINUM . L. Pedunculis bifloris folio multo longioribus: foliis oppositis 5-partitis, lobis multifidis linearibus: petalis emarginatis longitudine calycis aristati; arillis glabris; seminibus reticulatis.*

*G. columbinum . All. Ped. - Smith. Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 203.\* G. dissectis foliis, pedunculis florum longissimis . Vaill. Par. t. 15. f. 4.*

*In nemorosis collinis et montanis commune . Sul Monte Mario, nella Valle dell' Inferno, etc. Ann. Floret Majo, Junio. Petala pallide coerulea . - Planta gracilis.*

789. *DISSECTUM . L. Pedunculis bifloris folio brevioribus: foliis oppositis reniformi-rotundatis 5-partitis, segmentis dissectis: petalis emarginatis, capsulis hirsutis; seminibus reticulatis .*

apriile 1801  
Varietate flora  
alba, petala angustiora,  
tiora, tardiora.

apriile 1801  
Maggio, 6. 1801

apriile 1801

G. dissectum . *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 204. - *Cavan. D.* 4. t. 78. f. 2.

In humidis pratis , marginibus umbrosis frequens . Ann. Floret Aprili . Petala purpurea calycem aristatum sub-aequantia .

*3. Mayj. 1809.* 790. RETUNDIFOLIUM . *L.* Pedunculis bifloris : foliis oppositis , reniformi-rotundatis , sub-lobatis , incisis , pubescentibus : petalis integris ; arillus hirsutis ; seminibus reticulatis .

*G. rotundifolium* . *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 204. - *Cavanill. D.* 4. t. 93. f. 2. *Pes columbinus* seu alterum geranium . *Lob. ic.* 658. - *Dod. Pempt.* 61.

In marginibus viarum , plateis , ad muros commune . Ann. Floret Aprili , Majo . Fl. pallide rubri calyce vix longiores .

791. ROBERTIANUM . *L.* Pedunculis bifloris : foliis ternatis quinatisque pinnatifidis : petalis integris calyce decanguli aristato duplo longioribus : arillus reticulatis .

*G. robertianum* . *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 205. - *Cavan. D.* 4. t. 86. f. 1. - *Lob. ic.* 657. - *Dod. Pempt.* 62.

In sylvaticis , muris umbrosis , ad sepes vulgatissimum . Ann. Floret Majo , Junio . Fl. purpurei . - *Odor hircinus* .

### MONADELPHIA POLYANDRIA .

#### (311) ALTHEA .

792. OFFICINALIS . *L.* Foliis tomentosis sub-ovatis angulatis , obscure trilobis ; floribus sub-racemosis axillaribus , terminalibusque .

*A. officinalis* . *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 71. *A. ibiscus* . *Dod. Pempt.* 644. *A. Dioscoridis et Plinii. Hort. Rom.* 1. t. 46.

In pratis depresso communis . Offic: *altea* . Perenn. Floret Julio , Augusto . Fl. carneo-purpurascentes .

793. CANNABINA . *L.* Foliis tomentoso-scabris ; inferioribus palmato-digitatis ; summis ternatis , foliolo intermedio longissimo . *DC. Syn.*

*A. cannabina* . *All. Ped.* . - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 72.\* *Alcea fruticosa* *cannabinae* folio . *Clus. H.* 25.

In pascuis , aggeribus , sylvarum oris frequens . Perenn. Floret Junio , Julio . Fl. rosei .

794. HIRSUTA . *L.* Foliis cordato-rotundatis , obtuse quinque-

MONADELPHIA POLYANDRIA.

227

- Lobis*, summis profunde 3-lobis : pedunculis unifloris solitariis : caule hirsuto.  
*A. hirsuta*. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC.*  
*Syn.* - *Saci B. Etr.* 2. p. 72. *Alcea villosa*. *Dalech. H.* 594.-  
*J. B. H.* 2. p. 1067.

In montanis ad vias, sepes. *Presso Rio-freddo*, etc. Ann.  
*Floret Junio*. Fl. roseo-coerulecentes.

(312) MALVA.

A. Pedunculis axillaribus confertis.

795. ROTUNDIFOLIA. *L.* Caule prostrato ; foliis cordato-orbiculatis, obsolete quinquelobis : pedunculis fructiferis declinatis. *L.* - *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC.*  
*Syn.* - *Saci B. Etr.* 2. p. 73.

*M. sylvestris repens* pumila. *Lob. ic.* 651. - *Dod. Pempt.* 653.  
 In ruderatis, plateis, herbosis passim. Vulgo : *malva*. Ann.  
*Floret Junio*, et tardius. Fl. carnei, striis saturatis.

796. SYLVESTRIS. *L.* Caule erecto, ramoso ; foliis alternis, 5-7-lobis, obtusis ; pedunculis petiolisque pilosis. *Saci B. Etr.* 2. p. 73.

*M. sylvestris*. *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC.* *Syn.* *M. sylvestris procerior*. *Dodon. Pempt.* 453.

In aggeribus, herbidis, ad sepes communis. Perenn. Floret Majo. Petala late emarginata, purpurascens.

B. Pedunculis solitariis.

797. ALCEA. *L.* Caule erecto, pilis radiantibus : foliis scabriusculis ; inferioribus rotundatis, crenatis, sub-quinquelobis ; caulinis palmatis pinnato-dentatis : calycis exterioris foliolis ovalibus.

*M. alcea*. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC.* *Syn.* *Alcea vulgaris*. *Clus. H.* 2. p. 25.

In montibus ad sepes, vias umbrosas communis. Intorno ad Albano, Nemi, Palombara, sui Cimini, etc.

(313) LAVATERA.

798. HISPIDA. *Desf. Atl.* 2. p. 118. t. 171. Caule fruticoso, piloso, pilis fasciculatis ; foliis superioribus trilobato-hastatis, dentatis, tomentosis : pedunculis axillaribus unifloris, brevissimis, solitariis, calyceque fasciculato hirtis.

*L. hispida*. *W. Sp.* - *Pers. E.*

In umbrosis, sylvaticis oris. Fra Nemi e Genzano. Frut. Floret Julio. Fl. purpureo violacei. - Saponem spirat.

799. TRILOBA. *L.* Caule frutescente : foliis cordato-rotundatis, crenatis ; superioribus sub-trilobis : stipulis cordatis, pedunculis unifloris, aggregatis.

*L. triloba*. *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC.* *Syn.* - *Carvanilla D.* 2. p. 87. t. 31. f. 1.

Super rudera antiqua. Nell'anfiteatro Flavio ... Fratic. Floret Junio . Fl. dilute purpurei.

300. PUNCTATA. *All. auct. 26.* Caule herbaceo punctato-scabro : foliis sub-tomentosis ; inferioribus orbiculato-cor-datis , summis trilebis : pedunculis solitariis folio lon-gioribus . *W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 75.*\*

In aggeribus viarum, ad sepes communis . Ann. Floret Junio , Julio . Fl. dilute purpurei , majusculi .

(314) MALOPE .

301. MALACOIDES . *L.* Caule adscendente : foliis ovato-oblon-gis , obtusis , crenatis : pedunculis axillaribus , solitariis , folio longioribus .

*M. malacoides . W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 76. - Cavan. D. 2. p. 84. t. 27. f. 1. Malva betonicae folio . Bocc. Sic. 15. t. 8. f. 2. Alcea betonicae folio flore purpureo violaceo . Barr. ic. 1189.*

In agris mare versus copiose . A Ponte Galera , presso Cor-neto , Civitaceccchia , etc. Ann. Floret Junio . Fl. rubri striis violaceis .

Folia floralia indivisa , vel plus minus profunde triloba , interdum sub-hastata lobo medio lanceolato .

## CLASSIS XVII.

## DIADEPHIA.

## ORD. HEXANDRIA.

- (315) *CORYDALIS*. *Calix minimus*. *Corolla ringens*. *Petala 4 irregularia*, *unicum calcaratum*. *Filamenta diadelpha*, *singulus fasciculus antheras 1-3 gerens*. *Capsula siliquosa polysperma*.
- (316) *FUMARIA*. *Calix minimus*. *Petala 4 irregularia*, *unicum calcaratum*. *Staminum filamenta diadelpha*; *fasciculus singulus antheras 3 gerens*. *Nux sphoerica unilocularis*, *monosperma*. *Semen parieti adfixum*.

## ORD. OCTANDRIA.

- (317) *POLYGALA*. *Calix 5-phyllo*, *foliolis duobus majoribus alae-formibus*, *vel triphyllus foliolo superiore maiore*. *Corolla irregularis limbo bilabiato*. *Capsula compressa*, *obcordata*, *bilocularis*.

## ORD. DECANDRIA. \*)

Sect. I. Stamina monadelpha.

- (318) *SPARTIUM*. *Calix deorsum productus*. *Carina, quibusdam pendula*. *Filamenta germini adhaerentia*. *Stigma longitudinale supra villosum*. *Legumen oblongum mono-poly-spermum*. -*Folia trifoliata*, *vel simplicia*.
- (319) *GENISTA*. *Calix bilabiatus*, *labio superiore bidentato*, *inferiore 3-dentato*. *Vexillum oblongum a pistillo staminibusque deorsum reflexum*. -*Folia trifoliata*, *vel simplicia*.
- (320) *ULEX*. *Calix diphyllus bi-bracteatus*. *Carina dipetala*. *Legumen turgidum vix calyce longius*. -*Folia trifoliata*.
- (321) *CYTISUS*. *Calix bi-labiatus*, *labio superiore bidentato*. *Carina erecta*. *Legumen basi attenuatum*. -*Folia trifoliata*; *flores lutei*.
- (322) *ONONIS*. *Calix 5-partitus*, *laciinis linearibus*. *Vexillum striatum*. *Legumen inflatum sessile*. -*Folia trifoliata*, *vel simplicia*.

\*) *Stamina 10*, *in nonnullis monadelpha*, *in pluribus diadelpha*, *nempe filamentis 9 coalitis*, *unico libero*. - *Flos papilionaceus*. - *Legumen*.

- (323) *LUPINUS*. *Calix* 2-la*tatus*. *Antherae* 5 *oblongae*, 5 *sub-rotundae*. *Carina* *dipetala*. *Legumen* *coriaceum*, *t*  
*rulosum*, *polyspermum*. -*Folia* *digitata*.
- (324) *ANTHYLLIS*. *Calix* *ovato oblongus*, *medio inflatus*, *ore connivens*, *persistens*, 5-dentatus. *Legumen* *parvum* 1-2-  
*spermum* *calyce tectum*. -*Folia* *impari-pinnata*.
- Sect. II. *Stamina diadelpha*. *Legumen* *articulatum*, sc.  
*transverse multiloculare*, *loculis monospermis* *sponite non dehiscentibus*.
- (325) *CORONILLA*. *Calix* *campanulatus bilabiatus*, *supra bidentatus* *dentibus approximatis*, *infra 3-dentatus*. *Petal*  
*longe unguiculata*. *Legumen* *teres*, *articulatum*, *ut isthmis interceptum*. *Semina oblonga*, *aut cylindrica*.  
-*Folia impari-pinnata* : *flores umbellati*.
- (326) *SECURIGERA*. *Flores Coronillae*. *Legumen* *compressum*,  
*articulatum*, *longe subulato-cornutum*. *Semina parallelepiped*a.  
-*Folia impari-pinnata* : *flores umbellati*.
- (327) *ORNITHOPUS*. *Calix* 5-dentatus, *tubulosus*. *Carina minima*. *Legumen* *arcuatum*, *gracile*, *teres*, *acutum*,  
*articulatum*, *articulis cylindricis*. -*Flores umbellati*.
- (328) *HIPPOCREPIS*. *Calix* *inaequaliter 5-dentatus*. *Vexilli unguis calyce longior*. *Legumen* *oblongum compressum*,  
*membranaceum*, *articulatum*, *curvum*, *altera sutura emarginato-dentatum*.
- (329) *SCORPIURUS*. *Calix* 5-fidus. *Carina inferne bifida*.  
*Legumen* *oblongum*, *coriaceum*, *revolutum*, *sulcatum*,  
*articulatum articulis contractis*. -*Flores umbellati*.
- (330) *HEDYSARUM*. *Calix* 5-fidus, *persistens*. *Carina magna*, *transversim obtusa*. *Legumen* *articulis orbicularibus*,  
*compressis*, *laevibus aut tuberculosis*. -*Folia impari-pinnata*.
- Sect. III. *Stamina diadelpha*. *Legumen* *biloculare*, saepi-  
mento longitudinali interdum incompleto.
- (331) *ASTRAGALUS*. *Calix* 5-dentatus. *Carina obtusa*.  
*Legumen* *biloculare*, *aut sub-biloculare*, *sutura inferiore intro-flexa*. -*Folia impari-pinnata*.
- (332) *BISERRULA*. *Calix* 5-dentatus. *Carina obtusa*. *Legumen* *biloculare compressum*, *valvis dorso sinuato-dentatis*.
- Sect. IV. *Stamina diadelpha*. *Legumen* *uniloculare*.
- §. 1. *Folia abrupte pinnata*, *seta aut cirrho terminata*.
- (333) *OROBUS*. *Calix* 5-fidus, *laciinis 2 superioribus pro-*  
*fundioribus*, *brevioribus*. *Stylus* *gracilis*, *linearis*, *api-*  
*ce hirsutus*. *Legumen* *oblongum*, *teretiusculum*, *poly-*  
*spermum*.
- (334) *LATHYRUS*. *Calix* 5-fidus, *laciinis 2 superioribus brevioribus*. *Stylus* *planus*, *apice latiusculus*, *antice*

- villosus*. Legumen oblongum, polyspermum. -Folia petiolo cirrhoso, foliolis conjugatis, vel simplicia.
- (335) *PISUM*. Calix 5-fidus, laciinis binis superioribus brevioribus. Stylus 3-gonus, supra carinatus; stigma hirsutum. Legumen oblongum, polyspermum.
- (336) *VICIA*. Calix tubulosus, 5-fidus, laciinis binis superioribus brevioribus. Stylus filiformis angulo recto cum ovario, superne et subtus apice villosus. Legumen oblongum, polyspermum.
- (337) *ERVUM*. Calix 5-partitus, laciinis linearibus acutis corollam subaequantibus. Stigma capitatum, glabrum. Legumen oblongum 2-5-spermum.
- §. 2. *Folia impari-pinnata*.
- (338) *COLUTEA*. Calix 5-fidus. Carina obtusa. Stylus per totam longitudinem deorsum barbatum. Legumen inflatum, sutura superiore intus tumida, seminifera, dehiscente.
- (339) *GALEGA*. Calix campanulatus, dentibus 5 subulatis subaequalibus. Legumen oblongum erectum, compressum, saepius torulosum. -Folia impari-pinnata, in quibusdam trifoliata.
- §. 3. *Folia trifoliata*.
- (340) *PSORALEA*. Calix 5-fidus, punctis callosis, persistens. Carina dipetala. Legumen monospermum, sub-rostratum, evalve, calycis longitudine.
- (341) *MELILOTUS*. Calix tubulosus, 5-dentatus. Carina simplex, alis vexilloque brevior. Legumen calyce longius. Flores laxe racemosi.
- (342) *TRIFOLIUM*. Calix tubulosus, 5-dentatus, persistens. Carina simplex, alis vexilloque brevior. Legumen minimum 1-2-spermum calyce tectum. -Flores capitati.
- (343) *LOTUS*. Calix tubulosus, persistens. Alae vexillo breviore, sursum connientes. Filamenta cuneiformia. Legumen oblongum erectum sub-cylindricum, interdum tetrapterum.
- (344) *DORYCNIUM*. Calix 5-dentatus, bilabiatus. Filamenta subulata. Stigma capitatum: Legumen calyce paullo magius 1-2-spermum.
- (345) *TRIGONELLA*. Vexillum et alae subaequales, patentes, corollam tripetalam mentientes. Carina minima. Legumen oblongum, compressum, vel cylindricum, polyspermum.
- (346) *MEDICAGO*. Calix sub-cylindricus, 5-fidus. Carina a vexillo sub-remota. Legumen polyspermum, forma varium, falcatum, vel in spiram contortum. -Flores saepius lutei.

## DIADELPHIA HEXANDRIA.

## (315) CORYDALIS.

25.  
Mayo 1891.

802. BULBOSA . Pers. E. Caule simplici ; racemo terminali ; bracteis oblongis , pedunculo longioribus ; foliis bibernatis , oblongis , acutiusculis : radice tuberosa , cava . W. Sp. ( sub Fumaria ).

1.  
April 1890.

C. tuberosa . DC. Syn. Fumaria bulbosa . L. - All. Ped. - Lois. G. Radix cava major . Dod. Pempt. 327. - Clus. H. 271.

In montium sylvis frequens . Copiosamente sul Monte Caci presso Rocca di Pupa , etc. Perenn. Floret Aprili , Majo. Fl. albidi vel saturate rosei .

803. DIGITATA . Pers. E. Caule simplici ; racemo terminali ; bracteis cuneatis , digitatis , pedunculo longioribus : foliis bibernatis ; radice bulbosa , solida. DC. Syn. ( sub C. bulbosa ).

Fumaria Halleri . W. Sp. - Lois. G. F. solida . Smith Br. \* Radix cava minor . Dod. Pempt. 527.

In montium sylvis . Pluries laudatus Leander Ciuffa benevolè communicavit specimina a se inventa in montibus Tuscanianis presso Monte Compatri . Perenn. Floret Aprili , Majo. Fl. rosei , vel albidi .

804. LUTEA . Pers. E. Caule diffuso , ramoso , obtusangulo ; capsulis 6-8-spermis corolla brevioribus : bracteis minimis lineari-subulatis ; foliis bipinnatis : radice fibrosa . DC. Syn.

Fumaria lutea . L. - Smith Br. \* - W. Sp. - Lois. G. F. corydalis . Matth. Valgr. 1160.

In montium sylvis . Sul Monte Gennaro .... Perenn. Floret Majo , Junio . Fl. flavi .

## (316) FUMARIA .

6 Magg. 1891.

805. CAPREOLATA . L. Caule ramoso , scandente : foliis triternatis ; foliolis obovato-cuneatis , incisis , petiolis partitibus cirrhoso-convolutis ; nucibus globosis .

F. capreolata . Smith Br. \* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 1. p. 170. \*

Ad sepes ubique frequens . Ann. Floret Aprili et tardius . Fl. albo-carnei , apice atro-sanguinei .

806. OFFICINALIS . L. Caule ramoso , diffuso : foliis supra-decompositis ; foliolis cuneiformi-lanceolatis , incisis : nucibus globosis , apice retusis .

F. officinalis . All. Ped. - Smith Br. \* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 1. p. 169. F. Matth. Valgr. 1158.

In cultis , ad vias ubique vulgaris . Off: sumaria . Ann. Floret Martio-Augusto . Fl. rosei apice saturatiore .

807. PARVIFLORA . Lam. Enc. Caule ramoso , diffuso : foliis su-

- pra-decompositis ; foliolis tripartitis , linearibus , canaliculatis : spicis laxis , nucibus globosis , apice acuto .  
 W. parviflora . Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. F. spicata β. Syst. Nat. ed 13. F. foliis tenuissimis . floribus albis circa Monspelium nascens . Vail. Par. 56. t. 10. f. 5.  
 In cultis , vineis , viis frequens . Ann. Floret Aprili ad aestatem . Fl. albi apice purpurei .

## DIADELPHIA OCTANDRIA .

## (317) POLYGALA .

10. Maggio 1817

808. VULGARIS . L. Floribus cristatis , racemosis ; alis calycinis trinerviis , obtusis , ovatis , corolla vix longioribus : caulinibus procumbentibus ; foliis linear-lanceolatis . W. Sp. - Pers. E. - Lois. G.  
 P. vulgaris . All. Ped. - Smith Br. - DC. Syn. P. major . Vail. Par. t. 32. f. 1.  
 In apricis montium . Sul Monte Gennaro nel gran prato .... Perenn. Floret Majo , Julio . Fl. coerulei .  
 809. MONSPELIACA . L. Floribus cristatis , racemosis ; alis calycinis reticulatis , acutis , corolla longioribus : foliis linear-lanceolatis acutis . W. Sp. - Pers. E. - Lois. G.  
 P. monspeliaca . All. Ped. - DC. Syn. P. vulgaris coloris obsoleti , foliis angustissimis . J. B. H. 3. p. 388.  
 In pratis sterilibus , collinis circa urbem , et ad muros . Nella Villa Pamphilj , sul Monte Mario , sul Colosseo , etc. Ann. Floret Majo , Junio . Fl. dilute lutei .  
 810. FLAVESCENS . DC. Cat. H. Monsp. p. 134. Floribus cristatis , racemosis ; bracteis ternis caducis ; alis calycinis ellipticis utrinque acutis , corolla capsulaque longioribus : foliis linear-sub-lanceolatis . DC. l. c. - Sebast. Rom. Pl. Fasc. 1. p. 6. t. 1.\*  
 P. major floribus luteis . Raii H. 639. P. lutea . C. B. P. 215.  
 P. tertia sive lutea . J. B. H. 3. p. 388.  
 In sterilibus agri Romani , Cornetani , Tiburtini , et in montibus Sabinis non infrequens . Perenn. Floret ab Aprili ad autumnum . Fl. lutei .  
 811. MAJOR . Murr. Syst. Veg. Floribus cristatis , racemosis ; alis calycinis multinervis obtusis , mucronatis , corolla brevioribus : foliis linear-lanceolatis , acutis . W. Sp. - Pers. E.  
 P. orientalis linifolia flore magno purpureo . Buxb. Cent. 3. p. 40. t. 70. f. 1. P. vulgaris major . Clas. H. 1. p. 324.  
 In jugis sub-apenninis . Sul Monte Calvo presso Subiaco .... Perenn. Floret Junio , Julio . Fl. pulchre rosei .

## DIADELPHIA DECANDRIA.

Sect. I. *Stamina monadelpha*.

## (318) SPARTIUM.

20. Giugno 1891. 26  
812. JUNCEUM. L. Ramis oppositis, virgatis, apice floriferis; foliis lanceolatis glabris, W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Savi Tr. d. Alb. 1. p. 205.

Sp. junceum. All. Ped. Genista juncea. Scop. Carn. - DC. Syn. - J. B. H. 1. p. 395. Sp. dioscorideum narbonense et hispanicum. Lob. ic. 91.

In ericetis, collibus arenosis, sterilibus communis. Vulgo: *ginestra*. Frut. Floret Majo, Junio. Fl. lutei.

813. SCOPARIUM. L. Foliis ternatis solitariisque, oblongis: floribus axillaribus; leguminibus margine pilosis: ramis angulatis. W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Savi Tr. d. alb. 1. p. 207.

Sp. scoparium. All. Ped. Genista scoparia. Lam. - DC. Syn. G. scoparia vulgaris. Lob. ic. 89. G. Dod. Pempt. 761.

In ericetis, collibus sylvaticis, aggeribus viarum passim. Vulgo: *scopiglio*. Frut. Floret Aprili. Fl. lutei.

814. VILLOSUM. Vahl. Foliis ternatis, oblongo-ovatis: pedunculis axillaribus, calycibus leguminibusque villoso: ramis angulatis, spinosis. W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Savi B. Etr. 1. p. 171.\*

Sp. lanigerum. Desf. Atl. Cytisus lanigerus. DC. Syn.

In maritimis ericetis, collibus frequens. Intorno Cagliari abbondantemente, etc. Frut. Floret Aprili, Majo. Fl. lutei.

## (319) GENISTA.

815. JANUENSIS. Vivian. H. Bot. di Negro p. 10. Ramis argute triquetris: foliis simplicibus lanceolatis, margine cartilagineis, rameis inferioribus obtusis: leguminibus nudis. Bertol. Pl. Gen. 85. - Savi B. Etr. 1. p. 173.\*

G. scariosa. Vivian. Fl. It. Fragm. 1. p. 5. t. 8.\* - id. Ann. bot. P. 2. p. 175. - Lois. Notic. 104.

In subapenninis montibus. Sul Monte Gennaro.... Frut. Floret Majo, Junio. Fl. lutei.

20. 26  
Giugno 1891. 26  
816. TINCTORIA. L. Foliis lanceolatis, glabris; ramis teretibus, striatis, erectis: leguminibus glabris. W. Sp. - Pers. E. - Savi Tr. d. Alb. 1. p. 121.

G. tinctoria. All. Ped. - Lois. G. - DC. Syn. Genistella infectoria. Lob. ic. 2. p. 101. G. tinctoria vulgaris. Clus. H. 101.

Tuta planta, et folia pubescentia. In siccioribus collibus, et in dumetis sylvaticis montanis frequens. Vulgo: *ginestrella*. Frut. Floret Majo, Junio. Fl. lutei.

817. OVATA. Valdst. Hung. Foliis oblongo-ovatis legumini-

*busque hirsutis ; ramis teretibus , striatis . W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Savi Tr. d. Alb. 1.p. 121.*

*G. ovata . DC. Syn.*

*Cum praecedente sed minus frequens . Frut. Floret Majo . Fl. lutei .*

(320) ULEX.

818. EUROPAEUS . *L. Dentibus calycinis obsoletis , conniventibus , bracteis ovatis laxis , ramulis erectis . Smith Br.\* - W. Sp. - Lois. G. - DC. Syn.*

*U. europaeus . Pers. E. - Savi Tr. d. alb. 1.p. 227. Genista spinosa . Dod. Pempt. 759.*

*In ericetis , sylvis , etiam circa urbem . Vulgo : ginestrone . Frut. Floret Februario , Martio . Fl. lutei .*

(321) CYTISUS .

819. LABURNUM . *L. Racemis simplicibus pendalis : foliolis ovato-oblongis . L. - All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 242.\**

*Laburnum arbor trifolia anagyridi similis . J. B. H. 2.p. 361. In montibus Latii et Sabinae : in viridariis Romae passim colitur . Arbuse. Floret Majo .*

820. DIVARICATUS . *Ait. Kew. Racemis terminalibus erectis laxis ; calycibus leguminibusque glanduloso-muricatis : ramis patentibus ; foliolis longitudinaliter plicatis .*

*C. divaricatus . W. Sp. - Pers. E. - Savi B. Etr. 2. p. 245.\**

*C. complicatus . DC. Syn. Spartium complicatum . L. - Lois. G. C. hispanicus secundus . Lob. ic. 2. p. 47. - J. B. H. 1. p. 370.*

*In collibus circa Romam , et in Montium dumetis . Presso Frascati ; da Monte-Rosi a Viterbo sulla strada postale in gran copia , etc. Frut. Floret Julio , Augusto . Legmina fusca , scaberrima , viscida .*

821. SESSILIFOLIUS . *L. Racemis erectis ; calycibus bractea triplici ; leguminibus glabris : foliis superioribus sub-sessilibus .*

*C. sessilifolius . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 244.\* C. glaber siliqua lata . J. B. H. 1. p. 373.*

*In montibus frequens . Sul Monte Gennaro , etc. Frut. Floret Majo .*

822. TRIFLORUS . *L' Herit. Floribus pedunculatis , axillaribus , sub-ternis : foliolis ovatis , obtusis , mucronatis , hirsutis : leguminibus compressis , sub-arenatis , villosissimis .*

*C. triflorus . W. Sp. - Desf. Atl. 2. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Savi B. Etr. 2. p. 245.\* C. tertius . Clus. H. 94. C. hispanicus 4. Lob. ic. 2. p. 48.*

*In ericetis , collibus sylvaticis circa urbem nil communius . Frut. Fl. Aprili .*

823. *SUPINUS*. *L.* Villosus : floribus brevi-pedunculatis , sub-binatis , axillaribus ; ramis prostratis ; foliolis obovato-obtusis .  
*C. supinus* . *All. Ped.-W. Sp.-Pers. E.-Lois. G. C. septimus.*  
*Clus. H. 1. p. 97.*  
 In montium dumetis . *Sul Monte Albano alla Madonna del Tufo* , *sul Monte Gennaro* , etc. Frut. Floret Aprili , Majo . Legumina villis longis albidis vestita .
- (322) *ONONIS* .
824. *ARVENSIS* . *Enc.* Floribus sub-geminatis , axillaribus : foliis inferioribus ternatis , ovatis , sub-viscosis , serratis , ramisque spinosis villosis . *DC. Syn.*  
*O. arvensis* . *All. Ped. - Pers. E. - Turg. Inst. 3. p. 74* *O. arvensis* *β. Smith Br.* *O. spinosa* . *Syst. Veg. - W. Sp.-Lois. G. O. spinosa* *β. L.* *Anonis vulgaris spinosa* , flore purpureo . *Moris. Ox. 2. p. 169. t. 17. f. 1.*  
 In campis ubique . Perenn. Floret Majo , Junio . Fl. intense rosei .
825. *COLUMNÆ* . *All. Ped. 1166. t. 20. f. 3.* Floribus sub-sessilibus , lateralibus : foliis ternatis , oblongis , pubescentibus ; stipulis lanceolatis , denticulatis ; calycibus scarioris corolla longioribus . *W. Sp.*  
*O. Columnae* . *Saci 2 Cent. p. 158.\* - Lois. G. O. parviflora. Lam. Enc. - Pers. E. - DC. Syn.* *O. lutea sylvestris minima. Col. ecphr. 1. p. 304. t. 301.*  
 In sterilibus montosis . *A Tivoli presso S. Antonio* , *e sul Monte della Croce* , *presso Albano* . . . . Perenn. Floret Majo , Junio . Fl. lutei .  
 Folia suprema interdum simplicia .
826. *VARIEGATA* . *L.* Floribus sub-pedunculatis axillaribus ; foliis simplicibus , obovatis , striatis , serratis ; stipulis ovatis , dentatis : caule procumbente . *W. Sp. - Pers. E.-Lois. G.*  
*O. variegata* . *DC. Syn. - Saci 2 Cent. 156.\* - Biyon. Sic. Cent. 2. p. 38.* *Anonis maritima mitis* , folio lucido , serrato . *Bocc. Sic. 7. t. 38. f. 3.*  
 In arena maritima frequens . *Presso Ostia, a Fiumicino* , etc. Ann. Floret Aprili , Majo . Fl. lutei , lineis purpureis striati .
827. *VISCOSA* . *L.* Pedunculis unifloris , aristatis , longitudine foliorum : foliis simplicibus , oblongis , serratis , viscosis ; infimis ternatis . *W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn.*  
*O. viscosa* . *All. Ped. - Saci 2 Cent. p. 156.\* Anonis lutea viscosa latifolia minor flore pallido. Ba r. ic. 1239.*  
 In collibus maritimis . *Intorno Civitavecchia* . . . . Ann. Floret Majo , Junio . Fl. luteoli .
828. *RECLINATA* . *L.* Pusilla , pubescens , sub-viscosa : caule

ramoso patulo ; foliis ternatis , foliolis ovato-cuneiformibus , apice dentatis ; pedunculis muticis unifloris ; leguminibus cernuis . *Lois. G.*

*O. reclinata . W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn. O. mollis . Savii Mem. d. Soc. It. T. 9. - id. 2 Cent. p. 157. Anonis pusilla birsuta , flore ex albo et rubro colore mixto . Moris. H. 2. p. 171.*

In nemorosis collibus circa urbem . In copia al Settentrio- ne del Monte Mario .... Ann. Floret Junio . Fl. albi , ve- xillo roseo .

(323) LUPINUS .

829. ALBUS . *L. Racemis terminalibus , floribus alternis : calycis labii subaequalibus integris , dente setaceo utrinque interjecto : foliis digitatis , foliolis 5-7 ovato-oblongis ba- si cuneatis .*

*L. albus . W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. L. sa- tivus albo flore . Clus. H. 2. p. 228. L. sativus . Dod. Pempt. 529.*

In arvis sponte occurrit . Ann. Floret Majo . Fl. albi .

830. ANGUSTIFOLIUS . *L. Racemis lateralibus ; floribus alter- nis : calycis labio superiore bifido , inferiore integro vel apice tridentato , lacinula lanceolata utrinque interjecta : foliis digitatis , foliolis 7 linear-lanceolatis , obtusis , planis .*

*L. angustifolius . W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. L. angustifolius coeruleus elatior . Raii. H. 908.*

In arvis , praesertim maritimis haud infrequens . Ann. Flo- ret Aprili . Fl. coerulei , vel albi .

Caulis pubescens : folia angusta , sub-linearia , pilis rar- obsita , nec tota planta pilis ferrugineis longis densis vestita : calycis labium inferius apud nos frequentissime tridentatum .

(324) ANTHYLLIS .

831. TETRAPHYLLA . *L. Decumbens , herbacea : foliis quater- no-pinnatis , inaequalibus ; floribus lateralibus . DC. Syn.*

*A. tetraphylla . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. A. leguminosa vesicaria , lutea . Barr. ic. 554.*

In marginibus agrorum , collibus sterilibus ab urbis occi- dente frequens . Ann. Floret Majo , Junio . Fl. luteoli , carina saturatiore .

832. VULNERARIA . *L. Herbacea : foliis pinnatis , inaequalibus : capitulo terminali , duplicato . DC. Syn.*

*A. vulneraria . W. Sp. - Pers. E. - Lois. G.*

*a. Flore luteo .*

Loto affinis vulneraria pratensis . C. B. P. 332. Lagopodium flore luteo . Tabern. ic. 925.

*b. Flore rubro .*

Vulneraria supina flore coccineo . Dill. elth. 431. t. 320. f. 413.

16  
April 1891  
2. May 1891

16  
April 1891  
5. May 1891

16  
April 1891  
5. May 1891

$\gamma$ . Flore albo .

*Vulneraria rustica* flore albo . *Tourn. Inst.* 291.

*Var.  $\alpha$*  in montibus et pratis Sabinae . *Sul Monte Gennero*, etc.  $\beta$  et  $\gamma$  in collibus maritimis . *Presso Civitavecchia, nella campagna di Corneto*, etc. Perenn. Floret Aprili , Junio .

(333) MONTANA . *L.* Herbacea : foliis pinnatis, aequalibus, serratis : capitulo terminali globoso . *DC. Syn.*

*A. montana* . *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *A. incanus* tomentosus pallido globoso flore italicus . *Barr. ic. 1391. t. 722.*

In subappenninis jugis . *Sul Monte Calvo presso Subiaco ...* Perenn. Floret Junio , Julio . Fl. purpurei .

*Sect. II. Stanina diadelpha* . *Legumen articulatum*.

(325) CORONILLA .

(334) EMERUS . *L.* Fruticosa : pedunculis sub-trifloris ; petalorum unguibus calyce triplo longioribus ; caule angulato . *DC. Syn.*

*C. emerus* . *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Savi B. Etr. 2. p. 247.*\* *G. scorpioides* elatior . *Clus. H. 97.*

In collibus , ad muros , super urbis moenia . Frut. Floret Martio , Majo . Fl. lutei .

(335) VARIA . *L.* Herbacea , diffusa : foliis pinnatis , foliolis plurimis oblongo-ellipticis glabris , lomentis sub-pentagonis , erectis .

*C. varia* . *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn. Savi B. Etr. 2. p. 248.*\* *Securidaca dumetorum* major, etc. *Moris. H. 3. s. 2. t. 10. f. 4.*

Ad margines , sepes frequens circa urbem . Perenn. Floret Junio , Julio . Fl. albo , roseo et violaceo variegati .

(336) CRETICA . *L.* Herbacea : foliis pinnatis ; foliolis 11-15 cuneatis , retusis : lomentis erectis quinis .

*C. cretica* . *W. Sp.* - *Pers. E.* *C. cretica* herbacea flore parvo purpurascente . *Tourn. Cor. 44.*

Ad margines , in aggeribus herbosis communis . *Sul Pinicio* , nelle Ville Borghese , Pamphilii , etc. Ann. Floret Majo , Junio . Fl. rosei .

(326) SECURIGERA .

(337) CORONILLA . *DC. Syn.* Foliolis plurimis oblongo-cuneatis . *Coronilla securidaca* . *L.* - *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *Savi B. Etr. 2. p. 248.*\* *Securidaca vera* . *Clus. H. 236.* *S. lutea major* . *Hort. Rom.* 7. t. 27.

In marginibus , pratis vulgaris . Ann. Floret Majo , Junio . Fl. lutei .

(327) ORNITHOPUS .

(338) COMPRESSUS . *L.* Foliis pinnatis : floribus capitatis bractea suffultis ; leguminibus compressis , recurvatis , rugosis . *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.*

o. Magg: 1893

O. compressus. *All. Ped. Scorpioides leguminosa. Dalech.*  
*H. 493. Ornithopodium scorpioides siliqua compressa.*  
*Hort. Rom. 7. t. 28.*

In sterilibus collinis, montanis, ad margines viarum, oras  
 nemorum frequens. *Al Pigneto-Sacchetti, ad Albano etc.*  
*Ann. Floret Aprili, Majo. Fl. lutei.*

839. SCORPIOIDES. *L. Foliis ternatis subsessilibus; impari ma-*  
*ximo. L. - All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn.*

*Scorpioides Matthioli. Dod. Pempt. 71. - Riv. tetr. 210.*

In sterilissimis, muris frequens. *Copiosamente sul Colos-*  
*seo, sul Testaccio, etc. Ann. Floret Aprili, Majo. Fl.*  
*lutei.*

## (328) HIPPOCREPIS.

840. UNISILIQUOSA. *L. Leguminibus sessilibus, solitariis,*  
*erectis. L. - All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn.*

*Ferrum equinum vulgare. Col. ecphr. 1. p. 302. t. 300. - Hort.*  
*Rom. 7. t. 29.*

Ad margines in montosis, et collinis. *Sul Monte Mario*  
*alla Madonna del Rosario, sul Monte Gennaro ... Ann.*  
*Floret Junio. Fl. lutei.*

841. MULTISILIQUOSA. *L. Leguminibus pedunculis, confer-*  
*tis circularibus, margine altero lobatis. L. - All. Ped. -*  
*W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn.*

*Ferrum equinum alterum polyceraton. Col. ecphr. 1. t. 300.*

Ad margines cum praecedente. *Sul Monte Gennaro ....*  
*Ann. Floret Majo, Junio. Fl. lutei.*

## (329) SCORPIURUS.

842. SUBVILLOSA. *L. Pedunculis 2-4-floris: leguminibus ex-*  
*trorsum spinis confertis, longis, acutis. DC. Syn.*

*Sc. subvillosa. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Sa-*  
*vi B. Etr. 2. p. 238. Scorpioides bupleuri folio, corniculis*  
*asperis, etc. Moris. H. 2. s. 2. t. 11. f. 3.*

In sterilibus, viarum aggeribus communis. Ann. Floret  
 Majo, Junio. Fl. lutei.

## (330) HEDYSARUM.

843. CORONARIUM. *L. Caulescens, diffusum: foliis pinnatis,*  
*foliolis ellipticis, margine sub-hirsutis: leguminis articu-*  
*lis subrotundis, aculeatis, nudis.*

*H. coronarium. All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. -*  
*DC. Syn. H. clypeatum. Hort. Rom. 7. t. 30. Onobrychis*  
*altera. Dod. Pempt. 549.*

In aggeribus viarum quae ab urbe ad mare pergunt passim.  
 Perenn. Floret Janio. Fl. rubri.

*Sect. III. Stamina diadelpha. Legumen biloculare, sepimen-*  
*to longitudinali interdum incompleto.*

## (331) ASTRAGALUS.

844. HAMOSUS. *L. Caulescens, procumbens: foliolis cunea-*  
*tis, emarginatis; stipulis ovatis: racemis paucifloris, pe-*

dunculatis : leguminibus hamatis , subulatis ; glabris . W. Sp. - Pers. E. - Lois. G.

A. hamosus *All. Ped. - DC. Astr. 124.* A. Monspeliacus . Clus. H. 234.

In marginibus , herbosis obvius . *Sul Pincio , a Villa Partrizi , etc. Ann. Floret Majo , Junio . Fl. pallide lutei .*

**845. MONSPESSULANUS . L.** Acaulis : foliolis ellipticis , obtusis : scapis racemosis , declinatis , folio longioribus : vexillis elongatis ; leguminibus teretiusculis arcuatis . W. Sp. - Pers. E. - Lois. G.

A. monspessulanus . *All. Ped. - DC. Astr. 190.* A. purpureus perennis Monspeliensis . Moris. H. 2. p. 106.

In maritimis collibus , pascuis . *Presso Corneto , ad Ostia ... Perenn. Floret Martio , Junio . Fl. purpurascentes .*

**846. GLYCYPHYLLOS . L.** Caulescens , prostratus : foliolis glabris , ellipticis , mucronatis ; stipulis ovato-lanceolatis ; racemis pedunculatis folio brevioribus : leguminibus subtriquetris , arcuatis , glabris .

A. glycyphyllos . *All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn.* A. luteus perennis , procumbens , vulgaris . Moris. H. 2. p. 107. Glaux vulgaris . Clus. H. 133.

In umbrosis sylvaticis circa urbem et in montibus . *Alla Caffarella , alla Macchia de' Mattei , sul Monte Albano , sul Monte Gennaro , etc. Perenn. Floret Majo , Julio. Fl. albido-lutescentes .*

### (332) BISERRULA .

**847. PELECIINUS . L.** Pedunculis axillaribus 3-5-floris .

B. pelecinus . *All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Biv. Sic. Cent. 2. p. 12.* Securidaca peregrina . Clus. H. 2. p. 238. Hedyssarum congestis et utrinque lunatis silquis . Barr. ic. 1137.

In marginibus . *Sul Pincio vicino all' ingresso della passeggiata pubblica . Ann. Floret Majo. Fl. coeruleascentes .*

*Sect. IV. Stamina diadelpha . Legumen uniloculare .*

§. 1. Folia abrupte pinnata seta aut cirrho terminata .

### (333) OROBUS .

**848. VERNUS . L.** Foliis pinnatis 2-3-jugis , foliolis ovatis , acuminatis : stipulis semi-sagittatis integerrimis : caule simplici anguloso . *DC. Syn.*

O. vernus . *All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G.* O. pannonicus primus . Clus. H. 230.

§. Racemis 10-30-floris : vexillo reticulato-venoso .

O. variegatus . *Ten. Fl. Neap. Prod. Suppl. 1.p. 62.* Astragalus Diocordidis . *Column. Phytob. 48. t. 14.*

In umbrosis nemorosis circa urbem , et in montibus communis varietas §. *Nella Villa Borghese , etc. Perenn. Floret Martio , Aprili . Fl. purpureo-coerulei .*

Varietati dentes calycini bini superiores et inferior subulati, bini intermedi lanceolati. Racemus floribus 8 ad 20 quandoque etiam 30. Vexillum venis saturationis coloris pictum. Flores senio coerulecentes. Stipulae ovatae, semi-sagittatae, acutae, integrae. An vere distincta species? Janus Planchus in annotationibus ad Plytobasanon a citato Orobo Clusii non separat.

349. NIGER. *L.* Foliis pinnatis, 4-6-jugis, foliolis ovato-oblongis: racemorum pedunculis folio longioribus: caule ramoso, anguloso.

*O. niger*. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *O. pannonicus* secundas. *Clus. H.* 2. p. 230. *O. sylvaticus* viae foliis. *Rivin. t. 60.*

In elatis montibus sylvosis. *Sil Monte Artemisio* (communicavit doctus Botanicus Schow Danus.) Perenn. Floret Majo. Fl. coeruleo-purpurascentes.

(334) LATHYRUS.

A. Annui. Pedunculis 1-3-floris.

850. APHACA. *L.* Pedunculis unifloris: cirrhis aphyllis: stipulis sagittato-cordatis. *L.* - *All. Ped.* - *Smith Br.*\* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 2, p. 250.\*

*Aphaca*. *Dod. Pempt.* 545. - *Hort. Rom.* 8. t. 22.

In incultis, securis vias communis. Ann. Floret Aprili, Mayo. Fl. lutei.

851. NISSLIA. *L.* Pedunculis unifloris: foliis simplicibus linearibus, cirrhis nullis: stipulis subulatis.

*L. nissolia*. *L.* - *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 251.\* *Eryum sylvestre*. *Dod. Pempt.* 529. *Nissolia parva* flore purpureo. *Buxb. Cent.* 3. t. 45. f. 1.

In arvis sterilibus, et in montosis. *Alla Crescenza*, *Marcosimone*, etc. Ann. Floret Majo, Junio. Fl. rubelli, vexillo rubro.

852. OCHRUS. *DC. Syn.* Pedunculis unifloris: petiolis decurrentibus membranaceis diphyllis, stipulis nullis. *DC. l. c.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 251.\*

*Pisum ochrus*. *L.* - *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Lois. G.* *Ochrus palida*. *Pers. E.* *O.* seu *ervilia*. *Lob. ic.* 2. p. 68. *Ervilia sylvestris*. *Dod. Pempt.* 522. *O.* folio integro. *Hort. Rom.* 7. t. 19.

Inter segetes. *Presso Capo di Bove*, etc. Ann. Floret Majo, Junio. Fl. pallide flavi.

853. SATIVUS. *L.* Pedunculis unifloris, sub-flore articulatis: petiolis cirrhosis diphyllis tetraphyllisque: leguminibus ovatis, compressis, dorso bi-marginatis.

*L. sativus*. *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *Targion. delle Cicerchie* p. 58. - *id. Istit. t. 3.* p. 83. *L. an-*

guloso semine . J. B. H. 2. p. 306. L. sive cicerula . Dod.  
Pempt. 522.

In arvis, ad vias sponte occurrit . Vulgo : cicerchia . Ann.  
Floret Junio . Fl. purpurascentes vel albi .

- 20  
April 1801
- 854. COCCINEUS.** All. Ped. n. 1222. Pedunculis unifloris petio-  
lo diphyillo sub-aequalibus ; cirrho simplicissimo , foliolis  
lineari-ensiformibus nervosis : leguminibus teretiasculis ;  
seminibus rotundatis .

L. coccineus . Pers. E. L. sphoericus . Retz. - W. Sp. -  
Lois. G. - DC. Syn. L. axillaris . Lam. Dict. L. flore coc-  
cineo . Raii H. 896. L. foliis angustis , floribus singulari-  
bus coccineis . Segu. Ver. 2. p. 82.

In pratis , ad margines communis . Ann. Floret Aprili ,  
Majo . Fl. coccinei .

- 855. ANNUUS.** L. Pedunculis 1-2-floris ; petiolis cirrhosis ,  
alatis , diphyllis , foliolis ensiformibus ; stipulis bilobis  
subulato-linearibus : leguminibus compressis glabris .

L. annuus . W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Lathyri  
species lutea . J. B. H. 2. p. 304.

In arvis , ad sepes frequens . Ann. Floret Majo , Junio . Fl.  
lutei .

- 856. HIRSUTUS.** L. Pedunculis 1-2-3-floris : petiolis cirrhosis  
diphyllis , foliolis oblongo-lanceolatis mucronatis : legu-  
minibus hirsutis ; seminibus scabris .

L. hirsutus . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. -  
Lois. G. - DC. Syn. L. siliqua hirsuta . J. B. H. 2. p. 305.

In pratis subhumidis , ad fossas . Al Portonaccio , etc. Ann.  
Floret Junio , Julio . Fl. purpurascentes , dein viridi-coe-  
rulei .

- 857. ARTICULATUS.** L. Pedunculis 1-3-4-floris : petiolis ala-  
tis cirrhosis ; imis sub-aphyllis exstipulatis ; canlinis po-  
lyphyllis , foliolis sub-lanceolatis , oppositis alternisve ;  
stipulis semilunatis , integrerrimis vel basi appendiculatis .

L. articulatus . W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - L.  
auriculatus . Bertol. It. Pl. Dec. 2. p. 38.\*

In herbosis collibus , et sylvaticis passim . Ann. Floret Majo ,  
Junio . Fl. purpureo-rosei , maturitate coerulei , vexilo  
bianrito .

Distinctam speciem a L. articulato L. plantam nostram diju-  
dicaveramus cum cl: Bertolonio , ob pedunculos saepius  
3-4-floros , et stipulas semi-lunatas appendicula ad basim  
destitutas . Cum autem exemplaria non nulla possideamus  
in quibus appendicula haec , minutissima licet , conspi-  
cienda adest , tutius hoc referre censemus . Gaeterum  
adnotandum videtur , plantam hanc stipulas praesefere  
in summo caule ut plurimum latiores , caeterisque magis  
explicatas , in imo nullas ; insuper ludere foliolis ellipti-  
co-lanceolatis , et lanceolato-linearibus , interdum exacte

linearibus conjugatis, vel alternantibus, quod frequen-  
tissimum in foliis superioribus.

B. Pereenes: pedunculis multifloris.

858. PRATENSIS. L. Pedunculis multifloris: petiolis cirrhosis,  
sub-simplicibus, diphyllis, foliolis lanceolato-acutis: sti-  
pulis sagittatis acuminatis.

L. pratensis. All. Ped. - Smith Br\*. - W. Sp. - Pers. E. -  
Lois. G. - DC. Syn. - Rivin. tetr. t. 45. L. sylvestris du-  
metorum. J. B. H. 2. p. 30.

In pratis humidis, secus fossas communis. Perenn. Floret  
Majo, Junio. Fl. lutei.

859. SYLVESTRIS. L. Pedunculis multifloris: petiolis ramoso-  
cirrhosis diphyllis foliolis ensiformibus; internodiis alatis.

L. sylvestris. All. Ped. - Smith Br\*. - W. Sp. - Pers. E. -  
Lois. G. - DC. Syn. - Clus. H. 229. - Dod. Pempt. 523. La-  
thyri majoris species flore rubente, et albido, etc. J. B.  
H. 2. p. 302.

In nemorosis, dumetis communis. A Villa Pamfili, alla  
Crescenza, etc. Perenn. Floret Majo, Junio. Fl. roseo-  
purpurei, vexillo saturatiore, carina sub-virenti.

Foliis angustioribus linear-i-lanceolatis, vel amplioribus en-  
siformi-lanceolatis variat.

(335) PISUM.

860. ARVENSE. L. Petiolis teretibus sub-4-phyllis: stipulis ba-  
si dentatis: pedunculis 1-2-floris.

P. arvense. W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Pisi pul-  
chra species folio anguloso. J. B. H. 2. p. 297.

In arvis, et ad oras nemorum commune. Vulgo: pisellina.  
Ann. Floret Majo. Fl. rosei, alis atro-purpureis.

(336) VICIA.

A. Floribus racemosis.

861. ONOBRYCHIOIDES. L. Pedunculis multifloris folio longiori-  
bus; floribus distantibus; foliolis linearibus; stipulis se-  
mi-sagittatis linear-i-lanceolatis, basi dentatis. W. Sp. -  
Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn.

V. onobrychioides. All. Ped. 1198. t. 42. f. 1. V. onobry-  
chidis flore. C. B. Prod. 149.

In montium arvis. Lungo il Teverone presso Tivoli .... Ann.  
Floret Junio. Fl. violacei.

862. GRACCA. L. Pedunculis sub-20-floris folio longioribus;  
floribus deorsum imbricatis: foliis multijugis, foliolis ob-  
longo-lanceolatis, obtusiusculis; stipulis semisagittatis,  
segmentis linearibus.

V. Gracca. All. Ped. - Smith Br\*. - W. Sp. - Pers. E. -  
Lois. G. - DC. Syn. - Savi 2 Cent. p. 151.\* Cracca. Riv.  
tetr. 49.

In sepibus, viarum marginibus vulgaris. Perenn. Floret  
Majo. Fl. rubro-violacei, aetate coerulecentes.

1195

Signo 1871

3 Maggio 1871

aprile 1871

flor. alb.

20

Giugno 1871

Alternarum stipularum segmentum inferius saepissime desideratur. Foliola numerosa in quovis folio, villoso-secristea.

- TENUIFOLIA*. Roth. Germ. I. 509, II. 183. Pedunculis folio longioribus, floribus numerosis imbricatis: foliolis lanceolato-linearibus, acutis, trinerviis; stipulis linearibus, integerrimis.

*V. tenuifolia*. W. Sp. - Pers. E.

In sylvis Tusculanis presso Monte Compatri frequenter vidit et exemplaria communicavit amicissimus Leander Giuffa. Perenn. Floret Junio. Fl. coerulescenti-violacei.

- PSEUDO-CRACCA*. Bertol. Rar. It. Pl. Dec. 3. p. 58.\* Pedunculis sub-6-floris folio longioribus; floribus secundis, laxis, deflexis: foliolis oblongis obtusis; stipulis bifidis, segmentis lanceolatis; caule diffuso.

In marginibus agrorum prope marinum litus. A Castel Fusano, presso Ostia, Fiumicino. etc. Ann. Floret Martio, Majo. Fl. albo-coerulescentes, quandoque albi. Racemus floribus 4-8, rarius pluribus. Foliola in singulo folio 6-16, angusta.

- SYLVATICA*. L. Pedunculis multifloris folio sub-longioribus: foliolis ovato-sub-ellipticis, mucronatis, glabris; stipulis lunatis calycibusque setaceo-dentatis.

*V. sylvatica*. All. Ped. - Smith Br\*. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. V. foliis ovatis, stipulis argute dentatis, etc. Hall. Helv. 426. t. 12 f. 2.

In montium sylvaticis. Sul Tuscolo: communicavit pluries laudatus Leander Giuffa. Perenn. Floret Junio, Julio. Fl. albidi, purpureo variegati.

- ATRO-PURPUREA*. Desf. Atl. 2. p. 164. Pedunculis multifloris folio sub-brevioribus: foliolis oblongo-lanceolatis, mucronatis albo-villosis; stipulis semi-sagittatis profunde dentatis: calycibus villosissimis: caule tetragono.

*V. atro-purpurea*. W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. In maritimis. Presso Civitavecchia. Ann. Floret Aprili. Fl. atro-purpurei.

- NARBONENSIS*. L. Pedunculis 3-6-floris brevissimis; foliis 3-4-jugis foliolis late-ovatis obtusis scabris; stipulis majusculis, dentatis: le guminibus compressis, margine ciliatis.

*V. narbonensis*. All. Ped. - Lois. G. - DC. Syn. - Bignon. Sic. Cent. 2. p. 72.

a. Foliolis integerrimis. Lois. l. c.

*V. narbonensis*. W. Sp. - Pers. E.

b. Foliolis serratis. Lois. l. c.

*V. serratifolia*. Jacq. Austr. App. t. 8. - W. Sp. - Pers. E. *V. monadelpha*. Roth. Cat. 2.

In sepiibus promiscue, varietas utraque frequens. Alla Caf-

16

aprile 1871

Vicia Faba

*farella*, *Capo di Rove*, *presso Ostia*, etc. Ann. Floret Majo, Junio. Fl. atro-sanguinei, in  $\beta$  sub-seni.

868. TRICOLOR. Nob. (*Fl. Rom. Prod. Tab. 4.*) Pedunculis trifloris brevissimis; foliolis oblongo-ellipticis, sericeo-villosis; stipulis superioribus ovatis, integris, coloratis: leguminibus reflexis, glabris, margine ciliatis.

Ad sepes, aggeres, oras nemorum vulgaris circa Romanam, et in montibus. Copiosamente a *Capo di Rove*, alla *Caffarella*, *Acqua bollicante*, *presso Civitavecchia*, sui *Monti Albani*, *Tusculani*, etc. Ann. Floret Majo. Fl. vexillo virenti, alis fuscis, calyce purpurascente.

Caules simplices, scandentes, 2-5-pedales, 4-goni, sulcati, rubicundi, sub-glabri. Folia 7-9-juga foliolis oblongo-ellipticis, saepius retusis, vel emarginatis, quandoque integris, mucronulatis, oppositis vel alternantibus, petiolulatis; villis sericeis adpressis superne raris obsita, cinerascenti-viridia, subtus pallidiora; petiolo communi sulcato rubente; cirrho terminali sub-trifido. Stipulae foliorum inferiorum minusculae, lanceolatae, basi semi-sagittatae, integerrimae, vel interdum uno alterrove dente quasi obsoleto donatae, centro excavatae, fusco notatae; racemulis adstantes grandiores, ovatae, integerrimae, concavae, exterius totae fuscae, inaequales. Pedunculi axillares solitarii, floribus saepius tribus, vel quatuor, quandoque binis, apice brevi-aristati, 3 lineas etiam longi, folio octies saltem breviores. Flores approximatim, pedicellati, deflexi. Calix brevis pallens, supra ut plurimum rubellus, dentibus subulatis inaequalibus. Corollae tubus glaber, superne sordide rufescens, inferne luteolus: vexilli lamina erecta, retuso-biloba, lobis retroflexis sub-parallelis, luteovirens, venulis fuscis exarata: alae rotundatae, extus intense fuscae, velutinae: carina fuscescens, parvula. Legumina reflexa, glabra, margine minutissime denticulata et ciliata ut in *V. napolensi*. Semina 6-10, subrotunda.

Habitat quoque in contermina ditione Neapolitana, et in Etrusca.

B. Floribus axillaribus, sessilibus, vel pedunculatis, pedunculo simplici.

869. SATIVA. L. Leguminibus sessilibus, sub-binatis, erectiusculis: foliolis oblongo-ovatis, sub-retusis, mucronatis; stipulis profunde dentatis, notatis, *V. sativa*. All. Ped. - Smith Br. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. *V. vulgaris sativa*. J. B. H. 2. p. 310. - Hort. Rom. 7. t. 23.

In segete , arvis , nemorosis ubique . Vulgo : *veccia* . Ann. Floret Majo , Junio . Fl. purpurei , vel sub-violacei .

Variat foliolis oblongo-ovatis , vel cuneiformibus , apice truncatis , vel retusis , interdum etiam sub-integris . Totâ planta plus minus pubescentia . Semina laevia .

- 6*  
April 1801.  
*v*
870. **ANGUSTIFOLIA** . *All. Ped.* 1201. (adde) *t. 59. f. 2.* Leguminibus sub-sessilibus , sub-solitariis : foliis imis foliolis obcordatis , caulinis linearis-truncatis sub-mucronatis , summis angustissimis acuminatis ; stipulis dentatis ; seminibus laevissimis .

**V. angustifolia** . *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *V. sativa*  $\beta$  nigra *L.* *V. vulgaris sylvestris* semine parvo et nigro frugum . *J. B. H.* 2. *p. 512.*

In steriliibus , inter segetes non infrequens . Ann. Floret Majo , Junio . Fl. purpurei .

Icon Allionii , imperfecte quidem , hanc speciem , nullimode *lathyroidem* refert , ut videtur .

871. **PEREGRINA** . *L.* Leguminibus pedicellatis , solitariis , pendulis , tetraspermis , glabris , foliolis omnibus linearibus truncato-retusis , mucronatis .

**V. peregrina** . *All. Ped.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* *V. peregrina* angustissimis foliis , etc. *Pluk. Alm.* 386. *t. 233. f. 6.*

In steriliibus collinis , ad sepes frequens . *Nella Villa Melini in copia* , in *Villa Borghese* , etc. Ann. Floret Majo , Junio . Fl. intense violacei .

Foliolis angustissimis linearibus , apice bicornibus uniformibus ; floribus pedicellatis , intense violaceis ; leguminibus cernuis a praecedente satis distincta .

872. **LATHYROIDES** . *L.* Procumbens : leguminibus sessilibus , solitariis , glaberrimis : foliis subtrijugis ; imis foliolis obcordatis , superioribus oblongo-ovatis ; stipulis integris ; seminibus tuberculatis .

**V. lathyroides** . *Smith Br.* \* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *Ervum soloniense* . *L.* *V. minima* . *Riv. tetr.* *t. 56.*

In pratis , herbosis vulgaris . Ann. Floret Aprili , Majo . Fl. coeruleo-menti-violacei .

873. **HIRTA** . *Balb. Misc. alt.* Leguminibus sessilibus solitariis reflexis hirtis : foliolis linearis-lanceolatis mucronatis , cauleque hirto ; stipulis semisagittatis , coloratis : vexillo glabro .

**V. hirta** . *Pers. E.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 2. *p. 255.* *V. lutea*  $\beta$  *hirta* . *Lois. G.*

In segete , viarum marginibus , agris communis . Ann. Floret Junio . Fl. citrini .

874. **HYBRIDA** . *L.* Leguminibus sessilibus solitariis reflexis ,

pilosus: foliolis oblongo-ovatis, retusis; stipulis vix notatis: vexillo villoso.

V. hybrida. *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 255.

In aggeribus viarum, agris, ad sepes communis. Ann. Floret Majo, Junio. Fl. luteoli, vexillo extus sub-griseo villoso.

875. GRANDIFLORA. *Scop. Carn.* 2. p. 65. t. 42. Leguminilus brevi-pedicellatis, geminatis, subcernuis, glabris, foliolis subellipticis, emarginatis, mucronatis; stipulis notatis: caulinibus debilibus glabris.

V. grandiflora. *Bertol. It. Pl. Dec.* 3. p. 32.\* V. sordida. *Waldst. et Kitaib. Hung. T.* 2. p. 143. t. 133. - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. Notic.* 107.

In umbrosis, nemorosis vulgatissima. Ann. Floret Majo, Junio. Fl. albo-flavescentes, grandinseuli.

Folia saepius oblongo-ovata, interdum ovato-sub-rotunda, apice plus minus retuso, fere glabra.

876. SEPIUM. L. Leguminibus brevi-pedicellatis, subquaternnis erectis; foliolis ovatis obtusis, integerrimis, mucronatis, nervis sub-hirsutis; exterioribus deercentibus.

V. sepium. *All. Ped.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 256.\* - *Riv. tetr.* 56. V. sepium perennis. *J. B. H.* 2. p. 313.

In sylvaticis. *Presso Tivoli, Frascati, etc.* Perenn. Floret Junio. Fl. purpureo-cyanei.

Foliola ultra medium attenuata, apice obtusissimo.

877. BITHYNICA. L. Leguminibus pedunculatis, sessilibusve, sub-solitariis, erectis: foliis 1-2-3-jngis, foliolis oval-lanceolatis; stipulis profunde dentatis, majusculis.

V. bithynica. *All. Ped.* 1199. t. 26. f. 2. - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* - *Savi B. Etr.* 2. p. 256.\* *Lathyrus Bithynicus. Lam. Dict. Graeca floribus albis, etc. Buxb. Cent.* 3. p. 25. t. 45. f. 2.

In sylvaticis, sepiibus frequens circa urbem. *A Villa Borghese, etc.* Perenn. Floret Majo, Junio. Fl. vexillo purpureo-violaceo, alis et carina albidis.

Facies Lathyri. Ludit foliis, stipulisque angustioribus et pedunculis elongatis.

(337) ERVUM.

878. HIRSUTUM. L. Pedunculis sub-4-floris, folio brevioribus: leguminibus dispermis, compressis, pubescentibus: foliis abrupte pinnatis, cirrho terminali; foliolis retusis. *Bertol. Opusc. Scient. Bol. Fasc.* 3. p. 158.\*

E. hirsutum. *All. Fed.* - *Smith Br.* - *W. Sp.* - *Pers. E.* - *Lois. G.* - *DC. Syn.* *Aracus sive Cracca minima. Lob. Stirp. Obs.* 522. *Cracca minor. Tabern. ic.* 507. - *Riv. tetr.* 53.

- In segete, herbosis commune . Ann. Floret Majo, Junio . Fl. albidi .
- 879. UNIFLORUM.** *Tenor. Fl. Neap. Prod. Suppl. 2. p. 68. (Fl. Rom. Prod. Tab. 5. f. 2.)* Pedunculis unifloris folio longioribus ; legumine dispermo , compresso , sub-puberulo : foliis abrupte pinnatis setula terminali ; foliolis retusis , inferioribus obcordatis , superioribus oblongis . *Bertol. Op. Scient. Bol. Fasc. 3. p. 157.*
- E. uniflorum.** *Sebast. Rom. Pl. Fasc. alter p. 15. t. 4.\* Ciccer ervoides . Brignol. R. Pl. Forojul. p. 27.*
- Super rudera Thermarum Diocletiani , et Amphitheatri Flavii . Ann. Floret Majo . Fl. sub-coerulei .
- 880. TETRASPERMUM.** *L. Pedunculis sub-bifloris , folio subaequalibus ; leguminibus sub-tetraspermis , glabris : folio. lis oblongis , obtusis , truncatisve .*
- E. tetraspermum .** *All. Ped. - Smith. Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - DC. Syn. Vicia tetrasperma . Lois. G. V. minor segetum cum siliquis patulis glabris . Moris. H. 2. p. 64. s. 2. t. 4. f. 16.*
- In messibus , herbosis frequens . Ann. Floret Majo . Fl. coeruleo-purpurascentes .
- 881. GRACILE .** *DC. Fl. Fr. 6. p. 581. Pedunculis sub-4-floris folio longioribus : leguminibus sub-5-spermis compressis , glabris : foliis abrupte pinnatis cirrho terminali ; foliolis superioribus acutis . Bertol. Opusc. Scient. Bol. Fasc. 3. p. 158.*
- E. longifolium .** *Ten. Fl. Neap. Prod. p. 69. Vicia gracilis . Lois. Gall. t. 12.\**
- In arvis , collibus sterilibus circa urbem frequens . Ann. Floret Majo . Fl. albo-violacei .
- §. 2. Folia impari-pinnata .
- (638) **COLUTEA .**
- 882. ARBORESCENS .** *L. Caule arborescente : foliolis obcordatis , emarginatis : pedunculis sub-sex-floris ; leguminibus apice clausis . DC. Syn.*
- C. arborescens .** *All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - Savi Tr. d. alb. i. p. 89. C. Dod. Pempt. 784.*
- In muris antiquis , romanis moenibus , et in sylvaticis . *Nella Passeggiata del Pincio, etc. Frut. Floret Junio, Julio . Fl. lutei .*
- (359) **GALEGA .**
- 883. OFFICINALIS .** *L. Foliis pinnatis ; foliolis lanceolatis , mucronatis , glabris ; stipulis lanceolatis , sagittatis : leguminibus erectis , strictis : W. Sp.*
- G. officinalis .** *All. Ped. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. G. Dod. Pempt. 548. - Rivin. t. 72. G. vulgaris . Hort. Rom. 7. t. 25.*

20.  
Giugno 1871.  
iD 1877

In pratis depressis vulgatissima . Off. *Ruta capraria* . Perenn. Floret Junio-Septembri . Fl. sub-coerulei .

§. 3. Folia trifoliata .

(340) PSORALEA .

884. BITUMINOSA . L. Foliis ternatis : foliolis ovato-lanceolatis : petiolis pubescentibus laevis ; spicis capitatis , pendunculatis, axillaribus . W. Sp. - DC. Syn.

Ps. bituminosa . All. Ped. - Pers. E - Lois. G. - Saci 2 Cent. p. 159.\* Ps. bitumen redolens . Hort. Rom. 7. t. 35. Trifolium bituminosum . Dod. Pempt. 566.

In montium sterilibus , ad vias . Presso Palombara , Tivoli , etc.

Perenn. Floret Junio , Júlio . Fl. coeruleo-violacei . - Variat foliis angustioribus .

(341) MELILOTUS .

885. OFFICINALIS . Enc. Leguminibus racemosis pendulis ; subrugosis , acutis , 1-2-spermis : foliolis ovato-oblongis , dentatis . DC. Syn.

M. officinalis . All. Ped. - Pers. E. Trifolium (melilotus) officinalis . L. - W. Sp. - Smith Br. - Lois. G. Tr. odoratum seu melilotus . Dod. Pempt. 567.

β. Alba . Major ; floribus albis , foliolis ovatis . Pers. l.c.

M. officinarum Germaniae flore albo . Tourn. Inst. 407.

In campus , ad vias communis . Bienn. Floret Junio . Fl. lutei , in β albi . - Odor Anthoxanthi odorati L.

886. ITALICA . Enc. Leguminibus racemosis mono-di-spermis , rugosis , obtusis : racemis folio longioribus : caule erecto , ramoso ; foliolis obovatis subrotundis , integris vel dentatis . Sebast. Rom. Pl. Fasc. 2. p. 56.\*

M. italica . All. Ped. - Pers. E. - DC. Syn. - Casser. Hort. 99. Trifolium italicum . L. - W. Sp. - Lois. G. M. italica folliculis sub-rotundis . Hort. Rom. 7. t. 37.

In agris , hortis , Amphitheatro Flavio frequenter . nn. Floret Aprili , Majo . Fl. lutei .

887. INDICA . All. Ped. 1121. Leguminibus racemosis , laevis ; ovato-sub-rotundis , mono-di-spermis , stylo mucronatus : caule erecto : foliolis oblongo-obtusis latitentatis , apice serratis .

Melilotus indica Pers. E. - Sebast. Rom. Pl. Fas. 2. p. 58.

Trifolium indicum . L. - W. Sp. - Lois. G. Melilotus parviflora . Desf. Atl. 2. p. 192. - Pers. E. - DC. Syn. M. lutea minor floribus et siliculis minoribus spicatum et dense dispositis . Moris. H. 2. p. 161.

In Amphitheatro Flavio , et in maritimis arenosis . Presso Ostia .... Ann. Floret Majo ; Junio . Fl. lutei .

Characteres , quibus Melilotus haec parviflora separetur ab indica non invenisse fatemur cum Willdenowio

888. DENTATA . Waldst. et Kitaib. Hung. 1. p. 41. t. 41. Legu-

15

*Luglio 1871*

*Giugno 1871*

minibus racemosis , nudis , dispermis , sub-rugosis , acutiusculis : stipulis basi dentatis : caule erecto . W. Sp. ( sub Trifolio ) .

M. dentata . Pers. E.

In maritimis . Presso Ostia . . . Perenn. Floret Majo . Fl. lutei . Stipulis basi partito-dentatis distincta a M. officinali .

889. LONGIFOLIA . Tenor. Prod. Fl. Neap. Suppl. 1. p. 66. Leguminibus monospermis , subrotundis , obtusis , arcuatim rugosis ; racemis folio longioribus: caule erecto angulato; foliolis oblongo-linearibus serrulatis , obtusis . Ten. l. c.

In maritimis . Presso Ostia . . . Ann. Floret Majo . Fl. lutei . - Caulis vix ramosus .

(542) TRIFOLIUM.\*

§. I. Trifolia ebracteata .

A. Calyce piloso , superne fisso .

890. SUBTERRANEUM . L. Capitulis paucifloris , post anthesim hypogaeis : fructibus involucro centrali , rigido , reflexo obtectis . Savi Obs. p. 12.\*

T. subterraneum . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. - Hort. Rom. 7.t. 36. Tr. pratense supinum cathobleps . Barr. ic. 181.

In pascuis steriioribus circa urbem commune . In copia a Testaccio , etc. Ann. Floret Martio-Junio . Fl. albo-subcarnei .

B. Calyce piloso , margine integro , dentibus aequalibus vel subaequalibus .

891. ARVENSE . L. Caule diffuso , foliolis lanceolato-linearibus : capitulis villosissimis , oblongis , mollibus ; dentibus calycinis corolla longioribus . Savi Obs. p. 17.\*

Tr. arvense . All. Ped. - Smith Br.\* - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Lagopus vulgaris trifolius quorundam . J. B. H. 2. p. 377. Lagopus angustifolia minor , erectior . Barr. ic. 901.

In agris , marginibus commune . Ann. Floret Junio . Fl. sub-rosei .

892. LAPPAEUM . L. Caule diffuso : foliolis ob-ovatis , denticulatis : capitulis sub-globosis , hispidis ; dentibus calycinis rigidiusculis corollam aequantibus . Savi Obs. p. 20.\*

Tr. lappaeum . All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC. Syn. Tr. capitulo glomerato rigido . J. B. H. 2. p. 378.

Tr. nemorosum , capite ovato villoso rubescente . Barr. ic. 871.

\* ) In specierum distributione aureum opusculum cl: Savi cui titulus Observationes in varias Trifoliorum species sumus secuti .

- In pascuis, secus vias, in collibus. *Sul Monte Mario, a Villa Madama, etc.* Ann. Floret Majo. Junio. Fl. pallide rosei.
893. CHERLERI. L. Caule procumbente; foliolis obcordatis: capitulis villosis globosis; stipulis 2 bracteantibus, altera aphylla: dentibus calycinis corollae subaequalibus. *Savi Obs. 23.*
- Tr. Cherleri. *All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC.*  
*Syn. Lagopus minor supinus molli et compresso capite.*  
*Barr. ic 859.*
- In sterilissimis, marginibus arenosis frequens. Ann. Floret Majo, Junio. Fl. sordide albi.
894. STELLATUM. L. Caule diffuso; foliolis obcordatis: capitulis globosis; dentibus calycinis triangularibus, patentibus, nervosis, corolla longioribus. *Savi Obs. 30.*
- Tr. stellatum. *All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC.*  
*Syn. Tr. stellatum purpureum monspessulanum. J. B. H. 2.*  
*p. 376. Lagopus minor erectus capite globoso, stellato;*  
*flore purpureo. Barr. ic. 860.*
- In sterilissimis, marginibus viarum obvium. Ann. Floret Junio, Julio. Fl. rosei.
895. PALLIDUM. Waldst. Caule diffuso: foliolis ovato-subrotundis; stipulis pilosis, cauda setacea: capitulis globosis, dentibus calycinis setaceis rectis, corolla brevioribus. *Savi Obs. 32.*
- Tr. pallidum. *Poir. Enc. - W. Sp. - Pers. E.*
- In pascuis alunde. Ann. Floret Majo, Junio. Fl. albo-virescentes.
- Floris colore a simillimo *Tr. pratensi* statim distinguendum.
896. INCARNATUS. L. Caule eretto: foliolis ob-cordatis; stipulis pubescentibus cauda obtusa; spicis conico-oblongis; dentibus calycinis corolla brevioribus. *Savi Obs. 35.*
- Tr. incarnatum. *All. Ped. - W. Sp. - Pers. E. - Lois. G. - DC.*  
*Syn. - Bivon. Sic. Cent. 2. p. 65. Lagopus major folio trifoli. Dod. Pempt. 567. Tr. alopecurum latifolium spica longa. Barr. ic. 697.*
- In agris, pascuis, marginibus vulgare. Ann. Floret Majo, Junio. Fl. albidi vel rosei.
897. BOCCONE. *Savi Obs. p. 37.*\* Caule eretto, sub-ramoso: foliolis oblongo-cuneatis, apice denticulatis: capitulis oblongis, geminatis; dentibus calycinis corollae sub-aequilibus. *Savi l. c.*
- Tr. nodiflorum turbinatum. *Bocc. Mus. 142. t. 104. (male).*  
*In ericetis, ad oras nemorosas circa urbem non rarum.*  
*Al Pigneto-Sacchetti, alla Lucchina, etc.* Ann. Floret Julio. Fl. vexillo rnbro, alis carinaque albis.
898. LIGUSTICUM. *Balbis.* Caule sub-ramoso, diffuso: foliolis obovato-cuneatis, sub-retusis: capitulis oblongis his-

