

Olei hujus usus apud ipsos etiam vulgaris est ad inungendas corporis partes rigidas, atque contractas, imprimisque nervos distentos relaxare dicunt. Exercitatos etiam, & quosvis labore fessos toto corpore inungunt: nempe quod exercitijs similes corporis partes exsiccantur, & colliquefcunt: quod ipsum humectatione sua impedit hujus olei perfunctoria ac lubrica frictio. Hoc ipsorum acopum est, & insigne lassitudinis remedium esse prædicant. Olim hæc corporum inunctio frequenti in usu fuit tam apud præscos Græcos, quam apud Romanos, illorum in delitijs æmulos: & habita certè fuit non postrema salubrioris Medicinæ prophylacticæ, id est, sanitatis conservatricis, pars, ut passim Galeni scripta perhibent.

Olei usus medicus.

Hujus Palmæ Ady meminit autor descriptionis Guineæ, Manicongi, Angolæ & vicinarum regionum occidui Oceani, ubi dotes regni Congo refert, inquit, In campisveniunt permultæ & variæ Palmæ, utpote, quæ Nuces fert Indicas, & quæ dactylos gignit. Crescit præterea alia ibidem Palmæ species, non multum à duabus primis fronde diversâ, ex qua oleum, vinum, acerum, fructus ac panem colligunt. Per viam expressionis fit oleum è fructus pulpa, uti ex olivis fieri solet, colore & substantia simile nostro butyro, præterquam quod è viridi in flavum colorem magis declinet. Utuntur ipsi eo pro butyro ac oleo, lampadum flammæ eo alunt, eodem oleo sua perungunt corpora, ut glabra & agilia reddantur. Denique cibi vicem gerit necessitatis tempore, uti nobis evenit, qui fame perijsemus, nisi hoc oleum habuissemus. Hujus Palmæ vel fructus nomen non refert: verum ex orationis serie satis patet, hanc esse Palmam Ady quæ fructum Caryosso fert, ex cujus pulpa fit istud croceum oleum.

Et jam dispiciendum duxi operæpretium, an hi palmæ fructus ab Indis allati Veteribus innotuerint, nec ne, quod summa cum cautione peragendum. Sæpenumerò enim rebus quibusdam sunt indita nomina, quæ tamen descriptionibus Veterum non conveniunt: quibus nominibus idcirco non nimis fidendum est, ut optimè & pulchrè monet vir gravissimus, doctissimus, & super hæc occupatissimus Petrus Bellonius libro primo singularium & memorabilium Observationum, quas tu mi Cluli latinas fecisti.

Theophrastus de Palmarum generibus, Genera, inquit, Palmarum plura. Primum enim, & quasi discrimine maximo, quod aliud fructiferum, aliud sterile: & paulo post addit: * Fructuum ipsorum differentiarum plures, alij namque sine ligno intus, alij cum ligno: & alij duro ligno, alij molli proveniunt: colore quoque inter se discrepant: alij enim candidi, alij nigri, alij flavi: ad summam non pauciores quam ficorum colores, aut absolute genera statuunt. Adhæc differre magnitudine figuræque volunt: quosdam enim in modum esse malorum, magnitudinèque tantos, ut quatuor tantum in spicam teneantur, alios minutos cicerum magnitudine. Denique, paucis interjectis, inquit. Genus aliud est in Cypro, quod & folium amplius habet, & fructum multo ampliorem, discriminèque peculiari discretum, magnitudine mali punici, figura oblongum: non tamen sapidum tanquam cæteræ, sed radicibus similem, ut non devoretur, sed succo tantum expresso expuatur. Hactenus Theophrastus. Qui sanè locus desumptus ex Historia Plantarum lib. II. cap. VIII. Caryoces fructum utcumque proponit, quem antè diximus esse ex Palma fructifera, & habere durioris ligni corticem, cui infedit pulpa flava cum ejusdem coloris pellicula, magnitudinem etiam illius esse mali citrij, cujus sit forma oblonga. Quo modo denique præter nucleum pulpæ expressæ ineatur usus, in olei præparatione ostendimus. Itaque apertissimè patet nonnullis cum Palmæ cujusdam fructu Theophrasti notis, hunc Caryoces fructum convenire.

* Videtur interdum Gaza negligentis interpretis officio functus, aut alium Græcum codicem sequutus: meus enim sic habet. αὐτῶν δὲ τῶν καρπῶν διαφορὰ πλείους. οἱ μὲν γὰρ ἀπύρνοι, οἱ δὲ μαλακοπύρνοι, καὶ τὰς χροιάς οἱ μὲν λευκοί, οἱ δὲ μέλανες, οἱ δὲ ξανθοί. τὸ δὲ ὅλον οὐκ ἐλάττω χρώματά φασι εἶναι τῶν συκῶν, οὐδ' ἀπλῶς τὰ γένη. διαφέρει δὲ καὶ κατὰ τὰ μεγέθη καὶ κατὰ τὰ σχήματα. καὶ γὰρ σφαιροειδῆ εἰς ἐπίουσι ὡσανεὶ μῆλα, καὶ τὰ μεγέθη τηλικούτους, ὡς τέτταρας εἰς τὴν σαχύν εἶναι. ἐπὶ δὲ κ' εὐπόδες. ἄλλους δὲ μικρὰς ἡλικίας ἐρεβίνθους.

Ambigo præterea an Theophrasti locus de Palma Ady sit intelligendus. Sed & Cariotas Dioscoridis & Galeni nihil aliud esse aio, quam palmulas sive dactylos qui ad nos adferuntur, qui quidem immaturi sicci & adstrictionis participes sunt, maturi autem dulces pingues & succulenti.

Hujus fortè meminit Dioscorides, dum Caryotarum, sive Caryotidarum Palmarum mentionem facit: inquit enim lib. I. cap. de Palma. μάλινα δὲ αἱ καρῶτιδες ἐπιόουσαι ἀρτηριῶν τραχύτητας ἰώνται. præsertim Caryotæ esu faucium asperitati medentur.

Earundem meminit & Galenus lib. II. de alimentorum facultatibus, ubi Palmæ fructus facultatem alimentalem rimatur: ἔστι δὲ, inquit, ἐν αὐτοῖς ἡ μικρὰ διαφορὰ. τινὲς μὲν γὰρ ξηροῖτε εἰσι καὶ σφύροντες, ὡσανεὶ οἱ αἰγύπτιοι, τινὲς δὲ μαλακοὶ καὶ ὑγροὶ καὶ γλυκεῖς, ὡσανεὶ οἱ καρυστοὶ καλέμενοι: id est. Non pauca autem in ipsis est differentia: quædam enim sunt sicca & adstringentes, ut Ægyptiæ: quædam verò molles & humidæ, & dulces, ut quæ Caryotæ appellantur.

Oleum

PLANTAE,
feu SIMPLICIA, ut vocant,
QVAE IN BALDO MONTE,
ET IN VIA
AB VERONA AD BALDVM
REPERIUNTVR;

Cum Iconibus & nominibus quamplurimarum
quæ à nullo antè sunt observatæ : nunc à
IOANNE PONA Pharmacopæo Veronensi
repertæ, descriptæ, & editæ.



ANTVERPIÆ,
EX OFFICINA PLANTINIANA,
Apud Ioannem Moretum.

clō. Iō c i.

M. V. L. S. M. L. O. R. A. C. A. D. C. A. R. O. L. U. M. C. L. A. U. D. I. C. I. U. M.

P L A N T A E

SEU SIMPLICIA, ut vocantur

QVAE IN BALDO MONTE

ET IN VIA

AB VERONA AD BARDAM

REFERTUR

Cum Iconibus & nominibus plurimissimis
que à nullo ante sunt observatae : nunc à
IOANNE PONA Pharmacopoeo Veronensi
reperita, describitur, & editur.



A N T V E R T I A

EX OFFICINA PLANTINIANA,

Apud Ioannem Moretum.

cl. l. c. l.

CLARISSIMO VIRO
CAROLO CLVSIO
IOANNES PONA S.

RAEST ANTISSIMAM Medicinam humano generi necessariam esse inde constat, quod (uti in Ecclesiastico legitur, & in libris Castigationum purgantium Ioannis Mesuae) ipsi propter ejus fragilem, & caducam naturam à summo rerum opifice clementissime fuerit elargita; constant siquidem hominum corpora ex elementis corruptioni subiectis invicem agentibus, & patientibus, ex quibus, alterationes, & affectiones necessario hominibus occurrunt, quarum vi actiones facultatum, organorum ministeria, similarium partium naturales effectus omnes varijs modis leduntur: hinc ipsa rationalis anima labefactatis instrumentis (quasi dentata dolabra) in operibus suis, & circa artes omnes, scientias, philosophiam, & (quod gravius est) erga suum summum creatorem deficere saepe cogitur; anima namque nostra hac carnea veste obvoluta huius corporis instrumentis (continue etiam fluentibus) ut sua perficiat munera indigere lucidissime conspicitur; nam quo modo imaginatione corrupta, diminuta memoria discurret, & ratiocinabitur? suum agnoscerit auctorem, redemptorem, atque illi obtemperabit? egrotum verò corpus quo modo homini artes convenientes exercebit? proculdubio aut haec diminute tractabit, aut depravate praestabit: o verè infelix humana natura, cum prope innumeris arumnis, & tot, tantisque morbis miserimè subjaceas! His tamen calamitatibus omnibus arte ipsa medica nobis à benedicto Deo benignissime impartita obviamimus, & verè medemur. Haec etenim precepta, & medicamenta proponit, ac exhibet, quae dogmaticè rationabiliterque usurpata, quantum homini licet, praesentem tuetur, & deperditam sanitatem restituit: jam verò haec medica materia (habitibus illis praetermissis, qui ex fonte philosophiae hauriuntur) cum ab elementis, fodinis, animantibus, alijsque huiusmodi rebus naturalibus promanant; tum praecipue à simplicium, plantarumque admirabili virtute sumuntur. His igitur ego cum a vidè operam navaverim, tum, ut ex horum admirabili natura, artificio, & effectibus causantem artificem intelligerem, admirarerque; tum, ut haec cognoscendo, discernendoque possem (quod muneris est nostri) utiliter, & non adulterinè, quae ab Excell^m Medicis in hominum utilitatem praecipiantur, genuina simplicia eligere, & eadem in pharmaca commiscere, neque expensis, neque laboribus peperci, ut vegetabilium praecipua loca studiosè inviserem, quaeque ibi ad hoc facientia nascerentur, quanta possem diligentia perquirerem, observarem atque colligerem. Inter haec igitur cum ceteris dote ista minimè secundus sit MONS noster BALDVS dictus, Baldus (inquam) qui altitudine, latitudine, amœnitate, ac pulchritudine insignis in Italiae finitimis limitibus Tridentum versus, ubi faucibus Alpium ipsa à Rhetia separatur, situs est; isque in agro Veronensi, ab ipsa urbe Verona viginti millibus passuum distans: quae praeter arces, & mœnia tutissima, civium splendore, vetustate fundatorum, aëris salubritate, amœnissimis collibus, flumine pulcherrimo Athesi, lacu Benaco (qui certè benè agit, cum solus Carpiones, regios pisces & producat & alat,) Aedibus superbo Amphitheatro, illustribus Templis, terrae quibusque fructibus, acutorum ingeniorum feracitate, & quae tandem naturali, & medico Viridario Baldo monte, in quo variae, ac peregrinae plantae abundè conspiciuntur, praestantissima civitas existit. Hunc itaque ipsum cum per plures vices unà cū Illustribus, Excellentissimisq; , atque admodum RR. D. Patre Mauro, & D. Casare, altero quidem fratre, altero filio peracutissimi integerrimique Iuris consulti D. Fabij de Nicheolis, bujuscè civitatis, generis splendore, fortuna bonis,

& literis primatibus civibus: D. Nicolao Maronea, Hectore Moscalea pariter Urbis nostrae Medicis clarissimis: D. Hieronymo Calderino civis nostro doctissimo: D. Ioachimo Iungermano Norinbergensi (faelicis recordationis) Philosopho, Medico, & Herbariae facultatis peritissimo, à quo veluti à scientissimo Duce plurimum & cognitionis, & artis simplicium omnium mihi comparavi: D. Pascale le Coq. Gallo, D. Iacobo Zuinghero Basiliensi, & D. Georgio Rentzio Vucinspergensi, omnibus Philosophia, & Medicina doctoribus, atque in plantarum notitia versatissimis: & cum per plures (inquam) vices montem ipsum Baldum peragrarem, investigando, rimandoque diligenter Valles, Prata, Sylvas, Rubos, Foveas, Cavitates, Rupes, Verticisque omnes precipites, atque saxosos; ne quae iterato saepe labore conquiescerem, temporis tractu à memoria effluerent, aut consenescerent, ac demum culpa mortis interirent, haec de maximo hoc Baldo breviter adnotare non ab re fore arbitratus sum: tum praesertim, cum numerosiora simplicia ipse quam alij hucusque observaverim, tum potissimum etiam, cum plantas aliquas novissime ibi ego adinvenerim, quae haecenus nec editae, nec cognita ab aliquo (quod sciam) unquam fuerint. quas etiam nec parum & utilitatis, & pulchritudinis, herbariae suppellectili allaturas esse mihi persuadeo.

Memor ergo singularis humanitatis tuae, quam tu mihi aliquando doctissimis epistolis tuis, simplicium alicujus difficultatis enodationem tractantibus declarasti, meque eorum perfectiori scientia adauxisti: optimèque sciens quantum in plantaria facultate polleas, quandoquidem scientia tua praestantia cuique ex praclarissimis tuis voluminibus satis patet, quibus praeter incomparabilia studia, vigilias, peregrinationesque ejus comparanda causa subiisse: eisdemque manifestas, te mirabili ordine, & eloquentia singulari, non minus singula describendo mentis oculis, quam suis iconibus referendo oculis corporis subijcere. Pulchrè itaque cognoscēs, te Medicae materiae tantū profuisse, ipsamque tibi infinite debere, à ratione alienum non esse censui ut haec tibi uni dicarem. prout etiam in futurum, si qua occurrerent, me facturum polliceor, ut apicem perfectionis tum in cognoscendis, tum in usurpandis simplicibus (si fieri possit) assequi mihi liceat; hoc autem eo libentius feci, quod ad id me (inter ceteros) Perillustris, & undequaque Clarissimus, ac omnium scientiarum genere insignis Ioannes Vincentius Pinellus, praecipuus ac singularis meus dominus, honorifica servitutis mea erga te faelix initium est cohortatus. Hic Vir praestantissime reperies Iter, Villas, Loca, Situs, Aspectus, seriemque omnem ac nomina herbarum, quae singulis in locis vere exoriuntur. Posthac verò, ac propediem (ut spero) Deo bene annuente, singularum ipsius Baldi partium imagines, ac locorum effigies depictas accipies. Quoniam autem nobilitas, & candor animi tui, mihi jampridem perfectus est, quo labores hos meos qualescumque amplectari non dedignaberis; pluribus hoc à tua benignitate contendere supervacaneum existimaui. Satis id mihi erit si signum hoc esse meae perpetuae erga te observantiae, pro certo habueris. Interim Deum O. M. ut te quam diutissime incolumem tueatur, rogo. cura ut valeas. Verona, Idibus Augusti, M. D. XCV.

DESCRIP

DESCRIPITIO MONTIS BALDI.



MENSES Vernaes cū jam præterijissent, qui propter montium qualitates in nostri Baldi regionibus, quā in planitiēbus tardius sese manifestant, tempus ad iter nostrum faciendum oportunissimum visum est. Itaque circiter Idus Iulij ab Vrbe discessimus Occidentem versus, & egressi statim per amplam agrorū planitiem, absque vitibus, alijsve arboribus cultam progredimur, in qua abundanter conspicitur:

Eryngium montanum, Matthioli: seu vulgare.

Tithymalus Cyparissias Penæ: perperam Etula minor Italarum, Lobellio.

Spina seu Stella solstitialis, Penæ.

Atractylis multorum: secundū aliquos Cnycus sylvest. Gaza Fusum sylvestrem vocat.

Onopyxus, Guilandini: Carduus vulgaris, Lobel.

Acanthium, Diosc. seu Spina alba sylvest. Fuchsj.

Ornithogalon, Diosc. seu Bulbus Leucanthemus Dodonæi.

Rhamnus tertius, Matthioli: seu Paliurus, Penæ: frequentissimus.

Pulegium floribus verticillatis: perperam Calamintha officinarum.

Carlina sylvest. minor, Clusij.

Gallium luteum, frequentissimum.

Verbenaca vulgaris, & Matthioli.

Polygonū minus, Matthioli: à quibusdam Herniaria vocata: ab alijs Herba Turca: Tragus, pro Empetro proponit: Cordus, Millegranam vocat, ab aliquibus, Helleborina Diosc. putata, & Herba Cancris minor etiam nominatur: ab Italis, Centograna.

Verbascum fœmina, Lobellij, seu Verbascum ramosum candido flore.

Verbascum latius, Dodonæi; prius, Matthioli.

Blattaria, Plinij luteo flore.

Hyoscyamus primus, Matthioli.

Mentastrum vulgare, seu Mentæ sylvest. species.

Plantago aquatica, Herbariorum: nonnulli verò genuinum Alisma; seu Damasconium Diosc. autumant.

Calamintha tertia; seu aquatica, Matthioli.

Et pervenimus ad locum, qui vulgo Clivus dicitur, qui est principiū planitiē eijusdam magnæ, saxosæ, & ut plurimū incultæ; latitudinis circiter octo millium passuum, & lōgitudinis quattuor; Hæc omnino æqualis est, aëre saluberrimo, & pervia in qua quasi in quodam æquore persisteres, & per illud permeares, eminus absque impedimento prospicis hinc inde Villas, & ipsum Baldum; in hac autem deambulando adnotatur:

Sideritis pratensis rubra, Dalechâpij, & Sideritis etiam luteo flore eijusdem conspicitur.

Eruum sativum, Cordi: Pisum Græcorum, Trago: Matthiolus, pro Clymeno pingit.

Camelina siue Theophr. Erysimum, &

Verbenaca recta Fuchsj; siue mas.

Erythrodanum, Græcorum: Rubiatintorum in Officinis.

Centaurium Collinū, Gesneri, Ioachimolungermano: Aphyllâthes quarta, Dodonæi.

Dipsacus sarivus, vel Galledragon Xenocratis, Anguillario: seu Spina selenitis Theoph. Guilandino.

Dipsacus sylvest. major, Fuchsj:

Ranūculus Hortēsis simplex, seu primus Fuchsj: Ranunc. echinatus sylvestr. tertius, Dodonæi: seu Ranunc. arvorum, Lobellij.

Heliotropium supinum Clusij.

Anthemis, seu Chamæmelum.

Buphtalmum Matthioli.

Sideritis prima Matthioli: Pena verò, Marrubiū aquaticū seu palustre facit.

Stachys Dioscor. & Scordotis Plinij, Lobellio: à Trago Marrubium agreste vocatum: at à Matth. Pseudostachys.

Echium Matthioli, floribus rubris.

Item albis floribus.

Echium Loniceri, seu Buglossum vulgare officinarum.

Chamæzizypha, seu Zizypha sylvest. frequentissima.

Echium Fuchsj.

Gnaphalium vulgatissimum.

Ægylops Theophr. seu quartum genus Roboris, Dalechampi.

Hyosiris flore cādido, siue laceæ Pannonicæ species, Clusij.

Sideritis prima Fuchsj: perperā Herba Iudaica Avicennæ, Herbariorum.

Sideritis secunda Matthioli.

Lactuca sylvest. Matthioli: Endivia quarundam officinarum, Penæ.

Diosc. Myagrū Dodonæo: à Matthiolo, Pseudomyagrū dicta, hinc abundanter colitur.

Convolvulus minor spicæ folijs, Lobellij: à quibusdam, Scamonium tenue Plinij, creditur.

Convolvulus secundus, Clusij: Cantabrica

brica Plinij, secundum aliquos: à Dalecham-
pio Volvulus terrestris dictus.
Onofma Matthioli.
Anchusa lutea Dalecham-
pij; frequen-
tissima.
Centaurium parvum Dioscor. à Dodo-
næo Panax heptophyllum Plinij voca-
tum: ab Italis Biondella: Quibusdam
perperam Lymnesium Cordi videtur.
Blattaria flore cæruleo, elegantissima.
Cytisus Tragi: à Lobellio Lagopus altera
pinnato folio dictus.
Cistus annuus alter Lobellij.
Hyacinthi spurij varia genera.
Ampelopsalum frequentissimum.
Lagopyrus Dodonæi; seu Lagopus spi-
catum.
Pulsatilla vulgaris; seu Anemone sylvest.
Fuchsi: Ranunculum decimum Cordus
facit: Lusitanus perperam, Alopecu-
ron vocat.
Betonica passim.
Corinus; Plinij: Cocconelia Theophr.
Clusio: Coggyria Plinij Camerario:
Chrysophyllum Priscorum Lobellij:
fortè Barba Iovis Plinij Gesnero.
Glaux Guilandini: à Belgis Anthyllis le-
guminosa; seu Anthyllis prior Do-
donæi.
Tithymalus platiphyllus Penæ: à qui-
busdam Characias vocatur.
Holoostium Matthioli.
Muscipula altera flore muscoso, Penæ:
seu Sesamoydes magnum Salmanti-
cum quorundam, Clusio: etiam Clu-
sius ipse Lychnidis sylvest. speciem ef-
se putat.
Aphyllanthes Anguillaræ: à Pena pro
Bellide cærulea exhibita: Italis Boto-
naria; à Monspellensibus Globu-
laria.
Armerius flos tertius, Dodonæi.

IN hujus dextera parte prope flumen reperitur

Coluthæa Theophrasti: à quibusdam
Cytisus creditus.
Saxifragia alba, seu quarta Matthioli.
Polygonatum Diosc. seu Fraxinella Ira-
lorum: Secacul Gesnero putatur.

IN ejus fluminis opposita parte, copiosè pullulat:

Rhus Obsoniorum, & Coriariorum, vel Sumach: sed tamen sterilis est.

ET cum jam pervenimus ad finem spatiosi hujus agri, ad lævam manum pagum Buxo-
letum relinquimus (ita vocatum ex copioso Buxo ibi sponte nascenti, cujus sylva etiam in
præsencia in fluminis ripa conspicitur) quo in pago inveniuntur plantæ diversæ, videlicet:

Abrotanum mas commune.
Abrotanum inodorum, Penæ.
Abrotanum mas, album.
Alyssum, Matthioli: an potiùs Thlaspi
species? fortasse Alyssum minimum
Clusij.
Botrys, frequentis.
Antirrhinum sylvest, sive Phyteu, Dod.
Chamænerion Gesneri: à quibusdā Del-
phiniurā Diosc. & Linum filiquosum.

Lagopus, seu pes leporis.
Clinopodium Lacunæ, Penæ: idem Pe-
na Acinon facit: Betonica Pauli quo-
rundam; seu Clinopodium primum
Matthioli.
Clinopodium minus, seu Vulgare, Ocy-
mum sylvest. seu Acinos Dodonæi: vel
Pulegium petræum Gesneri: perperam
Calamintha montana, Tragi.
Trifolium cochleatum, seu Medicæ spe-
cies, Penæ.
Item Medica spinoso folliculo.
Symphitum petræum Penæ: Consolida
minor à Matthiolo: Brunella altera
Dodonæi:
Item floribus albis.
Oenanthæ Fuchsi: Filipendula multo-
rum: & dubitat Pena, an Plinij Molon.
Thalictrum nigrum Cordi: Dodonæus
Thalictrum magnum facit: à quibus-
dam Ruta pratensis, & Saxifragia Gal-
lorum.
Osiris, seu Linaria vulgaris.
Sylbum, seu Leucacantha Loniceri.
Aphyllanthes prima Dalecham-
pij.
Syrinchion Theophrasti, Cordo: seu
Bulbus esculentus, Lacunæ: Bulbus
sylvest. Fuchsi: à Lobellio, Ornitho-
gallon luteum vocatū, qui etiam dubi-
tat an sit Vomitorius Bulbus.
Lactuca sylvest. vera Dalecham-
pij.
Lactuca sylvest. Fuchsi, & Matthioli; seu
Picris angustifolia Diosc. Penæ.
Pecten Veneris Ruellij: aut forrasse (ut
inquit) Anguillara, Scandix Veterum.
Tordylium, Seseli creticum Lobellij.
Nasturtij species, Gesneri: illa quæ à Tra-
go, Fuchsi, & Cordo pro Seriphio
Germanico proposita est: à Pena fortè
Thalietrum Diosc. seu Sophia Chy-
rurgorum: à Dodonæo etiam pro Tha-
lietro picta.

Flammula altera Dodonæi, seu Clema-
tis recta.
Stratiotes, seu Achilleæ congener Clu-
sij; fortè Helyochrisis Italica, Mat-
thioli.

Ladanum segetum Plinij Dalecham-
pio; rubro ac albo flore invenitur.
Aristolochia rotunda genuina; frequen-
tissima.
Itè Clematidis, Penæ: perperā aliqua Of-
ficinarū credunt esse genuinā longam.
Thlaspi parvum Hieracifolium, & Leu-
coion minimum luteum Penæ: à Da-
lecham-
pio pro Lunaria lutea picta:
Clusius Thlaspi clypeatum vocat, in
suis

suis doctis. Observat. Pannonicis : à quibusdam, Biscutella.

Nepeta, Tragi: Menta Catti, & Cattaria multorum.

Iberis, seu Lepidium Diosc.

Tithymalus verrucosus Dalechampij.

Mox descendimus ad Athesim, inde senis conjunctis navigijs pendentibus ex longo, crasso, & mobili fune, qui alium similem funem amplectitur, magnis arborum truncis in utraque ripa infixis alligatum, in Pagum transvehimur Septimum dictum, quod ab Urbe distet septem millibus passuum, quod magnam voluptatem spectantium oculis ob elegantiam adfert; pergentibus autem per illas semitas reperiuntur hæ plantæ:

Onobrychis Pannonica prima, Clusij:

seu, ut ego dicerē, Cicer Astragaloides.

Heliochrysos sylvest. seu Chrysocome,

HINC post frugiferos aliquos campos ingredimur in vastum & pariter incultum agrum, parum ab eo dissimilem, de quo in initio itineris. ubi adnorantur:

Euphrasia, passim.

Linum perpusillum floribus luteis Lobellij.

Item sylvest. Linum floribus albis.

Eupatorium Græcorum; seu Agrimonia.

Erygerum magnum, seu Iacobæa Senecium Lobellij.

Helxine Cissampelos.

Felix mas, frequentis.

Iris vulgaris.

Anonis lutea Camerarij: Natrix Plinij,

Quorundam: perperam multi Pharmacopœorū pro vero Meliloto utuntur.

Lotus fativa Matthioli.

Ocymoides Matthioli; flore albo.

Percepiet Anglorum Penæ.

Saponaria Rec. Cunder Avicennæ Vale-

IN quo loco etiam conspicimus;

Cistum annum flore guttato, nostrum.

Cistus annuus flore guttato.



Esula minor Tragi.

Polypremnum Dalechampij: seu Polygoni species.

Origanum sylvest. seu commune in officinis.

Lappa major Matthioli utraque.

Tragi; vel Amaranthi lutei species.

Verbascum III. Matthioli.

Cynoglossum Vulgare.

randi, ex Lobellio.

Conyza Helenitis Cordi: seu Baecaris

Monspelliensis Penæ: Matthiolus pro

Conyza majore pingit, uti etiā Dod.

Horminum sylvestre Fuchsj.

Millefolium luteum, an Agerati species?

Polygalla Diosc. Dalechâpio: seu, Ono-

brychis Dodonæi: vel caput Gallinæ

Belgarum Penæ.

Sideritis prima Fuchsj: Tethrait & her-

ba Iudaica, Herbariorum.

Sarxifagon Pauli, & Diosc. Guilandino,

& Osteocollum Absyrthi: est Saxifra-

gia communis.

Corruda.

Cicer sylvest. alterum Dalechampij.

ASSURGIT recto surculo tripalmari, quadrato, hirsuto, virescenti; cui prope terram folia multa Oleæ effigie, deinde per intervalla ad opposita latera alternato situ bina, ad medium usque, deinde per aliquos ordines terna spectantur, duobus tamen ex his angustioribus, è quibus flores multi, colore & forma Helianthemi. Sed hoc amplius in singulis folijs guttulam sanguineam fortiti, ad instar Pyropi, auro summa arte excepti, tum summitati, tum pediculo longiusculo & capillari calicibus affixi hærent; horum tamen aliqui sine folijs unicum florem in suprema parte obtinentes plantam finiunt. quæ radice unica, exili, lignosa, ac parum fibrata alitur. Floret initio Iulij; sapor, & semina ut in alijs Chamæcistis; provenit in plano Agro altero, sed frequentior in opido Ciani.

Et hæc inveniuntur Pontonum usque: Est autem Pontonum rus amœnum in quo jam dictorum Nichesolarum sunt perampla prædia, & egregiæ ædes, aptæ ad excipiendos propter varia illarum exulta ornamenta, varij generis suppellectilem, & absolutas commoditates quosvis Illustris. Viros, uti sæpissimè contigit; adjuncta huic nobiliss. domui duo pulcherrima Viridaria, in quibus præter varios ordines frequentissimarū Cupressuum, & in-

ferorum

ferorum selectissimorum, diligenter coluntur istæ nobiles plantæ: (inter quas digniores & magis peregrinæ à Præclarissimo Viro Ioanne Vincentio Pinello transmissæ huc sunt.)

- Acanthus aculeatus Lobellij: seu Monspelliensium Chamæleontha.
 Caucafon, seu Moly Indicum.
 Althæa flore luteo; aut Theoph. Ibisum Lobellij: seu Abritilon Avicennæ.
 Sanicula montana Clusij.
 Aconitum lycoctonum Matthioli.
 Aconitum batrachoides Penæ.
 Napellus Matthioli.
 Napellus Penæ.
 Napellus racemosus.
 Napellus Moyfi Avicennæ, Matthioli.
 Leucoion creticum pulcherrimum, fortè Leucoion cœruleum Diosc.
 Tamarindus vel Derelvide Ægyptiorum, Exc^{mo} Prospero Alpino.
 Acacia Ægyptia genuina Antiquorum.
 Stœchas altera Penæ.
 Paliurus Athenæi, seu Nabca Ægyptiorum, Alpino.
 Aquilina quatuor diversorum colorum pleno flore, sive degener, hoc est, ex pers corniculorum inflexorum.
 Item, quatuor diversorum colorum, pleno flore roseo, sive degener.
 Hyppomaratum.
 Dictamnium creticum.
 Bryonia cretica.
 Hedyсарum alterum clypeatum Lobel.
 Thlaspi clypeatum Penæ.
 Iris bulbosa colore luteo palleſcēti. (tior.)
 Iris bulbosa versicolor angustifol. saturatior.
 Iris bulbosa versicolor latifol. saturatior.
 Iris bulbosa violaceo flore.
 Iris bulbosa flore rubro.
 Iris bulbosa flore rubro elegantior.
 Pseudonarcissus pleno flore.
 Pseudonarcissus Hispanicus minor.
 Mirtillus Germanica.
 Aster pratensis, seu V. Clusij.
 Scabiosa Hispanica Clusij: à Fabio Columna, Phyteuma Diosc. credita.
 Lirio-asphodelus albo flore.
 Anonymos Buxifolia.
 Sefeli Massiliense Diosc.
 Panax Heracleum Herbariorum.
 Panax Asclepium Diosc. Guilandino.
 Aloë utraque.
 Trachelium majus, nostrum.
 Tragium creticum Bellonij: seu Androsimum fruticosum Camerarij: vel Ruta hypericoides Dodonæi.
 Isopyrum Matthioli: seu potius ad Melanthij sylvest. species referenda.
 Eruca peregrina Clusij: seu Leucoion marinum Patavinum.
 Impatiens Dodonæi.
 Trifolium Asphaltites.
 Viola matronalis, vel Damascena Rec. à Fuchsio pro Leucoio albo picta: à quibusdam Hesperis Plinij credita.
 Centaurium majus genuinum Diosc.
 Smyrnum Lacunæ.
 Hemerocalles Chalcedonica.
 Digitalis lutea, flore amplo.
 Item purpurea.
 Cytisus Maranthæ.
 Bryonia cretica.
 Peucedanum magnum Italicum Lobellij.
 Hieracium intubaceum flore carneo.
 Verbascum quartum Matthioli.
 Draba Dodonæi; seu Dryophonos Plinij, ejusdem: nonnulli verò, Thlaspi Candidæ umbellatum vocant.
 Myrrhis parva altera Lobellij.
 Superba Austriaca Clusij.
 Cacalia Penæ.
 Leontopetalon, è Creta.
 Tanacetum acutum album Tragi: seu Parmica folio Taraconis, Penæ: vel Pyrethrum sylvest. quorundam.
 Ocymoides arboreum, seu fruticosum Camerarij.
 Cardiaca Melica Penæ; seu Moluca aspera.
 Tanacetum non odorum Penæ; seu perperam Sideritis Itatorum Lobellio.
 Chamærhododendros alpina, Penæ.
 Corona imperialis, simplici serie florum.
 Liliu Sufianum Clusij: quidam Liliu Perficum vocant.
 Poterion Diosc. Penæ: à quibusdā Pimpinella spinosa.
 Pthora Valdensium.
 Lychnis Chalcedonica: Scarlatea vulgò.
 Thapsia Matthioli.
 Ferula Galbanifera Lobellij.
 Ranunc. polyanthos aureo flore.
 Datura Turcarum Garziæ: Solanum manicum Columna facit.
 Muschari Turcarum: Matthioli exhibet pro Bulbo Vomitorio.
 Eryſitales, Plinij.
 Ocymoides repens polygonifolio, Penæ.
 Helianthæ flore candido.
 Acorum genuinum Antiquorum: perperam Calamus aromaticus multorum.
 Rhodia radix.
 Siliqua.
 Iasmynum Cathalonicum.
 Syringa cœrulea Lusitanica Penæ: Lilac Turcarum, Matthioli.
 Arundo Indica, vel Cannacorus quorundam: à Camerario Gladiolus Indicus vocatur.
 Cumynum sylvestre primum & Diosc.
 Calcitrapa candida, & rubra flore duplo.
 Cnicus alter Clusij,
 Cnicus sylvestris primus multorum: Atractylis vera Dalechampi.
 Chariophyllata montana major.
 Item Alpina minima nostra.
 Iacobæa 11.
 Item, 111. Pannonica Clusij.
 Caltha seu Calendula, pleno amplo flore: Clymenum Diosc. Fabio Colunæ.
 Soldanella

Soldanella alpina Clusij.
 Gramen Parnasi Dodonæi.
 Primula arborescens flore simplici.
 Lygusticum verum Dioscoridis.
 Pulsatilla flore albo.
 Aconitum tertium Diosc.
 Alektorolophus primus alpinus Clusij.
 Nardus Celtica altera Lobellij.
 Stœbe Capitata Rosmarini folio.

Scorzonera Hispanica.
 Item, V. Pannonica Clusij.
 Ornithogalon spicatum.
 Dentariæ minoris Matthioli, tres ex fo-
 liorum numero varietates.
 Item:
 Stœbe Capitata Rosmarini folio nostra,
 cujus Iconis descriptio sequitur.



Tras nostrum, vel esculentus Cypetus:
 Dulcichini, à Guilandino vocatum:
 à Dodonæo pro Cypero dulci propo-
 situm: Fabius Columna Neapolita-
 nus, Malinathalam Theoph. esse au-
 tumat, uti etiam Anthaliu Plinij, fa-
 silicite. Hæc planta propriè Veronen-
 sis, nullibi enim in tota Europa, præ-
 terquam apud nos sponte hæcitur. Pro-
 venit verò copiosissimè prope Urbem
 ad meridiem, in qua itidem parte fut-
 gunt hæc, quæ hic descriptæ sunt.

RURSVM trajicimus flumen hic præsertim rapidissimum, & aliqua in parte vortico-
 sum vel flexuosum, antedictis annexis ab fractis, & sic incedendo relinquitur dextrorsum
 Athesim, & Arcem illam ratione loci inexpugnabilem, sitam in faucibus montium, nobis
 appellatam *la Chiufa*; nam cum olim montis soliditate integri tutissimo lapidosoq; pariete
 Athesis clauderetur, atque aliò, non autem Veronam perflueret, mons hominum arte, ma-
 nuque apertus fuit, parte illa quæ alveo recta opponitur integra relicta, quam ita violenter
 ipsa aqua labentes feriunt, & ab obijce montis rejectæ tanto impetu relabuntur, ut rates,
 quibus merces utriusque Germaniæ advehuntur Venetias, Veronam, & alias in civitates,
 quandoque omnino ibi submergantur, semper tamen pars anterior in altum per ipsum
 montem ascendat, posterior autem aquis immergatur, quo fit ut in ea parte morantes
 cum aliorum risu, nec sine suo periculo ad genua usque madescant: conversum interim
 flumen ad dexteram ablabitur, ac denuo reconversum, tortuose angulosèque ipsum per-
 vium, ac arte factam os ingreditur, ac sine impedimento perlabitur. Per hanc Arcem per-
 petuo

EX albicante radice lignosa, & aliquan-
 tulum fibrosa, varij efferuntur caules
 teretes, modo coronariæ Lybanothis,
 trium circiter cubitorum, quadam canitie
 aspersi, profert folia uti ipsa Lybanothis, sed
 longiora multo, & acuminata magis, quæ
 paululum flaccida facta, ita sese coarctant,
 ut omnino appareant Pinaltri folia, quæque
 supernè subvirescunt, infernè albicant, cum
 quadam lanugine, uti & cauliculi: in ramu-
 lorum fastigijs edit capitula quæadmodum
 Stœbe Salmantica prima Clusij; quasi ma-
 gnitudo Centaurij majoris, cui etiam
 flos simillimus est, nisi quod magis purpura-
 scit: semen retinet Cnici, sed nigricans;
 perennis est planta. Hanc sub nomine Cha-
 mæpiperis mihi misit D. Antonius Berthio-
 lus Ducis Mantuæ Pharmacopæus peritifi-
 simus, observatorque insignis, ut ipsi de hac
 sententiam meam dicerem: ego verò ratios
 nullas cur ipsa ita vocari deberet intel-
 ligens, imò cum viderem Rosmarinum in
 folijs æmulari, ac Stœbis formam obtinere,
 atque temperamentum, (cum adstringens
 & exsiccans gustu sentiatur,) non esse præ-
 ter rationem arbitratus sum, nomine Stœ-
 bis Capitatæ Rosmarini folio eam insigniri,
 donec verius aliquod inventum sit, cui me
 subscribere non recusabo.

Chelydonium sylvest. Cordi: seu Caltha
 palustris, Gesneri: Matthioli pro Far-
 fugio pingit.
 Phalangium Crete Salonensis Penæ: seu,
 Pseudoasphodelus, vel Asphodelus
 minor Dodonæi, & Asphodelus 111.
 Clusij.
 Lotus tetragonolobus Camerarij. Vbi
 etiam abundanter conspicitur,
 Oleaster Germanicus, Cordi: seu (ut
 multi existimant) Rhamnus primus
 Dioscoridis.

petuo præsidio Sereniss. Senatus Veneti custoditam, & per callem hunc montibus adhaerentem partim arte, partim natura extructum, iter fit in ipsam Germaniam: in via ista invenitur:

Pfyllium, frequentissimum.

Ægyptus Penæ: & prima Matthioli.

Alcea vulgaris.

Alcea Veneta Tragi: Alcea peregrina solisequa Penæ: secundum aliquos Vesicaria Cordi: à Matthiolo pro Hyppocoo exhibita.

Bryonia.

Phyteuma Dalechampiij frequentiss.

Chamædrys, frequentiss.

Perfoliata rubra, quorundam, Gesnero:

Tamecnemum Cordi: Vaccaria Dodonæi.

Dorycnium Rondelletij, Penæ.

Tribulus sylvest. Dalechampiij.

Terebinthus, frequentissimus.

Mahaleb Gesneri, & Matthioli.

Leucoion sylvest. Pannonicum Clusij.

Lycium Italicum, Matthioli: an infectoria Spina altera Clusij?

Lolium Fuchsiij: Gittago Tragi: Nigellastrum Dodonæi: à quibusdā Pseudomelanthium, & Lychnoïdes segetū.

Clematis altera Matthioli.

Campanula arvensis minima, Dodonæi; quam ipse olim pro vera Onorichide exhibebat.

Gladiolus vulgaris.

Galega, seu Ruta Capraria: à Clarissimo Philosopho ac celeberrimo Medico, Hieronymo Fracastorio Onorichis dicta: à quibusdā Italis, Lavanesi.

Trio, seu Erysimum.

Lycopsis Loniceri: sylvest. Buglossi congener.

Vvularia Tragi: Cervicaria, & Trachelion multorum: à quibusdā Archangelica.

Rheseda Plinij secundum aliquos: dubitat an Cantabrica Plinij Pena: ab Italis, Eruca peregrina vocata.

Dentellaria Gesneri: Dodonæus, Erygerum quartum facit: Pena, pro minima Conyza exhibet: Matthiolum pro minore Conyza pingit; & Phyllium, à Cordo.

Veronica fœmina Fuchsiij, & Matthioli: Pena verò pro vera Elatine Dioscorid. pingit.

Lamium Plinij; seu iners, ac mortua Verticilla.

Lamium Penæ: perperam à Matthiolo pro Galeopsi Herbariorum picta; ut Lacuna affirmat.

Perfoliata Dodonæi.

POSTEA verò ingredimur Pagum Caprinum, nobilem, multum feracem, pluribus fontibus scatentem, & nobilibus habitationibus exornatum. Hic observantur:

Asplenium Diosc. Cetrach Arabum.

Polytrichum, utrumque.

Phyllitis Dioscoridis.

Hydropiper Dioscor. seu Persicaria non

Drypis Dalechampiij.

Drypis Loniceri.

Fraxinus.

Populus Lybica, Nigra, & Leuca.

Rubus.

Prunum sylvestre ex quo fit Acatia vulgaris.

Ligustrum vulgare: à nonnullis Cyprus vocatur: sive Phillyrea à Dodonæo.

Phalangium ramosum Lobellij.

Fusanum nostrum: Evonymus Theoph. Lobellio: Tragus pro Carpine Theophr. proponit: Cordus verò Anonymon vocat.

Lotus arbor Diosc. à nostris autem Perlaro vocatur.

Fruentone nostrum; seu Theophrasti Erysimum Penæ: vel Ocymum Veterum Tragi: à quibusdā Lampfana vocatum, hic copiosissime colitur.

Melampyrum Theophr. Cordo, Trago, & Dodonæo; seu Vaccinum Triticum: à Clusio Parietaria sylvest. Pannonica tertia: Alopecuros Plinij Lobellio: & Stelephuros Plinij, quibusdā.

Telephium Diosc. Anguillario, & Guilandino: Scorpioides Matthioli: seu, Telephium Crateuz, Lobellio.

Brassica campestris Clusij: & Perfoliata siliquosa Anglorum.

Caryophyllata vulgaris, an (utinquit Pena) Genm Plinij? à quibusdā Chrysogonum Diosc.

Rapunculus sylvest. cœruleo flore; seu sylvest. Tragi: Dodonæus Rapum sylvestre facit.

Ocymastrum Fuchsiij: Ocymum sylvest. seu Adinos Dodonæi: à Pena, pro Cynopodio vulgari odore Pulegij exhibitum: Tragus Calamintham montanam facit, sed male; nam Calamintha montana verà ab ista diversissima est, ut infra adnotabimus.

Lappa agrestis Tragi: à Pena; Cautalis albo flore vocata: Aster Diosc. Penæ: alter Matthiolo: Bubonium Galeni, Dodonæo.

Aster primus Matthioli; seu Ansellus Virgilij.

Calcitrapa Cordi.

Chamaemelum Eranthemum; Fuchsiij.

Consolida regalis, quorundam.

Ruta Canina Rec. an tertia Scrophularia Dodonæi?

Galium floribus albis.

mitifolia; perperam Crataegonum Cordi, aliqui vocant.

Hydropiper Ruellij; seu, Hepatorium Cannabinum vulgò; perperam Hepatorium

patorium Avicennæ creditum.
 Hydropiper alterum Herbariorum, Dalecham-
 pio: à quibusdam Chrysanthemum.
 Androsæmum Matthioli, Penæ, & Lobellij.
 Ascyrum Matthioli, & multorum.
 Lyfimachia altera Matthioli: seu (ut Pena inquit) Lyfimachia purpurea, an verò Pliniana?
 Nummularia Recentiorum: an (ut inquit ipse Pena) Erestedanû Theoph. à Cæsalpino Boriffa dicta.
 Artemisia major, seu vulgaris.
 Centauroides vel Lymnesium Cordi: fortè (ut inquit Anguillara) Papaver spumeû: Gratiola, & Gratiadei vulgò.
 Anagallis utraque, terrestris, ac aquatica.
 Symphitum maius, floribus albis, & purpureis.
 Solanum Halicacabum Diosc.
 Hedera terrestris Matthioli.
 Hermodactylus, sive Colchicum nõ venenatum Officinarum: quorundam Narcissus Virgilij.
 Symphitum medium, & minus.
 Ophyoglossum, Fuchsi; seu Enophylon: à Cordo lingua Vulneraria: Ligulacam Plinij Gesnerus autumat: à quibusdam Ceratia Plinij, Luciola etiam, ac Argentina nuncupata.
 Genistella infectoria vulgatissima: an (ut Pena inquit) Lutea Plinij: à Trago perperam pro Ferula proposita.
 Potentilla minor, seu Argemone quorundam.
 Vitis sylvest. Matthioli: an (ut idem Pena inquit) Melotton Theoph. seu Cyclaminus altera à Dodonzo: Siliquastrum Plinij Guilandino: à quibusdã Circea, & Dulcisamara vocatur.
 Chrysanthemum Damocratis Fuchsi: Ranunculus verticillatus Apulleij.
 Persicaria pusilla Lobellij.
 Cirsium Matthioli.
 Centaurium luteû vel Citrium, Mesues.
 Vrtica Heraclea Tragi: falsò Scorodonia Cordi à quibusdam credita, nam Scorodonia ab ipso Cordo exhibita alia planta non est quàm Salvia sylvest. Tragi, & Sphacelus Dodonzi.
 Dryopteris, frequentissima.
 Cassuta Plinij: Linodesmum Gesneri: vel Cuscuta vulgò: quidam, Orobanchen vocant.
 Oxyacantha Fuchsi; perperam Berberis multorum.
 Oxyacantha Diosc. & Matthioli, est Berberis genuina Arabum: à Trago Cynosbatos: à Cordo, Sorbus aculeata: Spina Appendix Plinij, à Gesnero.
 Siliqua sylvestris Clusij: an (ut Pena inquit) Cercis Theophrasti? est illa commentitia Acacia prima, à Matthiolo picta.

Condrilla major, Dodonzi, & Loniceri; seu Apate Dalechampi.
 Periclymenum Dioscoridis.
 Periclymenum rectum alterum Clusij.
 Periclymenum non perfoliatum alterum, Lobellij.
 Xanthium, seu Strumaria.
 Caulis Matthioli.
 Tussilago seu Bechion, vel Farfara.
 Equiseti variaz species.
 Phu parvum, seu palustre.
 Acer Monspessulanum.
 Erica major floribus purpurascens, Lobellij: seu Erica altera Clusij.
 Gramen hirsutum, fortè Gramen Leucanthemum Dalechampi: à quibusdam Combretum Plinij dictum.
 Circea Lutetiana.
 Orvala tertia Dodonzi: seu Colus Iovis, vel Galeopsis lutea, seu Horminum sylvest. quorundam.
 Colutea Scorpioides.
 Cytisus Hispanicus alter, Clusij.
 Item quartus, ejusdem.
 Cytisus alter, Penæ.
 Cytisus albus sylvest. Cordi: an Cytisus, Gesneri?
 Valeriana rubra Dodonzi; & Ocymastrum Valerianthon: an (ut inquit Lobellius) Cõdurdum, Plinij? fortè Narcissus Virgilij & Columellæ: Strution ab Excell^{mo} Aldroando: & à quibusdã Ben rubrum creditum.
 Aria Theophrasti, Dalecham-
 pio.
 Phyteuma Matthioli: à Penæ Campanula persicifolia, vel quæ Iasone à Theophr. credita.
 Viburnû Matthioli; seu Lantana vulgò.
 Daphnoides, seu Laureola.
 Digitalis Lutea parva.
 Iacea montana Narbonensis, Lobellio.
 Anemone tenuifolia Cordi: Eranthemum Gesneri, & Dodonzi: Matthioli, Adonis florem nuncupat: Lobellius φλδξ, id est, Phlox Theophrasti, autumat.
 Orobis Venetus primus, & alter, Clusij; seu purpureo, & albo flore.
 Galeopsis Dioscoridis. cujus radices quia albo Helleboro persimiles sunt, hactenus pro ipso Helleboro in Officinis perperam exhibitæ sunt. hujus effigies à nullo certius relata est, quàm ab Excellentissimo Camerario, in Epitome Matthioli.
 Genistella aculeata; fortè Vlex Plinij, Penæ.
 Pneumonanthæ Cordi: Gentianæ minoris species, Penæ: à Dodonzo, Viola Calathiana dicta.
 Geranium Bathrachioides Dodonzi: vel Gratiadei Germanorum, Lobel.
 Geranium Hemathodes; seu Gruciale supinum Lobellij.
 Chamæcistus 111. Pann. Clusij.
 Hyssopus

Hyssopus Officinarū, vel potius Thymbræ species.
 Anonymos linifolio Clusij.
 Clematis tertia Matthioli: seu Vitis sylvest. Dalechampij.
 Ocymoides repens polygonifolio, Penæ.
 Juniperus minor, seu vulgaris.
 Taxus: Milos Theoph. Pena, seu *σμύλος*, vel *σμύλαξ*, Diosc. & Galeni.
 Leucacantha Monspelliensium, Dalechampio.
 Asarum; perperam Baccara multorum.
 Polygala Matthioli, non Diosc. Astragaloidem, Lobellius facit: an potius ad Loti species referenda est?
 Lotus sylvest. Anguillaræ, & Matthioli: seu Trifolium Asphalthæum, Fuchsj; vel odoratum Trifolium, seu sativa Lotus Dodonæi: an Mel frugum Theophr. ut Pena inquit?
 Calamintha montana; & altera Calamintha, Matthioli.
 Lampana Dodonæi.
 Clymenum Plinij quorundam: Dodonæus, Androsæmum facit: vel alterum Androsæmum Fuchsj.

Locvs Coronæ, est in angustijs duorum montium, qui constant ex solido saxo, semi milliaris altitudinis, adamussim perpendiculariter recti, ac aspectu horribiles, supra medium sinistri quorum exprorecta est magna saxosa portio, hortulum pèilem repræsentans, inaccessibilis, nisi per funem ab altitudine superiori demittaris: aut via hominum industria parata, aspera, & difficili circa latus dexteri montis descendendo, ex hoc ad sinistram trans eas per ligneum pontem, valida Tiliæ fœminæ arbore bifurcata fultum, quæ Tilia aded magna (divinum profectò) ex vivo saxo exoritur, ac alimento à simplici lapide suggesto nutritur, augetur ac germinat, pandens ita nobiles illos duos ramos, ut ponti viride tegumentum parer; hinc per arctam semitam in montis latere gradatim excisam, & unicæ personæ deservientem scanditur ad naturale podium, ubi perpulchrum, neque parvum Templum Deiparæ, semper Virgini gloriosæ erectum est, cunctis non solum vicinis pagis, sed etiam remotioribus oppidis, & urbibus venerandum, ad quod præsertim decimo octavo Kal. & sexto Idus Septembris turbæ hominum copiosissimæ confluunt; quod ab Heremita quodam venerabiliter custoditur, quare ab aliquo etiam probo viro solitudinis cupidus hujuscemodi apta contemplationi loca initium sumpsisse credibile est: hinc Omnipotenti Deo mentis elevatione aguntur gratiæ, atque divinæ clementiæ beatæque Virgini locorum indagatores semetipsos commendant, subinde bene cultus hortulus religiosi hominis invisitur: jam verò cum superius denuò reditum est, in initio descensus consistendo, deorsum prospicientibus sese offert admodum amœna Vallecule Brentini, agris vitiferis, & optimè cultis insignita, qui rapido, flexuosissimoque Athesi summa cum voluptate levari conspiciuntur: in hoc admirabili Coronæ situ hæ plantæ virescunt:

Corydalis Galeni Anguillario: seu Fulmaria tertia Matthioli: Splith, vel montana Corydalis quibusdam an (ut Lobellius inquit) Phragmites Aetij?
 Scorzonera latifolia, seu Hispanica; è rimis tantum saxorum erumpens.
 Crocodilium Fuchsj: à Gesnero, Echinopus vocatum: à Cordo, Carduus Sphærocephalus: à Trago, pro vero Chamæleone pictum: Pena verò, Ritro seu Rutro Theophr. autumat: Dodonæus, pro Spina peregrina pinxit:
 Spina alba quorundam: seu Sphærocephalus annuus, Camerarij.
 Fabaria, seu Faba inversa, vel Crassula: à Trago, pro Scrophularia exhibita, ut inquit Pena, quam Telephium Græ-

Chærephyllum, vel Chærophyllos Columellæ, Dodonæo: à Manardo, Mirrhys credita: Orcoselinum Anguillaræ: & Cerefolium, & Gingidium multorum.

Marrubium agreste, Tragi: seu Stachys Diosc. (ut Pena inquit) & Scordotis, Plinij.

Herba sacra quorundam Dalechampio: seu Mellissophyllum Tragi, & Cordi: à quibusdam perperam Mellissophyllum Fuchsj; putata: nam (ut mihi videtur) Mellissoph. Fuchsj; est ipsa montana Calamintha, Penæ.

Sphondilium Rec. seu Acanthus Germanica.

Cicuta.

Serpillum, utrumque.

Polium alterum Matthioli: à quibusdam Iva mœscata.

Anonymos flore Coluteæ, Clusij, sive prior.

Castanea; atque Carpini frequentiss.

Et hæ plantæ, usque dum ascendendo pervenimus ad coronam.

corum ipse putat.
 Saxifragia magna Italarum; frequentiss. ex scissuris pullulat.
 Polemonia petraea Gesneri, Joachimo Iungermanno.
 Fistularia petraea, seu Alektorolophos tertia alpina Clusij.
 Hyssopus montana.
 Parietaria sylvestr. prima } Pannonicæ
 Item sylvest. altera } Clusij.
 Saxifragia Bavarica } Iungermanni.
 Saxifragia hircina elegantissima }
 Epimedium Penæ; & Dodonæi: Lunaria media secundum aliquos.
 Euphrasia altera, Lobel. & Dodonæi.
 Cannabis sylvestr. prima Lobel.
 Conyza minor, & media, Matthioli.

Campanu-

Campanula Elzophyllos, Iungermanni.
Sedum magnum pallido flore.
Phalangium ramosum, jam dictum.
Colutea Scorpioides, frequentissima.
Galeopsis aquatica, verticillatis floribus.

Trachelium majus petrazum.



Tanacetum non odorum Penæ; frequentissimum.

Androsæmum Marthioli: frequentiss. & Trachelium petrazum majus nostrum, etiam hic pullulat, cujus Icon hic proponitur.

A Radice lignosa, & rugosa, colore pallido purpurascente exeunt cauliculi multi striati, subhirsuti, cubitales, & cum rubore virides; qui inordinate emittunt folia oblonga, crenata, nigricantia, sua pariter hirsutie communita, parte prona potissimum, ubi etiam albicant, & Salviæ folia referunt, magis tamen angusta, & mucronata; inter quæ parvula quædam foliola prodeunt: in summo caule sunt flores multi acervatim congesti, quæadmodum in umbellata Cervicaria Penæ; & inferius ex eodem globuli quidam, at minori numero, & inferius magis inter caulem, & folia, alij, & adhuc pauciores; formam representant illorum jam dictæ Cervicariæ, sed minores, albi, & in quinque, & quandoque septem mucronatas scissuras divisi; è quorum centro multa exeunt stamina sublutea, quorum unum modo Proboscidis egreditur, versus cacumen satis crassum, quod dum maturatur, bifurcatum & aduncatum evadit. decedente Augusto florens conspicitur, atque talis per plures dies conservatur, unde hætenus semen minimè observari potuit; inter rimas illorum asperrimorum lapidum Baldi, solum circa Coronæ Templum pullulat. Trachelium hoc non acre, non amarum, sed tantum adstringens esse sensu dignoscitur, multoque magis ipsa Cervicaria.

Hic contiguæ aliquæ domus sunt quorundam hominum urbanorum qui Cruciatii vocantur, in quibus hospitia non incommoda pro locorum ratione haberi possunt: Hinc discedimus ad Vallem frigidam, & primò transimus per quædam prata, vulgò Prata Bazaria dicta: deinde ad Basianam, & Imen, quæ sunt Vallecule Meridiem spectantes, admodum herbosæ, in quibus greges pecudum, & armentorum pascuntur, eo præsertim temporis initio, cum in montes tendunt; atque etiam, cum ineunte frigore ab altioribus descendunt; & hoc ne quid à frigoris subita mutatione animalia patiantur: Quæ Valles multis caudicibus, Acerum: Ariarum Theoph. Viburnorum, Corylorum, Fagorù, & pullulantium Quercuum abundant, inter quas frequentissima germinat;

Montana Calamintha vera Antiquorum, à Pena, & Lobellio celebrata; sive Mellissophylon verum Fuchij.

Hic etiam virescunt plantæ hæ:

Bistorta major vulgatissima: à Gesnero
Limonium: à quibusdam, Britannica existimata.

Caltha alpina Gesneri: Plantago alpina ab alijs: an Celtica nardus altera Penæ? & Rondelletij? fortè Chrysanthemum Dodonæi: & Doronicum quartum Clusij.

Chamæleon albus Dioscor. Helxine Plinij, Anguillarij: Sylibus Gesneri; & Carlina vulgo, Martagonis, seu purpurei Lilij, variaz species.

Hyacinthus Germanicus liliflorus, &

Hyacinthus bifolius Theoph. Penæ.

Aspodelus albus major, frequentiss.

Verbascum Tragi: Cyanus major Lobellij.

Cyanus supinus Lobellij.

Cirsium Pannonicum primum Clusij.

Orobanchæ, variaz.

Panax Heracleum Recentiorum.

Myrrhis altera parva Penæ: perperam Daucoides Cordi, Lobellio: quidam pro vero Sefeli; alij pro Ligustico genuino in pharmacis ponunt.

Alectorolophos, Plinij, seu Crista galli: ab aliquibus Alliaria dicta.
 Cirsiium Anglicum Penæ.
 Atlepias flore albo, frequentiss.
 Heliochrysos silvestris Tragi: vel Chry-

socome Germanica, Lobellij: à Matthiolo Pseudoleontopodium dicta.
 Onopordon Plinij Dalechampio: fortè Carduus Eriocephalus Clusij: à quibusdam Corona fratrum.

Et sic pervenimus in nobilissimam, ac omni laude dignam frigidam Vallem, ortui solari expositam. hinc sunt planities non parvæ herbis abundantes, quibus à Maio, usque ad Septembrem mensem animalia copiosa nutriuntur; hic adsunt cavitates quædam, in quarum duabus pluviales aquæ conservantur, in tertia autem salientes aquæ perpetuò scaturiunt: his armenta pro potu utuntur. In eisdem copiosè luxuriat,

Potamogetum, seu fontalis: perperam Malabathrum Lusitani.

Hic sunt humiles, & pastorales casæ, seu Tuguria ex viminibus contexta, flantibus ventis pervia, paleis cooperta (Baito) ab Incolis dicta, sub quæ lac defertur atque asservatur, & sub his, & ab imbribus pastores ipsi sese tuentur: in ista planitie frequentissima est,

Alchimilla, seu Stellaria multorum; seu Leontopodium Brunfelsij: Drosium à Cordo nuncupatum.
 Soldanella montana Clusij, passim.
 Britanica Fracastorij: an potius Hormini silvest. species?
 Veronica supina, Lobellij.
 Carduus Condryloides Dalechampij.
 Hyerobotanæ mas, & femina, Dodonæi.
 Bellis cœrulea magna.
 Helleborus albus, floribus pallefcientib.

Primula veris prior, & altera, Matthioli: à Fabio Columna Neapolitano, Alisma sylvarum, & pratorum, vocitatur.
 Polygala, Tragi, & Dodonæi: seu Onobrychis, Diosc. Lobellio.
 Item floribus luteis, ab Excellentiss. Iacobo Zuingero inventa.
 Aconitum Lycoctonum vi. Clusij.
 Lotus encaphyllos Dalechampij: multi ex nostris pharmacopœis, pro vero Meliloto utuntur.

Quibus perspectis aggredimur ascensum, (& difficilem sanè, licet talis non videatur) ad scopulorum latus, atque simul hæc simplicia à nobis collecta,

Loti, variæ species.
 Helleborus albus floribus atrorubētibus.
 Aconita varia.
 Pilosella floribus rubris.
 Gramen parnassi, vel Liliiconvallij species Dodonæi: aut Monophyllon multorum: Cyclaminus altera Diosc. seu

unico folio Dalechampij: non rectè Lobellius Gramen parnassi Cordi facit; nam (ut ipse Cordus scribit) ignorari affirmat.
 Bethonica alpina albo flore.
 Juniperi species minima; fortè Juniperus supina Clusij.

Et cum jam ad eum locum perventum est, vulgò Saxa Vallis Frigidæ appellatum, quæ ardua, prærupta, ac alicubi valde discissa sunt, laborandum est in ingenti selectarum plantarum copia, quæ hinc amœnissimè vivunt, atque virescunt, siquidem observantur:

Crocodilium Monspelliensium Dalechampio.
 Echium montanum Dalechampij: seu ut ego dicerem, Cervicaria montana Thirsoides, seu Trachelium Alopecuroides.
 Scabiosa montana omnium minima Penæ.
 Lonchitis aspera major, Ghini, & Matthioli.
 Centaurium majus alterum Clusij: à quibusdam (falsò) Centaurium majus Dioscor. creditum; & Rheubaldensis quorundam: hinc frequentissimum.
 Veronica mas Fuchsij, & Dodonæi: Lobellius, Bethonicam Pauli facit.
 Veronica Dalechampij.
 Veronica recta minima, Lobellij.
 Leontopodium, Loniceri: an Myosotis?
 Allij montani 1111. species duæ, Clusij.
 Serratula Rec. frequentiss.
 Carduus pratensis, Tragi: seu Acanthus sylvest. Lugdunensium.

Carduus Aræophyllos Dalechampij.
 Chamæleon verus Tragi: Tetralix spinosa Lugdunensium.
 Viola Martia surrectis cauliculis Penæ: à quibusdam Viola arborea.
 Martagon, seu Liliium montanum Italorù: vel Hyacinthus Poëtarum Tragi: seu Asphodellus fœmina, Fuchsij: à Dodonæo, Liliium sylvest. vocatum.
 Polygonatum latifolium.
 Item minus, multorum; seu angustifolium: à Mutono, Chamædaphne Dioscoridis creditum.
 Bellis maxima flore Anthemidis: sive Bellis major Lobellij.
 Antiphthora, frequentissima.
 Napellus verus cæruleus, Penæ.
 Napellus vulgaris, seu Lycoctonum fativum Ericarpum, Cordi.
 Iacea nigra, Dodonæi.
 Panax Chironium Tragi: seu Isophyllon Cordi, vel Bupleurum alterum latifolium, Lobellij.

Bupleurum

Bupleurum Penæ; seu angustifolium.
 Aster luteus, seu Oculus Christi major
 Dalechampij.
 Achillea fideritis Matthioli.
 Iacobeæ altera Pannonica Clusij.
 Draba Penæ.
 Hypoglossum multorum: Fabius Columna, Radicem Idæam facit.
 Lunaria Magorum Arabum Penæ: seu Oxalys scutiformis, vel saxatilis.
 Onagra Rec. an potius Lyfimachia filiquosa species? quibusdam Chamæmeris Gesneri putatur.
 Digitalis prima, Tragi; seu amplo flore: Dalechampius Verbasci specie facit.
 Pseudoasphodellus Panni, Clusij.
 Dauci alterum genus Fuchsj: à Lobelio, Lybanothis Theophr. vocata.
 Daucitertia species Fuchsj: seu Lybanothis
 Clematis Crutiata alpina.



Sedum Petræum montanum, Penæ: fortè Phyllum Arrhenogonum primum Dalechampij.
 Campanula minor rotundifolia, Lobel. frequentissima.
 Auricula Vrsi Matthioli: Britanica, seu Arthritica, Anguillaræ: Lunaria Arthritica à Gesnero: à Fabio Columna,

Indidem præterea mirabiliter, ac elegantissimè exsurgunt plantæ hæ nostræ, Icones quarum, & descriptiones, sunt quæ sequuntur:

nothis altera Dodonæi: & minor Lobellij.
 Geleopsis Cortusi: Scrophulariæ congener est.
 Linum sylvest. Pann. alterum Clusij; vel Cistoydes Linum.
 Lychnis quarta Clusij.
 Flamula, & Clematis recta.
 Trachelium majus, & minus Fuchsj.
 Scorzonera v. Pannonica Clusij.
 Succisa Fuchsj; seu Morsus Diaboli.
 Ornithopodium Dodonæi.
 Condrilla cœrulea flore pulcherrimo; seu Sonchus lævis primus Clusij.
 Passerina Linariæ folio, Lob. seu Chrysocome altera, Mutoni.
 Galega montana, Dalechampij.
 Vbi etiam;
 Clematis Crutiata alpina nostra, invenitur; cuj? effigies ac descriptio sequitur:

A Sarmentosa radice egerminant multi caules vitignei, magis subtiles quam in alijs Clematidibus; lignosi, angulares, lenti, & tricubiales; è quibus surculi multi adhuc magis subtiles quatuor digitorum altitudinis, qui æqualiter bipartiti ad latera dividuntur, singuliq; obtinent tria folia iusto intervallo divisa, & pediculo brevissimo adnexa, forma mirtea, tamen majora, satis profundè per ambitum secta, nervosa, rugosa, inæqualis magnitudinis, nigroque virentia: est illi flos Crucem representans, folijs mucronatis, lanuginosis, cœruleis albicantibus, cujus medium acervulo quodam extremulis foliolis (uti in Rosa Alexandrina apparet,) decoratur. Est sarmentosa, & perenni radice. Oritur in altioribus Baldi rupibus, quibus Eurus dominatur. Bruma arefcunt folia. Planta aliquantulum acris sapore: radices verò insipidæ existunt.

Ex simplicibus cotibus egerminant:
 Phyllum Arrhenogonum majus Dalech.
 Nardus Celtica, frequentissima.
 Daucus primus, Dioscor. seu Creticus vocatus.
 Saxifragia major, frequentissima.
 Umbilicus Veneris alter, frequentissimus.
 Rapunculus major latifolius, seu Alopecuros Theoph. Dodonæo.
 Rapunculus montanus angustifolius.
 pro genuino Alismate proponitur.
 Aizoon montanum Dalechampij. & Cneorum aliud Theophr. Matthioli, in postrema Commentariorum Latinorum editione.

Trachelium petraeum minus.



Veronica petraeae semper virens.



planta. acerbi, & austeri saporis esse gustu percipitur.

IN ipsius Baldi altioribus summitatibus, cuiusvis alius plantæ, à Trachelio petreo minori, sterilissimis, inter præcipites illas coetes ab eisdem veluti cadentibus pendens, germinat Trachelium istud, lignosa, pallida, ac valde rugosa radice, sesquipalmari, à qua folia numerosa pediculis quatuor vel ad summum quinque digitos transversos altis nixa, Cymbalariae folia ut plurimum æmulantia, non ita crassa, sed nervosiora, & profundius laciniata, atque in viridi colore nigricantia; & ex qua separatim cauliculi multi, tenues, læves, nigrovirentes prædictæ altitudinis, cum folijs aliquot substantia cum superioribus, quorum aliquando unum non longo pediculo circa medium caulem emicat, reliqua florem semper circumvolvunt, sed hæc angustiora, & magis laciniata prioribus existunt; inter quæ umbellæ vice flores calycibus brevissimo pediculo contenti prædeunt in nigro purpurascete cærulei, Chymicæ cucurbitæ vitreæ simillimi, quinque incisuras obtinentes in medio corporis tumore, quæ neque ad collum perveniunt, nec totum corpus ad calycem usque discindunt: in cuius medio multa filamenta nutriuntur, quorum unicum illius longitudinis est, ut aliquantulum crassum collum, multum egrediatur, & quod maturitate bifurcatum fit: Floret tempore majoris Trachelij nostri: semen nondum conspeximus: perennis, & astringens est planta.

Item:

Veronica petraeae semper virens.

EX scissuris simplicis & omnino nudi saxi Baldi, hæc nascitur, quinque, sex, vel pluribus etiam caulibus rotundis, non ramosis, altitudinis sesquipalmari, è quibus foliola bina exeunt, (licet aliqua magna reperiantur) æquali ordine disposita, uti Chamædryd, tamen non sic profundè incisa, admodum crassa, splendida, supernè virentia & lanugine quadam donata, infernè verò albicantia: fert in summitate multos flores ad instar spicæ, quaternis, quinis, & septenis folijs cæruleo colore, aliquantulum albicantibus; quibus cadentibus relinquitur calyx, in quo semen continetur, ut in alijs Veronicis fit. Habet radices parvas fibrosas ac nigricantes, quæ ita saxi illis horridis paucissima commixta terra includuntur, & adherescunt, ut difficilimè etiam ligonibus evelli possint. Floret initio Iulij, & circa finem maturatur semen. Semper virens est, & elegantissima pulcherrimæque

Item:

Veronica minor alpina, Serpilli folio.

Thlaspi petraeum Myagroides.

Item:

Veronica Serpillifolia omnium minima.



VERONICA minima folio Serpilli, oritur in altioribus summitatibus Baldi, Orientem versus, multis ramusculis surculosis, rotundis & laevibus; altitudinis ad summum unius cum dimidio palmi: fert folia Serpilli modo, sed aliquanto longiuscula, in nigro colore virentia, non serrata; licet aliquando (sed raro) aliqua divisa conspiciantur. in summitate absque aliquo ordine habet flores, cum quinis, aut senis, & quandoque etiam quaternis tantum folijs. simili colore floribus perreæ Veronicæ, sed dilutiori. Calycem seu Vasculum, dum flores deponit, retinet; in quo clauditur semen rotundum, minutum atque nigrum: radix est lignosa & fibrosa. Floret Julio mense; semen Augusto maturitate perficitur. Perennis naturæ planta est; licet frigore depereant comæ. tota planta, & semen gustu adstringenti deprehenditur, nulla percepta acredine, aut mordacitate; unde in fluxibus & in quibus adstringere sine caliditate opus est, aptum esse medicamentum judicari potest.

Item:

Saxifragia alba petræa.



HABET hæc tenerissima planta radiculam unicam, tenuem, capillarem, ad semipalmum altam ac rufescentem, à qua plura folia substantiâ, ac formâ albæ Saxifragiæ, molliora tamen, ac profundius divisa, è quorum medio caulis assurgit teres, nodosus, leviter hirsutus, dilute purpurescens, ac dodrantalis. huic inhærent ramusculi plurimi ab imo ad summum inordinate dispositi: in summitate frequenter sunt flosculi quinque candidissimis folijs constantes, quorum centrum quædam pallefcientia filamenta occupant; istis cadentibus relinquitur calyx semen continens minutissimum, uti in Saxifragia magna Italica. Floret Junio mense ad finem; facillime languescit, ac deperditur: initio dulcem existimes, postea vero acrimonia percipitur.

Item:

Thlaspi petræum Myagroides; cujus est hæc descriptio.

IN scissis cotibus frigidiæ Vallis pullulant à radice capillari folia multa humi sparsa, & per ambitum secta; atque unicus quadrangularis caulis atrovirescens, ad tres palmos altus, à medio ad summum in varios ramusculos divisus, in cujus summitate flosculi albi foliorum quatuor; quibus de-

Thlaspi petraeum Myagrodes.

Veronica minor alba, scilicet scilla.



cidentibus relinquuntur vascula omnino re-
ferentia Dodonæi Myagrum. Floret ad exit-
tum Iunii. saporis acrimonia nulli Thlaspi
generi cedens.

ALIQUANTULUM autem supra ipsa non fa-
tis celebrata dirupta saxa, in dextera parte
scaturiunt aquæ gelidissimæ ad Notum ex-
positæ, quibus Fons Navolæ nomen est, qua-
rum frigiditatem manus vix ferre possunt,
imò quandoque vitrea ipsa vasa, ad refrige-
randum potum in iisdem immersa, quæ ca-
lores propter difficilem ascensum contra-
ctum, leniantur, minimo temporis spatio
perfracta sunt, quæ quamvis abundanter satis
fluant, per illam Montis partem dimidij mil-
liaris altitudinis ad Vallis frigidæ planitiem,
attamen ad hanc non perveniunt, sed totæ
ab illa terrarum superficie absorbentur, circa
fontem istum nullæ surgunt plantæ, quæ ali-
bi observatæ non sint.

AD dexteram autem Fontis, est Vallec-
ula quædam appellata (*la Valle del Bastion*) quòd
olim ibi magnus murus in formam propu-
gnaculi ædificatus, ad transitum Germano-
rum retardandum. Hanc percurrentes dum
descendimus ad diversorium, in parte dexte-
ra Navolæ contigua, Zephyro opposita, fre-
quentissima vidimus:

quorundam: an (ut Gesnerus inquit)
potius Ledon alpinum? à Dalecham-
pio Evonymon Theoph. creditum: ab
Excellentiss. Aldroando Nerium alpi-
num dictum.

Chamærododædron Allobrogum, Penæ.
Idæam Vitem Theophr. Dalecham-
pio: at Clusius in Pannonicis, alteram Vi-
tem Idæam facit: ab Anguillario Vva
Vrsi dicta: Dodonæus, Vacciniam ni-
gram vocat: alij, Mirthyllum.

Tussilaginis alpinæ Clusij, duas species,
Pinguiculam cœruleo, ac albo flore.

Tussilago.

PARS verò ejusdem sinistra, sterilis
existit.

Tormentilla candida frequentissima.
Ranunculus IIII. luteo flore Fuchsj: si-
ve Ranunc. nemorosus luteus, Dodo-
næi.

Item Ranunc. glomerosus frequentiss.

Crocum

- Pirolam alteram Pann. Clusij fortè Am-
brosiam montanam Dalechampij.
- Item quartam Pann. Clusij.
- Item Pyrolam Matthioli: & Limonium
Fuchsj.
- Hepaticam albam Cordi: seu Gramen
Parnassi Hederaceo folio Lobellij.
- Salicem Platiphylleos: Leucophlæos
Dalechampij.
- Salicis Pumilæ genus quartum Clusij.
- Balsamum alpinum, & Rosam alpinam,
- IN medio verò ipsius Vallis ad Orientem provenit frequens.
- Filix mas.
- Cacalia Penæ.
- Cacalia prima Pannonica Clusij.
- Aconiti varia genera.

MANE à somno experrecti, oriente jam sole ex hospitio (Baito videlicet) scandimus
denuo (lævorsum tamen) jam dictas diruptas rupes, ac pervenimus ad verticem montis ubi
(quoniam terra nonnihil videtur depressa) & sinum quendam efficit, ideo vulgò Os Na-
volæ appellatur, expositus autem est locus iste ad Africum sive Lybem, quo circumcirca
provenit:

- Pulsatilla albo flore Penæ: seu Anemo-
ne sylvestris altera Pann. Clusij: vel Sa-
molum Plinij Dalecham-
pio: ut in
suo Horto medico Camerarius testi-
ficatus.

AB hac aliquantulum descendendo venimus in quædam prata ad Occidentem spectan-
tia Vrucaria vocata, quæ plantis istis ornantur:

Crocum vernum minus prim. Clusij. frequentissima.
 Ranunculus bulbosus Penæ: seu Tuberosus Dodonæi: aut Batrachium Apuleij.
 Oenanthe alpina Penæ: passim.
 Serapias candido flore Lobel. sive Cynosorchis montana folio maculoso Gemmæ.

Hinc Aquilonem versus per eandem hanc partem montis, in alia prata amplissima, herbosissimaque transivimus; Baldensibus ea Vallis Vaccaria vocatur, quod illic opimis pascuis aluntur innumerabilia boum armenta; dives autem est locus iste fonte perenni aquarum salientium, quæ usui sunt non solum pastoribus, atque armentis ad extinguendam sitim, verum & ipsis pascuis ad humum irrigandum: surgunt hic

Major, minor, & minima Gentiana Matthioli.

Pseudorchis, Bifolium Dodonæi: à quibusdam Ophrys Plinij: Gramen Parnassi quorundam Lobellio.

Coriandrum sylvest. Myconi.

Liriasphodellus albo flore: seu Hemerocales Dalechampij.

Thapsia Matthioli.

Aconitum tertium Matthioli.

Aconitum tertium Diosc. frequentis.

Laserpitium Fuchsj: à Trago Smyr-

nium nuncupatum: Anguillara Lygusticum autumat: Cordus, Struthion facit: ab aliquibus Imperatoria, Ostrutium, & Magistrantia.

Auricula Muris, frequentis.

Pæonia fœmina.

Sphondylium laciniatis folijs.

Orchidis varia genera.

Saxifragia umbellifera Penæ.

Galeopsis maxima Pannonica Clusij.

Ornithopodium Dodonæi.

Draba altera Pannonica Clusij.

Ab istis autem herbosissimis pratis ad Occidentem versus, statim ascendimus (& laboriosè sanè) ad cacumen montis, à Vaccaria valle unius miliaris altitudine perpendiculariter elevatum; cui nomen est, Mons Major. quoniam omnium vicinorum montium altitudinem superat: hic stantes Benacum detegimus, qui à Sarcis Tridentinis initium fumens, desinit in Mintium flumen Fischeriam ingrediens, & eandem in duas partes secans: Hic Fischeriæ locus, mœnibus, propugnaculis, & mole tutissimis munitus est: hic numerosæ Anguillæ, ac Troctæ maximæ abundantissimè capiuntur à piscatoribus: Cernimus subinde Syrmionem peninsulam, natale solum Catulli nostri Poëtæ; ubi non longè sub ipsis Benaci aquis, fontes sulphurei creduntur esse; exhalationem certè sulphuris, & sentis, & hauris naribus. Ulterius est in conspectu Decentianum quarumcumque frugum emporium magnum. Præterea Salodium, quod ad urbis dignitatem proximè accedit, oculis sese offert; hic merx de albatii fili, ejusdemque subtilissimi ad veltes lineas consuendas & acu pingendas, copiosissimè exercetur. Ob oculos quinetiam versatur, Maternum, & Tusculanum. His tribus in locis, ubi vitalis saluberrimæque aura ducitur, omni arte ac industria coluntur Viridaria arborum præstantissimarum, ut sunt Malus Citria, Malus Medica, & Massilica. inter quas sunt etiam quædam quæ ingentes fructus ferunt, Poma Adami vocitata, propterea quod in inferiori parte cicatricem obtineant, post morsum primi patris, (ut ferunt) relictam. Hæ quidem celebrandæ plantæ, quovis tempore florent, & totum annum acervatim fructus conservant. horum locorum parietes ex Lauro & Mirto, quasi auleis quibusdam mirè teguntur. his & hortorum viæ concinnè admodum exornantur: atque aded abundant Lauro loca ista, ut hac, vice lignorum, ad instruendum ignem etiam populares utantur. Ex quibus amœnissimis viridarijs, præter delicias, summus quoque proventus excipitur, cum fructus isti non solum nobis, & vicinis civitatibus, verum etiam Germanis ipsis cumulatissimè impartiantur. Papyrus scriptoria hic etiam in magna copia conficitur. Hinc conspicitur parva insula Monachorum minorum D. Francisci, in qua abundanter provenit,

Herium albis, & rubris floribus, ex faxis nudis prope aquam pullulans.

Aspectui etiam sese offert, Bojacum, ubi piscatores Carpionum præcipuè degunt. Ulterius Vicus Campioni, quo in loco ad excoquendum ferrum, ferramentorumque genera omnia extruenda, ædificia varia fabricata sunt, habent namque hic aquas ipsis inservientes, atque fodinas ferrea materia exuberantes; atque ut paucis totam rem perstringam, hic contemplari licet aquas diversicolores: selectarum olearum oliveta frequentia: Naves, (quæ tamen naviculæ apparent,) tum ab aspirantibus ventis, tum nautis remigantibus, Lagisium hanc Veronensis oræ, illam ad oppidum Tridentinæ Ripæ impulsam: prætereo rivulos murmurantium aquarum, Pistrinis ad molendas fruges, ac torcularibus varijs deservientes: prætereo ut prolixitatem evitem, diversos alios pagos: taceo tempestates procellosas, ac repentinas, quibus Lacus iste commovetur, ob contrarios ventos tempore eodem inter sese concurrentes. Ut jure Virgilius Lacum verbis illis compellarit.

Fluctibus, & fremitu assurgens Benace marino.

Ad summum, humanis delitijs, ac vitæ salubritati, ora hæc locupletissima Benacensis opportunissima existit.

Ex hac etiam specula veluti ab altissima eminentissimaque Arce, Verona, ejus territorium, Athesisque flexuosissimus oculis sese (confuse tamen,) subiiciunt; luminoso etiam, serenoque existente caelo remotiores vires, sed adhuc magis indistincte, atque confuse apparent. hic locus distat à Benaco consueto itinere sex milliaribus, perpendiculariter verò duobus: in hoc itidem montis cacumine planities est herbosa, ubi oves, & capræ tantummodo pascuntur; in qua invenitur Trifolium angustifolium alpinum, quod ita describo.

Trifolij angustifolij alpini icon.



NASCITVR Trifolium istud in eodem Majori Monte; ea parte, quæ ad Orientem spectat. cujus radix longitudine est ferè quincunciali; exterius quidem colore pallefcenti, interius verò albido: lignosa autem, & multis oblecta comis: sapore subamaro. Surgit ab hac unus tantum cauliculus, omnibus prorsus folijs nudus, rotundus pariter, cavus, ac laevis, semipedalis longitudinis; qui in summo sine ordine flores emittit, quorum forma ad Vicæ flores proximè accedit, in quibus color purpureus admodum venustus enitescit. E summo radice capite exeunt supra terram quinque, ac plures etiam pediculi, ternas ferè uncias longi, quorum singuli, è medio duas barbudas emittunt; & in summo folia tria, æquo inter se spatio distincta. Horum verò longitudo sesquiuncialis est: at forma angusta, acuminata, ac nervosa. Planta ipsa admodum rara est, & perennis. Floret autem mense Julio. Illius semen nondum mihi conspectum, neque vires satis cognitæ sunt. parte autem occasum spectante fonticulus perpetuò scaturit, cujus aquæ labentes per montis crepidines in Vaccariam vallem, paulatim absorbentur & ad nihilum rediguntur: in parte verò Septentrionem aspiciente semper nives jacent, quas aliquando, cum nimis altæ non sunt, plantæ penetrant, & caput supra ipsas efferentes in eis virescunt, florent & semen ferunt, quod ego ipse mea manu collegi. In hac eadem planitie, ac contiguis alpinis rupibus exurgunt plantæ infra scriptæ:

Alectorolophus primus Pann. Clusij.

Chamælea Germanica, Tragi & Dodonæi: an (ut Pena inquit) Chamædaphne Dioscor. Fuchsius, Daphnoiden facit: à quibusdam, Mezereum Germanicum.

Tormentilla candida Dalechampij: seu Pentaphyllum alpinum petrosum minimum Lobellij: sive Stellaria argentea, vel Argentaria petræ Gesneri: seu Alchimilla minor Camerarij.

Lunaria racemosa, seu Lunaria minor Matthioli: à Columna pro Epimedio Dioscor. exhibetur.

Gnaphalium alpinum Clusij: Matthio-

lus Leontopodio preponit.

Leontopodium parvum Lobellij.

Pinus Tibulus Plinij; vel Pinastrigenus sterile: Itali Mugo vocant.

Anagyris minor.

Cneorum Matthioli: an Oleantrum sylvestr. Avicennæ? foitè Thymelea minor Cordi.

Ranunculi montani primi, species prima

Item primi, species altera

Gentianella v. Pannonica Clusij: à Dalechampio, Helleborina vocata.

Gentianella sexta Clusij; frequentissima.

VBI etiam plantæ hæ nostræ exurgunt, quarum effigies & descriptiones sequuntur.

Ranuncu-

Ranunculus alpinus Coriandri folio:
Clusio, Rutæ folio.



Ocymoides muscosus.



Ranunculus Alpinus Corian-
dri folio.

EX radicibus longis teretibus, fibro-
sis, candidis & quodam splendore or-
natis, quatuor ad summum sese efferunt
folia semipalmaria, à purpurascete pedi-
culo folia Coriandri referentia, attamen
minora, & magis laciniata, & ad similitu-
dinem Fumariz disposita; inter quæ ex-
urgit unicus pediculus rotundus, lævis, pal-
maris, florem continens, circa cujus me-
dium foliolum unicum est, in summitate
autem flos ex duodecim, & pluribus
etiam folijs compositus, (uti in Buphtal-
mo) albis subpurpurascetibus, ac venu-
lis sanguineo colore percurrentibus, ab
alijs viridibus foliolis exceptis, calycis vi-
cem gerentibus; in cujus deflorescentis
medio remanent semina congesta ut in
alijs Ranunculis: floret ad Kal. Iulij. Na-
scitur in Majoris montis cacumine, Oc-
cidentem versus. perennis est; & aliquan-
tulum acris.

Item:

Ocymoides muscosus.

EX unica radice lignosa, pallida, supe-
riori parte in plures divisuras secta,
uti in Sedis alpinis Clusij, emergunt fre-
quentissima foliola superficiem terræ æ-
qualiter, densissimeque cooperientia ad
Musci similitudinem, pulcherrimam viri-
ditate prædita; inter quæ frequentissimi
flosculi, suis pediculis ijsque brevissimis
singuli innixi à folijs secundum calycem
tantum elevati sunt, formâ, calyce, & co-
lore Ocymoidis repentis, (minores ta-
men) quare Ocymoidem muscosum ap-
pellare placuit. Sic Muscus iste exornat
terram, ut tapete pulcherrimum referens
oculos summopere demulceat. In Iugo
rupium Majoris montis provenit. Floret
circa Kal. Iulij. gustu exsicantis faculta-
tis esse percipitur. perennis est planta.

Item:

Geranium alpinum longius
radicatum.

HABET hæc planta radicem crassam,
bipalmarem, exterius nigricantem,
intus albam, supernè in plures partes divi-
sam, atque eo in loco, unde folia exeunt,
tuberosam; folia autem unico pediculo
tereti, gracili, lanugine argentea pube-
scenti, palmarique inhærentia, ex quin-
que,

Geranium alpinum longius radicatum.



Cariophyllata alpina, omnium minima.



Item:

Cariophyllata alpina, omnium minima.

A Radice crassiuscula, in fibras varias divisa semipalmari altitudine, & albicante, pullulant prope terram multa folia trium digitorum altitudine Agrimonix formam æmulantia, (æqualiter tamen inferna foliola veluti alæ utrinque disposita,) serrata per ambitum, multis in locis per ordinem laciniata, molliter lanuginosa, aliquantulum crispa, saturatè virentia, ac splendore quodam nitentia; inter quæ quædam ad hanc perfectam formam haud perveniunt, ex horum medio sese attollit unicus, & elegans flos, folijs quinque aurei coloris conflatus (in quorum centro lutea staminula) calyce non ab simili ab alterius Cariophyllatæ montanæ Clusij continetur, atque pediculo lanuginoso tereti; ac ad summum palmari insidet. Flores profert initio Julij, perennis est; ac facultate exsiccatoria. In Iugo Viticariæ ad Occidentem provenit.

Item:

Clinopodium alpinum.

PVLLVLANT serpendo ex fibrosissimis radicibus varij cauliculi quadrangulares, hirsuti, ac sesquipalmares; quibus bina folia hirsuta, serrata, Ocimum minus æmulantia, ex adverso & directè sita sunt, inter quæ alia parva foliola existunt: flores multi atrorubentes, ac Calaminthæ montanæ

Clinopodium alpinum.



tanz genuinæ forma, inter folia commixta, globulum repræsentant; floret in initio Julij; est acri sapore. Provenit passim non procul à Majori monte, ubi perennat.

HINC ulterius pergentes paulò inferius descendimus in Valleculam æternis nivibus, & glacie majori ex parte contactam, cujus inferior pars constat ex contractis & ita mobilibus saxis, ut super ipsis nullo modo consisti possit, adeò ut lupi, & ursi mortui adinventi sint, quando hac transire volentes, saxis sub eorù pedibus motis, nullo cum modo gradu continere possent, unà cum coribus præcipientes corruerunt: quæ saxa cum attrita, & candida sint, variasq; sortiuntur figuras non abúmiles denudatis ossibus, à vicinis Vallis ossium nominata fuit: in hac Valle contiguisque præruptis locis hæc exurgunt simplicia:

Alpigena Chamærhododædros, Penæ: à Guilandino, Terionarca Plinij putata: Gesnerus, Vitem Idæam rubris acinis, nuncupavit: Dodonæus, pro Vaccinia rubra proponit: Mihi videtur, Anonymos, Ballami alpini folio.

Cotonaster Gesneri.

Cassia poëtarum Penæ.

Ilex.

Pthora Valdensium, frequentissima.

Heptaphyllon.

Chamæcerasus montana Gesneri: Xylosteum alterum quorundam.

Anemone tuberosa radice Penæ; sive tertia Dodonæi: vel altera Clusij.

Anemone flore albo Clusij.

Lycostaphylos fœmina Cordi: à Pena,

Sambucus aquatica: à quibusdam

Thraupalus Theoph. credita.

Sambucus sylvest. seu Cervina Tragi: vel

Sambucus racemosa Penæ.

Sedum alpinum vi. Clusij.

Chariophyllata montana altera Clusij.

Sefeli pratense Monspeliensium, Lob.

Lilium Convallium, frequentissimum.

Syringa flore albo; an Phylladelphus Athenæi: Ostry Theoph. quorundam,

malè tamen: nam Camerarius in doctissimo suo Medicæo horto, alià non

esse Ostryam, vel Ostrya à Theoph. descriptam putat, quàm plantam illam,

quæ pro Carpino à Matth. pingitur. hic paululò inferius copiosius conspicitur.

ADHVC paulò inferius huic Vallecule contigua sunt prata in latere montis latè extensa, admodum delitiosa, cum propter apricum situm, tum quia sunt instar Viridarij, ubi multæ ac raræ plantæ, quæ passim toto in monte surgunt, collectæ visuntur. Cujus rei, ea videtur esse causa; quòd cum in alijs locis, pratibusq; editioribus, & his ipsis imminetibus herbæ quotannis ematuruerint, exsiccataq; & in fœnum redactæ, non plaustris, non jumentorù dorso propter locorum difficultates, convehi domum possint, sed eas trahi per terram necesse sit, & per hæc præcipuè prata transitum habere; hinc fit, ut varia semina decidant, iisdemque mox nascentibus, omnigenis herbis loca redundant. quare etiam per quãdam dignitatem, & excellentiam absolutè, & nullo alio adjecto nomine à Malesinensibus Prata vocantur, numerus autem plantarum in his ipsis luxuriantium, hic est:

Aster y. pannon. Clusij: elegantiss.

Liriosphodelus albo flore, frequentiss.

Phlomis Lychnitis altera Syriaca, Lob.

Ocymoides magnum flore purpureo.

Caltha alpina Gesneri, frequentiss.

Iacea montana Narbonensium, Lob.

Verbascum Tragi, copiosissimum.

Ornithogalon spicatum, luteo pallecente flore.

Clynopodium Austriacum Clusij.

Ranunc. quartus Diosc. seu Aconitum

Batrachioides Penæ: hic frequentiss.

Hyacinthus Poëtarum, Tragi, copiosus.

Lilium purpureum majus, & primum Penæ.

Hieracium v. Pannonicum Clusij.

Condrylla cœrulea purpurea.

Iuncaria Salmanticensis Clusij.

Doronicum v. Pann. Clusij, frequentiss.

Mirrhis altera parva, Lobel.

Iacobæ Pannonicæ Clusij, omne genus, Gentianellæ variæ.

Aconita varia.

Sphondylium laciniato folio.

Sanicula montana Clusij.

Panax

Panax Heracleum.
 Genista Nuensis Dalechampij.
 Asphodelus major, frequentiss.
 Aquileia fusco flore.
 Herba Paridis.
 Machaleb Gesneri.
 Lunaria lutea Dalechampij.
 Anagryis minor.
 Periclymeni recti duæ species.
 Cytisi varia genera.
 Serrata Cordi, ab alijs Recentioribus Solida
 lidago Saracenicæ nuncupata.

Hic pariter silentio non est prætereunda Via illa Fagorum acclivis valde, triū milliarium longitudine constans, modò hac, modò illac, anguem dum serpit semicontractum referens; ex utroque latere fagis ingentibus septa, quarum cacumina sese mutuò vincientia veluti fornicem effingunt, quæ viatores ab ardentissimi Solis æstu, & impetu pluviarum aliquo modo tueri possint. Ab his verò pratis usque ad montis summum dorsum, Culmen Malfesini vocitatum, infrascriptæ sunt plantæ:

Libanothis Cheryophoros fruticans.
 Item Sterilis.
 Ligusticum Matthioli: nonnulli pro Silere, aut Sefeli Massiliense utuntur.
 Soldanella alpina.
 Tussilaginis alpina Clusij duo genera.

In hoc etiam culmine, est planities satis lata herbis refertissima, ubi propter varios prospectus jucundè indagatores animum atque oculos pascunt. in hac ac circumcirca, germinat frequentiss.

Chariophyllata alpina nostra.
 Coronaster Gesneri.

Ex hoc fastigio descendimus recta versus Septemtrionem in semicirculares quasdam fauces, inter jam dictum Culmen, & alium montem Altissimum nominatum, licet ille ad celsitudinem Majoris montis non perveniat. quæ montis in Lunæ formam excavata portio, Os Navenæ dicitur. hic Benaci adhuc multa pars cernitur; imò & sonorus bombus aquarum Brasæ fluminis, abundantissimè ex Brixiensibus montibus è regione montis altissimi, de quo agimus, in lacum præcipitantium clarissimè exauditur, licet inter hæc loca, & illa quatuor milliarium spatium intersit. His in locis dicendæ plantæ copiosæ, attolluntur:

Sefeli Massiliense genuinum, frequentissimum: fortè Meum Italicum Lobellij.
 Daucus Creticus.
 Panax Aesclepium.
 Absynthium montanum odoratissimum.

In hoc Altissimo ubi Baldus terminatur, nullæ nascuntur herbæ quarum alibi non meminimus.

Ab his faucibus ambulamus per montis latus admodum herbosum, & cui Oriens dominatur, pulcherrimas plantas semper observantes alibi, tamen descriptas. In planitiem tandem devenimus, ubi aliàs ingens, & pulcherrima fuit sylva, Brentonicensis dicta, Abietibus, Pinis, Ilicibus, Quercubus, alijsque innumeris arboribus, ac præcipuè patulis Fagis referta nunc verò, ut rerum fert vicissitudo, trunci tantum ipsi crassissimi ramis omnibus rescissis, nescio quid magnum indicantes, cernuntur.

Impatiens herba Dodonæi: an (ut ipse inquit) Aeschynomenes Plinij; Mercurialis sylvest. altera, Tragi: Pena Persicariam siliquosam, & Noli me tangere, facit. perperam Esula sylvest. Tragi, multorù: ab aliquibus Pseudoapocynum dicta.

Radix cava Herbariorum: à Cordo Capnum Aetij; & Capnos Phragmites, Plinij: à Fuchio, Pistolochia credita: à Pena, Fumaria bulbosa Plinij, vocata: Matthiolus, pro altera Fumaria exhibet.

Orobus primus Pann. Clusij.
 Hepatica nobilis Dodonæi.
 Helleborina Penæ.
 Combretum Plinij, quorundam.
 Gentiana major frequentissima.
 Gerania multorum generum.
 Cacalia Penæ.
 Præonia fœmina frequentissima.
 Scorzonera v. Pann. Clusij: frequentiss.
 Sesamoides magnum Salmanticum, Clusij: n altera Muscipula flore muscoso, Penæ?

Anonymos Balsami alpini folio.
 Pulsatilla flore albo.
 Sefeli genuinum Massiliense.
 Mezereum Germanicum.
 Oenanthe alpina Lob. Item:
 Clematis Crutiana nostra, invenitur.

Ledum alpinum; &
 Soldanella alpina.

Allium Vrsinum Matthioli: Arctoscorodon Gesneri.
 Lunaria odora, vel Græcæ major.
 Lunaria Chymistarum: seu Viola latifolia Bolbonach, Dodonæi.
 Orchidis Serapiadis varia genera.

Mutelina Gesneri, & Camerarij: à quibusdam, Meum Alpinum dictum.
 Pulmonaria Lichenis facie.
 Filix saxatilis crispa; fortè Pteridion fœmina Cordi:
 Filix saxatilis Tragi.
 Saxifragia aurea Lichenis facie, & Erysimi species Aldroandi, Penæ.
 Cacalia Penæ.
 Phallus Hollandicus. pro Satyrio primo Diosc. Excell^o Matthiolo tribus folijs Rumicis arte affixis, venditus. prout Clarissimus & Excellentiss. Philosophus, ac

phus, ac Medicus, Ludouicus Fumanellus, qui hunc, & illum qui ad Matthiolum est missus, spectavit, apertè testatur: facile autem fuit decipi, propter summam utriusque, antequam

A B hac excisa sylva pergimus per eandem semitam versus Meridiem, ac ingredimur Vallem Attilonem, quæ multis scaturiginibus salubrium aquarum irrigatur. Cujus pinguis herbis copiosissima armenta æstate tota pascuntur: refertissima est numerosissimis plantis, quarum multas silentio præteribo, cum alibi adnotatæ sint; eas solum referam, quæ aut copiosiores hic nascuntur, aut digniores relatione sunt. Abundantissimè igitur hic nascitur:

Coralloides Cordi: seu minor Dentaria Matthioli: vel Alabastrites nemorosa Alpina, Penæ: & Viola Dentaria, Dodonæi: Pentaphyllea, ac Eptaphyllea, flore albo, atque purpureo, hic invenitur.

Helleborine, sive Epipactis, Penæ, & Dodonæi.

Polytrichum aureum majus, & minus Herbariorum.

Filix foemina.

Item, mas.

Primula sylvarum Lobellij.

Cynocrambe, vel Mercurialis sylvestris.

Jacobæa tertia Pann. Clusij.

Sanicula foemina Fuchsj.

Solidago Sarracenicæ Lobellij.

Mater Violarum Dalechampij: alijs Viola surrectis cauliculis vocatur: à quibusdam Viola arborea.

Barbi Capra, Herbariorum: à Brunfelsio, Picnemon credita: ab aliquibus Rhodera; ab alijs Melandrium Plinij: Italis, Vlivaria, & Crostofanaria.

Tanacetum non odoratum Lobellij: Athanasia Leucanthemos quorundam.

Virga aurea major Doræ floribus.

Item, minor.

Phellandrium Plinij; Guilandino: ab Herbarijs Angelica sylv. vocata: Cordus, Smyrnum facit.

Geranium fuscum Clusij.

Geranium Malacoides, Rec.

Geranium Batrachoides Dod. sive Germanorum Gratiædei.

Geraniorum communiorum, varia genera.

Pulmonaria vulgatissima Borraginis folio, major, & minor; ite cœruleis, atque purpureis floribus: Cordus, Symphytum sylvest. facit: & Pulmonaria Plinij, Gesnerus: perperam Potamogetum Diosc. Lusitanis.

Lythospermum Anchuse facie, Lobellij: fortè Pulmonaria major Dalechapij.

Auricula Muris major Tragi: à Dalechamptio Corchorus Theophr. Galli, Pulmonariam vocant.

Aster non Atticus Tragi: perperam Aconitum Pardalianches Fuchsj: Gesnerus, Solanum Monococcon facit: à Cordo Aconitum Monococcon vocatum: à Pena, Solanum tetraphyllum: ab Herbarijs, Paradis herba dicta.

Aconitum alterum Matthioli.

è terra erumpat, similitudinem.

Sanicula alpina guttato flore Gesneri:

Sanicula montana Clusij: fortè Chariophyllata folio Hederaceo Penæ.

Item, quartum ejusdem.

Napellus verus cœruleus Lobellij.

Napellus racemosus Dodonæi: an (ut Pena inquit) Actea Plinij? à quibusdam Christophoriana dicta: ab aliquibus,

Helleborus niger.

Sambucus palustris, Lycostaphyllum foemina Cordi.

Rubus Idæus Dioscoridis.

Rubus Idæus lævis,

Rubus alter lævis, an potius Chamærubus? Rubum Idæum Gesnerus facit, &

Rubum saxatilem, Clusius.

Mirthyllus Germanica, frequentissima.

Corruda altera Clusij.

Chariophyllata montana Matthioli.

Item, montana Dalechampij.

Seolymos Theophrasti, Clusio.

Muscus arboreus; à Græcis, Bryon.

Muscus terrestris Tragi: seu Chamæpeuce, Gesneri: vel clavatus Muscus, Lobellij: Dens leoninus, secundum aliquos;

Muscus terrestris repens Clusij: fortè Mirma, Borussi: à Lobellio, Muscus alter denticulatus.

Muscus terrestris denticulatus prior, Lobellij.

Oxys lutea Clusij: seu Oxys corniculata repens, Lob.

Oxys Pliniana.

Virga pastoris, Matthioli: Labri Veneris species.

Tithymalus Characias v. Dodonæi.

Item, Helioscopius.

Item, Platiphyllos.

Pithyusa Dodonæi.

Mezereum Germanicum.

Solanum majus, Rec. hic non solum frequentissimum est, sed admodum vegetum surgit.

Fragaria.

Myrrhis Fuchsj.

Pyrola Matthioli; frequentissima: Limonium silvestre Tragi.

Hysopus nemorensis lutea, Lugdunensium.

Nepeta quarta Tragi: seu Calamintha Montastrifolia, Penæ.

Ranunculus primus

Item, alter } Matthioli.

Item, tertius }

Item, quintus ejusdem: nonus apud Cordum: Bulbosus Apuleij Dodonæo.

Item, quartus Diosc. copiosus.

Item,

Item, Glomerofus alpinus, Lobel. Flos
Trollius, à Gesnero: Sextus, Matthioli:
seu, ut ego dicerem, Aconitum ter-
tium Diolc.
Mollugo altera montana Dalechampij.
Paralytica alpina angustifolia major, Lo-
bellij: à Fuchfio, Verbasculum odo-
rum dictum.
Viola lutea montana Clusij.
Primulæ arborefcntis varia genera: à
Fabio Columna, Alisma sylvarum, &
pratorum, vocata.
Amellanchier Gallorum, Penæ: Pyrum
Cervinam, Gesnerus facit: Clusius, in
Observat. Pannon. sub nomine Idææ
Vitis describit.

Abies.
Pinus sylvestris seu Multo.

Ex dignioribus verò hæc sunt:

Lamium primum, & alterum Pann. Clusij.
Cacalia Pann. seu glabro folio, ejusdem.
Anemone v. } Dodo-
Item, Anemone trifolia } naci.
Rubra lævis Taurinensium, Lobellij.
Phyllum Thelygonum Dalechampij.
Satyrium Erythronium Herbariorum
Penæ, & Dens Caninus: à Dalecham-
pio Satyrium trifolium seu album: à
Clusio (in Pannonicis) Dentali vocatur.
Satyrium abortivum Lobellij: perperam
Orobanches magna quorundam.
Circæa Dalechampij.
Sedum alpinum tertium } Clu-
Item, quartum } sij.
Oreoselinum Clusij: seu nigrum Sefeli,
quorundam.
Absinthium alpinum, seu Umbelliferum
floribus albis.
Sanicula mas, Fuchfij: à Matthiolo Dia-
pensa vocata: Fabius Columna, pro
Siderite tertia Dioscoridis propo-
nit.

VLTERIVS introimus latitudinem quandam quæ Novezia ab incolis appellatur, in
qua frequentissimus est:

Crocus Vernus primus Clusij.
Dentellaria, Gesneri.
Solanum majus: seu Bella Donna Ita-
lorum: vel Mandragora Morion
Theophr. quorundam.
Tussilago.

IN cujus sinistra parte, quædam inæqualitates magnæ saxæ existunt: inter quas variæ
cavitates conformantur, Noveziæ cavitates vulgò dictæ, in quibus,

Cicutaria latifolia foetidissima Lobellij:
à quibusdam Peloponense Sefeli cre-
dita.
Lunaria minor Matthioli: seu Botrytes.
Trifolium aureum Dod. flore purpureo.

PRÆTER hæc Novezia in montis parte dextrorsum ad Occidentem, tribus dotata
est Valleculis, quarum capita usque ad Majorem ipsum jam dictum montem perveniunt:
harum Vallecularum prima appellatur Losanna, quæ licet parva sit, dives tamen est rarissi-
mis plantis, in hujus convexa parte orienti exposita ascendere incipientibus inuenitur:

Holostium Camerarij: forte Holostium
quorundam Dalecham-pio.

Carpinus, Matthioli; vel Ostryx Plinij
Camerario.

Fagus.
Betula.

Acer montana, seu Acer major Cordi:
Clinotrocha Anguillara, Lobellio.

Sorbus sylv. alpina Penæ, & Matth. Sor-
bus Torminalis secundum aliquos:
Dodonæus, Ornum & Fraxinum syl-
vestrem vocat.

Sorbus Torminalis Matthioli, & Penæ:
seu Cratægus Theophrasti. Anguil-
lara.

Aquifolium, vel Agrifolium, & Ruscus
sylv. multorum, Cratægonum Theoph.
Plinij: Lacuna verò, Paliurum secun-
dum vocat.

Larix, & Agaricum.

Amblatum Cordi: vel Dentaria major
Matthioli.

Dentaria rubra Dalechampij.

Solidago Sarracenicæ tertia Clusij.

Petasites magna Dalechampij.

Tussilago montana ejusdem.

Erisitales Dalechampij: perperam Mi-
thridatia Plinij, secundum aliquos.

Baccaris Dioscor. Matthiolo.

Ribes Officinarum.

Apium montanum Dalechampij.

Bellis lutea ejusdem.

Thimelææ species, Myconi.

Ranunc. montanus albus, Dalechamp.

Cistus, & Hypocistis.

Aster montanus Penæ.

Damaconium nothum: Calceolus Ma-
riæ, & Sacerdotis Crepida, Recentio-
rum: Amatus Lusitanus sub nomine
Lonchitidis primæ pingit.

Aster montanus hirsutus Penæ.

Aizoon ferratum primum } Cordi.
Item, alterum }

Petasites alpina.

Jacobæa altera Clusij.

Asphyllanthes.

Batrachij varia genera.

Asphodellus luteus, & alter Plinij Do-
donæo.

Allium anguinum Matthioli.

Cacalia Penæ, copiosissima.

Aconiti varia genera.

Item:

Clematis crutiata nostra.

Aconitum aliud Dalechampij.

Pseu doasphodellus Clusij.

Er dum

Et dum magis ascenditur:

Chamecistus quartus Myrtifolius Clusij.
 Nardus Celtica frequentifs.
 Aconitum Pardaleanches, Plinij.
 Aconitum Pardaleanches Antiquorum
 Dodonæo.

Phtoræ duæ species, frequentifs.
 Doronicum vulgatiffimum.
 Doronicum Pannon. primum } Clu-
 Item Pannon. tertium } sij.
 Clinopodium Austriacum ejusdem.

IN dextera verò ejus parte Noto subjecta copiosa reperitur:

Pinguicula, Gesneri cœruleo flore; seu Cucullata Dalechampij: à quibusdam Crias Apul-
 lej credita.

IN sinistra autem quæ Græcum Orientem aspicit, peculiariter provenit:

Pinguicula flore albo.
 Auricula Vrsi purpureo flore frequentifs.

Item:
 Clinopodium alpinum nostrum.

AT circumcirca abundantiffima est:

Genista Iluensis Dalechampij.
 Tussilago altera alpina Clusij.
 Tussilago montana altera Lobellij.
 Soldanella montana Penæ: seu Lunaria
 alia minor Dalechampij: à quibus-
 dam Lunaria di dinari vocata.

Bistorta minor Clusij.
 Verbaiculus alpinus cœruleus Dale-
 champij.
 Carum.
 Lonchitis aspera major, frequentiffi-
 ma.

DVARVM reliquarum Vallearum altera Lonzia vocitatur, in qua nihil notatu di-
 gnum detegitur, nisi quòd in ea

Phtora major, atque minor frequentif-
 sima.

Doronici Recent. varia genera.
 Salicis saxatilis duæ species.

ALTERA verò Bruta nuncupatur, in qua Nives & Glacies perpetuò dominantur. in
 ipsam præterea feræ diversæ, Lupi præsertim, ac Vrsi sese recipiunt; in hujus summo verti-
 ce inaccessibili, prominenti, & simpliciter saxeo, cavitas quædam existit (Coval santo) dicta,
 è cujus rimis,

Trachelium minus petræum, & } sese exerunt:
 Veronica petræa sempervirens }

Quarum Icones, ac descriptiones, habentur in descriptione frigidæ Vallis.

Sedum petræum Bupleurifolio: flore verius.



Item:

Sedum petræum Bupleuri folio:
 flore verius.

EST illi unica radix crassa, teres, si-
 ne fibris, sed quibusdam quasi
 tuberculis hinc inde erumpentibus,
 crasso cortice obvoluta, intus pallida,
 extra in rubore nigricans, ad sum-
 mum cubitalis, supernè partita, (ut
 in Geranio nostro alpino:) folia angu-
 stifolij Bupleuri omnino similia ex
 protuberantibus illis partitionibus co-
 piosè emanantia, & in circuitum se-
 se expandentia: flores autem ex se-
 prem foliolis aliquantulum mucro-
 natis, in luteo pallefcentibus, profert
 in summitate caulis teretis, nudi, &
 dodrantalis; in quorum medio semi-
 na umbellæ modo graviter spirantia
 existunt; atque hæc uti in eodem Bu-
 pleuro. Floret Idibus Julij: & Idibus
 Augusti colligitur semen: gustu re-
 fert Cynaræ saporem.

DVM



I N D E X.

ῥοδιόν	71.	ῥοδιόν	14.	Φελλόδεν	21.
ῥοδιόν	lxv.	Τερμινθίη ῥητίνη	15.	φελ.δς	21.
Σατύριον ῥιζόφυλλον	150.	ῥητίνη	15.	σηρδς	18.
σησακά	29.	τετραγώνια	57.	φιλύκη	51.
σιδριπέ	xlj.	τετραγώνιο	ccxliiij.	φιλύρα	53.
σιουρήχιον	217.	τετραγώνιο	ccxliiij.	φύλλον	xlx.
σκόδα	171.172.	τι κριον	350.		
σαβύμιον	cliij.cliiij.	τι βρεον	364.	Χάλκειον	109.
σαχρότερον	xlviij.	πύμαλον	cxv.	χαμαίβαλαν	cx.
σιντάλιον	lxiiij.	τίβρον	186.	χαμαίκατον	118.
σμάρα	22.	τρίζανον	92.	χαμαίβρις	352.
σμάρα τετραχία	113.	τρίζανον	92.	χαμαίβρις	352.
σπαρτίον	103.	τετραγώνιο	336.	χαμαίβρις	64.
σπυρίδιον	ccxliiij.	τρίβολον	ccxlj.ccxliij.	χαμαίβρις	319.
σελεσφρον	xlviij.	ῥοδιόν	71.	χαμαίβρις	172.
σίχα ἢ σόχας	345.	ῥοδιόν	133.	χαμαίβρις	172.
σεσπώπις ὁ χλιόφυλλον	331.	ῥοδιόν	133.	χαμαίβρις	172.
σινθρόν ὑπωπικόν	lxxxv.	ῥοδιόν	133.	χαμαίβρις	172.
χάνθη ῥητίνη	133.	ῥοδιόν	133.	χαμαίβρις	172.

INDEX LATINVS PLANTARVM

QVÆ IN HAC HISTORIA

CONTINENTVR.

ABIES pag.	34.	Anchusa	clxv.	Asphodelus	196.197.cclviij.
Abies marina	35.36.	Androsace altera Matthioli	cxliij.	Aster	xij.xiiij.xiiij.xv.xvj.
Abrotonum femina	341.342.	Androsace Bellonij	92.	Astragalus	ccxxiiij.ccxliiij.
Absinthium	338.339.340.	Anemone hortensis	248.249.	Astrantia	cxliiij.
Acacalis	46.	Anemone Mompelliana	336.	Atriplex silvest. baccifera	135.
Acacia i. Matthioli	ccliij.	Anemone silvestris	244.245.	Auellana Byzantina	11.
Acet	9.	246.247.248.		Auricula Iudæ	cclxxviij.
Acinos Dioscor.	354.	Anonis mitior	99.	Auricula urfi	302.303.304.
Aconitum	xciiij.xcv.xcvj.	Anthriscus Plinij	cxviiij.		305.
aconitum bacciferum	lxxxvj.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	BACCARIS Diosc.	xxj.
Acorum	230.231.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	Baccharis Rauwolfij	ibid.
Actæa Plinij	lxxxvj.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	Benedicta	ciij.
Admirabilis Peruana	lxxxviiij.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	Berberis	120.
lxxxix.xc.		Anthriscus Plinij	cxviiij.	Bellis media	xlviij.
Adonis flos	263.335.336.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	Betonica	xxxviiij.xxxix.
Adrachne	48.49.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	Bistorta	lxviiij.lxix.
Agriomelea	63.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	Blitum majus Peruianum	lxxxj.
Alaternus	50.51.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	Boletus	cclxxiiij.ccxv.
Alcea	xxv.xxvi.xxviiij.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	Brassica campestris	cxviiij.
Alchimilla	cviiij.308.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	Brassica virgata	cxviiij.
Alectorolophos alpina	ccx.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	Britannica	lxviiij.
ccxj.		Anthriscus Plinij	cxviiij.	Bruta Plinij	37.
Allium alpinum	190.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	Brya silvestris	41.
Allium ursinum	ibid.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	Bugula vide Prunella	
Alnus	12.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	Bulbus eriophorus	172.173.
Aloë	clix.clx.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	Bupthalmum	332.333.
Alopecuros nonnullorum	xlj.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	Butomon	232.
Alpigena	64.	Anthriscus Plinij	cxviiij.		
Alfene	clxxiiij.cxxxiiij.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	CACALIA	cxv.
Althæa	xxiiij.xxiiij.xxv.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	Calamentum inodorum	354.
Alypum quorundam	91.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	Calcitrapa	vij.viiij.
Alyssum Galeni	xxxiiij.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	Caltha palustris	cxiiij.
Alyssum minimum	cxviiij.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	Campanula	clxxj. clxxij.
Amanita Pauli	cclxxij.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	clxxij.	
Ambra dulcis	356.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	Canna Indica	lxxxj.
Amellus Virgilij	xvj.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	Cantabrica Plinij	xlx.
Anabasis	92.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	Cantabrica quorundam	ibid.
Anagallis	clx xxij.cxxxiiij.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	Cardamine	cxviiij. cxviiij.
Anagyris	93.	Anthriscus Plinij	cxviiij.	Carduus	

I N D E X.

Carduus eriocephalus	cliiij.	Coccus infectoria	24.25.	Erica	41.42.43.44.45.46.
Carduus mollior	cl. clj.	Coggygia	16.17.	Erinacea	107.
Carduus muricato cap.	viiij.	Colchicum	199.200.201.202.	Eryum Cordi	ccxxx.
Carlina	clv. clvj. clvij.		cclvij.	Eryngium	clij. clvj. clvij.
Caryophyllus flos	282.283.	Colocasia	lxxv.		clvij. clix.
	284.285.286.287.	Colutea Theoph.	14.	Evonymus	56.57.82.
Caryophyllata	ciij. ciij. ciij.	Colutea scorpioides	97.98.		
Casia quorundam	91.	Colytea Theoph.	14.	FABAGO	13.
Castanea equina	7.	Condrilla	cxliij. cxliij. cxlv.	Faba Ægyptia	lxxv.
Castanea peruana	8.9.	Connarus Alexandrinorum	27.	Faba suilla	lxxxv.
Catanance	cxj. cxij.	Consolida regalis	ccv.	Fagulus	155.
Cattaria tenuifolia	xxxij.	Convolvulus altheæ fol.	xlix. l.	Filipendula	ccxj.
Caucalis	cej. ceij.	Convolvulus minor	1.	Filix pumila	ccxj. ccxij.
Caucon	92.	Conyza	xix. xx. xxj.	Flammula Matthioli	124.
Cedrelate	39.	Coral arbor	ccliij.	Flos cancri	lxxxij.
Cedrus lycia	ibid.	Corallina latifol.	cc.	Flos Persicus Sifynrichio con-	
Cedrus phœnicea	38.	Coralloides	ccxij.	gener	217.
Celastrus	51.	Coris quorundam	clxxiiij.	Fœniculum tortuosum	ccxcix.
Centaurium flavo flore	clxxx.	Cornus	13.	Fœnum Græcum Tragi	ccxxx-
Centaurium majus	x. xj.	Corona fratrum	cliiij.	ij.	
Cepœa	lxvij. lxxvij.	Corruda	clxxvij. clxxvij.	Fraxinella	100.
Cerafus avium	65.	Cortusa Matthioli	307.	Fritillaria	152.153. cclvij.
Cerafus laurea	5.	Corylus	10.	Frutex coronarius	55.
Cerafus Macedonica	64.	Cotinus Plinij	16.	Fumus terræ	ccviiij.
Cercis	13.	Cotonaster	62.63.	Fungi esculenti	ccxiiij. cclxv.
Cerrus	20.	Cotyledon	lxij. lxiiij.	& sequentibus paginis vsque	
Cerithe quorundam	clxvij.	Cratægus Theoph.	9.	ad cclxxvj.	
	clxvij.	Cratægonum	xl.	Fungi perniciosi	ccclxxvj. & seq.
Chamæbalanus	ccxxxiiij.	Crista gallinacea	ccxj.	pag. vsque ad	ccxcv.
Chamæcerafus	64.	Crocum montanum	208.	Fungus Latinis litteris inseri-	
Chamæcistus	74.75.76.		209.	ptus	ccclxxvj.
Chamædaphne Diosc.	278.	Crocum vernum	203.204.205.		
Chamædrys	351.352.		206.207.208. cclix.	GALEGA	ccxxxiiij. ccxxx-
Chamægenista	103.104.	Croton Anguillaræ	92.	vij.	
Chamæiris	224.225.226.227.	Cuci	3.	Galeopsis	xxxv. xxxvj.
Chamæleon	cliiij. clv.	Cupressus marina	36.	Gallium rubro flore	clxxv.
Chamæleuce Plinij	cxiiij.	Cyclaminus	263.264.265.	Genista Plinij	102.
Chamælinum	319.	Cydonago	62.	Genista vulgaris	103.
Chamæmespilus	60.61.	Cynoglossum	clxj. clxij. clxiiij.	Genista tinctoria	101.
Chamæmorus	118.119.	Cytisus	93.94.95.96.97.	Gentiana	311.312.313.314.315.
Chamæpeuce Cordi	81.		ccxlvj.		316.
Chamæpitys Austriaca	clxxx-	DACTYLVS Plinij	ij. iij. lxij.	Geranium	xcix. c. cj.
iiij. clxxxv.		Daucus montanus	ccxvij.	cij.	
Chamærododendron	82.	Delphinium	ccv. ccvj. ccvij.	Geum Plinij	cij.
Chamæsyce	clxxxvij.	Dens caninus	266.	Glandes terrestres	ccxxxij.
Chamelæa	86.	Dentaria	cxix. cxx. cxxj. cxxij.	Glaux	ccxxxiiij. ccxl. ccxlj.
Chamelæa folia	82.		ccxiiij.	Globularia	ccxvj.
Chara radix	ccxij.	Dentilaria	ccxiiij.	Glycyrrhiza fol. Gesneri	cc-
Chelidonium	cciiij.	Dolichus Bellonij	ccxxxvij.	xxxij.	
Chrysanthemum	331.332.	Doronicum	xvj. xvij. xviiij.	Gnaphalium	327. 328. 329.
	333.334.335.		xix.		330.
Chrysome	326.327.	Dorycnium	100. ccliiij.	Gramen	ccxvij. ccxviiij.
Cicer silv. Matthioli	ccxxxiiij.	Dorycnio congener planta	100.	ccxix.	
Cicercula Ægyptiaca	ccxxxvj.		101.	Grassularia	120.
Cichorium verrucarium	cxliij.	Draba	ccxiiij. cxxv. cxxvj.	Guayava	ccliij.
Cicutaria	cc.	Draco arbor	1.		
Cinnaberis Diosc.	2.	Draconis sanguis	2.	HALIMVS	51.52.
Cirsium	cxlvij. cxlix. cl.	Dryophonon Plinij	17.	Hedera cilicia	113.
Cistus annuus	76.77.	Dyospiros	62.	Helenium Ægyptium	ccxliij.
Cistus femina	70.71.72.73.			Heliotropium	xlvj. xlviij.
Cistus ledon	77.78.79.80.81.	ECHIVM	clxij. cxliij. clxv.	Hemerocallis	129.
Cistus mas	68.69.	Eleagnus Cordi	86.	Hemerocallis Valentina	167.
Clematis altera	121. 122. 123.	Elechrysum	325.326.	Hemionitis	ccxiiij.
Clematis daphnoides	221.	Elleborine recentiorum	271.	Hepatica trifolia	ccxlviij. cc-
Clinopodium	353.354.356.		272.273.	xlviij.	
Clymenum Matthioli	ccxxix.	Elleborus	274.	Heptaphyllum	cviiij.
	ccxxx.	Elleborus niger Diosc.	Dodo-	Herba cervi	352.
Cneorum Matthioli	89.90.	næo	308.	Herba Iudaica	xlj.
Cnicus	clj. clij.	Ephedra	92.	Hermodactylus Syriacus	202.
Coagulum terræ Plinij	270.			Hesperis	296.297.

I N D E X.

Hieracium	cxix.cxl.cxlj.	Lilium Byzant.miniat.	131.	NAPPELLVS vulgaris	xcvj.
	cxlij.cclx.		132.	Narcissus	154.155.156. & ali-
Hippoglossum Valentinum	90.	Lilium convallium	190.	quot paginis subsequentibus,	
Hippophaës	viiij.	Lilium fatuum	135.	& cclvij.	
Hippophaëstum	300.viiij.	Lil. Persicum	127.128.129.	Nardus celtica & montana	lvj.
Holoſteum	cx.cxj.	Lil.punicum	136.	lvij.	
Horminum ſilveſtre	xxviiij.	Lil.rubrum	133.	Nasturtiolam	cxix.
	xxix.xxx.xxxj.	Lil.ſilv.ſive montan.	133.134.	Nasturtium Valentinum	cxix.
Hyacinthus	174.175.176.177.		cclvj.		cxix.
	178.179.180.181.182.183.	Lil.Suſianum	129.130.	Natrix Plinij	100.
	184.185.cclvij.	Limæ	6.	Nepa	106.
Hydnophyllon	77.	Limones	ibid.	Nerion alpinum	82.
Hyofciris Plinij	vij.	Limonium peregrinum	lxxxij.	Nymphæa	lxxvj.lxxvij.
Hyofeyamus	lxxxiiij.lxxxiiij.	Linaria	319.320.321.322.323.		
	lxxxv.	Linum ſilveſtre	317.318.319.	OCIMASTRUM Valentinum	xlij.
Hypocoum legitimum	xciiij.	Lirionarcifſus Hemerocallidis	facie	Ocimum Indicum	352.
Hypericum lupinum	clxxxj.		167.168.	Oculus Chriſti	xvj.
Hypociftis	68.79.	Liriolum alterum Theoph.	163.	Odontitis Plinij	292.
Hypogloſſum	278.	Lithoſpermum	clxiiij.	Oenanthe	190.ccxj.
Hypoſopus vulgaris	356.	Locuſtulæ in ulmi radicibus	13.	Oenoplia Bellonij	27.
		Lonchitis	ccxij.ccxiiij.	Olea	25.26.
IACEA	vj.vij.viiij.	Lotus Ægypt.	lxxvj.	Oleafter	26.
Iacobæa	xxj.xxij.xxiiij.	Lotus Athenæi	29.	Onobrichis	ccxxxij. ccxxxiiij.
Iaſione Plinij	1.	Lotus Lybica	27.	ccxxxviiij.ccxxxxix. ccxl.	
Illecebra	lx.	Lotus Pharidis	29.	Opuntia marina	ccl.
Ilex	21.22.	Lotus ſec.Theoph.	5.	Orchis	267.268.269.270.
Iris	217.218.219.220.221.	Lotus ſiliquoſus	ccxliij.	Oriofelinum	cxv.
	222.223.224.	Lunaria	cxviiij. cxix.	Ornithogalum	186.187.188.
Iris anguſtifolia	228.229.230.	Lupi	224.	189.cclvij.cclviiij.	
Iris bulbofa	209.210.211.	Lupinus	ccxxviiij.	Orobanche	270.271.
	212.213.214.215.	Lupulus	126.	Orobis	ccxxx.ccxxxxj.ccxxxxij.
Iris tripolitana	227.	Lychnis ſilveſtris	288.289.	Oſtria	55.
Iſchæmon Plinij	ccxvij.	290.291.292.293.294.		Oſyris	91.325.
Iſchas	cx.cxcj.	Lycium	111.	Oxalis maxima	lxix.
Iuglandis genus	10.	Lysimachia	1.lj.liij.liij.	Oxyacantha	64.
Iuncaria	clxxiiij.			Oxycedrus	39.
Iuniperus	37.38.	MAELVA trimeſtris	xxiiij.	Oxytriphyllon	ccxliij.
		Malum terræ	lxxiiij.	Oxys	ccxlviij.
LACATHA Theophr	65.	Malus aurea	6.	PADVS Theoph.	65.
Lachryma Iob	ccvj.	Malus medica	5.6.7.	Pæderotis	350.
Lada	81.	Mandragora femina	lxxxvj.	Pæonia	279.280.281.
Lagopus	ccxlvi.ccxlvij.	Mandragoras Theoph.	lxxxv.	Palma marina	ccl.
Lamium	xxxvj. xxxvij. xxxviiij.	Marrubium	xxxiiij.	Pancratium	171.
Larix	34.35.	Marragon	136.137.	Panicum	ccxv.ccxvj.
Lathyrus ſil.	ccxxix. ccxxx.	Marva Iantufa	xxxiiij.	Papaver corniculatum	xcj.
Lavendula multifido folio	345.	Marum	356.	xcij.	
Laurocerafus	4.5.	Maſtiche	14.	Papaver ſpinofum	xcij.
Laurus Alexandrina	278.	Medica	ccxliij.ccxliij.	Parietaria ſilveſtris	xliij.xlv.
Laurus ſilveſtris	50.	Melampyrum	xl.	Paronychia Hispanica	clxxxij.
Laurus taxa	278.	Melandrium Plinij	293.294.	Parthenium	336.337.
Ledon	77.78.79.80.81.	Melanthium	ccvij.ccviiij.	Peplis	clxxxvij.
Ledum alpinum	81.82.	Meliſſophyllum	xxxvij.	Perdicion	cxlv.
Ledum Sileſiacum	82.83.	Menthaſtrum	xxxij.xxxiiij.	Periclymenum	57.58.59.
Leimodorum	270.	Millefolium	331.cclj.	Perſea	2.3.
Lentiſcina refina	15.		cclij.	Petalites	cxvj.
Lentiſcus	14.	Mimulus Plinij	ccxj.	Petromelis	62.
Leontopodium	328.cxj.cxij.	Mollugo	clxxvj.	Peucedanum	cx cvj.
Lepidium Nebrifs.	ccxxiiij.	Moly	191.192.193.194.195.	Pezica fungus	cclxvj.ccx.
Leucanthemum alpinum	335.	196.		Phallus Iunij	cclxxxvij.ccxv.
Leucas montana	352.	Molybdena	cxiiij.	Phoſeolus	ccxxij. & ali-
Leucojū bulbofum	168.169.170.	Muſcari	178.179.	quot ſequentibus pag.	
Leucoium marinū	298.cxxxiiij.	Muſcipula	294.295.	Phillyrea	51.52.53.
Leucoium ſilveſtre	299.	Muſcus marinus	ccl.	Philyca	51.
Leucophlæos Dalechamp.	85.	Muſcus terreſtris	ccxlix.	Phlomis	xxvij.
Lichen marinus	ccl.	Myrica	36.39.40.	Phrynion	108.
Lili-aſphodelus	137.		41.	Phyllitis	ccxiiij.
Lilio-narciſſus	137.138.139.	Myriophyllum pelagicum	cclj.	Phyllum	xlviij.
	140. & aliquot paginis ſe-	Myrtociftus	68.	Phyteuma Dioſc.	v.
quentibus.		Myrtomalis	62.	Picea	
Lilium album Byzant.	135.	Myrtus	65.66.67.		

I N D E X.

Picea	33.34.	Rubus Idæus & saxatilis	117.	TANACETVM inodorum	337.338.
Pilosella minor	330.	Rumex latifolius	lxix.	Teda	33.
Pimpinella	cxcvij.	Ruta canina	ccix.	Telephium	lxv.lxvj.lxvij.
Pimpinella spinosa	109.	Rutamontana	cxxxv. cxxxvj.	Terebinthina resina	15.
Pinaster	31.32.33.	SABINA baccifera	37.	Terebinthus	15.16.
Pinguicula	310.	Salix	85.86.	Tetrahil	xlj.
Pinustibulus	34.	Salsicortex	18.	Tetralix	46.
Piperitis fungus	ccxc	Sálvia	342.343.	Teucrium	348.349.350.
Pistolochia	lxxij.cclix.cclx.	Sanamunda	88.89.	Thapsia	cxcij.
Pisum silvestre	ccxxix.	Sanguisorba	cxcvij.	Thlaspi	cxxx.cxxxj.cxxxij.
Pityides	33.	Sanicula montana	306.307.	cxxxij.	
Plantago	cix.cx.	Sanicula trifolia	cxxvij.	Thora Italica	xcvij.
Platanus	9.	Saxifraga	308.cxcvj.cxcvij.	Thymbra	358.
Plumbago	cxxij.cxxiiij.	Scabiola	j.ij.iiij.v.vj.	Thymelæa	87.
Polium	361.362.363.	Scammonea Valent.	126.	Thymum	357.
Polygala	98.99.324.325.	Scilla	171.	Tinus	49.50.
Polygonatum	275.276.277.	Scolymus	clij. cliij.	Tipha	ccxv.
Polygonum quartum Plinij	91.	Scorodoprafon	190.191.	Tithymalus	clxxxvij. clxxxix.
92.		Scorpius	106.107.	cxc.	
Polytricha	clxxix.	Scorfonera	cxxxvij. cxxxviiij.	Trachelium	clxx.clxxj.clxxij.
Poterium Dalechampij	108.	cxxxix.		Tragacantha altera	107.108.
Primula veris	300.301.302.	Serofularia	ccix. ccx.	Tragium alterum Diofcorid.	cxcvij.
Pruna	4.	Securidaca	ccxxxvij. ccxxxviiij.	Tragoriganum	355.
Prunella	xlij.xliij.	Sedum lvij.lviiij.lix.lx.lxj.lxij.		Tragum vulgare	327.
Prunus myrobalanus	46.47.	Selinum	cxcix.cc.	Tribulus aquaticus minor	cclij.
Pseudo-apios	ccxxxij.	Senecio fœtidus	xxij.	Tribulus terrestris	ccxlj. ccxljij.
Pseudo-asphodelus	158.	Serpillum silvestre	358.359.	Trifolium	100.101. ccxljij.
Pseudochamæpitys	clxxxv.	360.361.		ccxlj. ccxljij. ccxlviij.	
Pseudoleontopodium	330.	Serratula Matthioli	viiij.	Tuberes	28.
Pseudonarcissus	164.165.166.	Sertularia	ccl.	Tulipa	137.138. & sequenti-
Pulmonaria	clxix. clxx.	Sesamoides quorundam	295.	bus aliquot paginis usque ad	
Pyracantha	64.	Sefeli	cxcij. cxciiij. cxcix.	153.	
Pyrafter-Idæ	62.	Sideritis	xxxix. xl. xlj.	Turrita	cxxvj.
Pyrola	cxvj. cxvij. cxvijij.	Siler	85. cxcv.	Tussilago	cxij. cxijij. cxiiij.
Pyrus cervina & petræa	62.	Siliqua silvestris	13.	VACCINIVM Plinij	65.
		Sinapi pumilum	cxxix.	Valeriana	liiij. lv. lvj.
QUERCUS latifolia	20.	Sifyrinchium	216.217. cclvij.	Veratrum nigrum	j. ij. iiij. iiij.
Quercus marina	20.21.	Smilax aspera	112.113.	274.	
Quercus semper vitens	18.	Solanum	lxxxv.	Verbascum silvest.	xxvijij.
Quinquefolium	cv. cvj. cvij.	Soldanella alpina	308.309.	Verbena	xlj. xlviij.
		Sonchus	cxlviij. cxlviij.	Veronica	346.347.
RADIX cava	271.	Sorbus	9.	Vicia	ccxxxv.
Ranunculus grumosa radice		Sparganium Placæ	164.	Victorialis longa	189.
237.238. & paginis aliquot		Spartium Græcorum	102.	Viola Mariana	clxxj.
sequentibus.		Spartum Plinij	ccxix. ccxx.	Viola montana	309.310.
Ranunculus montanus	234.	ccxxj.		Viscum	20.23.26.34.39.85.
235.236.237.		Spina appendix Plinij	121.	Vitis Idæa	61.62.
Ranunculus præcox	232.233.	Spina infectoria	111.	Vitis silvestris	122.
Ranunculus silvarum	246.	Spiræa	84.	Vlmaria	cxcvij.
247.248.		Spongiosi fungi	cclxiiij.	Vva marina	91.92.
Rapunculus	clxxiiij.	Stachys spinola	cclix.	Vva taminia	122.
Rhamnus	109.110.111.	Stelis	34.	Vva urfi	63.
Rhodia radix	lxv.	Stœbe Salmantica	ix. x.	XYPHIVM	190.
Rhus	17.	Stœchas	344.345.	ZIZYPHVS alba	29.30.
Ribes	119.120.	Stratiotes millefolia	330.	Zizyphus rutila	28.
Robur	18.19.	Suber	21.22.		
Rosa	113.114.115.116.	Suilli fungi	cclxxj. ccxcj.		
Ros marinus silvestris	83.84.	Symphitum tuberosum	clxvj.		
Rubia	clxxvj. clxxvij.	Syringa frutex	55.56.		

X I D M I
**INDEX CONTINENS PEREGRINA
 PLANTARVM NOMINA QVÆ IN HAC
 HISTORIA DESCRIBVNTVR.**

A BBEIS	237.	Azadarac	30.	çadorija	xciiij.
Abeto	34.	Azal-Xochiel	157.	Cafelale	150.
Abhel	37.	Azebucho	27.	çamarilla	364.
Abillota	23.	Azedaraeth	31.	çamarinhera & çamarinhas	46.
Abrojos	ccxlj.	Azeit de mata	15.	çamotes	lxxvij.
Açafran salvage	clij.	Azre	9.	Camparrilla	116.l.
Acero	9.	Azuche	27.	Candilera	xxvij.
Açoifeias & Açoifeio	29. & Açufaisas.	BABA varganya	ccxxxij.	Cañabeja	ccxj.
Açucenas amarillas	164.	Bagoly gomba	ccxxvij.	Cantueſſo	345.
Abasber	9.	Baguenaudier	14.	çarça parilla	113.lxxij.
Abozna	55.	Blaw Baldzian	185.	Caro corredor	clix.
Adracla	48.	Baltracan	ccxj.	Cardon	clxj.
Ahozn	9.	Bamia	xxvij.	Cardon lechal	clij.
Aies	lxxvij.	Barbozca	9.	Carra	xlx.
Ajo de ciguñas	180.	Barenbluſt	82.	Carobe & Carobole	14.
Ajunjera	cxliij.	Bataras	lxxvij. lxxvij.	Carouger & Carouges	ibid.
Alaçer	clj.	Bathengel	352.	Caſca	51.
Alader	53.	Bec de grue	clj.	Caſtagna di cavallo	8.
Alaja Suſam	224.	Bechy ſiu	lvij.	Caſt.ñ. de cavallo	ibid.
Alaterna	51.	Behen	292.	ad Caſtaneſi	8.
Albardin	ccxx.	Beidelfar	lxxvij.	Cavala lale	150.
Alcolcaz	lxxv.	Beidſar	ibid.	Caucason	191.
Alcornoque	21.	Bein holtz	59.	Cebolla albarrana	171.
Alezre	35.	Bel	16.	Cebolla de culebra	197.
Alfabeca	ccxxxij.	Belcho	92.	Cebollina	208.
Algarouo	13.14.	Belend	lxxxv.	Cecrapchel	20.
Aliehrin frances	345.	Beleſa	ccxiiij.	at Cecſtaneſi	8.
Aliſier	9.	Bella donna	lxxxv.	Cerifier nam	64.
Aliſo	12.	Bellan	109.	Cerres	ccxxxvj.
Allga caon	113.	Bellora	23.	Chamepidia	cxv.
Almaſtiga	15.	Benedicten Kraut	ciii.	Champignon	ccxxvij.
Alno	12.	Benedicten wurtz	ciiij.	Chaſtagne de cheval	8.
Alpergas	clxxix.	Benoitte	ciiij.	Chelidoine	ciiij.
Alproſen	82.	Bergzoſen	82.	Cherfa	20.
Altamiza	364.	Berkyne	9.	Cherme	55.
Alubias	ccxxvij.	Befaſa	ccxxxvij.	Chermafel	41.
Amapolas	xcij.	dulle Beſi. n	lxxiiij.	Cherme verd	23.
Amelancher	62.	Bik alya	ccxxvij.	Cherfnette	352.
Amores mios	167.	Biffen Fruyt	lxxxv.	Chöpörke gomba	ccxxvij.
Amotes	lxxvij.	Bingſlein	ccxxiiij.	Chriſtwurtz	274.
Amourettes	ccxxvij.	Binizade & Binizante	255.256.	Chumo	lxxx.
Angerling	ccxxvij.	Bidecin	301.	Chypkeſa	118.
Arabifche Jacinthen	186.	Birchen ſchwammen	ccxxvij.	Ciden ſari	164.
Araghoen	67.	Bitter wurtz	313.314.	Cidras	5.
Arbol d' amor	13.	Bitwurtz	245.	Cinogloſſa	clxij.
Arbol parayſo	30.	Blutwurtz	clj.	Clavellinas	286.
Arbouſier	48.	Boga	96. & Boxa.	Colcas	lxxvj.
Arbre de vie	37.	Bou à faire lardoires	57.	Cogombrillos amargos	ccxxxvij.
Ardivija	79.	Bokros gomba	ccxxv.	Collejas	292.
Argamula	clxv.	Bont quibir & ſougier	16.	Collejon	ccxxvij.
Armoiries	287.	Borſos gomba	ccxxvij.	Conoccielle	ccxxiiij.ccxv.
Arnaballo	cxv.	Borafa termewt	ccxxvij.	Con Zambach	167.
Arveira	15.	Bzachen diſtel	clix.	Coquelourdes	166.260.
Arzolla	vij.	Breço	46.	Coraçoncillo	clxxxj.
Aſchitz	10.	Bzem raepe	271.	Cormier	10.
Aſparago	clxxix.	Bzuſt beerlin	29.	Cornicabra	15.
Aſprilla	clxxxij.	Bruyere	46.	Coronilla de frayles	91.
Atorga	46.	Buchen ſchwammen	ccxxvij.	Coronilla de Rey	99.
Atramocos de can	ccxxxiiij.	Bugloſſa ſalvatica	clxv.	Coſcoja	24.
Aube eſpine	121.	Bugloſſe ſauvage.	ibid.	Craſt Kraut	305.
Auffenblad	278.	Buburmenem	264.	Creſpino	121.
Aulaga	106.	Bultz	ccxxvij. ccxxvij. ccxxvij.	Cuentas	lxxxij.
Aulne	12.	Burhalaga	89.	Culcas	lxxvj.
		Butter wort	311.	çumaque	17.
		CABEÇVELA	x.		çumillo
		Cade	39.		

gumillo	exij.	GAGEL	17.	gemeine Honbstonge	clxij.
Cypres	342.	Galambicza	ccclxix.	Hohen schwammen	ccclxxv.
DALADER		celxx.		Holder schwammen	ccclxxv.
Damor	51.	Galinaccia	ccclxxvj.ccc.	Holtz schwammen	ccclxxv.
Devebohini	ccij.	Galipoli lale	263.	Horzgeillen	ccclxxv.
Dixno gomba	156.162.	Galaginya fa	121.	Huile de mastie	15.
Dixno repa	ccxxj.	Gamarfa	ccxxvij.	Hundsbeer	59.
Dit	264.	Ganonçillos & Gamones	197.	Hundsstischen	59.
Dohum	13.	Ganejou	ccclxxvij.	Hundszung	clxij.
Dolkraut	264.	Garavancillos	ccxxxij.	Hunerlaub	82.
Dolwurtz	lxxxvj.	Garlob studen	62.	seyer & sekete Hunyor	274.
Durillo	50.	Garoupe	86.	Hutrieß	204.
Eberwurtz	clv.	Gaspelbozne	107.	Hys	24.
Edeidistel	clj.	Gelb beckerl	166.	Hysgnum	ibid.
Egörfä	12.	Gelb Klee	104.	IARO	lxxij.
Elce	23.	Gelb Hornungs blumen	166.	Iasmin rosso	xc.
Elcken	65.	Gelb Nertz blumen	166.	Iauge	107.
Ellebore blanc & noir	274.275.	Gel tydelosen	166.	Iavorfa	9.
Encbro	39.	Genswurtz	xix.	Jeger beer	62.
Ensayon	lvij.	Genevre	39.	Jeger kraut	237.
kleine Entian	313.	Gengevo salvatico	246.	Iglieze	104.
Enxalmos	ccxix.	Germandree	352.	Igname	lxxix.
Enzina	18.23.	Gescheket Indianische blumen	xc.	Iharfa	9.
Eoufe	23.	Geyßbart	ccclxxij.	Iletro	51.
Erbfel	121.	Geyß Flaw	ccclxx.	Illyan zuet	137.
Erdt apfel	264.	Geyß schwammen	ccclxx.	Inhame	lxxvij.
Erdt psrimmen	104.	Giglio	224.	Ionc marin	107.
Erica	46.	Giglio marino	167.	Ionquillos	159.162.
Erizo	107.	Ginepro	39.	Iringo	clix.
Ertbaum	12.	Gilgen	224.	Irom	338.
Escabon	95.	Givroslees sauvages	286.	Irom barbara	121.
Esclair	ccij.	Giugiole	29.	Isten nyla	287.
Esola rotunda	ccc.	Giul	262.	Iujubier & Iujubes	29.
Esparragos	clxxix.	Glabkraut	clxxvj.	Iunquerina	ccliij.
Espine vinette	121.	Goldwurtz	134.	Iusquiamo	lxxxv.
Esteba	70.77.	Golia kore m	ej.		
Eulalia	106.	Gouwoztel	ccclij.	KACHCHI jescalch	332.
Ewz lab	ccclxxij.	Graine d'escarlatte	24.	Kartan	clj.
Ezerethgyw su	272.	Graine de perroquet	clj.	gelbe Käseblumen	332.
FAEL		Grana de tintorevos	24.	Kechke rago fa	57.
Fauterne	16.	Gresseltig	ccclxxv.	Kelber schiff	315.
Fay giorgy	lxxij.	Grimwurtz	ccclij.	Kemeni cher fa	18.
Fay soska	20.	Groote nascap	lxxxvj.	Kerssenbaum schwammen	ccclxxvj.
Feyer scarwas gomba	121.	Guardalobo	91.	Kesere w gomba	ccclxxix.
Felber	ccclxxvj.	Guindoulter & Guindoules	29.	Keske gomba	8.
Felber schwammen	85.	Gul catamer	262.	roso Kessen	287.
Felscher gresling	85.	Gye Wngy Wyrag	190.	Kepfens	301.cclxxij.
Fenyo alyä gomba	ccclxxv. ccclxxv.	HABEL		Kepferlin	301.cclxxij.
Fenyo fa	34.35.	Hachal Indi	37.	grosser gepe Klee	ccclxxvj.
keröztös Fenyo	33.	Hadbaha	xc.	Knaben kraut	clxxvj.
köz Fenyo	32.	Hagdozn	111.	Knot berries	118.
teviskes Fenyo	32.	Hallada	121.	Körö fa	81.
rad Fenyo	39.	Halm	106.	Köz siz fa	85.
weiß vnd schwarz Jereut	32.	Hanebane	ccxx.cclxx.	Krenling	ccclxxvj.
Festü verag	31.	Hanenbuche	lxxxv.	Kreutz blumen	301.
Fette henne	102.	Hanekammeken	55.	Kreutz wurtz	313.
Feuchten	ccclxxvj.	Harmala	cccl.cclxxij.	Krotten schwammen	ccclxxvj.
Fieber kraut	lxxvij.	Harsala	ccxxxvj.	Kueling	ccclxxij.
Filiguero	34.	Hasen öllein	ccclxx.	Kygio gomba	ccclxxij.
Fiz fa gomba	237.	Herba di latte	ccclv.	Kygio hagma	180.
Flambe	51.	Herbe aux poulmons	clxx.	LABLAB	
Flecken kraut	ccclxxvij.	Herbe aux tignes	lxxxv.	Ladierna	ccxxxvj.
Fliegenbeer	224.	Herbe aux viperes	ccclxxv.	Lagrimas de Moysen	51.
Fliegen schwammen	clxx.	Herench	ccclxxvij.	Lale ben zede	ccxxvj.
Flubirlin	62.	Herva de S.Laurenza	ccxxxij.	Länge de chien	263.
Flublumle	ccclxx.	Hestre	55.	Larmes de N.Dame	clxxij.
Follado	62.	Hepden	46.	Latri	ccxxvj.
Frailillos	305.	Hepden pissop	76.	Lauro salvatico	ccxxxvj.
Framboisier	50.	Hepdnisch binkraut	83.	Lauskraut	50.
Frisoles	lxxij.	Hepyl aller welt kraut	76.	braun Lauskraut	274.
Froschen stuel	117.	Hinber	117.	Lean kewk wrcim	cccl.
Fuespeckkraut	ccxxxvj.cclxxvj.	Himesta	103.	Leche tresna	cccl.
Fusim	ccclxxvj.	Hirschling	lxxvj.cclxxvj.	Lengua canina	clxxij.
	clxx.	wilde Hirschling	ccclxxvj.	Lengua	
	57.	Hirtzwurtz	352.cclxx.		

Lengua de buco Salvage	214.	Mustral	18.	RAISNIS de mar	92.
Lengua de perro	214.	Myrta, Myrte, Myrto	67.	Rapontis	xj.
Reifraß	204.	Myrtus baum	64.	Rafelnul	lxxvj.
Remeritha	46.	NABCA Alpini	28.	Rausch	82.
Lentagine	50.	Nap & Napca	27.	Recama	113.
Lentjuela	99.	Narajus	5.6.	Rechling	echtr.
Lentisco	53.	Narcisse	162.	Rekottye. fa	85.
Lentisque	14.	Narcissen rößlin	162.	Retama	103.
Leplap	ccxxvj.	Narzen schwammen	echtr.	Reveille matin	cxv.
Rechenbaum	35.	Natrer schwammen	echtr.	Reylla buer	213.
Liege	11.	Nep	27.	Reynblumen	325.
Limas y Limones	67.	Neurinas	39.	Rhon	17.
Linfraut	325.	Niwel zek fia	292.	Roble	18.
Linterna	52.	Niwel gomba	clxx.	Rodel vnd braun Rodel	echtr.
Lirio	213. 217. 224.	Nogeruela	clxxvj.	Romero	80.
Lirio cardeno	224.	Nombri de Venus	lxvij.	Romero marino	327.
Lirio spadañal	213.	Nozelhas	217.	p. tragi Rosa	117.
Lirios azules	ibid.	Nozelhas pequena	208.	Rosella	70.
Lisch	224.	Nuphar	lxxvj.	erd Rosen	117.
Lohere	ccxlvj.	Nyrsa gomba	clxx.	dunnen Rosen	116.
Lo ke wke Worchin	245.	wilden Dohenzung	clxx.	hepden Rosen	117.
Longer Krupt	clxx.	Delbaum	26.	pimpernelle Rosen	116.
Lubie Endigi	xxvj.	Oenlets sauvages	286.	Rosen von Jericho	57.
Lunaria del grapolo	cxix.	Okö Zom	332.	Rosen wurtz	clxx.
Lyncn	221.	Olaxfa	26.	wilde Rosmarin	364.
MAÇVCAS	217.	Olivastre	30.	Rosspreyck	305.
Madreña	48.	Olivella	86.	Rouge herbe	clxx.
Magney	clxj.	Olivier	26. 27.	blaw Ruckartza	9.
Magiaro salata	cl.	Oliuo	27.	Ruda	ccxxvj.
Maisterwurtz	cxv.	Openaw	lxxx.	SAAR fZ	85.
Mälbeerbaum	9.	Orbitochorto	ccxlvj.	Sabdari fa	xxvj.
feyer Malva	xxvj.	Orpin	lxxvj.	Sadar Serapionis	27.
Mamey	3.	Orvale	xxxvj. lxxxv.	Saffaf	30.
Mancanilla	327.	Ossuna	364.	Safran bastard	clj.
Manno trew	clxx.	Dsterlutze	lxvij.	wilde Safran	clij.
Manta de N. Señora	lxxv.	PALMA di Nettuno	clj.	Safrano saracmesco	ibid.
Marabillas del Piru	xc.	Palomilla & Palomina	ccix.	wild Galben	xxvj.
Maresma	54.	Papas	lxxix. lxxx.	Salgedeiras	14.
Margendzthen	27.	Panicaut	clix.	Salice	85.
Marquerites bleués	17.	Passeleurs	260.	Salomon pöcheti	277.
Marienschuch	272.	Pasternitz	ccxv.	Salsero	357.
Masbeer	9.	Penachio delle Ninfe	clj.	Sandalida	ccxlvj.
Mastich	15.	Penachio Persiano	130.	Sanguenho	51.
Mata	14.	131.	131.	Sanguin blanc	ibid.
Matulera	xxvj.	Peperlin	ech.	wepß Sanickel	cxlvj.
Maurachen	echtr.	Perdiguera	74.	Sant Geoze schwammen	echtr.
Mazola	xxvj.	Perlaro	30.	Sant Johans bzot	14.
Mazza di cavalliero	clxj.	Peztricz	clxxv.	Sant Petero wurtzel	cxlvj.
Melese	35.	Pfifferling	echtr.	Sap	34.
onser vrown Melch Krupt	clxx.	Piadera	53.	Sapin	ibid.
Menchera	xxvj.	Pico de Cigueña	69.	Sarga viola	299.
Metl	clxj.	Pie de borro	209.	Sarilla	356.
Meurte	67.	Piment	17.	Sarrasine	lxxvj.
Mezey zek fia	286.	Pincl	clxxvj.	des Sars	ccxxvj.
Miscajin	1327.	Pino alvar	35.	Saule	85.
Mierda cruz	88.	Pino carax	33.	Sauze	ibid.
Mjediega	101.	Poffeteg	clxxvj.	Sawbzot	264.
Mise g yerthya	271.	Poncires	7.	Sawtaschen	clxx.
Misfischwammen	echtr.	Porcion	166.	Scakaik	179.
Modelger	313.	Poriron	clxxvj.	Scambrones	110.
Molesso	50.	Psfakja	281.	Scheberling	echtr.
Molino	107.	QVEIRO	46.	Schelkraut	clxlvj.
Mose beeren	19.	welscher Quendel	357.	Schluffel blumen	301. 305.
Montfraut	clxx.	Quercivola	392.	dick turggische rot	Schmalzblu-
Montrauten	clxx.	Quexigo	18.	men	244.
Montan	238.	Quinua	lxxx. lxxxj.	Schmerwurtzel	clxxvj.
Monyaró alya gomba	clxxvj.	Quiribuela	46.	Schoßwurtz	267.
Morilles	clxxvj.	Quiruëla	73.	Schzubbeeren	60.
Mort au chien	201.	Quispel	180.	Schwalbenkraut	clxlvj.
Mortella	67.	Quita meriendas	201.	Schwertel	224.
Mosbell	170.			Schwindelkraut	305.
Monges	70.			Sceetro de Nettuno	clj.
Muschio greco, & Muscho romi	179.			Scoba he dionda	326.
				Scobas	103.
				Scopa	101.
				Segullada	

I N D E X.

Segullada	91.	Terebinthe	15.	Weisse balbalan	19.
Seisefum	30.	Tetiberzic	119.	Weiß Hornungs blumen	170.
Semper nova	clxxx.	Teubelinge	ccclxx. cclxx.	Weiß Jacinthen	186.
wilden Senff	ccxlj.	Teuffels abbey	237.	Weiß rauch	340.
Seperew fu	341.	Teuffels milch	ccc.	Weisse veil	170.
Sequitia Romana	ccxij.	Thanneling	ccclxxv.	Weiß wurtz	277.
Serbita	38.	Thannen	14.	Welsche holdet	55.
Serin cada	162.	Thym, Thymo, Thymus	357.	erdt Weprel	64.
Siben hamfozm	190.	Tiktara	189.	stain Weprel	64.
Siempre enjuta	91.	Tiz rös fu	xlj.	Whit root	311.
Stigwurtz	190.	Tomarguera	clxxj.	rechter Widertson	ccclxx.
Sincer schwammen	ccclxxv.	Tomillo	345-357.	Wild gelb veil	299.
Snetropfen	170.	Tomillo perruno	342.	Wild kuttren	62.
Sorbolaro	10.	Tomillo salsero	357.	Wild Saffran	201.
Spargen	clxxv.	Toñada	162.	Wild neglin	286.
Spasro	ccxx.	Tornasol	xlviij.	Wolfs milch	ccc.
Speick	lvij.	Tornesol	ibid.	Wolswurtz	ccc.
Speirbaum	10.	Toronjas	5-7.	Wi felem serewnt gomba	ccclxxx.
Speerwerbaum	10.	Torvisco	53.	Wulblumen	328.
Spina borda	clij.	Trebison curmass	5.	Wundkraut	lvij.
Spindelbaum	57.	Trebol	ccclxij.	XAGVARCA	78.
Spino	110.	Tribi & Timbri	358.	Xaguarco	80. 81.
Spongiole	cclxij.	Trique madama	lx.	Xara	77.
Stein aichel	18.	Tuero	ccxij.	Xara-estepa	70. 78.
Steinber	118.	Turmera	177.	Xara-xarguna	78.
Stein negelin	286.	Tusai	127. 118. 129.	Xaron	78.
Stein röslein	90. 305.	Tuyis alya gomba	ccclxxxv.	YERVA de las bivas	clxx.
Stichenpfrimen	104.	Tuyfchiachi	129.	Terva de S. Guiteria	clxxxclxij.
Stozck schnabel	clj.	VAD-megy	64.	Terva del quadrillo	77.
Stoek schwammen	ccclxxv.	Vad zek fu	292.	Terva de Vallesteras	274.
Stridula	cxlv.	Varganya	ccclxj. cclxij. cclxxxij.	Terva pulgera	xxj.
Sugaro	21.	Varuy Lab	ccclxxxij.	Terva puntera	lvij.
Sultan Zambach	131.	Vazillos	cxj.	Terva tora	101.
Sumac	17.	Vedegambre blanco y negro	lxvij.	Tmeßta	103.
Susam giule	130.	Veleso	274.	Xopillo	356.
Szawas gomba	ccclxxij.	Verdezilla	lxxxv.	ZAFRA	208.
Szedöry	118.	Vermellon	l.	Zarnabo	30.
födis Szedör	ibid.	Vesse de loup	24.	Zarneb	ibid.
Szemerchyeck	ccclxij.	Villorita	ccclxxxvij.	Zaroa	111.
Szent Gyeurgy gambaya	ccclxij.	Vorne	201.	Zek fu	286.
Szent Gyeurgy veraga	190.	Vnderbozn schwammen	122.	Zelmice-fa	65.
Szent János kenyere	14.	Unser frau har	ccclxxv.	Zenselacht	30.
Szilwa alya	ccclxxv. cclxxxv.	Unser frauw schuch	323.	Zens Ianos five	xxxij.
Szilfa termewt alya	ccclxvj.	Unser frauw schwarz rauch	272.	Zens Lazlo kiraly five	313.
TAMARICE	41.	Vogel beer	9.	Zeöd lithom	137.
Tamarischen baum	41.	Vogel nest	270.	Zerem cada	162. 163.
Tamarisque	ibid.	Vr gomba	ccclxxij.	Zigenbaert	ccclxxij.
Tamoxi, Tamuexo, Tmujos	111.	Vrgueira	46.	Zepdloß	201.
Taratoufli	lxxx.	Vrs	ibid.	Zinneck	46.
Taray	41.	Vva de perro	50. 113.	Zoddei negelin	286.
Tarobolos catamon	241.	Klein Walwurtz	clxx.	Zufniare	131. 132.
Tartarsky	232.	Warw borso	ccxxxv.	Zumbul	175.
Tataria	ccxj.	Weiberfist	ccclxxvij.	Zumbul Arabi	186.
Tely fa	20.	Weiden	85.	Zurumbeth	30.
Tely zöd	46.				
Terbaick	16.				

A P P R O B A T I O.

HÆ Rariorum Plantarum Historiæ CAROLI CLVSII Medici expertissimi, nihil nostræ Catholicæ fidei contrarium præ se ferunt. Quare ante obitum Auctoris in lucem prodire possunt, vt precibus piorum, ipse memor suæ primæ plantationis, iam finem suum certum faciat, quò securior viam vniuersæ carnis ingredi tandem valeat. Ita censeo 27. Februar. an. 1601.

Egbertus Spitholdius Plebanus &
Canonicus Antuerpiensis.

Menda que Typographicarum operarum oculos effugerunt in hac Plantarum Historia sic erunt emendanda: Prior numerus paginam significat, Alter versum.

p. 2. v. 60. ferebat. p. 3. v. 36. PERSEAE. p. 10. v. 1. Aschitzg. p. 13. v. 34. tectos. p. 13. v. 40. rotunditatis. p. 14. v. 21. fert. in p. 17. v. 6. ad exim p. 17. v. 10. p. 26. 59. Cerpa p. 29. v. 1. a colore v. 30. Guindoulier. p. 36. v. 19. Tellinaru p. 39. v. 4. Genevre. p. 46. v. 4. Lemerinha. p. 50. v. 19. Lenta- gine p. 51. v. 27. sauguenho. p. 74. & 75. figura Chamæcisti trit. & v. trāspozita p. 84. v. 26. Sebi. v. 62. Viburnum p. 86. v. 12. fabulosus p. 89. v. 43. Centaurij. p. 91. v. 2. Velez el rubio. v. 37. siam p. 94. v. 32. ut leguminum p. 100. v. 18. titulo. Do- RYCNIVM p. 110. v. 15. plurimus & p. 114. v. 10. translatas, p. 117. v. 15. tit. RVBVS IDAEVS MYLGARIS p. 124. v. 49. pingui sacco tur. p. 133. supra figuram ponendus titulus LI- LIVM MINIATVM PRAECOX ANGVSTIFOLIVM. p. 144. v. 4. infidentes p. 151. v. 6. bulbillos. p. 153. v. 29. habet hortu, p. 173. v. 5. in denos p. 177. v. 6. proficisceret; p. 178. v. 26. premenda p. 180. tit. Hyac. Comof. albo p. 186. v. 14. quem p. 191. v. 61. parens. p. 212. tit. Itis bulbosa flavo flo. sine iv. p. 222. v. 9. angusta p. 223. v. 3. Caroli a S Audoinaro. p. 224. v. 25. Lirio cardeno. p. 228. v. 40. tit. Semen p. 230. v. 53. Ba- denles thermas. p. 233. v. 9. aconiti p. 236. marg. Ranunculi m. IIII (a. p. 244. v. 42. acris p. 259. v. 49. valde dissimilis e p. 286. v. 26. exterius rub. p. 275. Moos Veratri nigri III figura, quam additam oportuit ex pag. 679. Tam. Iron fig. 2 aut pag. 680. fig. 1. p. 279. v. 4. ossium p. 283. v. 13. adferebamus p. 285. v. 6. supra fig. 2. Caryophyll. fil. VII. p. 291. v. 27. PRIOREM & OCTAVAM Sal. p. 299. v. 9. inciperet; p. 304. post v. 20. debuis- serit inseri verba sequentia.

SEPTIMAE folia ijerant familia, quæ Primum genus fla- vos gestans flores habet, præsertim his quæ candicant, & veluti farinā quadam sunt aspersa, minus tamē amplā: caul. dodran- talis tanquā farinā etiam aspersus, summo fastigio multos flo- res in quinque laciniis divisos sustinet, quarum singulae in ex- tremo crenā sunt præditæ, instar florum flavæ, paullo tamē mi- nōres, colorisq; exalbidi carneo perfusi: odore habet Primæ. In Bataviam, ubi conspiciebam, ex Anglia primum allatum esse intelligebam hoc genus; an vero sponte istuc nascatur, an aliunde illatum, me latet.

Tanecnemum, 29. Onobrichida, 34. Onobrichis, 36. Irio, 48. Phyllum, cccxxxi: 38. melotron, cccxxvi: 13. action Gef., cccxxxi: 26. Saxi, 49. Nerium, cccxl: 42. pro Leontopodio, cccxliij: 21. au altera, cccxli: 34. vlmaria.

Deinde ponendum OCTAVA pro SEPTIMA & in marg. Auric. v. 11. & pag. 305. supra fig. Auricula usi ix. mi- nima, & v. 8. NONAE pro OCTAVAE, & marg. Auric. usi ix. p. 316. v. 5. cognominans. v. 11. leis folijs con p. 342. margine Chamæcyparillus Plinij reponi debuisset è regione sectionis PLINIVS Cha. p. 349. v. 1. primo genere, p. 356. v. 36. duræ, lignosæ, in

Tribus posterioribus libris mutata est numerorum ratio, qua nobis in mendis corrigendis fuit sequenda.

p. iij. v. 17. tria exteriora p. xj. v. 1. lapidolis juxta p. xvij. mar- gine Pannonic. p. xxvij. v. 34. Baticā v. 39. Batica. v. 40. Ba- tici p. xxxvij. v. 9. Lausannam p. xliij. v. 26. corrumpit. pag. lxxij. margine Sedum minus. 1. p. lxxj. v. 28. haberet p. lxxij. v. 5. minor. Hoop. lxxij. v. 33. (væ Cepææ p. lxx. v. 18. LOX- GAE p. lxxv. v. 8. postremæ fo. v. 34. Alcolcaz p. lxxv. v. 23. vi- rēibus a. p. lxxix. v. 19. Yucam. p. lxxxj. 8. purgatas v. 54. Sul- læ p. cxliij. v. 25. pergerent; p. cxv. v. 13. deinde in p. cxxxiiij. v. 50. consequi. p. cxxxv. v. 3. valcula p. cxxxvj. supposita fig. pro legitima quam miseram p. cxlij. tit. Hieracium xi. min. p. cxlix. v. 1. alternis p. cl. v. 21. munitæ sint p. clvj. v. 18. nit Plan. v. 24. dissimiles v. 53. quibusdam p. clvij. v. 15. cum sub inseq. p. clxj. v. 1. nonnulli p. clxv. v. 15. buglosa sal v. 56. ay- xovav v. p. clxv. v. 7. (quod istius regionis mulieribus usi v. 19. foliam ap. v. 28. semini p. clxix. v. 28. caliculum p. clxxvij. utriusque figuræ titulo Corrida p. clxxxvj. v. 42. Chamæfy. v. 46. aspersa, p. cxc. margine xaxaxias p. cxcij. v. 61. Jmpha. p. cxcij. v. 30. itiatas, p. cxcvij. v. 9. Phalio. p. cxcvij. v. 55. de- fcri, illud scilicet pungendum p. cc. v. 44. infernā parte p. ccj. v. 22. PROXIMI vs p. ccij. v. 16. Chelidonij p. cciiij. v. 19. blandē rub p. ccv. v. 27. proposuerunt. p. cciv. v. 3. quidam p. ccxvij. v. 9. dissimile esset, v. 10. beret dre p. ccxj. v. 2. quæ in v. 26. plumulam. p. ccxxxij. v. 11. cognita, p. ccxlv. v. 18. qui con- fertim p. ecl. v. 16. ad Brij p. ccvij. v. 11. Arabici vel Lilij v. 19. glandulosas p. cclix. v. 48. derothymo, p. cclxxx. v. 30. primum.

pag. cclxxxiiij. margine Sarga varganya, ccciiij: 36. subspi- cæ cxil., cccv: 1: 58. plarimæ, cccxvij: 5. aliqui, 30. perforat, cccxix: 3. adstrictionis, cccxviiij: 7. Abutilon, cccxxx: 15.

Series Chartarum.

* A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z.

a b c d e f g.

AA BB CC DD EE FF GG HH II KK LL MM NN OO PP QQ

RR SS TT VV XX YY ZZ.

aa bb cc dd ee ff gg.

Omnes sunt Terniones, præter YY Duernionem,

g, & ff, Quaterniones.

Egbertus Zitholdius Flessum & Canonius Antwerpenfis.

A N T V E R P I A E,
E X O F F I C I N A P L A N T I N I A N A,
A P V D I O A N N E M M O R E T V M.
A N N O C I O . I O C I .



句



Clusius

PLANTARUM

HISTORIA