

Nomes dos Lugares.	Latitude ou Alt. do Pólo.	Longitude.		
		Em graos.	Em tempo.	
Ilhas Ma- gáel. {	Entrada . . . . .	47° 17',0 N.	53° 1',0 Occ.	3 <sup>h</sup> 32' 4" *
	Amberst (C. O.) . . . . .	47 19,0	53 25,0	3 33 40
	Brion (P. E.) . . . . .	47 52,0	52 27,0	3 29 48
	L. Bird, ou das Aves . . . . .	47 55,0	52 7,0	3 28 28
	P. Scomina B. Miramichi . . . . .	47 12,0	56 6,0	3 44 24
Miscou I. Bahia Chaleur . . . . .	48 4,0	56 19,0	3 45 16	
I. Boaventura . . . . .	48 33,5	55 58,0	3 43 52	
B. Gaspee (P. S. da entr.) . . . . .	48 47,5	56 1,5	3 44 6	
C. Rosiers . . . . .	48 57,0	55 57,0	3 43 48	
C. Chat . . . . .	49 7,0	58 54,0	3 54 16	
Quebec . . . . .	46 47,5	62 45,0	4 11 0 *	
I. aux Coudres . . . . .	47 23,0	61 58,6	4 7 54 *	
Bahia das Sete Ilhas (I. Gran- de P. S. O.) . . . . .	50 6,0	57 52,0	3 51 28	
I. Anticosti R. Bom Socorro . . . . .	49 26,0	55 13,3	3 40 53 *	
Idem P. S. E. . . . .	49 7,0	53 40,0	3 34 40	
Monte Joli . . . . .	50 6,0	53 33,0	3 34 12	
Mecatina Grande (P. S.) I. . . . .	50 44,0	50 32,0	3 22 8	
B. Eskimaux (entrada) . . . . .	51 22,0	49 16,0	3 17 4	
XXXVIII. Costa da Terra Nova.				
Bahia de S. Joaõ (P. Ferolle) . . . . .	51 2,0	48 41,0	3 14 44	
Ponta Rica . . . . .	50 40,2	48 58,0	3 15 52 *	
Ingornachoix . . . . .	50 37,3	48 50,5	3 15 22 *	
Boa Bahia (P. S.) . . . . .	49 32,0	49 34,0	3 18 16	
Bahia das Ilhas (P. S.) . . . . .	49 6,0	49 58,0	3 19 52	
C. de S. Jorge . . . . .	48 30,1	50 56,6	3 23 42 *	
C. Anguille . . . . .	47 55,0	50 57,3	3 23 49 *	
C. Ray . . . . .	47 37,0	50 48,0	3 23 12	
Bahia de la Poile (entrada) . . . . .	47 38,0	49 57,0	3 19 48	
Ilha Burgeo . . . . .	47 35,5	49 11,3	3 16 45 *	
Ramea (a mais O.) Ilhas . . . . .	47 30,0	49 0,0	3 16 0	
Ilhas Penguins (meio) . . . . .	47 22,0	48 35,0	3 14 20	
C. la Hune . . . . .	47 52,0	48 25,0	3 13 40	
Porto Jervis (I. Grande) . . . . .	47 36,0	47 49,0	3 11 16	
Ilha Longa (no Porto) . . . . .	47 36,0	47 40,0	3 10 40	
Porto Breton (P. E.) . . . . .	47 27,0	47 23,0	3 9 32	
Ilha Brunet Bah. da Fortuna . . . . .	47 16,0	47 29,0	3 9 56	
Porto Fortuna . . . . .	47 4,0	47 27,0	3 9 48	
Miquelon Grande (C. N.) I. . . . .	47 8,0	47 55,0	3 11 40	

Nomes dos Lugares.	Latitude ou Alt. do Pólo.	Longitude.	
		Em grãos.	Em tempo.
I. de S. Pedro (Porto) ; . . .	46° 46',5 N.	47° 45',0 Occ.	3 <sup>h</sup> 11' 0" *
C. Chapeau Rouge . . . . .	46 53,0	46 59,0	3 7 56
Porto Burin . . . . .	47 3,0	46 44,0	3 6 56
Bahia Mortier (entrada) . . .	47 9,0	46 38,0	3 6 32
Porto Placencia (no forte) . .	47 14,0	45 36,0	3 2 24
C. de S. Maria . . . . .	46 52,0	45 46,0	3 3 4
Porto de S. Maria (P. N. E.) .	46 58,0	45 9,0	3 0 36
C. Freels Bah. Trepassey . . .	46 38,0	45 5,0	3 0 20
C. Raze . . . . .	46 40,0	44 38,5	2 58 34 *
Porto Formoso (P. N.) . . . .	47 1,0	44 28,0	2 57 52
C. Ferryland . . . . .	47 4,0	44 25,0	2 57 40
C. Bull, ou do Touro . . . . .	47 20,0	44 19,0	2 57 16
C. Speard . . . . .	47 31,4	44 12,8	2 56 51 *
S. Joã Forte . . . . .	47 33,8	44 15,0	2 57 0 *
Torbay . . . . .	47 43,0	44 16,0	2 57 4
C. de S. Francisco . . . . .	47 52,0	44 23,0	2 57 32
Belleisle (Grande Beach) . . .	47 40,0	44 38,0	2 58 32
Portugal-Cove . . . . .	47 39,0	44 35,0	2 58 20
Santa Cruz . . . . .	47 22,0	44 57,0	2 59 48
Salmon-Cove . . . . .	47 27,0	45 1,0	3 0 4
B. Hespanhola . . . . .	47 38,0	45 10,0	3 0 40
Carbonier . . . . .	47 47,0	44 56,0	2 59 44
Bahia Green (C. E.) . . . . .	47 57,0	44 28,0	2 57 52
Ilha do Bacalhaq (P. N.) . . .	48 25,0	44 24,0	2 57 36
Pam de Açucar B. da Trindade	48 0,0	44 58,0	2 59 52
Porto Dildo . . . . .	47 35,0	45 14,0	3 0 56
I. Randam (C. S. E.) . . . . .	48 10,0	45 5,0	3 0 20
Trindade . . . . .	48 26,0	44 50,0	2 59 20
Porto Catalina (C. S.) . . . .	48 31,0	44 31,0	2 58 4
C. Boa Vista . . . . .	48 50,0	44 33,0	2 58 12
C. Freels . . . . .	49 31,0	44 55,0	2 59 40
I. de Funk . . . . .	49 51,0	44 6,0	2 56 24
I. do Fogo (C. E.) ; . . . . .	49 57,0	45 51,0	3 3 24
B. de N. Senhora (C. de S. Joã)	50 10,0	47 8,0	3 8 32
B. d'Orange (P. S.) . . . . .	50 31,0	47 58,0	3 11 52
C. Canada . . . . .	50 46,0	47 45,0	3 11 0
Ilha Groais (P. S.) . . . . .	50 53,0	47 14,0	3 8 56
Porto Croc . . . . .	51 3,3	47 25,0	3 9 40 *
C. de S. Antonio . . . . .	51 20,0	47 9,0	3 8 36
S. Lunaire Bahia . . . . .	51 29,0	47 5,0	3 8 20 *
C. Bauld I. Quirpon . . . . .	51 39,0	47 2,8	3 8 11 *
I. Grande du Sacre (P. N.) . .	51 39,0	47 11,0	3 8 44

Nomes dos Lugares.	Latitude ou Alt. do Pólo.	Longitude.	
		Em grãos.	Em tempo.
C. Normand . . . . .	51° 59',0 N.	47° 31',0 Occ.	3 <sup>h</sup> 10' 4 <sup>o</sup>
Bahia de S. Barbara . . . . .	51 15,0	48 20,0	3 13 20
XXXIX. <i>Costa de Lavrador, Greenlandia, e Islandia.</i>			
Porto de Lavrador . . . . .	51 28,0	48 48,0	3 15 13
Red-Bay (entrada P. O.) . . . . .	51 44,0	48 2,0	3 12 8
I. Castle (P. S.) <i>Bah. d'York</i> . . . . .	52 0,0	47 21,0	3 9 24
Belleisle (P. N. E.) . . . . .	52 0,0	46 56,0	3 7 44
Bahia de S. Pedro (P. O.) . . . . .	52 9,0	47 9,0	3 8 36
C. Charles <i>Bahia de S. Luis</i> . . . . .	52 16,0	47 7,0	3 8 28
C. de S. Miguel . . . . .	52 47,0	47 12,0	3 8 48
I. Spotted (P. N.) <i>Rocky-Bay</i> . . . . .	53 31,0	47 9,0	3 8 36
I. Wolf (P. N.) . . . . .	53 45,0	47 22,0	3 9 28
Table-Bay (P. N.) . . . . .	53 45,0	47 59,0	3 11 56
Bahia de Sandwich (C. Negro) . . . . .	53 49,0	48 29,0	3 13 56
C. Webuck . . . . .	55 18,0	49 45,0	3 19 0
I. Hillsborough (P. E.) <i>B. Nain</i> . . . . .	57 10,0	52 55,0	3 31 40
C. Chidley . . . . .	60 8,0	56 15,0	3 45 0
Ilha Button . . . . .	60 35,0	56 55,0	3 47 40 *
C. Charles <i>I. Charles</i> . . . . .	62 46,5	65 50,0	4 23 20 *
C. Diggs . . . . .	62 41,0	70 25,0	4 41 40 *
Ilha Mansfeld (P. N.) . . . . .	62 38,0	72 8,0	4 48 32 *
B. Mosquito (C. Smith) . . . . .	61 2,0	70 57,0	4 43 48
East-Main-House . . . . .	52 14,0	70 30,0	4 42 0
Moose (forte) . . . . .	51 15,0	72 25,0	4 49 40
Albani (forte) . . . . .	52 13,0	73 25,0	4 53 40
C. Henriqueta . . . . .	55 20,0	74 1,0	4 56 4
York (forte) . . . . .	57 0,0	84 1,0	5 36 4
C. Churchill . . . . .	58 57,0	84 37,0	5 38 28
Forte do Principe de Galles . . . . .	58 47,5	85 42,5	5 42 50
C. Southampton <i>I. Barren</i> . . . . .	62 2,0	77 44,0	5 10 56
C. Pembroke . . . . .	62 57,0	73 35,0	4 54 20 *
C. Walsingham . . . . .	62 59,0	69 23,0	4 57 32
Ilha Salisbury . . . . .	65 29,0	68 22,0	4 33 28 *
Ilha Selvagem . . . . .	62 52,5	62 23,5	4 9 54 *
Ilha Saddleback . . . . .	62 7,0	59 48,0	3 59 12 *
C. da Resolucao . . . . .	61 29,0	56 45,0	3 47 0 *
C. Graças a Deos . . . . .	65 56,0	55 15,0	3 41 0
I. Disco (P. S. E.) . . . . .	69 0,0	42 43,0	2 50 52
C. Bedford <i>I. James</i> . . . . .	68 50,0	48 5,0	3 12 20

Nomes dos Lugares.	Latitude ou Alt. do Pólo.	Longitude.		
		Em grãos.	Em tempo.	
Musketonove . . . . .	64°55',2 N.	44°31',8 Occ.	2 <sup>h</sup> 58' 7" *	
Gotbaab . . . . .	64 9,9	56 2,5	3 44 10 *	
C. Farewel . . . . .	59 38,0	34 17,0	2 17 8 *	
C. Herloffs . . . . .	64 15,0	24 45,0	1 39 0 "	
Patriford . . . . .	65 35,8	15 34,9	1 2 20 *	
Lambhuus (Observ.) . . . . .	64 6,3	13 30,5	0 54 2 *	
Islandia	Bessested . . . . .	64 6,1	13 29,8	0 55 59 *
	Ilha de Portland . . . . .	63 22,0	10 29,0	0 41 56 *
	Hola . . . . .	65 44,0	11 19,0	0 45 16 *
	C. Norte . . . . .	66 40,0	14 15,0	0 57 0
I. de Joaõ Maine (P. S.) . . . . .	71 0,0	1 30,0	0 6 0	

## XL. Costa do Mar Glacial.

I. Chery, ou Bear . . . . .	74 36,0	27 41,0 Or.	1 50 44
Spitsberg (C. S.) . . . . .	76 42,0	23 42,0	1 34 48
Idem I. dos Estados (P. S.) . . . . .	77 24,0	28 45,0	1 55 0
Idem P. Hakluyts . . . . .	80 0,0	19 11,0	1 16 44
Rio de Cobre visto por Hearn . . . . .	68 52,0	101 50,0 Occ.	6 47 20
R. Mackenzie (Barra) . . . . .	69 15,0	123 55,0	8 15 40
C. Glacial Amer. Sept. . . . .	70 29,0	153 17,5	10 15 10 *
C. Lisburn idem . . . . .	68 58,0	157 27,0	10 29 48
C. Nordeste d'Asia . . . . .	68 56,0	170 46,5	11 25 6 *
C. Slagatskoi . . . . .	71 48,0	178 35,0	11 54 20
Kowima (a Baixa) . . . . .	68 18,0	171 45,0 Or.	11 26 52 *
Utoroi (P. N.) I. . . . .	74 10,0	150 55,0	10 3 40
Olenk . . . . .	72 43,0	128 25,0	8 33 40
Pestchnoe . . . . .	73 0,0	118 7,0	7 52 28
C. N. de Samogedi . . . . .	77 55,0	108 49,0	7 15 16
Powa . . . . .	75 38,0	96 57,0	6 26 28
Ubino . . . . .	73 19,0	90 40,0	6 2 40
Sariscoe . . . . .	71 10,0	94 43,0	6 18 52
C. Matzol . . . . .	73 42,0	85 3,0	5 40 12
Nova Zembla (P. N. E.) I. . . . .	76 30,0	78 45,0	5 15 0
Ilha Waigats (P. N.) . . . . .	69 18,0	66 50,0	4 27 20
Archangel . . . . .	64 31,6	49 8,3	3 16 33 *
Kemi . . . . .	64 20,0	43 23,0	2 53 32
Umba . . . . .	66 44,5	42 37,8	2 50 31 *
C. Czymots . . . . .	68 55,0	49 45,0	3 19 0
Kola . . . . .	68 52,5	41 25,5	2 45 42 *

E X P L I C A Ç Ã O  
D A S  
E P H E M E R I D E S.

---

1. Estas Ephemerides são calculadas para o tempo medio do Observatorio Real da Universidade de Coimbra, contado astronomicamente, isto he, de meio-dia a meio-dia, levando as 24 horas seguidas, sem distincão de horas da manhã, e de horas da tarde. E daqui vem, que do meio-dia até á meiu-noite concorda a conta do tempo astronomico com a do civil; mas da meiu-noite até o meio-dia ás horas da manhã do tempo civil ajunta-se 12 horas, e referem-se ao dia astronomico antecedente; e reciprocamente, das horas do tempo astronomico tira-se 12, e o resto são horas da manhã do dia civil seguinte. Assim, por exemplo, 5 de Janeiro 4 hor. do tempo astronomico he o mesmo dia 3 de Janeiro 4 hor. da tarde do tempo civil; mas 3 de Janeiro 18 hor. he 4 de Janeiro 6 horas da manhã etc.

2. De qualquer modo que se conte, he o tempo verdadeiro quando se conforma com o movimento apparente do Sol, sendo meio-dia no instante em que o centro delle passa pelo meridiano. Mas como estas revoluções diurnas não são iguais, foi necessario introduzir o tempo medio e uniforme, para sobre elle se fundarem os calculos astronomicos. Não concorda por tanto o meio-dia verdadeiro com o medio, senão quatro vezes no anno, e em todo o mais tempo começa o dia medio antes, ou depois do verdadeiro. Nas Ephemerides até agora publicadas tem-se feito a redução necessaria de todos os calculos para corresponderem ao meio-dia verdadeiro, por ser mais usual, e se haver immediatamente pelas observações. Mas nos intervallos ficão sem a exactidão que convem nas partes proporcionais, porque tambem as horas do tempo verdadeiro não são iguais. Nestas porém tudo vai correspondente ao tempo medio, pelo qual se regulaõ as pendulas nos Observatorios fixos, e se deverião regular todos os relógios do uso civil, sendo mui facil de acertar por meio das observações, como adiante se mostrará.

3. He tambem de advertir, que o tempo medio não pode referir-se ao ponto do Equinocio apparente, que retrocede com desigualdade, ainda que pequena, mas deve referir-se ao Equinocio medio. E por isso todos os lugares dos astros calculados nestas Ephemerides são contados desde o mesmo Equinocio medio, e quando for necessario, podem reduzir-se ao

apparente por meio da Equação respectiva, de que adiante se tratará. Em muitos outros artigos seguimos hum plano differente do que até agora se tem adoptado nas outras Ephemerides, como se verá na exposição de cada hum delles.

*Pagina I de cada mez.*

4. Nesta pagina se achará para cada dia ao meio-dia medio a Longitude, Ascensão Recta, e Declinação do Sol, com a Equação do tempo; e no fundo della, de seis em seis dias, os seus movimentos horarios, semi-diametro, tempo da passagem delle pelo meridiano, parallaxe horizontal, e a sua distancia, tomada a media como unidade: tudo calculado pelas nossas Taboas Astronomicas publicadas em 1813. E nas Longitudes, deixada a antiga denominação dos Signos, contaõ-se os grãos seguidamente até 360, como sempre se costumou nas Ascensões Rectas; e em vez de segundos, tomaõ-se as centessimas de minuto, que representaõ mais exactamente os resultados do calculo, e facilitaõ muito as operações das partes proporcionais, que frequentissimamente se devem fazer.

5. Quer-se, por exemplo, saber a Longitude do Sol no primeiro de Janeiro (1804) ás 13<sup>h</sup> 5' 42". Reduzaõ-se primeiramente os minutos e segundos a partes decimais da hora: advertindo, que a sexta parte dos segundos os converte em decimais de minuto, e a sexta parte dos minutos com esse appendice converte tudo em decimais de hora; e reciprocamente, que o sextuplo das partes decimais da hora converte em minutos o que corresponde á casa das decimas, e o sextuplo da dizima que ficar aos minutos converte em segundos o que corresponder á casa das decimas. Assim 5' 42" he o mesmo que 5<sup>h</sup>.7, e 5<sup>h</sup>.7 o mesmo que 0<sup>h</sup>.095. Multiplicando entãõ o tempo reduzido 13<sup>h</sup>.095 pelo movimento horario em Longitude 2',548, e ajuntando o producto 33',366 á Longitude do meio-dia 279° 58',34. será a Longitude procurada 280° 31',706.

6. Reciprocamente: se houvessemos de procurar a que tempo no primeiro de Janeiro (1804) teve o Sol a Longitude 280° 31',706, deveriamos tomar a differença entre ella e a do meio-dia antecedente 33',366, e dividilla pelo movimento horario 2',548, e o quociente 13<sup>h</sup>.095 ou 13<sup>h</sup> 5' 42" daria o tempo procurado. Mas por meio da Tab. I. auxiliar (Vol. I.) pode achar-se mais facilmente o mesmo por huma multiplicação, desta maneira. Com o movimento horario 2',548 multiplicado por 10, isto he, com 25',48 se acha na dita Tab. pag. 123 o factor correspondente 2,36479 ou mais simplesmente 2,3548, o qual tambem se multiplica por 10, e fica 23,548 para ser por elle multiplicada a differença 33',366, e o producto dá em minutos o tempo procurado 785',7 que se reduz a 13<sup>h</sup> 5' 42".

7. Em vez da dita Tab. I. do Vol. I. damos no fim deste huma mais abbreviada, e mais cômoda, a qual se ajuntará a todos os Volumes seguintes. Nella se acharão os factores correspondentes aos numeros *A*. de 25',4 até 43',1 com as suas differenças; e com cada huma destas na ultima parte da Taboa se achará a parte proporcional ás centesimas de minuto, e bem assim ás millesimas, decimas millesimas etc. cortando huma, duas, etc. letras para a direita no numero achado. Por exemplo: Querendo o factor corres-

pondente a  $28^{\circ}357$  achamos  $2,1201$  para  $28^{\circ}3$  com a differença  $74$ , e com esta para os algarismos seguintes  $57$  as partes proporcionais  $57 \dots 5,2$  cuja soma  $42$  tirada de  $2,1201$  dá o factor procurado  $2,1199$ . E se o numero  $A$  for menor que  $25^{\circ}4$  ou maior que  $43^{\circ}1$  entra-se na Tab. com o seu dobro, triplo, etc. ou com ametade, terço, etc. e do factor achado toma-se semelhantemente, o dobro, triplo, etc. ou ametade, terço, etc.

8. Estas multiplicações de numeros que envolvem partes decimaes, fazem-se mais abbreviadamente, escrevendo o multiplicador debaixo do multiplicando inversamente da direita para a esquerda, e ficando a casa das unidades delle debaixo da casa decimal do multiplicando immediatamente seguinte á que se quer exacta no producto. Então cada algarismo do multiplicador começa a multiplicar-se pelo do multiplicando que está em cima delle, tendo sempre attenção ao que lhe viria da multiplicação pelo algarismo que lhe fica á direita, e esse augmentado de huma unidade se o seguinte for maior que  $5$ ; e todos estes productos parciais se assentão de sorte que os primeiros algarismos delles á direita fiquem na mesma columna. Deste modo as duas multiplicações antecedentes de  $13^{\circ}095$  por  $2^{\circ}548$ , e de  $33^{\circ}366$  por  $23^{\circ}548$ , querendo as centesimas exactas, e ainda as millesimas quasi exactas, se praticaõ da maneira seguinte

$13,095$	$33,3660$
$845.2$	$845.32$
$26190$	$667320$
$6547$	$100098$
$524$	$16683$
$105$	$1355$
$33,366$	$267$
	$785,703$

9. Do mesmo modo se tomaõ as partes proporcionais pelo que respeita á Ascensão Recta, e á Declinação, a qual sendo austral he marcada com o sinal  $-$ , e sendo boreal com o sinal  $+$ , assim como as de todos os outros Planetas: advertindo porém, que a parte proporcional della ajunta-se á Declinação antecedente quando ellas vão crescendo, e tira-se quando vão diminuindo, quer sejaõ boreais, quer austrais. Mas na passagem de huma denominação para a outra, se a parte proporcional for maior que a Declinação antecedente, então tira-se esta daquella, e o resto he a Declinação procurada, e com a denominação seguinte.

10. Por exemplo: Em 20 de Março (1804) ao meio-dia he a Declinação  $0^{\circ}6'72$  austral, a qual vai diminuindo, e o movimento horario he  $0^{\circ}987$ . Se a quizermos para as  $4^h$ , será a parte proporcional  $3'95$  e diminuida da Declinação antecedente dará a Declinação procurada  $0^{\circ}2'77$  ainda austral. Mas se a quizermos saber para as  $14^h$ , acharemos a parte proporcional  $13'82$  maior do que a Declinação antecedente  $0^{\circ}6'72$ , e tirando esta daquella, o resto  $0^{\circ}7'10$  será a Declinação procurada, e já boreal.

11. Para quem se achar em qualquer outro meridiano, e a qualquer hora delle quizer saber a Longitude do Sol etc., he necessario que saiba a hora que então he em Coimbra, e para essa fará o calculo na fórma sobre-

dita. A hora de Coimbra se saberá pela differença da Longitude Geographica dos dous meridianos contada seguidamente para Oriente ou para Occidente conforme a parte por onde se chegou ao dito meridiano, e incluindo na conta  $360^\circ$  se na viagem progressiva se tornou a passar pelo de Coimbra. Essa differença convertida em tempo se tira ou junta á hora do lugar, conforme se tiver ido pela parte Oriental, ou pela Occidental; e o resto, ou soma será o dia e hora de Coimbra nesse instante.

12. Se hum navegante, por exemplo, se achar por  $25^\circ 45'$  para Oriente de Coimbra, tendo navegado para Oriente, e tornado a passar pelo mesmo meridiano de Coimbra, e se pela sua conta se achar a 10 de Janeiro ás 10 horas e 20', será a sua differença de Longitude para Oriente  $385^\circ 45'$ , e era tempo  $25^\circ 35'$ , a qual subtrahida do tempo por elle contado no dito lugar dará 9 de Janeiro  $8^\circ 45'$  tempo de Coimbra no mesmo instante. Porém se chegasse ao mesmo meridiano de  $25^\circ 45'$  para Oriente de Coimbra, tendo navegado pela parte Occidental, e pela sua conta estivesse tambem a 10 de Janeiro ás 10 horas e 20', então a differença de Longitude deveria ser contada pela mesma parte Occidental, o seria  $336^\circ 15'$ , ou  $22^\circ 25'$  em tempo, a qual junta ao tempo do lugar 10 de Janeiro  $10^\circ 20'$  daria o tempo correspondente no meridiano de Coimbra 11 de Janeiro  $8^\circ 45'$ .

13. E daqui se entenderá, que a respeito dos Lugares fixos da Terra não se deve attendêr á sua situação no Hemispherio Oriental ou Occidental, segando as differenças das Longitudes contadas até  $180^\circ$  para huma e outra parte, mas ao rumo por onde nos comunicamos com os ditos Lugares. Na nova Zelanda, por exemplo, o Cabo do Norte fica  $179^\circ$  para Occidente de Coimbra, e o Cabo do Sul  $175^\circ 33'$  para Oriente. Sendo porém a nossa comunicação para aquelles pontos do Globo pela parte Oriental, a Longitude do Cabo do Norte não deve tomar-se de  $179^\circ$  para Occidente, mas de  $181^\circ$  para Oriente: E pelo contrario, se o caminho fosse pela banda do Occidente, a Longitude do Cabo do Sul não deveria tomar-se de  $175^\circ 35'$  para Oriente, mas de  $184^\circ 27'$  para Occidente.

14. A Equação do tempo leva o sinal — quando he subtractiva do tempo medio para ter o verdadeiro, e o sinal + quando he additiva; e o contrario será quando pelo tempo verdadeiro se quizer saber o medio. Mas então, como se acha a Equação com o mesmo tempo verdadeiro, quando devia ser com o medio ainda ignorado, não pôde tomar-se como exacta senão quando ella he muito pequena, ou muito pequena a sua variação em 24 horas. Com ella porém se achará muito approximadamente o tempo medio, e com este a Equação exacta, de que se ha de usar. Assim, por exemplo, a 20 de Janeiro (1804) ás  $9^h$  do tempo medio se acha a Equação —  $11^\circ 19', 44$ , e por consequente o tempo verdadeiro nesse instante  $8^\circ 48' 40'', 56$ . Mas se com este quizermos saber o medio correspondente, com elle acharemos a Equação approximada —  $11^\circ 19', 30$ , a qual sendo-lhe applicada com o sinal contrario dá o tempo medio  $3^h 59', 59'', 86$  proxima-mente; e com este se achará a Equação exacta —  $11^\circ 19', 44$ , que applicada do mesmo modo dará o tempo medio justamente  $9^h$ . Nos casos, em que as Differenças da Equação variaõ mais consideravelmente convém para maior exactidão que se atenda ás segundas Differenças. E assim no caso do exemplo em vez de —  $11^\circ 19', 44$  achariamos mais exactamente —  $11^\circ 19', 53$ .

## Pagina II.

15. Na pagina segunda de cada mez se acha a Ascensão Recta do meridiano para cada dia ao meio-dia medio, que he ( como se sabe ) igual á Long. med. do ☉, e marca o ponto do Equador, que nesse instante passa pelo meridiano, contado do Equinocio medio em tempo, e em grãos. E no fundo della se uchaõ as partes proporcionais da dita Ascensão Recta em tempo, as quais servirão tambem para a Ascensão Recta em grãos, mudando-se nellas os minutos em grãos, os segundos em minutos, e tomando de tudo a quarta parte.

16. Para saber pois a Ascensão Recta do meridiano ao meio-dia medio de qualquer outro lugar, buscar-se-ha a parte proporcional correspondente á differença de Longitude em tempo: a qual será additiva á Ascensão Recta de Coimbra, se o lugar ficar para Occidente; e subtractiva, se ficar para Oriente; na fórma acima declarada ( n. 13. ). Em Macão, por exemplo, que fica 122° para Oriente de Coimbra, e 8<sup>h</sup> 8' em tempo, acharemos que a 8<sup>h</sup> compete a parte proporcional 1' 18",85, e porque a de 10', he 1",54 e consequentemente 0",164 a de 1', para 8' teremos 1",31. Donde será a parte proporcional correspondente a Macão 1' 20",16, a qual sendo subtrahida da Ascensão Recta de Coimbra em tempo para qualquer dia, ficará a que compete ao meridiano de Macão nesse mesmo dia ao meio-dia medio. E mudando essa parte proporcional 1' 20",16 em 1° 20',16, a quarta parte 20',04 será o que deve constantemente subtrahir-se da Ascensão Recta de Coimbra em grãos, para ter a daquelle Lugar.

17. Sabendo por tanto a Ascensão Recta do meridiano ao meio-dia medio em Coimbra immediatamente pela Ephemeride, e em qualquer outro Lugar por meio da redução antecedente, facilmente se achará a que corresponde a qualquer outro tempo desse dia, ajuntando-lhe o mesmo tempo com a parte proporcional, que lhe corresponder. Assim, por exemplo, no primeiro de Janeiro (1804) sendo em Coimbra a Ascensão Recta do meridiano 18<sup>h</sup> 39' 50",40 ao meio-dia medio, ás 14<sup>h</sup> 40' 12" será 18<sup>h</sup> 39' 50",40 + 14<sup>h</sup> 40' 12" + 2' 17",99 + 6",57 + 0",03 = 9<sup>h</sup> 22' 26",99, e em grãos 140° 36',75.

18. Na Questão inversa, quando se procura o tempo correspondente a huma Ascensão Recta dada, della aumentada de 24<sup>h</sup>, se for necessario, se tira a do meio-dia antecedente, e o resto he proximoamente o tempo procurado, e maior do que convem. Delle se tira a parte proporcional competente ás horas, do resto a que lhe compete aos minutos, e desse resto a que lhe competir aos segundos, e teremos por ultimo resto o tempo procurado. Assim, no mesmo exemplo antecedente, querendo saber o tempo em que a Ascensão Recta do meridiano ha de ser 9<sup>h</sup> 22' 26",99, della ( aumentada neste caso de 24<sup>h</sup> ) tiraremos a do meio-dia antecedente 18<sup>h</sup> 39' 50",40, e teremos o resto 14<sup>h</sup> 42' 36",59, do qual tirando 2' 17",99 parte proporcional ás 14<sup>h</sup> fica o resto 14<sup>h</sup> 40' 18",60, e deste tirando mais 6",57 parte proporcional aos 40' fica o resto 14<sup>h</sup> 40' 12",03, do qual em fim tirando 0",03 parte proporcional aos 12" fica o tempo procurado 14<sup>h</sup> 40' 12",00.

19. Como a passagem de huma estrella pelo meridiano he quando a Ascensãõ Recta della coincide com a do mesmo meridiano, o tempo dessa passagem se calculará buscando o tempo, em que a Ascensãõ Recta do meridiano ha de ser igual á da estrella. E assim no primeiro de Janeiro a estrella que tivesse  $9^{\text{h}} 22' 26''$ ,99 da Ascensãõ Recta passaria pelo meridiano ás  $14^{\text{h}} 40' 12''$ , conformemente ao que se achou pelo calculo antecedente: advertindo sempre, que quando se quizer grande exactidãõ deve a Ascensãõ Recta da estrella corrigir-se do effeito da aberraçãõ, não porém da nutaçãõ, porque deve ser contada do Equinocio medio, assim como se conta a do meridiano.

20. A passagem dos Planetas he da mesma maneira quando a sua Ascensãõ Recta se ajusta com a do meridiano; mas como a delles varia do meio-dia a meio-dia, he necessario que se attenda á variaçãõ correspondente ao mesmo tempo que se procura. Da Ascensãõ Recta do Planeta em tempo ao meio-dia tira-se a do meridiano, e procedendo do modo sobredito se acha proximamente o tempo da passagem, ao qual se ajuntará a parte proporcional da variaçãõ horaria em tempo, que lhe corresponder, e se tirará quando o Planeta for retrogrado.

21. Querendo, por exemplo, saber o tempo medio da passagem do Sol pelo meridiano em 20 de Janeiro (1804), da Ascensãõ Recta delle ao meio-dia medio  $301^{\circ} 29',45$  reduzida a tempo  $20^{\text{h}} 5' 57''$ ,80 tira-se a do meridiano  $19^{\text{h}} 54' 45''$ ,00, e do resto  $0^{\text{h}} 11' 12''$ ,80 tira-se a parte proporcional da Ascensãõ Recta do meridiano que lhe corresponde  $1',84$ , e fica  $0^{\text{h}} 11' 10''$ ,96, que seria o tempo da passagem, se o Sol entre tanto não mudasse de Ascensãõ Recta. Como porém tem a variaçãõ de  $2',652$  e em tempo de  $10',61$  por hora, a parte proporcional que dahi resulta he  $1'',98$ , que ajuntando-se ao tempo achado dá exactamente o da passagem a  $0^{\text{h}} 11' 12''$ ,94.

22. No exemplo antecedente calculamos a passagem do Sol pelo methodo cõmmun a todos os Planetas, exceptuando a Lua que requer outra consideraçãõ em rasoã da variaçãõ dos movimentos horarios, de que adiante se tratará. Mas a passagem do Sol mais abbreviadamente se achará applicando ao meio-dia medio com o sinal contrario a Equaçãõ do tempo, e essa correctã com a parte que lhe competir da sua variaçãõ em 24 horas, que vem a ser o mesmo que achar o tempo medio ao meio-dia verdadeiro (n. 14). Assim, no mesmo exemplo, a Equaçãõ do tempo ao meio-dia medio he  $- 11' 12''$ ,8, e a parte proporcional, que lhe compete a rasoã de  $17'',7$  por 24 horas, he  $0'',14$ , e conseguintemente o tempo da passagem  $0^{\text{h}} 11' 12''$ ,94.

23. Para se ajustar por tanto huma pendula ao tempo medio, he necessario que observado o meio-dio verdadeiro ou por alturas correspondentes, ou pelo Instrumento das passagens, ou pela meridiana filar, mostre o que nesse dia compete ao instante do dito meio-dia. E se o não mostrar justamente, nota-se a differença; e essa comparada com a do dia seguinte mostrará qual hãveria de ser em qualquer instante intermedio, e conseguintemente o tempo medio de huma observaçãõ, que entãõ se fizesse.

24. Pelo que respeita porém a pendula regulada pelo tempo sideral, he sabido que deve mostrar  $0^{\text{h}}$  no instante da passagem do Equinocio medio pelo meridiano. E isso terá lugar sempre que ella mostrar constan-

temente a Ascensão Recta de qualquer estrella bem conhecida na sua passagem pelo meridiano, e em cada dia a Ascensão Recta do Sol, ou a do meridiano correspondente ao instante do meio-dia verdadeiro. E havendo alguma differença compara-se com a da passagem seguinte ou da estrella, ou do Sol, e se conhecerá a differença correspondente a qualquer instante do intervalo, e consequentemente o tempo sideral, ou a Ascensão Recta de qualquer astro que então passasse pelo meridiano. E do mesmo modo notadas as differenças em dous meios-dias consecutivos a respeito do tempo medio que lhes correspondia, ou do  $0^h$  do tempo verdadeiro, será conhecido qualquer destes para o instante intermedio, em que se tenha feito qualquer observação, e marcado o tempo della pela dita pendula.

25. O tempo da passagem de hum astro por qualquer circulo horario, assim como o da passagem pelo meridiano, reduz-se tambem a achar-se o tempo medio correspondente a huma Ascensão Recta do meridiano conhecida, só com a differença de não ser essa simplesmente a do astro, mas a do astro-aumentada ou diminuida do angulo horario, conforme ficar este para Occidente, ou para Oriente do meridiano, e tendo tambem attenção á variaçãõ da Ascensão Recta pelo que respeita aos Planetas (n. 20.).

26. Por exemplo: Tendo no primeiro de Janeiro observado para Occidente a altura de Sirio, e por ella juntamente com a sua Declinação, e com a Latitude do Lugar, achado o angulo horario  $62^{\circ} 47' 5$ , reduziillo-hemos a tempo a razão de  $15^{\circ}$  por hora, e dará  $4^h 11' 10''$ , o qual junto á Ascensão Recta da estrella em tempo  $6^h 36' 32''$  dará a Ascensão Recta do meridiano no instante da observação  $10^h 47' 42''$ . E se esse meridiano do Lugar da observação estiver para Occidente de Coimbra  $23^{\circ} 22'$ , ou  $1^h 55' 28''$  será a Ascensão Recta delle ao meio-dia medio  $18^h 40' 5' 76$  (n. 16.), a qual sendo tirada da que se achou para o instante da observação, fica o resto  $16^h 7' 36'', 24$  do qual tirando successivamente as partes proporcionais ás horas, minutos, e segundos (n. 18.) acharemos o tempo medio procurado  $16^h 4' 57'', 29$ . Este methodo he mais simples do que o vulgarmente usado por meio da passagem da estrella pelo meridiano, porque só essa requer hum calculo tal como o antecedente, e depois o angulo horario não se hade reduzir a tempo a razão de  $15^{\circ}$  por hora, mas de  $15^{\circ}$  por  $0^h 59', 836$ , que he reduçãõ mais trabalhosa.

27. Em quanto ao Sol: O seu angulo horario em tempo, a razão de  $15^{\circ}$  por hora, sendo para Occidente, dá immediatamente o tempo verdadeiro no Lugar da observação; e sendo para Oriente, tira-se de  $24^h$ , e o resto he o tempo contado astronomicamente desde o meio-dia antecedente. Com elle, e com a differença dos meridianos se saberá o que então se contava no meridiano de Coimbra, e consequentemente a Equação para se reduzir ao medio (n. 11. 14.).

28. Da mesma maneira se achará o tempo do Nascimento e Occaso dos astros, tendo advertido que nesse caso não he necessaria observação para saber o angulo horario, porque he o mesmo que o seu arco semi-diurno, unicamente dependente da Declinação dos mesmos astros, e da Latitude do Lugar. O arco semi-diurno se achará pela Taboa das differenças ascensionais (Vol. II. pag. 134, e 197.).

29. Na mesma pagina segunda se apontão os phenomenos, e as observações mais importantes de cada mez. Tais são as conjunções da  $\odot$  e dos

Planetas com as estrellas, e de hans com os outros. E estas conjunções se entenderão sempre em Ascensão Recta, porque essas, assim como as diferenças de Declinação, são as que immediatamente se observão. Primeiramente se poem o tempo da  $\zeta$ , depois o sinal do astro que relativamente se move a respeito do outro que se lhe poem adiante, e por fim a differença verdadeira das Declinações no instante da mesma  $\zeta$ , marcada com o sinal + quando o primeiro astro passa ao Norte, e com — quando ao Sul do segundo. Assim em 8 de Janeiro (1804)  $7^h 12', 2$  do tempo medio de Coimbra  $\zeta \pi 11$  +  $26', 1$  quer dizer, que nesse tempo se achará a Lua em conjunção da Ascensão Recta com a estrella  $\pi$  de Scorpio, e  $26', 1$  para o Norte della, sem attende aos effeitos opticos da parallaxe.

30. E vão notadas todas as que em rasoã dos ditos effeitos da parallaxe podem ser eclipticas em alguma parte da Terra, de cujo calculo se tratou no Vol. I. pag. 250. Mas as que haõ de ter lugar em Coimbra, e com pouca differença em todo o Reino de Portugal, vão já calculadas, apontando-se os tempos da Immersão e da Emersão, e marcando-se os pontos da circumferencia da Lua por onde ha de entrar e sair a estrella contados em grãos desde o ponto mais alto da Lua para Oriente quando tiverem o sinal +, e para Occidente quando tiverem —. Além disso se marca tambem a differença das Declinações apparentes nesses mesmos pontos com o sinal + entrando ou sahindo a estrella para o Norte do centro da Lua, e — para o Sul. Por qualquer destes meios, ou por ambos, se fará juizo do ponto da Lua onde se deve esperar a sahida da estrella, porque sem isso só por acaso se pode fazer bem a observação. Quem usar de hum telescópio montado parallelamente, e bem verificado, não carece dos ditos meios, porque pondo a estrella na entrada perto do fio parallello ao Equador na mesma proximidade delle observará a sahida, visto que ella não muda de Declinação. Nos Eclipses do Sol o principio he o que não pode ser bem observado sem se saber o ponto da circumferencia delle onde se hade esperar o contacto, e a primeira impressão sensivel da interposição optica do distico da Lua; e esse sómente pode conhecer-se pelo primeiro dos meios sobreditos, o qual sempre se notará nos eclipses visiveis em Coimbra. E marcaremos tambem com o sinal ? todos os eclipses, cujo annuncio não podemos afiançar por dependerem de huma pequena quantidade que póde não ter lugar, sendo dentro dos limites a que se extendem os erros das Taboas.

31. As observações dos eclipses do Sol, e das estrellas, são da maior importancia, tanto para rectificar as Taboas da Lua, como para determinar a Longitude Geographica dos Lugares onde ellas se fizerem. E por isso ha muito de recômandar aos nossos navegantes, que aproveitem todas as occasiões de as fazerem nas ilhas, portos, enseadas, e quaesquer outros pontos do Globo, onde abordarem: para o que não precisaõ mais do que de hum Oculo achromatico de tres pés, porque elles costumão levar os Instrumentos necessarios para a determinação do tempo, na qual deve procurar-se a maior exactidão possível. Estas observações carecem de huma redução, de que se tratou no primeiro Volume pag. 236. a qual pode ser feita a todo o tempo, e aqui faremos com muito gosto a de todas as que nos forem remetidas, com as quais iremos acertando as posições dos Lugares na Taboa Cosmographica, que publicamos neste Volume, e continuaremos a publicar nos seguintes.

32. Os eclipses da Lua não carecem da sobredita redução, mas a differença dos tempos, em que se observou a mesma phase, dá immediatamente a differença dos meridianos. São porém menos exactas as determinações fundadas nestas observações, por causa da gradação successiva da penumbra, que não deixa bem distinguir o termo justo da sombra, donde vem que no mesmo Lugar diferentes Observadores julgaõ o principio, e fim destes eclipses em tempos differentes até 4 minutos, principalmente usando de telescopios de differente alcance. Não devem com tudo desprezar-se estas observações, e muito mais porque em cada eclipse se podem fazer muitas, notando os tempos, em que entraõ, e sabem da sombra as manchas, e pontos notaveis da Lua, cuja figura se achará no fim do primeiro e do undecimo Volume destas Ephemerides. A entrada de cada mancha comparada com a observada em outro Lugar dá a differença dos meridianos por essa observação, e o meio arithmetico de todas dá o resultado geral das entradas, ou immersões; e achando do mesmo modo o das emersões, o meio arithmetico delles dará a differença dos meridianos muito proxima-mente. Com exactidão porém a daria, se cada hum dos Observadores fosse constante no gráo de escuridade, que começaram a tomar por termo da sombra, porque entãõ quanto hum julgasse a immersão antes que o outro, tanto julgaria a emersão depois, e os meios arithmeticos de ambos Observadores coincidirão no mesmo instante physico.

### Pagina III.

33. Os calculos dos Planetas, que se contém nesta pagina, foraõ feitos pelas nossas Taboas publicadas em 1813. E para não ficar baldada para o publico a exactidão, com que se fizeraõ, todos os Lugares calculados não se dão sómente em minutos, mas ajuntaõ-se as decimas de minuto, de maneira que nunca levaõ a respeito do que deua o calculo differença maior que a de 0',85, ou de 3", e assim podem servir para todos os casos, em que for necessaria huma tal exactidão.

34. Os Lugares de Mercurio, que são de pouco uso por passar quasi sempre involvido nos raios do Sol, vaõ agora calculados de seis em seis dias, os de Venus e Marte de tres em tres, os de Jupiter de seis em seis, os de Saturno de dez em dez, deixando-se Urano como inutil ao nosso proposito. Mas na passagem de hum mez para outro, succede algumas vezes ser o intervallo differente, visto que não tem todos o mesmo numero de dias, e que sempre se começa no primeiro de cada hum, donde resulta que sómente na passagem de hum mez de 30 dias para o seguinte he que não se altera o andamento de nenhum dos ditos intervallos.

35. Qualquer que seja o intervallo, a differença de dous Lugares consecutivos dividida pelos dias do intervallo dá o movimento diurno, e esse multiplicado pela parte dada do intervallo reduzida a unidade do dia dá a parte proporcional correspondente additiva, ou subtractiva, conforme forem os Lugares crescendo, ou diminuindo. Por exemplo: Querendo a Ascensão Recta de Venus em 21 de Janeiro (1804) ás 10<sup>h</sup> 48', achamos na Ephemeride que a 19 he 324° 36',3 e 331° 50',7 a 25, cuja differença 7° 14',4 dividida pelo intervallo 6 dá o movimento diurno 1° 12',4, e este multipli-

cado por  $2^{\circ} 45'$  (que he a parte do intervallo correspondente ao tempo proposto) dá a parte proporcional  $2^{\circ} 57',4$  que junta neste caso á Ascensãõ do dia 19, dá a que se procura  $327^{\circ} 33',7$ .

36. No calculo antecedente suppon-se que o movimento he uniforme em cada intervallo, - como pode suppor-se quasi sempre nos usos ordinarios. Mas quando for necessario grande exactidaõ, he necessario que se attenda ás segundas differença; e isso quer os intervallos sejaõ iguais quer desiguais, se fará desta maneira: Busque-se tambem o movimento diurno do intervallo seguinte; e se esse for igual, ou quasi igual ao antecedente, será exacta ou quasi exacta a supposiçaõ da uniformidade. Não o sendo porém, tome-se a differença delle, e divida-se pela soma dos intervallos; e o quociente multiplicado pelo complemento da parte dada do intervallo (isto he, pelo que falta á dita parte para se completar o intervallo inteiro, ou pela differença entre o intervallo e a mesma parte) dará a correccãõ do primeiro movimento diurno, additiva quando elles vão diminuindo, subtractiva quando vão crescendo; e esse, assim correcto, sendo multiplicado pela parte do intervallo dará a parte proporcional, e consequentemente o Lugar que se busca. Se os dous movimentos diurnos forem para partes oppostas, hum directo e o outro retrogado, ou hum para o Norte e o outro para o Súl, a differença delles se torna em soma, a qual segue a denominaçãõ do segundo.

37. Assim no mesmo exemplo antecedente, o intervallo seguinte de 25 de Janeiro a 1 de Fevereiro he de 7 dias, o movimento diurno  $1^{\circ} 10',486$ , cuja differença a respeito do antecedente  $1^{\circ} 9',14$  dividida pela soma dos intervallos 13 dá o quociente  $0',147$ , e este multiplicado por  $3^{\circ} 55'$  (que he o complemento da parte do intervallo dada  $2^{\circ} 45'$ ) dá a correccãõ  $0',52$  additiva neste caso ao movimento diurno antecedente  $1^{\circ} 12',4$ , que ficará reduzida a  $1^{\circ} 12',92$ , e multiplicando-o pela parte do intervallo  $2^{\circ} 45'$ , teremos a parte proporcional correspondente  $2^{\circ} 58',7$ , e consequentemente a Ascensãõ Recta procurada  $327^{\circ} 33',0$ .

38. He tambem necessario recorrer ás segundas differença; quando se quizer saber o tempo das Estaçõs, maximas Elongaçõs, Latitudes, ou Declinaçõs: Nos dous intervallos consecutivos, dentro dos quais se vê que cabe o tempo procurado, buscaõ-se os movimentos diurnos, e a differença delles que se reduz a soma quando são para partes contrarias, como acima se advertio, se divide pela soma dos intervallos. Do quociente multiplicado pelo primeiro intervallo (que vem a ser ametade da dita differença, quando elles são ignais) tira-se o primeiro movimento diurno; e o resto, que semelhantemente se reduz a soma quando são para partes contrarias, dividido pelo dobro do mesmo quociente, dará o tempo que se procura contado do principio do primeiro intervallo.

39. Assim, por exemplo, vendo que Mercurio a 25 e 28 de Janeiro, e 1 de Fevereiro (1804) tem as Longitudes Geocentricas  $322^{\circ} 30',6$  . . . .  $323^{\circ} 47',1$  . . . . e  $322^{\circ} 58',4$  conhecemos que a maxima, ou o ponto da Estaçãõ, cabe em algum instante intermedio. O movimento diurno do primeiro intervallo he  $+ 25',5$ , o do segundo  $- 12',175$ , a differença delles  $- 37',675$ ; e esta dividida pela soma dos intervallos 7 dá o quociente  $- 5',382$ , o qual multiplicado pelo primeiro intervallo 3 dá o producto  $- 16',146$ , e tirando deste o primeiro movimento diurno  $+ 25',5$ , fica o

reoro —  $41^{\circ} 646$  , que dividido pelo dobro do mesmo quociente —  $10^{\circ} 764$  d  $14,869$  , ou  $3^{\text{d}} 20^{\text{h}} 51^{\text{m}} 4$  , e consequentemente a Estação no dia 28 ás 20  $51^{\text{m}} 4$  .

40. Os semidiametros dos Planetas, que algumas vezes convem saber, e que não couberão na pagina, facilmente se acharão por meio das parallaxes, porque tem com ellas huma ração constante em cada hum delles. Eis aqui os factores respectivos, pelos quais se hade multiplicar a parallaxe actual, para ter o semidiametro :

	Fact.		Fact.		Fact.
$\text{Mer}$ . . . . .	0,40	$\text{J}$ . . . . .	0,52	$\text{V}$ . . . . .	9,98
$\text{V}$ . . . . .	0,96	$\text{Z}$ . . . . .	10,86		

### Pagina IV.

41. Nesta pagina se contém as Longitudes da Lua calculadas para o meio-dia, e meia-noite de cada dia astronomico pelas nossas Taboas Astronomicas já citadas.

42. Cada Longitude calculada he seguida de dous numeros subsidiarios  $A$  , e  $B$  , que servem para se achar com exactidão a Longitude para qualquer tempo intermedio, ou reciprocamente o tempo correspondente a huma Longitude dada. O numero  $B$  refere-se á mesma unidade de minuto, a que se refere o numero  $A$  , e a virgula, que nelle separa o ultimo algarismo, não quer dizer, que o antecedente pertence á casa das unidades, mas á casa do ultimo algarismo do numero  $A$  , sendo aquelle separado com a virgula para a direita huma casa decimal de mais no dito numero  $B$  , ao qual por isso mesmo se não poz denominação das unidades no alto da sua columna. Assim no primeiro de Janeiro (1804) ao meio-dia he seguida a Longitude da Lua do numero  $A$   $31^{\circ} 488$  , e de  $B$  —  $16,7$  , que por abbreviatura quer dizer —  $0^{\circ} 0167$  .

43. O numero  $A$  he o movimento horario da Lua no instante do meio-dia, ou meia-noite, a que se ajunta, entendendo-se aqui por movimento horario não o que ella anda effectivamente na hora seguinte, mas o que havia de andar, se conservasse a mesma velocidade que tinha no dito instante. Para saber o que semelhantemente corresponde a qualquer instante intermedio, multiplica-se  $B$  pelo dobro do tempo reduzido á unidade da hora (n. G.), e o producto he a variação de  $A$  additiva, ou subtractiva, conforme  $B$  tiver o sinal +, ou o sinal —. Assim, querendo saber o movimento horario da Lua em Longitude no primeiro de Janeiro (1804) ás  $15^{\text{h}} 24^{\text{m}} 18^{\text{s}}$  , ou ás  $3^{\text{h}} 405$  depois da meia-noite, á qual corresponde  $A = 31^{\circ} 095$  , e  $B = -0^{\circ} 0148$  , multiplicaremos este pelo dobro do tempo  $6^{\text{h}} 81$  , e o producto  $0^{\circ} 101$  subtraído neste caso de  $A$  dará o movimento horario procurado  $30^{\circ} 994$  .

44. Se quizermos porém o movimento effectivo de huma hora, que no uso ordinario costuma tomar-se por movimento horario, então em vez de multiplicar  $B$  pelo dobro do tempo multiplicar-se ha pelo dobro mais ou menos huma unid. de, conforme for para a hora seguinte ou para a antecedente. E assim, no mesmo exemplo, acharíamos o movimento horario  $31^{\circ} 009$  das  $2^{\text{h}} 405$  até as  $3^{\text{h}} 405$  , e  $30^{\circ} 979$  das  $3^{\text{h}} 405$  até ás  $4^{\text{h}} 405$  , que são

propriamente os movimentos horarios correspondentes ao meio dos intervallos  $2^h,905$  e  $3^h,905$ , e tomados como correspondentes a todo o intervallo respectivo (que vem a ser o mesmo que suppor o movimento uniforme em cada hora) no mesmo meio produzem o maior erro. Assim tomando  $30^m,979$  como movimento horario ás  $3^h,405$ , dahi até ás  $3^h,905$  andaria a Lua  $15^m,4895$ , quando realmente terá andado  $15^m,4935$ ; e se supuzessemos o mesmo movimento horario constante por espaço de tres horas, das  $3^h,405$  até ás  $6^h,405$  andaria  $1^o 32^m,937$ , quando realmente não andará mais que  $1^o 32^m,849$  com a differença de  $5^s,3$  que em certos casos pode chegar ao dobro nas Longitudes, e ao quadruplo nas Ascensões Rectas.

45. A Longitude da Lua para qualquer tempo depois do meio-dia, ou da meia-noite, se achará multiplicando o tempo por  $B$ , cujo producto será a correccão de  $A$  additiva, ou subtractiva, conforme o sinal de  $B$ , e multiplicando o  $A$  correcto pelo mesmo tempo teremos o movimento correspondente da Lua, que junto á Longitude do meio-dia, ou meia-noite antecedente, dará a que se procura. Se, por exemplo, a procurarmos no primeiro de Janeiro (1804) ás  $15^h 24^m 18^s$ , ou ou as  $3^h,405$  depois da meia-noite, multiplicando este tempo por  $B$  ( $-0^m,0148$ ) o producto  $-0^m,050$  será a correccão subtractiva de  $A$  ( $31^m,095$ ) que ficará reduzido a  $31^m,045$ , o qual multiplicado pelo mesmo tempo dará o movimento correspondente  $105^m,71$  ou  $1^o 45^m,71$ , e esse junto á Longitude da meia-noite antecedente ( $158^o 25^m,44$ ) dará a que se procura  $160^o 11^m,15$ .

46. Reciprocamente: Sendo dada qualquer Longitude, acharemos o tempo, subtrahindo della a do meio-dia, ou a da meia-noite proxima antecedente, e dividindo a differença reduzida a minutos pelo numero  $A$ . O quociente será o tempo approximado, com o qual se buscará a correccão de  $A$ , e tornando a dividir por elle correcto a mesma differença teremos exactamente o tempo procurado. Assim tirando da Longitude  $160^o 11^m,15$  do mesmo exemplo a da meia-noite antecedente  $158^o 25^m,44$  temos a differença  $1^o 45^m,71$ , que reduzida a  $105^m,71$  e dividida por  $A$  ( $31^m,095$ ) dá o tempo approximado  $3^h,4$ , e este multiplicado por  $B$  ( $-0^m,0148$ ) dá a correccão  $-0^m,050$ , e consequentemente será o valor correcto de  $A$   $31^m,045$ , pelo qual tornando a dividir a mesma differença teremos exactamente o tempo procurado  $3^h,405$  depois da meia-noite, ou  $15^h 24^m 18^s$ .

47. Para evitar porém essas divisões se calculou a Tab. I. auxiliar do primeiro Volume, que as reduz a multiplicações desta maneira: Busca-se nella o factor correspondente a  $A$ , e basta que seja com duas casas decimais, e por elle se multiplica a sobredita differença reduzida á unidade do grão. O producto será o tempo proximo, e quante basta para buscar a correccão de  $A$ . Com elle correcto se busca na mesma Taboa o factor correspondente, pelo qual tornando a multiplicar, a mesma differença acharemos exactamente o tempo que se procura. Assim, no mesmo exemplo, entrando com  $A$  de  $31^m,095$  na dita Taboa (pag. 124) achamos o factor  $1,93$  que multiplicado pela differença  $1^o,7618$  dá o tempo approximado  $3^h,4$  com o qual se acha na lórma sobredita o valor correcto de  $A$   $31^m,045$ , e com este na mesma Taboa o factor  $1,9327$ , pelo qual tornando a multiplicar a mesma differença teremos o tempo exacto  $3^h,405$ . Em vez daquella Taboa pode servir a que vai no fim deste Volume, e irá no dos seguintes da maneira acima declarada (n. 7.).

48. Na mesma pagina se achará a parallaxe horizontal da Lua em cada dia ao meio-dia, e á meia-noite, donde por simples partes proporcionais se conhecerá a que compete a qualquer instante intermedio. Esta parallaxe he a que corresponde ao Equador, e carece de huma reduçãõ subtractiva para se ter a correspondente a qualquer paralelo; reduçãõ que se achará na Tab. IX. do primeiro Volume pag. 162.

### Pagina V.

49. Nesta pagina se achará a Latitude da Lua calculada semelhantemente para cada dia ao meio-dia, e á meia-noite. E cada huma he seguida dos numeros *A* e *B* para o mesmo fim que nas Longitudes, mas que carecem de especial attençãõ. As Longitudes são sempre progressivas, e por isso os numeros *A* sempre additivos, sendo sómente os numeros *B*, ora additivos, ora subtractivos. Mas as Latitudes são humas vezes para o Norte marcadas com o sinal +, outras para o Sul marcadas com o sinal -; e tanto humas como outras tem a principal parte da sua variaçãõ denotada por *A* ora para o Norte marcada tambem com o sinal +, ora para o Sul com o sinal -. Isto porém não introduz mais do que huma leve modificaçãõ nas regras, que se deoã para as Longitudes, que de outra sorte não seria necessario repetir.

50. Para achar pois o movimento horario em Latitude (entendido do mesmo modo que o da Longitude (n. 43.)) para qualquer tempo depois do meio-dia, ou da meia-noite, multiplica-se o numero *B* pelo dobro do dito tempo reduzido á unidade da hora cujo producto se marca com o mesmo sinal de *B*; e a soma delle e de *A*, quando tiverem o mesmo sinal, que será tambem o della, ou a differença, quando o tiverem differente, e com o sinal do maior, será o movimento horario para o Norte, ou para o Sul, conforme saber com o sinal +, ou com o sinal -.

51. Por exemplo: Querendo saber o movimento horario no primeiro de Janeiro (1804) ás 9<sup>h</sup> 24', ou 9<sup>h</sup> 4' achamos na Ephemeride para o meio-dia antecedente  $A = -2',729$ , e  $B = +0',0058$  (n. 42). Multiplicando este pelo dobro do tempo 18<sup>h</sup>,8 temos o producto  $+0',109$ , e a differença entre elle e *A* com o sinal do maior he o movimento horario  $-2',620$ , e para o Sul. Do mesmo modo querendo-o saber no dia 10 do mesmo mez ás 17<sup>h</sup> 54', isto he, ás 5<sup>h</sup>,9 depois da meia-noite, para a qual se acha na Ephemeride  $A = +1',979$ , e  $B = +0',0104$ , o producto deste multiplicado pelo dobro do tempo 11<sup>h</sup>,8 será  $+0',125$ , e a soma delle com *A* será o movimento horario procurado  $+2',102$ , que pelo sinal se conhece ser para o Norte; e isso mesmo se conhece pela simples inspecçãõ da Latitude, porque sendo austral, e diminuindo, mostra que a Lua caminha para o Norte.

52. Quando se quizer o movimento effectivo de huma hora, em vez de multiplicar-se *B* pelo dobro do tempo, multiplicar-se-ha pelo dobro augmentado ou diminuido de huma unidade, conforme se tratar da hora seguinte ou da antecedente ao tempo dado; e tudo o mais como na regra, e nos exemplos antecedentes. Veja-se porém o que fica advertido (n. 44.) a respeito do erro que se commette, quando se toma por movimento horario o movi-

mento effectivo de huma hora, não sendo elle uniforme, mas accelerado, ou retardado.

53. Para se achar a Latitude da Lua a qualquer tempo depois do meio-dia, ou da meia-noite, multiplica-se  $B$  pelo tempo, e a soma do producto e de  $A$  (que se torna em differença quando forem de differentes sinais, e leva o do maior) multiplicada outra vez pelo mesmo tempo dará outro producto, cuja soma com a Latitude do meio-dia ou da meia-noite antecedente (que tambem se mudará em differença quando forem de diferente sinal, e levará o do termo maior) será a Latitude procurada, boreal, ou austral, conforme subir com o sinal + ou com o sinal —.

54. Exemplo: Se quizermos saber a Latitude da Lua em 6 de Janeiro (1804) ás 19<sup>h</sup> 56', isto he, ás 7<sup>h</sup>,6 depois da meia-noite, para a qual se acha na Ephemeride a Latitude — 5° 11',28, o numero  $A$  — 0',280, e  $B$  + 0',0117, multiplicando este pelo tempo teremos o producto + 0',089, cuja soma com  $A$  será — 0',191, a qual multiplicada outra vez pelo tempo dará o producto — 1',45, cuja soma com a Latitude da meia-noite antecedente será a Latitude procurada — 5° 12',73. Do mesmo modo, se a quizermos no dia 14 ás 10<sup>h</sup>, 24', ou 10<sup>h</sup>,4, sendo a do meio-dia antecedente — 0° 3',20, o numero  $A$  + 3',113, e  $B$  + 0',0006, a multiplicação deste pelo tempo dará + 0',006, cuja soma com  $A$  será + 3',119, e essa multiplicada outra vez pelo tempo dará + 32',44, cuja soma (que neste caso se reduz a differença) com a Latitude do meio-dia antecedente será a Latitude procurada + 0° 29',24, que pelo sinal se conhece ser boreal.

55. Nas duas ultimas columnas da mesma pagina se achará o semidiametro horizontal da Lua calculado para cada dia ao meio-dia, e á meia-noite. O semidiametro horizontal não carece, como carece a parallaxe, de redução alguma em razão da ellipticidade da Terra, mas he em qualquer Lugar ao mesmo que em Coimbra ás horas que no seu meridiano correspondem ao tempo dado do mesmo Lugar. Em toda a parte porém carece de huma redução additiva em razão da altura sobre o horizonte, que a chega para mais perto do Observador, assim como a todos os astros; mas a differença he sómente sensivel na Lua pela sua grande proximidade da Terra: e o dito aumento se achará calculado na Tab. XI. do primeiro Volume pag. 162.

### Paginas VI, e VII.

56. Nestas duas paginas se contém as Ascensões Rectas, e as Declinações da Lua calculadas para cada dia ao meio-dia, e á meia-noite acompanhadas dos seus respectivos numeros subsidiarios  $A$ , e  $B$ , cujo uso he sem differença alguma o mesmo que fica explicado para as Longitudes e Latitudes.

57. Na ultima columna da pagina VI. vai a passagem da Lua pelo meridiano de Coimbra, e defronte nas duas ultimas columnas da pagina VII. vão os seus numeros subsidiarios  $A$ , e  $B$ , que servem para se achar a passagem por qualquer outro meridiano conhecido. He facil de ver que, a respeito do instante physico da passagem da Lua pelo meridiano de Coimbra

em qualquer dia; he anterior o da passagem pelos meridianos que ficão para Oriente, até que dada a volta inteira se virá ao da passagem pelo de Coimbra no dia antecedente; e pelo contrario, que he posterior o da passagem pelos meridianos successivos para Occidente, até que acabado o gyro por essa parte se virá ao da passagem pelo de Coimbra no dia seguinte. He tambem claro que, a respeito da passagem da Lua pelo meridiano de Coimbra em qualquer dia, he indifferente buscar a anterior, ou a posterior por qualquer outro meridiano, com tanto que se não erre o dia que nelle então se conta. E como esse depende da parte Oriental ou Occidental, por onde chegamos ao dito meridiano (n. 12. e 13.), para evitar confusão buscaremos sempre a passagem anterior nos Lugares que nos ficão para Oriente nesse sentido, e a posterior nos que ficão para Occidente.

58. Toda a differença do calculo nestes dous casos está na correccão do numero  $A$ , a qual deverá applicar-se com o proprio sinal de  $B$  na passagem posterior, e com o contrario na anterior. Por exemplo: no dia 11 de Janeiro (1804), em que a passagem da Lua pelo meridiano de Coimbra he ás  $23^h 50',6$  com os seus numeros  $A$  ( $2',281$ ), e  $B$  ( $-0',0014$ ), se quizermos saber a passagem anterior pelo meridiano de Macão, que fica para Oriente  $8^h 153$ , multiplicaremos por esta differença dos meridianos o numero  $B$ , e applicando o producto  $-0',011$  com o sinal contrario ao numero  $A$ , ficará reduzido a  $2',292$ ; e este multiplicado pela mesma differença dos meridianos dará  $18',64$ , que neste caso se haõ de subtrahir da passagem pelo meridiano de Coimbra  $23^h 50',6$  para ter a de Macão ás  $23^h 31',96$  sendo então em Coimbra  $15^h 23',96$ . Para o meridiano porém outro tanto para Occidente de Coimbra buscaríamos a passagem posterior, e applicando a correccão  $-0',011$  com o seu proprio sinal ao numero  $A$ , ficaria este reduzido a  $2',270$ , e multiplicado pela mesma differença dos meridianos daria  $18',46$  additivos neste caso ao tempo da passagem em Coimbra ( $23^h 50',6$ ) para ter a do meridiano supposto ás  $0^h 9',06$  do dia 12, sendo então em Coimbra  $8^h 17',06$  do mesmo dia.

59. Sendo conhecido o tempo da passagem da Lua pelo meridiano de qualquer Lugar, facilmente se achará o do Nascimento antecedente e do Occaso seguinte. Primeiramente: Se for em outro meridiano, começaremos pela reduccão de  $A$  ao tempo da passagem, que se achará multiplicando  $B$  pelo dobro da differença dos meridianos, e applicando-a com o seu sinal quando o meridiano for para Occidente, e com o contrario quando for para Oriente. Depois com a Declinação da Lua no tempo da passagem, e com a Latitude do Lugar buscaremos o arco semi-diurno (Vol. II. pag. 154, e 197.), ao qual sjuntaremos o producto delle mesmo pelo numero  $A$ , e assim augmentado o tiraremos, e sjuntaremos ao tempo da passagem, para termos os do Nascimento e Occaso approximados quanto basta para se buscar a Declinação competente a cada hua delles, e com ella o seu arco semi-diurno. Este primeiramente se multiplica por  $B$ , para ter a correccão de  $A$ , e depois por  $A$  correcto, para ter a do mesmo arco semi-diurno sempre additiva, o qual assim augmentado se tira, ou sjunta ao tempo da passagem conforme for o correspondente ao Nascimento, ou ao Occaso; advertindo tambem, que a correccão de  $A$  he com o proprio sinal de  $B$  para o Occaso, e com o contrario para o Nascimento.

60. Em 19 de Janeiro (1804); por exemplo, passa a Lua pelo meri-

diano de Coimbra ás 5<sup>h</sup> 59<sup>m</sup> com a Declinação boreal 14° 54', á qual corresponde o angulo horario 6<sup>h</sup> 52', que multiplicado por  $A$  (2',148) dá o aumento delle 15', e ficará reduzido a 7<sup>h</sup> 7', o qual subtrahido do tempo da passagem dá o Nascimento da Lua no dia 18 ás 22<sup>h</sup> 32', e ajuntando dá o Occaso no mesmo dia 19 ás 12<sup>h</sup> 46'. Para estes tempos approximados achamos as Declinações 13° 13' e 16° 32', ás quaes correspondem os angulos horarios 6<sup>h</sup> 45',8 e 6<sup>h</sup> 58',1, que darão as correções respectivas de  $A - 0',020$  e  $+ 0',021$ , o qual ficará sendo 2',128 e 2',169, donde teremos as dos mesmos angulos horarios, que se reduzirão a 7<sup>h</sup> 0',2 e 7<sup>h</sup> 13',2, e darão o Nascimento no dia 18 ás 22<sup>h</sup> 38',8, e o Occaso no mesmo dia 19 ás 12<sup>h</sup> 52',2. Em razão do excesso da parallaxe horizontal sobre a Refracção, a Lua nascerá sempre hum pouco mais tarde, e se porá mais cedo, do que se acha pelo calculo antecedente. Esse effeito pode tambem calcular-se, mas as desigualdades do horizonte physico fazem inutil semelhante trabalho, e até para os usos ordinarios bastará ficar nos primeiros valores approximados, maiormente quando a Lua não variar muito em Declinação.

61. A passagem pelo meridiano he de maior importancia, e algumas vezes será conveniente sabella com exactidão maior do que a que se acha na Ephemeride. Eis aqui o modo de a calcular: Tendo advertido, que a dita passagem he depois do meio-dia desde a Conjunção até á Opposição em Ascensão Recta, e depois da meia-noite desde a Opposição até á Conjunção; da Ascensão Recta do meio-dia, ou da meia-noite antecedente reduzida a tempo tiraremos a do meridiano, e o resto será o tempo approximado da passagem. Este reduzido á unidade da hora, e multiplicado por  $B$  dará a correção de  $A$ , o qual depois de correcto se reduzirá tambem a tempo, e á unidade do minuto, e delle se tirará a quantidade constante 0',1643. O complemento do resto para 60' será hum numero, com o qual na Tab. I. auxiliar do primeiro Volume acharemos o factor que multiplicado pelo tempo approximado dará o exacto que se procura. O tempo approximado na multiplicação por  $B$  basta que leve duas casas decimais, mas convém aumentallo de tantas vezes 0',03 quantas forem as horas delle.

62. Exemplo: No mesmo dia 19 de Janeiro, em que a passagem he depois do meio-dia, ao qual corresponde a Ascensão Recta 19° 52',86, reduzindo-a a tempo (1<sup>h</sup> 18' 11",44), e tirando della aumentada neste caso de 24", a do meridiano (19<sup>h</sup> 50' 48",45), teremos o tempo approximado da passagem 5<sup>h</sup> 27' 22",99, ou 5<sup>h</sup> 45639, donde acharemos o numero 5,62, que multiplicado por  $B$  (+ 0',0368) dá a correção de  $A$  (+ 0',207) que ficará sendo 33',391, do qual tomando o terço, e depois o quinto do terço teremos a sua redução a minutos de tempo 2',2261, e tirando-lhe a quantidade constante 0',1643, ficará  $A$  reduzido a 2',0618. Com o seu complemento para 60' (57',9382) acharemos pela sobredita Tab. I. o factor 1,03558, que multiplicado pelo tempo approximado 5<sup>h</sup> 45639 dá o tempo exacto 5<sup>h</sup> 65053, ou 5<sup>h</sup> 39,032. Em vez da Tab. I. do primeiro Volume pode usar-se da equivalente mais abbreviada, que no fim deste se ajunta.

63. No fundo da pagina VII. se achará a Longitude do Nodo ascendente da Lua, que he necessaria para o calculo da Nutação, e juntamente a Equação dos pontos equinoaciaes em Longitude, e Ascensão Recta, com

a qual se reduzirão do Equinocio medio ao apparente sendo applicada conforme o sinal que tiver, e com o contrario quando se houverem de reduzir do apparente ao medio. Em quanto á Longitude esta Equação he o effeito todo da Nutação; mas em quanto á Ascensão Recta, ainda he necessaria outra, de que se tratou na Explicação do Volume I. n. 94, e na do Vol. II. n. 95. No fundo tambem das tres paginas antecedentes se acharão as phases da Lua em Longitude e Ascensão Recta, a entrada della nos Signos do Zodiaco, e nos pontos notaveis da sua orbita.

### Paginas VIII, e IX.

64. Nestas duas paginas se acharão as Distancias da Lua ás estrellas, e Planetas, tanto para Oriente como para Occidente della, as quais se destinão ao Calculo das Longitudes, que cadahum fará pelo Methodo, a que estiver acostumado, ou por algum dos propostos no Volume I. (pag. 221). E por essa occasião tornaremos a recomendar o methodo das Alturas (pag. 225) independente das ditas Distancias, e que pode ser mais facil e vantajoso a muitos respeito.

65. As Distancias vão calculadas para o meio-dia e para a meia-noite do meridiano de Coimbra, tempo medio; e cada huma dellas he seguida de dous numeros *A* e *B*, cujo uso he o mesmo que se mostrou nas Longitudes, mas aqui será conveniente que torne a repetir-se.

66. A questão directa de saber a Distancia em qualquer tempo dado não carece de grande precisão no calculo, porque he sómente necessaria para se pôr a alidade do Instrumento pouco mais ou menos no grão competente; operação, que facilita a observação, e mostra tambem a estrella a quem a não conhecer. Com a hora pois do Lugar, e com a differença de Longitude estimada, se buscará o tempo, que então he em Coimbra depois do meio-dia, ou da meia-noite, pelo qual reduzido á unidade da hora se multiplicará o numero *A* sem attenção á correccão, e nelle mesmo podem desprezar-se os dous ultimos algarismos. O producto junto á Distancia do meio-dia ou da meia-noite antecedente, quando a estrella ficar para Occidente, e tirado quando ficar para Oriente será proxivamente a Distancia verdadeira ao tempo dado; a qual, sem embargo de ser differente da apparente que se hade observar, não deixará de servir para o fim proposto, porque a differença não pode ser tão grande que exceda o campo visual do Instrumento.

67. Para quem, por exemplo, estiver no primeiro de Janeiro (1804) por  $2^h 24'$  de Longitude estimada para Oeste de Coimbra, e se dispuzer a observar a Distancia da Lua a Jupiter ás  $13^h 33'$ , será o tempo de Coimbra nesse instante  $20^h 57'$ , ou  $8^h 95$  depois da meia-noite, para a qual se acha na Ephemeride a Distancia calculada  $53^\circ 53'$ , e o numero *A*  $30^h 5$ ; e este multiplicado pelo tempo  $8^h 95$  dará o producto  $275'$ , ou  $4^\circ 35'$ , que subtraído da Distancia da meia-noite  $53^\circ 53'$  dará a Distancia procurada  $49^\circ 20'$ . Do mesmo modo para quem estivesse a 15 do mesmo mez, por  $3^h 18'$  para Leste, e ás  $4^h 58'$  quizesse saber proxivamente a Distancia da Lua ao Sol, seria o tempo correspondente em Coimbra  $1^h 40'$ , ou  $1^h 67'$ , o qual multiplicado por *A* ( $51^h 9$ ) daria o producto  $55'$ , e esse junto á Distancia cal-

culada para o meio-dia antecedente ( $52^{\circ} 56'$ ) daria a Distância procurada  $33^{\circ} 49'$ .

68. Na questão inversa, quando se procurar o tempo de Coimbra correspondente a huma Distância verdadeira achada por observação he necessario que se faça o calculo com toda a exactidão. Se a distancia he para Oriente, tira-se da proximamente maior na Ephemeride, ou ella corresponde ao meio-dia, ou á meia-noite; e se he para Occidente, da Distância dada he que se hade tirar a que na Ephemeride se achar proxivamente menor. Em ambos os casos a differença se reduzirá á unidade do grão, e se multiplicará pelo factor que com o numero  $A$  se achará na Taboa I. auxiliar do primeiro Volume, ou na equivalente que vai no fim deste, e irá no dos seguintes (n. 7.), multiplicação, em que basta usar de duas casas decimais em cada hum dos factores. O producto será o tempo approximado, que multiplicado por  $B$  dará a correção de  $A$  additiva ou subtractiva conforme o sinal de  $B$ , e com  $A$  correcto se achará na mesma Taboa o factor exacto, que multiplicado pela mesma differença dará o tempo procurado.

69. Suppondo, por exemplo, que no primeiro caso acima figurado se achou pelo resultado da observação a Distância verdadeira da Lua a Jupiter no primeiro de Janeiro de  $49^{\circ} 18' 56''$  ás  $18^h 34' 15''$  do tempo medio, a proximamente maior na Ephemeride he a correspondente á meia-noite  $53^{\circ} 52' 67''$  e a differença  $4^{\circ} 34' 11''$  reduzida a  $4^{\circ},5685$ , e para esta primeira operação sómente a  $A$ , sendo multiplicada pelo factor 1,96 que na dita Taboa corresponde ao numero  $A$  ( $30^{\circ},5$ ) dará o tempo approximado  $8^h,96$ , e este multiplicado por  $B$  ( $-0^{\circ},0178$ ) dará a correção de  $A$  ( $-0^{\circ},159$ ), e consequentemente será  $A$   $30^{\circ},385$ . Com elle na mesma Taboa se achará o factor 1,97466 que multiplicado pela differença  $4^{\circ},5685$  dará o tempo  $9^h,0212$ , ou  $9^h 1' 16''$  depois da meia-noite em Coimbra, que vem a ser ás  $21^h 1' 16''$ , e a differença entre este tempo e o do Lugar da observação no mesmo instante physico, em que se suppoem coincidir a distancia calculada com a observada, dará a differença dos meridianos  $2^h 27' 1''$  para Occidente neste caso.

70. Se no outro meridiano supposto resultasse da observação a distancia verdadeira da Lua ao Sol  $33^{\circ} 48' 25''$  no dia 15 de Janeiro ás  $4^h 57' 18''$  do tempo medio, na Ephemeride se acharia a immediatamente menor  $32^{\circ} 55' 66''$  correspondente ao meio-dia do dia 15, cuja differença  $52' 59''$  reduzida a  $0^{\circ},8765$  e multiplicada por 1,88 factor correspondente a  $A$  ( $31^{\circ},9$ ) daria o tempo approximado  $1^h,65$ , o qual multiplicado por  $B$  ( $+0,0092$ ) daria a correção de  $A$  ( $+0,015$ ), e consequentemente  $A$  ( $31^{\circ},917$ ), cujo factor 1,87988 multiplicado pela differença  $0^{\circ},8765$  daria finalmente o tempo de Coimbra  $1^h,6477$ , ou  $1^h 38' 52''$  no instante da observação; e pela differença dos tempos seria conhecida a differença dos meridianos  $3^h 18' 26''$ .

### Pagina X.

71. Nesta ultima pagina de cada mez se acharão os Eclipses dos Satellites de Jupiter, calculadas pelas Taboas da terceira edição da Astronomia de Lalande para o tempo medio astronomico do Observatorio de Coimbra; tempo, que cada hum pode reduzir ao civil, e apparente (n. 1. e 14.),

quando bem lhe parecer. E em qualquer outro meridiano, a differença delle em tempo se ajuntará ao de Coimbra estando para Oriente, e se tirará estando para Occidente, para ter o tempo do eclipse nesse Lugar, cujo conhecimento he necessario a quem se quizer dispôr para a observação delle.

72. Para estas observações servem ordinariamente os Telescopios de reflexão de dous até tres pés de foco, ou os achromaticos de igual foco da ultima construcção de Dollond. E para as não perder, convém que o Observador se antecipe ao tempo achado nos eclipses do primeiro Satellite tres minutos, nos do segundo seis, nos do terceiro nove, e nos do quarto quinze. Além disso, se a Longitude do Lugar a respeito de Coimbra não for bem conhecida, quanto se julgar que nella pode haver de incerteza, outro tanto se ajuntará de anticipação a cada huma das sobreditas.

73. Estes eclipses succedem para Occidente do Planeta desde a conjunção della com o Sol até a opposição, e para Oriente desde a opposição até a conjunção. As Immersões são mais facéis de observar, e sem fadiga a vista, bastando de vez em quando olhar para o Satellite até que elle comece a perder a luz, e a parecer mais pequeno; e então he que deve fixar-se a vista sobre elle até marcar o instante da sua total desaparição, que he o que se entende por Immersão. E porque a Emerção se entende no seu principio quando apparece o primeiro ponto de luz apenas sensivel do Satellite, para observar esse instante he necessario estar com a vista continuamente applicada á espera delle; e ainda assim, se não estiver dirigida ao mesmo ponto onde ha de começar a apparecer o Satellite, ou muito perto delle, não haverá muito que ficar na observação.

74. Para gozar o Observador nessa parte, de nada serve a pagina das configurações dada em outras Ephemerides. Em vez della damos as Posições dos Satellites no tempo dos seus respectivos Eclipses calculadas de 6 em 6 dias pelas Taboas que demos no Vol. II. pag. 141, e 199. Estas Posições são determinadas por duas coordenadas, huma tomada desde o centro do Planeta parallelamente ás bandes para Oriente ou para Occidente, e outra que chamamos Latitude perpendicular á extremidade della para o Norte ou para o Sul, conforme se indica no alto das suas respectivas columnas, e ambas em partes de que o Raio do Planeta he a unidade. Assim no dia 2 de Janeiro se acha que a Immersão do I Satellite hade ser 1,69 do Raio do Planeta para Occidente do centro delle, e 0,34 para o Sul; e que a 25 será a Immersão do II 2,34, a Emerção 0,78 para Occidente, e ambas 0,63 para o Sol. E bem se vê, que no caso da Emerção a ordenada 0,78 cahe dentro do disco do Planeta, mas que a outra 0,63 perpendicular a ella vai marcar hum ponto fóra do mesmo disco onde ha de succeder a Immersão, que por isso será visivel, ainda que poderá falhar por ser quasi em contacto o Satellite com o Planeta, pelo que vai marcado com o sinal ?.

75. Com os ditos numeros pode fazer-se huma figura, que represente o lugar onde hade succeder a Immersão, ou Emerção, de que se tratar, a respeito do Planeta, tendo a attenção de pôr o Oriente e Occidente, o Norte e o Sul conformemente ao Telescopio de que se usar. Os de reflexão regularmente poem os objectos ás direitas, e para esses nos nossos Paizes Boreais fica o Oriente para a esquerda do Observador, o Occidente para a direita, o Norte para cima e o Sul para baixo; e tudo he pelo contrario nos que invertem os objectos. He verdade com tudo, que o dito lugar

sempre na practica parecerá algum tanto mais chegado ao Planeta do que na figura, assim porque a irradiação delle faz parecer o seu disco maior, como porque sempre parece menor hum espaço escuro ao pé de outro luminoso. Comparando porém a figura com a estimação visual nas Immersões facilmente se conseguirá o habito de rebaixar nella o que convier nas Emerções; mas ainda sem isso não deixará de ser muito util para segurar o bom successo nestas observações.

76. Estes eclipses são de grande importancia para a determinação da Longitude Geographica dos Lugares, onde se fizérem as observações delles: a qual, assim como nos da Lua (n. 32.) se conhece immediatamente pela differença dos tempos das mesmas observações. Ha porém semelhantemente hum limite de indeterminação, que também se compensa tomando o meio do que resultar das Immersões, e das Emerções. No primeiro Satellite em razão do seu rapido movimento he pequeno o dito limite, e a observação delle em qualquer Lugar de posição ainda desconhecida, comparada com o tempo calculado para o meridiano de Coimbra, dará sempre, sem erro maior que hum grão, a differença dos meridianos.

77. Para serem visiveis os eclipses dos Satellites em qualquer Lugar he necessario que Jupiter esteja ao menos 8<sup>o</sup> sobre o horizonte, e o Sol debaixo outro tanto. Os visiveis em Coimbra vão notados com o sinal  $\wedge$ ; e em outros Lugares facilmente se conhecerão os que lá haõ de ser visiveis por meio da Tab. VIII. do Vol. II. pag. 137, e 198.

78. A Taboa da Differença dos Meridianos da presente Edição foi rectificada pelo *Connoiss. des Temps. de 1816*, e vai enriquecida com a posição de muitos Lugares do Interior do Brazil, e alguns do Perú, tirados do Grande Mappa manuscrito, que possuímos, do habil Astronomo e Doutor *Antonio Pires da Silva Pontes Leme*, Capitaõ de Fragata, e Geographo Real, empregado na demarcação dos limites entre a America Portugueza e a Hespanhola.

79. A Taboa Cosmographica foi também retocada em varios pontos, e reformada inteiramente, quanto à Costa do Brazil, pela referida Carta do Doutor *Poues*.

# I N D E X

## DAS MATERIAS COMPREHENDIDAS NESTAS EPHEMERIDES.

E Pochas principais correspondentes ao anno de 1821. . . . .	Pag. V
Sinaes e Abbreuiaturas de que se faz uso nas Ephemerides. . . . .	VI
Eclipses do anno de 1821. . . . .	VII
Pessoas effectivamente empregadas no Calculo destas Ephemerides. . . . .	VIII
Calendario para o anno de 1821. . . . .	I
N. B. O 1.º, 2.º, 3.º e 5.º destes artigos tambem se achão para o anno de 1822, os tres primeiros nas paginas III, IV e V, e o ultimo, em pagina da mesma numeracao outra vez comecada para o dito anno.	
Catalogo das Estrellas principais reduzidas ao primeiro de Janeiro de 1810. . . . .	121
Taboa da Diferença dos Meridianos dos Lugares principais da Terra relativamente ao Observatorio da Universidade de Coimbra. . . . .	133
Taboa Cosmographica dos Portos, Cabos, Ilhas, e Lugares das Costas maritimas do Orbe Terraqueo. . . . .	151
Art. I. Costa da Noruega e Suecia até o Cabo Falsterbo com as Ilhas adjacentes. . . . .	Ibid.
Art. II. Costa Occidental do Baltico . . . . .	152
Art. III. Costa Oriental e Meridional do Baltico. . . . .	153
Art. IV. Costa Oriental e Occidental de Dinamarca. . . . .	154
Art. V. Costa d'Alemanha e Hollanda. . . . .	155
Art. VI. Costa Oriental e Meridional da Graõ Bretanha com as Ilhas adjacentes. . . . .	156
Art. VII. Costa Occidental da Graõ Bretanha. . . . .	158
Art. VIII. Costa Oriental e Occidental da Irlanda. . . . .	160
Art. IX. Costa de França . . . . .	161
Art. X. Costa d'Hespanha e Portugal até Gibraltar. . . . .	163
Art. XI. Costa Oriental d'Hespanha. . . . .	166
Art. XII. Costa Meridional de França e Occidental d'Italia com as Ilhas de Corsega, Sardenha, Sicilia, e Malta. . . . .	167
Art. XIII. Costa Oriental d'Italia, e Turquia Europea. . . . .	169
Art. XIV. Costa do Mar Negro, Natolia, e Syria. . . . .	172
Art. XV. Costa do Egypto, e Berberia. . . . .	173
Art. XVI. Costa Occidental d'Africa . . . . .	174
Art. XVII. Ilhas dispersas do Oceano Atlantico pela Ordem das Latitudes. . . . .	176
Art. XVIII. Costa Oriental d'Africa. . . . .	178
Art. XIX. Ilhas e Baixos do Mar da India por ordem das Latitudes. Ibid.	180
Art. XX. Costa do Mar Vermelho, Arabia, e Persia. . . . .	180
Art. XXI. Costa Occidental do Indostaõ, e Ilhas adjacentes. . . . .	182
Art. XXII. Costa Oriental do Indostaõ. . . . .	183

Art. XXIII.	Costa d'Arracaõ, Malaca, e Cochinchina.	184
Art. XXIV.	Ilhas da Sunda.	186
Art. XXV.	Ilhas Mollucas, e Philippinas.	189
Art. XXVI.	Nova Guiné, Nova Hollanda, e Ilhas visinhas.	193
Art. XXVII.	Ilhas dispersas do Oceano Pacifico pela ordem das Latitudes.	195
Art. XXVIII.	Costa da China, Japaõ, e Tartaria Oriental.	199
Art. XXIX.	Costa Occidental d'America Septentrional.	202
Art. XXX.	Costa do Perú, e Chili.	204
Art. XXXI.	Costa da Terra de Magalhaens e da Terra do Fogo.	206
Art. XXXII.	Costa do Brazil.	207
Art. XXXIII.	Costa da Guyana, e da Terra Firme.	210
Art. XXXIV.	Ilhas Antilhas, ou Archipelago d'America.	211
Art. XXXV.	Costa Oriental do Mexico, Luisiana, e Florida.	216
Art. XXXVI.	Costa dos Estados Unidos.	219
Art. XXXVII.	Costa d'Acadia, e Golfo de S. Lourenço.	220
Art. XXXVIII.	Costa da Terra Noya.	223
Art. XXXIX.	Costa de Lavrador, Greenlandia, e Islandia.	225
Art. XL.	Costa do Mar Glacial.	226
	Explicação das Ephemerides.	227
	Taboa dos Factores.	


Art. I.	Costa Occidental da Europa.	228
Art. II.	Costa Oriental da Europa.	229
Art. III.	Costa Occidental da Africa.	230
Art. IV.	Costa Oriental da Africa.	231
Art. V.	Costa Occidental da Asia.	232
Art. VI.	Costa Oriental da Asia.	233
Art. VII.	Costa Occidental da Oceania.	234
Art. VIII.	Costa Oriental da Oceania.	235
Art. IX.	Costa Occidental da America.	236
Art. X.	Costa Oriental da America.	237
Art. XI.	Costa Occidental da America Septentrional.	238
Art. XII.	Costa Oriental da America Septentrional.	239
Art. XIII.	Costa Occidental da America Meridional.	240
Art. XIV.	Costa Oriental da America Meridional.	241
Art. XV.	Costa Occidental da Europa.	242
Art. XVI.	Costa Oriental da Europa.	243
Art. XVII.	Costa Occidental da Africa.	244
Art. XVIII.	Costa Oriental da Africa.	245
Art. XIX.	Costa Occidental da Asia.	246
Art. XX.	Costa Oriental da Asia.	247
Art. XXI.	Costa Occidental da Oceania.	248
Art. XXII.	Costa Oriental da Oceania.	249


Factores correspondentes aos numeros A.


Partes proporcionais.


A	Fact.	D.	A	Fact.	D.	A	Fact.	D.	D.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25,4	2,2622	92	31,3	1,9169	61	37,2	1,6129	43	33	3	7	10	13	17	20	23	26	30
25,5	2,3550	92	31,4	1,9108	61	37,3	1,6086	43	34	3	7	10	14	17	20	24	27	31
25,6	2,3438	91	31,5	1,9047	60	37,4	1,6043	43	35	4	7	11	14	18	21	25	28	32
25,7	2,3347	91	31,6	1,8987	60	37,5	1,6000	43	36	4	7	11	14	18	22	25	29	32
25,8	2,3256	90	31,7	1,8927	59	37,6	1,5957	42	37	4	7	11	15	19	22	26	30	33
25,9	2,3166	89	31,8	1,8868	59	37,7	1,5915	42	38	4	8	11	15	19	23	27	30	34
26,0	2,3077	88	31,9	1,8809	59	37,8	1,5875	42	39	4	8	12	16	20	23	27	31	35
26,1	2,2989	88	32,0	1,8750	58	37,9	1,5831	42	40	4	8	12	16	20	24	28	32	36
26,2	2,2901	87	32,1	1,8692	58	38,0	1,5789	41	41	4	8	12	16	21	25	29	33	37
26,3	2,2814	87	32,2	1,8634	58	38,1	1,5748	41	42	4	8	13	17	21	25	29	34	38
26,4	2,2727	86	32,3	1,8576	57	38,2	1,5707	41	43	4	9	13	17	22	26	30	34	39
26,5	2,2641	85	32,4	1,8519	57	38,3	1,5666	41	44	4	9	13	18	22	26	31	35	40
26,6	2,2556	84	32,5	1,8462	57	38,4	1,5625	41	45	5	9	14	18	23	27	32	36	41
26,7	2,2472	84	32,6	1,8405	56	38,5	1,5584	40	46	5	9	14	18	23	28	32	37	41
26,8	2,2388	83	32,7	1,8349	56	38,6	1,5544	40	47	5	9	14	19	24	28	33	38	42
26,9	2,2305	83	32,8	1,8293	56	38,7	1,5504	40	48	5	10	14	19	24	29	34	38	43
27,0	2,2222	82	32,9	1,8237	55	38,8	1,5464	40	49	5	10	15	20	25	29	34	39	44
27,1	2,2140	81	33,0	1,8182	55	38,9	1,5424	40	50	5	10	15	20	25	30	35	40	45
27,2	2,2059	81	33,1	1,8127	55	39,0	1,5384	39	51	5	10	15	20	26	31	36	41	46
27,3	2,1978	80	33,2	1,8072	54	39,1	1,5345	39	52	5	10	16	21	26	31	36	42	47
27,4	2,1898	80	33,3	1,8018	54	39,2	1,5306	39	53	5	11	16	21	27	32	37	42	48
27,5	2,1818	79	33,4	1,7964	54	39,3	1,5267	39	54	5	11	16	22	27	32	38	43	49
27,6	2,1739	78	33,5	1,7910	53	39,4	1,5228	38	55	6	11	17	22	28	33	39	44	50
27,7	2,1661	78	33,6	1,7857	53	39,5	1,5190	38	56	6	11	17	22	28	34	39	45	50
27,8	2,1583	77	33,7	1,7804	53	39,6	1,5152	38	57	6	11	17	23	29	34	40	46	51
27,9	2,1506	77	33,8	1,7751	52	39,7	1,5114	38	58	6	12	17	23	29	35	41	47	52
28,0	2,1429	77	33,9	1,7699	52	39,8	1,5076	38	59	6	12	18	24	30	35	41	47	53
28,1	2,1352	76	34,0	1,7647	52	39,9	1,5038	38	60	6	12	18	24	30	36	42	48	54
28,2	2,1276	75	34,1	1,7595	51	40,0	1,5000	37	61	6	12	18	24	31	37	43	49	55
28,3	2,1201	74	34,2	1,7544	51	40,1	1,4963	37	62	6	12	19	25	31	37	43	50	56
28,4	2,1127	74	34,3	1,7493	51	40,2	1,4926	37	63	6	13	19	25	32	38	44	50	57
28,5	2,1053	74	34,4	1,7442	51	40,3	1,4889	37	64	6	13	19	26	32	38	45	51	58
28,6	2,0979	73	34,5	1,7391	50	40,4	1,4852	37	65	7	13	20	26	33	39	46	52	59
28,7	2,0906	73	34,6	1,7341	50	40,5	1,4815	37	66	7	13	20	26	33	40	46	53	60
28,8	2,0833	72	34,7	1,7291	50	40,6	1,4778	36	67	7	13	20	27	34	40	47	54	60
28,9	2,0761	71	34,8	1,7241	49	40,7	1,4742	36	68	7	14	20	27	34	41	48	54	61
29,0	2,0690	71	34,9	1,7192	49	40,8	1,4706	36	69	7	14	21	28	35	41	48	55	62
29,1	2,0619	71	35,0	1,7143	49	40,9	1,4670	36	70	7	14	21	28	35	42	49	56	63
29,2	2,0548	70	35,1	1,7094	49	41,0	1,4634	36	71	7	14	21	28	36	43	50	57	64
29,3	2,0478	70	35,2	1,7045	48	41,1	1,4598	35	72	7	14	22	29	36	43	50	58	65
29,4	2,0408	69	35,3	1,6997	48	41,2	1,4563	35	73	7	15	22	29	37	44	51	58	66
29,5	2,0339	69	35,4	1,6949	48	41,3	1,4528	35	74	7	15	22	30	37	44	52	59	67
29,6	2,0270	68	35,5	1,6901	47	41,4	1,4493	35	75	8	15	23	30	38	45	53	60	68
29,7	2,0202	68	35,6	1,6854	47	41,5	1,4458	35	76	8	15	23	30	38	46	54	62	69
29,8	2,0134	67	35,7	1,6807	47	41,6	1,4423	35	77	8	15	23	31	39	46	54	62	70
29,9	2,0067	67	35,8	1,6760	47	41,7	1,4388	34	78	8	16	23	31	39	47	55	63	71
30,0	2,0000	66	35,9	1,6713	46	41,8	1,4354	34	79	8	16	24	32	40	47	55	63	71
30,1	1,9934	66	36,0	1,6667	46	41,9	1,4320	34	80	8	16	24	32	40	48	56	64	72
30,2	1,9868	66	36,1	1,6621	46	42,0	1,4286	34	81	8	16	24	32	41	49	57	65	73
30,3	1,9802	65	36,2	1,6575	46	42,1	1,4252	34	82	8	16	25	33	41	49	57	66	74
30,4	1,9737	65	36,3	1,6529	45	42,2	1,4218	34	83	8	17	25	33	42	50	58	66	75
30,5	1,9672	64	36,4	1,6484	45	42,3	1,4184	33	84	8	17	25	34	42	50	59	67	76
30,6	1,9608	64	36,5	1,6439	45	42,4	1,4151	33	85	9	17	26	34	43	51	60	68	77
30,7	1,9544	63	36,6	1,6394	45	42,5	1,4118	33	86	9	17	26	34	43	52	60	69	77
30,8	1,9481	63	36,7	1,6349	45	42,6	1,4085	33	87	9	17	26	35	44	52	61	70	78
30,9	1,9418	63	36,8	1,6304	44	42,7	1,4052	33	88	9	18	26	35	44	53	62	70	79
31,0	1,9355	62	36,9	1,6260	44	42,8	1,4019	33	89	9	18	27	36	45	53	62	71	80
31,1	1,9293	62	37,0	1,6216	44	42,9	1,3986	33	90	9	18	27	36	45	54	63	72	81
31,2	1,9231	62	37,1	1,6172	43	43,0	1,3953	33	91	9	18	27	36	46	55	64	73	82
31,3	1,9169	62	37,2	1,6129	43	43,1	1,3920	33	92	9	18	28	37	46	55	64	74	83

Page	Chapter	Page	Page
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100









EPHEMER.