



3  
14  
5  
3

Casa  
Gab. 3  
Est. 14  
Tab. 5  
N.º 3

JOHANNIS HEVELII  
Prodromus Cometicus,

<sup>Quo</sup>  
HISTORIA,  
COMETÆ

ANNO 1664 EXORTI

Cursum, Faciesq; diversas Capitis ac Caudæ  
accuratè delineatas complectens;

<sup>Nec non</sup>  
DISSERTATIO,

<sup>De</sup>  
Cometarum omnium Motu, Generatione, variisquè  
Phænomenis, exhibetur.


Ad

Illustrissimum ac Excellentissimum Dominum,

DN. J. BAPT. COLBERT,

Regis Christianissimi à Sanctioribus Consiliis, Sum-  
miq; Galliarum Ærarii Moderatorem Fidelissimum, &c. &c.

DOMINUM GRATIOSISSIMUM.



Cum Privilegio Sac. Cæsar. & Regiae Pol. & Suec. Majestatum  
GEDANI

AUTORIS TYPIS, ET SUMPTIBUS,  
Imprimebat SIMON REINIGER,  
ANNO M DC LXV.

JOHANNIS HEVELII  
Protomus Cometicus

HISTORIA  
COMETAE

Anno 1664 EXORTI

Cometum Faciebat; divitias Capitis ac Caudae  
accutateq; q; genitrixes complices;


DISSESTITATIO.

Cometum omnium Monstrorum Generatio, & Universalia  
Promovens, expeditum.

Illustrissimum ac Excelsum Domum

DN. I. BAPT. COLBERT.

Regis Christissimissimi & Sangiovinis Comitis, Secr.  
mid: Gallicanum Regiam Modelatorem His estissimum, eccl. eccl.  
Dominum Gratiosissimum.



Cuius Privilegio Sec. Celsi. G. Ratis. Pa. G. Zucc. M. de J. et alii

GEDANI

AUTORIS TYPIS, ET SUMPTIBUS

Johannes Simon Reiniger.


anno 1664 ex lxx

**ILLUSTRISSIMO**

**ATQUE EXCELLENTISSIMO**

**DOMINO,**

**DN. J. BAPT. COLBERT,**  
**REGIS CHRISTIANISSIMI**  
**A SANCTIORIBUS CONSILIIS,**  
**SUMMIQUE GALLIARUM ÆRARII**  
**MODERATORI FIDELISSIMO,**  
**&c. &c.**  
**DOMINO GRATIOSISSIMO.**



*Llustriſſime ac Excellente. Dne.*

*Summa Illustriſſimæ Excellentiae Tuæ benevolen-  
tia, atque singularis benignitas, quâ me meaque qualia  
qualia Studia Uranica, præter omne meritum, imo  
ſpem meam atque exſpectationem proſequeris, usque adeò,  
ut etiam Christianissimo Regi inter eos, quos Sacra  
Reg. M. Suâ Regali Clementiâ, ac Protectione dignos  
judicavit, me intimè commendaveris, animos addidit,  
ut non verear hasce pagellas Tuis ſubjicere oculis. Fa-  
teor quidem ultrò, tenues admodùm, ac levidensē es-  
ſe;*

se; veruntamen cùm insigne, imò stupendum Rerum omnium Conditoris opus, accuratè pro viribus delineatum, & succinctè descriptum exhibeant, ejusq; miracula pandant, tum ad ætheris secretiora plus plusq; perscrutanda, scientiamq; naturalem promovendam viam sternal, non dubito, quin Illustrissima Excellētia Tua exiguum hocce grati, ac devoti animi testimoniū gratiissimè suscipere, meq; porrò inter Sibi omnium officiorum nexu devinctissimos complecti sit dignatura. De reliquo DEUM O. M. precor, ut Illustrissimam Excellētia salvam, & felicem in Orbis Christiani, atq; Literati maximum incrementum quam diutissimè conservet.

Illustriss<sup>e</sup> Excellētia Tuæ

Omni obsequio cultuque

Dabam Gedani, Anno 1665, die se-  
ptimo Calendarum Maji.

Addictissimus

J. HEVELIUS.

JOHANNIS HEVELII  
Prodromus Cometicus,  
<sup>Quo</sup>  
HISTORIA  
COMETÆ  
ANNO 1664 ET 1665  
NEC NON  
DISSESTITIO  
<sup>De</sup>  
Cometarum omnium Motu, Generatione,  
variisq; Phænomenis, exhibetur.



Uanquam haud postremum extitit phænomenum, quod à multis annis, inter reliqua quamplurima, accuratè observare, annuente Divino Numine, nobis obtigit, quodq; nuper omnium oculos, trimestri ferè spatio, clarissimè perstrinxit; penitus tamen mecum jam decreveram, nihil quicquam de isto in medium proferre, antequam integrum opus meum Cometographicum, quod sub prælo versatur, lucem planè vidisset. Nihilominùs tamen persuasionibus Præclarissimorum Virorum adductus sum, ut animum mutaverim, ac proposuerim Philomathematicorum ardenti desiderio, quantum fieri potest, quantocuyus morem gere. Non quidem ut simul omnia & singula observata, quæcunq; deprehensa sunt, tum quæ ex iis meritò derivari, & demonstrari debent, ac possunt, hâc vice plenè describerem, & exponerem; sed tantùm ut generalem quandam adumbrationem, insignis hujus Cometæ, Amicis interea exhiberem. Quò securi sint omnes (in primis cùm multi Eximii, & Erudit Viri circa hunc Cometam in diversum abeant) de ejus exortu, loco, viâ itinerariâ, velocitate, tarditateq; , æqualemne, an inæqualem cursum prosequutus fuerit, an æthereus, an verò aëreus extiterit? tunc quâ diversâ facie, caudâq; toto apparitionis tempore affulserit? Specialiores observationes, quarum ingens numerus feliciter à nobis obtentus est, quæq; beneficio calculi ex illis erui, ac prolixè pertractari debent, suo loco reservantes.

A

Rarisfi-

*Autor Histori.  
am hujus Come-  
tæ in Come-  
tographiam o-  
mnino rejicien-  
dam esse initio  
duxit.*

*Cur verò Auto-  
ri nunc aliter  
viximus fuerit.*

*Quâ ratione &  
intentione Hi-  
storia hæc con-  
scripta fuerit.*

*Ipsæ observa-  
tiones, ac omnia  
quæ ex iis ac-  
curatiori calcu-  
lo derivanda  
sunt Cometogra-  
phæ reservan-  
tur.*

## JOHANNIS HEVELII

2

Rarissimum autem & maximè notabilem, imò admirandum inter plurimos hunc esse Cometam, quà faciem, quà motum, nemo non mecum fatebitur. Quare nihil potius etiam duxi, quam ut eum debitè & accurate, quoties tantùm Cœli fulsit serenitas, rimarer; & quidem maximis nostris Instrumentis æneis, sex septemve pedum, quoad radium, magnitudine, in quina imò bina minuta secunda accurate distinctis; Sextante scilicet distantias varias à plurimis Fixis, Quadrante Altitudines ejus Meridianas, Facies verò Telescopio duodecim pedum longo, atq; ex quinque lentibus merè convexis constructo haud aspernando; maximè ob ejus insignem claritatem, ac amplissimum Cœli spatium, quod simul sub uno intuitu, & quidem omnia objecta erecto ordine, comprehendit: quò postmodum eo exquisitiùs Cometæ hujus sedes, Parallaxis, distantia à Terrâ, ductus tramitis, motusq; in eo diversus pervestigari posent.

Notes autem velim benevole Lector, quod loca Cometæ ad singulos dies laxiori tantummodo ratione, non attento uno aut altero minuto, in hâc descriptione tradere proposuerim, tantâ nempe præcisione tantum, quantâ ex globo artificiali majori Cœlesti, habitâ tamen ratione motûs Fixarum in Longitudine, ea depromere licuit; accuratiora, in ipsis minutis primis atq; secundis, Longitudines videlicet, Latitudines, Ascensiones Rectas, Declinationes, nec non motum proprium, tam diurnum quam horarum, & quæ inde dependent, cùm rigidiori calculo subjecta fuerint omnia, Cometographia nostra, juvante D E O, exhibebit.

Observatus autem est eximus hic Cometa primùm à me hîc Gedani anno elapso 1664. die Solis, 14 Decembris stylo Gregoriano; qui quamvis aliquantò citius illuxerit, partim tamen ob adversam aëris tempestatem, partim nihil tale quid in viciniâ Solis exspectans, aliisq; tum observationibus singulis ferè noctibus à Mense Novembri & Decembri continuò districtus, eum ante diem modò dictum minimè in Cœlo deprehendi. At quamprimum in conspectum venit, sepositis reliquis speculationibus omnibus, non solùm nudis armatisq; oculis eum attentè contemplatus, sed & organis congruentibus, à quintâ ad septimam matutinam debitè illum infectatus sum; de eo cumprimis maximè sollicitus, ut à superfluis & dubiis in omni observatione abstinerem, & tantum certioribus, atq; utilioribus operam darem. Quare remotis minoribus instrumentis omnibus, majorem Sextantem nostrum arripui; quò ejus beneficio exquisitas à Fixis distantias, & maximo Quadrante altitudines ejus Meridianas, utpote præ cæteris observationibus, tam ex nudis altitudinibus, quam azimuthis petitis, longè accuratores acquirerem. Quod propositum negotiumq;, DEO secundante, quoties quoties Cœli favit serenitas ex voto etiam successit; sic ut unâ die nonnunquam decem, quindecim, imò viginti, diversæ intercedentes à Stellis circumvicinis præcipuis, majoris certitudinis gratiâ fuerint impetratae.

Quo Cœli loco  
die 14. dec. St.  
n. Cometa de-  
prehensus fue-  
rit.

Animadvertebatur autem Cometa eo tempore, die scilicet 14 Decemb. sub horam quintam, in Quadrante Orientali, ad Euronotum prope Rostrum Corvi, vix ab eo semigradu distans Favonium versus, altus 9° ab horizonte, in 8 grad.

*Cometa anno  
1664 ut meri-  
tò inter præci-  
puos, qui unquā  
affulserunt, na-  
meratur, sic  
pariter quam  
exquisitiūs  
observari me-  
rebar.*

*Quibus Instru-  
mentis Autor  
Cometam di-  
mensus est.*

*Loca Cometæ  
in hâc generali  
descriptione tâ-  
tum mecha-  
nicè deduc-  
sunt; accura-  
tiora ipsa Co-  
metographia  
propediem ex-  
hibebit.*

*Quo tempore  
Cometa Danti-  
sci ab Autore  
primum con-  
spexit fuerit.*

*Quibus obser-  
vationibus Au-  
tor maxime  
semper operam  
dederit.*

*Distantiae Co-  
metæ à Fixis,  
tum Altitudi-  
nes Meridia-  
nas, præstant  
cæteris obser-  
vationibus o-  
mnibus.*

in 8 grad. Libræ, sub Latitudine Australi 22 grad. Caput erat satis conspicuum subflavi coloris, luminisq; debilioris & aliquantò obtusioris, nusquam adeò vividi & splendidi, ut reliquarum Stellarum Planetarumq; : prout plerunq; Cometis usu venit. In meditullio ejus, lucidius quoddam lumen, trium vel quatuor minutorum in diametro, stipato alio obscuriori ac tenuiori, sive capillitio, cuius tota dimetens 12 ferè minut. aestimabatur, nudo visu apparebat. Capite verò lustrato, præstanti ac prælongo Telescopio, animadvertisimus meditullium corporis non ex uno solo clariori nucleo ; sed ex plurimis particulis, sive corpusculis, tum densioribus & lucidioribus, tum tenuioribus & obscurioribus, majoribus & minoribus, interspersâ insuper aliâ diversâ densitatis subtiliori materiâ, constare : adinstar effigiei sub Numero I, in subseguente Iconismo A delineatae.

De cætero hic Cometes notabilem, & insignem quoq; caudam quatuordecim grad. longam, satisq; claram, minus tamen ipso corpore, præ se ferebat ; quæ ut paullatim à capite incipiendo tenuior erat, sic sub extremitatem magis magisq; divaricabatur, exporrigendo se se, lineâ directionis Favonium, Crateremq; scilicet versùs, inter Stellam basin Crateris dictam, & eam borealiorem sub Cratere, proprius tamen basi. Num verò peculiarem motum suum, præter illum communem, vel diurnum, qui alias Soli, vel rectius Terræ tribuitur, eo ipso tempore posse dederit, & quam plagam versùs eum instituerit, neutiquam quidem ex unâ solâ recentis alicujus phænomeni observatione expeditum est cognoscere ; attamen ex diversis illis impetratis distantiis, præsertim Cometæ ab Arcturo, Spicâ, Corde Hydræ & Regulo, elapsò unius aut alterius horæ spatio, promptè & securè conjicere licuit, habere motum proprium contra seriem Signorum, & quidem diurnum eo tempore vix uno gradu majorem, eumq; ad Ortum vergentem & Retrogradum, contra sc. seriem Signorum. Quoniam distantiae ab Arcturo & Spicâ constanter sensim crescebant, è contrario à Corde Hydræ & Regulo paullatim ad duo præterpropter minuta prima decrescebant ; id quod autem ex subseguentibus observationibus rectius patebit.

Die Lunæ, 15 Decembbris summo mane, Cœlo perquam sereno avidissimè Stellam Crinitam exspectavi. In sinu namquæ gavisus sum rursùs tale phænomenum exortum esse, quo Cometographiam nostram amplius exornarem, hypothesin quæ de eorum motu, sine omni dubio, magis magisq; stabilirem. Horâ itaq; quartâ mat. multas distantias à diversis Fixis, nec non ejus altitudinem Meridianam cepi : ex quibus innotuit versari in 7° 20' Libræ, & in 22 grad. 20 min. Latit. Austr. atquæ Meridianam altitudinem ad 20 min. imminutam esse ; Distantias insuper ab Arcturo & Spicâ Virginis ferè ad gradum integrum maiores ; contrà à Corde Hydræ tanto ferè minores factas esse. Hinc luculenter constabat, Stellam Comatam ad partes Australiores, Tropicum versùs Capricorni, cui jam imminebat, viam cursu retrogrado instituisse, motumq; ejus viginti quatuor horarum spatio, gradum penè integrum æquasse.

*Quali & quin-  
to Capite initia  
luxerit.*

*Quanam in i-  
pso corpore, Tu-  
bo optico dete-  
cta sit.*

*Quâ caudâ fue-  
rit prædictus, &  
quam plagam  
versùs eam  
projecterit.*

*Autor, quâ ra-  
tione statim  
prima observa-  
tione per ex-  
erit, Cometam  
preter diur-  
num, peculia-  
rem motum  
posse dñe.*

*Autor maxime  
sibi gratulatur,  
quod denuo ta-  
le insigne phæ-  
nomenum ipsa  
observandum  
obtigerit.*

*Die 15 De-  
cemb. quo loco  
Cometa rese-  
dit, & ad quas  
Cæli partes iter  
sum institue-  
rit.*

*Exploratio  
angulo inclina-  
tionis orbite  
& Ecliptice  
nec non Nodo  
Comete de-  
scendit. illico via  
phenomeni iti-  
neraria Auto-  
ris innotuit.*

*Principio sta-  
tum Autor opti-  
me prævidit,  
Cometam hic  
Dantisci nu-  
quam planè ho-  
rizontem sub-  
ire posse.*

*Altitudo Poli  
de æquatoris  
Gedanensis.*

*In hoc conser-  
tiunt omnes Co-  
metæ, quod cur-  
riculum, ante-  
quam tardi vel  
Stationarii fi-  
ant, penè sub  
circulo maxi-  
mo peragant.*

*Autor Amicis  
ab exordio con-  
festim prædi-  
xit, per quos A-  
sterismos Co-  
metæ cursum  
suum eset di-  
recturus.*

*Quid in capi-  
te, caudâq; die  
15 Dec. nota-  
rum fuerit.*

*Vbi Cometa  
die 18 Dec. ex-  
titerit; tum  
quando Tropi-  
cum Capricor-  
ni supergressus  
sit.*

*Caput crevit,  
lucidiusque  
paulatim eva-  
git.*

Ex his duabus itaq; justè peractis animadversionibus promptum fuit colligere, cùm præcedentium Cometarum cursus non usq; adeò absconditus ( id quod præfiscini dixerim ) nobis amplius sit, quò & quam viam posthac arriperet, tum qualē lineam itinerariam describeret : cognitis videlicet ex distantiis, angulo Orbitæ & Eclipticæ 53 ferè grad. nec non Nodo ejus descendente in 28 vel 29 grad. propemodū Libræ versante ; propemodū inquam, quippe ex ipsis observationum fontibus tam illicò ea calculo subducere nondum concessum fuit, sed solummodò ex globo derivare. Hoc igitur fundamento innixi ( prout etiam sequentes annotationes confirmarunt ) rectè protinus statuimus, Cometam hunc, si nempe eò usq; perduraret, nec citius absumeretur, nequaquam posse infra horizontem circa Meridiem penitus se abscondere, & perpetuæ fieri occultationis ; licet Altitudo Poli nostri Gedanensis sit ex nostris aliquot annorum observationibus  $54^{\circ} 22' 52''$ , Elevatio

Æquatoris  $35^{\circ} 37' 8''$ , atq; sic altitudo Tropici Capricorni supra horizontem tantum  $12^{\circ} 6' 8''$ ; sed appropinquaret quidem de die in diem magis magisq; finitori, ita tamen ut infra  $5^{\circ} 26'$  ei nunquam accederet ; verùm deinde rursùs in dies altiora peteret, & ab horizonte successivè plus plusq; discederet : quò sic in parte oppositâ, sub æquali penè angulo inclinationis, tramite suo, Eclipticam trajicere posset.

Nam in hoc omnes Cometæ conveniunt, quod eâ ratione cursum suum semper instituant ( eos nempe, quib[us] contin-  
git eosq; perdurare, atq; semicirculum integrum emetiri ) ut totam itineris curriculum sub sectione quâdam circuli propemodū maximi absolvant : quemadmodum in Cometographiâ prioribus Libris ivimus comprobatum. Inde consequitur ex necessitate, Sidus hocce Crinitum, Hydram, Navem, Canem Majorem, Leporem, Caputq; Ceti percurrere debuisse : sicut hoc ipsum ad Amicos eodem currente die perscribere, & prædicere haud sum veritus.

De reliquo, caput hoc die vix quicquam immutatum esse videbatur ; nihilominus tamen nuclei ejus interiores, materiaq; universa corporis aliquantò ferè constipatiōr, lucidiorq; per Tubum apparuit : ut facies sub Numero 2 commonstrat ; Cauda verò paulò brevior, 11 circ. grad. specie tamen satis notabilis & luminosâ, ascendere basin versus Crateris visa est.

Die 16 & 17 Decemb. totum Cœlum adeò nubibus, ac crassioribus exhalationibus erat obductum, ut nihil penitus, ut ut assidue invigilatum est, de Cometâ deprehensum fuerit. Atverò die Jovis, 18 Decemb. Cœlo admodū annuente, plurimæ distantiæ denuò captæ fuerunt. Ex quibus didicimus, Cometam, horâ 4, mane, in  $3^{\circ} 45'$  Libræ, sub Lat. Aust.  $25^{\circ} 30'$  extitisse, atq; spatio trium dierum 4 grad. 10 min. motu retrogrado progressum esse in suo tramite, nec non Altitudinem Meridianam 1 grad. 25 min. imminutam esse ; sic ut meridionalior & declivior factus fuerit. Atq; ita versabatur sub Cratere, inter Rostrum Corvi & Hydram ; Tropicumque Capricorni jam supergressus erat sub meridiem diei 16, & quidem sub angulo ferè 18 grad.

Caput ejus aliquantillūm majus clarissq; apparebat, licet declivorem situm respectu horizontis obtineret. Ex quibus haud perperam judicavimus, aut

Cometa anno 1664 et 1665 obseruatus à Iac. Horrello.

Die 14 Decemb. mane.



Die 15 Decemb.



Die 18 Decemb.



Die 23 Decemb.



Die 29 Decemb. Die 30 Dec. Die 31 Dec. Die 1 Januar.  
Anno 1665.




Fig. A

Autor delin. et sculpsit.



aut corpus Cometicum reverā crescere, aut ad Terram propriū accedere. Etenim omnes Stellæ, quò decliviores & viciniores sunt horizonti, eò sunt obscuriores, iis altioribus, & ab horizonte magis remotis. Materia item capitis, ejusq; nuclei, ope Tubospicilli, pariter condensari plus plusq; videbantur: quippe materia illa dilutior, ad latera hinc inde dispersa quasi congregabatur ac constipebatur: prout sub Num. 3 delineavimus. Cauda ferè longior, 12 scilicet graduum apparebat, imo æq; lucida, ac die 15; circa cuspidem verò non minus, ut antea, in tenuissimos radios latè dispersa erat, atq; Cor Hydræ & Procyonem versus protendebatur. Id quod non solùm nudo oculorum adspectu dijudicavimus, sed etiam ex duabus distantiis, ab extremitate Caudæ, & aliquibus Fixis Sextante depromptis hāc die cognovimus. Diametrum præterea totius capitis, certioris cognitionis gratia, Magno Quadrante æneo, peculiari ratione rimatus sum: nimirum 15 min. æquare; cùm primâ die apparitionis vix 12 min. expleret.

Præterea, et si animitus exoptaverim, insignem hunc, & rarissimum, ratione motūs, Cometam, Cœlo fudo, in singulos dies observare potuisse; nihil tamen minus, nubilosus aër interdum obstitit, quemadmodum etiam die 19 & 20 nobis obtigit, quò minus Cometam videre concessum fuerit. Die quidem 21 decemb. sub horam quartam matutinam Cœlum inclaruit; sed vix per horulam: interea tamen omnem adhibui operam, ut duntaxat aliquas maximè necessarias observationes, nec non ejus Altitudinem Meridianam, pro vero loco ejus indagando, impetrarem. Ex quibus innotuit, eo tempore horâ sc. 4 15', sub Cratere in Hydrâ, in 28 nimirūm gradu Virginis, & Latit. Austr. 30 grad. Cometam latere; adhæc Altitudinem ejus Meridianam à die 18, spatio videlicet trium dierum 2 grad. 4 min. decrevisse: siquidem tantum 9° 16' 30'', adhærente refractione, reperta est. Unde manifestum erat, Cometam successivè adhuc fieri declivorem; motuq; proprio 6° 31' confessisse: sic ut cursum magis ac magis continuò concitaret.

Capitis verò tota diameter, nuclei nempe clarioris, cum circumfuso lumine debiliiori, ad 18 min. excreverat; videbatur quoq; ferè clarius, ut ut Telescopio illud contemplari nubes prohiberent. Nihilominus tamen haud obscurè colligere potuimus, remoto etiam Tubospicio, materiam exinde plus plusq; coagulari. Nam omnibus Cometi, quicunq; Tubo Optico hactenus sunt perlustrati, hoc fuit commune; quòd, quò densior compactiorq; eorum materia capitis reddita est, eò clariores lucidioresq; extiterint: quemadmodum in Cometographiâ Lib. VI. pag. 339 demonstratum est; ut ut alii contrarium, sed sine ratione, & contra experientiam sustineant.

Cauda, quod bene notes velim, hāc die planè insolens erat; non solùm quòd ultra 22 grad. in longum, & in latum 1° 30', imo ad 2° ferè excurrebat; sed quod, si accurate oculos ad eam intenderes, ex parte circa cuspidem, incurviceret & quidem concavitate deorsum, horizontem scilicet versus; convexitate verò sursum: instar illius anni 1618, aliorumq;. At quænam hujus rei genuina sit ratio, jam fusè Libro VIII, pag. 495 Cometograph. nostræ deductum est, quò Lectorem ablego. Deniq; directio ejus inter secundam

Constitutio Cor-  
poris Cometi  
interioris Tele-  
scopio detecta.

Cauda implu-  
rimū duvari-  
cata, non tamē  
omnis tempore  
æq; longa ex-  
tina.

Qua ratione  
directio Caudæ,  
tum Corporis  
diameter appa-  
rens fuerit ex-  
plorata.

Nonnunquam  
adversa aeris  
tempestas ob-  
servacionibus  
obstaculo fuit.

Cometa ex Li-  
bra, jam Virgi-  
ne intraverat.

Vt in dies de-  
clivioris sic suc-  
cessivè velocior  
factus est.

Caput Come-  
ticum ad 18  
min. die 21  
dec. excreve-  
rat.

Quo compa-  
ctior materia  
corporis alicu-  
jus Cometi, ed  
ipsi Comete  
sunt splendi-  
dores.

Cauda pre-  
longa, & non  
nihil incurva-  
ta hāc die ful-  
fit.

Ad quam  
Stellam expor-  
ta fuere.

& quartam à Corde Hydræ protendebatur; ita tamen ut curvitate in secundam à Corde magis propenderet.

*Sub quā longitudine, Latit. & Altit. Meridianā; tum quā velocitatem die 23 decemb. Cometa incessiter.*

*Caudam rursum in directum omnino exposuit.*

*A die 23 ad 27 dec. in horizonte Danisca- no Cometa planè ob nubila inconspicuus fuit.*

*Altitudo Merid. Cometa, die 28 Decemb.*

*Quantum im- mensum spatium Cometa in suo trahite, atq; in Longitudine bucus q; emen- sus fuerit.*

*Habebat sub Clypeo Navis circa inimum Leonis, sub maximā Latitudine Aust.*

*Motum in di- es acceleravit.*

*Quantā Gedanii extiterit Altitudo Cometa Merid. circa malum Navis incedens die 26 Decemb.*

*Sicuti come- ta ad diem us- quē 27 Dec. continuo decli- vior, sic econ- trariò ab hāc die constanter altior fatus est.*

*Caput (enīus) Diameter 22 min. ) admō- dum crūsum, & bīsūtum, materiaq; crāsfori con- stare videba- tur.*

Die 22 Decemb. Nubila obstiterunt; at die 23 semel quidem Cometa inter nubeculas se se conspiciendum præbuit; sed eo usq; tantum, ut unicam distantiam à Sinistro latere Virginis obtinuerim. Quantum ex hac, & transmisit ductu, seu obliquitate edidici, habebat tum temporis sub Hydrā in 22° Virginis, & Latit. 34° 30' Aust. ejusq; Altitudo Meridiana ad 2 grad. decreverat: quandoquidem non 7° eo die excedebat. Motus verò proprius à die 23 erat quoq; 7° ferè; adeò ut 24 horarum intervallo jam 4 ferè grad. progrederetur. Caput ob adversam aëris tempestatem Telescopio haud fuit conspectum; at Caudam insignem 20 circ. grad. omnino in directum vicissim exploratam, ad primam à Corde Hydræ, Occasum scilicet versùs, præ se ferebat.

Die 24, 25, 26, & 27, per totas quidem noctes in speculâ avidissimè Cometæ invigilavimus, quò eum in adeò decliviori situ ad horizontem consiperemus; sed frustrà: quippe ne semel quidem emicuit, ut nec vestigium ejus deprehenderim. Eadem tamen nocte horâ primâ die scilicet 28 decemb., apricante iterum Cœlo Cometam in Austro, prope Meridianum, vix 6 gradibus supra Finitorem elevatum detexi: singulis enim diebus maturius orbiter, discedendo nempe longius à Sole ad ejus oppositionem. Ubi verò non amplius sub Hydrā latebat; sed confecto immenso itineris spatio in suo trahite, occasum versùs, 38 scilicet grad., ac in longitudine adhuc ampliori, videlicet 46 grad., elapsis diebus 4 cum dimidio, longè situm, de quo valdè mirabar, immutaverat. Nam in puppi sub clypeo Navis commorabatur. A quo tum diversissimæ distantiae à variis Stellis fixis, uti singulis diebus constitutum erat, captæ sunt. Ex quibus apertum evasit, totam jam Virginem, maximamq; Leonis partem, existente scilicet in 4 grad. Leonis, sub latitudine

49° 30' Aust. peragrasse. Motus ejus diurnus inter diem 27 & 28 propter modum 11 extitit graduum; sic ut de die in diem velocius adhuc multò incederet.

Altitudinem ejus Meridianam quod attinet, etiamsi hāc nocte non 6 grad., ut modò dicebam, majorem habuerit; attamen ex inclinatione orbitæ, cursuq; Cometæ, in globo ritè descriptis luculenter perspexi, quod sub diem 26 haud paullò minorem, nempe vix 4° 30' ampliorem possederit: imminentem nimirūm duabus illis Stellis, in malo Navis constitutis; à quibus vix 1° 20' in Conjunctione distitit: sicuti illi, qui huic observationi interfuerunt, sine omni dubio exploratum habent. Idcirco à die 27, imò 26 jam rursùs altiora petiit, discedendo sensim ab horizonte Tropicum Capricorni, Äquatorem, Eclipticamq; versùs: dum quotidie Declinatio ac Latitudo imminuebatur, crescente econtrariò altitudine Meridianâ.

Luna quidem à Conjunctione recens obstabat, quò minùs ita dilucidè & distinctè, ut hactenus, videretur; nihil tamen seciùs satis erat conspicuus. Diameter ejus 22 ferè minitorum deprehensa est. Caput crispo ac denso cinctum erat capillatio. Beneficio verò Telescopii, nuclei corporis adhuc densiores, materiaq; tenuior quasi in medio peculiarem solidioremq; nucleum constituere

constituere videbatur. At Caudæ magna & inopinata diversitas obtigerat ; siquidem non amplius Favonium vel Corum versùs exporrigebatur , prout hactenus animadversum est , sed omnino ad Septentrionem , sursum scilicet protendebatur. Adhæc perquām ampla ac divaricata, longitudine 7 ferè gra-  
duum , instar Caudæ Pavonis extitit , veluti Iconismus sub num. 5 , Fig. A  
clare ostendit ; in cuius medio clara Stella in puppi Navis præcedens , majo-  
ris Globi seu supra clypeum præcedens , minoris, elucebat. Spectaculum , sanè , admodūm egregium , quale in Cometis non adeò frequens est , minus in Cometarum Oppositione Solis Terræq;; ubi plerunq; omni omnino jubare exuuntur : de quo singulari phænomeno Lib. VIII. Cometograph. de Cau-  
dis , in primis pag. 536 incipiendo fusè disseritur.

Caudam non  
amplius longā  
ad Occidentem  
dixit ; sed  
sursum brevio-  
rem magis q;  
divaricatam  
exposuit.

Non omnes  
Cometae in ipsa  
oppositione cau-  
dam omnino  
exuunt.

Die 28 vesperi , nisi Cœlum nubibus undiq; fuisse obductum , potuisset , meā opinione , Cometa post Solis occasum , tanquam Acronychius & vesperti-  
nus sub horam decimam circa Euronotum jam observari : quippe tum tempo-  
ris ventrem Canis Majoris jam insederat. Verūm , cùm tempestas haud arrise-  
rit , tota hæc nox nihil agendo elapsa est. Sub vesperam vero diei 29 decemb. ,  
horā 9 30' , Cometa rursus 10 gr. altus illuxit ; ita ut ab hâc die semper post-  
hac vesperi , celebratà nempe Conjunctione Solis , & non amplius mane pro-  
diret. De reliquo , ut ut Luna in principio Geminorum hærens sub Latit.  
5 grad. Aust. haud procul à Cometa , pariter in fine ejusdem Signi commo-  
rante , clarè radios eo tempore undiq; diffunderet ; nihilo tamen segnius no-  
vum sidus crinitum de suo lumine nihil ferè remisit , sed satis lucidum , ample-  
què corpore , 24 scilicet min. cum capillitio deprehensum est. Comam quoq; ,  
seu potius barbam accurate consideratā rectā ferè sursum projiciebat , uni-  
us propemodūm grad. Caput præterea hirsutum , instar Hirci se se offerebat ;  
in cuius meditullio seu centro lucidissimus & densissimus nucleus , colore ferè  
igneo , adminiculo Tubi , obvius erat , qui aliâ diversâ densitatis materiâ , nu-  
cleisq; minoribus intermixtis circundabatur : spectaculum , sanè , valde jucun-  
dum extitit adspectu : prout in Delineatione , sub Nuin. 6 videre est.

Cometa , quan-  
do ex matutino  
fatu fuit  
vespertinus.

Conjunctione So-  
lis & Cometæ  
incidit die 29  
Decemb. mane  
circa sextam.

Cometa non  
obstante Lunâ ,  
admodum Lu-  
cidus ac cir-  
cum circa hir-  
sus , magni-  
tudine valde  
conspicua exti-  
tis , barba cur-  
tam sursum  
projiciens.

Præclarissim⁹  
& lucidissimus  
nucleus rotun-  
dus in meditul-  
lio disci Come-  
ticæ Tubo de-  
prehensus est.

Cometa sub  
pede anteriore  
Canis Majoris ,  
sub finem can-  
cri & inutum  
Geminorū ob-  
servatus est ,  
crescente adhuc  
ejus motu cur-  
riculi.

Paucissim⁹  
Cometis obtin-  
git adeò velo-  
cisimo ferri  
motu.

Substituit autem Cometa infra sinistrum pèdem anteriorem tum tempo-  
ris Canis Majoris , cui adstabant à parte inferiore duæ Stellulæ Globo nondum  
adscriptæ , satis tamen conspicuæ : in Longitudine nimirūm 28° 40' Geminorū  
& Latit. 47° , paullò minore , hesternâ die . Altitudinem Meridianam  
quidem , cùm paullò post Cœlum à nubibus obumbraretur , atq; Cometa pri-  
mùm sub medianam noctem culminaret , hâc vice Majori Quadrante minimè  
rimatus sum ; ex Globo tamen constituit , jam ultra 12 grad. excrevisse. Mo-  
tum in suâ orbitâ à die 28 mane , ad vesperam usq; hujus diei 29 ; videlicet spa-  
tio 43 horarum , 23° 40' ferè , atq; in longitudine , sive in Signifero 36° confe-  
cit ; quantum Cœli spatium , tantillo tempore emetiri , profecto , paucissim⁹  
Cometarum obtigit : adeò ut uno die , à 28 , horā 9 , ad 29 decemb. , 12° ferè  
in suo tramite , & in Eclipticâ 16° peragraverit. Unde colligere est , continuo  
gradum hucusq; accelerasse.

Die 30 decemb. circa 10 vespertinam , aëre iterum admodūm defæcato ,  
Cometa in collo Leporis deprehensus est , lumine adhuc perquām lucido &  
conspicuo ;

Cometa die 30  
Dec. Lunæ cō-  
junctus in collo  
Leporis extitit.

conspicuo; non obstante Lunâ cum eo conjunctâ, & vix 35 grad. remota. Barbam quoq; seu crines, longitudine unius gradûs, à circulo verticali, seu Septentrione paullulùm recedentes spargebat Euronotum versùs; ut hâc die directionem ejus inflechteret, exponendo eos, ad partes contrarias, pedem scilicet dextrum Orionis, vel potius paullò infra eum. Caput pariter villosum

*Barbam non-nihil inflexit ad partes cœli adversas.*

*Nucleus ille Capitis major loco quasi emoveri vixus est.*

*Hac die motu suo fuit velocissimus.*

& circumcirca crinitum apparuit; Telescopio ferè eadem hesterna quoq; facies conspecta est, cum illo intermedio lucidissimo nucleo rotundo; nisi quod ex centro quasi dimoveri ad limbum ortivum videretur. Extitit in  $12^{\circ} 40'$  Geminorum, in Latit Aust.  $40^{\circ} 10'$ , Asc. R.  $76^{\circ} 30'$  atq; Declinat.  $17^{\circ} 10'$ , alto in Meridie  $18^{\circ} 27'$ . Exinde cognoscere est, jam ultra  $13^{\circ}$  à die 27 auctam, atq; intervallo 24 horarum  $12^{\circ} 44'$  in suo itineris ductu; in Longitudine verò  $16^{\circ}$  Cometam ipsum promotum esse. Atq; sic porrò in suscepto tramite pergebat strictè per caput Leporis, ac si ipsius oculum obtegere constituisset.

*An cometam oculum Leporis texerit?*

Lubenter igitur istud jucundissimum spectaculum advertissem, quod mea conjecturâ sub horam secund. vel tertiam matutinâ incidisset; sed aëre subobscuriori præpeditus sum, quò minùs id fieri potuerit. Ex subsequenti autem observatione colligere licuit, Cometam, dictam Stellam, oculum scilicet Leporis haud occultasse, sed tantummodo supergresum esse, in distantiâ 20 circiter minutorum: de quo phænomeno nobis alii, quibus magis annuit Cœlum, quicquam certius annunciare suo tempore poterunt.

*Caput cometæ, licet quantillū decessere incepit, tamen lumine & colore admodum vivido gaudebat.*

Die 31 Decemb. vesperi, horâ 6, liquidissimâ Cœli tempestate, Cometa jam ad 14 grad. supra horizontem ascenderat, corpore aliquantò imminuto quoad diametrum, colore verò albicanti ac satis splendido, vix Regel, sive sinistro pedi Orionis vel quicquam cedere videbatur. Telescopio item similem penè faciem, ut pridie, tam quâ lumine, colore, quam quâ nucleorum situ ostentabat; nisi quod major ille intermedium, qui hactenus meditullium occupaverat, jam longius à centro, limbum versùs Ortivum discesisset. Caudam, penitus intuenti, omnino ad Euronotum, medium Cinguli Orionis nempe versùs projiciebat, longitudine unius ferè grad.: qualem sub Num. 8 adumbratam vides. Hærebat horâ 9 vesp., in  $2^{\circ} 40'$  Geminorum, & Latit. Aust. ferè  $34^{\circ}$ . In motu suo aliquantò remissior factus: siquidem spatio 24 hor., tantum 11 grad.  $10'$ , atq; in Longit.  $10^{\circ}$ , & in Latit.  $6^{\circ}$  transferat. Ascensio itaq; R. prodiit  $66^{\circ}$ , & Declin.  $12^{\circ} 30'$  Aust. existente ejus altitudine Meridianâ hoc tempore  $23^{\circ} 13' 50'$ . Ex quibus luculenter rursus liquet, Cometam in suo semel arrepto cursu continuò ascendisse Eridanum & Lucidam

*Situs cometæ in principio Geminorum.*

*Motus proprius retardans incipit.*

*Vbi cometæ celestissimo gradu incescit, ibi Terra extitit propinquus fitius.*

Mandibulam Ceti versùs: maximamq; velocitatem motûs, inter diem 29 & 30 exercuisse. Ubi, sine omni dubio, Terræ tum vicinissimus extitit: protut ex ipsis observationibus in Cometographiâ sumus, Deo sic volente, demonstraturi.

*Cometa prope Stellulam Eridani animadversus est, que paullò post in cometam emicuit.*

Die 1 Januarii anno 1665, horâ 8 vespert. innubilo æthere, Cometa infra Stellulam in Eridano, dictam aliàs tertiam à primo flexu, ad semigradum ferè, versùs Libonotum incedebat; de quâ tamen notabiliter mox discesit Favonium versùs; sic ut horâ 10, Comam suam decurtatam, per præmemoratam Stellam, in eâ tunc clarè emicantem projiceret. Caput quoad faciem parum

# PRODROMUS COMETICUS.

9

parùm admodùm, non obstante Lunâ plenâ, erat immutatum, nisi quod ferè lucidius appareret. Ope Telescopii materia interioris Corporis eandem etiam exhibebat speciem, hoc tamen discrimine, quòd nucleus ille major solidior lucidiorq; jam aliquantillum à pristino suo splendore remiserat. Ex plurimis illis distantiis, quæ hâc die feliciter impetratae fuére, locus ejus inventus est in Longit.  $24^{\circ} 20'$  Tauri & Latit. Aust.  $27^{\circ} 45'$ ; Asc. R.  $58^{\circ}$  & Declin.  $8^{\circ} 20'$ . Motus itaq; diurnus Cometæ extitit  $9^{\circ}$ ; Longitudinis verò  $8^{\circ} 20'$ , & Latitudinis  $6^{\circ} 15'$ ; ita ut in dies gradum magis magisq; comprimeret.

*Nucleus ille  
Capitus inter-  
medius major,  
pristinū splen-  
dorem quasi  
paullatim re-  
mutare vide-  
batur.*

*Jam Taurum  
intraverat,  
motu tamen  
paullò remissio-  
ri.*

Dies secundus Januarii, totus erat turbidus, ut nihil penitus nobis excubantibus, de novo Sidere Crinito, in conspectum venerit. Die verò 3 Januarii, ante ortum Lunæ, dilucidè quidem emicuit, sed brevi temporis spatio; ut pauciores observationes Instrumentis; Tubo verò nullas obtinuerim. Caudam trium circiter graduum, ad medianam Stellam trium informium ad Mandibulam Ceti existentium, sed inclinatiorem Ortum versus spargebat. Horâ 12 noctis, ex nubibus iterum irrepsit, sed illicò vicissim absconditus est. Versabatur autem in  $14^{\circ} 20'$  Tauri, & Latit. Aust.  $19^{\circ}$ . A die 1 Januarii ad 3 usq;  $12^{\circ} 30'$  in suo itineris ductu peregerat. Exinde præcedente die  $7^{\circ}$ , & subsecente, à 2 ad 3 Januarii,  $5^{\circ} 30'$  tantùm motu suo trajecera.

*Cauda, que  
præcedentibus  
diebus vix u-  
nius gradus  
deprehensa est,  
nunc ad 3 gr.  
excreverat; or-  
tum scilicet  
versus se ex-  
tendens.*

*Motum de die  
in diem langu-  
diorem exer-  
cuit.*

Die 4 Januarii, caliginosa nox obstitit, quò minùs parùm admodùm animadversum fuerit: quanquam semel atq; iterum ex dehiscentibus nubibus eximio lumine & albicanti colore, caudâ quoq; notabili præditus effulsi. Atverò quo loco reverà resederit, secundùm Longitudinem & Latitudinem, non datur hâc vice adeò exquisitè cognoscere; nisi ex proportione præcedentium & sequentium observationum. Ex quibus reperitur hoc tempore in  $11^{\circ}$  Tauri, & Latit. Aust.  $15^{\circ} 20'$  ferè hæsisse: existente Ascensione Rectâ  $43^{\circ} 10'$ , & Declin.  $30'$  Boreali. Atq; ita perspicuum est, Cometam hâc die 4 Januarii sub hor. 3 pomeridianam, Æquatorem sub  $44^{\circ}$ , atq; angulo penè  $31^{\circ}$  jam transiisse.

*Quo tempore  
Cometa Æqua-  
torem & sub  
quo angulo tra-  
jecerit.*

Die 5 Januarii, occidente Sole, horâ  $4^{\circ} 30'$ , affulgente Mandibulâ Ceti, simul Cometam, quoad popularem adspectum, id temporis, ab inferiore parte dictæ Stellæ  $30'$  remotum occidentem versus conspeximus; ita tamen ut Conjunctionem jam celebrasset: dixisses quidem, primo intuitu, Cometam occultasse Mandibulam; sed neutquam id obtigit: ut ut nonnulli aliter sentiant. Nam si Cometa Mandibulam omnino texisset, haud potuisset hæc Strella, horâ 9 (ut factum est) in ipsâ caudâ apparere; sed necessariò caudam super Mandibulam eo tempore direxisset. Horâ 6 & 7, antequam Luna oriretur caput perquam erat conspicuum, nec non cauda ad  $14$  grad. excurrens, præsertim circa educationem notabili lumine ac densitate, quali vix hactenus unquam gaudebat. Sub horam 9 Cometa aliquantò promotiore, priori loco scilicet emoto, Mandibula Ceti ad Caput in mediâ Caudæ clarè & egregie emicuit; circa verò medietatem ejus aliæ binæ Stellulæ spectabantur; inferior, prima ad Mandibulam Ceti, altera superior, incognita erat: in extremitate, ubi cauda valde se se dilatabat, pariter Stellula globo nondum annumerata extitit. Extendebar autem ipsa coma, quoad directionem, ad quartam

*Cometa qui-  
dem in transitu  
admodum ex-  
titit vicinus  
Mandibula  
Ceti, sed nus-  
quam illam te-  
xit.*

*Cauda insi-  
gni densitate  
claritateq; lu-  
xit.*

*Quando Man-  
dibula rursus  
in caudâ appa-  
ruit.  
comam, in quâ  
diversæ Stellu-  
læ conspectæ  
sunt, plane  
nunc Ortum  
versus ad cly-  
peum Orionis  
porrexit.*

in Clypeo Orionis, eatenus, ut eam nunc planè Eurum versùs, in plagam videlicet Cœli, ratione primæ apparitionis adversam exponeret.

*Caput ali-  
quanto minus,  
nec adeò his-  
tum; nucleum  
verò illum ma-  
jorem jam pla-  
né interius se  
observatum est.*

Caput ex parte imminutum videbatur, nec tot crinibus undiq; septum; nihilominus tamen apprimè conspicuum, ut modò dicebam. Tubi verò beneficio, de interiori illo clariori nucleo, per aliquot jam dies emicante, vix vestigium ampliùs supererat. Dissolvebatur itaq; materia illa capitinis, disgregando nempe se se plus plusq;: veluti sub Num. 11 Fig. A delineavimus. Circa horam 9, Mandibula Ceti, Cometa & illa in ore Ceti sub linea ferè rectâ conspecta est. Longitudine phænomeni existente  $8^{\circ} 40'$  Tauri, Latit. Aust.  $13^{\circ}$ , Asc. R.  $4^{\circ} 20'$  & Declin.  $2^{\circ} 20'$  Bor. Motus verò proprius à 1 ad 5 Januarii  $20^{\circ} 45'$  ferè, item à die 3 ad 5,  $8^{\circ} 20'$  inventus est. Consequitur ergo, Cometam inter 4 & 5 Jan. motu diurno  $3^{\circ} 30'$  progressum esse. Intantum nunc cursu erat remissior! Altitudo autem Meridianâ  $38^{\circ} 8' 45''$  observata est; excedens hâc die Äquatoris Altitudinem  $2^{\circ} 31' 37''$ .

*Cometa quo  
altior respectu  
Meridiani, eò  
tardior in tra-  
mite suo exti-  
tit.*

Die 6, ab horâ 6 ad 11 vesp. cælo iterum favente, observationes pro voto depromere concessum fuit. Caput probè adhuc lucidum, colore ferè argenteo, minus tamen aliquanto, 8 duntaxat minitorum apparuit; sic ut decrescere videretur. Proinde etiam ope Tubospicilli nuclei interiores materiaq; congregari, imò potiùs dissolvi deprehendebantur. Quoad situm, constituit Cometa, eo tempore, cum Mandibulâ Ceti, & illâ in ore, triangulum propemodùm æquilaterum. Cauda insuper hoc die adhuc 15 grad. longa, omnino ortum versùs excurrens, inter Stellas in pede & paleari Tauri, ad dextrum scilicet genu valde se se dilatans, egregiam præ se ferebat claritatem; in cuius medio, nec non extremitate, duæ Stellulæ clarissimè affulgentes conspectæ sunt: ut iconismus sub Num. 12 Fig. B exhibet. Nonnunquam, quod bene advertas velim, cauda quasi scintillabat, fluctuabatq; ac si per intervallo compriberetur, rursùs dilataretur, novoq; velut radios vibraret ac evomeret: quale phænomenum sèpiùs antehac, tam in hoc, quam aliis Cometis observatum est. Ex quibus autem rationibus istud acciderit, Cometographiæ Lib. VIII pag. 509 docet. Ratione sitûs versabatur ipse Cometa in  $7^{\circ}$  Tauri, & Latit.  $10^{\circ} 36'$  Aust. existente Asc. R.  $38^{\circ} 0'$ , & Declin.  $4^{\circ} 4'$  Bor.. Peregit itaq; uno die 3° in suo tramite, sub Altitudine Meridianâ  $39^{\circ} 41'$ .

*Motus Come-  
te diurnus ad  
3 grad. die 6  
Jan. redactus  
erat.*

*Constitutio  
Capitis Come-  
tici.*

*Longitudo &  
Latitudo Cau-  
de insignis.*

Die 7 Januarii, tranquillâ & egregiâ aëris tempestate, paullò post horam 4 vesp., Cometam nudis deteximus oculis; qui postmodùm, etiam pro lubitu, Instrumentis observatus est. Caput ejus sensim decrescere, nihilo tamen minùs abundè clarum, coloris argentei & albicantis apparuit: quintam nuclei, ac particulæ illæ, quibus totum corpus constabat, per tubum videlicet, magis ac magis confluebant, in languidorem quasi massam coentes; attamen ad limbum orientalem materia compactior, nucleiq; aliquantò lucidiores, reliquâ capitinis parte animadversa sunt: sicuti sub Num. 13 delineavimus. Coma item insignem longitudinem 13 grad. & latitudinem, minimum duorum, & ampliùs graduum præ se ferens, ad Stellam istam, quæ sequitur tertiam in armo Tauri, projecta est. Infima & tertia earum in armo, in extremitate affulserunt; infimâ tamen ad lineam directionis magis propende-

dente; à parte verò superiori caudæ, circa medietatem, Rostrum Ceti, ad integrum gradum à linea directionis distare observatum est. Ex quâ distantiâ certò dijudicare licuit, Comæ latitudinem, eâ in parte, ad 2 grad. excrescere. Longitudo autem Cometæ detecta est in  $5^{\circ} 30'$  Tauri; Latit. Aust.  $8^{\circ} 36'$ ; Asc. R.  $35^{\circ} 30'$ , Declinat.  $5^{\circ} 23'$  Bor.; atq; Altitudo Merid.  $40^{\circ} 59' 40''$ : Cùm Cometa continuo ductu caput Andromedæ versùs, discedendo nempe perpetuò à Mandibulâ Ceti, contra seriem Sign. ascenderet.

Diversæ ite-  
rum Stellulæ  
tam in ipsa  
caudâ, quam  
circa eam fue-  
runt adspetta-  
biles.

Situs Cometæ

Eo igitur attento, in omni observatione perquâm fui sollicitus, ut præ aliis omnibus distantiis à Fixis, intercapedes Cometæ à binis modò dictis Stellis, Capite scilicet Andromedæ & Mandibulâ Ceti debitè explorarem. Maximè enim conducibles hæ binæ distantiæ nunquam non nobis fuerunt, ad motum scilicet proprium ac diurnum facillimo negotio, etiam absq; omni calculo, cognoscendum. Nam, quia Cometa cursum suum à Mandibulâ, strictè pergendo Caput Andromedæ versùs instituebat, proclive fuit, ex binis dictis distantiis, hujus & alterius diei, ex differentiâ scilicet illarum, motum proprium indagare. Distantia autem Cometæ à Mandib. quod notes, necessariò semper tanto crevit, in omni observatione, dum motu indesinenti fecebat retrogrado, quanto altera distantia Cometæ à Capite Androm. nunquam non decrevit. Extiterunt itaq; hæ distantiæ semper normæ loco, de certitudine, & præcisione nostrarum observationum judicandi: quippe, si vel semel in semiminuto tantum aberrasses, illicò vitium in alterutram distantiam innotuisset; tum nunquam hæ binæ distantiæ conjunctim, totum intervallo, Capitis scilicet Andromedæ & Mandib. Ceti, quod alias  $48^{\circ} 9' 40''$  est, constituissent. Hincq; binæ hæ dictæ distantiæ, quocunq; etiam die observatae, cujuscunq; etiam fuerint quantitatis (ditem enim immutabantur) semper tamen sibi invicem additæ, necessum est, ut componant  $48^{\circ} 9' 40''$ . Id quod etiam (absit gloria) constanter quâvis observatione, in ipso minuto, ne dicam interdum secundo præstitimus; eo præsertim tempore, circa initium Februarii, cùm Cometa à linea illâ rectâ Capiti Androm. & Mand. Ceti interjacens, parùm aut nihil defleceret; in cæteris diebus, recedente paullulum ab istâ linea rectâ debitæ proportioni etiam semper responderunt: prout observationes ipsæ Cometographiæ inserendæ, suo tempore, loquentur. Id quod leviter tetigisse haud parùm conducere arbitror, partim ut Astrophili cognoscant, quali compendio interdum attendendum sit, & quòd hâc ratione non solum diligentia Observatorum, in Stellis, phænomenisq; rimandis, sed & Instrumentorum constructio & perfectio, omnium optimè explorari nullo negotio poscit. Nam, ut adhuc clariùs dicam, constitutis nimirùm tribus Stellis in unâ eâdemq; rectâ linea, omnino necessum est, ut binæ intercapedes ab utrâq; extremâ Stellâ conjunctim, assidue prorsùs sint æquales distantiæ ipsarum extremarum: veluti negari haud potest. Sed revertamur ad Observationes nostri Cometæ.

Autor quâm  
maximè ope-  
ram dedit, ut  
distantias Co-  
metæ à capite  
Andromedæ &  
Mandibulâ Ce-  
ti acquireret.

Crescente di-  
stantia Cometæ  
à Mandibulâ,  
altera à capite  
Andromedæ  
decrevit.

Ratio singu-  
laris exploran-  
di diligentiam  
Observatorum,  
tum Congruen-  
tiam observa-  
tionum.

Quantâ indu-  
stria observa-  
tiones ab Auto-  
reperiatæ fue-  
rint, penes ali-  
os suo tempore  
estò judicium.

Ex tribus  
Stellis in unâ  
eâdemq; rectâ  
constitutis, o-  
mnium optimè  
& observatio-  
nes & Instru-  
menta exami-  
nantur.

Die 8, nubila Cœlum totum subtexerant. Die verò 9 Januarii, horâ 6 vesp. Caput phænomeni ferè in pristino deprehendimus statu, nec non caudam, nisi quod aliquantò longior, 15 sc. grad. existeret. Excurrebat

Die 9 Januar.  
ferè eadem Co-  
metæ facies  
exitit.

Orientalis in enim, sed valde dilatata, ad secundam usq; in armo Tauri, suâ directione ; in fronte Ceti cum aliis quibusdâ in cauda extitit. Ceti  $4\frac{1}{2}$  gr. à Capite propemodùm remota cernebatur ; atq; alia in eductione,

Tubo tantum conspicua : item à parte inferiore Rostrum Ceti ; sub capite verò in distantiâ  $30'$  ferè Stella in fronte occid. Ceti spectabantur ; sic ut hanc posteriorem Cometa jam supergressus eset : prout sub Num. 14 Fig. B delineatum est. Occupabat Long.  $2^\circ 50'$  Tauri ; Latit.  $5^\circ 40'$  Aust. ; Asc. R.  $32^\circ 0'$ , & Declin.  $7^\circ 23'$  : intervallo verò duorum dierum  $3^\circ 45'$  emensus. Confecit itaq; hoc die duos penè gradus.

Die 10 Januarii, Cœlo indulgente, à  $5$  vesp. ad medium usq; noctem, observationibus invigilatum est. Materia interior Capitis plus plusq; se se disgregare, ac dissolvere videbatur ; prout sub Num. 15 adumbravimus, observatus.

Cauda Come-  
te quatuor  
Stellulæ eraç  
condecorata.  
  
Cauda Come-  
te quatuor  
Stellulæ eraç  
condecorata.

Cauda verò & rarer & brevior, 12 tantum grad., inter supremam & secundam in armo Tauri excurrebat. In quâ quatuor Stellulæ reperiebantur ; una in extremitate, alterâ sub caudâ, atq; aliæ binæ prope ipsum caput. Longitudo ejus tum extitit  $2^\circ 0'$  Tauri, Latit.  $4^\circ 40'$  Aust. Asc. R.  $31^\circ 0'$  & declinatio  $8^\circ 11'$  Bor. ; motu verò proprio, spatio 24 horarum  $1^\circ 31'$  absolvit.

Cometa non nisi unum gra-  
dum cū dimi-  
dio, uno die,  
peragravit.

Ex quibus patet, Cometam continuò lentiori incessisse gradu : quemadmodum initio ad Leporem usq; concitatori ferebatur.

Die 11 Januarii, quanquam peregrè domo abfui, nihilominus suffici-entibus Sextante, ac Quadrante, singula minuta commonstrantibus instru-ctus, toties, quoties cœli affulsa serenitas, eximum hunc & rarissimum Cometam ab aliis Astris debite dimensus sum : prout hâc quoq; die obtigit, ex-cepto, quod Tubospicillo illo longiori, quod transvehi haud potuit, minimè illum instraverim. Caput, ut ut in oculos satis adhuc incurrit, pallidum tamen & subobscurum, minusq; ratione diametri, apparuit. Cauda verò insigniter longa  $18$  circ. grad. ; sed ad cuspidem valde debilis & attenuata, ad supremam & secundam ferè in armo Tauri, projecta est. In distantiâ  $7$  grad. à corpore, binæ vicissim Stellulæ, alterâ à parte superiori, alterâ à parte inferiori caudæ conspectæ sunt : hæc, in fronte erat occidentalis Ceti, illa incognita quædam. Versabatur eo tempore in  $1^\circ 20'$  Tauri, Latit. Aust.

Et hoc die  
Stellulæ diver-  
se Cometam  
stipabant.  
  
Quantus fue-  
rit motus diur-  
nus die 11 Ja-  
nuar.

Cœli, ubi aliquot annis continua nova Stella hæsit in collo Ceti, culminaverit : quæ autem toto anno præterito hucusq;, quod mirandum, nondum se se conspicendum præbuit. Cùm tamen quotannis minimum semel diversâ magnitudine, prout in Historiâ nostrâ, de eâdem Stellâ editâ, legere est, illu-xerit. Ultimum namq; à me observata est, anno 1663 sub initium Septemb. quandoquidem  $18$  Mensis Augusti ejusdem anni æqualis adhuc visa est illi in ore Ceti ; adeò ut totis mensibus  $18$ , & amplius planè inconspicua man-ferit. Utrum nunc rursus aliquando proditura sit ; an verò perpetuis tenebris se devoverit ? tempus docebit.


Nova Stella  
in collo Ceti, sin-  
gulis annis  
hættenus con-  
spicua, jam in-  
tegro anno, &  
amplius plane  
delituit.

Die 12 Januarii, semel quidem inter nubes Cometa emicuit, sed pro-tinus à nubibus abreptus est, ut nihil certi Instrumentis deprehendi potuerit;

quan-


Cometa observatus à Joh Hevelio.

Die 6 Januarii.




52

Die 7 Januarii.




53

Die 9 Januarii.



54

Die 27 28 30 Januarii.



21

Die 2 Februari.



22

Die 3 Februari.



23

Die 4 Februari.



24

Die 12 Febr.




25

Die 18 Februarii.



Die 14 Februarii.



27

Die 18 Februarie.



26

B 3

Die 23 Januar.



20

Autor delineavit et sculpsit.

Fig. B.

६६

86

quamquam sufficienti lumine præditus, nec non caudâ, cum primis circa educationem ad septem, octove grad.; circa apicem verò mirum in modum tenuis, & rara erat, cuius tota longitudo tamen  $20^{\circ}$  æquabat. In meditullio clara Fixa emicuit, in fronte scilicet occidentalis Ceti, ea ipsa, quæ pridie à superiori parte ei adhæsit. Cùm igitur nullas distantias à fixis hâc vice obtinuerim, locum ejus accuratè indigitare non usq; adeò promptum est. Attamen ex motu ejus diurno, anguloq; inclinationis constat, Cometam degisse in  $0^{\circ} 40'$  Tauri, & in Latit.  $2^{\circ} 40'$  Aust.; sic ut Eclipticam nondum attigerit, nec Arietem subintraverit. Ad quod utrumq; observandum quidem perquâm fui avidus; sed adversa aëris tempestas prorsùs obstitit. Ad diem enim 17 usq; nihil quicquam ob continua nubila observatum est. Animadversi tamen sunt tribus continuis diebus circa vesperam Parelii, cum suis variegatis circulis; qualia phænomena, item Halones, Coronæ Lunares, ac ejus generis aërea meteora in horizonte Gedanensi sâpiùs notata sunt. Die 16 Januarii, mane, oriente Sole Deliquium Solare, (quod sine omni dubio hîc apud nos ex parte conspicuum extitiset, ut ut Ephemeridum Scriptores alto silentio istud præterierint, pariter ac alterum illud, quod anno 1664, die 28 Januarii ad  $5\frac{1}{2}$  digit. hîc à me observatum est) avidissime quidem exspectavi; sed pariter turbidum cœlum hoc insigne spectaculum nobis invidebat.

Die 17 verò vesperi, denuò ex sententiâ successerunt omnia. Ope Telescopii ipsum corpus Cometicum abundè adhuc erat conspicuum, quamquam amplitudine aliquantò diminutum, tum riori & tenuiori materiâ præditum: sicuti effigies ad Num. 16 exhibit. Cauda subobscurus rarissimis ac radiis divaricantibus (sed cœlo non admodum defæcato) constabat 8 circ. graduum; quam ad oculum Boreum Tauri exporrigebat. In quâ rursùs plurimæ Stellulæ lucidissimæ passim occurabant; inter quas capiti proxima, vix  $30'$  vel  $40'$  remota excelluit: Cometâ commorante in Long.  $28^{\circ} 20'$  Arietis & Latit.  $1^{\circ} 0'$ , sed Boreali. Etenim Eclipticam jam transgressus erat, meo calculo, die 16 Januarii sub Meridiem, in  $29^{\circ}$  ferè Arietis. A die 10 ad 17 usq; cursu suo  $6^{\circ} 14'$  confecit: exinde motus diurnus posterior deprehenditur fuisse tantùm 38 minutorum.

Die 18, Cœlum nobis minimè arrisit; atvero die 19 Januarii, cadente Sole, observationes rursùs continuatæ sunt. Caput, et si multùm decreverat, tamen paullò ferè lucidius, quam diebus aliquot præcedentibus se se obtulit; id quod immotis oculis intuenti, limpidissimo ac liquidissimo et si aëre, per intervalla modo clarius, modo aliquantò obscurius apparuit, ac si scintillaret, radiosq; recentes subinde ejiceret: prout etiam aliis diebus deprehensum est. Situm autem nucleorum, materiæq; interioris, facies sub Num. 17 monstrat. Cauda insuper debilis & circa cuspidem valdè attenuata & sparsa, 8 grad. tantùm extitit; in quâ pariter frequentes radiationes & vibratio-nes notatæ sunt. Longitudo Cometæ animadversa est  $27^{\circ} 40'$  Arietis, Latit.  $1^{\circ} 45'$  Bor. Asc. R.  $25^{\circ}$ , Declin.  $12^{\circ} 36'$  Bor. Altitudo verò Meridiana hâc die quidem, sed vix ac ne vix obtenta est: eò, quod adeò tempestivè horâ vespertinâ  $5^{\circ} 30'$ , primo scilicet crepusculo culminaverit, ac visum penè

*Caudam quidem prælongâ, sed circa apicem admodum tenuem, & raram exhibuit.*

*In ipso principio Tauri, sub Latitud. adhuc Australis Cometa animadversus est.*

*Tribus continuis diebus Parelii ab Autore conspecti sunt.*

*Vt ut nullius Eclipticos Solares in Ephemeridibus facta fuerit mentio; tamen hic Daniisci quædam extitit.*

*Caput cauda que magis magisq; diminuabantur.*

*Diversæ Fixæ in coma denuò conspicue.*

*cometa in Arietate sub latitudine jam Boreali versabatur.*

*Quando & quo gradu Eclipticam transcederis.*

*Caput & cauda per intervalla scintillare, radiosq; quasi vibrare videbantur.*

*Altitudo Meridiana die 19 Januarii ultimum ab Autore observata est; & quare?*

*Motu suo tan-  
tum semigra-  
dum uno die  
peregit.*

suâ exilitate & debili colore illusserit. Exinde, cùm de die in diem culminationem anticipaverit, haud amplius ab hâc die, hîc in nostro horizonte culminare visus est. Atverò Occidentaliores utiq; illum diutiùs in meridie observare potuerunt. Ratione motûs proprii, jam ad tantam redactus erat lassitudinem, ut à die 17 ad 19 usq; tantum 1° 4' trajecerit: provenit igitur pro motu diurno ultimo 30'.

*Vt ut exiguo  
corpo, coloreq;  
debiliori, tame  
optimè Instru-  
mentis Come-  
tam rimatus  
est Autor.*

Die 20 Januarii vesp. horâ 7, Luna etsi ad 20 grad. propemodum ab horizonte elevata, ac vix ultra 35° à Cometâ eset remota; nihilominus perspicuè in sensum cecidit, ut accuratiùs hactenus nunquam observari Instrumentis potuerit. Caput tamen valde erat diminutum, coloreq; longè debiliori & pallidiori micabat, caudâ pertenui & albescente 7 circ. grad., ad Stellam præcedentem in collo Tauri, sub Plejadibus, Hellespontum videlicet versus exorrectâ. Quæ Coma, etsi occumbente Lunâ, nil quicquam tamen amplius vel luminis, vel vividioris coloris recuperavit. Commorabatur id temporis in Longit. 27° 25' Arietis, & in Latit. Bor. 2° 12'. In motu verò suo proprio vix hâc die 27' peregit.

*Initio præsen-  
te Lunâ cauda  
tantum duo-  
rum graduum;  
silente verò 4  
grad. visa est.*

Die 21, vesp. Lunâ adhuc altiore, propiore & splendidiore, Cometa nihilo seciùs exquisitè observatus; quanquam Capite minore & obscuriore, tum caudâ breviori, duobus tantummodò gradibus longâ extitit. Luna tamen præsens, maximâ parte, eo tempore istam obscuritatem palliditatemq; Cometæ induxerat. Nam protinus post Lunæ occasum, & caput lucidius & cauda longior, 4 ferè grad., ad primam in eductione Caudæ Arietis directa, observabantur; & quidem in 27° 20' Arietis, in Latit. 2° 36' Bor. confectis in motu proprio, 24 horarum intervallo, 24 minutis.

*Cauda ad pri-  
mam in edu-  
ctione caudæ  
Arietis proto-  
debatur.*

*Cometa in  
conjunctione  
Lune, cauda  
penè prossus e-  
xutus; tum  
corpo adeo e-  
xiguo, atq; te-  
nus apparuit, ut  
negotium face-  
serit prius  
quam rectè In-  
strumentis ob-  
servari potue-  
rit.*

*Telescopio lu-  
stratus, insig-  
nem discum,  
variis nucleis,  
materiâq; di-  
versa præedita,  
sed minimè ro-  
tundum exhibi-  
bit.*

*Quâ viâ in-  
fallibili ma-  
gnitudo discri-  
minata sit.*

Dies 22 Jan. totus extitit nebulosus; atverò die 23, Cœlo arridente, Cometa noster denuò animadversus est; sed cùm Luna ferè bisecta ei immineret, imò in ipsâ Conjunctione, in Latitudine tantum 8° 20' ad Austrum remota, videlicet in 27° Arietis simul cum Cometâ consisteret, corpore admodum tenuis debilisq; ; caudæ verò vix vestigium apparuit: prout ex Figurâ B sub. Num. 20 patet. Attamen rectè Instrumentis diversæ distantiaæ Fixis observari potuerunt; quanquam artis erat per rimulas pinnacidii, eâ diligentiâ, quâ quidem adhuc peractum est, Cometam dimetiri. Quoad popularem adspectum autem, caudâ, ut dixi, penè caruit; attentiori tamen Observatori comam 30' vel 40' Hellespontum versus projicere visus est. At Telescopio consideratus, caput insigni lumine, tum spectabili magnitudine adhuc gaudebat; in sinu suo diversos nucleos, materiamq; diversæ densitatis fovens, lumine debiliori cinctam. Discus autem, quod notabile, minimè absolutum præ se ferebat rotunditatem, sed asperam, laceratamq; , cuspidibus hinc inde leviter eminentibus. Cujus magnitudinem ut exquisite hâc vice explorarem, comparationem institui inter partem ejus interiorem, lucidiorremq; , remoto omni capillitio, & rariori isto lumine, quo cingebatur, Maculasq; Lunares; id quod convenienter in tam arctâ conjunctione præstare in expedito erat. Accuratâ itaq; inspectione ac contemplatione, deprehendi partem istam Capitis luminosiorem justè superiori parti, Ponti scilicet Euxini semissi,

semisī, nimirūm à Catenâ Mundi, ad Insulam Apolloniam usq; , sex minuta prima subtendenti æquiparari posse. Commorabatur in  $27^{\circ}$  Arietis, in Latit. Bor.  $3^{\circ}$  : motu proprio, duobus diebus  $41'$  consumperat ; sic ut à die 22, ad 23, tantum  $19^{\circ} 30''$  emensus fuerit.

*Qualis Comète situs, quantusq; ejus motus extiterit.*

Die 24, 25, & 26 Januar. continuò subobscuræ noctes extiterunt. Proinde ante diem 27, hor. 8 vesp. nullus Cometæ concedebatur adspectus ; imò etiam hâc vesperâ , tantum per intervalla , & cœlo haud usq; adeò sudo Cometa emicuit, ut laboris artisq; fuerit Cometam Sextante accuratè rimari ; præprimis Lunâ incurvatâ, majori lumine imbutâ, ac altioribus Signis, in viciniâ , hærente. Nihilo tamen segniùs unicam distantiam à Mandibulâ Ceti acquisivi, ex quâ cognovimus, spatio quatuor præcedentium dierum  $1^{\circ} 1'$  progressum esse ; tam lineam istam rectam ex secundâ per primam Arietis ducam, Eclipticam versùs jam transcendisse, atq; nunc in  $26^{\circ} 40'$  Arietis & Latit. Bor.  $4^{\circ}$  hærente. Per tubum verò contemplatus, antecedentis diei ferè faciem, luciditatem nempe & magnitudinem referebat ; quod autem, quâ nudum adspectum, tantâ obscuritate præditus, tum omni caudâ penitus orbatus, videretur , Lunæ potissimum adscribendum est.

*Luna quamvis plusquam dimidiata extiterit ; nibil emirus tamen Cometa recte Organis detestatus est.*

Die 28 Januarii , circa hor. 6, ut ut cœlo admodùm annuente , adeò tamen imminutus pallidusq; inermibus videbatur oculis, quò vix agrè per rimulas pinnacidiorum deprehendere Cometam potuerimus. Veruntamen nonnullæ distantiae extorsæ sunt : ex quibus didicimus, à 23 hucusq;  $1^{\circ} 20'$  transasse ; existente videlicet in Longit.  $26^{\circ} 30'$  Arietis, & Latit.  $4^{\circ} 12'$  ferè. Quali verò facie interior pars capit is tum resplenderit, delineatio ad Num. 21 Fig. B apertè ostendit.

*Cometa omnis caudâ erbarus extutus.*

Die 29 Januar. ob continuas nubes nihil animadversum. At die 30, semel quidem inter nubeculas conspectus ; sed lumine nimis pallido & obscurò, tum exutus omni caudâ : ob Lunæ plenæ, ut arbitror, præsentiam ; ut nihil penitus certi annotari concessum fuerit. Quemadmodum etiam die 31 Januar. & 1 Februar. accidit.

*Cometa adhuc quotidie motu retrogradando incersit, sub Latitudine semper majori.*

Die 2 Febr. Sole occumbente, cœlo rursùs perquàm sereno vesp. horâ 5, non solùm Venus & Mercurius, sed & Cometa prosperè detectus est. Quippe , Lunâ nondum ortâ egregiam vicissim speciem ostendebat , ut ex animi sententiâ omnia successerint. Animadvertisimus itaq; à die 23 Januar., ad 2 Febr. phænomenon trajectione suâ  $2^{\circ} 8' 25''$ , & hâc die ultimâ, vix  $8'$  esse promotum ; in Eclipticæ verò Longit.  $26^{\circ} 20'$  Arietis, & Latit. Bor.  $5^{\circ} 8'$  versari. Videbatur, quoad Longitudinem , quasi jam Stationem iniisse, & paullo amplius vix procedere ; in tramite autem suo , sensim adhuc ulterius progrediendo, atq; motum proprium maximè in latum protendere. Caput in claritate , nihil penitus , ratione simplicis adspectûs, primæ Stellæ Arietis cedebat, quanquam magnitudine illam multò superabat. Tria namq; minuta, imò quatuor ; ope Telescopii æquare, tum capillitum penè totum exuisse, notatum est. Materia item interior , ut ut lumine superq; adhuc vivido gauderet, rario tamen, nucleis illis densioribus ferè deletis omnibus se se obtulit. Præterea ad dextram capit is sursum binas conspeximus Stellulas, quæ

*Quibus diebus, & quare omnino rotundus apparuerit, atq; adeò debili lumine & corpore diminuto, ut nullo modo per rimulas pinnacidii observari potuerit.*

*Cometa revisicit*

*Cometa ratione Eclipticæ ferè stationarius, tum motu tardissimo in suo orbe progrede deprehensus est.*

*cometa claritate non absimilis Stellæ 4 magn. sed magnitudine multo maior.*

*Magnitudo di, ci Cometicæ capillitio prorsus nudatus.*

*Dispositio corporis interioris.*

*unâ*

unâ diametro Cometæ, tam à se invicem, quâm inferior à Cometâ removebantur: sicuti sub Num. 22 delineatum dedimus. Dein Caudam  $2\frac{1}{2}$  graduum, imò trium & amplius inter vibrandum, sed pertenuem & rarissimam, nec adeò divaricantem, ad Stellulam in collo Arietis sub cornu, 5 magn. cuspidi ejus, tum temporis quasi adhærentem protrusit. Fuisset procul dubio aliquantò lucidior & spisior, nisi Venus clarissimam suam lucem ad Cometam usq; exporrigens, tum crepusculum impedimento fuisse.

Die 3 Febr. vesp. hor. 7, tranquillo admodum aëre, corpus Cometum tam nudis, quâm armatis oculis conspectum, eandem ferè speciem hæternam referebat, crinibus adhærentibus penè omnibus exutam; sic ut interior & clarius discus tantum in oculos incurreret. Coma non minus 3 grad. ad eandem ferè Stellam in collo Arietis sitam projiciebatur, quæ in ejus apice, ut pridie emicabat. Ultra hæc, multò jucundissimum spectaculum hâc die Telescopio detectum est: binas nimirùm illas Stellulas pridie ad dextram Cometæ obvias, nunc ipsissimo limbo ejus orientali adhærere; inferior & lucidior vix totus exiverat; alter minor & superior adhuc maximâ parte sub tenuiori materiâ Capitis adsitâ latebat, ut ea propter etiam minor & subobscuringa videretur. Ex quibus colligere est, inferiorem à Capite Cometico planè tectam fuisse, alteram superiorem verò minimūm limbū strinxisse. Optassem itaq; illas potuisse aliquot horis citius observari; quò certò constaret, an istæ Stellulæ omnino à corpore Cometico obtectæ, an tantum obumbratae vel obscuratae fuerint: atq; sic de capitis densitate & tenuitate aliquid certi pronunciare liceret. Quemadmodum etiam hocce phænomenum ad diversorum horizontum parallaxes, absq; omni prolixiori calculo eruendas: an nimirùm aliquam, an nullam habuerit Cometa, si in aliis benè à nobis remotis Regionibus rectè observatum est, multum conducit. Quin-etiam hoc ipsum phænomenum optato mihi accidit, quod ex eo amplitudinem diametri Cometici exquisitissimè, absq; omni periculo aberrandi, determinare potuerim. Nam, cum ex diversis distantiis, in primis à Mandibulâ Ceti, & Capitis Andromedæ deprehensum sit, spatio 24 horarum tantum 5° 30' Cometam progressum esse; non minùs ex antecedente observatione liquidum sit, unâ diametro Cometam à binis illis ortum versùs distitisse; nunc verò in ipso limbo Orientali residere: consequitur necessariò Cometæ diametrum

*Corpus Cometum omni caudam satis notabilem ostendit.*

*Binæ Stellulae in ipsissimo Comete limbo notatae sunt.*

*Eiusmodi occultationes per quam utilis sunt ad parallaxes cognoscendas.*

*Ex harum*

*stellarum fitu*

*diametrum Co*

*mete rite ex*

*ploravit Autor.*

*Cometa nul-*

*lum planè mo-*

*tum ratione E-*

*clipticæ sed*

*latitudinis tan-*

*tum ostendit:*

*fuit ergo in E-*

*cliptica statio-*

*narius.*

*Nudis oculis*

*quidem minor*

*& obscurior;*

*Telescopio ta-*

*men fere idem*

*apparuit.*

Die 4 Febr. horâ 7 vesp. tum caput pallidius, tum cauda, quanquam eadem longitudine, extitit obscurior; ob aërem tamen, ut puto, paullò spisior. Siquidem Tubo optico eandem adhuc referebat faciem; nisi quod lumen illud rarius, sive hirsutum capillitum jam penitus exuisset. Binæ illæ Stellulæ, quæ pridie limbo prorsùs adstabant, à Cometâ modò unâ ejus diametro removebantur; hoc est, 3 vel 4 min. Unde iterum iterumq; certiores reddimur

reddimur de quantitate dimetientis. Nam motu proprio vix ultra 4 min. hâc die progressus est. Quæ magnitudo item ex motu proprio inter 2 & 4 Febr. deprehenso omnino obtinetur, ut cuilibet experiri promptum est. Cùm igitur abundè constet, Cometam 24 horarum intervallo, tantùm 4', vel summùm 5' & quidem sursum secundùm Latitudinem se promovisse, uti- què in proclivi est, Longitudinem ejus vix quicquam variatam esse; sed stationarium secundùm Longitudinem penè extitisse; Latitudinem vero Bor. ad 3' auctiorem evasisse; hoc est, 5° 16'. Subolet igitur in tramite suo haud posse hunc Cometam, hâc trajectione fieri Stationarium; sed solummodò respectu Eclipticæ, prout ex sequentibus Observationibus abundè elucet.

Quod superest, ut ut vel maximè proximis observationibus inhiaverim, ut rectè in progesu apprehenderem, quomodo Cometa iter suum suscep- tum, ac hucusq; perductum; hoc est, sub quo angulo, vel potius quâ incur- vatione, tum quam Cœli partem versùs istud reflectat: non ignorans, quan- tum intersit Cometographiæ, omniumq; eorum qui naturam motumq; ta- lium Siderum temporaneorum scrutantur, hoc ipsum funditus cognoscere: præprimis, cùm nemo tam Veterum, quam Recentiorum similem incessum vel animadverterit, vel animadvertere exquisitè unquam ipsis obtigerit; imò, si non aliter saltem Telescopio id liceret, exoptavi. Verùm, equidem nec die 5, 6, 7, 8 & 9 Febr. ob continuas nives, aërisq; turbulentum statum id impetratum est.

Atverò die 10 Febr. vesp. horâ 7, etiamsi propter vapores nudis oculis Cometam adspici haud concessum fuerit, tamen Telescopio illum quæsi- tum ivi, ac tandem etiam feliciter detexi: à duabus nimirum illis Stellulis, quibus die 2 Febr. adhæsit, jam ad gradum integrum elongatum esse; id quod ex aperturâ Tubi istius, quæ omnino gradum integrum aliâ subtendit, planissimè nobis innotuit. Motus autem curriculi sui penè totus, secundùm Latitudinem, deflectendo leniter ad cornua Arietis, Polumq; Eclipticæ ver- sùs, se se extendebat, vix notabili spatio secundùm Longitudinis ductum; quantum videlicet ex solo adspectu & conjecturâ, denegatis omnino distantiis à Fixis, dijudicare dabatur. Nam omnino justè id ipsum determinare hâc vice haud potest: cùm ne quidem nudis oculis ad Fixas situm ejus aestimare datum fuit. Videbatur itaq; 26° 40' Long. & 6° 20' ferè Lat. Boreal. oc- cupare. Ex quibus liquidum est, Cometam jam motu incedere directo, vi- amq; suam nunc reflectere, sub insigni itineris incurvatione, Caput Arietis versus; ac si totum istud Sidus peragrare constituisset. Num res autem ita omnino evenerit, subsequentes observationes ostendent.

Die 11 Februarii nubilum Cœlum obstitit, quò nihil penitus observatum fuerit. Die verò 12 vesperi, etiamsi Cœlum undiq; extiterit sudum; nihilominus tamen Cometam diu multùmq; quæsivi, priusquam in oculos in- curreret; id quod partim crepusculo vividiori, partim lucidissimæ Veneri phænomeno appropinquantì initio adscribebam: prout etiam non adeò abso- num esse videbatur. Potissima tamen ratio hæc erat, quod à die 4 Februarii, ubi ultimùm Sextante illum rimatus eram, tam lumine, quam corpore mul-

In longitudine  
nil quicquam  
procesu Come-  
ta; sed motum  
sui tramitis,  
qui erat die  
tradicimus in  
latum protra-  
xit.

Cometa nostra  
non factus est  
Stationarius in  
suo itineris du-  
ctu.

Rei magni  
momenti est re-  
tæ cognoscere,  
sub quâ incur-  
vatione iter Co-  
metæ refle-  
ctant.

Quâ ratione  
Telescopii be-  
neficio locus Co-  
metæ depre-  
hensus fuerit.

Cursum jam  
inflebat Cor-  
nua Arietis  
versus.

Quo loco cœli  
resederit Come-  
ta.

Quid cause  
fuerit, quod Co-  
meta die 12  
Febr. tardius  
solo sub ad-  
spectum vene-  
rit.

*Cometa valde obscurus & pallidus.* tūm decreverat. Proinde primūm horā  $6\frac{1}{2}$  in conspectum prodiit, quamquam corpore admodūm diminuto, pallido ac subobscuro, ut vix Stellæ illi in collo Arietis sub Cornu quintæ magnitudinis æquiparari tum potuerit. Arietis itaq; & laboris erat, Cometam debitè tunc dimetiri; nihilo tamen segniùs longè accuratiùs, quām ab exordio putaram, eum dimensus sum, sed caudā omni orbatum: attamen transversis oculis attentè consideratus, radiolum quendam pertenuem & obscurum, primam Arietis & collum versùs spargere videbatur. Quoad situm haud parūm ad eandem Arietis ascenderat: cum *Situs Cometae.* quā & collo sub cornu triangulum ferè æquicrurum constituebat; cujus basin Cometa & Stella in collo, reliquæ vero binæ distantiaæ; utpote à primâ Arietis ad Cometam & collum, crura referebant; ita ut ducta recta per secundam & primam Arietis, in basis medium incideret. Id quod utiq; jucundum erat adspectu, nec non dignum notatu. Quandoquidem ex positu harum Stellarum, etiamsi præterea nullas obtinuissem distantias (quarum tamen adhuc diversæ: utpote à Mandibulâ Ceti, Capite Andromedæ, Palilio, & sinistro pede Persei impetratae fuerunt) satis præcisè locus Cometæ detegi potuissest. Ex ipsis igitur quatuor intercapelinibus situs Cometæ inventus est in Longit.  $27^{\circ} 0'$  Arietis, & Latit. Bor.  $6^{\circ} 30'$ . Motu itaq; proprio in suâ viâ itinerariâ promotus est, à 2 Febr. ad hunc 12 Febr.  $1^{\circ} 45'$ . Ex quibus elucet, quòd motu jam incescerit multò velociori, ut uno die  $13'$  confecerit, sub suo ductu scilicet incurvato: incurvato inquam; siquidem cursum suum planè nunc inflectebat in directum secundùm seriem Signorum, caput Arietis versùs, cùm antea constanter motu retrogrado progressus fuerit.

*Cometa directus, jam cursum incitabat.* Quo loco dis- Die 13 Febr. vesp. ob evaporationes aëris aliquantò crassiores, Cometam quidem nudo adspectu, tum Instrumentis rimari haud potuimus; Tubo tamen distinctè deprehensus est, uno gradu, vel paullò plus adhuc à primâ Arietis distare; sic ut in  $27^{\circ} 13'$  Arietis, in Latit.  $6^{\circ} 35'$  Bor. hæserit; atq; motu proprio 24 horarum spatio  $14'$  procescerit.

Die 14 Febr. horā  $6^{\circ} 30'$  vesp. ob nubila, non nisi unicam distantiam à Mandibulâ Ceti dimensus sum; ex quā autem solâ, non usq; adeò accurate locus Cometæ hujus diei nobis innotuit. Caput, quod attinet, valdè quidem, quoad nudum adspectum tenue & obscurum; nihilo tamen minùs satis conspicuum, ut adhuc probè Instrumentis, nisi adversa tempesta obstitisset, observari potuissest.

*Cometa die 18 Febr. ubi nam tandem seriat perevestigatione detectus fuerit.* Die 15, 16, & 17 nihil animadvertisimus; die verò 18, horā 7 vesperi Cœlo inclarescente, Cometam sollicitè quæsitum ivi, & quidem in omni cœli parte, ubi versari tum temporis putabam; sed nusquam sanè repertus est, ut ut omnes oculorum nervos intenderim; de quo autem valdè mirabar. Non ignorans enim, quòd quatuor dierum intervallo, & quidem silente Lunâ, non posset adeò prorsùs fieri invisibilis, vel à Venere & crepusculo tantoperè obnubilari, ut etiam prælongum, atq; excellentem Tubum Opticum omnino eluderet. Idcirco iterum iterumq; Cometam explorare aggressus sum; quem etiam tandem feliciter detexi; sed eo loco, ubi illum extare haud sperassem: nempe prope ipsam primam Stellam Arietis, atq; ad ejus sinistram, medium scilicet

scilicet capit̄ Arietis & Pleiadas vers̄us, vix 5 vel 6 min. ab eā Stellā primā remotum. Eatēnus, ut hāc ratione iter suum carpserit, sine omni dubio, per dictam modō Stellam, eamq; uti ex cursu colligere dabatur, planē circa meridiem hujus diei texerit. Utinam verò hāc ipsa conjunctio aliquantō tardius incidisset, quō simul transitum, vel Eclipsin illam notabilem, rei Cometographicæ bono, exquisitè annotare nobis obtigisset; num ab aliis Orientalioribus in Chinā, vel alibi degentibus, observatum id ipsum sit, valdē dubito. Cognito itaq; loco Stellæ primæ Arietis, datur pariter situs Cometæ. Nam, quia Cometa tantūm 5' promotior secundūm seriem Sign., & ratione latitudinis tantūm 2' altior ipsā Stellā erat. Hinc Longitudo phænomeni patefit in 28° 37', atq; Latit. 7° 10' Bor. Manifestum igitur est, Cometam magis magisq; in motu suo directo perrexisse, & quidem à 12 ad hunc 18 Febr. 1° 40' sive 1° 42'; sex scilicet diebus ferè tantum cœli spatiū emensus, quantum præcedentibus decem à 2 ad 12 Febr. Atq; ita motus diurnus, ultimò observatus extitit 21'; cùm die 4 Febr. tantūm 5' procederet. Respectu capit̄ erat pallidisimus; nihilominus 2' circ. in diametro; sed caudā prorsū exutus: prout sub Schemate B, n. 28 eum delineavimus.

Die 19 Cœli tempestas nihil quicquam permisit annotare; atverò die 20 Febr. dehiscentibus nubibus deprehendi quidem jam à primā Arietis eum discessisse; verū ubinam reverā eo tempore commoraretur propter nubeculas incurentes & subseqüentes crashores evaporationes animadvertere haud licuit. Ab hāc die, 7 Martii usq; Cœlum continuè obscurissimis nubibus obiectum fuit, ut ne quidem per horulam serenitas affulserit; hoc verò die vesperī, hor. 8, sed vix per quadrantem unius horæ, Cœlo prorsū depurgato, Cometam quidem omni diligentia inter Astra quæsivimus; sed nusquam planē eum deprehendimus; adeò ut tum visum omnino eluderet; omniam, sine dubio, distantiam, corporisq; tenuitatem, ut amplius à nobis haud fuerit conspectus.

Hāc sunt, quæcunq; hīc Dantisci, Divinā affulgente ope, de hoc Cometā observare nobis licuit; non quidem ipsæ Observationes Sextante & Quadrante Orichalcicis amplissimis, debitâ sollicitudine & diligentia captæ, quæ ultra 450 excurrunt, atq; in ipsam Cometographiam reservantur; sed ea foliummodò ratione, quā Cometæ loca, beneficio majoris globi, motumq; proprium ex distantiis deduximus. Quæ tamen nihilo seculis, ut puto, satis sunt accurata: prout suo tempore calculus noster docebit.

Supereft igitur, ahtequam in gratiam Cupidissimorum Astrophilorum, sed breviter nonnulla in Cometarum negotio disquirere incipiamus, ut loca Cometæ, ad singulos dies, quibus à me observatus est, in Tabellam ordine referamus, tam secundūm longitudinem, quam latitudinem; quō uno statim intuitu, motum progressumq; Cometæ comprehendas. Scias autem, quod loca Cometæ ad eam ipsam horam, quam observata sunt, non attentis diversis dierum temporibus, cùm hāc vice nihil prorsū intersit, tradita sint. Hincq; etiam ad intermedios dies, quibus à nobis haud detectus est Cometa, ejus lo-

Cometa, pri-  
mam Stellam  
Arietis, sine o-  
mni dubio pla-  
ne texit.

Quali gradu  
incesserit, &  
quali facie ap-  
paruerit.

Cometa non  
amplius con-  
spectus est.

Quot observa-  
tiones hujus Co-  
metæ, majori-  
bus Instrumen-  
tis Autor acqui-  
siverit.

Quæ ratione  
Longitudines  
& Latitudines  
Cometæ nunc  
exhibeantur.

ca prorsus omisimus: quanquam in proclivi fuisse, debitâ proportione ea explere; verum, cùm ad satietatem prolixè & exquisitè in Cometographiâ nostrâ, Deo annuente, ea omnia exhibere proposuerimus, hoc loco superflua esse arbitramur.

Non minus motum Cometæ proprium hîc annexamus; primùm nudum, ut in dies observatus est; deinde, sub peculiari etiam Tabellâ ad omnes & singulos dies totius apparitionis, tam horariorum, quâm diurnum, & quidem ab horâ 8 vespertinâ cuiusvis diei incipiendo, quò eò exquisitiùs gradus velocitatis, & tarditatis cuilibet innotesceret, omnisq; confusio ex diversis temporibus matutinis & vespertinis alias oritura planè evitaretur. Ubi notandum est, quòd motus horarius omnium diuin, in subsequentे Tabellâ, sub æquali omnino motu fuerit exhibitus; cùm tamen reverà inæqualis extiterit, si rem accuratè perpendas. Siquidem motus continuò aut crevit, aut decrevit; id quod in iis

*De motu Cometæ diurno & horario.*

*Motus horarius reverà extitit inæqualis.*

Tabula Longitudines & Latitudines  
Cometæ exhibens; ad eos scilicet dies, quibus ab Autore Sidus istud Crinitum observatum est.

	Anno 1664	Hora.	Longitud. Com. Gr. Min. Sig.	Latitud. Com. Grad. Min.
Die	14 Decemb.	5 mane	8 ° 22' 22"	Aust.
	15	5	7 20 22	A.
	18	4	3 45 25	30
	21	4	28 ° 30 0	0
	23 Decemb.	4	22 ° 34 30	A.
	28	2 mane	4 ° 49 30	
	29	9 vesp.	28 40 47 0	ferè.
	30	9	12 40 40 10	
1665	31 Decemb.	9 vesp.	2 40 34 0	A.
	1 Januarii	9	24 20 27 45	
	3	9	14 20 19 0	
	4	9	11 0 15 20	
	5	7 vesp.	8 40 13 0	
	6	7	7 0 10 36	
	7	7	5 30 8 36	
	9	7	2 50 5 40	
	10	7 vesp.	2 ° 4 40	
	11	7	1 20 3 30	A.
	17	7	28 20 1 0	Bor.
	19	7	27 40 4 45	
	20	8 vesp.	27 25 2 12	Bor.
	21	7	27 20 2 36	
	23	7	27 0 3 0	
	28	7	26 30 4 12	
	2 Febr.	7 vesp.	26 20 5 8	Bor.
	3	7	26 19 5 13	
	4	7	26 19 5 16	Stat.
	10	7	26 40 6 20	
	12	7 vesp.	27 ° 6 30	B.
	13	7	27 13 6 35	
	14	7	27 27 6 40	
	18	7	28 37 7 10	

Tabula

PRODROMUS COMETICUS.  
Tabula motū diurni, ut observatus est.

21

Mens. dies.	Hor.	Min.	Motus prop. in Orb.		Mens. dies.	Hor.	Min.	Motus prop. in Orb.
	Grad.	Min.				Grad.	Min.	
Anno 1664	14	0 0 man.	0	0	Anno 1665	1	9 0 vesp.	8 54
	15	5 0	0	55		3		12 30
Decemb.	18	5 0	4	10	Januarii	5		8 20
	21	4 30	6	30		6		3 0
	23	5 0 man.	7	0		7		2 32
	28	2 0	38	0		9		3 45
	29	9 30 vesp.	23	40		10		1 31
	30	9 30	12	44		11		1 20
	31	9 30 vesp.	11	10		17		4 54
						19		1 4
						20		0 27
						21		0 24
						23		0 41

Tabula, motum Cometæ diurnum & horarum, incipiendo ab horâ octavâ vesp. ad singulos apparitionis dies, exhibens.

Anno 1664	Mens. Decem.	Motus diurnus.		Motus unius horæ.		Anno 1665	Mens. Jan.	Motus diurnus.		Motus unius horæ.	
		Min.	Sec.	Min.	Sec.			Min.	Sec.	Min.	Sec.
Man. b. 5	14	0 0		0	0		15	47	0	2 0	
Vesp. b. 8	14	0 36		2	20		16	42	0	1 45	
	15	1 6		2	45		17	37	0	1 30	
	16	1 20		3	20		18	33	0	1 23	
	17	1 35		4	0		19	30	0	1 15	
	18	1 51		4	40		20	27	0	1 7	
Decemb.	19	2 10		5	30		21	24	0	1 0	
	20	2 34		6	30		22	21	30	0 53	
	21	3 4		7	40		23	19	30	0 48	
	22	3 49		9	30		24	18	0	0 45	
	23	4 48		12	0		25	17	0	0 42	
	24	6 8		15	20		26	16	0	0 40	
	25	7 48		19	30		27	15	0	0 38	
	26	9 18		23	15		28	14	0	0 35	
	27	10 28		26	10		29	12	30	0 30	
	28	11 28		28	40		30	11	0	0 28	
	29	12 17		30	40		31	9	30	0 24	
	30	12 44		32	0	Anno 1665	1	8	0	0 20	
	31	1 10		28	0						
Anno 1665	1	8 54		22	15	Febr.	2	7	0	0 17	
	2	7 4		17	40		3	6	0	0 15	
	3	5 26		13	35		4	5	0	0 13	
	4	4 29		11	12		5	6	30	0 16	
	5	3 45		9	22		6	7	30	0 18	
	6	3 5		7	42		7	8	30	0 22	
	7	2 30		6	15		8	9	30	0 24	
	8	2 3		5	8		9	10	30	0 27	
	9	1 44		4	20		10	11	30	0 29	
	10	1 29		3	45		11	12	0	0 31	
	11	1 16		3	10		12	13	0	0 33	
	12	1 6		2	45		13	14	0	0 35	
	13	0 58		2	25		14	15	0	0 40	
	14	0 52		2	15		15	16	30	0 43	
							16	17	30	0 47	
							17	19	0	0 47	
							18	21	0	0 52	

*Quâ ratione  
cursus Cometæ  
in Delineatio-  
ne fuerit defi-  
gnatus.*

Exhibit is itaq; his Tabellis, operæ pretium esse duco, ut tramitem dum q; hujus Cometæ ad quasvis observationes à nobis obtentas delineatum demus; secundum scilicet Asterismos Cœlestes Stellasq;; quo eò accuratiū cursum ejus comprehendere ac contemplari possumus; tum innote scat, qualem viam itinerariam descrips erit: atq; sic eò clariū de ejus motu, cursus inæqualitate, statione, & retrogressione disserere non nequeamus. Ty pum autem eâ ratione adumbrare in plano placuit, ut gradus longitudinis & latitudinis, tum circa Eclipticam, tum in vicinioribus Poli locis, ubi jure eò minores, quo remotiores ab Eclipticâ, pro naturâ sphæræ, esse deberent, omnino æquales sint. Eum quidem in finem, ut tantò evidentiū Cometam ejusq; motum diurnum ampliorem, confusionis evitandæ gratiâ, atq; sic dum trum, tramitisq; incurvationem tantò distinctiū repræsentare possemus. Loca verò universa secundum Longit. & Latit. ad eos videlicet dies, quibus hîc Gedani à nobis observata, descripta sunt. At motum proprium, sive interstium inter singulas observationes, quod notes velim, debitâ proportione circino dimetiri haud potes: quoniam secundum longitudinem, in omni latitudine gradus prorsus æquales sunt. Proinde motus iste, ex præcedente Tabellâ, eâ gratiâ adeò accurate exhibitâ, discerni & dijudicari omnino debet.

*Caput & cau-  
da quantum  
fieri licuit, de-  
beti delineata  
sunt.*

*Nudi circelli,  
quid in orbitâ  
Cometæ deno-  
tent.*

Caput & caudam quoq;, non in omnibus observationibus æq; præcisè, quoad Longitudinem & Latitudinem, ob spatiū chartæ nimis arctum de pingere licuit; nihilo tamen minus, quantū fieri potuit, omnia bene nota ta fuere, nec non ad quasnam Stellas, atq; sub quâ deviatione caudam direxerit, tum ubi longiori, rursus breviori, ac etiam prorsus nullâ caudâ fulserit: quanquam hæc omnia ex præcedentibus duobus Iconismis, & ipsâ Historiâ luculentius deprehenduntur. Deniq; nudi illi circelli, in orbitâ delineati, loca Cometæ ad eos dies, quibus hîc Gedani à nobis observari haud potuerunt, ad proportionis ductum superioris Tabellæ motus diurni, horam scilicet octavam cuiusvis diei vespertinam, referunt: quo sic continua serie, cursus Cometæ plenè oculis omnium subjiciatur, atq; eò perfectius proportio velocitatis, ubi nimirūm velocissimus, quâ ratione motu decreverit; ac deniq; ubi stationarius, simul directus fuerit, percipiatur: atq; ita omnibus constet, diversa omnino proportione, contra quā plurimi sustinent, tum etiam typis jam evulgarunt, in suo tramite incessisse.

*Vtrum bini  
Cometæ diver-  
si; an vero tan-  
tummodo uni-  
cus Cometa à  
Mens. Dec. ad  
Martium ferè  
usq; fuerit con-  
spicuus.*

Ex his igitur, quæ sati prolixè superioribus pagellis à primo Cometæ extortu ad interitum usq; enarravimus, atq; sub certâ designatione delineavimus, promptum est nulli non, rerum Cœlestium Scrutatori intelligere, etiam remotâ omni ambage, & fusiore demonstratione; utrum bini diversi; an vero tantum unicus Cometa extiterit, qui à principio Decemb. ad 18 Febr. conspectus fuit. Multi quidem Eximii Viri, principiò sibi persuaserunt, quia quotidie, ad Austrum, horizontem versus, caudâ procerissimâ ad occasum ex porrectâ, altitudinemq; suam Meridianam continuo diminuendo, cursum de properabat; postmodum verò rursus, præsertim à die 30 & 31 exutus ferè omni comâ, de die in diem plus plusq; ascendebat, motu, ut putabant, ferè contrario, duos extitisse diversos; quorum prior matutino, posterior ve-

*Quibus de  
cauſis nominali  
arbitrati fue-  
rint, duos ex-  
titisse diversos.*

z	o	o	z	o	o	z	o	o	z
z	o	o	z	o	o	z	o	o	z
z	o	o	z	o	o	z	o	o	z

*z*

CVR SVS COMETÆ ANNO 1664 ET 1665 A DIE 14 DECEMB. AD DIEM 18 FEBR.

## **GEDANI,**

OBSERVATVS, DELINEATVS, ÆRIQVE INCISVS,

A

JOHANNE HEVELIO.




CARSAS COMETAE ANNO 1647 ET 1651

OBSERVATORIS DININGERI

A.

JOHANNES



spertino apparuerit tempore. De quo tamen non est quod mireris. Nam sicuti vix paucis quibusdam, statim initio apparitionis angulus Orbitæ & Eclipticæ innotuit, nec ipsum corpus Cometum, continuo ordine, singulis diebus observare licuit, tum etiam nonnullos, sine dubio, latuerit, Cometas cursum suum propemodum sub circulo maximo absolvere: idcirco proclive fuit circa Cometam aberrare, ut licet revera unicus tantum extiterit, duos tamen diversos statuerint. Atvero iis, quibus angulus modò dictus illico innotuit: quemadmodum mihi quoq; altera statim observatione, die 15 Decemb. dicto scilicet angulo accurate descripto, in globo trium pedum ferè quo ad diametrum magnitudine, confessim nobis patuit, quem ductum cursu suo posthac constanter sequeretur, tum non nisi unicam eandemq; esse Stellam comatam, quæ exeunte anno 1664, nec non anno 1665 inchoante, à toto ferè mundo fuerit conspecta. Exinde expeditum nobis erat progressum ejus, velut jam suprà memini, prædicere Amicis: prout etiam olim jam circa Cometam anno 1652, & 1661 id ipsum feliciter præstitimus; ut ii norunt, qui nobis tum adfuerunt, vel quibus perscriptum est.

Vnde Auctori  
ab ipso statim  
initio consti-  
rit, quem cœli  
duum, toto  
durationis te-  
poreCometa ar-  
riperet.

Tramitem autem Cometarum soliti sumus hâc ratione describere, aut ad ductum alicujus Quadrantis, quo altitudines sub circulo verticali alias in globis depromuntur; descriptâ scilicet certâ sectione circuli maximi, per duo triave observata Cometæ loca, in globo jam eâ gratiâ notata: vel diri- gendo globum eatenus, ut dicta illa tria Cometæ loca Horizontem omnino stringant; id quod vel ex solâ globi circumvolutione, vel variatâ insuper elevatione Poli, vel Æquatoris prosperè succedit; ut sic circulum istum maximum, sive totum propemodum itineris Cometici cursum, ad ductum Horizontis adumbrare exquisitè possis. Exempli gratiâ: in hoc nostro Cometâ, elevetur Polus Arcticus simpliciter ad  $60^\circ$ , vel Æquator ad  $30^\circ$ , constituto simul nono Eclipticæ gradu Leonis, sub ipso Meridiano culminante, res omnis expedita est, atq; tum orbita Cometæ ab omni parte Horizontem prorsus stringit, quò sic illum ipsum tramitem plumbagine, vel alio quodam colore depingere tutò non nequeas. In quo circulo postmodum motus quovis diurnos describere, etiam ex unâ solâ distantia Cometæ & alicujus Fixæ, si plures impetrari interdum nequeunt, satis accurate, quâvis die, locumq; Cometæ cognoscere cuilibet integrum est: adeò ut hoc pacto viam Cometæ jam peractam, tum adhuc peragendam propemodum addiscas; neutiquam tamen omnino veram, & genuinam: ut mox pluribus percipies.

Ratio deli-  
neandi viam i-  
tinerariam re-  
centis cometæ.

Priusquam autem aliquantò altius inquiramus, utrum ista orbita, in quâ Cometa noster, tum alii omnes hactenus incesserunt, quin-etiam futuri incident, absolutus sit circulus maximus; an verò diversus alicujus sectionis ductus, necessum omnino est, (quò eò clariùs meliusq; res ab omnibus, etiam ab iis, qui naturam Cometarum, non ita funditus penetrarunt, percipiatur) ut addiscatur, quotuplex sit motus, quem quilibet Cometa, nec non novissimus, de quo jam sermo est, omni tempore exercet. Dico autem esse tripli-  
cem: Primò communem, vel Primi Mobilis, ut Peripatetici loquuntur, quem alioqui Mathematicorum pleriq; Terræ ejusq; diurno attribuunt, quo medi-

Quotuplex fit  
motus, quem  
Cometa omnes  
simil excentis

mediante, Cometæ cum stellis Fixis simul oriri, simul occidere 24 horarum spatio videntur. Secundo; apparentem, quem hic Cometa cursu suo retrogrado, contra s. s. & penitus inæquali perfecit. Tertiò; motum proprium verum & genuinum; quem nullus non Cometa à naturâ possidet, ac ipsi quasi naturalis est. Cum priori communi, quia omnibus corporibus cœlestibus tum Fixis, atq; Planetis universim competit, tum facile à quovis intelligitur, præterea huic nostro proposito nihil quicquam confert vel derogat, nil penitus hâc vice habebimus negotii. De altero verò illo motu apparente aliquantò fusiùs disseramus; eò cum primis attento, quod planè sit, qui solummodo à nobis omnibus oculis percipi, Instrumentisq; observari potuit, atq; ex cuius ductu, trames Cometæ visibilis propemodùm sub circuli maximi sectione exortus, atq; delineatus est. Hic tamen motus, ut rectè capias, Benevole Lector, minimè verus atq; genuinus Cometæ, ut diximus, est motus naturalis; sed potissimum ex motu redundat Terræ; sine quo fieri sanè vix potest, ut vel unicum Cometam, nedum omnes, unâ eademq; invariata hypothesi evincere possis ab omnibus inconvenientiis & absurditatibus, mirisq; phænomenis, in quibusvis obviis: de quibus suo loco pleniùs. Hic,

*Motus Cometarum apparet maximè in Spectatorum oculis incurrit.*

Vnde motus oriatur apparet.

in quam, motus Terræ, cùm se motui Cometarum genuino, ac innato immiscat, atq; ipsa Terra, respectu elongationis à Cometâ alio tempore valde sit diversa, sequitur necessariò, ut motus hic apparet, hoc quâm illo tempore planè sit diversissimus. Etenim ubi Terra penè in ipsum incidit Cometæ ve-

*Vbinam motus apparet semper sit terradisfimius.*

stigium, secundùm scilicet ejus exorptionem, super quo reverà omnes Cometæ suo motu vero moventur; quemadmodum primâ apparitione, in hoc Cometâ obtigit, circa initium Decembris, vel potius 23 Novembris, phænomenum, sive motu retrogrado, sive directo incedat respectu Terræ, nihil refert, tum necessariò Cometa lento incedere gradu, quoad motum scilicet

*Quando motus acceleretur, & ubi velocissimus sit.*

apparentem, imò planè stationarius esse videtur. Quod si verò Cometa & Terra se invicem transeunt; hoc est, ubi Terra, vel à parte superiore, vel inferiore Trajectoriam Cometæ motu contrario, transcendent: prout in Cometâ nostro, inter diem 29 & 30 ferè obtigit. Nam, cùm duo diversa, motu contrario, moventur, licet inæquali, citius profectò à se invicem discedunt,

*Fieri aliter haud potest, quād quod motus iste apparet velociter reddatur; imò in ipso transgredi omnium velocissimus.*

ampliusq; conficiunt cursu suo intervallum, quām quæ versùs eandem coeli ferruntur, vel propelluntur plagam. Hincq; quam primùm Cometa motu di verso à Terrâ removetur, motus iste apparet rursùs decrescit, tantoperè ut etiam, Terrâ iterum ad ductum vestigii Cometicī perveniente, planè stationarius fiat, ac deniq; etiam directus, Terrâ scilicet vestigium transgressa:

*Motus apparet ex motu vero Cometæ, Terræq; annuo componitur.*

ut prolixè deduximus ac rectè demonstravimus Lib. IX nostræ Cometo-graphiæ.

Motus igitur iste, quem in Cometâ deprehendimus, ac observavimus, ut rem brevibus complectar, ex motu Cometæ proprio vero, & motu Terræ annuo compositus est, qui ratione utriusq; motus de necessitate adeò inæqualis certo tempore apparere debuit, licet motus verus per se penè æqualis singulis diebus, & summè ordinatus existat, ut mox pluribus dicetur. Proinde etiam Cometa noster ab exordio, die sc. 14 Decemb. vix unum conficiebat gradum;

*Apparent motus perpetuò est inæqualis.*

gradum; at paullò post motus ejus notabiliter invaluit; ita ut die 29 & 30 Decemb. motus hic apparet ad 12° 44' ex cresceret; dein rursùs debitâ proportione retardatus est, usque dum 4 Febr. planè stationem celebraret, secundum videlicet Longitudinem, ut rem rectè intelligas, atq; sic prorsùs directus, cursum suum nimirū retroagendo, factus sit; sicuti ex superiori Historiâ, Tabellisq; motus Longitudinis & proprii apparentis pag. 20 & 21 insertis, clare patet.

Verum & genuinum motum autem quod attinet, antequam ulterius progredeamur, de illo apparente verba facere; dico, hunc verum omnibus Cometis à naturâ esse inditum; sed non unâ eademq; ratione: qui ut à nulla certâ quâdam Cœli parte exoritur, sic multò minus ad definitam ætheris plenum inquam tendit; sed summè est diversus in omnibus, neq; in unius Cometæ cursu ab omni parte æqualis, si rem accuratiùs expendimus, attamen in omnibus summè regularis & proportionatus est. Et licet hic motus verus inæqualitati cuidam obnoxius sit, neutiquam tamen adeo excessivo, ut quidam apparet in nonnullis deprehenditur Cometis, sed aut in aliis sensim crescit, ut in recenti, suo tempore, videbimus, aut in aliis paullatim decrevit, pro cuiusvis Cometæ qualitate, & situ, respectu Solis: de quo satis abundè egimus citato Libro IX Cometographi, quo Lectorem remitto. Non enim ratio instituti nostri hâc vice permittit, plenè omnia & singula demonstrare, sed hoc loco nonnulla tantummodo delibare statuimus; quòd hujus Cometæ cursus eò rectius percipiatur, atq; Philomathematicis faciem quasi præferamus, stimulosq; addamus ad has sublimes res ulterius prosequendas; non minus hypothesin, mentemq; nostram in Cometographiâ detectam occasiōnem præbeamus examinandis, cum primis vero, ut aliquantò altius perpendant, anne hâc ratione, unâ eademq; hypothesi fixâ, omnes & singuli Cometæ, eorumq; phænomena rectè & decenter salvari possint?

Nihilo tamen minus aliquid amplius hoc de motu vero paullò post in gratiam Benevoli Lectoris proferemus. Ne autem rem, atq; utrumq; motum inter se confundamus, ad motum rursùs apparentem revertamur, qui toti orbi maximè fuit conspicuus, omniumq; oculos perstrinxit: quòd sic prius ea omnia, quæ de hoc motu dicere in hocce opusculo proposuimus, absolvamus. Nam omnia minutissima, ut ut optima detui occasio detegendi ac demonstrandi, paucissimis tamen hisce pagellis absolvere haud possumus; maximè, cùm multum temporis ac laboris, prolixumq; ac fastidiosum requirant calculum.

Primò igitur queritur: qualisnam sit ductus? quem Cometa hic cursu suo apparenti (non vero genuino, siquidem planè ab isto diversus est) ex Corvo progrediendo per Hydram, Navem, Canem Majorem, Leporem, Eridanum, Caput Ceti ad Arietem perduxit; an omnino absoluti sit circuli maximi sectio; an vero species aliqua alicujus lineæ incurvatæ? Incomparabilis quidem Tycho, nec non Viri insignes, utpote Snellius, Crügerius aliiq; in ea fuerunt sententiâ, Cometas ratione hujus motus apparentis sub circulo exquisitè maximo ferri: prout in primis legere est apud Tychonem Lib. II de

Habent Co-  
metæ suum mo-  
tum natura-  
lem; sed qui-  
libet ferre pe-  
cularem.

Motus Cometæ  
genuinus,  
inæqualis qui-  
dem; sed re-  
gularissimus  
est.

Omnia & sin-  
gula imprese-  
tiarum demon-  
strate, Autor  
minime prope-  
sus.

An motus Co-  
metæ apparen-  
tis sub circulo o-  
mnino maxi-  
mo peractus  
fuerit?

Cometâ anno 1577 pag. 103. Verum unde evenerit, quod hâc in parte hal-  
lucinati fuerint, atq; res longè secùs se se habuerit, jam Libr. I pag. 113 Co-  
metog. affatim demonstravimus. Exinde neq; hunc Cometam, dico, neq;  
reliquos omnes, unquam sanè adeò strictè circulum maximum toto duratio-  
nis tempore, motu suo apparenti describere, sed eos potius certo tempore ab  
istâ orbitâ penitus rotundâ nonnihil, imò satis evidenti spatio deviare, id  
quod non solùm nupero Cometâ, & reliquis omnibus (prout etiam suo loco,  
beneficio calculi jam factum est) sed etiam confessim ad oculum mechanicè  
demonstrari potest, ut quilibet etiam harum rerum non usq; adeò peritus ex-  
orbitationem istam à circulari tramite palpare quasi possit.

Quando Co- Lubens quidem largior, quod quando Cometa eâ velocitate incedit, ut  
mete seditionem minimùm duos quovis die expedit gradus, ut ut posthac motum intendat ad  
circulus maxi- 20, 30, 40 & amplius gradus, sicut in Cometâ Regiomontani anno 1472  
mi, motu suo animadversum est, donec iterum cursum suum ad duos circiter gradus redigit  
describant. ac retardat; quod eo scilicet tempore, istudq; intervallum peragendo, in-  
quam, designet omnis Cometa motu suo apparenti (demis scilicet refractio-  
nibus & parallaxibus, si quæ Cometis inhærent) circulum satis præcisè maxi-  
mum. Atvero, ubi Cometa tardiori quàm duorum graduum motu fertur,  
vel stationarius est, vel cursum reducere incipit, nunquam jam amplius cur-  
sus Cometicus in circulo omnimodè maximo peragit, licet, ut diximus, o-  
mnes penitus refractiones ac parallaxes desint; sed Cometa paullatim jam ab  
illo circulari ductu deflectit: atq; eò plius, quod tardior sit, propiusq; ad ipsam  
accedit stationem: id quod etiam luce clariùs in nostro Cometa deprehen-  
sionib; maximi- ditur. Nam à die 19 Decemb. existente ejus motu jam 1° 51' ad 8° & 9°  
evidenter defle- Januarii usq;, ubi adhuc penè simili pergebat, ibidem cursus Cometicus ferè  
xit. sub ductu circuli maximi peractus est. Verum quemadmodum circa finem,  
notabili incur- ultimis diebus ad 9 scil. Januarii ad stationem usq;, minimè istum incessum  
natione cursum conservavit; sic etiam ab initio, ad exemplum aliorum omnium, ubi pariter  
notum secun- à statione recens erat, circularem talem ductum assequutus est: prout lucu-  
dum S. Signo- lenter videre est, ex superiori delineatione nostrâ C pag. 22 traditâ, quo-  
rum reduxit. modo se Cometa à 10 Januarii sensim à circulari orbitâ sursùm Aquilonem  
versus deflexit; tantoq; magis, quanto vicinior stationi redditus est; ita ut  
postmodùm sub insigni, & valde conspicuâ curvitate Primam Arietis versus  
iter suum converterit. Sed dilucidiùs adhuc id ipsum animadvertisimus, si mo-  
tus omnium dierum ex nostris observationibus, in primis Cometæ distantiis à  
diversis Fixis impetratis, locaq; singula Cometæ, atq; sic tota via itineraria ad  
amussum in globo quodam majori describatur, isq; ductus ad horizontem, ut  
supra docuimus, devolvatur, illustrissimè videbis hunc Cometam in Eclipticæ  
transgresu, circa nodum ascendentem plius duobus tribusve gradibus, imò  
multo amplius circa finem Mensis Febr. deviasse. Ideoq; nequaquam totus  
cursus, sive hujus, sive reliquorum Cometarum sub ductu circuli absoluè  
maximi absolvitur; quod ostendendum erat.

Angulus Ecli- Ex hâc deviatione præterea oritur, quod angulus Orbitæ & Eclipticæ,  
pticæ & Orbitæ tum Aequatoris, possit nullo pacto toto apparitionis tempore semper sibi o-  
in Cometis in dies variatur.

mninò æqualis permanere: sicuti non solùm in hoc Cometâ, sed reliquis omnibus, ut Lib. I. Cometog. nostræ dilucidè detectum est, planè accidit. Equidem si cursum Cometæ nostri delineemus, secundùm dies intermedios, quibus velocior 2 grad. extitit, invenimus angulum orbitæ & Eclipticæ, haud 49 vel summùm 50 grad. majorem fuisse; verùm ubi Cometa à 9 vel 10 Januarii ad cornua Arietis sensim plus plusq; gressum suum deviavit, eâ peni- Variatio an-  
guli Cometæ  
1664 & 1665.

tùs ratione tunc etiam angulum dictum diversum, majoremq; reddidit; sic ut die 16 Januarii, quo Eclipticam supergressus est, jam non amplius sub angulo 49 vel 50 grad.; sed 53 ferè grad. viam duxerit; imò ultimò, circa stationem ad 10 propemodùm grad. angulum dictum obtusiorem reddiderit: prout calculus suo tempore clarè evincet.

His de causis omnino etiam sequitur, quòd Nodi Cometarum nūnquam constantes fint, sed ferè in perpetuo versentur motu; nec uterq; Nodus, Boreus scilicet & Austrinus, sive ascendens & descendens, semper in gradu prorsùs opposito Eclipticæ versentur. Persuadere quidem nullus non, ut hactenus etiam ab omnibus ferè creditum est, sibi posset, utrumq; nodum, tam descendantem quam ascendentem, in 26° Libræ & Arietis, secundùm circuli maximi directionem hæfisse; sed longè secùs res se habet. Nam ex ipsis observationibus didicimus, Nodum Boreum minimum in 29° Arietis, in transitu Cometæ per Eclipticam, Nodum vero Austrinum principiò in 24° Libræ extitisse, si id accuratè observari nobis obtigisset: quanquam nuperus Cometa circa exortum ejus ex partibus Borealioribus minimè per Eclipticam ad Corvum pervenit; sed initio statim Mense, ut puto, jam Novembri in parte Meridionali sub Eclipticâ, in Latitudine scilicet Australi 15° circ. primùm emicuit; ut mox liquidiùs deducetur.

Eo prorsùs modo aliis Cometis etiam usu venit (sicut ex eorum observationibus laboriosè in Cometographiâ à me investigatum est) quòd non solùm simili ratione à vestigio maximi circuli toto durationis tempore exorbitaverint; sed & eorum Nodi planè variabiles mobilesq; extiterint: sicuti ex annexâ Tabellâ, ut rem brevibus pandam, cuivis apertum est.

Cometa	Angul. Orbitæ & Eclipticae. Grad. Min.	Nodus Grad. Min.
1531	0 25	0 5
1532	3 0	4 0
1533	11 0	11 0
1577	0 9	0 6
1585	1 52	0 22
1590	0 8	0 40
1618	1 23	1 0
1652	1 4	0 14
1661	15 44	27 0

Adeò ut (quod optimè notes velim) Cometa anni 1661 angulum ad 16°, atq; Nodum, de quo, sanè, haud parùm miraberis, ad 27°, nimirum ex 8° Piscium in 5° Arietis usq; , à die 3 Febr. ad 28 Martii; & quidem motu directo apparente, alias existente retrogrado, variavit. Non tamen in omnibus Cometis motus Nodorum motui Cometæ semper contrarius est, sed multoties etiam eundem ambo prosequuntur ductum: sicuti paginâ 123 Lib. I Cometog. longâ serie exposuimus.

Res igitur ipsa loquitur, Cometas neutiquam adeò præcisè, ab ipso initio, ad interitum usq;, observare tramitem circuli maximi, ut ut pleriq; , imò ferè omnes, quibus Cometæ ætherei sunt, aliter, sed perperam, statuant.

Quan'a fuē-  
rit diverforum  
Cometarū va-  
riatio anguli  
orb. & Eclipt.  
cum Nodorum  
progressio.

Cometa 1661,  
tam angulum  
ditum, quam  
Nodus omnium  
maxime va-  
riavit.

*Quibus de  
causis Cometæ  
adeo enormiter  
interdum exor-  
bitent, à circuli  
sektione maxi-  
mi.*

De reliquo, facile mihi persuadeo, nullum non rebus hisce abstrusis detum, genuinam hujus deviationis vel evagationis causam addiscendi cupidisimum esse: cùm, fateor, haud postrema sit aliarum quæstionum de Cometis enodandarum. Oritur autem ex nonnullis diversis rationibus, ut paucis dicam, nimirum: 1 Ex deviatione reali; quæ ex ipsâ materiâ Cometicâ originem dicit. 2 Ex deviatione apparente; quæ ex vario situ, variâq; distantiâ Cometarum à Terrâ & Sole, motuq; Terræ annuo profluit. 3 Deniq; ratione motûs impressi atq; inclinatione disci corporis Cometicî. Hæc verò non tam promptè, ut quidem à me enunciantur ab omnibus, sine dubio, percipientur. Cùm res sit, sanè, abstrusa; præprimis cùm hactenus nemo, quod sciam (absit invidia) hanc ipsam materiam vel leviter tetigerit, nedum planè detexerit; prolixâ igitur oratione, solidoque calculo, tum luculentâ, ope diverorum iconismorum demonstratione opus habent, si rectè & debitè commonstrari, & penetrari debeat. Verùm, quia Lib. IX pag. 563, item 655 Cometog. usq; affatim id jam præstitum est, atq; brevitati studeo, possumus, hoc loco, eo labore supersedere. Adeò, ut hâc vice sufficiat solummodo scire, posse nos evidentes, & minimè absurdas hujus deviationis proferre causas, quare nullus Cometa circulum perfectè maximū motu suo designare valeat.

*Qualisnam re-  
verà sit ductus  
Cometarum  
cursus.*

Quo autem nomine ductus hic Cometæ, quem cursu suo apparente describit, denominandus, & qualisnam sit incessus: cùm adeo in plerisq; omnibus sit diversus, modò plus, modò minus ab orbiculari linea discedens: an videlicet sectio sit Elliptica, Parabolica, an verò Pyperbolica, non ita in expedito est determinare; sed oportet, ut priùs accuratori calculo id ipsum in singulis Cometis, ut quidem fieri posset, si tantum concederetur otii, investigaretur.

*Res magni  
momenti est re-  
tine scire, ubi-  
nam cometæ  
sint stationarii,  
& sub quâ in-  
flexione viam  
vertant.*

Porrò ex nostris observationibus, exhibitâ Cometæ delineatione apprehendimus; ubi & quomodo Cometa factus sit stationarius & retrogradus, tum sub quâ obliquatione cursum directum instituerit. Quoniam Divinâ gratiâ indulgente, mihi ad 18 Febr. Cometam exquisitè observare concessum est. De quo, certè, habeo cur mihi gratuler, cùm à nemine, quod sciam, sive in hoc, sive in aliquo alio incurvatio adhuc rectè animadversa fuerit; præser-tim grande momentum sit, tum Cometographiæ multum interfit, ea omnia ritè observasse, si aliquantò profundiùs natura motusq; Cometarum disquiri debeat. Maximè verò inservient ad Peripateticis (si nullæ aliæ rationes in promptu essent, quæ tamen nobis haud desunt) demonstrandum, Cometas versari in æthere, motumq; Terræ annum necessariò esse concedendum: de quibus autem mox aliquantò pleniùs.

*Sub quâ in-  
curvatione co-  
meta recens  
iter suum redu-  
xit.*

Adhæc, ex nostrâ superiori adumbratione C evidenter elucet, quòd Cometa non subito, post stationem, sub angulo acutissimo, sive nullo, iter suum reflexerit, retinendo eum ipsum omnino ductum, quem eosq; conservaverat, sed pedetentim sub lentissimâ obliquatione satis notabili iter suum reduxerit, à pedibus scilicet præcedentibus, atq; collum ad primam præcisè Arietis, ubi die 18 Febr., uti percepisti, pag. 17 à me deprehensus est. Motum itaq; suum directum sub longè elevatori tramite instituit, quâm ego, ut etiam fortassis

fortassis alii unquam putassent. Quantum autem ex isto obliquiori ductu, atq; cursu, quem motu retrogrado, totâ duratione peregit, colligere licet, quemadmodum etiam haud vereor affirmare, Cometam inde à primâ scilicet Arietis, supra ejus caudam, Pleiadas versùs, à parte tamen earum paullò superiori, sub quinto grad. circ. Latit. Bor. cursum suum arripuisse; ita ut Eclipticam primùm in  $10^{\circ}$  Cancri, in medio ferè Asterismo Geminorum, (ad quod notes, caudam adeò constanter, per totam durationem tam matutinus, quam vespertinus exporrexit) rursùs transgrederetur, ad obtainendam denuò Latitudinem Australē, si nempe eosq; perduraret, & minimè consumeretur, priusquam eò deveniret. Optandum esset à quoipam id ipsum observari potuisse; sed valdè dubito; cùm à die 18 jam amplius detegi à me haud potuerit, ab alio quoipam id animadversum esse; licet omnium longissimis Tubis Opticis id tentatum fuerit. Nimis enim jam pallidus corpore tenuissimo & admodūm imminuto in remotissimâ à Terrâ distantiâ extitit; ut ut mēa opinione, eo usq; imò longius ob corporis sui constitutionem in altissimo æthere conservari potuerit.

Talem nunc ductum, sine omni dubio, Cometa in progressu s. f. Signorum sequutus est; quod, sanè, inter singularia, imò inter naturæ arcana meritò referendum est. Nam, si ita omnino sit, ut Eclipticam in  $10^{\circ}$  Cancri transcendat, prout quidem & ductus ejus incurvatio, tum reliquæ circumstantiæ id arguunt; sequitur ex necessitate, quòd distantia Tropicorum hujus Cometæ (ut ita loqui liceat) omnino sit æqualis distantia Tropicorum Terræ, sive Solis, hoc est, 47 ferè grad; tum quòd rursùs sub tali incurvatione, ut ad Arietem factum est, eâ lege, si eosq; perdurasset, ad Corvum redierit; atq; sic totum suum Orbem, sub ductu lenticulari planè finierit & absolvitur: prout pariter hunc cursum Cometæ directum à Primâ Arietis ad Corvum usq;, ex mente nostrâ indigitare in superiori delineatione C volumus. Quid verò huic rei sublateat; tum anne ex eo ipso præsumere, imò concludere liceat, quod alioquin à nobis statuitur, motum hunc apparentem, tam retrogradum, quam directum prorsùs ex motu Terræ annuo redundassem? illis potissimum dijudicandum relinquo, qui nullo fascino vel authoritate obsessi, ac præ cæteris Cœlum aliquantò penitiùs introspiciunt, nec non Cometographiam excolere satagunt. Si quis autem forte regereret, illud ipsum ex motu provenisse Solis; sequitur ex lege infallibili, quòd integrum Systema Cometicum, adeò vastissima Machina, quæ nullà ratione, materiâ quâdam, ipsi corpori Solari, ut facile conceditur, affixa est, à Sole motu penitus contrario, quem Peripatetici, ut & ipsa natura planè aliàs abhorret, per diversos Planetarum orbes obliquo & inclinato ad Eclipticam situ, perpetuò & constanti motu æquabili circumducatur vel circumrapiatur. Verùm, quam difficile id sit creditu & perceptu; imò potius quam absurdissimum, in primis si diversissima illa inæqualitas, & velocitas motûs apparentis, concessa etiam in linea quâdam rectâ, Cometam motu proprio ferri, Terrâ stante, & absq; motu Solis per calculum & rectè constructam hypothesin, ad omnium

An eandem  
plane viam,  
quam motu re-  
trogrado incer-  
sus, rursus mo-  
tu directo repe-  
tiverit?

Autor sibi pê-  
nitius persua-  
det, cometam  
alterâ vice in  
 $10^{\circ}$  grad. Can-  
cri Eclipticam  
transcendisse.

Distantia Tro-  
picorum Come-  
te ruperi, &  
equalis fuit di-  
stantia Tropi-  
corum Terræ  
sive Solis.

Anne ex mo-  
tu Terræ id  
ipsum redun-  
darit? Peri-  
tores dijudi-  
cent.

Domo Telluris  
motu annuo,  
quevis absur-  
dissima profili-  
unt.

dierum Cometæ à Terrâ distantias defendi, & demonstrari debeat, iterum iterumq; rerum Astronomicarum Peritis dirimendum committimus.

*Quando secundā vice Eclipticam Cometam trajeccerit; & ubinam rursus velocissimus extiterit.*

Percepisti itaq;, meâ sententiâ, Cometam in  $10^{\circ}$  Cancri Eclipticam alterâ vice trajecisse; quem gradum, vel Cœli locum, ut arbitror, nisi citius absuntus est, priusquam, ut dixi eò devenit,  $13^{\circ}$  Martii, anni currentis 1665 assequutus est, Sole tum existente in  $21^{\circ}$  Piscium; vel potius Terrâ in  $21^{\circ}$  Virginis (ut more Mathematico loquar) in elongatione à Sole, seu Terrâ  $109^{\circ}$ , hoc est, paullò post ejus Quadraturam: ubi, quod iterum animadversione dignum judico, rursus tali velocissimo motu  $13^{\circ}$  ferè grad., quali inter diem 29 & 30 Decemb. anni elapsi, procul omni dubio latus est. Id quod

*Quomodo Autor motum Cometæ in suo cursu indagaverit.*

inde conjicere, vel potius argumentari licet; suppono autem Cometam planè æquali incesu, & pari velocitatis & tarditatis gradu singulis diebus promotum esse, tam in hoc cursu reducto & directo, à statione suâ, Eclipticam versus, quâm in suo retrogrado motu, à summâ suâ velocitate ad dictam stationem, 4 sc. Febr. usq;; atq; tali proportione gradum postremò denuò accelerasse, quali ab initio à Cane Majore, usq; ipsam stationem illum retardaverit. Non est autem quòd putas, me funiculos hîc ex arenâ nectere, & planè impossibilia captare; sed rem capio, ut reverà accidit, atq; observationes clare ostendunt; nimirùm: videmus ex Tabulâ motûs proprii diurni hujus Cometæ pag. 22, Cometam, die 22 Januarii  $21\frac{1}{2}$ , in suo tramite apparente progressum esse; ex hoc verò tempore quotidiè successivè tardiorem, donec die 4 Febr. planè extitit stationarius, factum esse; pari proportione ab hac die 4 Febr. ad diem 18 subsequentem, 14 scilicet diebus, tantum itineris spatiū confiendo, quantum totidem diebus, à 22 Januarii ad 4 Febr., perfecisse 3 ferè gradus ab utroq; sc. latere puncti stationis. Hinc ita argumētor; quoniam Cometa post stationem 14 diebus planè eâ ratione & velocitate incesit, quâ totidem diebus, priusquam ad stationem pervenit, similemq; ductum conservavit; fieri aliter, profectò, haud potuit, quâm quòd ulterius continuo cursu iisdem inhæserit vestigiis. Præterea, cùm à termino stationis  $26^{\circ}$  sc. Arietis, ad  $10^{\circ}$  Cancri  $74^{\circ}$  contineantur in Cometæ orbitâ, atq; à 29 Decemb., ubi omnium velocissimus visus est, planè etiam tot gradus, nempe  $75^{\circ}$  ad punctum stationis absolverit; sequitur evidentissimè circa  $10^{\circ}$  Cancri rursus Cometam cursum suum celerrimum exercuisse; sic ut certum inde fit, ultimo Februarii jam motu directo  $1^{\circ} 6'$ ; die 5 Martii,  $2^{\circ} 30'$ ; die vero

*Cometa cursum omnino a-  
litter circa exi-  
tum Mens.  
Febr. ac initii  
Mart. pro-  
sequitus est;  
quam quidem  
Vir Eruditissi-  
mus sibi per-  
suaserit.*

$10^{\circ}$  Martii  $7^{\circ} 4'$ ; ac die 13 ejusdem Mensis ad 12 vel 13 grad, contra quâm Vir quidam Præclarissimus existimasset, aut sibi unquam persuasisset, progressum esse. Adhæc, si tam diu in æthere, atq; in suo motu, ut quidem facile persuadeor, perseveraverit, iterum ad Corvum sic rediit, punctum videlicet illud stationis, unde die 23 Novemb. discessit, die nimirùm 18 Aprilis. Nam à 23 Novemb. ad 4 Febr. tot planè dies, quot à 4 Febr. ad 18 Aprilis effluxi sunt; quin-etiam tot gradus in tramite illo retrogrado, quot omnino ( $160^{\circ}$  videlicet) in hoc cursu directo Cometæ trajiciendi fuerunt.

Quò autem ad motum iterum apparentem retrogradum redeamus, motum suum Cometa ex Corvo ad  $26^{\circ}$  Arietis usq; deduxit; secundùm verò Latitudi-

Latitudinem in ipsâ statione haud  $5^{\circ} 16'$  Bor. major extitit. Deinceps quidem Latitudo paullulùm crevit, quippe die 18 Febr. jam  $7^{\circ} 10'$  observata est; nihilominus tamen in cursu directo haud  $8^{\circ}$  amplior, sine omni dubio, evasit, sic ut posthac de die in diem sensim ad Eclipticam usq;, Nodumq; descendenter decreverit. Atq; ita minimus motus in suo tramite non infra  $5^{\circ}$  extitit; unde nullà ratione in suâ orbitâ vel tantillùm substitut; sed solummodo respectu Eclipticæ penè stationarius factus est. Velocissimum verò cursus, quem inter 29 & 30 Decemb. Leporem peragrandó, summum ad  $12^{\circ} 44'$  perduxit, existente scilicet in Oppositione Solis.

*Quæritur ergo, utrumne hic motus apparet circa oppositionem Solis, in omnibus Cometis sit semper concitatisimus, ut quidem esse videtur, tum plurimi quoq; reverè statuant? Negari quidem haud potest, quod rapidissimus Cometarum motus, circa oppositionem Solis aliquoties acciderit, etiam accidere poscit; sed minimè tamè necessarium est, ut in iis omnibus ita penitus evenire debeat. Ostendunt enim exempla, quod in ipsâ oppositione, nonnullus Cometa retrogradus factus sit. Hoc autem indubitatum est, atq; ex calculo reliquorum Cometarum apprehendi, quod omnes Cometæ ibidem semper velocissimi appareant, ubi Terra Trajectoriam, aut in superiori, aut ab inferiori parte transit, in primis si accidat in distantia Cometæ à Terrâ, nec non Sole propiore. Verum unde & quomodo hæc omnia proveniant, ac ritè demonstrari possint, hoc loco, cum nimis prolixa sint, atq; jam plenè satis Libro IX Cometog. nostræ exposita fuerint, dicere non attinet.*

Cæterum, ut in hâc dissertatione progrediamur, ostendendum esse duco: an motus nuperi Cometæ ille concitatisimus planè insolens sit, & velocissimus jure adscribi poscit? Quod omnes & singuli Cometæ, quâ motum apparentem omnino sint diversi, tum quâ eorum incrementa & decrementa velocitatis & tarditatis, quæ ex vario situ à Terrâ, tam ratione distantiae, quam elongationis exoriuntur, in immensum inter se differunt, jam ferè omnibus Philosophis innotuit, ut prolixiori probatione res hæc non opus habeat. Nam in omnibus id deprehensem est, quod aliis alio longè velocior, vel tardior extiterit. De hoc Cometâ affirmare possumus, quod meritò inter præcipuos sit recensendus, propter suum insignem motum velocem (reliqua ut modò præteream;) non quidem ex eo, quod ex numero velocissimorum extiterit, qui à Mundo condito affulserunt. Quandoquidem haud pauci æq; concitatores cursu; nonnulli tamen etiam multò celeriori trajecti fuerint: commonstrante nostrâ Historiâ Generali, Cometographiæ annexâ.

Cometa anni 1652, quem pariter sedulò rimatus sum, inter diem 20 & 21 Decemb. 11 grad. in suo tramite tranavit; qui tamen adhuc longè celerior extisset, si die 10 Decemb. à quopiam observatus fuisset. Cometa anno 1556, uno die  $15^{\circ}$ ; atq; Cometa 1472, quem Regiomontanus descripsit, spatio 24 horarum 40 & amplius gradus pervolavit in suâ orbitâ; in longitudine verò quatuor integra Zodiaci Signa, hoc est, 120 grad., à fine nempe Virginis ad principium usq; Geminorum, motu pariter retrogrado, adinstar nostri, qui tantum  $13^{\circ}$  in suo orbe apparenti, &  $16^{\circ}$  in longitud. transcendent.

Unde

*Quoq; &  
sub quâ latitu-  
dine in Arie-  
tempo pervenerit.*

*Cometa non  
ratione sive or-  
bitæ, sed tan-  
tum respectu  
Eclipticæ sta-  
tionarius eva-  
dit.*

*An in opposi-  
tione Solis per-  
petuè Cometæ  
fiant velocis-  
simi.*

*Nomina quæ  
in Oppositione  
videntur retro-  
gradi.*

*Ratione vix  
timeatur rea-  
sonem.*

*An plures Co-  
metæ tali rapi-  
disimo mo- u  
trajecti fuerint?*

*Varias ob-  
causas alius  
Cometa alio est  
velocior, segni-  
orq;.*

*Quinam Co-  
metæ concita-  
tores cursu hoc  
nupero fuerint.*

Unde sufficienter patet, quod jam olim ejus generis plures extiterent, etiam qui multò concitatiorem retulerint gradum. Attamen in plurimis, nuperus Cometa quam optimè cum dicto Cometā Regiomontano, tam rationē motū, quam caudā conferri potest; nimurūm: primō, quod uterq; ex Librā ad Arietem, motu pariter retrogrado progressus fuerit, initio & fine motu tardiori, in medio celeriori, sed sub diversā latitudine; Regiomontani quidētī maximam Latitudinem in parte Boreali ad  $77^{\circ}$ ; noster verò in parte Australi ad  $49^{\circ}$  deduxit. Ille ex  $14^{\circ}$  Libræ, ad  $11^{\circ}$  Arietis processit; hic verò à me quidētī primū in  $8^{\circ}$  Libræ, ad  $27^{\circ}$  usq; Arietis conspectus est; plane tamen existimō, eum non solum 2 Decemb., ut Lugduno Batavorum prescriptum est, jam apparuisse, sed multò citius, sine dubio, videri potuisse, si id Cœli spectaculum harum rerum quidētī gnari aut exspectassent, aut de eo præmoniti fuissent. Etenim die 23 Novemb. Cometa jam à Sole  $50^{\circ}$  elongatus fuit, manè ante ortum Solis, sic ut dilucide à  $6^{\circ}$  ad  $7^{\circ}$  conspiciri potuerit: quo tempore  $14^{\circ}$  Libræ, (ut alter ille Regiomontani) sed in latitudine  $14^{\circ}$  Aust. occupavit, existens in ipsā statione: sicuti in superiori Schemate ad caudam Corvi adumbrare voluimus. Id quod autem exinde innotuit, nam si ejus motum diurnum probè consideres, quem 12 Januarii  $1^{\circ} 6'$ , atq; interstitium illud 22 videlicet dierum, quod ad stationem interfuit, deinde ex adverso, à die 15 Decemb., ubi motus proprius pariter  $1^{\circ} 6'$  extitit, tantum constituas spatiū, in orbitā, caudam Corvi versūs, vel interjectos illos dies 22 numeres; sequitur necessariō, quod statio illa prior die vigesimo secundo, à die 15 Decemb. ductu retrogrado computando, 23 nempe Novemb. celebrata fuerit. Adhoc, quia Cometam in posteriore statione in Ariete, probè & distinctè mihi cum aliis quibusdam spectatoribus, tam nudis oculis conspicere, quam Instrumentis rimari obtigerit, & quidētī caudā 2 vel 3 grad. adhuc præditum: utiq; rationabili consequentiā deducitur, quod eo videlicet tempore à quopiam exercitato Speculatore videri potuisse.

*Cometa spe tardius initio plerūq; obser-vantur.*

Citiūs tamen ante 23 Novemb. vix potuisse credo; ut ut illum 14 diebus post celebratam stationem adhuc bene viderim. Nam plerūq; Cometæ initio tardius, in exitu verò diutiū deprehenduntur: ex quibus autem causis & quā ratione istud phænomenum prodeat, ex Cometographiā addiscet.

*Direccio caudæ tam hujus, quam Regiomontani prorsus fuit eadem.*

Secundō; ratione etiam caudæ, quod pariter notatu dignum, convenienter admodūm uterq; Cometa, tam Regiomontani, quam recens æquiparari potest. Fatetur enim ipse Autor, quod Cometa 1472 comam totā duratione, ex quovis Cœli loco constanter ad Stellas Geminorum direxerit: cauda, inquit, minūs mobilis erat, continuo respiciendo Stellas Geminorum, eas circumibat, nunquam ab iis per totum apparitionis tempus devians. Cū tamen initio comam occasum, & ultimo ortum versūs ostenderet. Simili ferè modo etiam cum nostro comparatum fuit: principiō pariter illum ad occasum, & postremō ad ortum jubar spargebat; & quod, sanè, mirandum, caudam non minūs omni tempore & loco, per totam durationem perpetuò etiam ad easdem Stellas Geminorum protendit, ut ille; exceptā illā deviatione reali, quæ caudis nonnunquam obvenit, de quā infra dicetur; & quidētī, (quod admodūm fin-

*Cometa nuperus toto durationis tempore constanter caudam, omni loco ad Stellas Gemin. & 10 gr. Cancri direxit.*

dùm singulare est, atq; ideo bene notari meretur) semper ad 10 ferè illum gradum Cancri, ad quem, mēā conjecturā & supputatione, ut paullò ante dicebam, Eclipticam, secundā vice, in suo motu directo velocissimo tracicere debebat: prout ex globo clarè perspicies. Nam ex Schemate nostro C id ipsum haud cognoscitur: cūm gradus longitudinis in remotioribus locis ab Eclipticā semper æquales constituti fuerint; atq; ideo nullā ratione ita accurate directiones caudarum ad Stellas fixas in eo delineari potuerunt. Quid hoc insuper sibi velit; & num aliquid arcani hīc etiam sublateat? res est alioris adhuc indaginis.

Sed pergo, determinando Cœli spatiū, quod totā suā duratione Cometa noster, à 14 Decemb., quo illum primū conspexi, ad 18 Febr. nimirū, in Eclipticā à 8° Libræ, ad 26° 19' Arietis emensus est, ad stationem usq; suam. In longitudine itaq; quinq; integra Signa Signiferi, & 11° 41'; in orbe verò suo 159° 15' absolvit; tot ferè gradus, quot Regiomontani, qui ad 175° cursum deduxit. Quod si autem nuperum aliquantò maturius in scenam producimus, ut reverè extitit, ultra 160 grad. pervolavit.

*Quot Signa  
Cœlestia, quo-  
ve gradus co-  
meta hic, tam  
in orbe suo,  
quam Eclipti-  
ca emensus fu-  
erit.*

*Quot diebus  
apparuerit.*

Duravit itaq; à die 14 Decemb. ad 18 Febr., ferè per tres menses, hoc est, 67 dies; atvero si à 1 Decemb. initium apparitionis numeretur, prodeunt 79 dies. Quem, sine dubio, adhuc longius contemplatus suissem, nisi longa & continua nubilosarum dierum series finem meis observationibus imposuisset. Est igitur hæc duratio bene notabilis; quam paucissimi Cometarum attingunt, nec ille 1472 eò perduravit; qui etiamsi æquale Cœli spatiū in orbitā & Eclipticā emensus, nihilominus tantum 46 diebus conspēctus est. Pleriq; enim multò brevioris sunt durationis, nec tantum ætheris spatiū tranant. Nihilo segnius tamen & alii apparuerunt, qui non solū per tres Menses, sed etiam diutiū fuerunt conspicui. Quemadmodum Anno Christi 380 alias Cometa quatuor mensium spatio; alii anno 60, 145, 337, 1240, sex mensium intervallo perdurarunt; inter præcipuos autem ille meritò habetur, qui anno Chr. 375, per octo integros Menses comparuit. Interea tamen non omnes, etiamsi diuturnioris sunt moræ, non æq; magnum deproperant Cœli spatiū, ut quidem in nupero, & Regiomontano animadversum est; sed nonnunquam minus conficiunt, & diutiū persistunt; rursus aliī breviori tempore majus tramitis intervallum absolvunt. Atq; hi plerūq; ex matutinis ante Solis ortum orientibus, successu temporis fiunt vespertini, hoc est, post Solis occasum conspicui; vel vice versa. Cujus generis nuperus Cometa extitit, tum illi, qui anno Christi 594, 1472, & 1531, alios ut præteream, in conspectum prodierunt.

*Ratione da-  
rationis inter  
præcipuos re-  
cenſendus est.*

*Quinam ex-  
metæ longe  
diuturniores  
extinerint.*

*Plures fuere  
Cometa qui ex  
matutinis facti  
sunt vespertini  
& vice versa.*

Antequam autem ad motum Cometæ verum nos conferamus, restat hoc loco adhuc quædam de certâ quæstione attexere, litemq; inter nonnullos exortam dirimere: dum alii in eâ hærent opinione, ac si Cometa non solū in nostro hemisphærio, sed etiam ubi Polus aliquantò declivior est, horizon tem circa Meridiem, uno aut altero die planè subiisset, ac se se nobis per temporis aliquod spatiū subduxisset. Id quod tamen nec hīc Gedani, multò minus alibi, ubi altitudo Poli minor, observatum est. Quippe Cometa etiam

*An Cometa  
sub horizonte  
Gedanensi a-  
liquanti per la-  
tuerit?*

*Cometa in Meridiano Gedanensi nungam declivior 5 grad. factus est.* in depressiori situ, atq; in majore ejus Latitudine Australi 49 grad., non ultra 6 grad. infra Tropicum Capricorni pervenit. Proinde fieri secùs haud potuit, quām quod adhuc ultra 5 grad. in meridiano Gedanensi elevatus fuerit; non solum nostris, sed aliorum quoq; observationibus id ipsum confirmantibus.

*Quibus in locis Cometa certe tempore horizontem strinxit.* Evidem non diffiteor alibi locorum, ubi Polus aliquantò elevatior est, quām in nostro horizonte, Cometam uno alterove die, aut finitatem stringere, aut etiam penitus occidere potuisse: utpote Holmiæ, Narvæ Livoniæ, Novogrodi Moscoviæ, ac in aliis locis, simili elevatione gaudentibus; ibidem, dico, Cometa die 26 & 27 Decemb. st. n. horizontem strinxit,

minimè tamen se se iis Populis omnino subduxit. Quod autem fortassis illum, eo ipso tempore minimè animadverterint, causa hæc est, vel quod tum horizon crassioribus evaporationibus abundans, ut fieri circa ipsum horizontem plerunq; solet, ejus conspectum denegaverit; vel quod ex sublimi turri, & edito quodam colle, tum à perito Contemplatori minimè quæsitus fuerit.

*Quibus populis Cometa ad 30 Januarii plane inconspectus extitit.* Atverò Nordcapi Norvegiæ, Wiborgi Finniæ, in Lappiâ, Grünlandiâ, Islandiâ, aliisq; hujus generis regionibus Septentrionalibus, horizonti se se omnino submersit, atq; eò diutiùs, quò sub obliquiori sphærâ loca ista sunt constituta; sic ut iis, circulo Arctico, & septuagesimo gradu circ. latitudinis, subiacentibus, utpote in Lappiâ, Islandiâ & Grünlandiâ degentibus, nihil quicquam de Cometâ, etiam ab ipso initio in conspectum venerit, donec Leporem ferè egressus fuerit, die scilicet 30 Januarii St. n.. At nos hīc Dantisci, nec non sub sphærâ rectiori habitantes, illi, inquam, continuo Cometæ aspectu ab ipso principio ad finem fruiti sunt.

*An Cometa motu fuerit vagabundus; an vero regularis?* Deniq; meritò quæritur: cùm Cometa ejusmodi inæquales motus diurnos, in suâ orbitâ, ut in delineatione etiam descriptum est, peregerit, quorum maximus 12 & amplius grad. exitit, minimus verò haud 5 excessit: anne evidentissimum sit indicium, motu irregulari, imò vagabundo Cometam progressum esse? Do quidem ultrò, motum totâ duratione admodum extitisse inæqualem; prout etiam ipsem observationibus deprehendi: interea tamen sub eâ ipsâ inæqualitate, summa latet regularitas, & proportionata inæqualitas. Debitâ enim proportione primò motus iste crevit, deinde etiam ratione maximâ convenienti iterum decrevit: hinc perperam, sanè, pro irregulari, multò minùs vagabundo habetur.

*Comete quandoquidem ad motum apparentem, viam quam semel ineunt ab ipso initio, constanter, strictè & decenti proportione prosequuntur, atq; sub debito angulo orbitæ & Eclipticæ, Nodorum competente; exceptâ illâ deviatione convenienti, de quâ paullò ante diximus, certis de caussis promanante; quæ tamen itidem summæ regularitati cum angulo inclinationis obnoxia est; instar Lunæ, reliquorumq; Planetarum, in quibus pariter nec motus apparent, nec angulus inclinationis, nodusquæ, tum deviatio à verâ orbitâ in omni ductu semper sibi æqualis, & similis est; sic ut nec ipsa corpora ætherea, universi scilicet Planetæ, sub circulo absolute maximo, si rem penitiùs introspicimus, constanter incedant, sed habeant pariter suas velocitates, stationes, digressiones & retrogressiones in suis orbibus apparentibus.*

Hæc

Hæc sunt, quæ breviter circa motum Cometæ apparentem recensenda, ac enodanda fuerunt. Sequitur motus Cometæ genuinus, à naturâ omnibus insitus. Quem quidem non quilibet protinus populari adspectu assequi potest; sed is tantum ex accuratioribus majorum Instrumentorum ope acquisitis observationibus, mediante demum calculo investigatur. Hic autem motus verus, ut rem rectè intelligas, haudquaquam in orbitâ Cometarum apparente, de quâ tot verba fudimus, tum in quâ Cometam nuperum incedere, tum modò prope has, modò illas fixas constitutum, atq; tot Cœli sidera percurrentem vidimus, perficitur; verum planè alius ac diversus est cursus, ductusq; , qui cum orbe illo apparente nihil quicquam habet commercii: nisi quod uterq; motus Terræ & Cometæ in orbitâ illâ apparente se se misceat, ac illum motum apparentem componat, producatq;

*Motus Cometæ  
genuinus, plane  
in alio tramite,  
quād apparet  
peragitur.*

Idcirco, cùm absq; omni contradictione verissimum sit, verum motum Cometis omnibus inesse: quemadmodum etiam ex omnibus Cometis, quorum observationes ad nostras pervenere manus, in Cometographiâ demonstratum dedimus; quæritur insuper (quæ quæstio, etiam omnium Naturæ Speculatorum judicio, haud inter triobolares reponenda est) cujus generis sit via illa itineris, quam Cometæ universi, motu suo genuino denotent? Utrum ferantur motu circulari? an recto? an verò curvo? Si sit rectus, an sit præcisè rectus? an potius ex parte curvus & flexuosus? Econtrariò, si sit incurvatus, utrum sit regularis? an verò irregularis? Deniq;, si regularis, utrum sit Ellipticus, an Parabolicus; an verò Hyperbolicus? Quæ, ut res sunt, non adeò omnibus obviæ, ita etiam profundissimæ sunt contemplationis, ac merentur funditùs enucleari ac demonstrari. Mathematici enim, Scrutatoresq; naturalium arcanorum nequaquam nudis verbis, sed rationibus, observationibus, ac demonstrationibus placantur. È autem ratione illa omnia discutere, nec propositum in hocce breviori opusculo est meum, nec arbitror, opus esse. Quippe ea omnia ordine & decenter in Cometographiâ nostrâ suo loco jam pertractata sunt; quæ Curiosus rerum naturæ, si ita visum erit, legat, trutinet, examinet. Sufficiat hâc vice, unum alterumve delibare, atq; concludere quale sit iter, additis, ac recensitis affectionibus quibusdam hujus veri motus maximè præcipuis; tum ultimò demonstrando, in quali lineâ vel ductu tum novissimus Cometa, tum reliqui omnes salvari ac demonstrari non nequeant.

*Qualis sit iti-  
neris ductus,  
quem in eo pro-  
prio vero Comé-  
te designavit.*

*Arduè & ar-  
gute questiones  
de Cometarum  
motu vero.*

*Mathematici  
in quibus as-  
quiescent.*

Persuasus fortè es, quòd per motum circularem universus hic motus Cometarum verus ab omnibus inconvenientiis possit aptè liberari. Verum, tantum abest, prout Tycho & Keplerus, Viri alijs perspicacissimi sponte factentur, ut vel unicum Cometam eâ ratione, ab omni parte, salvisq; quibusvis phænomenis debitè explanare possis, ut potius in laqueos inextricabiles incidas; præsertim si demonstrare debeas, quomodo Cometa ejusmodi diversos & inæquales motus apparentes in circulo peragat, parallaxibus non neglectis, attentisq; simul Cometæ distantiis ad singulos dies: quin-etiam ex circulari motu derivare, quâ viâ ad occasum Heliacum Cometâ vergente; circa vide-licet Quadraturam stationarius fiat! prout prolixius significavimus pag. 589

*Motus circu-  
laris nullo modo  
Cometis com-  
petit.*

*Quā viā, mo-  
tu sūo Cometā-  
rum natus o-  
mnium optimē  
salvetur.*

Lib. IX Cometog. Verūm, per lineam propemodū rectam, hoc est, incurvatam, vel potius conicam, omnium optimè negotium succedit, & quidem in Cometis omnibus: quemadmodum etiam apud me nullum est dubium, quin pari modo in recenti Cometā, dummodo observationes ad calculum revocavero, felicissimè sit successorum; eā tamen expressā lege, supposito motu Telluris annuo, pro quo omnes Cometæ strenue militant, & sine quo nullus omnium dextrè, & rationabili ratione per calculum & Schemata in quibusvis demonstrari potest.

*Cometæ in mo-  
tu suo naturali  
nunquam fūnt  
Stationarii, nec  
retrogradi; sed  
semper prorsū  
tendunt.*

*Motus Come-  
tarum propriis  
penē est aqua-  
tis.*

*Philosophi, qui  
in Praeceptori  
verba jura-  
runt, nec in ra-  
tionibus nec  
demonstratio-  
nibus acquie-  
scunt.*

*Cometæ mo-  
ventur reverā  
in sectione Co-  
nicā, motu ta-  
men nonnikil  
inæquali.*

*Quibus de-  
causis nunc  
Parabolam,  
nunc Hyperbo-  
lam, nunc El-  
lipsem descri-  
bant.*

Sed antequam hinc discedamus, poscit res, ut significetur, quod motus hic Cometarum verus undecunq; etiam descendat, & in quamcunq; etiam Cœli plagam unquam vergat, semper in directum, hoc est, prorsum procedat, sic ut nullo penè tempore, ut ut quam maximum Cœli emetiatur Cometa spatium, & quam diutissimè perduret, concesso etiam duodecim integris & amplius mensibus fit conspicuus, propemodū in suo ductu vero æqualiter progrediatur (propemodū æqualiter dico; nam æq; ut motus apparet aliqualem diversitatem, summam tamen regularem obtinet, ut mox pluribus dicetur) & nusquam stationarius, multo minus retrogradus reverā existat. Quod ut multi vix adeò procliviter capient, sic valde istud demirabuntur. At enimverò, mi Lector, omnia hæc radicitùs, ut ut libenter vellem, Tibi demonstrare hâc vice haud potero; cum calculo & Schematismis opus sit: quapropter adeas, sis, nostram Cometographiam, non dubito, quin tales rationes demonstrationesq; invenias, quibus optimè contentus esse poteris; nisi forsitan Philosophiam ex traduce colas, atq; obstinatâ mente sententiam semel arreptam defendas. Frustra enim illis, qui ex istâ sunt tribu, canitur, ex quocunq; etiam tono cantilenam deponas, atq; modulamen instituas.

Dico itaq;, motum hunc verum continuò esse directum & propemodū æqualem, adinstar Stellarum erraticarum, non obstante motu apparente ferè ut plurimū contrario inæquali, stationario, imò retrogrado. Nec posse utrumq; motum, ut rem brevibus dicam, ullâ aliâ ratione, quamquam etiam tentes, convenientiùs nos explicare, quam mediante sectione Conicâ. Quæ autem non in omnibus Cometis ejusdem est speciei. Nam in aliis parabolam, in aliis hyperbolam, in aliis etiam ellipsem refert; secundū nempe motum Cometæ impressum, atq; inclinationem disci Cometicī (cujus jam supra facta est mentio) nec non distantiam vel intervallum Cometæ à Sole, angulumq; Trajectoriarum & plani Ecliptici. In remotioribus enim Cometis à Sole, sub obtusiori Trajectoriarum, & radii Solaris ad Cometam ducti angulo incidentibus, motus hic verus æmulatur sectionem parabolicam; in vicinioribus verò Cometis, sub acutiori hoc angulo progredientibus, sectionem hyperbolicam: quemadmodum dilucidè comprobatum ivimus Lib. IX de Cometarum motu Cometog. quò Lectorem remitto. Ubi non solùm ex certis rationibus, sed plurimorum iconismorum demonstrationibus, superaddito calculo, in omnibus scilicet Cometis, quorum observationes haud defuerunt, prout etiam in Cometâ anni 1652 & 1661, fusè deductum est.

Hac igi-

Hac igitur ratione, atq; hanc viam conicam omnia phænomena, ut ut primo intuitu videantur prorsus aliena, & huic motui adversa, feliciter evincuntur ; dato etiam motu apparente longè mirabili irregulari simul tardissimo, simul velocissimo, quin-etiam longè velociori Cometa Regiomontano, quantævis sit durationis, sive apparitionis ; nihilominus, inquam, absq; omni vi & violentâ deductione deducuntur omnia. Hincq; Lib. IX pag. 633 admirandos exhibuimus Cometas, quoad motum & apparitionem, quorum prior septem mensium spatio duodecim signa Zodiaci & amplius trajicere posuit, motu apparenti perquam inæquali & anomalo ; vero tamen motu summè regulari & ordinato : tum qui posuit spatio 50 dierum sedecim integra Signa transcedere, licet in mediâ apparitione adeò tardus existat, ut confectis 160 diebus, vix duos Asterismos Signiferi transeat.

Alter Cometa, mediante eadem nostrâ hypothesi septem mensibus bis, in exortu scilicet & exitu, tantam ostendit velocitatem, ut uno aliquo tantum die quatuor integra Signa, ex Virgine in Taurum tranare posset ; licet in medio tardissimus extet ; dato etiam motu vero semper æquali & regulari ; in summâ, Cometam hunc, ex nostrâ Theoriâ, priusquam septem menses effluent, totum Cœlum & ejus dimidiam partem circumire, hoc est, octodecim Signa Cœlestia transcendere posse, demonstratur.

Tertius Cometa, quem in scenam produximus, potest hanc nostrâ invariata hypothesi, spatio 48 dierum, universâ duodecim Signa, & quidem contra seriem Sign. percurrende. Prodeat autem ex adverso aliquis, qui per circulos, sive etiam per lineas rectas, similem Cometam ejusq; phænomena universa, stante Terrâ atq; ejus annuo motu demto, eximere posse omnibus absurditatibus ; profecto, montes transferet.

Quartus ; intervallo 24 horarum, quinq; Signa Signiferi percurrit ; atq; Quintus integrum annum perdurat, totum Signiferum motu apparente spirali trajiciens. Concludo itaq; nullos non Cometas respuere Conicas sectiones, sed earum legibus sponte suâ obtemperare.

Ex quibus in proposito positum est, commonstrantibus etiam aliorum exemplis, posse utiq; nonnullos Cometas in linea ferè rectâ, sive obtusiori Conicâ moveri, atq; plus quam sex Zodiaci Signa pervolare ; ut ut nullus non adversum statuat, nec non novissimus Cometa non omnino semicirculum integrum expleverit ; sed fieri & decenter potest, ut aliud etiam in linea omnino rectâ sedecim imo octodecim Signa Cœlestia peragret. Sed inferas ; nonne, quæso, talis Cometa spatio integri anni totum pervadet Systema Planetarium, imo Fixarum totamq; Mundi Machinam ? Nentiquam, profecto, prout quoq; pag. 713 Lib. IX Cometog. evidenter probavimus, nullum unquam Cometam ex iis, quem instrumentis Astronomi dimensi sunt, concessum etiam omnium velocissimum ostentasse motum apparentem & verum, ne orbem quidem totum magnum, nedum Systema totum Planetarum, multò minus Fixarum transcendisse : hoc est, quod totum spatium, quod Cometa emensus est, toto durationis tempore, sub linea scilicet rectâ, vel conicâ, nondum æquet diametrum orbis magni, sive Terræ vel Solis ; quæ alias, ex no-

Ornes Cometa  
ta hoc transi-  
conico eximun-  
tur omnibus  
inconvenien-  
tis.

Admirandus  
Cometa, qui  
spatio 50 die-  
rum 16 Signa  
Zodiaci pera-  
grare potest.

Cometa du-  
bus tantummo-  
do diebus 8 Si-  
gna Zod. per-  
volans.

Autor valde  
dubitatis, stante  
Terrâ tales co-  
metas ullâ ra-  
tione salvari  
posse.

Cometa inte-  
gro anno con-  
spicuus & mo-  
tu spirali ince-  
dens.

Possunt utiq;  
nonnulli plus  
quam sex Si-  
gna trajicere.

An possit Co-  
meta motu suo  
etiam velocissi-  
mo continuo, re-  
cto vel conico  
totam Mundi  
Machinam e-  
metiri ?

Etiam si Co-  
meta, longissi-  
me finit dura-  
tionis, possunt  
tamen nenti-  
quam majus

*Spatium dia-  
metro terræ orbis  
apnui perva-  
dere.*

strâ Theoriâ, 10200 Semid. Terr. complectitur: quanquam perinde est, sive hâc nostrâ, sive quâpiam aliâ, utpote Tychonicâ rem decidas.

Unde iterum tûto colligitur, reliquas rationes ut modò præteream, quod omnes universim Cometæ in Systemate generentur Planetario, motum suum absolvant, tandemq; etiam penitus dissolvantur, priusquam ad ipsas Fixas viamq; lacteam pervenire possint. Sic ut rationi planè videatur absolum, cum eò nunquam pertingant, nec in tantâ distantiâ deprehensi unquam fuerint, originem Cometarum sub Fixis, vel in viâ lacteâ quærere. Quæ res non adeò leviuscula nobis videtur, & ulteriori inquisitione digna; sed quoniam non minùs suo loco jam à nobis factum est, sufficiat. Deinde, quod mecum magis demiraberis, atq; ex calculo & observatis deduximus: quod nullus Cometa motu suo naturali vero, unquam tardior fuerit Saturno, vel velocior Mercurio, in Trajectoriâ videlicet suâ verâ, secundum Semid. Terræ. Id quod, ut pariter inter Naturæ abscondita repono, sic penitus mecum statuo, hoc ipsum viam nobis sternere, ad plura hujus generis abstrusiora detegenda.

*An Cometæ  
æquali tem-  
po-re, æqualem  
motum pera-  
gent?*

In Cometographiâ inter alia maximoperè operam dedi, prout etiam multo mihi constitit sudore, quò ex ipsis omnium Cometarum observationibus, quantitatatem veri motûs diurni, debito calculo elicerem: an nimirùm omnes Cometæ æqualibus temporibus, æquale itineris spatiū peragrent? Quantâ celeritate motûs omnium velocissimus vehatur? tum contrâ, quantâ tarditate omnium tardissimus incedat? Inveni autem motum hunc in omnibus valdè esse diversum, ut nullus penè alteri omnino sit æqualis; neq; eundem in toto itinere singulis diebus similem referre incessum, sed continuo, ratione tamen convenienti sensim crevisse aut decrevisse. Motus verus diurnus omnium lentissimus in Cometâ Regiomontani 1472, cuius tamen motus apprens, præ reliquis, ferè concitatisimus fuit, 33 tantum Semid. T. in suâ Trajectoriâ deprehensus est. Rursus omnium celerrimum motum diurnum verum, Cometa anni 1607 ad 220 Semid. T. exercuit; reliquorum Cometog. pag. 701 Lib. IX exhibet. Quali verò gradu nuperus incesserit Cometa, futurus calculus Cometographiæ addendus comonstrabit.

*Vnde hic mo-  
tus acceleretur,  
et retardetur.*

Verum, queras, unde hæcce Cometarum inæqualitas, tum retardatio & acceleratio veri motûs ortum suum trahat? qui tamen motus, ut modò innimus, summè aliàs regularis & proportionatus est, eo pacto ut, si ab initio crescit, constanter ad statutum tempus crescat; inde rursus concinnâ proportione debilitetur, vel vice versa; in nonnullis etiam non nisi continuo augeatur, in nonnullis perpetuò diminuatur. Dicam; quemadmodum etiam satis superq; rationibus physicis ac demonstrationibus citato Lib. IX comprobavimus. Primò autem, scire Te oportet, quod motus hic verus in omnibus illis Cometis ritè detectis, non eo loco Trajectoriæ, quò aliàs motus in suâ orbitâ omnium sit velocissimus, ut jam ex superioribus percepisti, ubi videlicet Cometa Terræ proximus est, aut Terra motu contrario vestigium transgreditur; sed ibidem solummodo, ubi Cometa Soli vicinior existit, atq; perpendicularum ex Sole in Trajectoriam incidit, sub angulo scilicet normali. Proinde, quò angulus radii Solaris in Cometa cum Trajectoriâ acutior, vel obtusior

*Ubinam mo-  
tus genuinus  
cometarum  
semper sit ve-  
locissimus.*