



1  
(a)  
14  
10

1  
(a)  
14  
10

10 - 24 - 5 -

29

6-24-10

1  
(a)  
14  
10



CHRISTIANI  
H V G E N I I  
ZVLICHEMII, CONST. F.  
HOROLOGIVM  
OSCILLATORIVM.

Divisum est super partes diuidit  
dissimilius

Plures De libri Horologiorum Oscillatoriis continet  
secundum quae de Declaratio libri Horologiorum Oscillatoriis  
terris de Demonstratio libri Horologiorum Oscillatoriis

Quibus tria Regum in quo circumscribitur  
et boundary inter se.

20447

**SIVE**  
**MOTV PENDVLORVM**  
**AD HOROLOGIA APTATO**  
**Demonstrationes**  
**GEOMETRICÆ.**



PARISIIS,  
Apud F. MUGUET, Regis & Illustrissimi Archiepiscopi Typographum,  
via Citharae, ad insigne trium Regum.

MDCLXXIII.  
CVM PRIVILEGIO REGIS.

CHRISTIANI  
VAN GENNI  
SAFICHENII CONS. E  
HOROLOGIUM  
OSCILLATORIUM

Dividitur liber hic in partes quinque,  
quarum


Prima Descriptionem HOROLOGII OSCILLATORII continet.

Secunda agit de Descensu gravium, & motu eorum in Cycloide.

Tertia de Evolutione & Dimensione linearum curvarum.

Quarta de Centro Oscillationis seu Agitationis.

Quinta alterius Horologii constructionem, in quo circularis  
est penduli motus, exhibet, & Theorematum  
de Vi Centrifuga.



PARISIIS

Abd F. Muguet, Regis & Illusterrimi Academiique Tychonianae  
Academy, ac Inscripte, ex iunctio eiusdem Redim.

MDCCLXXII

CVM PRIVILEGIO REGIS



# LVDOVICO XIV, FRANCIÆ ET NAVARRÆ REGI INCLYTO.

**B**ENATAM, Rex maxime, restitutamque hoc sæculo Geometriam, Galliæ præcipue debemus. Hinc enim orti, qui magna meliorique sui parte deperditam, ac veluti sepultam, instaurarunt primi, & in lucem reduxerunt. Quorum vestigiis insistentes, ita eam deinde, per totam Europam, excoluere viri subtilissimi, ut pauca jam posteriorum industriæ ab his relicta videantur; veterum vero inventa longissime prætervecti sint. In hac scientia, quam semper admiratus sum & amavi plurimum, quandocunque ad eam animum applicui, illa mihi præ cæteris proposui investiganda, quæ vel ad vitæ commoda, vel ad Naturæ cognitionem, reperta prodesse possent. Tunc verò optimè operam me collocasse existimavi, cum in ea incidisset, in quibus utilitas cum inveniendi difficultate, ac subtilitate ali-

qua, conjuncta foret. Quod si commendationis nonnihil accersere muneri nostro permittitur, ne prorsus indignum tua magnitudine apparet; non alias felicius, quam in hoc Horologii invento, utrumque illud me consecutum esse profiteor. Etenim, cum ex parte mechanicum sit inventum; ex parte altera, eaque multò præcipua, geometricis principiis constet; id quod ad posteriorem hanc attinet, non levi conamine, ex intimis artis recessibus petendum fuit: adeo quidem, ut inter omnia, quæ impensiore studio hactenus pertractaverim, haud dubie primum huic speculationi locum tribuam. Quænam vero in his sit utilitas, non est quod multis, Rex potentissime, ostendere tibi laborem. Non solum enim diutinâ experientiâ compertum habes, ex quo regiæ tuæ penetralibus recipi meruere Automata nostra, quantum, æquabili horarum demonstratione, cæteris hujusmodi machinationibus excellant: sed & potiores usus eorum, quibusque jam inde à principio mihi destinata fuere, non ignoras. Illos scilicet, quos & in Cælestium observationibus, & in Longitudinibus locorum inter navigandum dimetiendis, præstare apta sunt. Tuo enim jussu, non semel, per mare vecta fuere Horologia nostra. Tuis auspicis eadem nec pauca, Astronomiæ usibus dicta, visuntur in præclara illa Vraniæ arce, quam insigni nuper magnificentia, quantaque antehac regum nemo, exædificandam curasti. Quæ quoties mecum reproto, toties de fortuna hu-

ius inventi, quod in tua tempora inciderit, non  
parum mihi gratulari soleo. Nec jam requiret  
quisquam, opinor, qui quantum tibi illud de-  
beat intelliget, cur lucubrations has, quibus  
rationem ejus omnem descriptionemque expli-  
cui, augusto Nomi<sup>n</sup>i tuo inscribendas duxerim.  
Ac minus etiam id mirabitur, qui mihi, ad hæc  
atque alia meditanda, tranquillum otium beni-  
gnitate tua contigisse didicerit. Namque & hu-  
jus, ut mihi aliquatenus apud te ratio consta-  
ret, adnitendum erat; & quoquo modo conan-  
dum, ut, multis continua<sup>s</sup>que à te beneficiis af-  
fectus, nonnulla grati animi significatione de-  
fungerer. Scio equidem, rebus maximis, nego-  
tiisque iis intento, quæ in illo rerum fastigio  
positum agitare convenit, haudquaquam tibi  
liberum esse, ut ad hujusmodi contemplationes  
animum, alioqui rerum omnium capacem, ad-  
vertas. Sed non ideo minus grata hæc fore, mi-  
nusve tibi probatum iri arbitror, Rex augustissime;  
cui illa maximè placere videmus, quæ  
plurimum publicè prosunt; neque aliud magis  
curæ esse, quam ut nova incrementa sumant  
optimæ disciplinæ, novisque illustrentur inven-  
tis. Hoc enim satis declarat eximia illa tua, ac  
singularis, tum in ipsis promovendis, tum in his  
qui cognitione earum præminent remuneran-  
dis, liberalitas. Quam non immensæ, ac solito  
majores, bellorum impensæ quidquam immi-  
nuunt: non Galliæ tuæ fines circunscribunt. Ut  
plane te hoc agere appareat, quò non solum sub

imperio tuo viventes, sed & Orbis universus,  
quacunque beneficio tuo dignus est, te regnante,  
eruditior, ornatior, felicior evadat. Cui  
verissimæ præclarissimæque gloriæ tuæ, ita ali-  
quid fortasse etiam hæc literaria monumenta  
conducent; ut, si viguisse hoc tempore studia  
ista, artesque, posteris testari possint, simul  
illos edoceant, tuæ hoc virtuti, atque ani-  
mi magnitudini, ante omnia acceptum feren-  
dum esse. Lutetiæ Parisiorum; xxv. Mart. A.  
**CICLOPS**





# HADRIANI VALLII DAPHNIS, ECLOGA.

*Ad Christianum Hugenium Zulichemium,  
Constantini F.*



INITIUM tutela, simul jucunda voluptas,  
Dilecta Phœbo, Sceverinides \* Oceaninæ;  
Hunc quoque Pierum mihi fortunate laborem:  
Pervigilem noctem quo carmine duxerit Ancon

Navita, dicemus: vestro sic gurgite numquam  
Pan lavet, aut turpes incestent æqua Fauni.

Te, quem Fama vehit super aurea sidera curru,  
Ne pigeat nobis aurem præbere farentem,  
HUGENIDE, decus Hugenidum, fratrumque patrisque;  
Haud indigna tuo ferimus donaria sensu,  
Sicelisin aptata modis à vate Batavo  
Mixta Palæphatio commenta Solensia versu,  
Teque intertextum tuaque præclara reperta.

Iam caput Oceano, stipata minoribus astris,  
Extulerat radiis fraternis æmula Phœbe,  
Cum redditum molirentur pastoria pubes,  
Sidere quam pleno conchas legisse marinas  
Iuverat, hærentesque vadis captare paguros.  
In celso tamen advertunt Ancona morantem  
Colle, reum toties promissi carminis. ipsum  
Thestylis & Corydon, quos cætera turba secuti,  
A tergo circumveniunt, cinguntque corona.  
Ecquid agat, rogitant blandè: tum fausta precantur;  
Et damnant voti, promissaque carmina poscunt.  
Contra ille; O Pueri, quid portet crastinus Eos,  
Sedi explorator: turmales agmine mergi,  
Solivaga aut cornix, aut alcyones desertæ

\* Sceverina, Pagus apud Batavos, mari adjacens.

## DAPHNIS ECLOGA.

Si qua darent mihi signa, maris cras æquor arandum.  
Detinuit nunc usque Iovis clementia fudi,  
Et picturatus tot circum animalibus æther.  
Quæ nos in vitro miramur monstra profundo,  
Fert radians æther, vultus formasque natantum.  
Cancer ibi est, delphinque; est grandi corpore cetus.  
Ad Boream pisces, & contemplere sub Austro  
Pisces; nuper ubi numero crevisse feruntur.  
Sunt urna, fluviusque, & aplustris comta carina  
Illic, quin operis simulamina plurima vestri,  
Luminaque in cœlo pecori debentia nomen.  
Sunt hœdi parvæque suis, materque capella.  
Et fuse sparso quæ candet semita lacte.  
Vestibulum servant, elucens vellere fulvo  
Dux aries, ingensque auratus cornua taurus.  
Bini cernunturque canes, pernoxque bubulcus;  
Plaustraque; qui que auriga suis excussus habenis.  
Stellatum volat alatus per inane caballus:  
Ac præsepe suum juxta stabulantur aselli.  
Illic virgo, manum Cereali inlustris arista,  
Et, transmutatus faciem, Pan ipse renidet;  
Daphnin amans vestrum, secretæ rupis in umbra,  
Vranie velut edocuit: me singula Daphnis.  
Singula quæ (carmen quia poscritis) ordine pandam.

Extemplo tentat vocem: numerosque modosque  
Perpendens mulcit variis concentibus auras.  
Tum venti posuere, jacet sine fluctibus æquor;  
Factaque sunt terris, sunt facta silentia ponto.  
Mox interfatur: Quod prosperet; ab Iove magno  
Ordinar: ordiri consuerunt ab Iove vates.  
Vos, nec enim rerum brevis hic mihi nascitur ordo,  
Nocturnum chorea defendite corpore frigus.

Inde Iovis magni cunas, veterisque celebrat  
Saturni iussum crudele, dolumque Cybelles;  
Ortaque Dictæis Corybantia sacra latebris:  
Ut pueru nutrix sit olenis lecta mariti  
Vxor; & ipsa recens hædos enixa gemellos;  
Queis comitata polum modo lucida stella frequenter,  
Quæ prius Oleniis balavit bestia campis;  
Sub pedibusque terat formosi limen Olympi.

Tantus

## DAPHNIS ECLOGA.

Tantus amor Iovis , & percepti gratia lactis.  
Nec tamen hoc niveum manasse fluore nitorem,  
In duo secta vias , oculis manifesta videntum,  
Semita quo cander dicens ad tecta Tonantis;  
Tergeminam sed noctem productumque canebat  
Alciden mundo ; deus immortalis haberit  
Haud pote qui fuerat , soplata parvula mammis  
Labra pater gnati nisi conjugis admovisset :  
Quæ , simul expperrecta , simul conterrita , surgens  
Vvidulas tenero mammas substraxerit ori,  
Indignata. pavimentum tabulataque cœli  
Deciduus maculis ut tunc infecerit albis  
Per convexa ruens in se revolubilis humor:  
Orbita cycneo nunc unde bifurca colore,  
Ducta per æquales medio discrimine partes ,  
Ceruleum velut argento ferruminet axem :  
Axem , cervices qui quum lassaret Atlantis ,  
Haud gravis Herculeo requierit sarcina collo ;  
Atque tot ærumnas quem post , manesque subactos ,  
Ipse suis ornet jam portio magna triumphis ;  
Hesperidum contra custodem divitis horti  
Insurgens Anguem pede nixus ; apertaque retro  
Terribili riœtu nil curans ora Leonis ;  
Lerneæque audacem Hydræ succurrere Cancrum ;  
Monstra novercales testantia jugiter iras  
Et frustra bacchatum odium Iunonis iniquæ.

Hinc aliam memorat grassatam fraude novercam ;  
Et transmittendi pavidam nimis æquoris Hellen :  
In thalamos sit ut illa tuos , Neptune , recepta :  
Phryxeumque pecus , fœtamque heroibus Argo  
Phasidos ad fluctus deducit & æthera cantu.

Nec silet Europæ vectoris præmia ; vel te ,  
Bigarum Pelopis perjuri , Myrtle , rector.  
Myrtoum pelagus signaras ante caduco  
Funere ; sublimem nunc tollunt cornua Tauri.

Haud procul his Hyades notat exardescere : sed , quæ  
Sunt Hyades Graiis , Suculas dixisse Latinos ;  
Atque duas septem mutasse Trionibus Arctos ;  
Arctophylaca pigro , sua plaustra sequente , Bubulco ;  
Quando bovem prisco vocitabant more trionem ,

## DAPHNIS ECLOGA.

Quod tereret duro proscissam vomere terram.

Hanc adeo sortem miserans, suspiria ducit;

Buceriumque genus questu compellat inani;

Ah pecus infelix, armentum! sæcla fuerunt,

Pondere quum duro neque vos gemeretis aratri,

Navita nec vestro vocitaret nomine stellas.

Tunc neque sidus erat terris pia Virgo relicta,

Quæ Cereale manu spicum gerit; Icariotis

Sive sit Erigone, cui fida Canicula patrem

Quærenti indigna monstravit cæde peremptum;

Atque, comes dominæ, domino comitem Oarioni

Astra minor socium majorem repperit inter:

Seu magis Astræi sit sanguine creta, perenne

De genitore suo quæ nomen contulit astris:

Sive sit antiquæ Themidis justissima proles,

Aversata jugo vos aspectare gravari,

Tempora dum, pulsis melioribus, ærea surgunt:

Sive sit alma Ceres; horrens fugitiva videre

Vos quoque maestri; nil pejor linquit inausum

Ferrea dum soboles, ipsorum inimica Deorum:

Quos, quasi de terra (nam Dii coluistis & illam)

Sit pepulisse parum, tentavit pellere cœlo.

Tum detestatur suffultos angue Gigantas;

Porphyrona, statu torrentem cuncta minaci;

Rhæcumque; immanemque Gygen, validumque Mimanta;

Enceladumque; manusque rotantem Ægeona centum;

Et, cui par nemo feritate, Typhœa dirum,

Ausos invasisse Deos tellure fugatos,

Ac totum magno cœlum complesse tumultu,

Vndique divulsa jaculantes torviter ornos

De tumulis cumulorum montibus ex agrestis.

Terrigenam ut pubem, Divum penetralia sancta

Rimantem, Superi mentito fallere vultu

Quæsierint, addit; dispertitosque pavore:

Donec apud latè stagnantis flumina Nili

Horrificam faciem Pan sumserit Ægocerotis;

Ambiguoque sono Superos animarit ad arma,

Anguipedesque metu dare terga coegerit omnes;

Cœlo donandos Afinos auxisse timorem

Congerie vocum, perterritre poque fragore:

## DAPHNIS ECLOGA.

Illa cælicolis nam tempestate fuisse  
Auxilio Satyros, Silenorumque phalangem,  
Evantes in asellis cum Bacchæ ululatu,  
Thyrsis armatos, tectos colocynthide parma.

Parvus ut interea volucer cum matre Cupido  
Venerit Assyrii fugiens Euphratis ad undam;  
Induerintque gregis (Syriæ post numina genti)  
Squammigerum formas, gemini nunc aurea Pisces  
Lumina, signiferum Capricorno juncta per orbem,  
Ni fusa medius secernat Aquarius Vrna;  
Deucalioneos neque non edisserit imbres,  
Nectaris aut quanti Ganymedes pocula verset;  
Sive sit is Cecrops, peplo præsignis Athenæ;  
Pastor Aristæus seu plena alvearia gestet,  
Quæ subter volitets apes examine densò.

Qualiter & pandus vectarit Ariona Delphin,  
Ac aliter vectum Danaeum Persea narrat;  
Cepheaque, Andromedenque, & mœstam Cassiepeiam;  
Insertumque polo vastum Pistriceis hiatum:  
Quem Phaëthonus longo sinuamine propter  
Fulgeat Eridanus declivi proximus Austro:  
Nuper ad occulti Batavos ubi verticis axem  
Intuitos nova squammigerum simulacra micare:  
Sollertes Batavos, imo seu gurgite pisces  
Venari sit opus, vel in alto sidera cœlo.

Tum canit, ut Daphnis sacra sub rupe docentem  
Viderit Vranien: argutas carmina silvas,  
Et repetita cavos ediscere carmina montes:  
Ut Chaldæa vetus, mira dulcedine capti,  
Stent auditores circum, & Babylonia turba;  
Dein quos Graia tulit, quos aut Nilotica tellus,  
Itala quos, ac pulchra suo cum Cæsare Roma;  
Post Arabum de stirpe viri & regnator Iberus;  
Ac tandem quos consultos Germania misit  
Astrorum cœlique, suæ qui sidera terræ;  
Inferior nullis ut item neque Gallia desit;  
Gallia magnanimi Regis splendore superba,  
Borbonios ignes cui parturit arduus æher:

Tum Dea quo Daphnis, Divam quo Daphnis amore  
Complexus, quanti non conscientia Latmia saxa:

## DAPHNIS ELOGA.

Vtque Conon juveni radium donarit, utrimque  
Multo insignem auro, & pellucidulis crystallis;  
Per quas quod species, prope fiat; & augmina sumat:  
Dixerit &: Sollers, en, primus quale Batavus  
Munus adornarit; sed Etrusci quo decus Arni  
Est Antenorea senior Tyrrhenus in urbe  
Regna Iovis princeps metatus, ab æthere vobis  
Nunquam nota prius miracula nuntia portans;  
Lunæ montes; vultus tibi, Phosphore, ternos;  
Quove satellitio sublustræ nocte vagetur  
Stella Deum regis per cœrulea tempora supernæ  
Hoc quoque tu non nota prius miracula prodes:  
Hujus erat tibi servatus sollertia usus;  
Arcanumque Chroni mortalibus omne recludes.  
Accipe frustra olim nobis optabile donum.

Daphnidis ad gratum nomen pernice chorea  
Exsultant alacres Pueri: neque segnius ipse  
Prosequitur; Geminæ imitantia lumina falces  
Haec tenus ut vanæ Saturni credita sidus  
Oblongo tam diversa sub imagine disco  
Fingere, quando globum teretem teres annulus extra  
Splendet, & ambo nigror spatii distaminat intus;  
Exiguo circum quos erret stellula gyro:  
Omnia divino quæ freat munere Daphnis  
Extulerit, non ante novam vulgata per artem:  
Adjungitque; quod his meritis permulsus, eundem  
In sua magna Chronus sit adire sacraria passus:  
Heic oculis lustrarit ut omnia; promferit atque  
Inventum subtile secandi temporis illinc;  
Partes quo minimas ac momina dividat horæ,  
Oscilla ex tenui suspendens mollia filo:  
Id labyrintheos cursus qui dirigat alni,  
Ignarumque viæ ratis haud finat esse magistrum:  
Cui neque quotidie tam certus spondeat auctor,  
Oceano quantum Titan altissimus exstet;  
Ac quibus emergat, queis tunc simal occidat oris,  
Daphnidos egregio norint conamine docti.

Ille canit: chorus in numerum sua brachia quassant,  
Alternoque solum pede pulsant. at freta saltu  
Librabant hilares se super humida thynni.

## DAPHNIS ELOGIA.

Auritus leporum populus tunc creditur ultro  
Iliceas liquisse domos, carasque quietes  
Vicini nemoris: nulloque frequentior unquam  
Caricis arrosor prodiisse cuniculus antris  
Tempore narratur; narrent si vera puellæ  
Littoreæ, quæ siccandis custodia passim  
Retibus ad ventos expansis forte sedebant.  
Pectore Nerëides nudo, lasciva caterva,  
Visa per incertam Lunam, visæve putantur,  
Et Triton, Glaucusque, procul sub luce maligna;  
Tuque, cubans juxta stratas prope littora phocas,  
Neptuninarum pecudum fidissime custos:  
Neu quisquam seræ meminit decadere nocti.  
Interea tenebræ densantur; & abdita nimbo  
Cynthia dum latitat, cœli de parte Serena  
Cinctum non solitis processit crinibus astrum,  
Prolixumque trahens albore notabile syrma.  
Mirantur chorus attoniti, miratur & ipse;  
Præsertim tantum capiti cum demsit honorem,  
Ornatumque sequacem omnem mox reddita Luna.  
Infit &: Ad sua quisque mapalia tendite nota,  
Prodigio nil solliciti, curamve foventes.  
Insuetos alias tales cantabimus ignes,  
Et trepidantem nequicquam formidine vulgum.  
Hæc Ancon: mihi vîa tibi quæ digna referri,  
HUGENIDE, decus Hugenidum, cui sidera curæ,  
Nec Phœbum ac Pimplæ fas est contemnere Divas,  
Queis tua tota domus, fratres, genitorque dicati.  
Sic neque te facies peregrini terreat astri,  
Idemve anne aliis vario fulgore cometes.

A. CICCI LXV.

CHRISTIANI

PRIVILEGE DU ROY.

L OUIS par la grace de Dieu Roy de France & de Navarre : A nos amez & feaux Conseillers, les Gens ténans nos Cours de Parlement, Maistres des Requestes ordinaires de nostre Hostel, Baillifs, Seneschaux, Prevosts, leurs Lieutenans, & tous autres Justiciers & Officiers qu'il appartiendra, Salut. Nostre cher & bien amé FRANÇOIS MUGUET nostre Imprimeur ordinaire, Nous a tres-humblement fait remontrer qu'il luy auroit esté mis és mains un Livre intitulé, *Christiani Hugenii Zulichemii Conf. F. Horologium Oscillatorium, seu de motu Pendulorum ad horologia aptato demonstrationes Geometricæ*, qu'il desireroit donner au public s'il nous plaisoit luy en accorder la permission, humblement requerant icelle. A CES CAUSES voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous luy avons permis & accordé, permettons & accordons par ces présentes d'imprimer ou faire imprimer ledit Livre en telle forme, caractere, volume, & autant de fois que bon luy semblera, durant le temps de six années entieres & consecutives, à commencer du jour qu'il seraachevé d'imprimer pour la premiere fois, faisant tres-expresses défenses à toutes personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, de l'imprimer ou faire imprimer, vendre ny débiter durant ledit temps en aucun lieu de nostre Royaume, sans le consentement de l'Exposant, ou de ceux qui auront droit de luy, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de quinze cens livres d'amende applicable, un tiers à Nous, un tiers à l'Hôpital General de nostre ville de Paris, & l'autre tiers à l'Exposant, de confiscation des exemplaires contrefaits, & de tous dépens, dommages & interests, à la charge qu'il en sera mis deux exemplaires en nostre Bibliothèque ordinaire, un en celle du cabinet de nostre Louvre, & un autre en celle de nostre amé & feal Garde des Sceaux le sieur Daligre. Si vous mandons que du contenu en ces présentes vous fassiez joüir & user l'Exposant, & ceux qui auront droit de luy pleinement & paisiblement, cessant & faisant cesser tous troubles & empêchemens au contraire, voulans qu'en inserant ces présentes ou extrait d'icelles en chacun des exemplaires, elles soient tenuës pour bien & deuëment signifiées ; Commandons au premier nostre Huissier ou Sergent sur ce requis, faire pour l'execution des présentes tous exploits à ce necessaires. CAR tel est nostre plaisir. DONNE à Versailles le dernier jour de Septembre l'an de grace mil six cens soixante-douze. Et de nostre Regne le trentième. Signé, LOUIS. Par le Roy, COLBERT.

Registre sur le Livre de la Communauté des Marchands Libraires & Imprimeurs de Paris, le 4. Novembre 1672. suivant l'Arrêt du Parlement du 8. Avril 1653. & celuy du Conseil Privé du Roy du 27. Fevrier mil six cens soixante-cinq. Signé, D. THIERRY, Syndic.

Achevé d'imprimer pour la premiere fois le premier jour d'Avril 1673.


Les Exemplaires ont esté fournis.

CHRISTIANI



I

CHRISTIANI HVGENII  
ZVLICHEMII, CONST. F.  
**HOROLOGIVM  
OSCILLATORIVM,**  
SIVE  
**DE MOTV PENDVLORVM  
AD HOROLOGIA APTATO**  
Demonstrationes Geometricæ.



NNVS agitur sextus decimus ex quo fabricam horologiorum, tunc recens à nobis inventorum, edito libello publicam fecimus. Ab illo verò tempore cùm multa invenerimus ad perfectionem operis spectantia, visum est ea singula hoc libro exponere. Quæ quidem adeo ad perfectionem ejus inventi pertinent, ut potissima ejus pars censeri possint, ac velut fundamentum totius mechanicæ hujus, quo prius destituta erat. Mensura enim temporis certa atque æqualis pendulo simplici naturâ non inerat, cum latiores excursus angustioribus tardiores observentur; sed geometria duce diversam ab ea, ignotamque antea penduli suspensionem reperimus, animadversâ lineâ cuiusdam curvaturâ, quæ ad optatam æqualitatem illi conciliandam mirabili plane ratione comparata est. Quam postquam

A

2 CHRISTIANI HVGENII

horologij adhibuimus, tam constans certusque eorum motus evasit, ut post crebra experimenta terra marique capta, manifestum jam sit & Astronomiae studijs & arti Nauticæ plurimum in ijs esse præsidij. Hæc ea est linea quam defixus in circumferentia currentis rotæ clavus, continua circumvolutione, in aëre designat; à Geometris nostri ævi cycloidis nomine donata, & ob alias multas sui proprietates diligenter expensa; à nobis vero propter eam quam diximus mensurandi temporis facultatem, quam nihil tale suspicantes, ac tantum artis vestigiis insistentes, inesse ipsi comperimus. Hanc cum jam pridem amicis horum intelligentibus notam fecerimus (nam non multo post primam horologij editionem animadversa fuit) nunc eandem, demonstratione quam potuimus accuratissima firmatam, omnibus legendam proponimus. Itaque in hac tradenda demonstratione potissima pars hujus libri versabitur. Vbi primùm necesse fuit novis nonnullis demonstrationibus stabilire & promovere ulterius viri maximi Galilei de descensu gravium doctrinam, cuius fructus desideratissimus, atque apex veluti summus, hæc ipsa quam invenimus cycloidis est proprietas.

Quæ porro ut ad pendulorum usum aptari posset, nova curvarum linearum consideratio adhibenda fuit, earum scilicet quæ sui evolutione alias curvas generant. Vnde comparatio inter se longitudinis curvarum cum rectis nascitur, quam ulterius etiam quam præsens necessitas postulabat prosecutus sum, propter theoriæ, ut mihi visum est, elegantiam & novitatem.

Cæterum ad explicandam Penduli Compositi naturam, cuius utilitatem in constructione horum automatōn demonstro, ad jungenda fuit Centrorum Oscillationis contemplatio, à pluribus quidem, sed minus feliciter, hactenus tentata; in qua theorematum complura animadversione, ni fallor, digna reperientur, ad figuræ lineares, planas, solidasque pertinentia. Ante hæc omnia vero præmittitur ipsa horologij mechanica constructio, pendulique applicatio, eâ formâ quæ ad usus astronomicos aptissima reperta est, ad cuius instar reliquæ omnes, mutatis quæ opus est, facile ordinari possint.


Quia vero contigit egregio hujus inventi successu, quod fieri plerumque solet, quodque futurum prædixeram, ut plures sese ejus auctores esse cuperent, aut si non sibi ipsis, suæ tamen nationis alicui potius quam nobis eum honorem tribui vellent, inquis eorum conatibus tandem aliquando occurrentum hic

## HOROLOG. OSCILLATOR. ,


arbitror. Nec sanè aliud fere opponere ijs necesse fuerit præterquam id unum, nempe ante annos sexdecim, cum nec dicto nec scripto cujusquam de horologijs hujusmodi mentio facta esset, aut rumor ullus omnino ferretur (loquor autem de penduli simplicis usu ad horologia translato, nam de Cycloidis additione nemo credo controversiam movebit) constructionem eorum propria meditatione me adinvenisse & perficiendam curasse. In sequenti anno, qui nempe hujus saeculi quinquagesimus octavus fuit, delineationem automati descriptionemque typis vulgasse; exemplaria, tum operis ipsius, tum libelli, quaquaversum dimisisse. Nam cum haec ita omnibus nota sint, ut nec testimoiiis eruditorum, nec Bataviæ Ordinum actis, quibus possent, confirmari opus habeant, facile apparet quid de illis existimandum sit, qui septem post annis eandem constructionem, quasi à se suisve amicis profectam, libris suis venditarunt. Qui vero Galileo primas hic deferre conantur, si tentasse eum, non vero perfecisse inventum dicant, illius magis quam meæ laudi detrahere videntur, quippe qui rem eandem, meliore quam ille eventu, investigaverim. Cum autem vel ab ipso Galileo, vel à filio ejus, quod nuper voluit vir quidam eruditus, ad exitum perductum fuisse contendunt, horologiaque ejusmodi re ipsâ exhibita, nescio quomodo sibi creditum iri sperent, cum vix verisimile sit adeo utile inventum ignoratum manere potuisse annis totis octo, donec à me in lucem ederetur. Quod si deditâ operâ celatum fuisse dicant, idem hoc intelligunt à quolibet alio posse obtendi, qui sibi originem inventi arrogare cupiat. Itaque probandum quidem id foret, neque eo magis ad me tamen quicquam pertineret, nisi una quoque ostendatur, id quod omnes latebat, mihi soli innotuisse. Et haec quidem necessariæ defensionis causa dicenda fuere. Nunc ad ipsius automati constructionem pergamus.



**FIG.I.**




**FIG. II.**



**FIG. IV.**



**FIG. III.**





## HOROLOGII OSCILLATORII.

*P A R S P R I M A,*

*Descriptionem ejus continens.*

**F**IGVR A adscripta horologium à latere inspiciendum præbet, ubi primum laminæ binæ sunt **A A**, **B B**, semipedali aut paulo ultra longitudine, latæ pollices duo & semis, quarum anguli quatuor columellis coaptantur, ut sesquipollice inter se distent. His laminis rotarum præcipuarum axes utrinque inseruntur. Prima atque infima est quæ notatur **C**, dentibus 80 incisa, cuius axi orbiculus quoque **D** affixus est, aculeis ferreis asper, ut funem cum appensis ponderibus contineat, quæ qua ratione ordinentur postea dicetur. Ponderis itaque vi rota **C** vertitur; hæc movet proximum tympanum **E** dentium octo, unâque rotam **F** eodem axe hærentem, cui dentes 48. Hanc excipit tympanum aliud **G**, & in eodem axe rota **H**, quibus dentium numerus idem qui tympano rotæque præcedenti. Sed hæc rota ejus est generis quas à forma coronarias vocant artifices nostri. Hujus dentibus agitatur tympanum **I** simulque rota **K**, quæ eodem axe tenetur, ad perpendiculum erecto. Tympano dentes 24; rotæ 15, atque hi ad instar ferræ dentium incisi. Supra medium rotam **K** transversus jacet axis pinnatus **L M**, cuius extrema sustinent hinc inde gnomones **N Q** & **P**, seorsim affixi laminæ **B B**. Notanda vero in gnomone **N Q** pars deorsum prominens **Q**, quæ oblongo foramine patens transmittit axem **L M**, simulque retinet eum quem rotæ **K** tympanoque **I** communem esse diximus, inferiori sui parte gnomoni **N** innitentem. In lamina **B B** foramen amplum excavatum est, quo ultra ipsam extendatur axis pinnatus **L M**, qui subtili cuspidé insertus gnomoni **P**, liberius ita movetur quam si ab ipsa lamina **B B** sustineretur simulque ultra eam prominenter debet enim prominere necessario ut affigi possit clavula **s**, quæ simul cum eo versationes faciat. Est autem hic motus reciprocus, nunc in hanc nunc in illam partem, quum dentes rotæ **K** alternatim occurrant pinnulis **L L**, notâ vulgo ratione, quæque proinde diligentiori explicatione non indiget.

## 6 CHRISTIANI HUGENII

DESCRIPTIO  
HORLOGII.

Porro clavula s, ima sui parte reflexa ac foramine oblongo terebrata, penduli virgam ferream, cui plumbum x affixum est, amplectitur. Hæc vero virga superne dupli filo suspensa est inter geminas lamellas, quarum una t hic tantum cernitur; itaque alteram figuram juxta descripsimus, quæ utriusque formam flexumque & totam hanc suspendendi penduli rationem exprimeret. Quanquam de vera laminarum istarum curvatura pluribus postea agendum erit.

Nunc autem ut de motu horologij dicamus, nam reliquas figuræ partes postea exequemur, facile euidem appareat & vi rotarum, à pondere tractarum, perpendiculi v x motum sustentari, postquam semel manu incitatum fuerit; & simul perpendiculi statos recursus rotis universis, totique adeo horologio movendi legem normamque præscribere. Clavula enim, quantumvis levi rotarum impulsu acta, non tantum obsequitur trahenti perpendiculo, sed & singulis recursibus paulisper ejus motum adjuvat, atque ita perennem reddit, qui alioqui sua sponte, vel verius occursu aëris, deficeret paulatim, vergeretque ad quietem. Rursus vero, quum ejusmodi sit natura penduli ut eodem semper tenore feratur, neque ab eo ulla ratione præterquam mutata longitudine dimoveri possit; utique postquam flexu lamellarum, inter quas suspensum est, æqualitatem illam consequuti fuimus; nequaquam permititur rotæ x, ut nunc citius nunc tardius incedat, etsi sæpe, ut in vulgaribus horologiis, id facere conetur; sed necessario singulidentes ejus coguntur æquabiles transire temporibus. Hinc vero manifestum est, & reliquarum quæ præcedunt rotarum, & denique etiam indicum æquabiles conversiones effici, cum omnia proportionaliter moveantur. Quamobrem siquid in fabrica vitij fuerit, vel, ob aëris mutatam temperiem, difficilius rotarum axes volvantur; dummodo non eo usque ut omnis horologij motus interrumpatur; nulla propter hæc inæqualitas aut motus retardatio timenda erit, semperque aut rectè tempus metietur aut omnino non metietur.

Indices porro hoc pacto circumaguntur atque ordinantur. Tertia lamina prioribus parallela est y y, pollicis quarta parte distans ab ea quæ notatur A A. In ea circuli horarij descripti sunt centro eodem x quo protenditur axis rotæ c. Quorum circulorum interior duodecim horarum divisionem habet, alter scrupulorum 60. Axii vero rotæ c aptatur, ultra laminam A A, rota β, tubulo coherens qui usque ad ε continuatur trans laminam y y; atque ita

## HOROLOG. OSCILLATOR.

7

insidet axi illi, ut una cum illo circumferatur; sine illo tamen, ubi opus fuerit, converti possit. Ad eum index imponitur, horæ spatio circuiturus atque ita scrupula prima, seu sexagesimas horarum, demonstratus. Rota vero quam diximus  $\beta$ , aliam rotam, totidem quod ipsa habet dentium, impellit, atque una affixum ei tympanum cui dentes sex, axiculo eorum communi hinc laminâ  $\alpha$ , inde gnomone  $\delta$  suffulto. Hoc tandem tympano rota  $\zeta$  movetur, dentes habens 72, tubulumque affixum qui & ipse ultra laminam  $\gamma$  ad  $\theta$  porrigitur, paulo citra quam definit tubulus rotæ  $\beta$ , quem intra se complectitur. Parte extrema  $\theta$  apponitur horarius index, brevior aliquanto illo quem scrupula prima signare diximus, cum interiore gyro ferri debeat. Secunda vero scrupula ut absque errore demonstrentur, imponitur axi rotæ  $\kappa$ , usque ad laminam  $\gamma$  producto, orbis  $\lambda$ , cui circulus in sexaginta partes divisus inscribitur, incisoque in laminâ  $\gamma$  foramine ad  $\tau$ , ex divisiones, cuspide in summo foramine defixa, prætereuntes notantur. Hæc vero tota indicum circulorumque horariorum dispositio ex figura minori clarius perspicitur, exteriorem horologij formam reffrente.

Cæterum penduli longitudinem, rotis quemadmodum diximus ordinatis, eam esse oportet ut scrupula secunda singulis recursibus metiatur, quæ longitudo tripedalis est, cumque commodè in schemate exhiberi nequiret, ejus quintam partem à suspensione summa, ubi incipit flexus laminæ  $\tau$ , ad usque centrum pondoris  $x$  expressimus. Tripedalem dico, non alicujus respectu pedis qui apud Europæ gentem hanc illamve in usu sit, sed certo æternoque pedis modulo ab ipsa hujus penduli longitudine desumpto, quem P E D E M H O R A R I U M in posterum appellare licet, ad illam enim omnium aliorum pedum mensuræ referri debent quas incorruptas posteris tradere voluerimus. Neque enim, verbi gratiâ, ignorabitur unquam venturis sæculis Parisini pedis modus, dum constabit eum ad Pedem Horarium esse ut 864 ad 881. Sed de hujus mensuræ exactissima constitutione pluribus agemus in iis quæ de Centro Oscillationis. nunc tempora conversionum in singulis rotis indicibusque obiter designabimus, ut rectè omnia ad dentium supra descriptorum numerum quadrare intelligantur.

Ergo una quidem conversione rotæ  $c$ , decies circumire apparet rotam  $F$ , sexages vero rotam  $H$ , & centies vicies supremam  $MK$ : cui quum dentes sint quindecim, iisque alternatim pulsentur pin-

DESCRIPTIO  
HOROLOGI.

nulæ  $\text{L}$   $\text{L}$ , una conversione rotæ  $\kappa$  numerabuntur ictus  $30$ , quibus respondent totidem itus reditusque penduli  $v$   $x$ . ideoque conversionibus  $120$ , respondebunt oscillationes simplices  $3600$ , qui numerus est scrupulorum secundorum unam horam efficien-  
tium. Itaque horæ tempore semel circumit rota  $c$ , cumque ea simul index ad  $e$  impositus, qui scrupula prima demonstrat. Et quoniam eodem temporis spatio etiam rota  $\beta$ , & per eam  $\gamma$ , con-  
vertitur, cum tympanidio suo dentium  $sex$ , ad quem numerum duodecuplus est numerus dentium rotæ  $\zeta$ , apparet duodecim de-  
mum horis hanc circumduci, totidemque indicem illi conjunc-  
tum in  $\theta$ . Denique cum rotæ  $h$  sexaginta conversiones respon-  
dere ostenderimus singulis conversionibus rotæ  $c$ , hinc illa, una  
cum affixo orbe  $\lambda$ , sexages in singulas horas circumferetur, hoc  
est, semel unius scrupuli primi tempore, ideoque partes sexage-  
simæ orbiculi  $\lambda$  secunda scrupula transitu suo ostendent: atque ita  
omnia rectè se habere manifestum erit. Pondus  $x$  in imo perpen-  
diculo trilibre est, plumbeum totum, vel ænea superficie plum-  
bum continente. Nec tantum metalli gravitate sed & figurâ in-  
super prospiciendum (plurimi enim refert) ut quam minimum  
occurru aëris impedimentum sentiat. Eoque in cylindri jacentis  
oblongi & utrinque præacuti formam fingitur, qualis cernitur  
ad a schemate horologij minore. Quanquam in his quæ ad navi-  
gationem parantur, forma lentis erectæ aptior visa est.

Porro eodem schemate & ponderis alterius  $b$ , quo motus ho-  
rologij continuatur, suspendendi ratio expressa est, quam, inco-  
gnitam prius, investigare nobis necesse fuit, ne interim dum sur-  
sum retrahitur pondus istud, cessaret vel impediretur aliquatenus  
horologij cursus, quod hic omnino cavendum erat. Paratur ita-  
que funis continuus atque in se rediens, extremitatibus aptu-  
ter se connexis. Is primum orbiculum rotæ infimæ conjunctum,  
qui in schemate majori notatus est  $D$ , amplectitur; inde descen-  
dens, altera sui parte trochleam  $c$ , cui pondus  $b$  appensum est, subit.  
Hinc super orbiculum  $d$  ascendit, extrinsecus horologio affixum,  
qui ferreos per circumferentiam aculeos habet, atque insuper  
ferratis dentibus ita est aptatus ut volvatur tracto fune  $e$ ; nequa-  
quam vero in partem contrariam revolvi possit. Ab hoc orbiculo  
descendit funis ad alteram trochleam  $f$ , cui pondus exiguum  $g$   
appenditur, quantum sufficit continendo majori  $b$ , ne aliter quam  
revoluto orbiculo descendat. Namque à trochlea  $f$  rursus ad ip-  
sum orbiculum  $d$ , unde descenderat, funis revertitur. Quibus ita  
se

## HOROLOG. OSCILLATOR.

DESCRIP<sup>T</sup>IO  
HOROLOGII.

se habentibus, manifestum est semper pondus *b* dimidia sui gravitate conari ut rotas horologij circumagat, nec tunc quidem cessare cum manu funem *e* trahente ascendere cogitur; adeoque horologij motum nusquam interrumpi, nec momentum temporis deperi.

Gravitatis modus in pondere *b* definiri certo non potest, sed quo minor conservando motui sufficerit, eo melius accuratiusque fabrefactum automaton arguet. In nostris, quæ optima hæc tenus habemus, ad sex libras redactum est, posita nimirum orbiculi *D* diametro pollicari fere, uti exhibita fuit; item perpendiculi pondere trilibri, ac totidem pedum longitudine. Quæ longitudo, ut hoc etiam admoneamus, trans capsam horologij dependet, oblongo foramine perviam, quantum oscillationibus peragendis necesse est. Ipsum vero horologium, ad hominis altitudinem suspensum, horis 30 moveri perseverat.

Supereft nunc forma lamellarum describenda inter quas perpendicularum affigi diximus, quarumque ad æquabilem horologio motum præstandum vel præcipua est opera. Absque his enim Penduli simplicis oscillationes (etsi nonnullis aliter visum est) non erunt æque diuturnæ, sed brevioris temporis eæ quæ per minores arcus incident; idque primum experimento hujusmodi facile deprehenditur. Si enim fila accipientur ejusdem longitudinis duo, paribusque in parte ima ponderibus religatis, utrumque seorsim suspendatur, tumque alterum eorum procul à linea perpendiculari, alterum parumper duntaxat extrahatur, simulque è manu dimittantur; non diu utrumque simul in partes easdem ferri videbitur, sed prævertet illud cuius exiliores erunt recursus. Sed & temporum per quoslibet arcus rationes numeris definiri possunt, certâ scientiâ nixis, & vero quam libuerit propinquis, veluti quod tempus descensus per totum circuli quadrantem est ad tempus per arcum minimum fere ut 34 ad 29. Adeo ut nequam resistentiæ aëris ea diversitas imputanda sit, ut quidam voluere, sed ex ipsa motus natura circulique proprietate nascat. Quod alio quoque argumento concludi possit ex ipsa Penduli isochroni constructione, ubi à circulari linea haud parum receditur, uti mox patebit.

Sed videatur forsitan nostris horologiis hisce, ubi eadem semper est oscillationum latitudo, nullius momenti futura quam diximus inæqualitas, adeoque nec correctione ulla perpendiculi opus fore. Quod sane ita esset si latitudo omnium planè eadem

B

constanter maneret. Sed cum pauxillum quandoque excedat vel deficiat, ex multis minimis differentiulis tandem magna satis conflatur, idque ita esse reipsa atque experimentis evincitur. Etsi enim eadem semper sit ponderis vis, rotæ sibi proximæ respectu, tamen per tot alias transdita, quantâcunque curâ limatae fuerint, non semper eadem ad perpendicularum usque pervenit. Præterquam quod frigore quoque difficilior motus rotarum efficitur; itemque evanescente aut sordescente quod illis additur oleo. Sed præcipue inæquales fiunt oscillationes horologiis quæ mari vehuntur, ob jactationem navis continuam, adeo ut omnibus quidem in universum, sed his maxime omnium remedio opus sit, quo reciprocationum Penduli latiorum angustiorumque tempora æqua-  
lia evadant.

Ad definiendam ergo lamellarum formam in quibus positum est remedium istud, in primis Penduli longitudinem statuisse oportet, quæ facile ex eo habetur, quod sint inter se longitudes perpendicularorum, sicut temporum quæ in singulos recursus impenduntur quadrata. Adeo ut cum tribus pedibus defini-  
verimus longitudinem perpendiculari quod scrupula secunda me-  
titur, ejus quarta pars, sive uncia novem debeantur ei quod se-  
misecunda notaturum sit. Item si Penduli longitudine quæratur,  
cujus recursus simplices 10000 horæ spatio peragantur, hoc modo ratio inibitur. Penduli nempe tripedalis scimus 3600 recursus in horas singulas numerari: ergo hujus recursuum tempora sin-  
gula, majora sunt temporibus Penduli quæsiti, proportione 10000 ad 3600, sive 25 ad 9. Quare ut quadratum numeri 25 ad qua-  
dratum 9, hoc est, ut 625 ad 81, ita erit longitudine pedum 3 ad  
eam quæ quærebatur, nempe unciarum 4 cum  $\frac{66}{100}$ .


Posita ergo longitudine perpendiculari, puta pedum trium in horologio à nobis proposito, inde Cyclois linea, quæ curvaturam laminarum t datura est, hoc modo describetur.

Super tabula plana affigatur regula A B, semidigitii crassitudi-  
ne. Deinde fiat cylindrus C D E eadem illa altitudine, diametrum  
vero baseos, dimidiæ perpendiculari longitudini, æqualem habens;  
sitque F G H I fasciola, seu potius bractea tenuis, affixa regulæ in  
F, cylindro verò in circumferentia puncto aliquo E, ita ut partim  
huic circumvoluta sit, partim extendatur juxta latus regulæ A B.  
Cylindro autem infixa sit ferrea cuspis D I, pauxillum ultra basim  
inferiorem prominens, atque ita ut circumferentia ejus exacte  
respondeat.

# HOROLOG. OSCILLATOR.

II


DESCRIPTIO  
HOROLOGI.



His ita se habentibus, si cylindrus secundum regulam A B volvatur, bracteolæ tantum F G crassitudine intercedente, eâque semper quantum potest extensâ, describet cuspis I in subjecto tabulæ plano lineam curvam K I, quæ Cyclois vocatur. Circulus vero genitor erit C D E, cylindri adhibiti basis. Quod si jam laminam K L ad regulam A B applicuerimus; exaratâ primum in ea cycloidis portione K I, invertemus deinde ipsam, & in superficie adversâ similem lineam K M, ab eodem punto K egredientem, incidemus. Tum figuram M K I, accurate secundum lineas istas, efformabimus, cui figuræ lamellarum interstitium aptari oportet, inter quas perpendiculum suspenditur. Sufficiunt autem ad horologiorum usum portiones exiguae arcuum K M, K I; reliquo flexu inutili futuro, ad quem perpendiculi filum accedere non potest.

Verum, ut mirabilis lineæ natura atque effectus plenius intelligantur, integras semicycloides K M, K I, alio schemate hic exprimere visum fuit, inter quas suspensum agitatumque Pendulum K N P, diametri circuli genitoris duplum, cujuscunque amplitudinis oscillationes, usque ad maximam omnium per arcum M P I, iisdem temporibus confecturum sit: atque ita, ut appensæ spheræ P centrum, in linea M P I, quæ & ipsa cyclois integra est, semper versetur. Quæ proprietas insignis, nescio an alii præter hanc lineæ data sit, ut nempe se ipsam sui evolutione describat. Hæc autem quæ dicta sunt, in sequentibus, ubi de descensu gravium, deque evolutione curvarum agemus, singula demonstrabuntur.

B ij obom




Licebit autem aliter quoque, per inventa puncta, cycloidem designare. Describatur circulus diametro  $AB$ , quæ dimidiæ longitudini perpendiculari æqualis sit. In cuius circumferentia sumptis partibus æqualibus quotlibet,  $AC, CD, DE, EF, AG, GH, HI, IK$ , jungantur  $GC, HD, IE, KF$ , quæ erunt inter se parallelae. Deinde arcui  $AF$  sumatur æqualis linea recta  $LM$ , eaque in partes æquales totidem dividatur quot sunt in arcu  $AF$ , earumque partium uni æquales ponantur singulæ  $CN, CO$  in recta  $CG$ , duabus vero partibus rectæ  $LM$ , æquales fiant singulæ  $DP, HQ$  in recta  $DH$ . Tribus vero, singulæ  $ER, IS$  in recta  $EI$ ; atque ita porro si partes plures fuerint acceptæ; ac tandem toti  $LM$  æquales fiant singulæ  $FT, KV$  in linea extrema  $FK$ . Iam si curvæ describantur per puncta  $AQSV, ANPRT$ , hæ rursus quæsitæ cycloidis partes erunt, inter quas perpendicularum affigi oportet.

Recta autem  $LM$  æqualis arcui  $AF$  invenitur, si primum duabus rectis, quæ semissibus arcus  $AF$  subtenduntur, æqualis ponatur  $XV$ , totius vero arcus subtensa  $AF$  æqualis ab eodem termino accipitur  $XZ$ , differentiæque  $VZ$  triens  $Z\Delta$  ad totam  $XZ$  adponatur. Nam tota  $X\Delta$  toti arcui  $AF$  tam prope æqualis erit, ut licet sextans fuerit circumferentia, (neque major hic unquam requiritur) non una sexies millesima parte suæ longitudinis deficiat, uti in his, quæ de Circuli Magnitudine antehac scripsimus, demonstratum est. Explicitis quæ ad horologii fabricam attinent, nunc quoque illud declarandum est, quo pacto ad veram horarum mensuram componi debeat. Ergo primum, an recte se habeat motus ejus, hoc modo examinabitur.

# HOROLOG. OSCILLATOR.

15

DESCRIP<sup>T</sup>IO  
HOROLOGI.



Oculo observatoris certus eligatur locus, unde sidera despici possint, simulque recta parietesve vicinarum ædium, sic posita, ut, cum eò appulerint stellæ quædam è fixarum numero, simul videri desinant. Eo loco foramen, ad pupillæ magnitudinem, constituantur, ut sequentibus diebus, absque errore, oculus ad idem punctum reponi possit. Iam ad momentum ipsum, cum stellarum aliqua è conspectu abit, notetur tempus horologio indicatum. Atque idem postero die, vel potius aliquot diebus intermissis, fiat. Quod si tantum unius diei spatium duabus observationibus intercesserit, oportet in postrema observatione tempus horologii deficere ab illo, quod prima observatione annotatum fuerat, scrupulis primis 3, secundis 56. Ita enim rectè se habere perpendiculi longitudinem constabit; quum tanto superetur quælibet siderum fixorum revolutio à die solari mediocri. Mediocri dico, quoniam dies solares, de medie ad meridiem, non omnes inter se æquales sunt, ut mox amplius exponet. Si vero post plures demum dies observatione repetatur, in singulos tantundem differentiæ causa computandum erit. Sit, exempli gratiâ, in prima observatione, ad momentum evanescentis stellæ, adnotata horologii hora 9, cum scrupulis primis 30, secundis 18; deinde, septimo post die, eadem disparsente stellâ, indicet horam 8, cum scrupulis pr. 50, sec. 24. Hæc hora deficit à priore scrupulis pr. 39, secundis 54. Quæ, in septem rdivisa, dant retardationem diurnam scrupulorum 3'. 42". Debebat autem esse scrupulorum 3'. 56". quæ illâ minor est scrupulis 1'. 46".

ut ob omnia examinatur.

Itaque tantundem quotidie deficit horologium à vera, seu media, dierum mensura.

Cæterum alio quoque modo, ad solem, horologii motum examinare licebit. Sed hic jam inæqualitatis dierum naturalium ratio habenda erit. Sunt enim, ut jam dixi, non omnes ejusmodi dies inter se æquales; & quanquam exiguum sit discrimin<sup>e</sup>, tamen plurium dierum intervallo s<sup>e</sup>pe eo usque ex crescit, ut haud quaquam contemni possit. Etenim si & solarium quam perfectissime descrip<sup>t</sup>um habeatur, & horologii automati motus ad verissimam dierum mensuram exactus sit, neque ab ea recedat; eveniet tamen necessario ut, certis anni temporibus, s<sup>e</sup>pe horæ quadrante, aut etiam semihora, inter se discrepent, ac rursus statis temporibus ultro concordent. Hoc enim ita esse, ex tabula temporis æquatoria quæ subjicimus, intelligetur; postquam usum ejus ostenderimus, qui est hujusmodi.

Accipiatur æquatio tabulæ, assignata diei qua primum cum sole, sive cum sciotherico, horologium ut conveniret fecimus. Itemque æquatio diei, qua queritur quæ bene ad dierum mensuram temperatum sit. Quod si jam prior æquatio major fuerit sequente, superare debet hora automati horam gnomonis eo, quo inter se æquationes istæ differunt. At si posterioris diei æquatio major inveniatur, erit excessus penes horam gnomonis, sive eam quæ ex sole observatur. Ut si, exempli gratia, die 5 Martii in eandem horam convenientiam sciothericum horologium atque automaton, cuius diei æquatio invenitur, in tabula, scrupulorum primorum 3, secundorum 11. lubeat que scire ejusdem mensis die 20, an automaton horas æquales rectè metiat necne: invenietur die posteriori adscripta æquatio scrupulorum primorum 7, secundorum 27. quæ quia superat præcedentem scrupulis primis 4, secundis 16, debet tanto senior esse hora sciotherici, quam quæ automato indicatur. Vnde, si diversum reperiatur, facile inde colligetur, quantum in dies singulos exuperet automaton, aut retardet.

In computanda tabula hac duplicem causam adhibui, utramque Astronomis notam, Eclipticæ nimirum obliquitatem, & solaris motus anomaliam. Quod cum ratio postulat, tum experientia quoque, his ipsis horologiis superstructa, quæque sine his nequam haberi poterat, evincit; quandoquidem, cum æquatione hic proposita, observationes solis, quas s<sup>e</sup>pe per complures menses, quotidie ad momentum quo meridianum circulum sol occuparet, instituimus, planissime consentire inventæ sunt.

# TABULA EQUATIONIS DIVERUM.

Die.	Januar.	Febr.		Mart.		Apr.		Maj.		Jun.		July.		Aug.		Sept.		Oct.		Nov.		Dec.				
		Min.	Sec.	Min.	Sec.	Min.	Sec.	Min.	Sec.	Min.	Sec.	Min.	Sec.	Min.	Sec.	Min.	Sec.	Min.	Sec.	Min.	Sec.	Min.	Sec.			
1	10	40	0	32	2	35	11	48	32	18	10	10	19	10	4	16	23	23	55	31	31	25	34			
2	10	10	0	24	2	18	11	37	18	39	18	1	2	12	8	16	42	26	49	31	55	25	10			
3	9	41	0	18	2	42	11	56	18	46	17	51	3	11	58	10	13	17	1	27	8	54	24	45		
4	9	13	0	13	2	56	12	15	18	53	17	41	4	11	48	10	18	17	21	27	31	52	24	20		
5	8	45	0	9	3	11	12	34	18	59	17	30	5	11	38	10	23	17	41	27	43	31	50	23	55	
6	8	17	0	6	3	26	12	53	19	4	17	19	6	11	28	10	28	18	18	1	28	0	31	47	30	
7	7	50	0	3	3	41	13	32	19	9	17	8	7	11	18	10	18	14	18	21	28	16	31	43	33	
8	7	23	0	1	3	56	13	31	19	14	16	57	8	11	9	10	41	18	41	28	32	31	37	22	38	
9	6	58	0	0	4	12	13	49	19	18	16	46	9	11	0	10	49	19	19	1	28	47	31	30	10	
10	6	34	0	0	4	29	14	6	19	22	16	35	10	10	52	10	58	19	21	29	2	31	22	21	45	45
11	6	10	0	0	4	46	14	23	19	25	16	24	11	10	47	11	7	19	41	22	16	34	13	21	14	
12	5	47	0	2	5	4	14	19	28	16	33	11	10	38	11	16	20	10	20	1	22	30	37	3	20	
13	5	24	0	4	5	21	14	55	19	29	16	1	13	10	31	11	25	20	20	22	29	29	43	30	14	
14	5	2	0	8	5	40	15	10	19	29	15	49	14	10	25	11	36	20	20	13	29	56	30	43	39	
15	4	41	0	12	5	58	15	25	19	29	15	37	15	10	19	11	48	11	4	30	9	30	32	29	14	
16	4	21	0	16	6	16	15	39	19	28	15	24	16	10	33	12	1	21	25	30	22	30	20	18	44	
17	4	2	0	21	6	33	15	53	19	26	15	31	11	17	10	7	12	14	47	30	34	30	8	18	24	
18	3	44	0	26	6	51	16	7	19	24	14	58	18	10	2	12	28	22	29	30	45	29	55	37	44	
19	3	27	0	32	7	16	21	19	21	14	45	19	9	39	9	58	12	42	22	31	30	55	29	40	37	14
20	3	11	0	40	7	27	16	34	19	18	14	32	20	9	54	12	57	22	31	4	29	23	32	16	44	
21	2	55	0	48	7	45	16	47	19	14	19	19	21	9	51	13	12	19	24	31	12	29	6	14	14	
22	2	39	0	57	8	3	16	59	19	11	14	6	22	9	49	13	27	33	31	19	19	28	48	35	44	
23	2	23	1	6	8	22	17	11	19	7	13	53	23	9	47	13	43	33	31	26	28	30	35	14	14	
24	2	7	1	16	8	41	17	22	19	2	13	40	24	9	46	13	59	24	31	34	28	11	24	43	43	
25	1	32	1	2.6	9	1	17	33	18	57	13	27	25	9	46	14	33	24	31	25	38	27	31	12	14	
26	1	38	1	37	9	21	17	43	18	51	15	15	26	9	46	14	33	24	31	43	27	30	13	41	41	
27	1	25	1	49	9	41	17	53	18	45	13	3	27	9	47	14	33	23	31	47	27	30	8	10	14	
28	1	13	2	10	1	18	3	18	3	39	12	52	28	9	49	15	8	25	33	31	32	45	26	40	12	14
29	1	1	4	10	21	18	13	33	12	41	9	69	15	12	52	15	26	25	33	31	32	26	24	10	10	
30	0	10	40	18	18	23	18	23	18	26	12	30	18	10	2.6	9	56	15	26	11	31	25	25	18	10	
31	0	41	10	59	10	18	18	18	18	18	18	18	18	10	0	16	4	4	31	10	10	10	10	10	10	

HISTORICUS

Dicitur

## 6 CHRISTIANI HUGENII

DESCRIPTIO  
HORLOGII.

Iam postquam utrovis modo eorum quos diximus, sed priore potius, examen institutum fuerit, si multum aberrare à media diem longitudine horologium reperiatur, adeo ut differentia ultra tria quatuorve prima scrupula ascendat, remedium adhibebitur aucta aut diminuta ipsius penduli longitudine. Vbi hæc tenenda est regula, tot scrupulis primis, in singulos dies, motum horologij acceleratum aut retardatum iri, quot  $\frac{1}{10}$  unius lineæ auferentur pendulo aut addentur. Cumque ad veram mensuram hoc pacto jam prope reductum erit, reliqua correctio transpositione exigui ponderis  $\Delta$ , virgæ v v adhærentis, commode peragetur. Id pondus lentis formam habet, cuius sectionem secundum axem in figura I expressimus. Et quia tantum vicefimam tricesimamve partem æquat ponderis x, hinc sit ut sat magnis spatiis è priore loco discedens, haud multum tamen perpendiculari motum afficiat, accelerando nempe quoties versus medium virgæ longitudinem attrahitur, retardando cum inde sursum aut deorsum movetur. Ne vero diu punctum illud quærendum sit quo verissimam daturum sit dierum mensuram, divisimus certa ratione, ex motus legibus petita, inferiorem virgæ medietatem, posito nimirum pondere  $\Delta$  parte quinquagesima ponderis x, parique gravitate ipsius virgæ v v. Quæ quidem divisiones figura IV exhibentur, ubi penduli portio inferior in tres partes secta cernitur, quarum, quæ infimo loco ponenda, est A B. Punctum A est centrum gravitatis ponderis x, à punto autem c, partes singulæ, quindecim scrupulorum primorum differentiam diurnam efficiunt, ubi tali intervallo mota fuerit lens  $\Delta$ . Demonstratio autem divisionumque inventio, dabitur in iis quæ de Centro Oscillationis.

Cæterum illorum quoque quæ mari vehuntur, longitudinum investigandarum gratiâ, formam hic describeremus, si quænam maxime ad hunc usum accommodata sit, æque ac in præcedentibus, exploratum determinatumque haberemus; et si quidem jam nunc eo res deducta sit, ut parum deesse videatur ad perficendum tantæ utilitatis inventum. Quid autem & qua fortuna hic tentatum fuerit, quidve deinceps tentandum restet, exponere non pigebit.

Prima duo hujusmodi horologia Britannica navi vecta fuere anno 1664, quæ vir nobilis è Scotia nobisque amicus ad nostrorum exemplum fabricari curaverat. Hæc ponderis loco laminam chalybeam habebant in spiram convolutam, cuius vi rotæ circumagerentur,

## HOROLOG. OSCILLATOR.

17

cumagerentur, quemadmodum in exiguis illis quæ circumferri solent automatis adhiberi solent. Ut autem jactationem navis perferre possent, è chalybea pila, cylindro æneo inclusa, horologia suspenderat, clavulamque quæ penduli motum continuat (erat autem semipedali longitudine pendulum) deorsum productam geminaverat, ut literæ f inverſæ formam referret; ne videlicet in gyrum evagari posset penduli motus, unde cessationis periculum. Navis hæc, cum tribus aliis quas itineris socias habuerat, postquam in Britanniam reversa est, Præfectus classis hæc retulit. Se nempe, cum à Guineæ littore solvisset, atque ad insulam, sancti Thomæ dictam, pervenisset, quæ æquinoctiali circulo sub jacet, compositis hic ad solem horologiis, occidentem versus cursum instituisse, atque ad septingenta circiter millaria continuo tramite progressum, tum rursus vento favente Libonoto ad Africæ littora declinavisse. Cum autem ad ducenta trecentave millaria eò cursum tenuisset, magistros aliarum navium, veritos ne priusquam Africam attigissent aquâ ad potum deficerentur, suassisse ut ad insulas Americanas, Barbatorum dictas, aquandi gratiâ deflecteret. Tum sese concilio nauclerorum habitu, jussisse que ut Ephemeridas ac supputationes singuli suas proferrent, reperisse cæterorum calculos à suis diversos abire, unius quidem 80 milliaribus, alterius centenis, tertii amplius etiam. Ipsum vero, cum ex horologiorum indicio collegisset non amplius quam triginta circiter milliaribus abesse insulam *del Fuego* dictam, quæ una est earum, non procul ab Africa distantium, quæ à Viridi promontorio nomen habent, eamque postero die teneri posse; confitum pendulis suis eò cursum dirigi imperasse, ac die insequenti sub meridiem eam ipsam in conspectum venisse insulam, paucisque post horis navibus stationem præbuuisse. Et hæc quidem ex Præfecti illius relatu.

Ab eo vero tempore aliquoties tum Batavorum tum Gallorum opera, idque Regis Serenissimi jussu, repetita fuere experimenta, vario eventu, sed ita ut sæpius negligentia eorum quibus horologia commissa erant quam ipsamet automata culpari possent. Optimus vero successus fuit in Mediterraneo mari, expeditione in Cre tam insulam, quò illustrissimus Dux Belfortius, Candia à Turcis obfessæ auxilium latus, cum Gallorum copiis missus erat, ubi & in prælio occubuit. Is in ea qua vehebatur navi, horologia hujuscे experimenti gratiâ habebat, virumque Astronomiæ peritum iis præficerat, è cuius observationibus, in singulos dies habitis, longitudines locorum ad quæ in ea profectione aut appulerunt na-

C

DESCRIPTIO  
HOROLOGII.

ves, aut quæ prætervecti dignoscere oculis potuerant, horologiorum operâ exacte dimensas fuisse comperimus, atque ita ut Geographicis descriptionibus quæ melioris notæ habentur cædem met' longitudinum differentiæ designatae reperiantur. Namque inter Toloni portum Candiamque oppidum differentia hor. 1. scrup. 22' reperta fuit, hoc est graduum longitudinis 20. scrup. 30'. ac rursus à Candia Tolonum revertentibus differentia proxime eadem. qui consensus certissimum veritatis est indicium.

Inter eundem Toloni portum & insulam quandam cui *Mare-timo* nomen est, prope promontorium Siciliæ quod Occidentem spectat, *Lilybæum* olim vocatum, differentia horaria observata est scrup. prim. 25, sec. 20, quibus respondent gradus longitudinis 6, scrup. 20'. Item à Tolono ad insulam *Sapienza* dictam, quæ juxta Peloponnesum est Occidentem versus, hora 1, scrup. prima 5', sec. 45'', quibus respondent longitudinis gradus 16, scrup. 26.

Horologia ad solem examinata fuerant, mane ad Orientem, vespere ad Occidentem, supputato ex data poli altitudine utroque temporis momento. Atque hæc ratio cum naves in anchoris stant omnium optima videtur, quod, absque instrumentorum ope, solis oculis eæ observationes peragantur.

Pendulum vero unciarum novem longitudine inerat horologiis hisce, pondere semissis. Rotæ ponderum attractu circumagebantur, eademque cum illis theca inclusæ erant quaternum pendulum longitudine. In ima theca plumbum insuper centum atque amplius librarum additum erat, quo melius perpendicularē situm suspensa in navi machina servaret.

Quanquam autem æquabilis admodum sibiique constans automati motus per hæc experimenta comperiebatur, tamen alia quoque ratione ulterius illud perficere aggressi sumus, quæ erat hujusmodi. Rotæ illi quæ serratos dentes habet, penduloque proxima est, pondus exiguum ex catenula affabre constructa appendimus, quo sola ipsa moveretur, reliqua omni machina nihil aliud agente quam ut singulis semiscrupulis horariis plumbum illud exiguum ad priorem altitudinem restitueret; eadem fere ratione atque in constructione horologii superius exposita videre est, ubi pondus altero fune attollitur, dum altero gravitatem suam horologii motui impertit. Quibus ita constructis, cum veluti ad unicam rotam omnia essent redacta, major adhuc quam antea apparuit horologiorum æqualitas, illudque accidit memoratu dignum, quod cum duo ad hanc formam constructa ex eodem tigno suspendissemus, tignum vero fulcris duobus impositum esset; motus penduli


## HOROLOG. OSCILLATOR.

19

DESCRIPTIO  
HOROLOGII.

utriusque ita iactibus adversis inter se consenserent, ut nunquam inde vel minimum recederent, sed utriusque sonus una semper exaudiretur: imo si data opera perturbaretur concordia illa, semetipsam brevi tempore reduceret. Miratus aliquandiu rem adeo insolitam, inveni denique, instituto diligentí examine, à motu tigni ipsius, licet haudquam sensibili, causam petendam esse. Nempe pendulorum reciprocationes horologiis, quantolibet pondere gravatis, motum aliquem communicare; hunc vero motum, tigno ipsi impressum, necessario efficere ut si aliter quam contrariis ad unguem iactibus pendulum utrumque moveatur, eo tamen necessario tandem deveniant, ac tum demum tigni motum penitus interquiescere. Quæ tamen causa non satis efficaciæ haberet, nisi & horologiorum motus aliunde æquabilissimus foret atque inter se consentiens.


Cæterum experimentis in Oceani navigatione habitis, ac præsertim procella vehementiore aquas agitante, compertum fuit primam ac præcipuam curam de motu horologiorum absque interruptione conservando habendam esse, quod jactationem navis tantam ægrè tunc perferre illa animadversum sit. Quamobrem nova denique ratione & penduli formam immutavimus, & aliter horologia ipsa suspendimus. Pendulum trianguli formam habet, in



cujus vertice deorsum spectante plumbea lens affixa est. Anguli utriusque reliqui filis inter laminas cycloidales suspensi sunt. Basis clavulam bifurcatam puncto sui medio recipit ab eaque movetur, illa vero ab rota ferrata horizonti parallela motum accipit. Motus rotarum omnium non à pondere sed à chalybea lamina, tympano inclusa, principium habet. In figura adjecta pendulum triangulare est A B C; lens plumbea B; laminae cycloidales E D, F G. Clavula

C ij

20 CHRISTIANI HUGENII  
bifurcata HK; rota ferratis dentibus N, quæ cæteris horologii rotis inferior est. Lenticulæ ad temperandum penduli motum LL.



Suspensionis modum altera hæc figura exhibet; ubi theca AB axibus primum duobus, quorum alter C tantum appareat, rectangulo ferreo D E inserta est; quod deinde rectangulum rursus axis suis FG ferreo gnomone FHKG sustinetur, qui contignationi navis immobiliter affixus est. in ima theca pondus 50 librarum appensum est. Quibus ita se habentibus, quacunque navis inclinatione perpendicularem positum servat horologium. Axis autem C, cum sibi opposito, ita collocati sunt, ut ad rectam lineam respondeant punctis suspensionum penduli ejus quod diximus: quo fit ut motus ipsius oscillatorius machinam nequaquam commovere possit, quo nihil est alioqui quod magis penduli motum destruat. Porro axium CC, & FG crassitudo, quæ pollicem æquat, gravitasque plumbi inferius appensi, nimiam movendi libertatem horologio adimunt, faciuntque ut si forte succussu navis graviore commotum fuerit, continuo ad quietem perpendicularumque suum revertatur.

Et hæc quidem ita adaptata machina ut in mare deducatur experientiæque committatur supereft, quæ & certam pene successus spem præbet, quod iis quæ hactenus instituere licuit experientis, multo melius quam priores illæ omnem motus diversitatem perferre reperta sit.



## HOROLOGII OSCILLATORII PARS SECUNDÄ.

*De descensu Gravium & motu eorum in Cycloide.*

### HYPOTHESES.

#### I.

**S**i gravitas non esset, neque aër motui corporum officeret, unum quodque eorum, acceptum semel motum continuaturum velocitate æquabili, secundum lineam rectam.

#### II.


*Nunc vero fieri gravitatis actione, undecunque illa oriantur, ut moveantur motu composito, ex æquabili quem habent in hanc vel illam partem, & ex motu deorsum à gravitate profecto.*

#### III.

*Et horum utrumque seorsim considerari posse, neque alterum ab altero impediri.*

Ponatur grave c è quiete dimissum, certo tempore, quod dicitur f, vi gravitatis transire spatiū c b. Ac rursus intelligatur idem grave accepisse alicunde motum quo, si nulla esset gravitas, transiret pari tempore f motu æquabili lineam rectam c d. Accedente ergo vi gravitatis non perveniet grave ex c in d, dicto tempore f, sed ad punctum aliquod e, recta sub d situm, ita ut spatiū d e semper æquetur spatio c b, ita enim, & motus æquabilis, & is qui à gravitate oritur suas partes peragent, altero alterum non impediente. Quamnam vero lineam, composito illo motu, grave percurrat, cum motus æquabilis non recta sursum aut deorsum sed in obliquum tendit, è sequentibus definiri poterit. Cum vero deorsum in perpendiculari contingit motus æquabilis c d,

C iij



apparet lineam  $C\bar{D}$ , accedente motu ex gravitate, augeri recta  $D\bar{E}$ . Item, cum sursum tendit motus æquabilis  $C\bar{D}$ , ipsam  $C\bar{D}$  diminui recta  $D\bar{E}$ , ut nempe, peracto tempore  $F$ , grave inveniatur semper in puncto  $E$ . Quod si, utroque hoc casu, seorsim, uti diximus, duos motus consideremus, alterumque ab altero nullo modo impediri cogitemus, hinc jam accelerationis gravium cadentium causam legesque reperire licebit. Et primum quidem duo ista simul ostendemus,

### PROPOSITIO I.

**A**Qualibus temporibus æquales celeritatis partes gravi cadenti accrescere, & spatia equalibus temporibus ab initio descensus emensa, augeri continue æquali excessu.

Ponatur grave aliquod, ex quiete in  $A$ , primo tempore lapsum esse per spatum  $A\bar{B}$ , atque ubi pervenit in  $B$ , acquisivisse celeritatem qua deinceps, tempore secundo, motu æquabili, percurrere posset spatum quoddam  $B\bar{D}$ . Scimus ergo spatum secundo tempore peragendum majus fore spatio  $B\bar{D}$ , quia vel cessante in  $B$  omni gravitatis actione spatum  $B\bar{D}$  percurreretur. Feretur vero motu composito ex æquabili quo percursurum esset spatum  $B\bar{D}$ , & ex motu gravium cadentium, quo deprimi necesse est per spa-

tium ipsi A B æquale. Quare ad B D addita D E , æquali A B , sci-  
mus tempore secundo grave perventurum ad E.

DE DESCENSU  
GRAVIAUM.

A      Quod si vero inquiramus quam velocitatem habeat in  
B      E , in fine secundi temporis , eam inveniemus duplam  
D      esse debere velocitatis quam habebat in B fine temporis  
E      primi. Diximus enim moveri composito motu ex æqua-  
bili cum celeritate acquisita in B , & ex motu à gravitate  
producto , qui cum tempore secundo idem plane sit ac  
primo , ideo decursu temporis secundi æqualem celerita-  
tem gravi contulisse debet atque in fine primi. Quare  
cum acquisitam in fine primi temporis celeritatem con-  
servaverit integrum , apparet in fine secundi temporis bis  
eam celeritatem inesse quam acquisiverat in fine tempo-  
ris primi , sive duplam.

F      Quod si jam , postquam pervenit in E , pergeret dein-  
ceps tantum moveri celeritate æquabili , quantam illic  
acquisivit , apparet tempore tertio , prioribus æquali , per-  
cursurum spatium E F , quod duplum futurum sit spatii B  
D ; quia hoc percurri diximus dimidia hujus celeritatis ,  
motu æquabili , & temporis parte æquali. Accidente au-  
tem rursus gravitatis actione , percurreret tempore tertio ,  
præter spatium E F , etiam spatium F G , ipsi A B vel D E æquale.  
Itaque in fine tertii temporis grave invenietur in G. Velocita-  
tem vero hic habebit triplam jam ejus quam habebat in B , in  
fine primi temporis : quia præter celeritatem acquisitam in E ,  
quam diximus duplam esse acquisitæ in B , vis gravitatis , tem-  
poris tertii decursu , æqualem rursus atque in fine primi celeri-  
tatem contulit. Quamobrem utraque celeritas , in fine tempo-  
ris tertii , triplam celeritatem constituet ejus quæ fuerat in fine  
temporis primi.

Eodem modo ostendetur tempore quarto peragi debere & spa-  
tium G H triplum spatii B D , & spatium H K ipsi A B æquale : ve-  
locitatemque in K , in fine quarti temporis , fore quadruplam ejus  
quæ fuerat in B , in fine temporis primi. Atque ita spatia quotli-  
bet deinceps considerata , quæ æqualibus temporibus peracta  
fuerint , æquali excessu , qui ipsi B D æqualis sit , crescere mani-  
festum est ; simulque etiam velocitates per æqualia tempora æqua-  
liter augeri.



## PROPOSITIO II.

**S**patium peractum certo tempore à gravi, è quiete casum inchoante, dimidium est ejus spatii quod pari tempore transiret motu aquabili, cum velocitate quam acquisivit ultimo casus momento.

Ponantur quæ in propositione præcedenti, ubi quidem A B erat spatiū certo tempore, à gravi cadente ex A, peractum. B D vero spatium quod pari tempore transiri intelligebatur celeritate aquabili, quanta acquisita erat in fine primi temporis, seu in fine spatii A B. Dico itaque spatium B D duplum esse ad A B.

A      Quum enim spatia primis quatuor æqualibus temporibus à cadente transmissa sint A B, B E, E G, G H, quorum inter se certa quædam est proportio: si eorum temporum dupla tempora sumamus, ut nempe pro primo tempore jam accipientur duo illa quibus spatia A B, B E, peracta fuere; pro secundo vero tempore duo reliqua quibus peracta fuere spatia E G, G K, oportet jam spatia A E, E K, quæ sunt æqualibus temporibus à quiete peracta, inter se esse sicut spatia A B, B E, quæ æqualibus item temporibus à quiete percurrebantur.

B      Quum igitur sit ut A B ad B E, ita A E ad E K; & convertendo, ut E B sive D A ad A B ita K E ad E A: erit quoque, dividendo, D B ad B A ut excessus K E supra E A ad E A. Quum sit autem, ex ostensis propositione præcedenti, K E æqualis tum duplæ A B, tum quintuplæ B D: E A vero æqualis tum duplæ A B, tum simplici B D; apparent dictum excessum K E supra E A æquari quadruplæ B D. Sicut igitur D B ad B A ita erit quadrupla D B ad E A: unde E K quadrupla erit ipsius B A: eadem vero E A æquatur, uti diximus, & duplæ A B & simplici B D. ergo B D duplæ A B æqualis erit; quod erat demonstrandum.



## PROPOSITIO III.

DE DESCENSU  
GRAVIAVM.

**S**patia duo, à gravi cadente quibuslibet temporibus transmissa, quorum utrumque ab initio descensus accipiatur, sunt inter se in ratione duplicata eorundem temporum, sive ut temporum quadrata, sive etiam ut quadrata celeritatum in fine cuiusque temporis acquisitarum.


Quum enim ostensum sit propositione antecedenti spatia A B, B E, E G, G K, quotcunque fuerint, æqualibus temporibus à cadente peracta, crescere æuali excessu, qui excessus sit ipsi B D æqualis: Patet nunc, quoniam B D est dupla A B, spatium B E fore triplum A B; E G quintuplum ejusdem A B; G K septuplum; aliaque deinceps auctum iri secundum progressionem numerorum imparium ab unitate, 1, 3, 5, 7, 9, &c. cumque quotlibet horum numerorum, sese consequentium, summa faciat quadratum, cuius latus est ipsa adsumptorum numerorum multitudo (velut si tres primi addantur, facient novem, si quatuor sexdecim) sequitur hinc spatia, à gravi cadente transmissa, quorum utrumque à principio casus inchoetur, esse inter se in ratione duplicata temporum quibus casus duravit, si nempe tempora commensurabilia sumantur.

Facile autem & ad tempora incommensurabilia demonstratio extendetur. Sint enim tempora hujusmodi, quorum inter se ratio ea quæ linearum A B, C D. spatiaque temporibus his transmissa sint E, & F, utraque nimirum ab initio descensus adsumpta. Dico esse, ut quadratum A B ad quadratum C D, ita spatium E ad F.

Si enim negetur; habeat primo, si potest, spatium E ad F maiorem rationem quam quadratum A B ad quadratum C D, nempe eam quam quadratum A B ad quadratum C G, sumta C G minore quam C D & à C D auferatur pars D H, minor quam D G excessus C D supra C G, atque ita ut reliqua H C commensurabilis sit ipsi A B; hoc enim fieri posse constat. Erit ergo C H major quam C G. Atqui ut quadratum temporis A B ad quadratum temporis C H, ita spatium E, quod tempore A B peractum est ad spatium peractum tempore C H, per superius ostensa. Hoc vero spatio majus est illud quod tempore C D percurritur, nempe spatium F. ergo spatii E ad spatium F minor est ratio quam quadrati A B ad quadratum C H. Sicut autem spatium E ad F, ita ponebatur esse quadratum A B ad quadratum C G; ergo minor quoque erit ra-

D

DE DESCENSU  
GRAVIAVM.



tio quadrati A B ad quadratum C G , quam quadrati A B ad quadratum C H , ac proinde quadratum C G majus quadratum C H ; quod est absurdum , quum C H major dicta sit quam C G . Non habet igitur spatium E ad F maiorem rationem quam quadratum A B ad quadratum C D .

Habeat jam , si potest , minorem ; sitque ratio spatii E ad F eadem quæ quadrati A B ad quadratum C L , sumptâ C L majore quam C D , & à C L auferatur L K minor excessu L D , quo C D superatur à C L ; atque ita ut reliqua K C sit commensurabilis A B . Quia ergo ut quadratum temporis A B ad quadratum temporis C K , ita est spatium E , peractum tempore A B , ad spatium peractum tempore C K . Hoc vero spatio minus est spatium peractum tempore C D , nempe spatium F . erit proinde spatii E ad F major ratio quam quadrati A B ad quadratum C K . Sicut autem spatium E ad F , ita ponebatur esse quadratum A B ad quadratum C L . Ergo major erit ratio quadrati A B ad quadratum C L quam ejusdem quadrati A B ad quadratum C K , ideoque quadratum C L minus erit quam qu. C K . quod est absurdum , quum C L major sit quam C K . Ergo neque minorem rationem habet spatium E ad F quam quadratum A B ad quadratum C D . quare necesse est ut eandem habeat . Porro cum celeritates in fine temporum A B , C D acquisitæ sint inter se sicut ipsam tempora ; apparet rationem spatiorum E ad F eandem quoque esse quæ quadratorum temporum A B , C D , quibus transmissa sunt . Itaque constat propositum .

#### PROPOSITIO IV.

**S**i grave celeritate ea quam in fine descensus acquisivit sursum tendere cœperit , fiet ut paribus temporis partibus , spatia qua prius sursum , eadem deorsum transeat , adeoque ad eandem unde descenderat altitudinem ascendat . Item ut aequalibus temporis partibus aequalia amittat celeritatis momenta .

Sunto enim ut in propositione 2 , spatia quotlibet , aequalibus

temporis partibus cadendo è quiete peracta, quorum primum A DE DESCENSU  
B; secundum compositum ex B D, quod celeritate æquabili ac-

quisita per A B transsecondum erat, & ex D E ipsi A B æquali; tertium compositum, ex E F, duplo ipsius B D, & ex F G, eidem A B æquali; quartum compositum ex G H, triplo ipsius B D., & ex H K ipsi itidem A B æquali, atque eadem ratione porro crescen-

A tia, si plura fuerint. Dico totidem æqualibus temporibus  
B eadem spatia K C, G E, E B, B A, singula singulis peragen-  
D da esse à gravi sursum tendente, atque incipiente cum ce-  
E leritate in fine descensus K acquisita.

Brevitatis autem gratia celeritas quæque designetur de-  
E inceps longitudine spatii quod grave motu æquabili, cum  
celeritate illa, atque temporis parte una, quales in descen-  
D su consideravimus, transmissurum esset.

Itaque ex ostensis dicta propositione, cum in K grave  
F pervenerit, habet celeritatem G H auctam celeritate B D,  
G hoc est celeritatem K F, quia K F æquatur ipsis H G, B D,  
C sunt enim partes singulæ H K, F G, æquales ipsi A B, ac  
proinde utraque simul ipsi B D, quam esse duplam A B  
D ostendimus propositione 2. Itaque celeritatem in fine des-  
C census K acquisitam sursum convertendo, si grave æqua-  
B bili motu ferretur, conficeret una temporis parte spatum  
K F. Atqui, gravitatis actione accedente, diminuetur  
H ascensus K F spatio F G ipsi A B æquali, ut patet ex dictis ad  
K hypothesin initio sumptam. Ergo parte prima temporis  
ascendet grave tantum per K G, quo eodem spatio parte temporis  
novissima descenderat. Simul vero & celeritati tantum decessisse  
necessè est, quantum acquiritur temporis parte una deorsum ca-  
dendo, hoc est celeritatem B D. Itaque grave, ubi ad G ascende-  
R rit, habet celeritatem reliquam H G, cum initio ascensus habuerit  
celeritatem H G una cum celeritate B D. Est autem ipsi H G æqualis  
G D; quum æquetur ipsi F E una cum D B, hoc est una cum dupla  
A B, hoc est una cum duabus F G & E D; Ergo si ex G, cum cele-  
ritate æquabili, quantam illic habet, sursum pergeret, confice-  
ret una parte temporis spatum G D. Accedente autem gravitatis  
actione, diminuetur ascensus iste spatio D E, ipsi A B æquali. Ergo,  
hac secunda parte temporis, ascendet per spatum G E, quod  
simili temporis parte etiam cadendo transferat. Simul autem ce-  
leritati tantum decessisse denuo debet quantum temporis parte  
una ex casu acquiritur, nempe celeritas B D. Itaque ubi usque ad

DE DESCENSU GRAVIUM. E ascenderit, habet duntaxat celeritatem F E, quæ nimirum relinquitur quum à celeritate G D aufertur celeritas B D. Nam B D, ut jam diximus, æqualis est duabus D E, F G.

Est autem ipsi F E æqualis E A, quum F E æquetur ipsi B D bis sumptæ, hoc est ipsi B D una cum dupla A B, hoc est una cum duabus A B, D E. Ergo si ex E cum celeritate æquabili, quantam illic habet, sursum pergeret, conjecturum esset una temporis parte spatiū E A. Sed accedente actione gravitatis, diminuetur ascensus iste ipso spatio A B. Proinde hac parte temporis per spatiū E B tantum ascendet, quod simili parte temporis descendendo quoque transierat. Hic vero rursus celeritati tantum decessisse necesse est quantum una temporis parte cadendo deorsum acquiritur, hoc est celeritatem B D. Itaque grave, ubi usque ad B ascenderit, habet celeritatem ipsam B D reliquam, cum in E habuerit celeritatem F E ipsius B D duplam. Si ergo ex B cum celeritate æquabili, quantam illic habet, sursum pergeret, conjecturum esset parte una temporis spatiū æquale ipsi D B, hoc est duplum A B. Sed accedente gravitatis actione, diminuitur ascensus iste spatio quod ipsi A B æquale sit. Igitur hac parte temporis ascendet tantummodo per spatiū B A, quod etiam primo descensus tempore transierat. Atque in fine quidem extremi temporis hujus necessario grave in A puncto reperietur. Sed dicetur forsitan altius ascendisse quam ad A, atque inde eo relapsum esse. At hoc absurdum esset, cum non possit, motu à gravitate profecto, altius quam unde decidit ascendere. Porro quum celeritati quam in B habebat rursus decesserit celeritas B D, patet jam gravi in A constituto nullam celeritatem superesse, ac proinde non altius excursurum. Itaque ostensum est ad eandem unde decidit altitudinem pervenisse, & singula spatia, quæ æqualibus descensus temporibus transmiserat, eadem totidem ascensus temporibus remensum esse: sed & æqualibus temporibus æqualia ipsi decessisse celeritatis momenta apparuit. Ergo constat propositum.

Quia vero in demonstratione propositionis secundæ, ex qua pendet præcedens, adsumptum fuit certam quandam esse proportionem spatiorum quæ continuis æqualibus temporibus à gravi cadente transeuntur, quæque eadem sit, quæcunque æqualia tempora accipiuntur; quod quidem & ex rei natura ita se habere necesse est, & si negetur, fatendum frustra proportionem istorum spatiorum investigari. Tamen, quia propositum etiam absque hoc demonstrari potest, Galilei methodum sequendo,


operæ pretium erit demonstrationem, ab illo minus perfecte traditam, hic accuratius conscribere. itaque rursum hic demonstrabimus,

DE DESCENSU  
GRAVIAVM.

## PROPOSITIO V.

**S**patium peractum certo tempore, à gravi è quiete casum inchoante, dimidium esse ejus spatii quod pari tempore transiret motu æquabili, cum celeritate quam acquisivit ultimo casus momento.

Sit tempus descensus totius A H, quo tempore mobile peregit spatium quoddam cuius quantitas designetur plano P. ducta-



que H L perpendiculari ad A H, longitudinis cuiuslibet, referat illa celeritatem in fine casus acquisitam. Deinde completo rectangulo A H L M, intelligatur eo notari quantitas spatii quod percurreret tempore A H, cum celeritate H L. Ostendendum est igitur planum P dimidium esse rectanguli M H, hoc est, ducta diagonali A L, æquale triangulo A H L.

Si planum P non est æquale triangulo A H L, ergo aut minus eo erit, aut majus. Sit primo, si fieri potest, planum P minus triangulo A H L. dividatur autem A H in tot partes æquales A C, C E, E G &c. ut, circumscriptâ triangulo A H L figurâ è rectangulis quorum altitudo singulis divisionum ipsius A H partibus æquetur, ut sunt rectangula B C, D E, F G, alterâque eidem triangulo inscriptâ, ex rectangulis ejusdem altitudinis, ut sunt K E, O G &c. ut, inquam, excessus illius figuræ supra hanc, minor sit excessu

D iii

DE DESCENSU  
GRAVITATIS. trianguli  $AHL$  supra planum  $P$ . hoc enim fieri posse perspicuum est, cum totus excessus figuræ circumscriptæ super inscriptam æquetur rectangulo infimo, basin habenti  $H L$ . erit itaque omnino excessus ipsius trianguli  $AHL$  supra figuram inscriptam minor quam supra planum  $P$ , ac proinde figura triangulo inscripta major plano  $P$ . Porro autem, quum recta  $AH$  tempus totius descensus referat, ejus partes æquales  $AC$ ,  $C E$ ,  $E G$ , æquales temporis illius partes referent. Cumque celeritates mobilis cadentis crescant eadem proportione qua tempora descensus \*, sitque celeritas in fine totius temporis acquisita  $HL$ ; erit ea, quæ in fine primæ partis temporis  $AC$  acquiretur,  $C K$ ; quia ut  $AH$  ad  $AC$ , ita  $HL$  ad  $C K$ . Similiter quæ in fine partis temporis secundæ  $CE$  acquiritur, erit  $E O$ , atque ita deinceps. Patet autem, tempore primo  $AC$ , spatium aliquod à mobili transmissum esse, quod majus sit nihilo; tempore vero secundo  $CE$  transmissum esse spatium quod majus sit quam  $K E$ , quia spatium  $KE$  transmissum fuisset tempore  $CE$ , motu æquabili, cum celeritate  $C K$ . habent enim spatia, motu æquabili transacta, rationem compositam ex ratione temporum, & ratione velocitatum, ideoque cum tempore  $AH$ , celeritate æquabili  $HL$  percurri posuerimus spatium  $MH$ , sequitur tempore  $CE$ , cum celeritate  $C K$ , percurri spatium  $KE$ , quum ratio rectanguli  $MH$  ad rectangulum  $KE$  componatur ex rationibus  $AH$  ad  $CE$ , &  $HL$  ad  $EO$ .

Quum ergo, ut dixi, spatium  $KE$  sit illud quod transmitteretur tempore  $CE$ , cum celeritate æquabili  $C K$ , mobile autem feratur tempore  $CE$  motu accelerato, qui jam principio hujus temporis habet celeritatem  $C K$ ; manifestum est isto accelerato motu, tempore  $CE$ , majus spatium quam  $KE$  conjecturum. Eadem ratione, tempore tertio  $EG$ , majus spatium conficiet quam  $OG$ , quia nempe hoc conjecturum esset tempore eodem  $EG$ , cum celeritate æquabili  $EO$ . Atque ita deinceps, singulis temporis  $AH$  partibus, à mobili majora spatia quam sunt rectangula figuræ inscriptæ, ipsis partibus adjacentia, peragentur. Quare totum spatium motu accelerato peractum majus erit ipsa figura inscripta. Spatium vero illud æquale positum fuit plano  $P$ . Itaque figura inscripta minor erit spatio  $P$ . quod est absurdum; eodem enim spatio major ostensa fuit. Non est igitur planum  $P$  minus triangulo  $AH$ . At neque majus esse ostendetur.

Sit enim, si potest; & dividatur  $AH$  in partes æquales, atque ad earum altitudinem, inscripta circumscripptaque rursus,

## HOROLOG. OSCILLATOR.

DE DESCENSU  
GRAVIAVM.

ut ante, sit triangulo A H L figura ex rectangulis, ita ut altera alteram excedat minori excessu quam quo planum p superat triangulum A H L, erit igitur necessario figura circumscripta minor planu p. Constat jam, prima temporis parte A C, minus spatium à mobili transmitti quam sit B C, quia hoc percurreretur eodem tempore A C cum celeritate æquabili C K, quam demum in fine temporis A C mobile adeptum est. Similiter secunda parte temporis C E, minus spatium motu accelerato transmittetur quam sit D E, quia hoc percurreretur eodem tempore C E, cum celeritate æquabili E O, quam demum in fine temporis C E mobile assequitur. Atque ita deinceps, singulis partibus temporis A H, minora spatia à mobili trajicientur quam sunt rectangula figuræ circumscriptæ, ipsis partibus adjacentia. Quare totum spatium motu accelerato peractum, minus erit ipsa figura circumscripta. Spatium vero illud æquale positum fuit plano p; ergo planum p minus quoque erit figura circumscripta. quod est absurdum, cum figura hæc plano p minor ostensa fuerit. Ergo planum p non maior est triangulo A H L, sed nec minus esse jam ostensum fuit. Ergo æquale sit necesse est; quod erat demonstrandum.

Et hæc quidem omnia quæ hactenus demonstrata sunt, gravibus per plana inclinata descendantibus atque ascendentibus æque ac perpendiculariter motis convenire sciendum est: cum, quæ de effectu gravitatis posita fuerunt, eadem ratione utrobius sint admittenda.

Hinc vero non difficile jam erit demonstrare propositionem sequentem quam concedi sibi, ut quodammodo per se manifestam, Galileus postulavit. nam demonstratio illa quam postea adferre conatus est, quæque in posteriori operum ejus editione extat, parum firma meo quidem judicio videtur. Est autem propo-  
sitio hujusmodi.

## PROPOSITIO VI.

**C**eleritates gravium, super diversis planorum inclinacionibus descendendo acquisita, aquales sunt, si planorum elevationes fuerint aquales.


Elevationem plani vocamus altitudinem ejus secundum perpendicularum.

Sunto itaque plana inclinata, quorum sectiones factæ plano ad horizontem erecto, A B, C B; quorumque elevationes A E, C D

sint æquales; & cadat grave ex A per planum A B, & rursus ex C per planum C B. dico utroque casu eundem gradum velocitatis in puncto B acquisiturum.

Si enim per C B cadens minorem velocitatem acquirere dicatur quam cadens per A B, habeat ergo, per C B cadens, eam duntaxat quam per F B acquireret, posita nimurum F B minore quam A B. Acquiret autem per C B cadens eam velocitatem qua rursus

\* Prop. 4. huj. per totam B C possit ascendere.\* Ergo & per F B acquiret eam



velocitatem qua possit ascendere per totam B C. Ideoque cadens ex F in B, si continuet porro motum per B C; quod repercuſſu ad superficiem obliquam fieri potest; ascendet usque in C, hoc est, altius quam unde decidit, quod est absurdum.

Eodem modo ostendetur neque per planum A B decidenti minorem velocitatem acquiri quam per C B. Ergo per utraque plana eadem velocitas acquiritur, quod erat demonstrandum.

Quod si vero, pro plano alterutro, sumatur perpendicularum ipsum planorum elevationi æquale, per quod decidere mobile ponatur, sic quoque eandem quam per plana inclinata velocitatem eiacquiri constat; eadem namque est demonstratio.

Porro hinc jam recte quoque procedet demonstratio alterius theorematis Galileani, cui reliqua omnia, quæ de descensu super planis inclinatis tradidit, superstruuntur. Nempe

### PROPOSITIO VII.

**T**empora descensuum super planis diversimode inclinatis, sed quorum eadem est elevatio, esse inter se ut planorum longitudines.


Sint plana inclinata A C, A D quorum eadem elevatio A B. dico tempus

## HOROLOG. OSCILLATOR.

33

tempus descensus per planum A C ad tempus descensus per A D  
esse ut longitudo A C ad A D. Est enim tempus per A C æquale tem-  
pori motus æquabilis per eandem A C, cum celeritate dimidia  
eius quæ acquiritur casu per A C\*. Similiter tempus per A D est \* Prop. 2. huj.  
æquale tempori motus æquabilis per ipsam A D, cum dimidia ce-

DE DESCENSU  
GRAVIAVM.



leritate ejus quæ acquiritur casu per A D. Est autem hæc dimidia  
celeritas illi dimidiæ celeritati æqualis\*, ideoque dictum tempus \*Prop. præced.  
motus æquabilis per A C, ad tempus motus æquabilis per A D, erit  
ut A C ad A D. Ergo & tempora singulis istis æqualia, nimirum  
tempus descensus per A C, ad tempus descensus per A D, eandem  
rationem habebunt, nempe quam A C ad A D. quod erat demon-  
strandum.

Eodem modo ostendetur & tempus descensus per A C, ad tem-  
pus casus per A B perpendicularē, esse ut A C ad A B longitudine.

## PROPOSITIO VIII.


**S**I ex altitudine eadem descendat mobile continuato motu  
per quotlibet ac quilibet plana contigua, utcunque incli-  
nata; semper eandem in fine velocitatem acquiret, qua ni-  
mirum æqualis erit ei quam acquireret cadendo perpendiculariter  
ex pari altitudine.

Sint plana contigua A B, B C, C D, quorum terminus A, supra  
horizontalem lineam D F per infimum terminum D ductam, al-  
titudinem habeat quanta est perpendicularis E F. descendatque  
mobile per plana illa ab A usque in D. Dico in D eam velocita-  
tem habiturum quam, ex E cadens, haberet in F.

Producta enim C B occurrat rectæ A E in G. Itemque D C producta

E F in H.

DE DESCENSU  
GRAVIAVM. occurrat eidem A E in E. Quoniam itaque per A B descendens eandem acquirit velocitatem in termino B, atque descendens \*Prop. 6. huj. per G B \*; manifestum est, cum flexus ad B nihil obstat motui ponatur, tantam velocitatem habiturum ubi in C pervenerit, quantam si per C C planum descendisset; hoc est, quantam ha-



beret ex descensu per B C. Quare & reliquum planum C D eodem modo transibit ac si per B C advenisset, ac proinde in D denique parem velocitatem habebit, ac si descendisset per planum E D, hoc est, eandem quam ex casu perpendiculari per E F. quod erat demonstrandum.

Hinc liquet etiam per circuli circumferentiam, vel per curvam quamlibet lineam descendente mobili (nam curvas tanquam ex infinitis rectis compositae essent hic considerare licet) semper eandem illi velocitatem acquiri si ab æquali altitudine descenderit: tantamque eam esse velocitatem, quantam casu perpendiculari ex eadem altitudine adipisceretur.

### PROPOSITIO IX.


**S**i grave, à descensu, sursum convertat motum suum, ascendet ad eandem unde venit altitudinem, per quas-cunque planas superficies contiguas, & quomodo cunque inclinas, incesserit.

Cadar grave ex altitudine A B, & ex punto B inclinata sint sursum plana B C, C D, D E, quorum extremitas E sit eadem altitudine cum punto A. Dico si mobile, post casum per A B, convertat motum ut perget moveri per dicta plana inclinata, pervenitum usque in E.

## HOROLOG. OSCILLATOR.

35

Dicatur enim, si fieri potest, tantum ad G perventurum. Producantur B C & C D, donec occurant horizontali G F in F & H. Cum igitur mobile, superatis planis B C, C D, habeat tantum eam velocitatem quâ possit ascendere per D G, vel per D H; nam ad hæc utraque eadem velocitate opus esse constat ex propositione



6; Ergo, superato plano B C, eam duntaxat habebat qua potuisset ascendere per C H, vel per C F. Ergo in B duntaxat eam qua potuisset ascendere per B F, hoc est, eandem quam acquireret descendendo per F B. Atqui in B habet velocitatem qua potest ascendere usque in A. Ergo illa velocitate quam acquirit grave descendendo per F B, posset ascendere per B A, hoc est, altius quam unde discesserat, quod fieri non potest.


Est autem eadem prorsus demonstratio quotcunque plana fuerint per quæ mobile ascendet. Vnde & si infinita fuerit planorum multitudo, hoc est, si superficies aliqua curva ponatur, per hanc quoque ad eam ex qua venit altitudinem mobile assurget.

## PROPOSITIO X.

**S**i mobile cadat perpendiculariter, vel per quamlibet superficiem descendat, ac rursus impetu concepto per quamlibet aliam feratur sursum, habebit ascendendo ac descendo in punctis æque altis eandem semper velocitatem.

Vt si mobile ex altitudine A B decidens, motum deinde continuet per superficiem B C D, in qua punctum c sit pari altitudine atque in A B est punctum E. Dico in C eandem velocitatem inesse mobili atque in E fuerat.

E ij




\*Prop. præced. usque ad D punctum, æque altum ac A\*: cumque & ex descensu per A B velocitatem eam acquirat qua, converso motu, ascensurum sit per C D\*; Patet cum pervenit ad C ascendendo, eandem ipsum habere velocitatem, quam habebat in E descendendo; quod erat demonstrandum.

\*Prop. præced. fit per C D\*; Patet cum pervenit ad C ascendendo, eandem ipsum habere velocitatem, quam habebat in E descendendo; quod erat demonstrandum.

## PROPOSITIO XI.

**S**i mobile per superficiem aliquam deorsum tendat, ac deinde converso motu sursum per eandem superficiem vel aliam similem similiterque positam feratur, aequalibus temporibus per idem spatium descendet atque ascendet.

Velut si per superficiem A B descendat mobile, atque, ubi ad B



pervenerit, converso motu sursum per eandem A B, vel ei similem & respectu plani horizontalis similiter positam B C, ascendet, constat ex ante demonstratis, per venturum ad eandem ex qua venit altitudinem. Cum autem perpetuo, in punctis quorum


\*Prop. præced. eadem altitudo, eadem velocitatem habeat ascendendo ac descendendo\*, appetit eadem lineam bis eadem velocitate singulis sui partibus percurri: unde & tempora utriusque motus æqualia esse necesse est; quod erat demonstrandum.

## PROPOSITIO XII.

DE DESCENSU  
GRAVIAVM.

**E**sto circulus ABC, diametro AC, cui ad angulos rectos sit FG; huic vero occurrat à termino diametri A educta AF extra circulum, quæ quidem necessario secabit circumferentiam, puta in B. Dico arcum BD, lineis GF, AF interceptum, minorem esse recta DF.

Iungatur enim BC, & ducatur ex B puncto tangens circumfe-



rentiam recta BE, quæ necessario occurret rectæ FG inter F & D. Est igitur angulus BAC in circulo æqualis angulo EBC\*. quare & angulus FBE, qui una cum EBC constituit angulum rectum FBC, erit æqualis BCA. Quia autem similia sunt triangula ABC, AGF, erit & angulus Fæqualis angulo ACG. Ergo idem angulus Fæqualis angulo FBE. Itaque isosceles est triangulus FEB, habens crura æqualia FE, EB. Addita ergo utrius eorum recta ED, fiet FD, æqualis duabus BE, ED. Hasce vero duas majores esse constat arcu BD, iisdem terminis intercepto, & in eandem partem cavo. Ergo & FD eodem arcu BD major erit: quare constat propositum.


## PROPOSITIO XIII.

**I**fdem positis, si recta AB occurrat ipsi DG intra circulum; Dico arcum BD, rectis GD, AB interceptum, majorem esse recta DF.

Iungatur enim DC & ducatur arcui DB subtensa DB. Quoniam ergo angulus ABD æqualis ACD, hoc est, angulo ADG; angulus autem DFB major angulo ADG, sive ADG; erit

E iii


DE DESCENSU  
GRAVIAVM. idem  $D F B$  etiam major  $D B F$ . Ergo in triangulo  $D F B$  latus  $D B$



majus latere  $D F$ ; unde multo magis arcus  $D B$  superabit eandem  $D F$ . Quare constat propositum.

#### PROPOSITIO XIV.

**S**it cyclois  $A B C$  cuius basis  $A C$  axis  $B D$ . Quomodo autem generetur ex definitione & descriptione mechanica superius traditis satis manifestum arbitror. Et circa axem  $B D$ , circulus descriptus sit  $B G D$ , & à quolibet punto  $E$  in cycloide sumpto agatur  $E F$  basi  $A C$  parallela, qua & occurrat axi  $B D$  in  $F$ , secetque circumferentiam  $B G D$  in  $G$ , Dico rectam  $G E$  arcui  $G B$  aequalem esse.



Describatur enim per  $E$  punctum circulus  $L E K$  ipsi  $B G D$  aequalis, quiue tangat basin cycloidis in  $K$ , & ducatur diameter  $K L$ . Est igitur recta  $A K$  arcui  $E K$  aequalis; sed tota  $A D$  aequalis semicircumferentia  $K E L$ ; ergo  $K D$  aequalis arcui  $E L$  sive  $G B$ . Est autem  $K D$  sive  $N F$  aequalis  $E G$ , quoniam  $E N$  aequalis  $G F$ , & communis utriusque  $N G$ . Ergo constat &  $G E$  aequalem esse arcui  $G B$ .

## PROPOSITIO XV.


DE DESCENSU  
GRAVIUM.

**D**ato in Cycloide puncto, rectam per illud ducere quæ Cycloidem tangat.

Sit cyclois A B C, & punctum in ea datum B, per quod tangentem ducere oporteat.

Circa axem cycloidis A D describatur circulus genitor A E D, & ducatur B E parallela basi cycloidis, quæ dicto circulo occurrat in E, & jungatur A E, cui denique parallela per B agatur H B N. Dico hanc cycloidem in B contingere.

Sumatur enim in ea punctum quodlibet, à B diversum, ac pri-




mo versus superiora velut H, & per H ducatur recta basi cycloidis parallela, quæ occurrat cycloidi in L, circulo A E D in K, rectæ A E in M. Quia ergo K L est æqualis arcui K A, recta autem K M minor arcu K E, erit recta M L minor arcu A E, hoc est, rectâ E B, sive M H; unde apparet punctum H esse extra cycloidem.

Deinde in recta H N sumatur punctum N inferius B, & per N agatur, ut ante, basi parallela, quæ occurrat cycloidi in Q, circulo A E D in O, rectæ A E productæ in P. Quia ergo O Q, æqualis est arcui O A; O P autem major arcu O E; erit P Q minor arcu E A, hoc est, rectâ E B, sive P N. Vnde apparet rursus punctum N esse extra cycloidem. Cum igitur quodlibet punctum præter B, in recta H B N sumptum, sit extra cycloidem, constat illam in punto B cycloidem contingere; quod erat demonstrandum.

Huic demonstrationi an locum suum hic relinquerem dubitavi, quod non multum ei absimilem à clarissimo VVrennio editam inveniam in libro VVallisij de Cycloide. Potest autem & universalis constructione propositum absolvi, quæ non cycloidi tantum sed & aliis curvis, ex cujuslibet figuræ circumvolutione genitis, conveniat; dummodo sit figura in eandem partem cava, & ex iis quæ geometricæ vocantur.

Sit enim curva  $N A B$ , orta ex circumvolutione figuræ  $O L$  super regula  $L D$ ; describente nempe puncto  $N$ , in circumferentia figuræ  $O L$  sumpto. Et oporteat ad punctum curvæ  $A$  tangentem ducere. Ducatur recta  $C A$  à puncto  $C$ , ubi figura regulam tangebat cum punctum describens esset in  $A$ : quod punctum contactus semper inveniri potest, siquidem eo reducitur problema ut duæ rectæ inter se parallelæ ducendæ sint, quarum altera transseat per punctum describens in figuræ ambitudatum, altera figuram tangat, quæque inter se distent quantum distat punctum datum  $A$  ab regula  $L D$ : dico ipsam  $C A$  occurrere curvæ ad angulos rectos, sive circumferentiam  $M A F$  descriptam centro  $C$  radio  $C A$ , tangere curvam in puncto  $A$ , unde perpendicularis ad  $A C$  per punctum  $A$  ducta curvam ibidem continget.



Ducatur enim  $C B$  primum ad punctum curvæ  $B$ , quod distet ultra punctum  $A$  ab regula  $L D$ , intelligaturque figuræ positus in  $B E D$ , cum punctum describens esset in  $B$ , contactus regulæ in  $D$ . & punctum curvæ quod erat in  $c$ , cum punctum describens esset in  $A$ , hic jam sublatum sit in  $E$ ; & jungantur  $E C$ ,  $E B$ , tangatque figuram in  $E$  recta  $K H$ , occurrens regulæ in  $H$ .

Quia ergo recta  $C D$  æqualis est curvæ  $E D$ ; eadem vero curva major est utraque simul  $E H$ ,  $H D$ ; erit  $E H$  major quam  $C H$ . Vnde angulus  $E C H$  major quam  $C E H$ , & proinde  $E C L$  minor quam  $C E K$ . Atqui addendo angulum  $K E B$ , qui æqualis est  $L C A$ , ad  $K E C$ , fit angulus  $C E B$ : & auferendo ab  $E C L$  angulum  $L C B$ , fit  $E C B$ . Ergo angulus  $C E B$  major omnino angulo  $E C B$ . Itaque in triangulo  $C E B$ , latus  $C B$  majus erit quam  $E B$ . sed  $E B$  æquale patet esse  $C A$ , cum sit idemmet ipsum unà cum figura transpositum.

## HOROLOG. OSCILLATOR.


41

tum. Ergo c b etiam major quam c a, hoc est, quam c f. unde DE DESCENSU  
GRAVIUM.

Sit rursus punctum n in curva sumptum inter regulam l d & punctum a. Cumque punctum describens esset in n, ponatur situs figuræ fuisse in v l, punctumque contactus l, punctum verò quod tangebat prius regulam in c, sit jam sublatum in v: & jungantur c n, n v, v c, v l. Erit ergo v n æqualis c a; imo erit ipsa c a translata in v n. Iam quia recta l c æquatur curvæ l v, ac proinde major est recta l v, erit in triangulo c l v angulus l v c major quam l c v. Quare addito insuper angulo l v n ad l v c, fiet totus n v c major utique quam l c v, ac proinde omnino major angulo n c v, qui pars est l c v. Ergo in triangulo c v n latus c n majus erit latere v n, cui æquatur c a, ideoque c n major quoque quam c a, hoc est quam c m. Vnde apparet punctum n cadere extra circulum m a f, qui proinde tanget curvam in punto a. quod erat demonstrandum.

Est autem eadem quoque tum constructio tum demonstratio, si curva genita sit à puncto describente, vel intra vel extra ambitum figuræ circumvolutæ sumpto. Nisi quod, hoc posteriori casu, pars quædam curvæ infra regulam descendit, unde nonnulla in demonstratione oritur diversitas.

Sit enim punctum a, per quod tangensducenda est, datum in



parte curvæ n a b, quæ infra regulam c l descendit, descripta nimirum à punto n extra figuram revolutam sumpto, sed certam

F

## 42 CHRISTIANI HUGENII

DE DESCENSU  
GRAVIAUM. positionem in eodem ipsius plano habente. Invento igitur puncto C, ubi figura revoluta tangit regulam CD quum punctum describens esset in A, ducatur recta CA. Dico hanc curvæ NAB occurtere ad rectos angulos, sive circumferentiam radio CA centro C descriptam tangere curvam NAB in puncto A. Ostendetur autem exterius ipsam contingere, cum in curvæ parte supra regulam CD posita interius contingat.

Positis enim & descriptis iisdem omnibus quæ prius, ostenditur rursus angulus ECH major quam CEH. atqui ad ECH addito HCB fit angulus ECB; & à CEH auferendo HEB, qui æqualis est DCA, fit angulus CEB. Ergo ECB major omnino quam CEB. unde in triangulo ECB latus EB majus quam CB. sed ipsi EB æqualis est CA, sive CF. Ergo & CF major quam CB: ideoque punctum circumferentiae F est ultra curvam NAB à centro remotum.

Item rursus ostenditur angulus LVC major LCV. Quare CVP, qui cum LVC duos rectos æquat, minor erit quam VCD. Atqui addendo ad VCD angulam DCN, fit VCN; & auferendo ab CVP angulum PVN, fit CVN. Ergo angulus VCN omnino major quam CVN. In triangulo itaque CVN, latus VN majus erit quam CN. Est autem ipsi VN æqualis CA sive CM. Ergo & CM major quam CN, ideoque punctum circumferentiae M erit ultra curvam NAB à centro C remotum. Itaque constat circumferentiam MAF tangere curvam in puncto A. quod erat demonstrandum.

Quod si punctum curvæ per quod tangens ducenda est, sit illud ipsum ubi regula curvam secat, erit tangens quæsita semper regulæ perpendicularis; ut facile esset ostendere.

## PROPOSITIO XVI.

DE MOTU IN  
CYCLOIDE.

**S**i circuli circumferentiam, cuius centrum E, secant rectæ duæ parallela AF, BG, quarum utraque ad eandem partem centri transeat, vel altera AF per centrum ipsum: Et à puncto A, quo centro propior circumferentiam secat, ducatur recta ipsam contingens: dico partem hujus AB, à parallela utraque interceptam, minorem esse arcu AC, ab utraque eadem parallela intercepto.


Ducatur enim arcui AC subtensa recta AC. Quia ergo angulus BAF est æqualis ei quem capit portio circuli AHF, quæ vel major est semicirculo vel semicirculus, erit proinde angulus BAF,

## HOROLOG. OSCILLATOR.

43

vel minor recto vel rectus; ideoque angulus A B C vel major recto vel rectus. Quare in triangulo A B C latus A C, angulo B sub-

DE MOTU IN CYCLOIDE.




tensum, majus erit latere A B. sed idem latus A C minus est arcu A C. Ergo omnino & A B arcu A C minor erit.

## PROPOSITIO XVII.

**I**isdem positis, si tertia recta prioribus parallela D K, circulum secuerit, qua ab ea que centro propior est A F, tantumdem distet quantum hæc à reliqua B G: dico partem tangentis in A, à parallela ultimo adjecta, & media interceptam, nempe A D, arcu A C à primis duabus parallelis intercepto minorem esse.

Hoc enim patet quum A D ipsi A B æqualis sit, quam antea ostendimus arcu A C minorem esse.




## PROPOSITIO XVIII.

**S**i circulum, cuius centrum E, due rectæ parallela secuerint AF, BG; & à punto B, ubi qua à centro remotior est, vel tantundem atque altera distat, circumferentia oc-

F ij

DE MOTU IN CYCLOIDE. currit, ducatur recta circumferentiam tangens: erit pars hujus BA, à parallelis intercepta, major arcu ab iisdem parallelis intercepto BC.


Ducatur enim in puncto C, recta MC L circumferentiam tangens, quæ occurrat tangenti BA in L. In triangulo A CL,



angulus C æqualis est angulo MCF, hoc est, ei quem capit portio circuli CBF. angulus autem A æquatur angulo quem capit portio circuli BCG, quæ portio quam sit major vel æqualis portioni CBF, quippe quam BCG vel ulterius distet à centro quam CBF, vel tantundem: erit proinde trianguli ACL angulus A minor vel æqualis angulo C: & consequenter latus CL vel minus vel æquale lateri AL. Atqui CL una cum LB majores sunt arcu CB. Ergo & AL una cum LB, hoc est, tangens AB, eodem arcu CB major erit. quod erat demonstrandum.

### PROPOSITIO XIX.

**I**sdem positis, si tertia recta prioribus parallela DK circumlum fecet, quæ tantundem distet ab ea quæ remotior est à



centro quantum hac à reliqua AF: Erit pars tangentis in B,


$\Delta$  parallelia media,  $\mathcal{E}$  ultimo addita  $D K$ , intercepta, nimirum  $B D$ , major arcu  $B C$ .

De MOTU IN CYCLOIDE.

Hoc enim manifestum est cum  $B D$  fiat ipsi  $B A$  æqualis, quam ostendimus arcu  $B C$  majorem esse.

## PROPOSITIO XX.

**S**i arcus circuli, semicircumferentia minor,  $A B$ , in partes quotlibet secetur lineis rectis parallelis, quæ  $\mathcal{E}$  inter se,  $\mathcal{E}$  cum rectis sibi parallelis per terminos arcus ductis, aqualia intervalla constituant, quales sunt  $C D$ ,  $E F$ ,  $G H$ ,  $K L \mathcal{E} c.$  ducanturque ad terminum arcus alterutrum  $A$ ,  $\mathcal{E}^2$ ) ad reliqua omnia sectionum puncta rectæ circumferentiam tangentes, omnes in eandem partem,  $\mathcal{E}$  ut unaquaque occurrat proxima dictarum parallelarum; cujusmodi sunt tangentes  $A C$ ,  $D E$ ,  $F G$ ,  $H K \mathcal{E} c.$  Dico has tangentes, dempta prima  $A C$ , simul sumptas, minores esse arcu proposito  $A B$ . Easdem vero omnes, non omissa  $A C$ , maiores esse arcu  $A B$  diminuto parte extrema  $N B$ , hoc est, maiores arcu  $A N$ .



Ponamus enim primo parallelarum aliquas transfire ab utraque parte centri  $Z$ , & sit  $G H$ , earum quæ sunt à parte  $B$ , centro proxima, vel per ipsum centrum transeat. Itaque tangentes omnes inter  $G H$  &  $B O$  comprehensæ, ut  $H K$ ,  $L M$ ,  $N O$ , singulæ suis arcubus minores sunt \*. Porro autem & tangens  $G F$ , arcu sequente  $F D$  minor est \*, & similiter tangens  $E D$  arcu  $D A$ . Itaque tangentes omnes inter  $B O$  &  $C D$  interjectæ, minores sunt arcibus  $B H$  &  $F A$ , ac proinde omnino minores arcibus  $B H$ ,  $H A$ , sive arcu  $B A$ , quod erat primo ostendendum.

Porro jam demonstrabimus tangentes omnes inter  $B O$  &  $A$  maiores esse arcu  $A N$ . Enimvero parallela  $G H$ , vel proprius centrum  $Z$  transit quam parallela  $E F$ , quam pono proximam esse

earum quæ à parte A transeunt, vel erit remotior, vel æque distabit.

Quod si E F longius à centro vel æque remota est ac G H, erit tangens F G major arcu suo F H, & reliquæ tangentes versus A, nimirum E D, C A majores singulæ arcubus suis \*; adeo ut omnes simul G F, E D, C A majores sint arcu H A. sed & arcu H L major erit tangens L M \*, & arcu L N tangens N O; itaque tangentes omnes, præter H K, majores simul erunt arcu A N; multoque magis, accedente ipsa H K, tangentes omnes inter A & B comprehensæ arcu eodem A N majores erunt.

Si vero G H à centro longius distat quam E F, erit tangens K H major arcu H F \*, & tangens M L ut ante major arcu L H, & tangens O N major arcu N L, & omnes proinde tangentes O N, M L, K H majores arcu N F. Sed & tangens E D major est arcu suo F D \*, & tangens C A major similiter arcu suo D A. Itaque tangentes omnes inter B O & A, præter G F, majores erunt arcu N A; multoque magis tangentes eadem, accedente G F, hoc est, omnes quæ inter B O & A interjiciuntur, eodem arcu N A majores erunt.

Ex his vero etiam demonstratio manifesta est in casibus aliis, qualiscunque semicircumferentiaæ arcus accipiatur, quippe cum vel eadem sit ubique, vel pars tantum præcedentis demonstrationis.

### PROPOSITIO XXI.

**S**I mobile descendat continuato motu per qualibet plana inclinata contigua, ac rursus ex pari altitudine descendat per plana totidem contigua, ita comparata ut singula altitudine respondeant singulis priorum planorum, sed majori quam illa sint inclinatione. Dico tempus descensus per minus inclinata, brevius esse tempore descensus per magis inclinata.

Sint series duæ planorum inter easdem parallelas horizontales comprehensæ A B C D E, F G H K L, atque ita ut bina quæque sibi correspondentia plana utriusque seriei iisdem parallelis horizontalibus includantur; unumquodque vero seriei F G H K H magis inclinatum sit ad horizontem quam planum sibi altitudine respondens seriei A B C D E. Dico breviori tempore absolvi descendum per A B C D E, quam per F G H K L.


# HOROLOGI OSCILLATOR.

47

Nam primo quidem tempus descensus per A B , brevius esse constat tempore descensus per F G , quum sit eadem ratio horum temporum quæ rectarum A B ad F G \* , fitque A B minor quam F G , propter minorem inclinationem. Producantur jam sursum rectæ C B , H G , occurrantque horizontali A F in M & N . Itaque tempus per B C post A B , æquale est tempori per eandem B C post M B ,

DE MOTU IN CYCLOIDE.

\* Prop. 7. huj.



cum in puncto B eadem celeritas contingat , sive per A B , sive per M B descendenti \*. similiterque tempus per G H post F G , æquale erit tempori per eandem G H post N G . Est autem tempus per B C post M B ad tempus per G H post N G , ut B C ad G H longitudine , sive ut C M ad H N , cum hanc rationem habeant & tempora per totas M C , N H , & per partes M B , N G \* , ideoque etiam tempora reliqua . Estque B C , minor quam G H propter minorem inclinationem . Patet igitur tempus per B C post M B sive post A B , brevius esse tempore per G H post N G sive post F G .

\* Prop. 6. huj.


\* Prop. 7. huj.

Similiter ostendetur , productis D C , K H sursum , donec occurant horizontali A F in O & P , tempus per C D post A B C , sive post O C , brevius esse tempore per H K post F G H sive post P H . Ac denique tempus per D E post A B C D , brevius esse tempore per K L post F G H K . Quare totum tempus descensus per A B C D E , brevius erit tempore per F G H K L . quod erat demonstrandum .

Hinc vero manifestum est , considerando curvas lineas tanquam ex innumeris rectis compositas , si fuerint duæ superficies , secundum lineas curvas ejusdem altitudinis inclinatae , quarum in punctis quibuslibet æque altis major semper sit inclinatio unius quam reliquæ , etiam tempore breviori per minus inclinatam grave descensurum quam per magis inclinatam .

Velut si sint duæ superficies inclinatae secundum curvas A B , C D , æqualis altitudinis , quarumque in punctis æque altis quibuslibet E , F , major sit inclinatio ipsius C D quam A B , hoc est , ut


De motu in Cycloide. recta tangens curvam C D in F, magis inclinata sit ad horizon-  
tem, quam quæ curvam A B tangit in puncto E. erit tempus de-  
scensus per A B brevius quam per C D.



Idemque continget si altera linearum rectæ fuerit: dummodo inclinatio rectæ, quæ ubique est eadem, major minorve fuerit inclinatione curvæ in quolibet sui puncto.

### PROPOSITIO XXII.

**S**i in Cycloide cujus axis ad perpendicularm erectus stat, vertice deorsum spectante, duæ portiones curvæ æqualis altitudinis accipiantur, sed quarum altera propior sit vertici; erit tempus descensus per superiorem, brevius tempore per inferiorem.



Sit Cyclois A B, cujus axis A C ad perpendicularm erectus, vertex A deorsum spectet; & accipiantur in ea portiones B D & E F, æqualis altitudinis, hoc est, ejusmodi ut parallelæ horizontales B C, D H, quæ superiorem portionem B D includunt, æque inter se

se distent ac  $E G, F K$ , inferiorem portionem  $E F$  includentes. Dico tempus descensus per curvam  $B D$  brevius fore tempore per  $E F$ .

De MOTU IN CYCLOIDE.


Sumatur enim in  $B D$  punctum quodlibet  $L$ , & in  $E F$  punctum  $M$ , ita ut eadem sit altitudo  $E$  supra  $M$  quam  $B$  supra  $L$ . Et descripto super axe  $A C$  semicirculo, occurrant ei rectæ horizontales  $L N, M O$ , in  $N \& O$ , & jungantur  $N A, O A$ . Itaque quum punctum  $N$  sit altius puncto  $O$ , manifestum est rectam  $N A$  minus ad horizontem inclinari quam  $O A$ . Est autem ipsi  $N A$  parallela tangens curvæ in  $L$  puncto\*, & ipsi  $O A$  parallela tangens curvæ in  $M$ . Ergo curva  $B D$  in puncto  $L$  minus inclinata est quam curva  $E F$  in puncto  $M$ . Quod si igitur portio  $E F$ , invariata inclinatione, altius extolli intelligatur vélut in  $e f$ , ita ut inter easdem parallelas cum portione  $B D$  comprehendatur, invenietur punctum  $M$  in  $m$ , æquali altitudine cum puncto  $L$ . eritque etiam inclinatio curvæ  $e f$  in puncto  $m$ , quam eadem est inclinati curvæ  $E F$  in  $M$ , major inclinatio curvæ  $B D$  in  $L$ . Similiter vero, & in quolibet alio puncto curvæ  $e f$ , major ostendetur inclinatio quam curvæ  $B D$  in puncto æque alto. Itaque tempus descensus per  $B D$  brevius erit tempore per  $e f$ \*, sive, quod idem est, per  $E F$ . quod erat demon-

\*Prop. preced.

strandum.

### LEMMA.

**E**sso circulus diametro  $A C$ , quem secet ad angulos rectos  $D E$ , & à termino diametri  $A$  educata recta  $A B$  occurrat circumferentia in  $B$ , ipsi vero  $D E$  in  $F$ . Dico tres hasce,  $A B$ ,  $A D$ ,  $A F$ , proportionales esse.



Sit enim primo intersectio  $F$  intra circulum; & arcui  $B D$  recta subtenSA ducatur. Quia igitur arcus æquales sunt  $A E, A D$ , erunt anguli ad circumferentiam ipsis insistentes,  $E D A, A B D$  æqua-

G

De motu in Cycloide. les. Itaque in triangulis  $A B D$ ,  $A D F$ , æquales anguli  $A B D$ ,  $A D F$ . Communis autem utriusque est angulus ad  $A$ . Ergo dicti trianguli similes erunt, ideoque  $B A$  ad  $A D$  ut  $A D$  ad  $A F$ .

Sit jam punctum intersectionis  $f$  extra circulum, & ducatur  $b h$  parallela  $D E$ , quæ occurrat rectæ  $A D$  in  $H$ . Itaque secundum jam demonstrata erit ut  $D A$  ad  $A b$ , ita  $A b$  ad  $A H$ , hoc est, ita  $A f$  ad  $A D$ : Ideoque rursus proportionales erunt  $A f$ ,  $A D$ ,  $A b$ . Quare constat propositum.

## PROPOSITIO XXXIII.

**S**it Cyclois  $A B C$ , cuius vertex  $A$  deorsum conversus sit, axe  $A D$  ad perpendicularum erecto, sumptoque in ea quolibet puncto  $B$ , ducatur inde deorsum recta  $B I$  qua Cycloidem tangat, termineturque recta horizontali  $A I$ . recta vero  $B F$  ad axem perpendicularis agatur, & divisa bifariam  $F A$  in  $X$ , super ea describatur semicirculus  $F H A$ . Ducta deinde per punctum quodlibet  $G$  in curva  $B A$  sumptum, rectâ  $\Sigma G$  parallelâ  $B F$ , quæ circumferentia  $F H A$  occurrat in  $H$ , axi  $A D$  in  $\Sigma$ , intelligantur per puncta  $G$  &  $H$  rectæ tangentes utriusque curvae, earumque tangentium partes iisdem duabus horizontalibus  $M S$ ,  $N T$  interceptæ sint  $M N$ ,  $S T$ . Iisdemque rectis  $M S$ ,  $N T$  includantur tangentis  $B I$  pars  $O P$ , & axis  $D A$  pars  $Q R$ .

Quibus ita se habentibus, dico tempus quo grave percurret rectam  $M N$ , celeritate æquabili quanta acquiritur descendendo per arcum Cycloidis  $B G$ , fore ad tempus quo percurretur recta  $O P$ , celeritate æquabili dimidia ejus quæ acquiritur descendendo per totam tangentem  $B I$ , sicut est tangentis  $S T$  ad partem axis  $Q R$ .

Describatur enim super axe  $A D$  semicirculus  $D V A$  secans rectam  $B F$  in  $V$ , &  $\Sigma G$  in  $\Phi$ , & jungatur  $A V$  secans rectas  $O Q$ ,  $P R$ ,  $G \Sigma$  in  $E K$  &  $\Lambda$ . Iungantur item  $H F$ ,  $H A$ ,  $H X$  &  $A \Phi$ ; quæ postrema fecet rectas  $O Q$ ,  $P R$  in punctis  $\Delta$  &  $\Pi$ .

Habet ergo dictum tempus per  $M N$  ad tempus per  $O P$ , rationem eam quæ componitur ex ratione ipsarum linearum  $M N$  ad  $O P$ , & ex ratione celeritatum quibus ipsæ percurruntur, contrarie sumpta\*, hoc est, & ex ratione dimidiæ celeritatis ex  $B I$  sive ex

\*Prop. 5. Galil.  
de motu æ.  
quab.

\*Prop. 8. huj.  $F A$ , ad celeritatem ex  $B G$ , sive ex  $F \Sigma$ \*. Atqui tota celeritas ex


## HOROLOG. OSCILLATOR.

51

**F** A ad celeritatem ex **F**  $\Sigma$ , est in subduplicata ratione longitudinum **F** A ad **F**  $\Sigma$ <sup>\*</sup>, ac proinde eadem quæ **F** A ad **F** H. Ergo di-  
midia celeritas ex **F** A ad celeritatem ex **F**  $\Sigma$  erit ut **F** X ad **F** H. Ita-  
que tempus dictum per **M** N ad tempus per **O** P habebit ratio-  
nem compositam ex rationibus **M** N, ad **O** P, & **F** X ad **F** H. Ha-  
rum vero prior ratio, nempe **M** N ad **O** P, eadem ostendetur quæ  
**F** H ad **H**  $\Sigma$ .

De motu in  
CYCLOIDE.

\* Prop. 3. huj.



Est enim tangens Cycloidis **B** **I** parallela rectæ **V** **A**, similiter  
que tangens **M** **G** **N** parallela rectæ **Phi** **A**; ac proinde recta **M** **N**  
æqualis **Delta** **Pi**, & **O** **P** æqualis **E** **K**. Ergo dicta ratio rectæ **M** **N** ad  
**O** **P** eadem est quæ **Delta** **Pi** ad **E** **K**; hoc est, **Delta** **A** ad **E** **A**; hoc est,  
**Phi** **A** ad **Delta** **A**; hoc est **V** **A** ad **Phi** **A**<sup>\*</sup>. Est autem ut **V** **A** ad **A** **Phi** ita **F** **A** \* Lemma pra-  
ad **A** **H**; nam quia quadratum **V** **A** æquale est rectangulo **D** **A** **F**, &  
quadratum **A** **Phi** æquale rectangulo **D** **A** **S**, quæ rectangula sunt  
inter se ut **F** **A** ad **S** **A**, hoc est ut quadratum **F** **A** ad quadratum **A** **H**,  
erit proinde & quadratum **V** **A** ad quadratum **Phi** **A** ut quadratum  
**F** **A** ad quadratum **A** **H**; atque etiam **V** **A** ad **A** **Phi** longitudine, ut **F** **A**  
ad **A** **H**. Ratio itaque **M** **N** ad **O** **P**, eadem erit quæ **F** **A** ad **A** **H**, hoc  
est, propter triangula similia **F** **A** **H**, **F** **H** **S**, eadem quæ **F** **H** ad **H**  
**S**, ut dictum fuit. Itaque dicta ratio temporis per **M** **N** ad tempus  
per **O** **P**, componitur ex rationibus **F** **X** ad **F** **H** & **F** **H** ad **H** **S**, ideo-  
que eadem erit quæ **F** **X** sive **X** **H** ad **H** **S**. Sicut autem radius **X** **H**  
ad **H** **S**, ita est tangens **S** **T** ad rectam **Q** **R**; hoc enim facile per-  
spicitur. Igitur tempus motus qualem diximus per **M** **N**, ad tempus  
per **O** **P** constat esse sicut **S** **T** ad **Q** **R**. quod erat demonstrandum.


G ij

## PROPOSITIO XXIV.

**S**it rursus ut in praecedenti propositione Cyclois A B C, cuius vertex A deorsum spectet, axis A D ad horizontem erectus sit; Et sumpto in ea quovis puncto B, ducatur inde deorsum recta B ⊙ qua Cycloidem tangat, occurratque recta horizontali A ⊙ in ⊙: recta vero B F ad axem perpendicula-  
ris agatur, Et super FA describatur semicirculus F H A. Deinde alia recta G E, parallela FB, secet Cycloidem in E, rectam B ⊙ in I, circumferentiam F H A in H, Et denique axem DA in G.

Dico tempus descensus per arcum Cycloidis B E, esse ad tempus per tangentem B I cum celeritate dimidia ex B ⊙, sicut arcus F H ad rectam F G.

Si enim hoc verum non est, habebit tempus per arcum B E ad dictum tempus per B I, vel majorem rationem quam arcus F H ad rectam F G vel minorem. Habeat primo, si fieri potest, majorem.



Itaque tempus aliquod brevius tempore per B E (sit hoc tempus z) erit ad dictum tempus per B I ut arcus F H ad rectam F G. Quod si jam in Cycloide supra punctum B sumatur punctum aliud N, erit tempus per B E post N B, brevius tempore per B E. Manife-  
stum est autem punctum N tam propinquum sumi posse ipsi B, ut differentia eorum temporum sit quamlibet exigua, ac proinde ut minor sit ea qua tempus z superatur à tempore per B E. Sit itaque

## HOROLOG. OSCILLATOR.

33  
De MOTU IN  
CYCLOIDE.

punctum  $N$  ita sumptum. unde quidem tempus per  $B E$  post  $N B$  majus erit tempore  $z$ , majoremque proinde rationem habebit ad tempus dictum per  $B I$  cum dimidia celeritate ex  $B \Theta$ , quam arcus  $F H$  ad rectam  $F G$ . Habeat itaque eam quam arcus  $F H O$  ad rectam  $F G$ .

Dividatur  $F G$  in partes æquales  $P P$ ,  $P Q$ , &c. quarum unaquæque minor sit altitudine lineæ  $N B$ , atque item altitudine arcus  $H O$ ; hoc enim fieri posse manifestum est; & à punctis divisionum agantur rectæ, basi  $D C$  parallelæ, & ad tangentem  $B \Theta$  terminatæ  $P \Lambda$ ,  $Q \Sigma$ , &c. Quibusque in punctis hæ secant circumferentiam  $F H$ , ab iis, itemque à punto  $H$ , tangentes sursum ducantur usque ad proximam quæque parallelam, velut  $\Delta X$ ,  $\Gamma \Sigma$  &c. Similiter vero & à punctis, in quibus dictæ parallelæ Cycloidi occurunt, tangentes sursum ducantur velut  $S V$ ,  $T M$  &c. additâ vero ad rectam  $F G$  parte una  $G R$  æquali iis quæ ex divisione, ductâque  $R \Phi$  parallelâ similiter ipsi  $D C$ , patet eam occurrere circumferentiæ  $F H A$  inter  $H$  &  $O$ , quia  $G R$  minor est altitudine puncti  $H$  supra  $O$ . Iam vero sic porro argumentabimus.

Tempus per tangentem  $V S$  cum celeritate æquabili quæ acquireretur ex  $B S$ , majus est tempore motus continue accelerati per arcum  $B S$  post  $N B$ . Nam celeritas ex  $B S$  minor est celeritate ex  $N B$ , propterea quod minor altitudo  $B S$  quam  $N B$ . At celeritas ex  $B S$  æquabiliter continuari ponitur per tangentem  $V S$ , cum celeritas acquisita ex  $N B$  continue porro acceleretur per arcum  $B S$ , qui arcus minor insuper est tangente  $V S$ , omnibusque partibus suis magis erectus quam ulla pars tangentis  $V S$ . Adeo ut omnino majus sit futurum tempus per tangentem  $V S$  cum celeritate ex  $B S$ , tempore per arcum  $B S$  post  $N B$ . Similiter tempus per tangentem  $M T$ , cum celeritate ex  $B T$ , majus erit tempore per arcum  $S T$  post  $N S$ , & tempus post tangentem  $\Pi Y$  cum celeritate ex  $B Y$ , majus tempore per arcum  $T Y$  post  $N T$ . Atque ita tempora motuum æquilibrium per tangentes omnes usque ad infimam quæ tangit cycloidem in  $E$ , cum celeritatibus per singulas quantæ acquiruntur cadendo ex  $B$  ad usque punctum ipsarum contactus, majora simul erunt tempore per arcum  $B E$  post  $N B$ . Eadem vero & minora essent, ut nunc ostendemus.

Considerentur enim denuo tempora eadem motuum æquilibrium per tangentes cycloidis. Et est quidem tempus per tangentem  $V S$  cum celeritate ex  $B S$ , ad tempus per rectam  $B \Lambda$  cum celeritate dimidia ex  $F A$ , ut tangens circumferentiæ  $\Delta X$  ad partem

## 54 CHRISTIANI HUGENII

De motu in  
CYCLOIDE.

\* Prop. præced.

axis  $F P^*$ . Similiterque tempus per tangentem  $M T$ , cum celeritate ex  $B T$ , ad tempus per rectam  $A \Xi$  cum eadem dimidia celeritate ex  $F A$ , ut tangens  $\Gamma \Sigma$  ad rectam  $P Q$ . Atque ita deinceps singula tempora per tangentes cycloidis, quæ sunt eadem supradictis, erunt ad tempora motus æquabilis per partes sibi respondentes rectæ  $B I$  cum celeritate dimidia ex  $B \Theta$ , sicut tangentes circumferentiæ  $F H$ , iisdem parallelis comprehensæ, ad partes rectæ  $F G$  ipsis respondentes.

Sunt igitur quantitates quædam rectæ  $F P$ ,  $P Q$ , &c. & totidem aliæ, tempora scilicet quibus percurruntur rectæ  $B \Lambda$ ,  $\Lambda \Xi$  &c, motu æquabili cum celeritate dimidia ex  $B \Theta$ ; Et unaquæque quantitas in prioribus ad sequentem eadem proportione refertur, qua unaquæque posteriorum ad suam sequentem; sunt enim utrobique inter se æquales. Quibus autem proportionibus priores quantitates ad alias quasdam, nempe ad tangentes circuli  $\Delta X$ ,  $\Gamma \Sigma$ , &c, referuntur, iisdem proportionibus & eodem ordine posteriores quoque referuntur ad alias quasdam, nempe ad tempora motus qualem diximus per tangentes cycloidis  $V S$ ,  $M T$  &c. Ergo, sicut se habent omnes simul priores ad omnes eas ad quas ipsæ referuntur, hoc est, sicut tota  $F G$  ad tangentes omnes  $X \Delta$ ,  $\Gamma \Sigma$ , &c. ita tempus quo percurritur tota  $B I$  cum celeritate dimidia ex  $B \Theta$ , ad tempora omnia motuum quales diximus per tangentes cycloidis  $V S$ ,  $M T$ , &c \*. Et invertendo itaque tempora motuum dictorum per tangentes cycloidis, ad tempus per rectam  $B I$  cum celeritate dimidia ex  $B \Theta$ , eandem rationem habebunt quam dictæ tangentes omnes circumferentiæ  $F H$  ad rectam  $F G$ ; ac minorem proinde quam arcus  $F O$  ad rectam eandem  $F G$ ; quia arcus  $F \Phi$ , ideoque omnino & arcus  $F O$  major est dictis omnibus arcus  $F H$  tangentibus \*. Atqui tempus per  $B E$  post  $N B$ , ad tempus per  $B I$  cum celeritate dimidia ex  $B \Theta$ , posuimus esse ut arcus  $F O$  ad rectam  $F G$ . Ergo dicta tempora omnia per tangentes cycloidis minora simul erunt tempore per  $B E$  post  $N B$ , cum antea majora esse ostensum sit; quod est absurdum. Itaque tempus per arcum cycloidis  $B E$ , ad tempus per tangentem  $B I$ , cum celeritate dimidia ex  $B \Theta$  vel ex  $F A$ , non habet majorem rationem quam arcus circumferentiæ  $F H$  ad rectam  $F G$ .

Habeat jam, si potest, minorem. Ergo tempus aliquod majus tempore per arcum  $B E$ , (sit hoc tempus  $z$ ) erit ad tempus dictum per  $B I$ , ut arcus  $F H$  ad rectam  $F G$ .

Quod si jam sumatur arcus  $N M$  æqualis altitudine cum arcu  $B$


\* Prop. 2. Archimedis de  
Sphæroid. &  
Conoid.

\*Prop 20 huj.

## HOROLOG. OSCILLATOR.

m- DE MOTU IN  
um CYCLOIDE.  
\*Prop. 22. huj.

E, sed cuius terminus superior N sit humilior puncto B, erit tempus per arcum N M majus tempore per arcum B E\*. Manifestum autem quod punctum N tam propinquum sumi potest puncto B, ut differentia dictorum temporum sit quamlibet exigua, ac proinde minor ea qua tempus z superat tempus per arcum B E. Sit itaque punctum N ita sumptum. Vnde quidem tempus per N M minus erit tempore z, habebitque proinde ad dictum tempus per B I, cum dimidia celeritate ex B O, minorem rationem quam arcus F H ad rectam F G. Habeat ergo eam quam arcus L H ad rectam F G.



Dividatur jam  $F G$  in partes æquales  $F P, P Q, \&c.$  quarum una quæque minor sit arcus cycloidis  $B N$  altitudine, itemque minor altitudine arcus circumferentiæ  $F L$ ; & additâ ad  $F G$  unâ eârum partium  $G \zeta$ , ducantur à punctis divisionum rectæ basi  $D C$  parallelæ, & ad tangentem  $B \odot$  terminatæ,  $P O, Q K, \&c.$ ; itemque à punto  $\zeta$  recta  $\zeta \Omega$  quæ secet cycloidem in  $V$ , circumferentiam in  $\pi$ , quibusque in punctis ductæ parallelæ secant circumferentiam  $F H$ , ab iis tangentes deorsum ducantur usque ad proximam quæque parallelam, velut  $\theta \Delta, \Gamma \Sigma$ : Quarum infima à punto  $H$  ducta occurrat rectæ  $\zeta \Omega$  in  $X$ . Similiter vero & à punctis, in quibus ductæ parallelæ occurrunt cycloidi, ducentur totidem tangentes deorsum, velut  $s \Lambda, t \Xi, \&c.$  quarum infima, tangens nempe à punto  $E$  ducta, occurrat rectæ  $\zeta \Omega$  in  $R$ .

Quia igitur pro  $\zeta$ æqualis est figura grandis altitudini arcus borealis easternus, cui æqualis est ex constructione altitudo arcus nordic meridionalis, erit & pro  $\zeta$ æqualis altitudini arcus nordic meridionalis. Est autem recta pro o ex constructione superior ter-

mino  $N$ . Ergo &  $\zeta \Omega$ , & in ea punctum  $v$ , superius termino  $M$ . Quare, cum arcus  $s v$  æqualis sit altitudinis cum areu  $N M$ , sed termino  $s$  sublimiore quam  $N$ , erit tempus per  $s v$  brevius tempore per  $N M$ \*.

\*Prop. 12. huj.

\* Prop. 8. huj.

Atqui tempus per tangentem  $s A$ , cum celeritate æquabili ex  $B s$ , brevius est tempore descensus accelerati per arcum  $s T$ , incipientis in  $s$ . Nam celeritas ex  $B s$ , qua tota  $s A$  transmissa ponitur, æqualis est celeritati ex  $s T$ \*, quæ motui per arcum  $s T$  in fine demum acquiritur; ipsaque  $s A$  minor est quam  $s T$ . Similiter tempus per tangentem  $T Z$ , cum celeritate æquabili ex  $B T$ , brevius est tempore descensus accelerati per arcum  $T Y$  post  $s T$ ; quum celeritas ex  $B T$ , qua tota  $T Z$  transmissa ponitur, sit æqualis celeritati ex  $s Y$ , quæ in fine demum acquiritur motui dicto per arcum  $T Y$  post  $s T$ ; ipsaque  $T Z$  minor sit arcu  $T Y$ . Atque ita tempora omnia motuum æquabilium per tangentes cycloidis, cum celeritatibus per singulas quantæ acquiruntur descendendo ex  $B$  usque ad punctum ipsarum contactus, breviora simul erunt tempore descensus accelerati per arcum  $s v$ . Eadem vero & longiora essent, ut nunc ostendemus.

Est enim tempus dictum per tangentem  $s A$ , cum celeritate æquabili ex  $B s$ , ad tempus per rectam  $O R$  cum celeritate æquabili dimidia ex  $B \Theta$ , sicut tangens semicirculi  $\theta \Delta$  ad rectam  $P Q$ \*. similiterque tempus per tangentem  $T Z$ , cum celeritate æquabili ex  $B T$ , est ad tempus per rectam  $K Y$  cum celeritate æquabili dimidia ex  $B \Theta$ , ut tangens  $\Gamma \Sigma$  ad rectam  $Q \Pi$ . Atque ita deinceps singula tempora per tangentes cycloidis, quæ sunt eadem supra dictis, erunt ad tempora motus æquabilis per partes sibi respondentes rectæ  $O \Omega$ , cum celeritate dimidia ex  $B \Theta$ , ut tangentes circumferentiarum  $\theta \pi$ , iisdem parallelis inclusæ, ad partes rectæ  $P \zeta$  ipsis respondentes. Vnde, ut in priori parte demonstrationis, concludetur omnes simul rectas  $P Q$ ,  $Q \Pi$  &c. hoc est, totam  $P \zeta$  esse ad omnes simul tangentes  $\theta \Delta$ ,  $\Gamma \Sigma$ , &c. sicut tempus quo percurritur tota  $O \Omega$ , cum celeritate dimidia ex  $B \Theta$ , adtempora omnia motuum quales diximus per tangentes cycloidis  $O A$ ,  $T Z$ , &c. Quare & convertendo, tempora omnia per tangentes cycloidis, eam rationem habebunt ad tempus dictum motus æquabilis per rectam  $O \Omega$ , sive per  $B I$ , quam dictæ tangentes omnes arcus  $\theta \pi$  ad rectam  $P \zeta$  vel  $F G$ , ac proinde majorem quam arcus  $L H$  ad rectam  $F G$ ; est enim arcus  $\theta H$ , adeoque etiam omnino arcus  $L H$ , minor dictis tangentibus arcus  $\theta \pi$ \*. Sed tempus per  $N M$  posuimus

\*Prop. 20. huj.

mus ab initio ad idem tempus per  $B\dot{I}$  se habere ut arcus  $LH$  ad rectam  $FG$ . Ergo tempus per  $NM$ , multoque magis tempus per  $sv$ , minus erit tempore per tangentes cycloidis. Quod est absurdum, cum hoc tempus, illo per arcum  $sv$ , antea minus ostensum fuerit. Patet igitur tempus per arcum cycloidis  $B\dot{E}$  ad tempus per tangentem  $B\dot{I}$  cum celeritate æquabili dimidia ex  $B\Theta$ , non minorem rationem habere quam arcus  $FH$  ad rectam  $FG$ . Sed nec majorem habere ostensum fuit. Ergo eandem habeat necesse est. quod erat demonstrandum.

DE MOTU IN CYCLOIDE.

## PROPOSITIO XXV.

**I**N Cycloide cuius axis ad perpendicularum erectus est, vertice deorsum spectante, tempora descensus quibus mobile, à quocunque in ea punto dimissum, ad punctum imum verticis pervenit, sunt inter se æqualia; habentque ad tempus casus perpendicularis per totum axem cycloidis eam rationem, quam semicircumferentia circuli ad diametrum.

Esto cyclois  $ABC$  cuius vertex  $A$  deorsum spectet, axis vero  $AD$  ad perpendicularum erectus sit, & à punto quovis in cycloide sumpto, velut  $B$ , descendat mobile impetu naturali per arcum  $BA$ , sive per superficiem ita inflexam. Dico tempus descensus hujus esse ad tempus casus per axem  $DA$ , sicut semicircumferentia circuli ad diametrum. Quo demonstrato, etiam tempora descensus, per quoslibet cycloidis arcus ad  $A$  terminatos, inter se æqualia esse constabit.

Describatur super axe  $DA$  semicirculus, cuius circumferentiam fecerat recta  $BF$ , basi  $DC$  parallela, in  $E$ ; junctaque  $EA$ , ducatur ei parallela  $BG$ , quæ quidem cycloidem tanget in  $B$ . Eadem vero occurrat rectæ horizontali per  $A$  ductæ in  $G$ : sitque etiam super  $FA$  descriptus semicirculus  $FH$ .


Est igitur, per præcedentem, tempus descensus per arcum cycloidis  $BA$ , ad tempus motus æquabilis per rectam  $BG$  cum celeritate dimidia ex  $BG$ , sicut arcus semicirculi  $FH$  ad rectam  $FA$ . Tempus vero dicti motus æquabilis per  $BG$ , æquatur temporis descensus naturaliter accelerati per eandem  $BG$ , sive per  $EA$ , quæ ipsi parallela est & æqualis, hoc est, tempori descensus accelerati per axem  $DA$ \*. Itaque tempus per arcum  $BA$ , erit quoque ad tempus descensus per axem  $DA$ , ut semicirculi circumferentia  $FH$  ad diametrum  $FA$ . quod erat demonstrandum.

\* Prop. 6. Galil. de motu Accel.

Quod si tota cycloidis cavitas perfecta ponatur, constat mobile, postquam per arcum  $B A$  descenderit, inde continuato motu per alterum ipsi æqualem arcum ascensurum\*, atque in eo tantum tempore atque descendendo consumptum\*. Deinde

\*Prop. 9. huj.

\*Prop. 11. huj.



rursus per  $A$  ad  $B$  perventurum, ac singularum ejusmodi reciprocationum, in magnis parvisve cycloidis arcubus peractarum, tempora fore ad tempus casus perpendicularis per axem  $D A$ , sicut circumferentia circuli tota ad diametrum suam.

### PROPOSITIO XXVI.

**I**isdem positis, si ducatur insuper recta horizontalis  $H I$  qua arcum  $B A$  secet in  $I$ , circumferentiam vero  $F H A$  in  $H$ : dico tempus per arcum  $B I$ , ad tempus per arcum  $I A$  post  $B I$ , eam rationem habere quam arcus circumferentia  $F H$  ad  $H A$ .

Occurrat enim recta  $H I$  tangentis  $B G$  in  $K$ , axi  $D A$  in  $L$ . Est itaque tempus per arcum  $B A$ , ad tempus motus æquabilis per  $B G$  cum celeritate dimidia ex  $B G$ , sicut arcus  $F H A$  ad rectam  $F A$ \*. Tempus autem dicti motus æquabilis per  $B G$ , est ad tempus motus æquabilis per  $B K$ , cum eadem celeritate dimidia ex  $B G$ , sicut  $B G$  ad  $B K$  longitudine, hoc est, sicut  $F A$  ad  $F L$ . Et rursus tempus motus æquabilis, cum dicta celeritate, per  $B K$ , ad tempus per arcum  $B I$ , sicut  $F L$  ad arcum  $F H$ \*. Igitur ex æquo erit tempus per arcum  $B A$  ad tempus per  $B I$ , ut arcus  $F H A$  ad  $F H$ . Et dividendo, & convertendo, tempus per  $B I$ , ad tempus per  $I A$  post  $B I$ , ut arcus  $F H$  ad  $H A$ . quod erat demonstrandum.

\*Prop. 24. huj.

\*Prop. 24. huj.

HOROLOGII OSCILLATORII  
P A R S   T E R T I A .

*De linearum curvarum evolutione & dimensione.*


D E F I N I T I O N E S .

I.

**L**INEA in unam partem inflexa vocetur quam rectæ omnes tangentes ab eadem parte contingunt. Si autem portiones quasdam rectas lineas habuerit, ha ipsæ productæ pro tangentibus habentur.

II.

Cum autem duæ hujusmodi linea ab eodem puncto egrediuntur, quarum convexitas unius obversa sit ad cavitatem alterius, quales sunt in figura adscripta curvæ A B C, A D E, amba in eandem partem cava dicantur.



III.

Si linea, in unam partem cava, filum seu linea flexilis circumPLICATA intelligatur, & manente una fili extremitate illi

H ij

DE LINEARUM  
CURVARUM  
EVOLUTIONE.


*affixa, altera extremitas abducatur, ita ut pars ea qua soluta est semper extensa maneat; manifestum est curvam quandam aliam hac fili extremitate describi. Vocetur autem ea, Descripta ex evolutione.*

## IV.

*Illa vero cui filum circumPLICatum erat, dicatur Evoluta. In figura superiori, ABC est evoluta, ADE descripta ex evolutione ABC, ut nempe cum extremitas fili ex A venit in D, pars fili extensa sit DB recta, reliqua parte BC adhuc applicata curva ABC. Manifestum est autem DB tangere evolutam in B.*

## PROPOSITIO I.

**R**ecta omnis, qua evolutam tangit, occurret linea ex evolutione descripta ad angulos rectos.




Sit AB evoluta, AH vero quæ ex evolutione illius descripta est. Recta autem FD C, tangens curvam AD in D, occurrit in C curvæ AC H. Dico ei occurrere ad angulos rectos: hoc est, si ducatur CE recta perpendicularis CD, dico eam in C tangere curvam AC H. Quia enim DC tangit evolutam in D, appetet ipsam referre positionem filii tunc cum ejus extremitas pervenit in C. Quod si igitur ostenderimus filum, in tota reliqua descriptione curvæ AC H, nusquam pertingere ad rectam CE præterquam in C punto, ma-

nifestum erit rectam c e ibidem curvam a c h contingere.

Sumatur punctum aliquod in a c præter c, quod sit h, sitque primo remotius à principio evolutionis a quam punctum c, & intelligatur pars libera esse h g, cum extremitate sua ad h pervenit. Tangit ergo h g lineam a b in g. Cumque interea dum describitur pars curvæ c h, evolutus sit arcus d g, occurret c d à parte d producta ipsi h g, ut in f. Ponatur autem g h occurrere rectæ c e in e. Quia igitur duæ simul d f, f g, majores sunt quam d g, sive curva ea fuerit sive recta: fiet addendo utrinque rectam d c, ut rectæ c f, f g simul majores sint recta c d & ipsa d g. Sed propter evolutionem, apparent utrisque simul, rectæ c d, & lineæ d g, æquari rectam h g. Ergo duæ simul c f, f g majores quoque erunt recta h g; & ablata communis f g, erit c f major quam h f. Sed f e major est quam f c, quia angulus c trianguli f c e est rectus. Ergo f e omnino major quam f h. Vnde apparat, ab hac quidem parte puncti c, fili extremitatem non pertingere ad rectam c e.

DE LINEARUM  
CURVARUM  
EVOLUTIONES.



Sit jam punctum h propinquius principio evolutionis a quam punctum c. sitque fili positio h g, tunc cum ejus extremitas esset in h, & ducantur rectæ d g, d h, quarum hæc occurrat rectæ c e in e. apparelt autem d g rectam non posse esse in directum ipsi h g, adeoque h g d fore triangulum. Iam quia recta d g vel minor est quam d k g, vel eadem, si nempe evolutæ pars d g recta sit; addirâ utriusque g h, erunt rectæ d g, g h simul minores vel

H iij

DE LINEARUM  
CUIVARUM  
EVOLUTIONE. æquales duabus istis, scilicet D K G & G H, sive his æquali rectæ minor utique erit rectâ D C. Sed D E major est quam D C, quia in triangulo D C E angulus C est rectus. Ergo D H multo minor quam D E. Situm est ergo punctum H, hoc est extremitas filii G H, intra angulum D C E. Vnde apparet neque inter A & C usquam illam pertingere ad rectam C E. Ergo C E tangit curvam A C in C; ac proinde D C, cui C E ducta est perpendicularis, occurrit curvæ ad angulos rectos. quod erat demonstrandum.

Hinc etiam manifestum est curvam A H C in partem unam inflexam esse, & in eandem partem cavam ac ipsa A G B, cuius evolutione descripta est. Omnes enim tangentes lineæ A H C, cadunt extra spatum D G A H C: omnes vero tangentes lineæ A G D, intra dictum spatum. unde liquet cavitatem A H C respicere convexitatem A G D.

### PROPOSITIO II.


**O**Mnis curva linea terminata, in unam partem cava, ut A B D, potest in tot partes dividi, ut si singulis partibus subtensa rectæ ducantur, velut A B, B C, C D; & à singulis item divisionis punctis, ipsaque curvæ extremitate rectæ ducantur curvam tangentem, ut A N, B O, C P, quæ occurrant iis quæ in proxime sequentibus divisionis punctis curvæ ad angulos rectos insistunt, quales sunt lineæ B N, C O, D P; ut inquam subtensa quæque habeat ad sibi adjacentem curvæ perpendicularem, velut A B ad B N, B C ad C O, C D ad D P, rationem majorem quavis ratione proposita.

Sit enim data ratio lineæ E F ad F G, quæ recto angulo ad F jungantur, & ducatur recta G E H.

Intelligatur primo curva A B D in partes tam exiguae secta punctis B, C, ut tangentes quæ ad bina quæque inter se proxima puncta curvam contingunt, occurrant sibi mutuo secundum angulos qui singuli maiores sint angulo F E H; quales sunt anguli A K B, B L C, C M D. quod quidem fieri posse evidentius est quam ut demonstratione indigeat. Ductis jam subtensis A B, B C, C D, & erectis curvæ perpendicularibus B N, C O, D P, quæ occurrant productis A K, B L, C M, in N, O, P: dico rationes singulas rectarum, A B ad B N, B C ad C O, C D ad D P, maiores esse ratione E F ad F G.

Quia enim angulus  $AKB$  major est angulo  $HEF$ , erit residuus illius ad duos rectos, nimis angulus  $NKB$ , minor angulo  $GEF$ .

DE LINEARUM  
CURVARUM  
EVOLUTIONE.




Angulus autem  $B$  trianguli  $KB$   $N$  est rectus, sicut & angulus  $F$  in triangulo  $EFG$ . Ergo major erit ratio  $KB$  ad  $B$   $N$  quam  $EF$  ad  $FG$ . Sed  $AB$  major est quam  $KB$ , quoniam angulus  $K$  in triangulo  $AKB$  est obtusus, est enim major angulo  $HEF$  qui est obtusus ex constructione. Ergo ratio  $AB$  ad  $B$   $N$  major erit ratione  $KB$  ad  $B$   $N$ , ac proinde omnino major ratione  $EF$  ad  $FG$ . Eodem modo & ratio  $BC$  ad  $CO$ , &  $CD$  ad  $DP$ , major ostendetur ratione  $EF$  ad  $FG$ . Itaque constat propositum.

### PROPOSITIO III.

**D**VÆ curvæ in unam partem inflexæ & in easdem partes cavae ex eodem puncto egredi nequeunt, ita ad se invicem comparatae, ut recta omnis qua alteri earum ad angulos rectos occurrit, similiter occurrat & reliqua.

Sint enim, si fieri potest, hujusmodi lineæ curvæ  $ACE$ ,  $AGK$ , communem terminum habentes  $A$ , & sumpto in exteriore illarum



puncto quolibet  $K$ , sit inde educta  $KE$  recta, curvæ  $AGK$  occurrens ad angulos rectos, ac proinde etiam curvæ  $ACE$ .


Potest jam recta quædam sumi major curva K G A, quæ sit Q. Diversa autem intelligatur ipsa K G A, ut in propositione antecedenti dictum fuit, in tot partes punctis H G F, ut subtensæ singulæ K H, H G, G F, F A, ad perpendiculares curvæ sibi contiguas H M, G N, F O, A P majorem rationem habeant quam linea Q ad rectam K E. Itaque & omnes simul dictæ subtensæ ad omnes dictas perpendiculares majorem habebunt rationem quam Q ad K E. Producantur autem perpendiculares eadem & occurrant curvæ A C E in D, C, B, nimirum ad angulos rectos ex hypothesi. Erit jam K E minor quam M D. Etenim, ducta E L ipsi K B perpendiculare, quoniam K E occurrit lineæ curvæ E C A ad angulos rectos, tanget E L curvam A C E, occurretque necessario rectæ M D inter D & M. Vnde cum K E sit brevissima omnium quæ cadunt inter parallelas E L, K M, erit ea minor quam M L, ac proinde minor quoque omnino quam M D. Eodem modo & H D minor ostendetur quam N C, & G C minor quam O B, & F B minor quam P A. Cum sit ergo P A major quam F B, erunt duæ simul P A, O F maiores quam O B. Item quum O B sit major quam G C, erunt duæ simul O B, N G, maiores quam N C. Sed duæ P A, O F maiores erant quam O B. Itaque tres simul P A, O F, N G omnino maiores erunt quam N C. Rursus, quia N C major quam H D, erunt duæ simul N C, M H maiores quam M D. Vnde, si loco N C sumantur tres hæ ipsa maiores P A, O F, N G, erunt omnino hæ quatuor P A, O F, N G, M H maiores quam M D: ac proinde eadem quoque omnino maiores recta K E, quia ipsa M D major erat quam K E. Diximus autem subtensas omnes A F, F G, G H, H K majorem rationem habere ad omnes perpendiculares P A, O F, N G, M H, quam linea Q ad K E. Ergo cum dictis perpendiculis minor etiam sit K E, habebunt dictæ subtensæ ad K E omnino majorem rationem quam Q ad K E. Ergo subtensæ simul sumptæ maiores erunt recta Q. Hæc autem ipsâ curvâ A G K major sumpta fuit. Ergo subtensæ A F, F G, G K, H K simul maiores erunt curva A G K cujus partibus subtenduntur; quod est absurdum, cum singulæ suis arcibus sint minores. Non igitur poterunt esse duæ curvæ lineæ quæ quemadmodum dictum fuit sese habeant. quod erat demonstrandum.

## PROPOSITIO IV.

**S**i ab eodem punto duæ lineæ exirent in partem unam inflexæ, & in eandem partem cava, ita vero mutuo comparatae

*parata ut rectæ omnes, quæ alteram earum contingunt, alteri occurrant ad angulos rectos; posterior hac prioris evolutione, à puncto communi cœpta, describetur.*

Sunto lineæ A B C, A D E, in partem unam inflexæ, & quarum utraque in easdem partes cava existat, habeantque communem terminum A punctum. Omnes autem rectæ tangentes lineam A B C, velut B D, C E, occurrant lineæ A D E ad angulos rectos. Dico evolutione ipsius A B C, à termino A incepta, describi A D E.




Si enim fieri potest, describatur dicta evolutione alia quædam curva A F G. Ergo lineæ rectæ quælibet, evolutam A B C tangentes, ut B D, C E, occurrent ipsi A F G ad angulos rectos \*, puta in F & G. Sed eadem tangentes etiam ad rectos angulos occurrere ponuntur lineæ A D E. Sunt igitur lineæ curvæ A D F, A F G, eodem punto A terminatæ, inque partem unam flexæ, & ambæ in eandem partem cavæ, quippe utraque in eandem atque ipsa A B C; nam de linea A D E constat ex hypothesi, de A F G vero ex propositione prima hujus; & omnes quæ uni earum occurront ad angulos rectos, etiam alteri similiter occurront. quod quidem fieri non posse antea ostensum est\*. Quare constat ipsam A D E descriptum iri evolutione lineæ A B C. quod erat demonstrandum.

\* Prop. 1. huj.

\* Prop. 3. huj.

**S**i Cycloidem recta linea in vertice contingat, super qua, tanquam basi, alia cyclois priori similis & aequalis constituatur, initium sumens à punto dicti verticis; recta qualibet inferiorem cycloidem tangens, occurret superioris portioni, sibi superposita, ad angulos rectos.

Tangat cycloidem A B C in vertice A recta A G, super qua, tanquam basi, similis alia cyclois constituta sit A E F, cuius vertex F. Cycloidem autem A B C tangat recta B K in B. Dico eam productam occurrere cyclidi A E F ad angulos rectos.



¶ Describatur enim circa A D , axem cycloidis A B C , circulus genitor A H D , cui occurrat B H , basi parallela, in H , & jungatur H A . Quia ergo B K tangit cycloidem in B , constat eam parallelam esse rectæ H A \*. Itaque A H B K parallelogrammum est , ac proinde A K æqualis H B , hoc est , arcui A H \*. Sit porro jam descriptus circulus K M , genitori circulo , hoc est ipsi A H D , æqualis , qui tangat basin A G in K , rectam vero B K productam fecet in puncto E . Quia ergo ipsi A H parallela est B K E , ac proinde angulus E K A æqualis K A H , manifestum est B K productam abscindere à circulo K M arcum æqualem ei quem à circulo A H D abscindit recta A H . Itaque arcus K E æqualis est arcui A H , hoc est rectæ H B , hoc est rectæ K A . Hinc

\* Propos. 15.  
partis 2.

\* Propof. 14.

vero sequitur, ex cycloidis proprietate, cum circulus genitor  $MK$  tangebat regulam in  $K$ , punctum describens fuisse in  $E$ . Itaque recta  $K E$  occurrit cycloidi in  $E$  ad angulos rectos \*. Est autem  $K E$  ipsa  $B K$  producta. Ergo patet productam  $B K$  occurrere cycloidi ad angulos rectos. quod erat demonstrandum.

## PROPOSITIO VI.

**S**emicycloidis evolutione, à vertice cœpta, alia semicyclois describitur evolute æqualis & similis, cuius basis est in ea recta qua cycloidem evolutam in vertice contingit.

Sit semicyclois  $A B C$ , cui superimposita sit alia similis  $A E F$ , quemadmodum in propositione præcedenti. Dico, si linea flexilis, circa semicyloidem  $A B C$  applicata, evolvatur, incipiendo ab  $A$ , eam describere extremitate sua ipsam semicyloidem  $A E F$ . Quia enim ex punto  $A$  egrediuntur semicycloides  $A B C$ ,  $A E F$ , in unam partem inflexæ, & ambæ in eandem cavæ, ac præterea ita comparatæ, ut omnes tangentes semicyloidis  $A B C$  occurrant semicycloidi  $A E F$  ad angulos rectos, sequitur hanc evolutione illius, à termino  $A$  incepta, describi\*. quod erat demonstrandum.


Et appareat, si dimidiā cycloidem, ipsi  $A B C$  gemellam, contrario situ ab altera parte lineæ  $C G$  disponamus, velut  $C N$ , ejus evolutione, vel etiam dum filum, jam extensum in  $C F$ , circa eam replicatur, alteram semicyloidem  $F N$  fili extremitate descriptum iri, quæ simul cum priore  $A E F$  integrum constituat.

Atque ex his, & propositione 25 de descensu gravium, manifestum jam est quod supra in Constructione Horologii de æquabili penduli motu dictum fuit. Patet enim perpendiculum, inter laminas binas, secundum semicyloidem inflexas, suspensum agitatumque, motu suo cycloidis arcum describere, ac proinde æqualibus temporibus quilibet ejus reciprocationes absolvit. Non refert enim utrum in superficie, secundum cycloidem curvata, mobile feratur, an filo alligatum lineam ipsam in aëre percurrat, cum utrobique eandem libertatem; eandemque in omnibus curvæ punctis inclinationem ad motum habeat.

## PROPOSITIO VII.

**C**yclois linea sui axis, sive diametri circuli genitoris, quadrupla est.

Repetita enim figura præcedenti: cum post totam semicycloidem A B C evolutam, filum occupet rectam C F, quæ dupla est A D, propterea quod axes cycloidum A B C, A E F sunt æquales; apparet semicycloidem ipsam A B C, filo sibi circum applicito æqualem, duplam esse sui axis A D, ac totam proinde cycloidem axis sui quadruplam.



Apparet etiam tangentem B E, quæ refert partem fili extensam, antea curvæ parti B A applicatam, huic ipsi longitudine æquari. Est autem B E dupla ipsius B K, sive A H, quoniam in propositione quinta ostensum est K E ipsi A H æqualem esse. Itaque pars cycloidis A B rectæ A H, sive B K, dupla erit: existente nimis B H parallela basi cycloidis: idque ubicumque in ea punctum B sumptum fuerit.

Hanc cycloidis dimensionem primus invenit, via tamen longe alia, eximius geometra Christophorus Wren Anglus, eamque deinde eleganti demonstratione confirmavit, quæ edita est in libro de cycloide viri clarissimi Ioannis Wallisij. De eadem vero linea, alia quoque multa extant pulcherrima inventa nostri temporis mathematicorum, quibus præcipue occasionem præbuere problemata quædam à Blasio Paschalio Gallo proposita, qui in his studiis præcellebat. Is cum sua, tum aliorum inventa recensens, primum omnium Mersennum lineam hanc in rerum natura advertisse ait. Primum Robervallium tangentes ejus defini-


visse, ac plana & solida dimensum esse. Item centra gravitatis tum plani, tum partium ejus invenisse. Primum Wrennum curvæ cycloidis æqualem rectam dedisse. Me quoque primum reperisse dimensionem absolutam portionis cycloidis, quæ rectâ, basi parallelâ, abscinditur per punctum axis, quod quarta parte ejus à vertice abest. quæ nimurum portio æquatur dimidio hexagono æquilatero, intra circulum genitorem descripto. Seipsum denique solidorum ac semifsolidorum, tam circa basin quam circa axem, centra gravitatis definivisse, itemque partium eorum. Lineæ etiam ipsius (sed hæc post acceptam à Wrenno dimensionem) centrum gravitatis invenisse, & dimensionem superficie rum convexarum, quibus solida ista eorumque partes comprehenduntur; earumque superficierum centra gravitatis. Ac denique dimensionem curvarum cuiusvis cycloidis, tam protractæ quam contractæ: hoc est earum quæ describuntur à punto intra vel extra circumferentiam circuli genitoris sumpto. Et horum quidem demonstrationes à Paschale sunt editæ. A quibus suas quoque, de eadem linea, subtilissimas meditationes exposuit Cl. Wallisius, atque eadem illa omnia suo marte se reperisse, ac problemata à Paschale proposita solvisse contendit. Quod idem & doctissimus Lovera sibi vindicat. Quantum vero unicuique debeat, ex scriptis eorum eruditæ dijudicent. Nos propterea tantum præcedentia retulimus, quod silentio prætereunda non videbantur egregia adeo inventa, quibus factum est ut, ex lineis omnibus, nulla nunc melius aut penitus quam cyclois cognita sit. Methodum vero nostram, qua in hac metienda usi sumus, in aliis quoque experiri libuit, de quibus porro nunc agemus.

## PROPOSITIO VIII.

**C**VJUS LINEÆ EVOLUTIONE PARABOLA DESCRIBATUR OSTENDERE.

Sit paraboloides A B, cuius axis A D; vertex A; proprietas autem ista, ut ordinatim ad axem applicata B D, cubus abscissa ad verticem D A æquetur solido, basin habenti quadratum D B, altitudinem vero æqualem lineæ cuidam datæ M; quæ quidem curva pridem geometris nota fuit; & pouatur axi D E juncta in directum A E, quæ habeat  $\frac{1}{3}$  ipsius M. Iam si filum continuum circa E A B applicetur, idque ab E evolvi incipiat, dico descri-

BELINEARUM  
CURVARUM  
EVOLUTIONE. ptam ex evolutione esse parabolam  $E F$ , cuius axis  $E A G$ , vertex  $E$ , latus rectum æquale duplæ  $E A$ .



Sumpto enim in curva  $A B$  puncto quolibet  $B$ , ducatur quæ in ipso tangat curvam recta  $B G$ , occurrens axi  $E A$  in  $G$ . & ex  $G$  ducatur porro  $G F$ , quæ ad rectos angulos occurrat parabolæ  $E F$  in  $F$ ; & sit ipsi  $G F$  perpendicularis  $F H$ , quæ parabolam in  $F$  contingat; & denique  $F K$  ordinatim ad axem  $E G$  applicetur.

Est igitur  $K G$  æqualis dimidio lateri recto, hoc est, ipsi  $E A$ ; ac proinde, additâ vel ablatâ utrimque  $A K$ , erit  $E K$  æqualis  $A G$ . Est autem  $A G$  triens ipsius  $A D$ , quoniam  $B G$  tangit paraboloidem in  $B$ : illud enim ex natura curvæ hujus facile demonstrari potest. Ergo &  $E K$  æqualis est trienti  $A D$ : &  $K H$ , quæ ex natura parabolæ dupla est  $K E$ , æquabitur duabus tertiis  $A D$ . Itaque cubus ex  $K H$  æqualis est  $\frac{1}{2}$  cubi ex  $A D$ , hoc est, solido basin habenti quadratum  $D B$ , altitudinem vero æqualem  $M$ , hoc est, ipsi  $A E$ . Quamobrem ut quadratum  $D B$  ad quadratum  $K H$ , ita erit  $K H$  longitudine ad  $A E$ , hoc est ad  $K G$ . Erat autem  $K H$  æqualis  $\frac{1}{2} A D$ , hoc est ipsi  $G D$ . Ergo ut quadratum  $B D$  ad quadratum  $D G$  ita est  $H K$  ad  $K G$ . Ut autem  $H K$  ad  $K G$ , ita est quadratum  $F K$  ad quadratum  $K G$ . Ergo sicut quadratum  $B D$  ad quadratum  $D G$ , ita quadratum  $F K$  ad quadratum  $K G$ . Et proinde sicut  $B D$  ad  $D G$  longitudine, ita  $F K$  ad  $K G$ . Vnde sequitur  $B G F$  esse lineam rectam. Sed  $G F$  occurrit parabolæ  $E F$  ad angulos rectos. Ergo apparet  $B G$ , tangentem paraboloidis, productam occurrere eidem parabolæ ad


angulos rectos. Idque similiter de quavis illius tangentे demon-  
strabitur. Ergo constat ex evolutione lineæ E A B, à termino E in-  
cepta, describi parabolam E F \*. quod erat demonstrandum.

DE LINEARUM  
CURVARUM  
EVOLUTIOINE.  
\* Prop. 4. huj.

## PROPOSITIO IX.

**R**eciam lineam invenire æqualem datæ portioni curvæ paraboloidis, ejus nempe in qua quadrata ordinatim applicatarum ad axem, sunt inter se sicut cubi abscissarum ad verticem.

Quomodo hoc fiat ex prop. præcedenti manifestum est. Para-  
bola vero E F ad constructionem non requiritur, quæ sic pera-  
getur. Data quavis parte paraboloidis hujus A B, cui rectam æqua-  
lem invenire oporteat, ducatur B G tangens in puncto B, quæ oc-  
currat axi A G in G. Tanget autem si A G fuerit tertia pars A D, inter



verticem & ordinatim applicatam B D interceptæ. Porro sumpta A E æquali ; lineæ M, quæ latus rectum est paraboloidis A B, du-  
catur E F parallela B G, occurratque lineæ A F, quæ parallelæ est B D, in F. Iam si ad rectam B G addatur N F, excessus rectæ E F supra E A, habebitur recta æqualis curvæ A B. Cujus demonstratio ex ante dictis facile perspicitur.

Semper ergo curva A B tantum superat tangentem B G, quan-  
tum recta E F rectam E A.

Rursus autem hic in lineam incidimus, cuius longitudinem alii  
jam ante dimensi sunt. Illam nempe quam anno 1659 Ioh. Heu-  
ratius Harlemensis rectæ æqualem ostendit, cuius demonstratio  
post commentarios Ioh. Schotenii in Cartesii Geometriam, eo-  
dem anno editam, adjecta est. Et ille quidem omnium primus  
curvam lineam, ex earum numero quarum puncta quælibet geo-

metricè definiuntur, ad hanc mensuram reduxit, cum sub idem tempus Cycloidis longitudinem dedisset Wrennius, non minus ingenioso epicheremate.

Scio equidem, ab edito Heuratii invento, Doctissimum Wallisium Wilhelmo Nelio, nobili apud suos juveni, idem attribuere voluisse, in libro de Cissoide. Sed mihi, quæ illic adfert perpendiculari, videtur non multum quidem ab invento illo Neliū abfuisse, neque tamen plane id adsecutum esse. Nam neque ex demonstratione ejus, quam Wallisiū affert, apparet illum satis perspexisse quānam foret curva illa, cujus, si construeretur, mensuram datam fore videbat. Et credibile est, si scivisset ex earum numero esse quæ jam pridem Geometris cognitæ fuerant, vel ipsum, vel alios ejus nomine, tam nobile inventum Geometris maturius impertituros fuisse, quod, si quod aliud, merebatur ut Archimedēum illud εὐρηκα exclamarent. Sane ejusdem inventi, tanquam à se profecti, etiam Fermatius, Tholosanus senator ac Geometra peritisimus, demonstrationes conscripsit, quæ anno 1660 excusæ sunt; sed illæ sero utique.

Cum vero in his simus, etiam de nobis dicere liceat, quid ad promovendum tam eximium inventum contulerimus: siquidem & Heuratio ut eo perveniret occasionem præbuimus, & dimensionem curvæ parabolicæ ex hyperbolæ data quadratura, quæ Heuratiani inventi pars est, ante ipsum atque omnium primi reperimus. Etenim sub finem anni 1657 in hæc duo simul incidimus, curvæ parabolicæ quam dixi dimensionem, & superficie conoidis parabolicis in circulum reductionem. Cumque Schotenio, aliisque item amicorum, per literas indicassemus, duo quædam non vulgaria circa parabolam inventa nobis sese obtulisse, eorumque alterum esse conoidicæ superficie extensionem in circulum, ille litteras eas cum Heuratio, quo tum familiariter utebatur, communicavit. Huic vero, acutissimi ingenii viro, non difficile fuit intelligere, conoidis istius superficie affinem esse dimensionem ipsius curvæ parabolicæ. Qua utraque inventa, ulterius inde investigans, in alias istas curvas paraboloides incidit, quibus rectæ æquales absolute inveniuntur.

Ac de Conoidis quidem superficie in planum redacta, ne quis forte testimonium desideret, pauca hæc adscribere visum est ex literis viri clarissimi, atque inter præcipuos hodie Geometras cendi, Franc. Slusii, quibus eo ipso anno mihi inventum illud, ac prolixius forte quam pro merito, gratulatus est. In quibus literis


24. Decemb. anni 1657. datis, ista habentur. *Duo tantum addo, unum &c. Alterum est, me has omnes curvas, ipsumque adeo locum linearem integrum, nihil pene facere prae invento hoc tuo, quo superficie in conoide parabolico rationem ad circulum suæ baseos demonstrasti. Hanc pro circuli quadratura pulcherrimam ἀπαγγελν prefero libens iis omnibus, quas ex loco linearis nec paucas olim deduxi, & quas tecum, si ita jusseras, data occasione communicabo.*

DE LINEARUM  
CURVARUM  
EVOLUTIONE.

Anno autem insequenti etiam superficies conoidum hyperbolicorum & sphaeroidum reperi, quomodo ad circulos reduci possent, constructionesque eorum problematum, non addita tamen demonstratione, Geometris quibuscum tunc litterarum commercium habebam, in Gallia Paschale aliquisque, in Anglia Wallisio impertii, qui non multo post sua quoque super his, una cum aliis multis subtilibus inventis in lucem edidit, fecitque ut nostris demonstrationibus perficiendis supersederem. Quoniam vero non inelegantes vise sunt constructiones nostræ, neque adhuc publice extant, placet hoc loco illas adscribere.

*Conoidis parabolici superficie curva circulum aequalem invenire.*

**S**it datum conoides cuius sectio per axem parabola A B C; axis eius B D, vertex B, diameter basis A C, qui sit axi B D ad an-



gulos rectos. Et oporteat superficie portionis curvæ invenire circulum aequalem.


K

Producto axe à parte verticis, sumatur  $B E$  æqualis  $B D$ , & jungatur  $E A$ , quæ parabolam  $A B C$  in  $A$  continget. Porro secetur  $A D$  in  $G$ , ut sit  $A G$  ad  $G D$  sicut  $E A$  ad  $A D$ . Et utrisque simul  $A E$ ,  $D G$  æqualis statuatur recta  $H$ . Item trienti basis  $A C$  æqualis sit recta  $L$ , & inter  $H$  &  $L$  media proportionalis inveniatur  $K$ . qua tanquam radio circulus describatur. Is æqualis erit superficie curvæ conoidis  $A B C$ . Hinc sequitur, si fuerit  $A E$  dupla  $A D$ , superficiem conoidis curvam ad circulum baseos fore ut 14 ad 9. Si  $A E$  tripla  $A D$ , ut 13 ad 6. si  $A E$  quadrupla  $A D$ , ut 14 ad 5. Atque ita semper fore ut numerus ad numerum, si  $A E$  ad  $A D$  ejusmodi rationem habuerit.

*Sphæroidis oblongi superficie circulum aequalem invenire.*

**E**sto sphæroides oblongum cujus axis  $A B$ , centrum  $C$ , sectio per axem ellipsis  $A D B E$ , cujus minor diameter  $D E$ .

Ponatur  $D F$  æqualis  $C B$ , seu ponatur  $F$  alter focorum ellipsoes  $A D B E$ , rectæque  $F D$  parallela ducatur  $B G$ , occurrens productæ




$E D$  in  $G$ . centroque  $G$ , radio  $G B$ , describatur super axe  $A B$  arcus circumferentiaæ  $B H A$ . Interque semidiametrum  $C D$  & rectam utrisque æqualem, arcui  $A H B$  & diametro  $D E$ , media proportionalis sit recta  $K$ . Erit hæc radius circuli qui superficie sphæroidis  $A D B E$  æqualis sit.

*Sphæroidis lati sive compressi superficiei circulum aequalem invenire.*

DE LINEARUM  
CURVARUM  
EVOLUTIONE.

**S**it sphæroides latum cuius axis A B, centrum c, sectio per axem ellipsis A D B E.

Sit rursus focorum alteruter F, divisâque bifariam F C in G, intelligatur parabola A G B quæ basin habeat axem A B, verticem



vero punctum G. Sitque inter diametrum D E, & rectam curvæ parabolicæ A G B aequalem, media proportionalis linea H. Erit hæc radius circuli qui superficiei sphæroidis propositi aequalis sit.

*Conoidis hyperbolici superficiei curva circulum aequalem invenire.*


**E**sto conoides hyperbolicum cuius axis A B, sectio per axem hyperbola C A D, cuius latus transversum E A, centrum F, latus rectum A G.

Sumatur in axe recta A H, aequalis dimidio lateri recto A G. & ut H F ad A F longitudine ita, sit A F ad F K potentia. Et intelligatur vertice K alia hyperbola descripta K L M, eodem axe & centro F cum priore, quæque latera rectum & transversum illi reciproce proportionalia habeat. Occurrat autem ipsi producta B C in M, sitque A L parallela B C. Erit jam sicut spatium A L M B, tribus rectis lineis & curva hyperbolica comprehensum, ad dimidium quadratum ex B C, ita superficies conoidis curva ad circulum baseos suæ, cuius diameter C D. Vnde constructio reliqua facile absolvetur, positâ hyperbolæ quadraturâ.

Quum igitur conoidis parabolici superficies ad circulum redigatur, aequa ac superficies sphærae, ex notis geometriæ regulis; in superficie sphæroidis oblongi, ut idem fiat, ponendum est arcus

circumferentia longitudinem æquari posse linea rectæ. Ad sphæroidis vero lati , itemque ad conoidis hyperbolici superficiem eadem ratione complanandam, hyperbolæ quadratura requiritur. Nam parabolicæ linea longitudo , quam in sphæroide hoc adhibuimus , pendet à quadratura hyperbolæ , ut mox ostendemus.

Verum, quod non indignum animadversione videtur, invenimus absque ulla hyperbolicæ quadraturæ suppositione, circulum æqualem construi superficie utrius simul, sphæroidis lati & conoidis hyperbolici.



Dato enim sphæroide quovis lato, posse inveniri conoides hyperbolicum, vel contra, dato conoide hyperbolico, posse inveniri sphæroides latum ejusmodi, ut utriusque simul superficie exhibatur circulus æqualis. cuius exemplum in casu uno cæteris simpliciore sufficiet attulisse.


Sit sphæroides latum cuius axis s t, sectio per axem ellipsis s t i k; cuius ellipsis centrum o, axis major t k. ponatur autem ellipsis hæc ejusmodi, ut latus tranversum t k habeat ad latus rectum eam rationem, quam linea secundum extremam & medium rationem secta, ad partem sui majorem.

Sumatur b c potentia dupla ad s o , item b a potentia dupla  
ad o k . & sint hæ quatuor continue proportionales b c , b a , b f ,

## HOROLOG. OSCILLATOR.

77

**B**E, & ponatur  $E P$  æqualis  $E A$ . Intelligatur jam conoides hyperbolicum  $Q F N$ , cuius axis  $F P$ ; axi adjecta, sive latus transversum  $F B$ ; dimidium latus rectum æquale  $B C$ .



Hujus conoidis superficies curva, unà cum superficie sphæroidis  $s i$ , æquabitur circulo cuius datus erit radius  $M L$ , qui nempe possit quadratum  $T K$  cum duplo quadrato  $s i$ .

*Curva parabolica æqualem rectam lineam invenire.*


**S**it parabolæ portio  $A B C$ , cuius axis  $B K$ , basis  $A C$  axi ad angulos rectos; & oporteat curvæ  $A B C$  rectam æqualem invenire.

Accipiatur basi dimidiæ  $A K$  æqualis recta  $i E$ , quæ producatur ad  $H$ , ut sit  $i H$  æqualis  $A G$ , quæ parabolam in puncto basi  $A$  contingens, cum axe producto convenit in  $G$ . Sit jam portio hyperbolæ  $D E F$ , vertice  $E$ , centro  $i$  descriptæ, cuiusque diameter sit  $E H$ ; basis vero  $D H F$  ordinatim ad diametrum applicata. Latus rectum pro lubitu sumi potest. Quod si jam super basi  $D F$  intelligatur parallelogrammum constitutum  $D P Q F$ , quod portioni  $D E F$  æquale sit; ejus latus  $P Q$  ita secabit diametrum hyperbolæ in  $R$ , ut  $R i$  sit æqualis curvæ parabolæ  $A B$ , cuius dupla est  $A B C$ .

Apparet igitur hinc quomodo à quadratura hyperbolæ pendeat curvæ parabolæ mensura, & illa ab hac vicissim.


K iii

Quæcunque vero problemata ad alterum è duobus hisce reducuntur, quamlibet veræ proximam solutionem per numeros ac-



cipiunt, logarithmorum admirabili invento. Cum per hos hyperbolæ quadratura, ut olim invenimus, numeris quam proxime explicetur. Est autem regula hujusmodi.

Sit D A B portio hyperbolæ, cujus asymptoti c s, c v, ductis D E, B V parallelis asymptoto s c.



Accipiatur differentia logarithmorum qui convenient numeris, eandem inter se rationem habentibus quam rectæ D E, B V; ejusque differentiæ quæratur logarithmus. Cui addatur logarith-

mus hic (qui semper est idem) 0, 36221, 56887. Summa erit logarithmus numeri qui spatium D E V B A D designabit, tribus rectis & curva D A B comprehensi, in partibus qualium parallelogramum D C est 100000, 00000. Vnde porro facile quoque habebitur area portionis D A B.

Sit ex. gr. proportio D E ad B V ea quæ 36 ad 5.

Ab 1, 55630, 25008, logar<sup>o</sup>. 36.  
auferatur 0, 69897, 00043. logar<sup>us</sup>. 5.

Erit 0, 85733, 14965. differ. logar<sup>orum</sup>.

Et 9, 93314, 92856. logar<sup>us</sup>. differentiæ.

Cui addatur 0, 36221, 56887. logar<sup>us</sup>. semper addendus.

Fit 10, 29536, 49743. logar<sup>us</sup>. spatii D E V B A D.

Habebit hujus logarithmi numerus 11 characteres, quum characteristica sit 10. Quæratur itaque primo numerus proxime minor, conveniens invento logarithmo, qui numerus est 19740. Deinde ex differentia logarithmi ejusdem, & proxime eum in tabula sequentis, reliqui characteres elicantur 81026, scribendi post priores, ut fiat 197408, 10260, addito ad finem zero, ut efficiatur numerus characterum 11. Est ergo area spatii D E V B A D proxime partium 197408, 10260, qualium partium parallelogrammum D C est 100000, 00000.


### PROPOSITIO X.

**L**ineas curvas exhibere quarum evolutione ellipses & hyperbola describantur, rectasque invenire iisdem curvis aequalis.

Sit ellipsis vel hyperbole quælibet A B, cuius axis transversus A C; centrum figuræ D; latus rectum duplum ipsius A E. Et sumpto in sectione quovis puncto, ut B, applicetur ordinatim ad axem rectam B K, & ad dictum punctum B tangens ducatur quæ convenientat cum axe in F; sitque B G ipsi F B perpendicularis, axique occurrat in G; & producatur B G usque ad H, ut B H ad H G habeat rationem eam quæ componitur ex rationibus G F ad F K, & A D ad D E.

Dico curvam E H M, cuius puncta omnia inveniuntur eodem modo quo punctum H, esse eam cujus evolutione, unâ cum recta E A, describetur sectio A B. Ipsam autem B H tangere curvam in

DE LINEARUM CURVARUM EVOLUTIONE.  $H$ , & esse toti  $H$  &  $A$  æqualem. Quamobrem, si ab  $H$   $B$  auferatur  $E$   $A$ , reliqua recta portioni curvæ  $H$  &  $E$  æquabitur. Apparet autem, cum curvæ puncta quævis indifferenter, certaque ratione inveniantur, esse eam utrobique ex earum genere, quæ merè geometricæ censentur. Vnde & relatio horum omnium punctorum ad puncta axis  $A$   $C$ , æquatione aliqua exprimi poterit, quam æquationem ad sextam dimensionem ascendere invenio; minimumque habere ter-



minorum, si fuerit  $A$   $B$  hyperbola cujus latera transversum rectumque æqualia. Tunc enim ducta ex quovis curvæ puncto, ut  $H$ , ad axem  $C$   $A$   $N$  perpendiculari  $H$   $N$ ; vocatâque  $A$   $C$ ,  $a$ ;  $C$   $N$ ,  $x$ ; &  $N$   $H$ ,  $y$ ; erit semper cubus ab  $x$   $x$ - $y$   $y$ - $a$   $a$  æqualis  $27$   $xx$   $yy$   $aa$ . Sed hoc casu brevius quoque multo, quam prædicta constructione, curvæ  $E$   $H$   $M$  puncta reperi possunt, ut in sequentibus ostendetur.

Cæterum notandum est, in ellipsi singulos quadrantes singulareum linearum evolutione describi; sicut quadrans  $A$   $B$   $L$  evolutione lineæ  $A$   $E$   $H$   $M$ , quadrans  $C$   $L$  evolutione similis huic oppositæ  $C$   $O$   $M$ . Est enim hæc in sectione utraque diversitas, quod cum principium quidem curvæ  $E$   $H$   $M$ , tam in ellipsi quam in hyperbola, sit punctum  $E$ , sumpta  $A$   $E$  æquali lateris recti; in hyperbola in infinitum inde dicta linea extenditur, at in ellipsi finitur

in

in puncto axis minoris M, sumpta LM æquali lateris recti, secundum quod possunt ordinatim applicatae ad dictum minorem axem. Namque hos terminos esse hujus curvæ, facile apparebit ortum ejus consideranti, quodque in ellipsi est sicut A D ad D E, ita L M ad M D.


DÉ LINEARUM  
CURVARUM  
EVOLUTIONES.

Horum autem demonstrationi non immorabimur, sed ad ipsam methodum tradendam pergemus, qua & hæ curvæ ex sectionibus conicis, & aliæ innumeræ ex aliis quibuscunque datis inventiuntur.

## PROPOSITIO XI.

**D**Atâ linea curvâ, invenire aliam cuius evolutione illa describatur; & ostendere quod ex unaquaque curva geometrica, alia curva itidem geometrica existat, cui recta linea æqualis dari possit.

Sit curva quæpiam, vel pars ejus, in partem unam inflexa A B F, & recta K L, ad quam puncta omnia referantur; & oporteat invenire curvam aliam, ut D E, cuius evolutione ipsa A B F describatur.



Ponatur jam inventa; & quoniam tangentes omnes curvæ D E, necesse est occurrere lineæ A B F, ex evolutione descriptæ, ad angulos rectos; patet quoque vicissim eas quæ ipsi A B F ad rectos angulos insistunt, ut B D, F E, tacturas evolutam C D E.

L

Intelligantur autem puncta  $B$ ,  $F$ , inter se proxima; & si quidem à parte  $A$  evolutio incipere ponatur, ulteriusque inde distet  $F$  quam  $B$ , etiam contactus  $E$  ulterius quam  $D$  distabit ab  $A$ ; interfectio vero rectarum  $B D$ ,  $F E$ , quæ est  $G$ , cadet ultra punctum  $D$  in recta  $B D$ . Nam concurrere ipsas  $B D$ ,  $F E$  necesse est, cum curvæ  $B F$  ad partem cavam insistant rectis angulis.


Quanto autem punctum  $F$  ipsi  $B$  propinquius fuerit, tanto proplus quoque puncta  $D$ ,  $G$  &  $E$  convenire apparet; ideoque, si interstitium  $B F$  infinite parvum intelligatur, tria dicta puncta pro uno eodemque erunt habenda; ac præterea, ductâ rectâ  $B H$ , quæ curvam in  $B$  tangat, eadem quoque pro tangentे in  $F$  censemebitur. Sit  $B O$  parallela  $K L$ , & in hanc perpendiculares cadant  $B K$ ,  $F L$ : secetque  $F L$  rectam  $B O$  in  $P$ , & sint puncta notata  $M$ ,  $N$ , in quibus rectæ,  $B D$ ,  $F E$ , occurrant ipsi  $K L$ . Quia igitur ratio  $B G$  ad  $G M$  est eadem quæ  $B O$  ad  $M N$ , data hac dabitur & illa; & quia recta  $B M$  datur magnitudine ac positione, dabitur & punctum  $G$  in producta  $B M$ , sive  $D$  in curva  $C D E$ , quia  $G$  &  $D$  in unum convenire diximus. Datur autem ratio  $B O$  ad  $M N$ ; simpliciter quidem in Cycloide, ubi primùm omnium illam investigavimus, invenimusque duplam; in aliis vero curvis, quas hactenus examinavimus, perduarum datarum rationum compositionem. Nam quia ratio  $B O$  ad  $M N$  componitur ex rationibus  $B O$  ad  $B P$ , sive  $N H$  ad  $L H$ , & ex  $B P$  sive  $K L$  ad  $M N$ ; patet si rationes hæ utræque dentur, etiam ex iis compositam rationem  $B O$  ad  $M N$  datum iri. Illas vero dari in omnibus curvis geometricis, in sequentibus patebit; ac proinde iis semper curvas adsignari posse, quarum evolutione describantur, quæque ideo ad rectas lineas sint reducibles.

Ponatur primò parabola esse  $A B F$ , cuius vertex  $A$ , axis  $A Q$ . Cum igitur lineæ  $B M$ ,  $F N$ , sint parabolæ ad angulos rectos, ductæque sint ad axem  $A Q$  perpendiculares  $B K$ ,  $F L$ ; erunt, ex proprietate parabolæ, singulæ  $M K$ ,  $N L$  dimidio lateri recto æquales; & ablata communi  $L M$ , æquales inter se  $K L$ ,  $M N$ . Hinc, quum ratio  $B G$  ad  $G M$  componatur ex rationibus  $N H$  ad  $H L$ , &  $K L$  ad  $M N$ , uti dictum fuit, sitque earum posterior ratio æqualitatis; liquet rationem  $B G$  ad  $G M$  fore eandem quæ  $N H$  ad  $H L$ ; & dividendo,  $B M$  ad  $M G$ , eandem quæ  $N L$  ad  $L H$ , sive  $M K$  ad  $K H$ ; nam  $L H$ ,  $K H$  pro eadem habentur, propter propinquitatem punctorum  $B$ ,  $F$ . Data autem est ratio  $M K$  ad  $K H$ , dato puncto  $B$ ; quoniam tam  $M K$ , quam  $K H$  dantur magnitudine; nam  $M K$  æquatur dimidio lateri recto,  $K H$  vero duplæ  $K A$ . Dataque etiam est positione & magni-

## HOROLOG. OSCILLATOR.

83


tudine recta  $B M$ . Ergo &  $M G$  data erit, adeoque & punctum  $G$ ,  
 sive  $D$ , in curva  $R D B$ ; quod nempe invenitur productâ  $B M$  usque  
 in  $G$ , ut sit  $B M$  ad  $M G$  sicut lateris recti ad duplam  $K A$ .



Et sic quidem, adsumptis in parabola A B F aliis quotlibet punctis præter B, totidem quoque puncta linea R D E, simili ratione, invenientur; atque hoc ipso lineam R D E geometricam esse constat, unaque proprietas ejus innotescit, ex qua cæteræ deduci possunt. Ut si inquirere deinde velimus, quanam æquatione exprimatur relatio punctorum omnium curvæ C D E ad rectam A Q: ducta in hanc perpendiculari D Q, vocatoque latere recto parabolæ A B F, a; AK, b; A Q, x; QD, y. Quoniam ratio B M ad M D, hoc est, KM ad MQ, est ea quæ  $\frac{1}{2}a$  ad  $\frac{1}{2}b$ , estque ipsa KM  $\propto \frac{1}{2}a$ , erit & MQ æqualis  $\frac{1}{2}b$ . Est autem MA  $\propto \frac{1}{2}a + b$ . ergo A Q sive x æqualis  $\frac{3}{2}b + \frac{1}{2}a$ . Vnde  $b \propto \frac{1}{3}x - \frac{1}{6}a$ . Porro quoniam, sicut quadratum MK, hoc est,  $\frac{1}{4}aa$  ad quadratum KB, hoc est,  $ab$ , ita qu. M Q, hoc est,  $\frac{1}{4}bb$  ad qu. QD; erit qu. QD, sive yy  $\propto \frac{1}{16}a^2$ . Vbi, si in locum b substituatur  $\frac{1}{3}x - \frac{1}{6}a$ , quod illi æquale inventum est, fiet yy  $\propto 16$  cub.  $\frac{1}{3}x - \frac{1}{6}a$  divisus per a. Ac proinde  $\frac{7}{16}ayy \propto$  cubo ab  $x - \frac{1}{6}a$ . Accipiatur AR in axe parabolæ  $\propto \frac{1}{2}a$ ; eritque R Q  $\propto x - \frac{1}{6}a$ . Curvam igitur C D ejus naturæ esse liquet, ut semper cubus linea R Q æquetur parallelepipedo, cuius basis qu. QD, altitudo  $\frac{7}{16}a$ ; ac proinde ipsam paraboloidem esse, cuius evolutione describi parabolam A B supra ostendimus; cuius nimirum paraboloidis latus rectum æquetur  $\frac{7}{6}$  lateris recti parabolæ A B. tunc enim hujus latus rectum æquale fit  $\frac{16}{17}$  lateris recti paraboloidis, quemadmodum ibi fuit definitum.

L ij

Quomodo porro ratio  $OB$  ad  $BP$ , sive  $NH$  ad  $HL$ , non tantum cum  $ABF$  parabola est, sed etiam alia quælibet curva geometrica, semper inveniri possit manifestum est. Quoniam tantum recta  $FH$  ducenda est, quæ curvam in adsumpto punto  $F$  tangat, &  $FN$  ipsi  $FH$  perpendicularis: unde  $NH$  &  $HL$  datæ erunt, ac proinde ratio quoque earum data.



At non æque liquet quo pacto ratio  $KL$  ad  $MN$  innotescat, quam tamen semper quoque reperi posse sic ostendemus.

Sint rectæ  $KT, LV$ , perpendiculares super  $KL$ , sitque  $KT$  æqualis  $KM$ , &  $LV$  æqualis  $LN$ , & ducatur  $VX$  parallela  $LN$ , quæ occurrat ipsi  $KT$  in  $X$ . Quoniam ergo semper eadem est differentia duarum  $LK, NM$ , quæ duarum  $LN, KM$ , hoc est, quæ duarum  $LV, KT$ ; est autem differentiæ ipsarum  $LV, KT$  æqualis  $XT$ , &  $XV$  ipsi  $LK$ ; erit proinde  $NM$  æqualis duabus simul  $VX, XT$ , vel ei quo  $VX$  ipsam  $XT$  superat. Atque adeo, si data fuerit ratio  $VX$  ad  $XT$ , data quoque erit ratio  $VX$  ad utramque simul  $VX, XT$ , vel ad excessum  $VX$  supra  $XT$ , hoc est, data erit ratio  $VX$  sive  $LV$  ad  $NM$ .

Sciendum est autem, quoniam  $KT$  ipsi  $KM$ , &  $LV$  ipsi  $LN$ , æquales sumptæ sunt, locum punctorum  $T, V$ , fore lineam quandam vel rectam vel curvam datam, ut mox ostendetur. Et siquidem sit linea recta; ut contingit si  $ABF$  coni sectio fuerit, &  $KL$  axis ejus; constat rationem  $VX$  ad  $XT$  datam fore, data positione ipsius lineæ  $VT$ , quæ locus est punctorum  $V, T$ ; semperque ean-

dem tunc haberi dictam rationem, qualemque fuerit interval-  
lum  $K L$ .

DE LINEARUM  
CURVARUM  
EVOLUTIONE.

At si locus alia linea curva fuerit, diversa erit ratio  $v x$  ad  $x t$ , prout majus minusve fuerit intervallum  $K L$ . Inquirendum est autem quænam futura sit ista ratio, cum  $K L$  infinite parvum imaginamur, quoniam & puncta  $B, F$ , proxima invicem posuimus. Similiter itaque & puncta  $v, t$ , lineæ curvæ minimam particulam intercipere intelligendum est; unde recta  $v t$ , cum ea quæ in  $t$  curvam contingit, coincidet. Sit ergo tangens illa  $t y$ ; potest enim duci quoniam curva, ad quam sunt puncta  $t, v$ , geometrica est. Ratio igitur  $y K$  ad  $K t$  data erit, adeoque &  $v x$  ad  $x t$ . ex qua etiam rationem  $L K$  ad  $N M$  dari ostendimus.

Quænam vero sit linea ad quam sunt puncta  $t, v$ , invenitur ponendo certum punctum  $s$  in recta  $K L$ , & vocando  $s K, x; K t, y$ . Nam quia data est curva  $A B F$ , eique  $B M$  ad angulos rectos ducta, invenietur inde quantitas lineæ  $K M$ , per methodum tangentium à Cartesio traditam, quæ ipsi  $K t$ , sive  $y$  æquabitur, & ex ea æquatione, natura curvæ  $t v$  innotescet, ad quam deinde tangens ducenda est. Sed clariora omnia fient sequenti exemplo.


Sit  $A B F$  paraboloides illa, cui superius rectam æqualem invenimus; in qua nempe cubi perpendicularium in rectam  $s K$ , sint inter se sicut quadrata ex ipsa  $s K$  abscissarum. Et oporteat invenire curvam  $C D E$  cujus evolutione paraboloides  $s B F$  describatur.

Hic primum ratio  $B O$  ad  $B P$  facile invenitur, quia tangentem paraboloidis in punto  $B$  duci scimus, sumpta  $s H$  æquali  $\frac{1}{2} s K$ . Cui tangenti cum  $B M$  ad angulos rectos insistat, dantur jam lineæ  $M H, H K$ , ac proinde carum inter se ratio, quæ est eadem quæ  $O B$  ad  $B P$ .

Vt autem ratio  $B P$ , sive  $K L$  ad  $M N$  innotescat, ponantur ad  $K L$  perpendiculares rectæ  $K T, L V$ , æquales singulis  $K M, L N$ , sitque  $v x$  parallela  $L K$ . Iam quia ex duabus simul  $K L, L N$ , auferendo  $K M$ , relinquuntur  $M N$ ; hoc est, auferendo ex duabus  $x v, v L$ , sive  $x v, x K$ , ipsam  $K T$ ; hinc autem relinqui apparet  $v x$  &  $x t$ : erunt igitur hæduæ  $v x, x t$  ipsi  $M N$  æquales, ac proinde ratio  $K L$  ad  $M N$  eadem quæ  $v x$  ad duas simul  $v x, x t$ . Ut autem hæc ratio innotescat cum intervallum  $K L$  est minimum; oportet secundum prædicta inquirere quis sit locus, sive linea ad quam sunt puncta  $t, v$ . Quod ut fiat sit latus rectum paraboloidis  $A B F \propto a$ ;  $s K \propto x; K T \propto y$ .

Quia igitur proportionales sunt  $K H, K B, K M$ , estque  $H K \propto L iii$

<sup>1</sup> x:KB ex natura paraboloidis æqualis R. cub.  $aax \propto y$ : fiet K M, hoc  
est K T  $\propto$  <sup>1</sup> R. cub.  $aax \propto y$ , ac proinde <sup>1</sup>  $aax \propto y^3$ . Vnde patet  
locum punctorum T, v, esse paraboloidem illam, quam cubicam  
vocant geometræ. Cui proinde ad T tangens ducetur, sumptâ s y  
duplâ ipsius s K, junctâque y T. Et jam quidem ratio v x ad duas  
simul v x, x T, quam diximus eandem esse ac K L ad M N, erit ea quæ  
v K ad utramque simul y K, K T. Hæc autem ratio data est, ergo &  
ratio K L ad M N. Sed & rationem O B ad P B datam esse ostensum  
est. Ergo, cum ex duabus hisce componatur ratio B D ad D M, ut su-  
pra patuit, dabitur & hæc; & dividendo, ratio B M ad M D; adeo-  
que & punctum D in curva D E.




Ad constructionem autem brevissimam hoc pacto hic perveniemus. K T sive K M dicta fuit y. Itaque M H erit  $y + \frac{3}{2}x$ . Et M H ad H K, sive O B ad B P, ut  $y + \frac{3}{2}x$  ad  $\frac{3}{2}x$ . sive, sumptis omnium duplis, ut  $2y + 3x$  ad  $3x$ . Deinde quia Y K  $\propto 3x$ , erit Y K ad Y K  $+ KT$ , sive per praedicta, K L ad M N, ut  $3x$  ad  $3x + y$ . Atqui ex rationibus O B ad B P, & K L ad M N, componi diximus rationem B D ad D M. Ergo ratio B D ad D M erit composita ex rationibus  $2y + 3x$  ad  $3x$ , &  $3x$  ad  $3x + y$ ; ideoque erit ea quæ  $2y + 3x$  ad  $3x + y$ . & dividendo, ratio B M ad M D, eadem quæ  $y$  ad  $3x + y$ .

Sit  $s z$  perpendicularis ad  $s k$ , eique occurrat  $m b$  producta in  $z$ .

Quia ergo ratio  $B M$  ad  $M D$  inventa est ea quæ  $y$  ad  $y + 3x$ , hoc est  
quæ  $M K$  ad  $M K + 3Ks$ . Sicut autem  $M K$  ad  $M K + 3Ks$ , ita  $M B$  ad  
 $M B + 3Bz$ : erit proinde  $M B$  ad  $M D$  ut  $M B$  ad  $M B + 3Bz$ . Vnde  
liquet  $M D$  æqualem sumendam ipsi  $M B + 3Bz$ . Atque ita quo-  
libet puncta curvæ  $CDE$  invenire licebit. Cujus curvæ portio quæ-  
libet ut  $Ds$ , rectæ  $DB$ , quæ paraboloidi  $sAB$  ad angulos rectos  
occurrit, æqualis erit. Constat autem geometricam esse, & si veli-  
mus, possumus æquatione aliqua relationem exprimere puncto-  
rum omnium ipsius ad puncta axis  $sK$ .

Simili modo autem, si inquiramus in paraboloide illa sive para-  
bola cubica, in qua cubi ordinatim applicatarum ad axem, sunt in-  
ter se sicut portiones axis abscissæ, inveniemus curvam cujus evo-  
lutione describitur, quæque proinde rectæ lineæ æquari poterit,  
nihilo difficultiori constructione per puncta determinari. Nam si  
fuerit illa  $sAB$ ; axis  $sM$ ; (dicitur autem impropriæ axis in hac  
curva, cum forma ejus sit ejusmodi, ut ductâ  $sZ$ , quæ fecet  $sM$  ad  
angulos rectos, ea portiones similes curvæ habeat ad partes oppo-




sitas;) agatur per punctum quodlibet  $B$ , in paraboloide sumptum,  
recta  $B D$ , quæ curvam ad angulos rectos fecet, axique ejus occurrat  
in  $M$ , rectæ vero  $sZ$  in  $Z$ . Deinde sumatur  $F D$  æqualis dimidiæ  $B M$ ,  
unâ cum sesquialtera  $B Z$ . Eritque  $D$  unum è punctis curvæ quæ sitæ  
 $R D$  vel  $R I$ , cujus evolutione, juncta tamen recta quadam  $R A$ , de-  
scribetur paraboloides  $sAB$ . Sunt autem hic, quod notandum  
est, quodque in aliis etiam nonnullis harum paraboloidum contin-  
git, duæ evolutiones in partes contrarias, quarum utraque à puncto  
certo  $A$  initium capit; ita ut evolutione ipsius  $A R D$ , in infinitum  
porro continuata, describatur paraboloidis pars infinita  $A B F$ ; evo-  
lutione autem totius  $F H K$ , similiter in infinitum extensæ, tantum  
particula  $A s$ . Punctum autem  $A$  definitur, sumptâ  $sP$  quæ sit ad

latus rectum paraboloidis, sicut unitas ad radicem quadrato-quadraticam numeri 91125, (is cubus est ex 45) applicataque ordinatim p A. Vnde porro punctum R, confinium duarum curvarum R D, R I, invenitur sicut cætera omnia harum curvarum, hoc est, sicut punctum D modo inventum fuit.

Denique, quæcunque fuerit ex paraboloidum genere curva s A B, semper æque facile curvam aliam, cuius evolutione ipsa describatur, quæque propterea rectæ adæquari possit, per puncta inveniri comperimus. Atque adeo constructionem universalem sequenti tabella exhibemus, quæ quoisque libuerit extendi poterit.

$$\text{Si } \begin{cases} ax \propto y^2 \\ a^2x \propto y^3 \\ ax^2 \propto y^3 \\ ax^3 \propto y^4 \\ a^3x \propto y^4 \end{cases} \text{ Erit } \begin{cases} BM + 2BZ \\ \frac{1}{2}BM + \frac{1}{2}BZ \\ 2BM + 3BZ \\ 3BM + 4BZ \\ \frac{1}{3}BM + \frac{1}{3}BZ \end{cases} \propto BD.$$

Sit s B parabola, vel paraboloidum aliqua, cuius vertex s; recta s K vel axis, vel axi perpendicularis, ad quam referuntur æquatione puncta paraboloidis; & ipsa quidem s K semper ad partem cavam ducta intelligitur; cui perpendicularis s z. Ponendo jam s K  $\propto x$ ;




$BK \propto y$ , quæ à punto quovis curvæ perpendicularis est ipsi s K; & latere recto curvæ  $\propto a$ ; prior pars tabellæ, quæ ad sinistram est, naturam singularum paraboloidum singulis æquationibus explicat. Quibus respondent in parte dextra quantitates lineæ B D, quæ si curvæ s A B insistat ad angulos rectos, exhibitura sit punctum D in

in curva quæ sita c d. Exempli gratia, si s b est parabola quæ ex coni sectione fit, ei scimus convenire æquationem tabellæ primam,  $a x \propto y^2$ ; cui respondet ab altera parte  $b m + 2 b z \propto b d$ . Vnde longitudo lineæ b d cognoscitur, adeoque inventio quotlibet punctorum curvæ c d. Quam quidem, hoc casu, paraboloidem esse supra demonstratum fuit, eam nempe, cujus æquatio tertia est hujus tabellæ.

Construitur autem tabella hoc pacto, ut b m sumatur multiplex secundum numerum qui est exponens potestatis  $x$  in æquatione; b z vero, multiplex secundum exponentem potestatis  $y$ ; ex his autem utrisque compositæ accipiatur pars denominata ab exponente potestatis  $a$ .

Præter hasce autem paraboloides lineas, alias item invenimus, à quibus, non absimili constructione, deducuntur curvæ rectis comparabiles. Assimilantur autem hyperbolis, eo quod asymptotos suas habent, sed tantum angulum rectum constituentes. Et harum primam quidem statuimus hyperbolam ipsam, quæ est è coni sectione.



Reliquarum vero naturam ut explicemus; sunto p s, s k, asymptoti curvæ a b, rectum angulum comprehendentes, & à curvæ puncto quolibet b ducatur b k parallelâ p s, sitque s k  $\propto x$ ; k b  $\propto y$ . Si igitur hyperbola sit a b, scimus rectangulum linearum s k, k b, hoc est, rectangulum x y semper eidem quadrato æquale esse, quod vocetur a a.

Proxima vero hyperboloidum erit, in qua solidum ex quadrato

lineæ s K, in altitudinem K B ductum, hoc est, solidum  $x^2 y$ , cubo certo æquabitur, qui vocetur  $a^3$ . Atque ita innumeræ aliæ hujus generis hyperboloides existunt, quarum proprietatem sequens tabella singulis æquationibus exhibit, simulque rationem construendi curvam D C, cuius evolutione quæque generetur.

$$\text{Si } \begin{cases} x^2 y \propto a^3 \\ x^3 y \propto a^3 \\ x^2 y^2 \propto a^3 \\ x^3 y^2 \propto a^3 \\ x^2 y^3 \propto a^3 \end{cases} \text{ Erit } \begin{cases} \frac{1}{2} B M + \frac{1}{2} B Z \\ \frac{1}{3} B M + \frac{1}{3} B Z \\ \frac{1}{2} B M + \frac{1}{2} B Z \\ \frac{1}{4} B M + \frac{1}{4} B Z \\ \frac{1}{2} B M + \frac{1}{2} B Z \end{cases} \propto B D.$$

Recta D B M Z curvam A B, ut antea quoque, secat ad angulos rectos, occurritque asymptotis s K, s P, in M & Z. Si igitur exempli gratia hyperbola fuerit A B, cuius æquatio est  $x^2 y \propto a^3$ , sumetur  $B D \propto \frac{1}{2} B M + \frac{1}{2} B Z$ , quemadmodum tabella præcipit. Eritque punctum D in curva D C quæsita, cuius alia quotlibet puncta sic inveniri poterunt, & portio ejus quælibet rectæ lineæ adæquari. Et hæc quidem eadem illa est curva, cuius relationem ad axem hyperbolæ superius æquatione expressimus. Constructio autem tabellæ hujus plane eadem est quæ superioris.

Cæterum, quoniam tum ad harum curvarum, tum ad earum quæ ex paraboloidibus nascuntur constructionem, ducendæ sunt lineæ D B Z, quæ ad datum punctum B secant curvas A B, sive ipsarum tangentes B H, ad angulos rectos; dicemus in universum quomodo hæ tangentes inveniantur. In æquatione itaque, quæ cujusque curvæ naturam explicat, quales æquationes duabus tabellis præcedentibus exponuntur, considerare oportet quæ sint exponentes potestatum  $x$  &  $y$ , & facere ut, sicut exponens potestatis  $x$  ad exponentem potestatis  $y$ , ita sit s K ad K H. Iuncta enim H B curvam in B continget. Velut in tertia hyperboloide, cuius æquatio est  $x^2 y^2 \propto a^3$ : quia exponens potestatis  $x$  est 1, potestatis autem  $y$  exponens 2; oportet esse ut 1 ad 2 ita s K ad K H. Horum autem demonstrationem neverunt analyticæ artis periti, qui jam pridem omnes has lineas contemplari cœperunt; & non solum paraboloidum istarum, sed & spæriorum quorundam infinitorum, inter hyperboloides & asymptotos interjectorum, plana solidaque dimensi sunt. Quod quidem & nos, facili atque universaliter methodo, expedire possemus, ex sola tangentium proprietate sumpta demonstratione. Sed illa non sunt hujus loci.



## HOROLOGII OSCILLATORII

### P A R S Q U A R T A.

#### *De centro Oscillationis.*

**C**Entrorum Oscillationis, seu Agitationis, investigationem olim mihi, fere adhuc puerο, aliisque multis, doctissimus Mersennus proposuit, celebre admodum inter illius temporis Geometras problema, prout ex litteris ejus ad me datis colligo, nec non ex Cartesii haud pridem editis, quibus ad Mersennianas super his rebus responsum continetur. Postulabat autem centra illa ut invenirem in circuli sectoribus, tam ab angulo quam à medio arcu suspensis, atque in latus agitatis, item in circuli segmentis, & in triangulis, nunc ex vertice, nunc ex media basi pendentibus. Quod eoredit, ut pendulum simplex, hoc est, pondus filo appensum reperiatur ea longitudine, ut oscillationes faciat temporum eorundem ac figuræ istæ, uti dictum est, suspensæ. Simul vero pretium operæ, si forte quæsitis satisficerem, magnum sanc & invi- diosum pollicebatur. Sed à nemine id quod desiderabat tunc obtinuit. Nam me quod attinet, cum nihil reperirem quo vel primus aditus ad contemplationem eam patesceret; velut à limine repulsus, longiori investigatione tunc quidem abstinui. Qui vero rem sese confecisse sperabant viri insignes, Cartesius, Honoratus Fabrius, aliique, nequaquam scopum attigerunt, nisi in paucis quibusdam facilitioribus, sed quorum tamen demonstrationem nullam idoneam, ut mihi videtur, attulerunt. Idque comparatio- ne eorum quæ hic trademus manifestum fore spero, si quis forte quæ ab illis tradita sunt, cum nostris hisce contulerit; quæ qui- dem & certioribus principiis demonstrata arbitror, & experimen- tis prorsus convenientia reperi. Occasio vero ad hæc denuo ten- tanda, ex pendulorum automati nostri temperandorum ratione oblata est, dum pondus mobile, præter id quod in imo est, illis applico, ut in descriptione horologii fuit explicatum. Hinc me- lioribus auspiciis atque à prima origine rem exorsus, tandem dif- ficultates omnes superavi, nec tantum problematum Mersennia- norum solutionem, sed alia quoque illis difficiliora reperi, &

viam denique, qua in lineis, superficiebus, solidisque corporibus certa ratione centrum illud investigare liceret. Vnde quidem, præter voluptatem inveniendi quæ multum ab aliis quæsita fuerant, cognoscendique in his rebus naturæ leges decretaque, utilitatem quoque eam cepi, cuius gratia primo animum ad hæc applicueram, reperta illa horologii temperandi ratione facili & expedita. Accessit autem hoc quoque, quod pluris faciendum arbitror, ut certæ, sæculisque omnibus duraturæ, mensuræ definitionem absolutissimam per hæc tradere possem; qualis est ea quæ ad finem horum adjecta reperietur.

## DEFINITIONES.

### I.

**P**endulum dicatur figura quælibet gravitate prædita, sive linea fuerit, sive superficies, sive solidum, ita suspensa ut circa punctum aliquod, vel axem potius, qui plano horizontis parallelus intelligitur, motum reciprocum vi gravitatis sua continuare possit.

### II.

*Axis ille horizontis plano parallelus, circa quem penduli motus fieri intelligitur, dicatur axis Oscillationis.*

### III.

*Pendulum simplex dicatur quod filo vel linea inflexili, gravitatis expertise, constare intelligitur, ima sui parte pondus affixum gerente; eius ponderis gravitas, velut in unum punctum collecta, censenda est.*

### IV.

*Pendulum verò compositum, quod pluribus ponderibus constat, immutabiles distantias servantibus, tum inter se, tum ab axe Oscillationis. Hinc figura quælibet suspensa, ac gravitate prædita, pendulum compositum dici potest, quatenus cogitatu in partes quotlibet est divisibilis.*

### V.

*Pendula isochrona vocentur, quorum Oscillationes, per arces similes, aequalibus temporibus peraguntur.*

## VI.

*Platum Oscillationis dicatur illud, quod per centrum gravitatis figura suspensa duci intelligitur, ad axem oscillationis rectum.*

DECENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.

## VII.

*Linea centri, recta qua per centrum gravitatis figura ducitur, ad axem oscillationis perpendicularis.*

## VIII.

*Linea perpendiculari, recta in plano oscillationis, ducta ab axe oscillationis, ad horizontis planum perpendicularis.*

## IX.

*Centrum oscillationis vel agitationis figura cujuslibet, dicatur punctum in linea centri, tantum ab axe oscillationis distans, quanta est longitudi penduli simplicis quod figurae isochronum sit.*

## X.

*Axis gravitatis, linea quævis recta, per centrum gravitatis figura transiens.*

## XI.

*Figura plana, vel linea in plano sita, in planum agitari dicatur, cum axis oscillationis in eodem cum figura lineare est plano.*

## XII.

*Eadem vero in latus agitari dicantur, cum axis oscillationis ad figuræ lineare planum rectus est.*

## XIII.

*Quando pondera in rectas lineas duci dicentur, id ita est intelligendum, ac si numeri lineare, quantitates ponderum rationemque inter se mutuam exprimentes, ita ducantur.*

## HYPOTHESES.

## I.

**S**i pondera quotlibet, vi gravitatis sua, moveri incipient; non posse centrum gravitatis ex ipsis composita altius, quam ubi incipiente motu reperiebatur, ascendere.

M iii

94 CHRISTIANI HUGENII

Altitudo autem in his secundum distantiam à piano horizontali consideratur, graviaque ponuntur ad hoc planum, secundum rectas ipsi perpendiculares, descendere conari. Quod idem ab omnibus, qui de centro gravitatis egerunt, vel ponitur expresse, vel à legentibus supplendum est, cum absque eo centri gravitatis consideratio locum non habeat.

Ipsa vero hypothesis nostra quominus scrupulum moveat, nihil aliud sibi velle eam ostendemus, quam quod nemo unquam negavit, gravia nempe sursum non ferri. Nam primo, si unum quodpiam corpus grave proponamus, illud vi gravitatis suæ altius ascendere non posse extra dubium est. Ascendere autem tunc inteligitur scilicet, cum ejus centrum gravitatis ascendit. Sed & idem de quotlibet ponderibus, inter se per lineas inflexiles conjunctis, concedi necesse est, quoniam nihil vetat ipsa tanquam unum aliquod considerari. Itaque neque horum commune gravitatis centrum ultro ascendere poterit.


Quod si jam pondera quotlibet non inter se connexa ponantur, illorum quoque aliquod commune centrum gravitatis esse scimus. Cujus quidem centri quanta erit altitudo, tantam ajo & gravitatis ex omnibus compositæ altitudinem censi debere; siquidem omnia ad eandem illam centri gravitatis altitudinem deducuntur, nullâ aliâ accessitâ potentia quam quæ ipsis ponderibus inest, sed tantum lineis infelixibus ea pro lubitu conjungendo, ac circa gravitatis centrum movendo; ad quod nulla vi neque potentia determinata opus est. Quare, sicut fieri non potest ut pondera quædam, in piano eodem horizontali posita, supra illud planum, vi gravitatis suæ, omnia æ qualiter attollantur; ita nec quorumlibet ponderum, quomodounque dispositorum, centrum gravitatis ad majorem quam habet altitudinem pervenire poterit. Quod autem diximus pondera quælibet, nulla adhibita vi, ad planum horizontale, per centrum commune gravitatis eorum transiens, perduci posse, sic ostendetur.

Sint pondera A, B, C, positione data, quorum commune gravitatis centrum sit D. per quod planum horizontale ductum ponatur, cuius sectio recta E F. Sint jam lineæ inflexiles D A, D B, D C, quæ pondera sibi invariabiliter connectant; quæ porro moveantur, donec A sit in piano E F ad E. Virgis vero omnibus per æquales angulos delatis, erunt jam B in G, & C in H.

Rursus jam B & C connecti intelligantur virgâ H G, quæ secet planum E F in F; ubi necessario quoque erit centrum gravitatis bino-

rum istorum ponderum connexorum, cum trium, in E, B, H, ponderum, centrum gravitatis sit D, & ejus quod est in E, centrum gravitatis sit quoque in plano EDF. Moventur igitur rursus pondera H, G, super puncto F, velut axe, absque vi ulla, ac simul utraque ad planum EDF adducuntur, adeo ut jam tria, quæ prius erant in A, B, C, ad ipsam sui centri gravitatis D altitudinem, suo ipsorum æquilibrio, translata appareat. quod erat ostendendum. Eademque de quocunque aliis est demonstratio.

DE CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.



Hæc autem hypothesis nostra ad liquida etiam corpora valet, ac per eam non solum omnia illa, quæ de innatantibus habet Archimedes, demonstrari possunt, sed & alia pleraque Mechanicæ theorematæ. Et sanè, si hac eadem uti scirent novorum operum machinatores, qui motum perpetuum irrito conatu moluntur, facile suos ipsi errores deprehenderent, intelligerentque rem eam mechanica ratione haud quaquam possibilem esse.

### I I.

*Remoto aëris, alioque omni impedimento manifesto, quemadmodum in sequentibus demonstrationibus id intelligi voluimus, centrum gravitatis penduli agitati, æquales arcus descendendo ac ascendendo percurrere.*


De pendulo simplici hoc demonstratum est propositione 9 de Descensu gravium. Idem vero & de composito tenendum esse declarat experientia; si quidem, quæcunque fuerit penduli figura,

æque apta continuando motui reperitur, nisi in quantum plus minusve aëris objectu impeditur.

## PROPOSITIO I.

**P**onderibus quotlibet ad eandem partem plani existentibus, si à singulorum centris gravitatis agantur in planum illud perpendiculares; ha singula in sua pondera ducta, tantundem simul efficient, ac perpendicularis, à centro gravitatis ponderum omnium in planum idem cadens, ducta in pondera omnia.

Sint pondera A, B, C, sita ad eandem partem plani, cuius sectio recta D F, inque ipsum à singulis ponderibus ducantur perpendicularares A D, B E, C F. Sit autem G punctum centrum gravitatis ponderum omnium A, B, C, à quo ducatur perpendicularis in idem planum G H. Dico summam productorum, quæ fiunt à singulis ponderibus in suas perpendicularares, æquari producto ab recta G H in omnia pondera A, B, C.



Intelligentur enim perpendicularares, à singulis ponderibus educatae, continuari in lateram partem plani D F, sintque singulæ D K, E L, F M, ipsi H G æquales; omnesque lineæ, inflexiles virgas referant, ad horizontem parallelas; & ponantur in K, L, M, gravitates ejusmodi, quæ singulæ cum sibi oppositis A, B, C, æquilibrium faciant ad intersectionem plani D E F. Omnes igitur K, L, M, æquiponderabunt omnibus A, B, C. Erit autem, sicut longitudine A D ad D K, ita pondus K ad pondus A, ac proinde D A ducta in magnitudinem A, æquabitur D K, sive G H, ductæ in K. Simili-

ter

ter EB in B æquabitur EL, sive GH, in L; & FC in C æquabitur FM,  
 sive GH, in M. Ergo summa productorum ex AD in A, BE in B,  
 CF in F, æquabitur summæ productorum ex GH in omnes K, L, M.  
 Quum autem K, L, M, æquiponderent ipsis A, B, C, etiam iisdem  
 A, B, C, ex centro ipsorum gravitatis G suspensis, æquipondera-  
 bunt. Vnde, cum distantia GH æqualis sit singulis DK, EL, FM,  
 necesse est magnitudines A, B, C, simul sumptas, æquari ipsis K, L,  
 M. Itaque & summa productorum ex GH in omnes A, B, C, æqua-  
 bitur productis ex DA in A, EB in B, & FC in C. quod erat demon-  
 strandum.

DE CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.

Etsi vero in demonstratione positæ fuerint rectæ AD, GH,  
 CF, horizonti parallelæ, & planum ad horizontem erectum; pa-  
 tet, si omnia simul in alium quemlibet situm transponantur, ean-  
 dem manere productorum æqualitatem, cum rectæ omnes sint  
 eadem quæ prius. Quare constat propositum.

### PROPOSITIO II.

**P**ositis quæ prius, si pondera omnia A, B, C, sint æqualia;  
 dico summam omnium perpendicularium AD, BE, CF,  
 aquari perpendiculari, à centro gravitatis ductæ, GH, multi-  
 pli secundum ponderum numerum.


Quum enim summa productorum, à ponderibus singulis in suas  
 perpendicularares, æquetur producto ex GH in pondera omnia; si-  
 que hic, propter ponderum æqualitatem, summa illa produc-  
 torum æqualis producto ex uno pondere in summam omnium per-  
 perpendicularium; itemque productum ex GH in pondera omnia,  
 idem quod productum ex pondere uno in GH, multiplicem secun-  
 dum ponderum numerum: patet summam perpendicularium ne-  
 cessario jam æquari ipsis GH, multiplici secundum ponderum nu-  
 merum. quod erat demonstrandum.

### PROPOSITIO III.

**S**i magnitudines quædam descendant omnes, vel ascen-  
 dant, licet in aequalibus intervallis; altitudines descen-  
 sus vel ascensus cuiusque, in ipsam magnitudinem ducta, ef-  
 ficient summam productorum aqualem ei, qua sit ex altitudi-  
 ne descensus vel ascensus centri gravitatis omnium magni-  
 tudinum, ducta in omnes magnitudines.

De centro  
oscilla-  
tionis.

Sunto magnitudines A, B, C, quæ ex A, B, C, descendant in D, E, F; vel ex D, E, F, ascendant in A, B, C. Sitque earum centrum gravitatis omnium, dum sunt in A, B, C, eadem altitudine cum puncto G; cum vero sunt in D, E, F, eadem altitudine cum puncto H. Dico summam productorum ex altitudine A D in A, B E in B, C F in C, æquari producto ex G H in omnes A, B, C.



Intelligatur enim planum horizontale cuius sectio recta M P, atque in ipsum incident productæ A D, B E, C F & G H, in M, N, O, P.

Quia igitur summa productorum ex A M in A, B N in B, C O in \* Prop. 1. huj. C, æqualis est facto ex G P in omnes A, B, C \*. Similiterque summa productorum ex D M in A, E N in B, F O in C, æqualis facto ex H P in omnes A, B, C; sequitur & excessum priorum productorum supra posteriora, æquari facto ex G H in omnes magnitudines A, B, C. Dictum vero excessum æquari manifestum est productis ex A D in A, B E in B, C F in C. Ergo hæc simul etiam æqualia erunt producto ex G H in omnes A, B, C. quod erat demonstrandum.

#### PROPOSITIO IV.



**S**i pendulum è pluribus ponderibus compositum, atque è quiete dimissum, partem quamcunque oscillationis integræ confecerit, atque inde porro intelligantur pondera ejus singula, relicto communi vinculo, celeritates acquisitas sursum convertere, ac quousque possunt ascendere; hoc facto, centrum gravitatis ex omnibus composite, ad eandem altitudinem reversum erit, quam ante inceptam oscillationem obtinebat.

## HOROLOG. OSCILLATOR.

99

Sit pendulum compositum ex ponderibus quotlibet A, B, C, virgæ, vel superficie pondere carenti, inhærentibus. Sitque suspensum ab axe per D punctum ducto, qui ad planum, quod hic conspicitur, perpendicularis intelligatur. In quo eodem plano etiam centrum gravitatis E, ponderum A, B, C, positum sit; lineaque centri D E, inclinetur ad lineam perpendiculari D F, angulo E D F: attracto, nimirum, eo usque pendulo. Hinc vero dimitti jam ponatur, ac partem quamlibet oscillationis conficere, ita ut pondera A, B, C, perveniant in G, H, K. Vnde, relictæ deinceps communi vinculo, singula intelligantur acquisitas celeritates sursum convertere, (quod impingendo in plana quædam inclinata, velut Q Q, fieri poterit,) & quo usque possunt ascendere, nempe in L, M, N. Quo ubi pervenerint, sit centrum gravitatis omnium punctum P. Dico hoc pari altitudine esse cum puncto E.

DE CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.



Nam primum quidem, constat P non altius esse quam E, ex prima sumptarum hypothesum. Sed nec humilius fore sic ostendimus. Sit enim, si potest, P humilius quam E, & intelligantur pondera ex iisdem, ad quas ascenderunt, altitudinibus recidere, quæ sunt L, M, N. Vnde quidem easdem celeritates ipsis acquiri constat, quas habebant ad ascendendum ad istas altitudines\*, hoc est, eas ipsis quas acquisierant motu penduli ex C B A D in K H G D. Quare, si cum dictis celeritatibus ad virgam superficiem, cui innixa fuere, nunc referantur, eique simul adhærescant, motumque secundum inceptos arcus continent; quod fiet, si prius quam virgam attingant, à planis inclinatis Q Q répercussa intelli-

\* Propos. 4.  
part. 2.

N ij

De centro  
oscillationis.


gantur; absolvet, hoc modo restitutum pendulum, oscillationis partem reliquam, & quæ ac si absque ulla interruptione motum continuasset. Ita ut centrum gravitatis penduli, E, arcus æquales E F, F R, descendendo ac ascendendo percurrat, ac proinde in R eadem ac in E altitudine reperiatur. Ponebatur autem E esse altius quam p centrum gravitatis ponderum in L, M, N, positorum. Ergo & R altius erit quam p: adeoque ponderum ex L, M, N, delapsorum centrum gravitatis, altius, quam unde descenderat, ascendisset. quod est absurdum \*. Non igitur centrum gravitatis p humilius est quam E. Sed nec altius erat. Ergo æque altum sit necesse est, quod erat demonstrandum.

\* Hypoth. I.  
huj.

### PROPOSITIO V.

**D**ato pendulo ex ponderibus quotlibet composito, si singula ducantur in quadrata distantiarum suarum ab axe oscillationis, & summa productorum dividatur per id quod fit ducendo ponderum summam, in distantiam centrigravitatis communis omnium ab eodem axe oscillationis; orietur longitudo penduli simplicis composito isochroni, sive distantia inter axem & centrum oscillationis ipsius penduli compositi.

Sint pondera pendulum componentia, (quorum nec figura nec magnitudo, sed gravitas tantum consideretur), A, B, C, suspensa



ab axe, qui per punctum D, ad planum quod conspicitur, rectus intelligitur. In quo plano sit quoque eorum centrum commune gravitatis E; nam pondera in diversis esse nihil refert. Distantia puncti E ab axe, nempe recta E D, vocetur d. Item ponderis A distantia A D, sit e; B D, f; C D, g. Ducendo itaque singula pondera in qua-

drata suarum distantiarum, erit productorum summa  $aee + bff + cgg$ . Et rursus, ducendo summam ponderum in distantiam centri gravitatis omnium, productum æquale erit  $ad + bd + cd^*$ . Vnde, productum prius per hoc dividendo, habebitur  $\frac{aee + bff + cgg}{ad + bd + cd}$ . Cui longitudini si æqualis statuatur longitudo penduli simplicis FG, quæ etiam x vocabitur; dico hoc illi composito isochronum esse.

Ponantur enim tum pendulum FG, tum linea centri DE, æqualibus angulis à linea perpendiculari remota, illud ab FH, hæc ab DK, atque inde dimissa librari, & in recta DE sumatur DL æqualis FG. Itaque pondus G penduli FG, integra oscillatione arcum GM percurret, quem linea perpendiculari FH medium secabit, punctum vero L arcum illi similem & æqualem LN, quem medium dividet DK. Itemque centrum gravitatis E, percurret similem arcum EI. Quod si in arcibus GM, LN, sumptis punctis quibuslibet, similiter ipsos dividentibus, ut O & P, eadem celeritas esse ostendatur ponderis G in O, & puncti L in P; constabit inde æqualibus temporibus utrosque arcus percurri, ac proinde pendulum FG, pendulo composito ex A, B, C, isochronum esse. Ostendetur autem hoc modo.

Sit primo, si potest, major celeritas puncti L, ubi in P pervenit, quam ponderis G in O. Constat autem, dum punctum L percurrit arcum LP, simul centrum gravitatis E percurrere arcum similem EQ. Ducantur à punctis Q, P, O, perpendiculares sursum, quæ occurrant subtensis arcuum EI, LN, GM, in R, S, Y. & S P vocetur y. Vnde, cum sit ut  $L:D:x, ad E:D:d$ , ita  $S:P:y, ad R:Q$ ; erit  $R:Q \text{ æqualis } \frac{d}{x}$ . Iam quia pondus G eam celeritatem habet in O, qua valet ad eandem unde descendit altitudinem ascendere, nempe per arcum OM, vel perpendicularem OY ipsi PS æqualem; punctum igitur L, ubi in P pervenerit, majorem ibi celeritatem habebit, quam qua ascenditur ad altitudinem PS. Dum vero L transit in P, simul pondera A, B, C, similes arcus percurrunt ipsi LP, nimirum AT, BV, CX. Estque puncti L celeritas in P, ad celeritatem ponderis A in T, quum vinculo eodem contineantur, sicut distantia DL ad DA. Sed ut quadratum celeritatis puncti L, quam habet in P, ad quadratum celeritatis puncti A in T, ita est altitudo ad quam illa celeritate ascendi potest, ad altitudinem quo hac celeritate ascendi potest\*. Ergo etiam, ut quadratum distantiae DL, quod est  $xx$ , ad quadratum distantiae DA, quod est ee, ita est altitudo quo ascenditur celeritate puncti L, quum est in P, (quæ altitudo major dicta est quam PS sive y,) ad altitudinem quo ascenditur celeritate ponderis A in T; si nempe postquam in T pervenit, reliquo pendulo,

\* Prop. 3. & 4.  
part. 2.

seorsim motum suum sursum converteret. Quæ proinde altitudo major erit quam  $\frac{eey}{xx}$ .

Eadem ratione, erit altitudo ad quam ascenderet pondus  $B$ , celeritate acquisita per arcum  $B\ V$ , major quam  $\frac{ffy}{xx}$ . Et altitudo ad quam ascenderet pondus  $C$ , celeritate acquisita per arcum  $C\ X$ , major quam  $\frac{ggy}{xx}$ . Vnde, ductis singulis altitudinibus istis in sua pondera, erit summa productorum major quam  $\frac{aeey + bffy + cgg}{xx}$ . quæ proinde major quoque probatur quam  $\frac{ady + bdy + cdy}{x}$ . Nam quia posita est longitudo  $x$  æqualis  $\frac{aee + bff + cgg}{xd + bd + cd}$ ; erit  $a dx + b dx + c dx$  æquale  $aee + bff + cgg$ . Et ductis omnibus in  $y$ , & dividendo per  $xx$ , erit  $\frac{ady + bdy + cdy}{x}$  æquale  $\frac{aeey + bffy + cgg}{xx}$ . Vnde quod dictum est consequitur. Est autem summa ista productorum æqualis ei, quod fit ducendo altitudinem, ad quam ascendit centrum gravitatis commune ponderum  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , in summam ipsorum ponderum,  $a + b + c$ ; si nempe singula, uti dictum, seorsim quoque possunt moveantur. Quantitas vero  $\frac{ady + bdy + cdy}{x}$  producitur ex descensu centri gravitatis eorundem ponderum, (qui descensus est  $RQ$ , sive  $\frac{d}{x}$ , ut supra inventum fuit,) in eandem quoque pondere summam  $a + b + c$ . Ergo quum prius productum altero hoc majus ostensum fuerit, sequitur ascensum centri gravitatis ponderum  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , si, relicto pendulo ubi pervenere in  $T$ ,  $V$ ,  $X$ , singula celeritates acquisitas sursum convertant, majorem fore ejusdem centri gravitatis descensu, dum ex  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , moventur in  $T$ ,  $V$ ,  $X$ . quod est absurdum, cum dictus ascensus descensui æqualis esse debeat, per antecedentem.

Eodem modo, si dicatur celeritatem puncti  $L$ , ubi pervenerit in  $P$ , minorem esse celeritate ponderis  $G$  quum in  $O$  pervenerit; ostendemus ascensum possibilem centri gravitatis ponderum  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , minorem esse quam descensum, quod eidem propositioni antecedenti repugnat. Quare relinquitur ut eadem sit celeritas puncti  $L$ , ad  $P$  translati, quæ ponderis  $G$  in  $O$ . Vnde, ut superius dictum, sequitur pendulum simplex  $F$   $G$  composito ex  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , isochronum esse.

### PROPOSITIO VI.

**D**ato pendulo ex quocunque ponderibus equalibus composito; si summa quadratorum factorum à distantiis, quibus unumquodque pondus abest ab axe oscillationis, ap-

plicetur ad distantiam centri gravitatis communis ab eodem oscillationis axe, multiplicem secundum ipsorum ponderum numerum, orietur longitudi penduli simplicis composito isochroni.

DE CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.

Sint posita eadem quæ prius, sed pondera omnia inter se æqualia intelligantur, & singula dicantur  $a$ . Rursus vero nulla eorum magnitudo consideretur, sed pro minimis habeantur, quantum ad extensionem.

Itaque penduli simplicis isochroni longitudi, per propositionem antecedentem, erit  $\frac{aaa+aff+agg}{ad+ad+ad}$ . Vel, quia quantitas divisa ac dividens utraque per  $a$  dividitur, fiet nunc eadem longitudi,  $\frac{aa+ff+gg}{3d}$ . Quo significatur summa quadratorum à distantiis ponderum ab axe oscillationis, applicata ad distantiam centri gravitatis omnium ab eodem oscillationis axe, multiplicem secundum numerum ipsorum ponderum, qui hic est 3. facile enim perspicitur numerum hunc, in quem duicitur distantia  $d$ , respondere necessario ipsi ponderum numero. Quare constat propositum.

Quod si pondera æqualia in unam lineam rectam conjuncta sint, atque ex termino ejus superiore suspensa; constat distantiam centri gravitatis, ex omnibus compositæ, ab axe oscillationis, multiplicem secundum ponderum numerum, æquari summæ distantiarum omnium ponderum ab eodem oscillationis axe\*, ac proinde, hoc casu, habebitur quoque longitudi penduli simplicis, composito isochroni, si summa quadratorum à distantiis ponderum singularum ab axe oscillationis, dividatur per summam earundem omnium distantiarum.


\* Prop. 2. huj.

#### DEFINITIO XIV.

**S**i fuerint in eodem plano, figura quedam, & linea recta que ipsam extrinsecus tangat; & per ambitum figura alia recta, piano ejus perpendicularis, circumferatur, superficiemque quandam describat, qua deinde secatur piano per dictam tangentem ducto & ad dicta figura planum inclinato; solidum comprehensum à duobus planis istis, & parte superficiei descriptæ, inter utrumque planum intercepta, vocetur Cuneus super figura illa, tanquam basi, abscissus.

In schemate adjecto, est A B E C figura data; recta eam tangens

De centro M D; quæ vero per ambitum ejus circumfertur, E F; cuneus au-  
scilla-  
tionis.



tem figura solida planis A B E C, M F G, & parte superficiei, à recta E F descriptæ, comprehensa.

#### DEFINITIO XV.

**D**istantia inter rectam, per quam cuneus abscissus est, & punctum baseos, in quod perpendicularis cadit à cunei centro gravitatis, dicatur cunei Subcentrica. Nempe in figura eadem, si K sit centrum gravitatis cunei, recta vero K I ad basin ejus A B E C perpendicularis ducta sit, & rursus I M perpendicularis ad A D; erit I M, quam subcentricam dicimus.


#### PROPOSITIO VII.

**C**uneus super plana figura qualibet abscissus, plano inclinato ad angulum semirectum, aequalis est solido, quod fit ducendo figuram eandem, in altitudinem aequalem distantia centri gravitatis figura, ab recta per quam abscissus est cuneus.

Sit, super figura plana A C B, cuneus A B D abscissus piano ad angulum semirectum inclinato, ac transeunte per E E, rectam tangentem figuram A C B, inque ejus piano sitam. Centrum vero gravitatis figuræ sit F, unde in rectam E E ducta sit perpendicularis F A. Dico cuneum A C B æqualem esse solido, quod fit ducendo figuram A C B in altitudinem ipsi F A æqualem.

Intelligatur enim figura A C B divisa in particulas minimas æquales

les quarum una g. Itaque constat, si harum singulæ ducantur in distantiam suam ab rectâ e e, summam productorum fore æqualem ei quod fit ducendo rectam A F in particulas omnes \*, hoc est, ei quod fit ducendo figuram ipsam A C B, in altitudinem æqualem A F. Atqui particulæ singulæ ut g, in distantias suas G H ductæ, æquales sunt parallelepipedis, vel prismatibus minimis, super ipsas erectis, atque ad superficiem obliquam A D terminatis, quale est G K; quia horum altitudines ipsis distantiis G H æquantur, propter angulum semirectum inclinationis planorum A D & A C B. Patetque ex his parallelepipedis totum cuneum A B D componi. Ergo & cuneus ipse æquabitur solido super basi A C B, altitudinem habenti rectâ F A æqualem. quod erat demonstrandum.



## PROPOSITIO VIII.

**S**i figuram planam linea recta tangat, divisaque intelligatur figura in particulias minimas aequales, atque à singulis ad rectam illam perpendiculares ductæ: erunt omnium harum quadrata, simul sumpta, aequalia rectangulo cuidam, multiplici secundum ipsarum particularum numerum; quod nempe rectangulum sit à distantia centri gravitatis figura ab eadem recta, & à subcentrica cunei, qui per illam super figura abscinditur.

Positis enim cæteris omnibus quæ in constructione præcedenti,  
sit L A C U N E I A B D subcentrica inrectam E E. Oportet igitur ostendere, summam quadratorum omnium à distantiis particularum

0

figuræ A C B æquari rectangulo ab F A, L A, multiplico secundum particularum numerum.

Et constat quidem ex demonstratione præcedenti, altitudines parallelepipedorum singulorum, ut G K, æquales esse distantiis particularum, quæ ipsorum bases sunt, ut G, ab recta A E. Quare, si jam parallelepipedum G K ducamus in distantiam G H, perinde est ac si particula G ducatur in quadratum distantiaæ G H. Eodemque modo se res habet in reliquis omnibus. Atqui producta omnia parallelepipedorum in distantias suas ab recta A E, æquantur simul produ-

\* Prop. 1. huj. cto ex cuneo A B D in distantiam L A \*, quia cuneus gravitat super puncto L. Ergo etiam summa productorum à particulis singulis G, in quadrata suarum distantiarum ab recta A E, æquabitur producto ex cuneo A B D in rectam L A, hoc est, producto ex figura A C B in rectangulum ab F A, L A. Nam cuneus A B D, æqualis est producto ex figura A C B in rectam F A \*. Rursus quia figura A C B æqualis est producto ex particula una G, in numerum ipsarum particularum;

sequitur, dictum productum ex figura A C B in rectangulum ab F A, L A, æquari producto ex particula G in rectangulum ab F A, L A, multiplico secundum numerum particularum G. Cui proinde etiam æqualis erit dicta summa productorum, à particulis singulis G in quadrata suarum distantiarum ab recta A E, sive à particula una G in summam omnium horum quadratorum. Quare, omissa utrinque multiplicatione in particulam G, necesse est summam eandem quadratorum æquari rectangulo ab F A, L A, multiplico secundum numerum particularum in quas figura A C B divisa intelligitur. quod erat demonstrandum.

### PROPOSITIO IX.


**D**ata figurâ planâ E in eodem plano linea rectâ, que vel fecet figuram vel non, ad quam perpendiculares cadant à particulis singulis minimis E equalibus, in quas figura divisa intelligitur; invenire summam quadratorum ab omnibus istis perpendicularibus; sive planum, cuius multiplex, secundum particularum numerum, dictæ quadratorum summa æquale sit.

Sit data figura plana A B C, & in eodem plano recta E D; divisâque figurâ cogitatu in particulas minimas æquales, intelligentur ab unaquaque earum perpendiculares ductæ in rectam E D, sicut à particula F ducta est F K. Oporteatque invenire

summam quadratorum ab omnibus istis perpendicularibus.

Sit datæ  $E D$  parallelæ rectæ  $A L$ , quæ figuram tangat, ac tota extra eam posita sit. Potest autem figuram vel ab eadem parte ex qua est  $E D$ , vel à parte opposita contingere. Distantia vero centri gravitatis figuræ ab recta  $A L$  sit recta  $G A$ , secans  $E D$  in  $E$ ; & subcentrica cunei, super figura abscissi plano per rectam  $A L$ , sit  $H A$ . Dico summam quadratorum quæsitam æquari rectangulo  $A G H$  una cum quadrato  $E G$ , multiplicibus secundum particularum numerum, in quas figura divisa intelligitur.

DE CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.



Occurrat enim  $F K$ , si opus est producta, tangenti  $A L$  in  $L$  punto. Itaque primum, eo casu quo recta  $E D$  à figura distat, & tangens  $A L$  ad eandem figuræ partem ducta est, sic propositum ostendetur. Summa omnium quadratorum  $F K$  æquatur totidem quadratis  $K L$ , una cum bis totidem rectangulis  $K L F$ , & totidem insuper quadratis  $L F$ . Sed quadrata  $K L$  æquantur totidem quadratis  $E A$ . Et rectangula  $K L F$  æqualia esse constat totidem rectangulis  $E A G$ , quia omnes  $F L$  æquales totidem  $G A$ \*. Et denique quadrata  $L F$  æquantur totidem rectangulis  $H A G$ \*, hoc est, totidem quadratis  $A G$  cum totidem rectangulis  $A G H$ . Ergo quadrata omnia  $F K$  æqualia erunt totidem quadratis  $E A$ , cum totidem duplis rectangulis  $E A G$ , atque insuper totidem quadratis  $A G$  cum totidem rectangulis  $A G H$ . Atqui tria ista; nempe quadratum  $E A$  cum duplo rectangulo  $E A G$  & quadrato  $A G$ ; faciunt quadratum  $E G$ . Ergo apparet quadrata omnia  $F K$  æquari totidem quadratis  $E G$ , una cum totidem rectangulis  $A G H$ . Quod erat ostendendum.


Porro in reliquis omnibus casibus, quadrata omnia  $F K$  æquantur totidem quadratis  $K L$ , minus bis totidem rectangulis  $K L F$ , plus totidem quadratis  $L F$ ; hoc est, totidem quadratis  $E A$ , minus totidem duplis rectangulis  $E A G$ , plus totidem quadratis  $A G$ , cum to-

\* Prop. 2. huj.

\* Prop. pre-  
ced.

D E C E N T R O  
O S C I L L A -  
T I O N I S .

dem rectangulis  $A G H$ . Atqui, omnibus hisce casibus, fit quadratum  $B A$ , plus quadrato  $A G$ , minus duplo rectangulo  $B A G$ , æquale quadrato  $E G$ . Ergo rursus quadrata omnia  $F K$  æqualia erunt totidem quadratis  $E G$ , una cum totidem rectangulis  $A G H$ . Quare constat propositum.




Hinc sequitur, rectangulum  $A G H$  eadem magnitudine esse, utriusvis cunei subcentrica fuerit  $A H$ ; hoc est, sive per hanc, sive per illam tangentium parallelarum  $A L$  abscissi. Itaque  $A G$  unius casus ad  $A G$  alterius, ut  $H G$  hujus ad  $H G$  illius. Sicut autem rectæ  $A G$  inter se, ita in utroque casu cunei per  $A L$  abscissi, ut colligitur ex prop. 7. huj. Ergo ita quoque reciproce  $G H$  ad  $G H$ .

Apparet etiam, dato figuræ planæ centro gravitatis  $G$ , & subcentrica cunei, per alterutram tangentium parallelarum  $A L$  abscissi, dari quoque cunei, per tangentem alteram  $A L$  abscissi, subcentricam.

#### PROPOSITIO X.

**P**ositis qua in propositione precedenti; si data recta  $E D$  transeat per  $G$ , centrum gravitatis figura  $A B C$ ; erit sum-



ma quadratorum à distantiis particularum, in quas figura

*divisa intelligitur, ab recta ED, æqualis rectangulo soli AGH,  
multiplici secundum ipsarum particularum numerum.*

DE CENTRO  
OSCILLA-  
TIONES.

Hoc enim manifestum est, quum nullum tunc sit quadratum


E G.

### PROPOSITIO XI.

**P**ositis rursus cateris ut in præcedentium penultima; si de sit axis figura planæ ABC, in duas aquales similesque portiones eam dividens, sitque insuper VG distantia centri gravitatis dimidiæ figuræ DAD ab recta ED, cunei vero, super ipsam abscissi per ipsam ED, subcentrica GX; erit rectangulum XGV æquale rectangulo AGH.

Est enim rectangulum XGV, multiplex secundum numerum particularum figuræ DAD, æquale quadratis omnibus perpendicularium à particulis ejusdem figuræ dimidiæ in rectam ED cadentium\*. Ac proinde idem rectangulum XGV, multiplex secun-

\* Prop. 8. huj.



dum numerum particularum totius figuræ ABC, æquale erit quadratis perpendicularium, ab omnibus particulis figuræ hujus in rectam ED demissarum; hoc est, rectangulo AGH multiplici secundum eundem particularum numerum, ut constat ex propos. præcedenti. Vnde sequitur rectangula XGV, AGH inter se æqualia esse. quod erat demonstrandum.


### PROPOSITIO XII.

**D**atis in plano punctis quotlibet; si ex centro gravitatis eorum circulus quilibet describatur; ducantur autem ab omnibus datis punctis, ad punctum aliquod in circuli illius

O iii

circumferentia linea recta; erit summa quadratorum ab omnibus semper eidem plano aequalis.

Sint data puncta A B C D: centrumque gravitatis eorum, sive magnitudinum æqualium ab ipsis suspensarum, sit E; & centro E describatur circulus quilibet Ff, in cuius circumferentia sumpto punto aliquo, ut F, ducantur ad id, à datis punctis, rectæ A F, B F, C F, D F. Dico earum omnium quadrata, simul sumpta, æqualia esse plano cuidam dato, semperque eidem, ubicunque in circumferentia punctum F sumptum fuerit.



Ducantur enim rectæ G H, G K, angulum rectum constituentes, & quarum unicuique omnia data puncta sint posita ad eandem partem. Et à singulis in utramque harum perpendicularares agantur A L, A K; B M, B O; C N, C P; D H, D Q. A centro autem gravitatis E, & à punto F, in alterutram duarum, G H vel G K, perpendicularares E R, F S. Et item, à datis punctis, in ipsam F s perpendicularares A V, B X, C Y, D Z. Et F T perpendicularis in ipsam E R. Porro sit jam

$$\begin{array}{lll} A L \propto a & A K \propto e & \text{radius } E F \propto \zeta \\ B M \propto b & B O \propto f & G S \propto x \\ C N \propto c & C P \propto g & \\ D H \propto d & D Q \propto h & \end{array}$$

Quia autem E est centrum gravitatis punctorum A, B, C, D; si addantur in unum perpendicularares A L, B M, C N, D H, compositaque ex omnibus dividatur in tot partes, quot sunt data puncta;

\* Prop. 1. huj. earum partium uni æqualis erit E R\*. Similiterque, divisâ in toti-

## HOROLOG. OSCILLATOR.

III

dem partes summâ perpendicularium AK, BO, CP, DQ, earum uni æqualis erit perpendicularis, ducta ex E in rectam GK, sive ipsa RG\*. Itaque, si summa omnium AL, BM, CN, DH, sive  $a + b + c + d$  vocetur l: summa vero omnium, AK, BO, CP, DQ, sive  $e + f + g + h$ , vocetur m: & numerus, datorum punctorum multitudinem exprimens, dicatur  $\theta$ ; erit ER  $\propto \frac{l}{6}$ ; & RG  $\propto \frac{m}{6}$ . Cumque GS sit x, erit RS sive FT  $\propto x - \frac{m}{6}$ ; vel  $\frac{m}{6} - x$ , si GR major quam GS; & semper quadratum FT  $\propto xx - 2\frac{x^m}{6} + \frac{m^m}{66}$ . quo ablato ab quadrato FE  $\propto ZZ$ , relinquetur quadratum TE  $\propto ZZ - xx + 2\frac{x^m}{6} - \frac{m^m}{66}$ . Et proinde TE  $\propto \sqrt{ZZ - xx + 2\frac{x^m}{6} - \frac{m^m}{66}}$ . Erat autem ER  $\propto \frac{l}{6}$ . Itaque TR  $\propto \frac{l}{6} +$  vel  $- \sqrt{ZZ - xx + 2\frac{x^m}{6} - \frac{m^m}{66}}$ . quæ TR, brevitatis gratia, dicatur y. Colligamus jam porro summam quadratorum omnium FA, FB, FC, FD. Quadratum AF æquatur quadratis AV, VF. Est autem AV æqualis differentiæ duarum VK, AK, sive duarum SG, AK; ac proinde AV  $\propto x - e$  vel  $e - x$ ; & qu. AV  $\propto xx - 2ex + ee$ . VF vero æqualis est differentiæ duarum FS, VS sive duarum FS, AL; ac proinde VF  $\propto y - a$  vel  $a - y$ ; & qu. VF  $\propto yy - 2ay + aa$ . Additisque quadratis AV, VF, fit quadratum FA  $\propto xx - 2ex + ee - yy - 2ay + aa$ . Eodemque modo invenientur quadrata reliquarum FB, FC, FD; atque omnia ordine disposita erunt hæc;

- qu. FA  $\propto xx - 2ex + ee + yy - 2ay + aa$ .
- qu. FB  $\propto xx - 2fx + ff + yy - 2by + bb$ .
- qu. FC  $\propto xx - 2gx + gg + yy - 2cy + cc$ .
- qu. FD  $\propto xx - 2hx + hh + yy - 2dy + dd$ .

Horum vero summa; si ponamus quadrata ee + ff + gg + hh  $\propto nn$ ; & quadrata aa + bb, cc + dd  $\propto kk$ ; erit ista,  $\theta xx - 2mx + nn + \theta yy - 2ly + kk$ . Siquidem  $\theta$  erat numerus datorum punctorum ideoque & quadratorum, positumque fuerat  $e + f + g + h \propto m$ , &  $a + b + c + d \propto l$ .

In ista vero summa, si in terminis  $\theta yy$  &  $2ly$ , pro y, ponatur id cuius loco positum erat, nempe  $\frac{l}{6} +$  vel  $- \sqrt{ZZ - xx + 2\frac{x^m}{6} - \frac{m^m}{66}}$ , fiet  $-\theta yy \propto \frac{l}{6} + 2l\sqrt{ZZ - xx + 2\frac{x^m}{6} - \frac{m^m}{66}} + \theta ZZ - \theta xx + 2Zm - \frac{m^m}{6}$ . &  $-2ly \propto -2\frac{l}{6} - 2l\sqrt{ZZ - xx + 2\frac{x^m}{6} - \frac{m^m}{66}}$ . vel  $+\theta yy \propto \frac{l}{6} - 2l\sqrt{ZZ - xx + 2\frac{x^m}{6} - \frac{m^m}{66}} + \theta ZZ - \theta xx + 2Zm - \frac{m^m}{6}$ . &  $-2ly \propto -2\frac{l}{6} + 2l\sqrt{ZZ - xx + 2\frac{x^m}{6} - \frac{m^m}{66}}$ .

Ac proinde, utroque casu, pro  $\theta yy - 2ly$  habebitur  $-\frac{l}{6} + \theta ZZ - \theta xx + 2xm - \frac{m^m}{6}$ . Quò appositis reliquis quantitatibus, summa prædi-

DE CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.

\* Prop. 2. huj.

cta contentis,  $\theta xx - 2xm + nn + kk$ , fiet tota summa, nempe quadratorum FA, FB, FC, FD,  $\propto \theta z z + nn + kk - \frac{mm}{8}$ . Quod apparet esse planum datum, cum hæ quantitates omnes datæ sint; semperque idem reperiri, ubicunque in circumferentia sumptum fuerit punctum F. quod erat demonstrandum.

Quod si puncta data diversas gravitates habere ponantur, invicem commensurabiles, ut si punctum A ponderet ut 2, B ut 3, C ut 4, D ut 7, eorumque reperto gravitatis centro, circulus rursus describatur, ad cuius circumferentia punctum, à datis punctis rectæ ducantur, ac singularum quadrata multiplicita sumantur secundum numerum ponderis puncti sui; ut quadratum A F duplum, B F triplum, C F quadruplum, D F septuplum; dico rursus summam omnium æqualem fore spatio dato, semperque eidem, ubicunque in circumferentia punctum sumptum fuerit. Patet enim hoc ex præcedenti demonstratione, si imaginemur puncta ipsa multiplicia secundum numeros attributæ cuique gravitatis; quasi nempe in A duo puncta conjuncta sint, in B tria, in C quatuor, in D septem, atque illa omnia æqualiter gravia.

### PROPOSITIO XIII.

**S**i figura plana, vel linea in plano existens, aliter atque aliter suspendatur à punctis, quæ, in eodem plano accepta, aequaliter à centro gravitatis sua distent; agitata motu in latus, sibi ipsi isochrona est.

Sit figura plana, vel linea in plano existens A B C, cuius centrum gravitatis D. quo eodem centro, circumferentia circuli in eodem plano describatur, E C F. Dico, si à quovis in illa punto, ut E, C, vel G, suspensa figura agitetur in latus; sibi ipsi, sive eidem pendulo simplici, isochronam esse.


Sit prima suspensio ex E punto, quando autem est extra figuram, ut hic, putandum est lineam E H, ex qua figura pendet, rigidam esse, atque immobiliter ipsi affixam.

Intelligatur figura A B C divisa in particulas minimas æquales, à quarum omnium centris gravitatis, ad punctum E, rectæ ductæ sint; quas quidem manifestum est, quum moveatur figura motu in latus, esse ad axem agitationis perpendicularares. Harum igitur omnium perpendicularium quadrata, divisa per rectam E D, multiplicem secundum numerum particularum in quas figura divisa est, efficiunt longitudinem penduli simplicis, figuræ isochroni\*, quæ

\* Prop. 6. huic.

quæ sit K L. Suspensâ autem figurâ ex puncto G , rursus longitudo penduli simplicis isochroni invenitur , dividendo quadrata omnia linearum, quæ à particulis figuræ ducuntur ad punctum G , per rectam G D, multiplicem secundum earundem particularum numerum \*. Quum igitur puncta G & E sint in circumferentia descripta \* Prop. 6. huj. centro D , quod est centrum gravitatis figuræ A B C , sive centrum

DE CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.



gravitatis punctorum omnium, quæ centra sunt particularum figuræ æqualium ; erit proinde summa quadratorum à lineis, quæ à dictis particulis ad punctum G ducuntur , æqualis summæ quadratorum à lineis quæ ab iisdem particulis ducuntur ad punctum E \*. Hæ vero quadratorum summæ, utraque suspensione, applicantur ad magnitudines æquales : quippe, in suspensione ex E , ad rectam E D , multiplicem secundum numerum omnium particularum ; in suspensione autem ex G , ad rectam D G , multiplicem secundum earundem particularum numerum. Ergo patet, ex applicatione hac posteriori, quum nempe suspensio est ex G , fieri longitudinem penduli isochroni eandem atque ex applicatione priori, hoc est, eandem ipsi K L .

Eodem modo, si ex C , vel alio quovis punto circumferentiae E C F , figura suspendatur , eidem pendulo K L isochrona esse probabitur. Itaque constat propositum.

#### PROPOSITIO XIV.


**D**Atâ figurâ solidâ, & linea rectâ interminataâ, quæ vel extra figuram cadat, vel per eam transeat; divisâque

P

DE CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.

*figurā cogitatu in particulas minimas aquales, à quibus omnibus ad datam rectam perpendiculares ductæ intelligantur; invenire summam omnium quæ ab ipsis sunt quadratorum, sive planum, cuius multiplex secundum particularum numerum, dictæ quadratorum summa aquale sit.*

Sit data figura solida A B C D, & linea recta quæ, per punctum E transiens, ad planum hujus paginæ erecta intelligatur: quæque vel secet figuram, vel tota extra cadat. Intelletoque, à singulis particulis minimis æqualibus, solidum A B C D constituentibus, velut F, rectas duci perpendiculares in datam rectam per E, quemadmodum hic F E, oporteat omnium quadratorum F E summam invenire.



Secetur figura piano E A C, per dictam datam lineam & per centrum gravitatis figuræ ducto. Item aliud planum intelligatur per eandem lineam datam, perque E G, quæ ipsi est ad angulos rectos.

Constat jam, quadratum rectæ cuiusque, quæ à particula di-

Etarum aliqua, ad lineam datam per E perpendicularis ducitur, sicut F E, æquari quadratis duarum F G, F H, quæ ab eadem particula, in plana per E G & E C ante dicta, perpendicularares aguntur\*. Quare, si cognoscere possimus summam quadratorum, quæ fiunt ab omnibus perpendicularibus, quæ à particulis universis cadunt in plana dicta per E G & per E C; habebimus etiam huic æqualem summam quadratorum à perpendicularibus, quæ ab universis iisdem particulis cadunt in rectam datam per E punctum.

DE CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.

\* 47. lib. I.  
Eucl.

Illa vero prior quadratorum summa colligetur hoc modo. Ponatur primò figuram planam dari O Q P, ad latus figuræ solidæ A B C D, ejusdem cum ipsa altitudinis, quæque sit ejusmodi, ut secta lineis rectis Q Q, R R, quæ respondeant planis figuram solidam A B C D secantibus M M, N N, & his parallelis; eadem sit dictarum linearum inter se, quæ & planorum horum ratio, si nempe sumantur utrinque quæ in ordine sibi respondent. Ut si linea R R sit ad Q Q quemadmodum planum N N ad M M. Quod si igitur figura plana O Q P, in totidem particulas minimas æquales divisa intelligatur, quot intelliguntur in solido A B C D, erunt etiam in unoquoque segmento figuræ planæ, velut Q Q R R, tot numero particulæ, quot sunt in figuræ solidæ segmento M M N N, isti segmento respondente; ac proinde & summa quadratorum, à perpendicularibus omnium particularum figuræ O Q P in planum E G, æquabitur summa quadratorum, à perpendicularibus omnium particularum figuræ solidæ, in idem planum E G productis. Illa autem quadratorum summa data erit, si dentur in figura O Q P, cuneoque illius, quæ propos. 9. huj. requiri diximus. Ergo his datis, dabitur quoque summa quadratorum, à perpendicularibus quæ, à particulis omnibus solidi A B C D, ducuntur in planum E G.

Ponatur nunc alia item figura plana S Y T Z, ejusdem cum solido A B C D latitudinis, hoc est, quam includant plana B Y, D Z solidum contingentia, ac parallela plano E A C, quæque sit ejusmodi, ut, secta lineis rectis V V, X X &c. quæ respondeant planis figuram A B C D secantibus, K K, L L, & his parallelis, faciat candem inter se rationem linearum harum atque illorum planorum, si sumantur quæ sibi mutuo respondent. Itaque rursus quadrata simul omnia perpendicularium, à particulis figuræ S Y T Z in rectam S T cadentium, æqualia erunt quadratis omnibus perpendicularium quæ, à particulis solidi A B C D, ducuntur in planum A C. Illorum autem summa quadratorum data erit, si detur distantia centri gravitatis figuræ S Y T Z ab recta B Y vel D Z; nec non distantia indidem centri gra-

D E C E N T R O  
O S C I L L A -  
T I O N I S .

\* Prop. 9. huj.

vitatis cunei sui abscissi plano per eandem rectam \*. Vel, figura s Y T Z ordinata existente, ut s T sit axis ejus, eadem quadratorum summa dabitur, si detur distantia centri gravitatis figuræ dimidiæ s Z T ab axe s T, item centri gravitatis cunei, super eadem dimidia figura, abscissi plano per axem ducto \*. Ergo, his datis, dabitur quoque summa quadratorum à perpendicularibus quæ, à particulis omnibus solidi A B C D, ductæ intelliguntur in planum E A C. Invenimus autem & summam quadratorum, à perpendicularibus omnibus in planum per E G ductis. Ergo & aggregatum utriusque summæ habebitur, hoc est, per superius ostensa, summa quadratorum perpendicularium quæ, à particulis omnibus solidi A B C D, cadunt in rectam datam per E transeuntem, & ad paginæ hujus planum erectam. quod erat faciendum.


### PROPOSITIO X V.

**I**isdem positis, si solidum A B C D sit ejusmodi, ut figura plana s Y T Z, ipsi proportionalis, non habeat notam distantiam centri gravitatis à tangentibus B Y vel D Z, vel, ut subcentrica cunei super ipsa abscissi, plano pereasdem B Y vel D Z, ignoretur; in figura tamen proportionali, quæ à latere est, O Q P, detur distantia  $\Phi$  P, qua centrum gravitatis figura dimidia O P V abest ab axe O P; licebit hinc invenire summam quadratorum à distantiis particularum solidi A B C D à plano E C. Oportet autem ut sectiones omnes, N N, M M, sint plana similia; utque per omnium centra gravitatis transeat planum E C; quemadmodum in prisme, pyramide, cono, conoidibus, multisque aliis figuris contingit. Atque eorum planorum distantias centri gravitatis, super tangentibus axi oscillationis parallelis, datas esse necesse est; uti  $\Theta$  subcentricas curvorum, qui super ipsis abscinduntur, ductis planis per easdem tangentes.

Veluti, si maxima dictarum sectionum sit B D, & in B intelligatur recta parallela axi E, hoc est, erecta ad planum quod hic conspicitur, oportet datam esse distantiam centri gr. sectionis B D à dicta linea in B, quæ sit B C, itemque subcentricam cunei, super sectione B D abscissi, piano ducto per eandem lineam in B, quæ subcentrica sit B K.

Etenim his datis, divisâque P V bifariam in  $\Delta$ , si fiat sicut  $\Delta$  P ad

$\Phi$ , ita rectangulum  $B C K$  ad spatium quoddam  $z$ ; dico hoc ipsum, multiplex per numerum particularum solidi  $A B C D$ , æquari summae quæsitæ quadratorum, à distantiis earundem particularum à piano  $E C$ .

De CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.

Quadrata enim à distantiis particularum planæ sectionis  $B D$ , à piano  $E C$ , quod per centrum gravitatis suæ transit; sive quadrata à distantiis particularum solidarum segmenti  $B N N D$  à piano eodem, æquari constat rectangulo  $B C K$ , multiplo per numerum dictarum particularum \*. Similiter, si planæ sectionis  $N N$  distantia \* Prop. 8. huj. centri gravitatis, ab recta quæ in  $N$  intelligitur axi  $E$  parallela, sit  $N X$ ; subcentrica vero cunei super ipsa abscissi, plano per eandem rectam, sit  $N F$ ; erunt quadrata à distantiis particularum planarum sectionis  $N N$  à piano  $E C$ , sive quadrata à distantiis particularum solidarum segmenti  $N M M N$ , à piano eodem, æqualia rectangulo  $N X F$ , multiplo per numerum particularum ipsarum sectionis  $N N$ , vel segmenti  $N M M N$ . Est autem  $B D$  divisa similiter in  $C & K$ , atque  $N N$  in  $X & F$ . Ergo rectangulum  $B C K$  ad rectangulum  $N X F$ , sicut quadratum  $B D$  ad quadratum  $N N$ .

Est autem & numerus particularum sectionis  $B D$ , ad numerum particularum sectionis  $N N$ , sicut sectiones ipsæ; hoc est, sicut quadratum  $B D$  ad quadratum  $N N$ . Itaque rectangulum  $B C K$ , multiplex per numerum particularum sectionis  $B D$ , ad rectangulum  $N X F$ , multiplex per numerum particularum sectionis  $N N$ , dupli-

catam habebit rationem quadrati  $B D$  ad quadratum  $N N$ ; hoc est, eam quam quadratum  $V V$  ad quadratum  $R R$ , in figura proportionali. Erit igitur & dicta prior summa quadratorum, à distantiis particularum segmenti  $B N N D$  à plano  $E C$ , ad summam alteram quadratorum, à distantiis particularum segmenti  $N M M N$ , ut qu.  $V V$  ad qu.  $R R$ . Eademque ratione ostendetur, summas quadratorum à distantiis particularum in reliquis segmentis solidi  $A B C D$ , esse inter se in ratione quadratorum quæ fiunt à rectis in figura  $O V V$ , quæ basi cujusque segmenti respondent. Quare summa quadratorum, à distantiis particularum omnium segmentorum solidi  $A B C D$  à plano  $E C$ , erit ad summam quadratorum, à distantiis particularum segmentorum totidem, maximo segmento æqualium, hoc est, cylindri vel prismatis  $B D S S$ , eandem cum solido  $A B C D$  basin altitudinemque habentis, sicut quadrata omnia rectarum  $V V$ ,  $R R$ ,  $Q Q$ , &c. ad quadrata totidem maximo  $V V$  æqualia, hoc est, sicut solidum rotundum  $O V V$  circa axem  $O P$ , ad cylindrum  $V V \Omega \Omega$ , qui basin & altitudinem habeat eandem. Hanc vero rationem solidi  $O V V$  ad cylindrum  $V V \Omega \Omega$ , componi constat ex ratione planorum quorum conversione generantur, hoc est, ex ratione plani  $O P V$ , ad rectangulum  $P \Omega$ , & ex ratione distantiarum quibus horum planorum centra gravitatis absunt ab axe  $O P$ ; hoc est, & ex ratione  $P \Phi$  ad  $P \Delta$ . Et prior quidem harum rationum, nempe plani  $O P V$  ad rectangulum  $P \Omega$ , eadem est quæ solidi  $A B C D$  ad cylindrum vel prisma  $B D S S$ , hoc est, eadem quæ numeri particularum solidi  $A B C D$ , ad numerum particularum cylindri vel prismatis  $B D S S$ . Altera vero ratio, nempe  $P \Phi$  ad  $P \Delta$ , est eadem, ex constructione, quæ spatii  $Z$  ad rectangulum  $B C K$ . Habebit itaque dicta summa quadratorum, à distantiis omnium particularum solidi  $A B C D$  à plano  $E C$ , ad summam quadratorum, à distantiis omnium particularum cylindri vel prismatis  $B D S S$  ab eodem plano, rationem eam quæ componitur ex ratione numeri particularum solidi  $A B C D$ , ad numerum particularum cylindri vel prismatis  $B D S S$ , & ex ratione spatii  $Z$  ad rectangulum  $B C K$ : hoc est, rationem quam habet rectangulum  $Z$ , multiplex per numerum particularum solidi  $A B C D$ , ad rectangulum  $B C K$ , multiplex per numerum particularum cylindri vel prismatis  $B D S S$ . Atqui quarta harum magnitudinum æqualis est secundæ; nempe rectangulum  $B C K$ , multiplex per numerum particularum cylindri vel prismatis  $B D S S$ , æquale summæ quadratorum, à distantiis particularum ejusdem prismatis vel cylindri  $B D S S$  à plano  $E C$ ; siquidem rectangulum idem  $B C K$ , multiplex

## HOROLOG. OSCILLATOR.


119

per numerum particularum segmenti  $B N N D$ , æquatur quadratis distantiarum particularum ejusdem segmenti à plano  $E C^*$ . Ergo & tertia primæ æquabitur; nempe planum  $Z$ , multiplex per numerum particularum solidi  $A B C D$ , summæ quadratorum, à distantiis particularum solidi ejusdem  $A B C D$  à plano  $E C^*$ . quod erat demonstrandum.

Notandum vero, quando solidum  $A B D$  rotundum est circa axem  $A C$ , fieri semper rectangulum  $B C K$  æquale quartæ parti quadrati  $B C$ ; quoniam subcentrica cunei, abscissi super circulo  $B D$ , plano per tangentem in  $B$ , nempe recta  $B K$ , æquatur<sup>1</sup> radii  $B C$ . Vnde, si  $P V$  æqualis posita sit  $B C$ , sequitur, faciendo ut  $P \Delta$  ad  $P \Phi$  ita rectangulum  $B C K$ , hoc est,  $\frac{1}{4}$  quadrati  $B C$ , hoc est, qu.  $P \Delta$  ad planum aliud  $Z$ , fore hoc rectangulo  $\Delta P \Phi$  æquale. Ac proinde tunc ipsum rectangulum  $\Delta P \Phi$ , multiplex secundum numerum particularum solidi  $A B D$ , æquari summæ quæsitæ quadratorum à perpendicularibus omnibus, quæ à particulis iisdem cadunt in planum  $E C$ .

## PROPOSITIO XVI.

**F**igura quævis, sive linea fuerit, sive superficies, sive solidum; si aliter atque aliter suspendatur, agiteturque super axibus inter se parallelis, quique à centro gravitatis figura æqualiter distent, sibi ipsi isochrona est.



Proponatur magnitudo quævis, cuius centrum gravitatis  $E$  punctum, sitque primo suspensa ab axe, qui per  $F$  intelligitur hujus paginæ plano ad angulos rectos. Itaque idem planum erit & planum oscillationis. In quo si centro  $E$ , radio  $E F$ , describatur circumferentia  $F H G$ , sumptoque in illa puncto quovis, ut  $H$ , magnitudo secundò suspensi intelligatur ab axe in hoc puncto infixo, atque agitari, manente eodem oscillationis plano. Dico isochronam fore sibi ipsi agitatæ circa axem in  $F$ .

De CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.  
\* Prop. 8. huj.

\* Prop. 14. lib.  
j. Eucl.

DE CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.

Intelligatur enim dividi magnitudo proposita in particulas minimas æquales. Itaque, quia in utraque illa suspensione idem manet oscillationis planum, respectu partium magnitudinis; manifestum est, si ab omnibus particulis, in quas divisa est magnitudo, perpendiculares cadere concipientur in dictum oscillationis planum, illas utraque suspensione occurrere ipsi in punctis iisdem. Sint autem hæc puncta ea quæ apparent in spatio A B C D.

Quum igitur E sit centrum gravitatis magnitudinis propositæ, ipsaque proinde circa axem, qui per E punctum erectus est ad planum A B C D, quovis situ æquilibrium servet; facile perspicitur, quod si punctis omnibus ante dictis, quæ in spatio A B C D signantur, æqualis gravitas tribuatur, eorum quoque omnium centrum gravitatis futurum est punctum E. Quod si vero, ut fieri potest, in puncta aliqua plures perpendiculares coincident, illa puncta quasi toties geminata intelligenda sunt, gravitatesque toties multiplices accipiendæ. Atque ita consideratorum, patet rursus centrum gravitatis esse E punctum.

Porro summam quadratorum ab rectis, quæ ducuntur à dictis punctis omnibus ad punctum F, eandem esse patet cum summa quadratorum ab iis rectis, quæ à singulis particulis magnitudinis propositæ ducuntur perpendiculares in axem oscillationis per F transeuntem; quippe cum linea ipsæ, quarum quadrata intelliguntur, utrobique eandem habeant longitudinem. Similiter etiam, cum suspensio est ex axe per H, patet summam quadratorum ab rectis, quæ ab omnibus punctis, in spatio A B C D signatis, ducuntur ad punctum H, eandem esse cum summa quadratorum, ab iis quæ, à particulis omnibus magnitudinis propositæ, ducuntur perpendiculares in axem oscillationis per H transeuntem. Ergo utroque casu, si summa quadratorum ab rectis quæ, à punctis omnibus prædictis, ducuntur ad puncta F vel H, dividatur per rectas E F vel E H, multiplices secundum numerum particularum in quas magnitudo proposita divisa intelligitur, orietur ex applicatione hac longitudo penduli simplicis, quod magnitudini suspensæ ex F vel H isochronum sit. Est autem summa quadratorum utroque casu æqualis\*, & rectæ quoque E F, E H, inter se æquales; & particularum idem numerus. Ergo, quum & applicatae quantitates, & quibus illæ applicantur, utrobique æquales sint, etiam longitudines ex applicatione ortæ æquales erunt, hoc est, longitudines pendulorum isochronorum magnitudini propositæ suspensæ ex F vel ex H. Quare constat propositum.


\* Prop. 11. huj.

## PROPOSITIO XVII.

DE CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.

**D**ato plano, cuius multiplex per numerum particula-  
rum, in quas suspensa figura divisa intelligitur, aque-  
tur quadratis omnium distantiarum ab axe oscillationis; si  
illud applicetur ad rectam, aqualem distantia inter axem  
oscillationis & centrum gravitatis suspensa magnitudinis,  
orientur longitudi penduli simplicis ipsi isochroni.

Sit figura A B C, cuius centrum gravitatis E, suspensa ab axe qui,  
per F punctum ad planum quod conspicitur, erectus sit. Ponendo-  
que divisam figuram in particulas minimas aequales, à quibus om-  
nibus, in dictum axem, perpendiculares cadere intelligantur: esto,  
per superius ostensa, inventum planum H, cuius multiplex per nu-



merum dictarum particularum, aequetur quadratis omnibus di-  
stantrum perpendicularium. Applicatoque plano H ad rectam  
F E, fiat longitudo F G. Dico hanc esse longitudinem penduli sim-  
plicis, isochronas oscillationes habentis magnitudini A B C, agi-  
tatae circa axem per F.

Quia enim summa quadratorum, à distantiis ab axe F, applicata ad  
distantiam F E, multiplicem secundum partium numerum, facit  
longitudinem penduli simplicis isochroni \*. Isti vero quadratorum  
summæ aequale ponitur planum H, multiplex per eundem parti-  
cularum numerum. Ergo & planum H, multiplex per eundem parti-  
cularum numerum, si applicetur ad distantiam F E, multiplicem

\* Prop. 6. huj.


Q

secundum particularum numerum; sive, omissa communi multiplicitate, si planum  $\text{H}$  applicetur ad distantiam  $\text{F E}$ ; orietur quoque longitudo penduli simplicis isochroni. Quam proinde ipsam longitudinem  $\text{F G}$  esse constat. quod erat demonstrandum.

## PROPOSITIO XVIII.

**S**i spatium planum, cuius multiplex secundum numerum particularum suspensa magnitudinis, aquetur quadratis distantiarum ab axe gravitatis, axi oscillationis parallelo; id, inquam, spatium si applicetur ad rectam, aqualem distantiae inter utrumque dictorum axium, orietur recta aqualis intervallu, quo centrum oscillationis inferius est centro gravitatis ejusdem magnitudinis.

Esto magnitudo  $\text{A B C D}$ , cuius centrum gravitatis  $\text{E}$ ; quæque suspensa ab axe, qui per punctum  $\text{F}$  ad planum hujus paginæ erectus intelligitur, habeat centrum oscillationis  $\text{G}$ . Porro axe per  $\text{F}$  intelligatur axis aliis, per centrum gravitatis  $\text{E}$  transiens, paralle-



lus. Divisaque magnitudine cogitat in particulas minimas æquales, sit quadratis distantiarum, ab axe dicto per  $\text{E}$ , æquale planum  $\text{I}$ , multiplex nempe secundum numerum dictarum particularum; applicatoque plano  $\text{I}$  ad distantiam  $\text{F E}$ , fiat recta quædam. Dico eam æqualem esse intervallu  $\text{E G}$ , quo céntrum oscillationis inferius est centro gravitatis magnitudinis  $\text{A B C D}$ .

Vt enim universaliter demonstratione quod propositum est comprehendamus: intelligatur plana figura, magnitudini  $\text{A B C D}$  analoga, ad latus adposita,  $\text{o Q P}$ ; quæ nempe, secta planis horizontalibus iisdem cum magnitudine  $\text{A B C D}$ , habeat segmenta inter-

cepta inter bina quæque plana, in eadem inter se ratione cum segmentis dictæ magnitudinis, quæ ipsis respondent; sintque segmenta singula figuræ o Q P, divisa in tot particulæ æquales, quot continentur segmentis ipsis respondentibus in figura A B C D. Hæc autem intelligi possunt fieri, qualisunque fuerit magnitudo A B C D, sive linea, sive superficies, sive solidum. Semper vero centrum gravitatis figuræ o Q P, quod sit T, eadem altitudine esse manifestum est cum centro gravitatis magnitudinis A B C D; ideoque, si planum horizontale, per F ductum, fecet lineam centri figuræ o Q P, velut hic in s, æquales esse distantias s T, F E.

DE CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.

Porro autem constat quadrata distantiarum, ab axe oscillationis F, applicata ad distantiam F E, multiplicem secundum numerum particularum, efficere longitudinem penduli isochroni \*; quæ longitude posita fuit F G. Illorum vero quadratorum summam, æqualem esse perspicuum est, quadratis distantiarum à plano horizontali per F, unâ cum quadratis distantiarum à plano verticali F E, per axem F & centrum gravitatis E ducto \*. Atqui quadrata distantiarum magnitudinis A B C D à plano horizontali per F, æquantur quadratis distantiarum figuræ o Q P ab recta s F. Quæ quadrata (si o sit punctum supremum figuræ o Q P, & H centrum gravitatis cunei super ipsa abscissi, plano per rectam O V, parallelam s F) æqualia sunt rectangulo O T H & quadrato s T, multiplicibus secundum numerum particularum dictæ figuræ \*, sive magnitudinis A B C D. Quadrata vero distantiarum magnitudinis A B C D à plano F E, quantumcumque axis oscillationis F distet à centro gravitatis E, semper eadem sunt: quæ proinde putemus æquari spatio Z, multiplici secundum numerum particularum magnitudinis A B C D.

Itaque quoniam quadrata distantiarum magnitudinis A B C D, ab axe oscillationis F, æquantur istis, quadrato nimis s T, rectangulo O T H, & plano Z, multiplicibus per numerum particularum ejusdem magnitudinis; si applicentur hæc omnia ad distantiam F E sive s T, orietur longitudine F G penduli isochroni magnitudini A B C D \*. Sed ex applicatione quadrati s T ad latus suum s T, orietur ipsa s T, sive F E. Ergo reliqua E G est ea quæ oritur ex applicatione rectanguli O T H, & plani Z, ad eandem s T vel F E.

Quare supereft ut demonstremus rectangulum O T H, cum plano Z, æquari plano I. Tunc enim constabit, etiam planum I, applicatum ad distantiam F E, efficere longitudinem ipsi E G æqualem. Illud autem sic ostendetur. Rectangulum O T H, multiplex secundum numerum particularum figuræ o Q P, sive magnitudinis A B

\* Prop. 6. huj.

\* Prop. 47. lib.  
I. Eucl.

\* Prop. 9. huj.

Q ij

D I C E N T R O  
O S C I L L A -  
T I O N I S .

\* Prop. 10. huj.

$CD$ , æquatur quadratis distantiarum figuræ ab recta  $x\tau^*$ , quæ per centrum gravitatis  $\tau$  dicitur ipsi  $s\tau$  parallela; ac proinde etiam quadratis distantiarum magnitudinis  $A B C D$ , à plano horizontali  $\kappa\kappa$ , ducto per centrum gravitatis  $E$ ; cum distantiae utrobique sint eadem. At vero planum  $z$ , similiter multiplex, æquale possum fuit quadratis distantiarum magnitudinis  $A B C D$  à plano verticali  $F E$ . Ac patet quidem quadrata hæc distantiarum à plano  $F E$ , una cum dictis quadratis distantiarum à plano horizontali per  $E$ , æqualia esse quadratis distantiarum ab axe gravitatis per  $E$ , qui sit axis  $\tau$  parallelus\*. Itaque rectangulum  $O\tau H$  una cum plano  $z$ , multiplicita secundum numerum particularum magnitudinis  $A B C D$ , æqualia erunt quadratis distantiarum ejusdem magnitudinis à dicto axe per  $E$ . Sed & planum  $i$ , multiplex secundum eundem particularum numerum, æquale possum fuit iisdem distantiarum quadratis. Ergo planum  $i$  æquale est rectangulo  $O\tau H$  & piano  $z$  simul sumptis. quod ostendendum supererat.

Hinc rursus manifestum fit, quod propositione 16 demonstratum fuit; nempe magnitudinem quamlibet, si aliter atque aliter suspendatur atque agitetur, ab axibus parallelis, qui à centro gravitatis suæ æqualiter distent, sibi ipsi isochronam esse.

Sive enim magnitudo  $A B C D$  suspendatur ab axe  $\tau$ , sive ab axe  $L$  illi parallelo; patet eadem utrobique esse quadrata distantiarum ab axe per  $E$ , qui sit axibus  $\tau$  vel  $L$  parallelus. Vnde & planum  $i$ , cuius multiplex, secundum numerum particularum, æquatur quadratorum summæ, utroque casu idem erit. Hoc vero planum, applicatum ad distantiam centri gravitatis ab axe oscillationis, quæ utroque casu eadem ponitur, efficit distantiam qua centrum oscillationis inferius est centro gravitatis; Ergo etiam hæc distantia utroque casu eadem erit. Velut si, facta suspensione ex  $L$ , fuerit dicta distantia  $EY$ , erit ipsa æqualis  $EG$ ; & tota  $Y\tau L$  æqualis  $GF$ ; adeoque, in suspensione utraque, idem pendulum simplex isochronum fit magnitudini  $A B C D$ .


### PROPOSITIO XIX.

**S**I magnitudo eadem, nunc brevius nunc longius suspen-  
sa, agitetur; erunt, sicut distantia axium oscillationis  
à centro gravitatis inter se, ita contraria ratione distantia  
centrorum oscillationis ab eodem gravitatis centro.

Sit magnitudo, cuius centrum gravitatis  $A$ , suspensa primum  
atque agitata ab axe in  $B$ , deinde vero ab axe in  $C$ ; sitque in prima

suspensione centrum oscillationis D, in posteriori vero centrum oscillationis E. Dico esse ut B A ad C A ita E A ad D A.

De CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.



Quum enim, in suspensione ex B, efficiatur distantia A D, qua nempe centrum oscillationis inferius est centro gravitatis, applicando ad distantiam B A spatum quoddam, cuius multiplex secundum numerum particularum minimarum æqualium, in quas magnitudo divisa intelligitur, æquatur quadratis distantiarum ab axe per A, parallelo axi in B \*; erit proinde rectangulum B A D dicto spatio æquale. Item, in suspensione ex C, quum fiat distantia A E, applicando idem dictum spatum ad distantiam C A; erit & rectangulum C A E eidem spatio æquale. Itaque æqualia inter se rectangula B A D, C A E; ac proinde ratio B A ad C A eadem quæ A E ad A D. quod erat demonstrandum.

Hinc patet, dato pendulo simplici, quod magnitudini suspensæ isochronum sit in una suspensione, datoque ejus centro gravitatis; etiam in alia omni suspensione, longiori vel breviori, dummodo idem maneat planum oscillationis, longitudinem penduli isochroni datam esse.

### PROPOSITIO X X.

**C**entrum Oscillationis & punctum suspensionis inter se convertuntur.

In figura superiori, quia, posita suspensione ex B, centrum oscillationis est D; etiam invertendo omnia, ponendoque suspen-

Q. iij


\* Prop. pre-  
ced.

De centro oscillationis.  
sionem ex D, erit tunc centrum oscillationis B. Hoc enim ex ipsa propositione precedenti manifestum est.

## PROPOSITIO XXI.

**Q**uomodo in figuris planis centra oscillationis inventantur.

Intellectis quæ hactenus demonstrata sunt, facile jam erit in plerisque figuris, quæ in Geometria considerari consueverunt, definire oscillationis centra. Atque ut de planis figuris primum dicamus; duplarem in iis oscillationis motum supra definitivimus; nempe, vel circa axem in eodem cum figura piano jacentem, vel circa eum qui ad figuræ planum erectus sit. Quorum priorem vocavimus agitationem in planum, alterum agitationem in latus.



Quod si priore modo agitur, nempe circa axem in eodem piano jacentem, sicut figura B C D circa axem E F; hic, si cuneus super figura intelligatur abscissus, piano quo secet planum figuræ, ut intersectio, quæ hic est D D, sit parallela oscillationis axi; deturque distantia centri gravitatis figuræ ab hac intersectione, ut hic A D; itemque subcentrica cunei dicti super eadem intersectione, quæ hic sit D H. Habebitur centrum oscillationis K, figuræ B D C, applicando rectangulum D A H ad distantiam F A; quoniam ex applicatione hac orietur distantia A K, qua centrum oscillationis inferius est centro gravitatis. Est enim rectangulum D A H, multiplex secundum numerum particularum figuræ B C D, æquale quadratis distantiarum ab rectâ B A C, quæ per centrum gravi-

tatis A parallela ducitur axi oscillationis E F \*. Quare, applicando idem rectangulum ad distantiam F A, orietur distantia A K, qua centrum oscillationis inferius est centro gravitatis A \*.

Hinc manifestum est, si axis oscillationis sit D D, fieri centrum oscillationis H punctum; adeoque longitudinem D H, penduli simplicis isochroni figuræ B C D, esse tunc ipsam subcentricam cunei, abscissi plano per D D, super ipsam D D. Quod unum ab aliis ante animadversum fuit, non tamen demonstratum.

Quomodo autem centra gravitatis cuneorum super figuris planis inveniantur, persequi non est instituti nostri, & jam in multis nota sunt. Velut, quod si figura B C D sit circulus, erit D H æqualis  $\frac{1}{2}$  diametri. Si rectangulum, erit D H  $\propto \frac{1}{2}$  diametri. Vnde & ratio appareret cur virga, seu linea gravitate prædita, altero capite suspensa, isochrona sit pendulo longitudinis subsequaliter. Considerando nempe lineam ejusmodi, ac si esset rectangulum minimæ latitudinis.

Quod si figura triangulum fuerit, vertice sursum converso, fit  $D H = \frac{3}{4}$  diametri. Si deorsum,  $\frac{1}{2}$  diametri.

Quod autem propositione 16 demonstratum fuit, id ad hujusmodi figuræ planæ motum ita pertinere sciendum. Nempe, si aliam atque aliam positionem demus figuræ B C D, invertendo eam circa axem B A C, ut vel horizonti parallela jaceat, vel oblique inclinetur, manente eodem agitationis axe F E, etiam longitudo penduli isochroni F K eadem manebit. Hoc enim ex propositione illa manifestum est.


Porro quando figura plana, circa axem ad planum figuræ erectum, agitatur; quam vocavimus agitationem in latus; velut si figura B C D moveatur circa axem, qui per punctum F intelligitur ad planum D B C erectus; hic jam præter cuneum super figura, qui absinditur plano ducto per D D, tangentem figuram in puncto summo, alter quoque considerandus cuneus, qui absinditur piano per B D, tangentem figuram in latere, quæque tangenti D D sit ad rectos angulos. Oportetque dari, præter figuræ centrum gravitatis A, subcentricamque H D cunei prioris, etiam subcentricam L B cunei posterioris. Ita enim nota erunt rectangula D A H, B A L, quæ simul sumpta faciunt hic spatium applicandum, quod deinceps etiam Rectangulum oscillationis vocabitur. Quod nempe, applicatum ad distantiam F A, dabit distantiam A K, qua centrum oscillationis K inferius est centro gravitatis A.

Si vero F A sit axis figuræ B C D, potest, pro cuneo abscisso per

DE CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.  
\* Prop. 10. huj.  
\* Prop. 18. huj.

\* Prop. 12. huj.

$B D$  super figura tota, adhiberi cuneus super figura dimidia  $DBM$  abscissus plano per  $D M$ . Nam, si cunei hujus subcentrica super  $D M$  sit  $O A$ , distantia vero centri gr. figuræ planæ  $DBM$  ab eadem  $D M$  sit  $N A$ , æquale esse constat rectangulum  $O A N$  rectangulo  $B A L$ \*. Itaque rectangulum  $O A N$ , additum rectangulo  $D A H$ , constituet quoque planum applicandum ad distantiam  $F A$ , ut fiat distantia  $A K$ .



Et horum quidem manifesta est demonstratio ex præcedentibus, quippe cum rectangula  $D A H$ ,  $B A L$ , vel  $D A H$ ,  $O A N$ , multiplicia secundum numerum particularum figuræ, æqualia sint quadratis distantiarum à centro gravitatis  $A$ ; sive, quod idem hic est, ab axe gravitatis axi oscillationis parallelo; ac proinde rectangula dicta, ad distantiam  $F A$  applicata, efficient longitudinem intervalli  $A K$ \*.

\* Prop. 18. huj.

### Centrum Oscillationis Circuli.

Et in circulo quidem rectangula  $D A H$ ,  $B A L$ , inter se æqualia esse liquet, simulque efficere semissem quadrati à semidiametro. Vnde, si fiat ut  $F A$  ad semidiametrum  $A B$ , ita  $hæc$  ad aliam, ejus dimidium erit distantia  $A K$ , à centro gravitatis ad centrum oscillationis. Si igitur circulus ab axe  $D$ , in circumferentia sumpto, agitur, erit  $D K$  æqualis tribus quartis diametri  $D M$ .

Ad hunc modum & in sequentibus figuris planis centra oscillationis quæsivimus, quæ simpliciter adscriptisse sufficiet. Nempe,


*Centrum oscillationis Rectanguli.*DE CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.

In rectangulo omni, ut c b, spatium applicandum, sive rectangulum oscillationis, invenitur æquale tertiae parti quadrati à semidiagonio a c. Vnde sequitur, si rectangulum ab aliquo angularum suspendatur, motuque hoc lateral i agitetur, pendulum illi isochronum esse; diagonii totius.

*Centrum oscillationis Trianguli isoscelis.*

In triangulo isoscele, cuiusmodi c b d, spatium applicandum æquatur parti decimæ octavæ quadrati à diametro b e, & vigesimæ quartæ quadrati baseos c d. Vnde, si ab angulo baseos ducatur d g, perpendicularis super latus d b, quæ occurrat productæ diametro b e in g; sitque a centrum gravitatis trianguli; divisoque intervallo g a in quatuor partes æquales; una earum a k apponatur ipsi b a; erit b k longitudo penduli isochroni, si triangulum suspendatur ex vertice b. Cum autem ex punto mediæ basis e suspendatur, longitudo penduli isochroni e k æquabitur dimidiæ b g.

Atque hinc liquet, triangulum isosceles rectangulum, si ex punto mediæ basis suspendatur, isochronum esse pendulo longitudinem diametro suæ æqualem habenti. Similiterque, si suspendatur ab angulo suo recto, eidem pendulo isochronum esse.

*Centrum oscillationis Parabola.*


In parabolæ portione recta, spatium applicandum æquatur  $\frac{12}{75}$  quadrati axis, una cum quinta parte quadrati dimidiæ basis. Cum-

R

que parabola ex verticis punto suspensa est, invenitur penduli isochroni longitudo  $\frac{1}{7}$  axis, atque insuper  $\frac{1}{7}$  lateris recti. Cum vero ex punto mediæ basis suspenditur, erit ea longitudo  $\frac{1}{7}$  axis, & insuper  $\frac{1}{7}$  lateris recti.

*Centrum oscillationis Sectoris circuli.*


In circuli sectore B C D, si radius B C vocetur  $r$ : semi arcus C F,  $p$ : semisubtensa C E,  $b$ : sit spatium applicandum æquale  $\frac{1}{2} rr - \frac{4bbrr}{9pp}$ , hoc est, dimidio quadrati B C, minus quadrato B A; ponendo



A esse centrum gravitatis sectoris. Tunc enim  $B A \propto \frac{2b^2r}{3p}$ . Si autem suspendatur sector ex B, centro circuli sui, fit pendulum ipsi isochronum  $\frac{3pr}{4b}$ , hoc est, trium quartarum rectæ, quæ sit ad radium B F ut arcus C F D ad subtensam C D. Hæc autem inveniuntur cognitis subcentricis cuneorum; tum illius qui super sectore toto absinditur, plano ducto per B K parallelam subtensiæ C D, cuius cunei subcentricam super B K invenimus esse  $\frac{3}{8}r - \frac{3}{8}a + \frac{3pr}{8b}$ , vocando a sinum versus E F; tum illius qui super dimidio sectore B F C absinditur plano per B F, cuius nempe cunei subcentricam super B F invenimus  $\frac{3}{8}b - \frac{3b^2r}{8a} + \frac{3pr}{8a}$ .

Sed & alia via, sectoris centrum oscillationis, facilius invenitur, quæ est hujusmodi. Intelligatur sectoris B C D pars minima sector B C P, qui trianguli loco haberi potest. Quadrata autem, à distantiis particularum ejus à punto B, æqualia sunt quadratis distantiarum ab recta B R, bifariam sectorem dividente, una cum quadratis distantiarum ab recta B Q, quæ ipsi B R est ad angulos rectos. Sed, horum quadratorum ad illa, ratio quavis data est major, quoniam angulus C B P minimus; ideoque illa pro nullis habenda sunt.

Positâ vero  $B O$  duarum tertiarum  $B R$ , hoc est, posito  $O$  centro gravitatis trianguli  $B C P$ ; &  $B N$  trium quartarum  $B R$ ; ut nempe  $N$  sit centrum gravitatis cunei, super triangulo  $B C P$  abscessi plano per  $B Q$ . His positis, constat quadrata, à distantia particularum trianguli  $B C P$  ab recta  $B Q$ , æquari rectangulo  $N B O$  multiplici secundum particularum ejusdem trianguli numerum. Itaque rectangulum  $N B O$ , ita multiplex, æquale censendum quadratis distantiarum à puncto  $B$  particularum trianguli  $B C P$ . Sunt autem quadrata




distantiarum harum, ad quadrata distantiarum totius sectoris  $B C D$ , sicut sector  $B C P$  ad sectorem  $B C D$ , hoc est, sicut numerus particularum sectoris  $B C P$ , ad numerum particularum sectoris  $B C D$ ; hoc enim facile intelligitur, eo quod sector  $B C D$  dividatur in sectores qualis  $B C P$ . Ergo rectangulum  $N B O$ , multiplex secundum numerum particularum sectoris  $B C D$ , æquale erit quadratis distantiarum particularum ejus à puncto  $B$ . Ideoque rectangulum  $N B O$ , applicatum ad  $B A$ , distantiam inter suspensionem & centrum gravitatis sectoris, dabit longitudinem penduli isochroni, cum sector ex  $B$  suspenditur \*. Est autem rectangulum  $N B O \propto \frac{1}{2}$  \* Prop. 17. huj.  $rr$ : distantia autem  $B A$ , ut jam ante diximus,  $\propto \frac{z b r}{z p}$ . Vnde, facta applicatione, oritur  $\frac{z p r}{4 b}$ , longitudo penduli isochroni, ut ante quoque inventa fuit.

### *Centrum oscillationis Circuli, aliter quam supra.*

Eodem modo etiam simplicissime, in circulo, centrum oscillationis invenire licet. Sit enim circulus  $G C F$ , cuius centrum  $B$ ; sectorque in eo minimus intelligatur  $B C P$ , sicut ante in sectore  $B C D$ .


Cum igitur, secundum modo exposita, quadrata, à distantiis particularum sectoris  $B\ C\ P$  ad centrum  $B$ , æquentur rectangulo  $N\ B\ O$ , hoc est, dimidio quadrato radii, multiplico secundum sectoris ipsius particularum numerum; circulus autem ex ejusmodi sectoribus componatur; erunt proinde quadrata, à distantiis particularum circuli totius ad centrum  $B$ , æqualia dimidio quadrato radii, multiplico secundum numerum earundem circuli particularum.



*Est autem  $B$  centrum gravitatis circuli. Ergo dictum dimidium quadratum radii, hic erit spatium applicandum distantiæ inter suspensionem & centrum  $B$ , ut habeatur intervallum, quo centrum oscillationis inferius est ipso centro  $B$ \*. quod & supra ita se habere ostendimus.*

\* Prop. 18. huj.

*Centrum oscillationis Peripherie circuli.*




*Facilius etiam, centrum oscillationis circumferentia circuli, hoc*

*R*

pacto reperitur. Esto enim circumferentia descripta centro B, radio B R. Quadratum igitur B R, multiplex secundum numerum particularum in quas circumferentia divisa intelligitur, æquatur quadratis à distantiis omnium earum particularum ad centrum B. Quare quadratum B R erit hic spatium applicandum \*. Patetque \* Prop. 18. huj. hinc, si suspensio sit ex G, punto circumferentiae, penduli isochroni longitudinem æquari diametro G F.

*Centrum oscillationis Polygonorum ordinatorum.*

Haud absimiliter & polygono cuvis ordinato, ut A B C, pendulum isochronum invenitur. Fit enim spatium applicandum, æquale semissi quadrati perpendicularis ex centro in latus polygoni, una




cum vigesima quarta parte quadrati lateris. At, si perimetro polygoni pendulum isochronum queratur, fit spatium applicandum æquale quadrato perpendicularis à centro in latus, cum duodecima parte quadrati lateris.

*Loci plani & solidi usus in hac Theoria.*

Est præterea & Locorum contemplatio in his non injucunda. Ut si propositum sit, dato punto suspensionis A, & longitudine A B, invenire locum duorum ponderum æqualium C, D, æqualiter ab A & à perpendiculari A B distantium, quæ agitata circa axem in A, perpendicularem plano per A C D, isochrona sint pendulo simplici longitudinis A B.

Ponatur A B  $\propto a$ , ductâque C D, quæ secet A B ad angulos rectos in E, sit A E indeterminata  $\propto x$ : E C vel E D  $\propto y$ . Ergo quadratum A C  $\propto x^2 + y^2$ . Hoc vero multiplex secundum numerum particularum ponderum c, d, quæ hic minima intelliguntur, æquatur quadratis distantiarum earundem particularum ab axe

suspensionis A. Ergo quadratum A C, sive  $xx + yy$ , applicatum ad distantiam A E, quæ nempe est inter axem suspensionis & centrum gravitatis ponderum C, D, efficiet  $\frac{xx+yy}{x}$ , longitudinem penduli isochroni \*; quam propterea oportet æqualem esse A B sive a.



Itaque  $\frac{xx+yy}{x} \propto a$ . Et  $yy \propto ax - xx$ . Vnde patet, locum punctorum C & D, esse circumferentiam circuli, cuius centrum F, ubi A B bifariam dividitur, radius autem  $\propto \frac{1}{2}a$ , sive F A. Ergo, ubicunque in circumferentia A C B D duo pondera æqualia, æqualiter ab A distantia, ponentur, ea, ex A agitata, isochrona erunt pendulo longitudinem habenti æqualem diametro A B.


Atque hinc manifestum quoque, & circumferentiam A C B D, si gravitas ei tribuatur, & quamlibet ejus portionem, æqualiter in A vel B divisam, & ab axe per A suspensam, eidem pendulo A B isochronam esse.

Loci vero solidi exemplum esto hujusmodi. Sit A N linea infelix sine pondere. Propositumque sit, ad punctum in ea acceptum, ut M, affigere ipsi ad angulos rectos lineam, seu virgam, pondere præditam O M L, ad M bifariam divisam, cuius in latus agitatæ oscillationes, ex suspensione A, isochronæ sint pendulo simplici longitudinis A N.

Ducatur O H parallela A N, & A H parallela O M, & sit O R æqualis  $\frac{1}{2} O L$ . Itaque cunei super recta O L, abscissi plano per O H ducto, subcentrica erit O R. Sed cunei alterius super eadem O L, abscissi piano per rectam A H, (est autem cuneus hic nihil aliud quam rectangulum) subcentrica erit ipsa A M. Quare rectangulum illud, quod supra Oscillationis vocavimus, erit solum rectangulum O M R. quod nempe applicatum ad longitudinem A M, dabit distantiam centri oscillationis lineæ O L, ex A suspensa, infra punctum M.


Sit jam  $A N \propto a : A M \propto x : m$  vel  $M L \propto y$ . Est ergo rectangulum  $O M R \propto \frac{1}{3}yy$ . quo applicato ad  $A M$ , fit  $\frac{yy}{x}$ . quæ longitudo itaque ipsi  $M N$  æqualis esse debet, cum velimus centrum oscillationis virgæ  $O L$  esse in  $N$ . Fit ergo æquatio  $\frac{yy}{x} + x \propto a$ . Vnde  $y \propto \sqrt{3ax - 3xx}$ . Quod significat puncta  $O$  &  $L$  esse ad Ellipsin, cuius axis minor  $A N$ ; latus rectum vero, secundum quod possunt ordinatim ad axem hunc applicatae, ipsius  $A N$  triplum.

DE CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.



Hinc vero manifestum fit, cum omnis virga ipsi  $O L$  parallela, & ad Ellipsin hanc terminata, oscillationes isochronas habeat pendulo simplici  $A N$ , etiam totum Ellipseos planum, ex  $A$  suspensum & in latus agitatum, ipsi  $A N$  pendulo isochronum fore. Sed & partem Ellipseos quamlibet, quæ lineis una vel duabus, ad  $A N$  perpendicularibus, abscindetur.

Cæterum adscribemus & aliud loci plani exemplum, in quo nonnulla notata digna occurunt.




Sit virga  $A B$  ponderis expers, suspensa ex  $A$ ; oporteatque, ad da-

tum in ea punctum  $B$ , affigere triangula duo paria, & paribus angulis ab axe  $AB$  recedentia, quorum anguli ad  $B$  minimi, sive infinite parvi existimandi, quæque, ita suspensa ab  $A$ , oscillationes isochronas faciant pendulo simplici datae longitudinis  $AL$ .

Hic, ducta  $CG$  perpendiculari in  $BG$ , & ponendo  $AB \propto a$ ;  $AL \propto b$ ;  $BG \propto x$ ;  $CG \propto y$ : invenitur æquatio  $y \propto \sqrt{2ab - 2aa - \frac{8}{3}ax + \frac{4}{3}bx - xx}$ . ex qua patet, bases triangulorum  $C$ , &  $D$ , quæ bases hic ut puncta considerantur, esse ad circuli circumferentiam; quia nempe habetur terminus simplex  $-xx$ .

Licet autem hic animadvertere, quod si  $a$  sit nihilo æqualis, hoc est, si punctum, ubi affiguntur trianguli  $BC$ ,  $BD$ , sit idem cum punto  $A$ ; tum futura sit æquatio  $y \propto \sqrt{\frac{4}{3}bx - xx}$ . Ac proinde, hoc casu, si sumatur  $AO \propto \frac{2}{3}b$ , hoc est,  $\propto \frac{2}{3}AL$ , centroque oper  $A$  circulus describatur  $ADN$ ; erunt bases triangulorum  $AC$ ,




$AD$ , ad illius circumferentiam. Cum igitur quælibet duo triangula acutissima, quæ ex  $A$  ad circumferentiam  $ACND$  constituuntur, magnitudine & situ sibi respondentia, centrum oscillationis habeant punctum  $L$ , positâ  $AL \propto \frac{3}{4}$  diametri  $AN$ ; cumque circulus totus ex ejusmodi triangulorum paribus componatur; uti & portio ejus quælibet, ut  $ACND$ , latera  $AC$ ,  $AD$  æqualia habens; manifestum est, tum circuli totius, tum portionis qualem diximus, centrum oscillationis esse in  $L$ .

Rursus, si in æquatione inventa ponatur  $\frac{8}{3}a \propto \frac{4}{3}b$ , seu  $2a \propto b$ ; hoc est, si triangula affigi intelligantur in  $B$ , quod longitudinem  $AL$  fecerit bifariam, erit  $y \propto \sqrt{2aa - xx}$ . quæ æquatio docet, quod si centro  $B$ , radio qui possit duplum  $BA$ , circumferentia describatur, ea erit locus basium triangulorum acutissimorum  $BC$ ,  $BD$ , quorum


quorum nempe, ex A suspensorum, centrum oscillationis erit L punctum. Cumque & circulus totus, & sector ejus quilibet, axem habens in recta A L, ex hujusmodi triangulorum paribus componatur, manifestum est & horum, ex A suspensorum, centrum oscillationis esse punctum L.

De CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.



Adeoque quilibet circuli sector, suspensus à punto quod distet, à centro circuli sui, semisse lateris quadrati circulo inscripti, pendulum isochronum habebit toti eidem lateri æquale. Atque ita, hoc uno casu, absque posita dimensione arcus, pendulum sectori isochronum invenitur.


Porro, ad universalem constructionem æquationis primæ,  $y \propto \sqrt{2ab - 2aa - \frac{8}{3}ax + \frac{4}{3}bx - xx}$ , dividatur A L bifariam in E, & adponatur ad B E pars sui tertia E F; eritque F centrum describendi circuli; radius autem F O æqualis sumendus ei, quæ potest duplum differentiæ quadratorum A E, E F.



Si itaque, ex punto B, ad descriptam circumferentiam triangula duo paria acutissima constituantur, ut B C, B D; illorum, ex A

suspensorum, centrum oscillationis erit L. Quare & portionis cuiuslibet descripti circuli, cuius portionis vertex sit in B, axis vero in recta A L, quales sunt utraque C B D; posita suspensione ex A; centrum oscillationis idem punctum L esse constat. Atque adeo etiam circuli segmentorum K O N, K M N, quæ facit recta K B N perpendicularis ad A B.

Et hæc quidem de motu lateralí planorum, ac linearum, animadvertisse sufficiat. Quibus hoc tantum addimus; inventis centrís oscillationis figurarum rectarum, seu quæ æqualiter ad axem utrinque constitutæ sunt; ut trianguli isoscelis, vel parabolicæ sectionis rectæ; etiam obliquarum, quæ velut luxatione illarum efficiuntur, ut trianguli scaleni, & parabolæ non rectæ, centra oscillationis haberi. Ut si, exempli gratia, triangulum B A C isosceles, cuius axis A D, à punto E suspensum intelligatur; sit vero & aliud triangulum scalenum F A G, axem eundem habens A D, & basin F G æqualem basi B C; etiam hoc triangulum, ex E suspensum, priori B A C isochronum esse dico.



Quia enim virga, seu linea gravis, F G, affixa virgæ sine pondere E D in D, situ obliquo, suspensa que ex E, isochrona est virgæ B C, similiter in D affixæ\*; idemque evenit in virgis cæteris trianguli utriusque, quæ axem A D secant in iisdem punctis, atque inter se æquales sunt: necesse est tota triangula, quæ ex lineis, seu virgis iisdem cōposita intelligi possunt, isochrona esse. In aliis figuris similis est demonstratio.


\*Prop. 16. huj.

## PROPOSITIO XXII.

DE CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.

**Q**uomodo, in solidis figuris, oscillationis centra inveniantur.

In solidis porro figuris facile quoque, per ante demonstrata, centrum oscillationis invenire licebit. Si enim sit solidum ABC, suspensum ab axe, qui, per punctum E, intelligitur hujus paginæ plano ad rectos angulos; centrum autem gravitatis sit F: ductis jam per F planis EFD, GFH, quorum posterius sit horizonti parallelum, alterum vero per axem E transeat; inventisque, per propositionem 14, summis quadratorum à distantiis particularum solidi ABC à plano GFH, itemque à plano EFD; hoc est, inventis rectangularibus utrisque, quæ, multiplicia secundum numerum dictarum particularum, æqualia sint dictis quadratorum summis; rectangularia hæc applicata ad distantiam EF, qua nempe axis suspensionis distat à centro gravitatis, dabunt intervallum FK, quo centrum agitationis K inferius est centro gravitatis F. Hoc enim patet ex propositione 18. Dabimus autem & horum exempla aliquot.




*Centrum oscillationis in Pyramide.*

Sit primum ABC pyramis, verticem habens A, axem AD, basin vero quadratum, cuius latus BC. ponaturque agitari circa axem qui, per verticem A, sit hujus paginæ plano ad angulos rectos.

Hic figura plana proportionalis OVV, à latere adponenda, secundum propositionem 14, constabit ex residuis parabolicis OPV, quæ nempe supersunt, cum, à rectangularibus QP, auferuntur semiparabolæ OVQ, verticem habentes O.

DE CENTRO  
OSCILLATIONIS.

Sicut enim inter se sectiones pyramidis  $B C$ ,  $N N$ , ita quoque rectæ  $V V$ ,  $R R$ , ipsis in figura plana respondentes. & sicut centrum gravitatis  $E$  distat, à vertice pyramidis, tribus quartis axis  $A D$ , ita quoque centrum gravitatis  $F$ , figuræ  $O V V$ , distabit tribus quartis diametri  $O P$  à vertice  $O$ .



Intellecto porro horizontali plano  $N E$ , per centrum gravitatis pyramidis  $A B C$ , quod idem figuram  $O V V$  fecet secundum  $R F$ ; inventaque subcentrica cunei, super figura  $O V V$  abscissi plano per  $O \Omega$ , quæ subcentrica sit  $O G$ , (est autem  $\frac{1}{4}$  diametri  $O P$ ) erit rectangulum  $O F G$ , multiplex per numerum particularum figuræ  $O V V$ , æquale quadratis distantiarum ab recta  $R F$  \*, ac proinde quoque quadratis distantiarum à plano  $N E$ , particularum solidi  $A B C$ . Fit autem rectangulum  $O F G$  æquale  $\frac{3}{80}$  quadrati  $O P$ , vel quadrati  $A D$ .

Deinde, ad inveniendam summam quadratorum à distantiis à plano  $A D$ , noscenda primo subcentrica cunei, super quadrata basi pyramidis  $B C$  abscissi, plano per rectam quæ in  $B$  intelligitur axi  $A$  parallela; quæ subcentrica sit  $B K$ ; estque  $\frac{2}{3} B C$ . Noscenda item distantia centr. gr. dimidiæ figuræ  $O P V$  ab  $O P$ ; quæ sit  $\Phi P$ ; estque  $\frac{3}{10} P V$ . Inde, divisâ bifariam  $P V$  in  $\Delta$ , si fiat ut  $\Delta P$  ad  $P \Phi$ , hoc est, ut  $5$  ad  $3$ , ita rectangulum  $B D K$ , quod est  $\frac{1}{11}$  quadrati  $B C$ , ad aliud spatium  $Z$ ; erit hoc, multiplex secundum numerum particularum solidi  $A B C$ , æquale quadratis distantiarum à plano  $A D$  \*. Apparet autem, fieri spatium  $Z$  æquale  $\frac{1}{20}$  quadrati  $B C$ .

Itaque, totum spatium applicandum, æquatur hic  $\frac{3}{80}$  quadrati  $A D$ , cum  $\frac{1}{20}$  quadrati  $B C$ . Vnde, si suspensio, ut hic, posita fuerit in  $A$ , vertice pyramidis, ideoque distantia, ad quam applicatio facienda,

\* Prop. 10. huj.

\* Prop. 15. huj.

## HOROLOG. OSCILLATOR.

141

**A** E æqualis  $\frac{3}{4}$  A D; fiet hinc E s, intervallum quo centrum agitationis inferius est centro gravitatis, æquale  $\frac{1}{20}$  A D, atque insuper  $\frac{1}{15}$  tertiae proportionalis duabus A D, B C. sive tota A s æqualis  $\frac{4}{5}$  A D, præter dictam  $\frac{1}{15}$  tertiae proportionalis.

De CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.

### Centrum oscillationis Coni.

Quod si A B C conus fuerit, omnia eodem modo se habebunt, nisi quod spatium z hic sit æquale rectangulo  $\Delta P\Phi$ \*, hoc est  $\frac{3}{20}$  \* Prop. 15. huj. quadrati P V vel B D, sive  $\frac{3}{80}$  quadrati B C. Quare, totum spatium applicandum, in cono erit  $\frac{3}{80}$  quadrati A D, una cum  $\frac{3}{80}$  quadrati B C. Ac proinde, posita suspensione ex vertice A, fiet E s, qua centrum agitationis inferius est centro gravitatis, æqualis  $\frac{1}{20}$  A D, &  $\frac{1}{10}$  tertiae proportionalis duabus A D, B C. sive tota A s æqualis  $\frac{4}{5}$  A D, una cum  $\frac{1}{15}$  tertiae proportionalis duabus A D, D B. Atque hinc manifestum est, si A D, D B æquales sint, hoc est, si conus A B C sit rectangulus, fieri A s æqualem axi A D.

Sequitur quoque porro, ex propositione 20, conum hunc rectangulum, si ex D centro baseos suspendatur, isochronum fore sibi ipsi ex vertice A suspenso, quemadmodum & de triangulo rectangulo supra ostensum fuit.

### Centrum oscillationis Sphera.

Si A B C sit sphæra, erit figura plana proportionalis, à latere adponenda, o v H, ex parabolis composita, quarum basis communis o H, æqualis sphæræ diametro A D. Sectâ vero sphærâ planis per centrum E, quorum B C sit horizonti parallelum, A D vero verticale: ut inveniatur summa quadratorum à distantiis à plano A D, noscenda est distantia centri gr. parabolæ o v H ab o H, quæ sit  $\Phi P$ , estque  $\frac{1}{2} v P$ . Deinde, divisâ P V bifariam in  $\Delta$ , constat rectangulum  $\Delta P\Phi$ , multiplex per numerum particularum sphæræ A B C, æquari quadratis distantiarum à plano A D\*. Est autem rectangulum  $\Delta P\Phi$  æquale  $\frac{1}{2}$  quadrati P V, vel quadrati B E.


\* Prop. 15. in fine.

Atqui, quadrata distantiarum à plano B C, æqualia esse liquet quadratis distantiarum à plano A D, ac proinde eidem rectangulo  $\Delta P\Phi$ , multiplici per dictum particularum numerum. Ergo spatium applicandum, in sphera A B C, erit duplum rectanguli  $\Delta P\Phi$ ; ideoque æquale  $\frac{1}{2}$  quadrati P V, à radio E B.

Itaque, si sphera suspensa sit ex punto in superficie sua A, erit

De centro  
oscilla-  
tionis.

Es, à centro spheræ ad centrum agitationis s, æqualis  $\frac{1}{2}$  semidiametri A E. Totaque A s æqualis  $\frac{1}{2}$  diametri A D. Si vero ex punto alio, ut L, sphaera suspensa sit; erit E s æqualis  $\frac{1}{2}$  tertiae proportionalis duabus L E, E B.



### *Centrum oscillationis Cylindri.*

In cylindro, invenimus spatium applicandum æquari  $\frac{1}{2}$  quadrati altitudinis, una cum  $\frac{1}{4}$  quadrati à semidiametro basis. Vnde si cylindrus à centro basis superioris suspendatur, fit longitudo penduli isochroni æqualis  $\frac{1}{2}$  altitudinis, una cum semisse ejus, quæ sit ad semidiametrum basis ut hæc ad altitudinem.


### *Centrum oscillationis Conoidis Parabolici.*

In conoide parabolico, rectangulum oscillationis est  $\frac{1}{8}$  quadrati altitudinis, cum  $\frac{1}{4}$  quadrati à semidiametro basis. Vnde, si à punto verticis fuerit suspensum, fit longitudo penduli isochroni  $\frac{3}{4}$  axis, cum  $\frac{1}{4}$  ejus quæ sit ad semidiametrum basis, sicut hæc ad axem, id est, una cum  $\frac{1}{4}$  lateris recti parabolæ genitricis.

### *Centrum oscillationis Conoidis Hyperbolici.*

In conoide quoque hyperbolico centrum oscillationis inveniri potest. Si enim, exempli gratia, sit conoides cuius sectio per axem, hyperbola B A B; axem habens A D, latus transversum A F: erit figura plana ipsi proportionalis B K A K B, contenta basi B B,

& parabolicæ lineæ portionibus similibus  $AKB$ , quæ parabolæ per verticem  $A$  transeunt, axemque habent  $GB$ , dividentem bifariam latus transversum  $AF$ , ac parallelum basi  $BB$ . Et hujus quidem figuræ  $BKAKB$ , centrum gravitatis  $L$ , tantum distat à vertice  $A$ , quantum centrum gravitatis conoidis  $ABB$ ; estque axis  $AD$  ad  $AL$ , sicut tripla  $FA$  cum dupla  $AD$ , ad duplam  $FA$  cum sesquialtera  $AD$ . Deinde & distantia centri gr. figuræ dimidiæ  $ADBK$ , ab  $AD$ , inveniri potest, atque etiam subcentrica cunei super figura  $BKAKB$ , abscissi plano per  $AP$ , parallelam  $BB$ ; hujus inquam cunei subcentrica, super ipsa  $AP$ , inveniri quoque potest; atque ex his consequenter centrum agitationis conoidis, in quavis suspen-sione; dummodo axis, circa quem movetur, sit basi conoidis parallelus. Atque invenio quidem, si axis  $AD$  lateri transverso  $AF$  æqualis ponatur, spatium applicandum æquari  $\frac{1}{10}$  quadrati  $AD$ , cum  $\frac{9}{100}$  quadrati  $DB$ . Tunc autem  $AL$  est  $\frac{7}{10} AD$ .



Vnde, si conoides hujusmodi ex vertice  $A$  suspendatur, inveni-tur longitudo penduli isochroni,  $AS$ , æqualis  $\frac{27}{31} AD$ , cum  $\frac{31}{140}$  tertiaræ proportionalis duabus  $AD$ ,  $DB$ .


### *Centrum oscillationis dimidii Coni.*

Denique & in solidis dimidiatis quibusdam, quæ fiunt sectione per axem, centrum agitationis invenire licebit. Ut si sit conus dimidiatus  $ABC$ , verticem habens  $A$ , diametrum semicirculi ba-

sisq. A

feos BC: ejus quidem centrum gravitatis D notum est, quoniam AD sunt  $\frac{3}{4}$  rectæ AE, ita dividentis BC in E, ut, sicut quadrans circumferentiaæ circuli ad radium, ita sint  $\frac{3}{4}$  CB ad BE. Tunc enim E est centrum gravitatis semicirculi baseos, ideoque in AE centra gravitatis omnium segmentorum semiconi ABC, basi parallelorum.

Et figura quidem porro proportionalis à latere ponenda, ovv, eadem est quæ in cono toto supra descripta fuit: per quam nempe invenietur summa quadratorum, à distantiis particularum semiconi à plano horizontali ND, per centrum gravitatis ducto. Verum quadrata distantiarum, à plano verticali MD O, ut colligantur, altera quoque figura proportionalis SYZ, sicut supra prop. 14. adhibenda est, cujus nempe sectiones verticales, exhibeant lineas proportionales sectionibus sibi respondentibus in semicono ABC.



& hujus figuræ cognoscenda est distantia centri gr. F ab SY, quam æqualem esse constat distantia D N, centri gr. semiconi à plâno trianguli AB. positâque HG subcentricâ cunei abscissi super figura SZY, ducto plâno per SY, noscendum est rectangulum GFH, cuius nempe multiplex, secundum numerum particularum semiconi ABC, æquabitur quadratis distantiarum semiconi in planum MD O. Licebit vero cognoscere rectangulum illud GFH, etiamsi subcentricæ HG longitudo ignoretur, hoc modo.


Diximus supra, cum de cono ageremus, quadrata distantiarum à plâno

à plano per axem ejus, æquari  $\frac{3}{80}$  quadrati à diametro basis, sive  $\frac{3}{20}$  quadrati à semidiametro, multiplicis per numerum particularum coni totius. Vnde & hic, in semicono A B C, quadrata distantiarum à plano A B æqualia erunt  $\frac{3}{20}$  quadrati B C, multiplicis per numerum particularum ipsius semiconi. Sed & rectangulum H G F, multiplex per numerum particularum semiconi A B C, æquatur quadratis distantiarum à plano A B, ut patet ex propositione 9. Ergo rectangulum H G F æquale  $\frac{3}{20}$  quadrati B C. Ponendo autem A B  $\propto a$ ; B C  $\propto b$ ; & quadrantem circumferentia, radio B C descriptæ,  $\propto q$ ; fit E B  $\propto \frac{1}{3} \frac{b}{q}$ . Cujus cum N D tribus quartis æquetur, fiet proinde N D, sive G F  $\propto \frac{1}{2} \frac{b}{q}$ . Cujus quadratum auferendo à rectangulo H G F, quod erat  $\frac{3}{20}$  quadrati B C, fiet rectangulum G F H  $\propto \frac{3}{10} b b - \frac{1}{4} \frac{b}{q}$ . Hoc autem rectangulum, multiplex per numerum particularum semiconi A B C, æquatur quadratis distantiarum à plano M D O. At quadratis distantiarum à plano M D æquantur, ut in cono,  $\frac{3}{80}$  quadrati A B, sive  $\frac{3}{80} aa$ , multiplices per numerum particularum semiconi A B C. Itaque, totum spatiū applicandum, æquabitur hic  $\frac{3}{80} aa + \frac{3}{20} b b - \frac{1}{4} \frac{b}{q}$ .

Vnde quidem centrum agitationis invenitur in omni suspenſione semiconi, dummodo ab axe qui sit parallelus basi trianguli à ſectione A B. Notandum vero, cum figura s z y ſit ignotæ prorsus naturæ, subcentricam tamen G H, cunei ſuper ipſa abſcissi plano per s y, hinc inveniri. Nam, quia rectangulum H G F æquale erat  $\frac{3}{20} b b$ , sive quadrati B C, & G F æqualis  $\frac{1}{2} \frac{b}{q}$ , fit inde G H æqualis  $\frac{3}{10} q$ .

Porro, etiam ſemicylindri, & ſemiconoidis parabolici, centra agitationis inveniri poſſunt, atque aliorum in ſuper ſemifolidorum; quæ aliis investiganda relinquimus.

Quemadmodum autem in figuris planis, ita & hic in solidis figuris locum habet, quod de obliquarum centris agitationis illic di- ximus, quæ veluti luxatione rectarum conſtituuntur, quarum centra oscillationis non diſſerunt à centris oscillationis rectarum. Sic, ſi coni duo fuerint A B C, A F G, alter rectus, alter scalenus; quorum & diametri & bases æquales; hi ex vertice ſuspensi, vel à quibuscumque axibus, æqualiter à centris eorum gravitatis diſtantibus, iſochroni erunt; dummodo axis, unde conus scalenus ſuspensus eſt, rectus ſit ad planum trianguli per diameſtrum, quod planum baſi eſt ad angulos rectos.




## PROPOSITIO XXIII.

**H**orologiorum motum temperare, addito pondere exi-  
guo secundario, quod super virga penduli, certa ra-  
tione divisa, sursum deorsumque moveri possit.

Vt hoc expediamus, primo penduli ipsius, ex virga gravitate  
prædicta, & appenso parte ima pondere, compositi, centrum  
oscillationis inveniendum est.

Sit virga, cum appenso pondere, A C, cuius longitudo dicatur a.



Intelligantur autem, tum virga ipsa, tum pondus  
appensum c, in particulas minimas æquales divi-  
sa, earumque particularum virga habeat num-  
erum b, pondus vero c numerum c, ponendo nem-  
pe b ad c, sicut gravitas virgæ ad gravitatem ap-  
pensi ponderis. Longitudo igitur penduli simpli-  
cis, dato isochroni, habebitur, si summa quadrato-  
rum à distantiis particularum omnium à puncto  
suspensionis A, dividatur per summam earundem  
distantiarum \*. Secetur A c bifariam in M; tum  
vero in T, ut A T sit dupla T C. Quia ergo M est  
centrum gravitatis lineaæ A C, & A T subcentrica  
cunei super ipsa abscissi plano per A D, perpendi-  
cularem ad A C; qui cuneus hic revera triangulum est; erit sum-  
ma quadratorum, à distantiis particularum virgæ à puncto A,

\* Prop. 6. huj.  
in fine.

æqualis rectangulo  $A M T$ , una cum quadrato  $A M$ ; hoc est, rectangulo  $T A M$ , multiplico secundum numerum particularum  $b$ ; hoc est,  $\frac{1}{2} a a b$ ; quia  $M A$  est  $\frac{1}{2} a$ , &  $T A = \frac{1}{2} a$ , ac proinde rectangulum  $T A M \propto \frac{1}{2} a a$ . Summa vero quadratorum, à distantiis particularum ponderis  $c$  ab eodem puncto  $A$ , æquabitur quadrato  $A C$ , multiplico secundum numerum particularum ipsius ponderis; hoc est,  $a a c$ . Adeoque summa quadratorum omnium, tam à distantiis particularum virgæ, quam ponderis  $c$ , erit  $\frac{1}{2} a a b + a a c$ .

DE CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.

Porro, distantiæ omnes particularum virgæ  $A C$  à puncto  $A$ , æquantur  $\frac{1}{2} b a$ ; longitudini scilicet virgæ ipsius, quæ est  $a$ , multiplico secundum semissim numeri particularum quas continet. Et distantiæ omnes particularum ponderis  $c$ , ab eodem puncto  $A$ , sunt  $a c$ . Ita ut summa utrarumque distantiarum sit  $\frac{1}{2} a b + a c$ . Per quam dividendo summam quadratorum prius inventam,  $\frac{1}{2} a a b$

$+ a a c$ , fit  $\frac{\frac{1}{2} a a b + a a c}{\frac{1}{2} a b + a c}$  sive  $\frac{\frac{1}{2} a b + a c}{\frac{1}{2} b + c}$ , longitudo penduli isochroni.

Quæ itaque habebitur, si fiat, ut dimidia gravitas virgæ, una cum gravitate appensi ponderis, ad trientem gravitatis virgæ, una cum gravitate ejusdem appensi ponderis, ita longitudo  $A C$  ad aliam. Oportet autem sumere longitudinem  $A C$ , à puncto suspensionis  $A$  ad centrum gravitatis ponderis  $C$ ; cum magnitudinis ejus ratio hic non habeatur, ac veluti minimum consideretur.

Quod si jam, præter pondus  $C$ , alterum insuper  $D$  virgæ inhærente intelligatur, cuius gravitas, seu particularum numerus sit  $d$ : distantia vero  $A D$  sit  $f$ . Ut pendulum simplex huic ita composito isochronum inveniatur, addenda sunt ad summam superiorem quadratorum, quadrata distantiarum particularum ponderis  $D$  à puncto  $A$ , quæ quadrata appetat esse  $df$ . Adeo ut summa omnium jam sit futura  $\frac{1}{2} a a b + a a c + f f d$ . Item, ad summam distantiarum, addendæ distantiæ particularum ponderis  $D$ , quæ faciunt  $df$ . Ac summa proinde distantiarum omnium erit  $\frac{1}{2} b a + c a + df$ ; per quam dividenda est ista quadrato-  
rum summa, & fit  $\frac{\frac{1}{2} a a b + a a c + f f d}{\frac{1}{2} b a + c a + f d}$ , longitudo penduli iso-  
chroni.

Quod si vero, hæc longitudo penduli isochroni, datæ æqualis postuletur, quæ sit  $p$ , & reliqua omnia quæ prius data sint, præter

D E C E N T R O  
O S C I L L A -  
T I O N I S .

distantiam  $A D$  seu  $f$ , quæ determinat locum ponderis  $D$ : sitque invenienda hæc distantia, id fiet hoc modo. Nempe, cum postu-

letur  $\frac{\frac{1}{3} a a b + a a c + f f d}{\frac{1}{2} a b + a c + f d}$  æquale  $p$ , orietur ex hac æquatione  $ff \propto pf +$

$\frac{\frac{1}{2} a b p + c a p - \frac{1}{3} a a b - a a c}{d}$ . Et  $f \propto \frac{1}{2} p + \text{vel} - \sqrt{\frac{\frac{1}{4} pp + \frac{1}{2} a b p + c a p - \frac{1}{3} a a b - a a c}{d}}$ . Vbi

animadvertisendum, duas esse veras radices, si  $\frac{1}{2} a b p + c a p$  minus sit quam  $\frac{1}{3} a a b + a a c$ ; hoc est, si longitudo  $p$  minor sit quam

$\frac{\frac{1}{3} a b + a c}{\frac{1}{2} b + c}$ , quæ antea inventa fuit longitudo penduli isochroni, sive

distantia centri oscillationis à suspensione, in pendulo composito ex virga  $A C$  & pondere  $c$ .

Vnde patet, si velimus efficere, ut, applicato pondere  $D$ , acceleretur penduli motus; posse duobus locis, inter  $A$  &  $C$ , illud disponi, quorum utrolibet eadem celeritas pendulo concilietur: velut in  $D$  vel  $E$ . Quæ loca æqualiter distabunt à puncto  $N$ , quod abest ab  $A$ , semisse longitudinis  $p$ , hoc est, semisse penduli simplicis, cui compositum hoc isochronum postulabatur. Apparet autem, quando hæc longitudo  $p$  tantum exiguo minor ponitur quam  $A C$ , etiam punctum  $N$  exiguo superius esse puncto medio virgæ  $A C$ .

Porro, ex æquatione superiori,  $f \propto p + \text{vel} - \sqrt{\frac{\frac{1}{4} pp + \frac{1}{2} a b p + c a p - \frac{1}{3} a a b - a a c}{d}}$  habetur determinatio longitudinis  $p$ . Patet enim,  $\frac{1}{4} pp + \frac{1}{2} a b p + c a p$  non minus esse debere quam  $\frac{1}{3} a a b - a a c$ . Vnde non debebit esse minor quam  $\frac{1}{d} \sqrt{\frac{1}{3} b d + 4 c d + b b + 4 b c + 4 c c - \frac{a b - a c}{d}}$ . Quod si  $p$  æquetur huic quantitati, hoc est, si  $\frac{1}{4} pp + \frac{1}{2} a b p + c a p$  fuerit æquale  $\frac{1}{3} a a b - a a c$ , erit jam, in eadem superiori æquatione,  $f \propto \frac{1}{2} p$ , hoc est,  $\frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{3} b d + 4 c d + b b + 4 b c + 4 c c - \frac{a b - a c}{2d}}$ . Quo determinatur distantia ponderis  $D$  à puncto  $A$ , ex qua maxime omnium accelereret motum penduli.

Atque hæc ad horologiorum usum sic porro adhibentur. Sit, exempli gratia, pendulum horologii, quod singulis oscillationibus scrupula secunda notet. Virgæ autem gravitas sit  $\frac{1}{50}$  gravitatis appensi ponderis in imo pendulo: &, præter hoc, sit aliud exiguum pondus mobile secundum virgæ longitudinem, cuius gravitas ea-

dem ponatur quæ ipsius virgæ. Quæritur jam, quo loco hoc virgæ imponendum, ut uno scrupulo primo acceleretur horologii motus, spatio 24 horarum. Item, ubi collocandum, ut duorum scrupulorum primorum sit acceleratio; item, ut trium, quatuor, atque ita porro.

DE CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.

Duætis viginti quatuor horis sexages, fiunt 1440, quot nempe scrupula prima una die continentur. Ex his unum aufer, quando unius scrupuli acceleratio quæritur: supersunt 1439. Ratio autem 1440 ad 1439 duplicata, proxime est ea quæ 1440 ad 1438. Ergo, si penduli simplicis, secunda scrupula notantis, longitudo divisa intelligatur in partes æquales 1440, earumque 1438 alii pendulo tribuantur, hoc præcedet alterum illud, in 24 horis, uno scrupulo primo. Adeo ut hic p valeat partes 1438.

Quia autem pendulum horologii, ex virga metallica & pondere appenso compositum, isochronum ponitur pendulo simplici partium 1440; invenienda primum est virgæ illius longitu-

do, ex æquatione superius posita. Erat nempe  $\frac{1}{3} \sqrt{ab + ac}$  æquale longitudini penduli simplicis, quod isochronum composito ex virga habente longitudinem  $a$ , gravitatem  $b$ , & pondere affixo cuius gravitas  $c$ . Ergo si longitudo penduli simplicis isochroni dicatur  $f$ . Erit  $\frac{1}{3} \sqrt{\frac{b f + c f}{b - c}} \propto a$ . positoque, ut hic,  $c \propto 50$ ;  $b \propto 1$ ;  $f \propto 1440$ ; fiet  $a \propto 1444^{\frac{4}{5}}$ , longitudo virgæ.

Iam, quia erat  $f \propto \frac{1}{2} p + \text{vel} - \sqrt{\frac{1}{4} pp + \frac{1}{3} ab p + ac p - \frac{1}{3} aab - aac}$ , fiet  $f \propto \frac{1}{2} p + \text{vel} - \sqrt{\frac{1}{4} pp + 72962p - 105061210}$ . Vnde porro, si  $p$  sit, uti diximus, partium 1438; invenietur  $f \propto 1331^{\frac{1}{2}}$ , qualium nempe  $f$ , seu pendulum simplex, secunda scrupula oscillationibus designans, continet 1440. Cujus longitudo si pedum trium statuatur, quos horarios vocavimus, habebit funcias 33, & 3 unciarum uncias, quas lineas vocant. Vel, auferendo hanc longitudinem à tota trium pedum longitudine, supererunt unciae duæ, lineæ 9, à centro oscillationis penduli compositi sursum sumendæ, ut habeatur locus ponderis D, unius scrupuli primi accelerationem præstans tempore 24 horarum. Eodem modo reliquas distantias, quibus virga dividenda est, calculo investigavimus, aliam atque aliam ponendo longitudinem  $p$ : easque subjecta tabella exhibe-

## 150 CHRISTIANI HUGENII

DE CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.

mus, secundum cujus numeros etiam virga penduli divisa est, quæ superius in descriptione horologii fuit exhibita. Procedunt autem accelerationes diurnæ, ut jam illic advertimus, per 15 scrupula secunda, seu primorum scrupulorum quadrantes. Ex. gr. si, pondere mobili D hærente in parte 73, 4, inveniatur horologium tardius justo incedere, in 24 horis, differentiâ 15 secundorum scrupulorum; oportebit sursum adducere pondus D, usque ad numerum 85, 6, ut corrigatur.

Acceleratio horologii  
spatio 24 horarum.Partes, à centro osc.  
sursum accipienda.

Scrup. pr. sec.

Linea &amp; decima linearum pedis horarii.

0, 15	7, 0
0, 30	15, 2
0, 45	23, 7
1, 0	32, 6
1, 15	41, 9
1, 30	51, 7
1, 45	62, 2
2, 0	73, 4
2, 15	85, 6
2, 30	99, 0
2, 45	114, 1
3, 0	131, 8
3, 15	154, 3
3, 30	192, 6

Centrum oscillationis altius est centro gravitatis c partibus 1, 4.

## PROPOSITIO XXIV.

**C**entri oscillationis rationem haberi non posse, in pendulis inter Cycloides suspensis; & quomodo hinc orta difficultas tollatur.

Si quis, subtili examine, contulerit ea quæ in superioribus, de pendulo inter cycloides suspenso, demonstravimus, cum his quæ ad centrum oscillationis pertinent; videbitur ei deesse aliquid ad perfectam illam, quam præferimus, oscillationum æqualitatem. Ac primo dubitabit, an, ad inveniendum circulum cycloidis genitorem, penduli longitudo accipienda sit à punto suspensionis ad

## HOROLOG. OSCILLATOR.

151

centrum gravitatis appensi plumbi, an vero ad centrum oscillationis; quod, ab altero illo, s<sup>e</sup>pe sensibili intervallo distat, atque eo majore, quo major fuerit sphera aut lens plumbea. Quid enim, si spherae diameter quartam, aut tertiam partem, penduli longitudinis æquet? Quod si ad centrum oscillationis illam longitudinem accipiendam dicamus, non tamen expediet quo pacto ea, quæ de centro oscillationis ostensa sunt, convenient pendulo continue longitudinem suam immutanti, quale illud quod inter cycloides movetur. Posset enim videri, etiam centrum oscillationis mutari, ad singulas diversas longitudines; quod tamen hoc modo intelligendum non est. Res sane explicatu difficillima, si omnimodam *explicatur* sectemur. Nam in demonstratione temporum æqualium in cycloide, mobile, per eam delatum, veluti punctum gravitate præditum consideravimus. Sed, si ad effectum spectemus, non magni facienda est difficultas hæc; cum ponderis, quo pendulum constat, magnitudo in horologiis tanta non requiratur (etsi quo majus eo melius) ut differentia centrorum gravitatis, & oscillationis, aliquid hic turbare possit. Quod si tamen effugere prorsus has tricas velimus, id ita consequemur, si sphera lentemve penduli, circa axem suum horizontalem, mobilem efficiamus: axis extrema utrinque, virgæ penduli imæ, inserendo: quæ idcirco ut bifida hac parte sit necesse est. Fit enim hoc modo, ex motu natura, ut eandem perpetuo positionem, respectu horizontalis plani, sphera penduli servet, atque ita puncta ejus quævis, æque ac centrum ipsum, cycloides easdem percurrent. Vnde cessat hic jam centrorum oscillationis consideratio; nec minus perfectam temporum æqualitatem tale pendulum consequitur, quam si punto unico omnis ejus gravitas contineretur.

DE CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.

## PROPOSITIO XXXV.

**D**E mensuræ universalis, & perpetua, constituenda ratione.

Certa, ac permanens magnitudinum mensura, quæ nullis casibus obnoxia sit, nec temporum injuriis, aut longinquitate aboleri aut corrupti poslit, res est & utilissima, & à multis pridem quæsita. Quæ si priscis temporibus reperta fuisset, non tam perplexæ nunc forent, de pedis Romani, Græci, Hebræique veteris modulo, disceptationes. Hæc vero mensura, Horologii nostri opera, facile constituitur; cum sine illo nequaquam, aut ægre admodum, ha-

beri possit. Etsi enim, simplici pendulorum oscillatione, hoc à quibusdam tentatum fuerit, numerando recursus qui tota cæli conversione continentur, vel parte ejus cognita, per fixarum stellarum distantias, secundum ascensionem rectam; nec certitudo eadem hoc modo, quæ adhibitis horologiis, contingit, & labor longe est molestissimus ac tædiosissimus, propter numerandi solicitudinem. Quia autem, præter horologia, aliquid, ad exactissimam hujus mensuræ inquisitionem, etiam centrorum oscillationis notitia confert; ideo hic demum, post eorum tractationem, hanc determinationem subjicimus.

Aptissima huic rei sunt horologia, quorum oscillationes singulæ secunda scrupula, vel eorum semisses, notant, quæque indicibus etiam, ad ea demonstranda, instructa sunt. Postquam enim, ad mediocrem dierum longitudinem, ejusmodi horologium, fixarum stellarum observationibus, compositum fuerit, methodo illa quam in horologii descriptione ostendimus: aliud pendulum simplex, hoc est, sphæra plumbea, aut alia materia gravi constans, extenui filo religata, juxta suspendenda est, motuque exiguo impellenda; ac tantisper producenda, aut contrahenda fili longitudo, donec recursus ejus, per quadrantem horæ, aut semensem, una ferantur cum reciprocationibus penduli horologio aptati. Dixi autem exiguo motu impellendum pendulum, quia oscillationes exiguae, puta 5 vel 6 partium, satis æqualia tempora habent, magnæ vero non item. Tunc, acceptâ mensurâ distantiae, à puncto suspensionis ad centrum oscillationis penduli simplicis; eaque, si recursus singuli scrupula secunda valeant, in tres partes divisâ, facient hæ singulæ longitudinem pedis, quem HORARIUM in superioribus vocavimus: quique, hoc pacto, non solum ubique gentium constitui possit, sed & venturo ævo redintegrari. Adeo ut & moduli pedum omnium aliorum, semel ad hunc proportionibus suis expressi, certò quoque in posterum cognosci possint. Sicut jam supra, pedem Parisiensem ad hunc horarum esse diximus, ut 864 ad 881; quod idem est ac si, posito prius pede Parisiensi, dicamus tribus hujusmodi pedibus, cum octo lineis & dimidia, constitui pendulum simplex, cuius oscillationes scrupulis secundis horariis responsuræ sint. Pes autem Parisiensis ad Rhenanum, quo in patria nostra utuntur, se habet ut 144 ad 139; hoc est, quinque lineis suis diminutus, alterum illum relinquit. Atque ita & hic pes, & alii quilibet, perpetuo duraturas mensuras accipiunt.

Quomodo autem centrum oscillationis in sphæra, ex qualibet  
Longitudine

longitudine suspensa, inveniatur, in superioribus demonstratum est. Nempe, si fiat ut distantia inter punctum suspensionis & sphæræ centrum, ad semidiametrum ejus, ita hæc ad aliam; ejus duas quintas, à centro deorsum acceptas, terminari in quæsito oscillationis centro. Facile autem apparet cur necessaria sit hujus centri consideratio, ad accuratam pedis Horarii constitutionem. Nam, si à punto suspensionis ad sphæræ centrum distantia accipiatur, sphæræ autem magnitudo non definiatur proportione ad filii longitudinem, non erit certa mensura penduli cuius recursus secunda scrupula metiantur; sed quo major erit ejus sphæra, hoc minor invenietur mensura illa, inter centrum sphæræ & punctum suspensionis intercepta. Quia in isochronis pendulis, centra quidem oscillationis à punctis suspensionum æqualiter distant; amplius autem descendit centrum oscillationis infra centrum sphæræ majoris, quam minoris.

DE CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.

Hinc necesse fuit illis, qui, ante hanc centri oscillatorii determinationem, mensuræ universalis constituendæ rationem inierunt; quod, jam inde à prima Horologii nostri inventione, nobilis illa Societas Regia Anglicana sibi negotium sumpfit, & recentius doctissimus Astronomus Lugdunensis, Gabriel Moutonius; his, inquam, necesse fuit designare globuli suspensi diametrum, vel proportione certa ad filii longitudinem, cuius nempe tricesimam vel aliam partem æquaret; vel mensuræ quadam cognita, ut digitii vel pollicis. Sed hoc posteriore modo, ponitur jam certi aliquid, quod id ipsum est quod quærendum est: et si scio vix sensibilem errorem fore, dummodo sphæræ istam, quam jam dixi, magnitudinem non multum excedant. Priore autem posset quidem aliquo pacto res explicari; sed ita, ut numerandarum oscillationum labor subeundus sit, calculoque etiam utendum. Quamobrem præstat, centra oscillationis adhibendo, certam rationem sequi, nullisque præter necessitatem legibus obligari. atque hic jam majoribus sphæræ quam exiguis potius utendum, quod illæ occursu aëris minus impediantr.

Cæterum, non sphæræ tantum ex filo suspensa, sed & coni, cylindri, aliaque omnia solida, planaque, quorum centra oscillationis superius exhibuimus, ad hanc mensuram investigandam apta sunt; quoniam, à punto suspensionis ad centrum oscillationis, certum idemque omnibus isochronis pendulis est intervallum. Neque etiam illa duntaxat horologia, quæ secunda scrupula aut eorum semisses singulis penduli recursibus indicant, ad hæc usur-

pare possumus; sed & aliâ quâcunque penduli longitudine instru-  
ctis propositum obtinebitur, dummodo ex rotarum proportioni-  
bus, seu dentium numero, cognoscatur numerus oscillationum  
certo tempore peragendarum. Invento enim pendulo simplici,  
cujus librationes singulæ conveniant vel singulis, vel binis ternisve  
recursibus horologii, constabit jam hinc, quot penduli illius vices  
horæ spatio transigantur. Quarum numerus si quadretur, erit ut  
quadratum è 3600, numero scrupulorum secundorum horam unam  
efficientium, ad quadratum illius numeri, ita longitudo penduli  
simplicis inventi, (quæ longitudo semper à puncto suspensionis ad  
centrum oscillationis accipienda est) ad longitudinem penduli il-  
lius horarii tripedalis, quod diximus. Hoc enim inde constat, quod  
duorum quorumvis pendulorum longitudines sunt inter se, sicut  
quadrata temporum quibus singulæ oscillationes transeunt; ideo-  
que contrariam rationem habent quadratorum à numeris, quos  
efficiunt oscillationes æqualibus temporum intervallis peractæ.  
Nam, cum haec tenus experientiâ tantum comprobatum fuerit  
Theorema illud, de pendulorum longitudinibus; eas nempe dupli-  
catam habere rationem temporum, quibus oscillationes singulæ  
peraguntur; nunc ejus demonstratio ex superius traditis manifesta  
est. Cum enim ostenderimus, singulos recursus penduli, inter cy-  
cloides suspensi, ad casum perpendicularis, è dimidia penduli lon-  
gitudine, certam rationem habere; eam scilicet quam circumferen-  
tia circuli ad diametrum suam, facile hinc colligitur, tempora oscil-  
lationum in duobus pendulis esse inter se, sicut tempora descensus  
perpendicularis ex dimidiis eorum altitudinibus. Quæ altitudines  
dimidiæ, sive etiam totæ, cum habeant rationem duplicatam tem-  
porum, quibus ipsæ descensu perpendiculari percurruntur\*, eadem  
quoque duplicatam rationem habebunt temporum, quæ oscilla-  
tiones singulas metiuntur. Ab oscillationibus autem minimis pen-  
duli, inter cycloides suspensi, non differunt sensibiliter oscillationes  
minimæ penduli simplicis, cuius eadem sit longitudo. Itaque &  
pendulorum simplicium longitudines, duplicatam rationem ha-  
bebunt temporum, quibus oscillationes minimæ transiguntur.

Quod si quis oscillationum numerandarum, quæ horæ aut se-  
mihoræ tempore transeunt, labore non defugiat; horologium  
que adfit, cuius index secunda scrupula demonstret; quæcunque  
accipiatur penduli simplicis longitudo, ejus numerus oscillatio-  
num, quæ hora una continentur, hoc modo cognoscetur; atque  
inde longitudo penduli tripedalis, ad secunda scrupula, ut antea,  
calculo prodibit.

\* Prop. 3.  
Part. 2.

## PROPOSITIO XXV.

DE CENTRO  
OSCILLA-  
TIONIS.

**S**patium definire, quod gravia, perpendiculariter cadentia, dato tempore percurrunt.


Hanc mensuram quicunque haetenus investigarunt, experimeta consulere necesse habuerunt; quibus, prout haetenus instituta fuere, non facile ad exactam determinationem pervenitur, propter velocitatem cadentium, sub finem motus acquisitam. Ex nostra autem prop. 25, de Descensu gravium, cognitaque longitudo penduli ad secunda scrupula, absque experimento, per certam consequentiam, rem expedire possumus. Ac primo quidem spatium illud inquiremus, quod unius scrupuli secundi tempore grave praeterlabitur; ex quo quaelibet alia deinde colligere licebit. Quia igitur penduli, ad secunda scrupula, longitudinem diximus esse pedum Horariorum 3: tempus autem unius oscillationis minimæ, est ad tempus descensus perpendicularis ex dimidia penduli altitudine, ut circumferentia circuli ad diametrum, hoc est, ut 355 ad 113: si fiat, ut numerus horum prior ad alterum, ita tempus unius secundi scrupuli, sive sexaginta tertiorum, ad aliud; fient  $19\frac{1}{10}$ , tempus descensus per dimidiam penduli altitudinem, quæ nempe est pedis unciarum 18. Sicut autem quadrata temporum, ita sunt spatia illis temporibus peracta, quemadmodum superiori propositione fuit ostensum. Ergo, si fiat ut quadratum ex  $19\frac{1}{10}$  ad quadratum ex  $60''$ , hoc est, ut 36481 ad 360000, ita 18 unciæ ad aliud, fient ped. 14. unc. 9. lin. 6, altitudo descensus perpendicularis tempore unius secundi. Cum autem pes Horarius sit ad Parisiensem, ut 881 ad 864; erit eadem altitudo, ad hanc mensuram reducta, proxime pedum 15 & unciæ unius. Atque haec cum accuratissimis experimentis nostris prorsus convenient. in quibus punctum illud temporis, quo casus finitur, non aurium aut oculi judicio discernitur; quorum neutrum hic satis tutum est; sed spatium descendendo peractum, alio modo, quem hic exponere tentabimus, absque ullo errore cognoscitur.

Penduli, ad parietem tabulamve erectam, suspensi dimidia oscillatio moram temporis, cadendo absumpti, indicat. Cujus sphærule, ut eodem momento ac plumbum casui destinatum dimittatur, utraque filo tenui connexa tenentur, quod admoto igne inciditur. Sed prius, casuro plumbo, funiculus alias adnectitur, ejus longitudinis, ut, cum totus exierit à plumbbo tractus, nondum ad pa-

rietem illidatur pendulum. Funiculi ejus caput alterum, regulæ chartaceæ, aut ex tenui membrana paratæ, cohæret; ita ad partem tabulam ve applicatæ, ut trahentem funem facile sequi possit, rectâque secundum longitudinem suam descendere; eo loci transiens, quo penduli sphæra ad tabulam accidet. Absumpto igitur funiculo toto, pars insuper regulæ deorsum trahitur à cadente plumbo, priusquam pendulum ad tabulam pertingat. Quæ quantæ sit pars, sphæra fuligine leviter infecta, regulamque præterlabantem signans, indicat. Huc autem addita funiculi longitudine, spatium cadendo emensum certò definitum habetur.

Aëris autem occursum, quasi nullus esset in his intelligimus, ut mensura cadentibus corporibus præfixa cum experimentis exacte consentiat. Nec sane tantus est ille, ut in altitudinibus his, quò ascendere datur, sensibile discriminem inducere possit; dummodo solida corpora è metallo, aut, si leviore materia constent, mole grandiuscula accipientur. Levitas enim' materiæ, in iis quæ cadendo aërem secant, ita magnitudine corporis pensatur, ut sphæra lignea, vel etiam è subere formata, paria faciat cum plumbea: quando nimirum diameter harum ad plumbeæ diametrum eam rationem habuerit, quam gravitas plumbi propria ad ligni suberisve gravitatem. Tunc enim gravitates sphærarum erunt inter se sicut earum superficies. Veruntamen, ut æquali celeritate, quantum sensu percipi potest, decidunt corpora, quæ multum intrinseca gravitate differunt, nequaquam opus est ut proportio illa diametrorum servetur. Possunt enim inter se æqualia esse, dummodo utraque satis magna sint; aut ex non nimia altitudine decidunt. Etenim illud quoque hic animadvertendum est, tantam vel altitudinem esse posse; vel, in mediocri etiam altitudine, tantam projecti corporis levitatem; ut ob aëris renitentiam, acceleratio motus tandem ab illa, quam in superioribus demonstravimus, proportione plurimum recessura sit. Namque in universum, corpori cuilibet, per aërem aliudve liquidum labenti, certus celeritatis modus, pro ratione ponderis ac superficie suæ, constitutus est; quem excedere, aut potius ad quem pervenire nunquam possit. Quæ nempe celeritas ea est, quam si aër, aut liquor ille sursum tendens, haberet, suspensum corpus idem sibi innatans sustinere posset. Verum de his, alias fortasse, pluribus agendi occasio erit.





## HOROLOGII OSCILLATORII PARS QUINTA.


*Constructionem aliam, è circulari pendulorum motu deducam, continens; & Theorematum de Vi Centrifuga.*

EST & aliud Oscillatori motus genus, præter id quod hanc tenus pertraetavimus. Ejusmodi nempe, quo, per circuli ambitum, pendulum pondus circumfertur. Vnde aliud quoque horologii commentum deduximus, eodem fere tempore quo prius illud; certoque itidem æquabilitatis principio nixum; sed cuius usus minus percrebuit, propter alterius illius constructionem, quodammodo simpliciorem facilioremque. Plura tamen hujus quoque generis de quo nunc loquimur, nec sine successu, constructa fuere: estque in his singulare illud, quod continuo atque æquabili motu circumferri cernitur index postremus, qui secunda scrupula designat; cum in priore nostro horologio, omnibusque aliis, subsultim quasi feratur. Item hoc quoque, quod absque strepitu, sonoque omni, moveantur hac ratione constructa automata. quanquam, ad observationes astronomicas, sonus ad singula secunda scrupula repetitus, utilitate non careat. Et constitueram quidem, descriptionem horum cum iis demum edere, quæ ad motum circularem & Vim Centrifugam, ita enim eam vocare liber, attinent; de quo argumento plura dicenda habeo, quam quæ hoc tempore exequi vacet. Sed, ut nova nec inutili speculatione maturius fruantur harum rerum studiosi, neve casu aliquo intercidat, hanc quoque partem, præter destinatum, cæteris adjunxi, qua machinæ hujus fabrica breviter exponitur, simulque Theorematum traduntur, ad vim centrifugam pertinentia; demonstratione ipsorum in aliud tempus dilata.

### *Horologii secundi constructio.*

Non necessarium duxi, ut rotarum, quibus interiora horologii constant, dispositionem hic exhiberem; cum ea ab artificibus fa-

CHRI STIANI HUGENII  
cile ordinari, variisque modis mutari possit; sed eam partem ex-  
plicari satis esse, quæ motum ejus certa ratione moderatur. Cujus  
partis hic figura expressa est.



Ax̄is D H ad horizontem erectus intelligendus est, ac super polis duobus mobilis. Huic ad A affixa est lamina, latitudine aliqua prædita, curvataque secundum lineam A B; quæ est paraboloides illa de qua ostendimus, propos. 8. partis 3, evolutione ejus, postquam ipsi recta quædam juncta fuerit, describi parabolam. Ea recta hic est A E; parabolam vero, ex evolutione totius B A E descriptam, refert linea E F. Filum curvæ B A applicatum, cujus extremo puncto parabola describitur, est B G F. Pondus illi affixum F. Dum autem axis D H in se vertitur, filum B G F, in rectam lineam extensem, sphærulam F una circumducit, ita ut circulos horizonti parallelos percurrat; qui majores minoresve erunt, prout majori aut minori vi axis D H, ab rotis horologii in tympanidium K agentibus, incitatibit: sed ita, ut omnes in superficie conoidis parabolici contineantur. Atque hoc ipso æqualia semper circuitus tempo-

ra evadent, ut ex iis, quæ de hoc motu postea dicemus, apparebit.

Quod si circuitus singulos, secundorum scrupulorum semisses notare velimus, oportet latus rectum parabolæ E F esse  $4\frac{1}{2}$  unciarum pedis Horarii nostri, hoc est dimidium longitudinis penduli, cuius singulæ oscillationes semiscrupulum secundum impenderent. Ex parabolæ autem latere recto, pendet magnitudo lateris recti paraboloidis A B; quippe quod illius  $\frac{17}{6}$  continet: atque item longitudo A E, quæ lateris recti parabolæ dimidium est. Si vero secunda scrupula unoquoque circuitu expleri desideremus, quadrupla priorum accipienda sunt, tum latera recta, tum linea A E.

Porro, et si filum B G F. veluti unicum ac simplex hactenus designavimus, sciendum tamen longe præstare ut parte superiori duplex sit, ac versus F in angulum coeat, 20 vel 30 partium. In quem finem & laminæ A B latitudo ad B tanta esse debet, quanta isti filorum divaricationi sufficit, vel & ipsa bifida facienda. Hoc pacto enim motus circularis ponderis F, absque alio ullo adminiculo, continuatur, ac filum utrumque sibi annexum in rectum extendit; quod non faceret, si unico tantum filo teneretur. Vbi tamen vim illam ab horologii rotis, vel pondere vel alia potentia motis, ad continuationem hujus motus circularis requiri sciendum. Quæ nempe vis per tympanidium K ad axem K H pervenit, ac minimo nisu, motum sphæræ F semel inditum, conservat.

Hoc autem quo facilius possit, liberrimam axis K H revolutionem esse oportet. Quod nulla ratione melius perfici compertum, quam si, parte sui ima, durato chalybe constet, suppositamque habeat adamantis superficiem planam; cuius minima quævis particula hic sufficit, subter laminam perforatam collocanda.

Cæterum in locum fili B G F, qua parte curvæ A B applicari debet, catenulam tenuem ex auro, aliave metallo, adhibere licebit, quo melius invariata servetur longitudo. Atque hoc in priore quoque horologio, ubi pendulum inter cycloides suspensum est, experti sumus. Sed ibi flexus catenulæ continuus, attritu annularum, per exiguo licet, non parum impedit liberam penduli agitationem.

## D E V I C E N T R I F V G A ex motu circulari, Theorematum.

### I.

**S**i mobilia duo aequalia, aequalibus temporibus circumferentias inæquales percurrant; erit vis centrifuga in ma-

De vi centrifugae. jori circumferentia, ad eam quæ in minori, sicut ipsæ inter se circumferentia, vel earum diametri.

## II.

Si duo mobilia aqualia, aquali celeritate ferantur, in circumferentiis inequalibus; erunt eorum vires centrifuga in ratione contraria diametrorum.

## III.

Si duo mobilia aqualia in circumferentiis equalibus ferantur, celeritate inquali, sed utraque motu aquabili, qualis in his omnibus intelligi volumus; erit vis centrifuga velocioris, ad vim tardioris, in ratione duplicita celeritatum.

## IV.

Si mobilia duo aqualia, in circumferentiis inqualibus circumlata, vim centrifugam aqualem habuerint; erit tempus circuitus in majori circumferentia, ad tempus circuitus in minori, in subdupla ratione diametrorum.

## V.

Si mobile in circumferentia circuli feratur ea celeritate, quam acquirit cadendo ex altitudine, quæ sit quartæ parti diametri aqualis; habebit vim centrifugam sua gravitati aqualem; hoc est, eadem vi funem quo in centro detinetur intendet, atque cum ex eo suspensum est.

## VI.

In cava superficie conoidis parabolici, quod axem ad perpendicularm erectum habeat, circuitus omnes mobilis, circumferentias horizonti parallelas percurrentis, sive parvae sive magna fuerint, equalibus temporibus peraguntur: quæ tempora singula aquantur binis oscillationibus penduli, cuius longitudo sit dimidium lateris recti parabolæ genitricis.

## VII.

Si mobilia duo, ex filis inqualibus suspensa, gyrentur ita ut circumferentias horizonti parallelas percurrent, capite altero fili immoto manente; fuerint autem conorum, quorum superficiem fila hoc motu describunt, altitudines aquales; tempora quoque circulationum aqualia erunt.

## VIII.

HOROLOG. OSCILLATOR.  
VIII.

161

De vi cen-  
trifuga.

*Si mobilia duo, uti prius, motu conico gyrentur, filis aquilibus vel inaequalibus suspensa; fuerintque conorum altitudines inaequales; erunt tempora circulationum in subduplicata ratione ipsarum altitudinum.*

IX.

*Si pendulum, motu conico latum, circuitus minimos faciat; eorum singulorum tempora, ad tempus casus perpendicularis ex dupla penduli altitudine, eam rationem habent, quam circumferentia circuli ad diametrum: ac proinde aequalia sunt tempori duarum oscillationum lateralium, ejusdem penduli, minimarum.*

X.

*Si mobile in circumferentia feratur, circuitusque singulos absolvat eo tempore, quo pendulum, longitudinem semidiametri circumferentiae ejus habens, motu conico circuitum minimum absolveret, vel duplicem oscillationem minimam lateralem: habebit vim centrifugam sua gravitati aequalem.*

XI.

*Penduli cujuslibet, motu conico lati, tempora circuitus aequalia erunt tempori casus perpendicularis, ex altitudine penduli filo aequali; cum angulus inclinationis fili, ad planum horizontis, fuerit partium 2. scrup. 54, proxime. Exakte vero, si anguli dicti sinus fuerit ad radium, ut quadratum circulo inscriptum ad quadratum à circumferentia ejus.*

XII.

*Si pendula duo, pondere aequalia, sed inaequali filorum longitudine, motu conico gyrentur, fuerintque conorum altitudines aequales; erunt vires, quibus fila sua intendent, in eadem ratione qua est filorum longitudinis.*

XIII.

*Si pendulum simplex oscillatione lateralı maxima agitetur, hoc est, si per totum circuli quadrantem descendat: ubi ad punctum imum circumferentiae pervenerit, triplo majori vi filum suum trahet, quam si ex illo simpliciter suspensum foret.*

FINIS.

X

## CORRIGENDA.

- Pag. 5. versu 9. à fine, pro N lege R; qua litera in figura omissa est.  
Pag. 6. v. 4. à fine, pro X scribe a.  
Ibidem v. ult. pro z scribe e. Et sic quoque pag. sequ. versu 2.  
Pag. 7. v. 2. à fine, pro M K scribe K.  
Pag. 16. v. 13. post, tricesimamve, adde aut etiam minorem.  
Pag. ead. v. 23. & 24. citantur litera A, B, C, qua in figura omisse sunt. ubi linea huc eadem 2.  
post, à puncto autem C, adde centro oscillationis.  
Pag. 26. v. 3. lege quadrato.  
Pag. 56. v. 7. à fine pro O A lege s. A.  
Pag. 81. & 84. in figurarum altera qua est ad sinistram, non ex T ducenda erat T X, sed ex V recta  
v X parallela L K.  
Pag. 85. v. 11. à fine, post K M, I N, adde, quarum huc major erit.  
Pag. 86. v. 1. pro a a x lege a x x, & dele do y.  
Pag. 87. v. 10. à fine, pro F D scribe B D.  
Ibidem v. 2. à fine, pro F H K scribe A R I.  
Item v. 3. à fine, lege continuata.  
Pag. 95. v. 1. pro B scribe G.  
Pag. ead. v. à fine s. lege volumus.  
Pag. 99. v. 12. dele velut Q Q.  
Pag. 104. v. 10. pro A D lege M D.  
Pag. 107. in fig. que ad dextram, debet punctum H esse ad alteram partem puncti a.  
Pag. 111. v. à fine 4. 6. & 7. pro z m lege z x m.  
Pag. 112. v. 2. pro  $\frac{m m l l}{6}$ , lege  $\frac{m m - l l}{6}$ .  
Pag. 123. v. 10. pro & H centrum gravitatis, lege, & o H subtentrica.


I X


I IX


III X

E I N I G

X









HVG  
DE  
MIO  
ENDV

